

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “I”
GESTASI 37-42 MINGGU DENGAN PERSALIANAN NORMAL DI
PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Pendidikan
Ahli Madya Kebidanan Jurusan D III Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

IRA AYU LESTARI
70400114072

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRA AYU LESTARI
Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng,06 November 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Diploma
Alamat : Mannyampa, Desa Tanakaraeng Kec manuju Kab Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan intranatal pada Ny”T”
Gestasi 37-42 minggu dengan persalinan normal di
puskesmas jumpandang baru Makassar tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, September 2017

Penyusun

IRA AYU LESTARI
Nim.70400114072

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL "Manajemen Asuhan kebidanan intranatal pada NY "1"
Gestasi 37-42 minggu Dengan persalinan normal"

Telah Disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI)
Mahasiswa Kebidanan

Menyetujui,
Pembimbing I




(Dr. Hj. Siti Soleha, S.SiT, S.KM, M.Ke)

Pembimbing II



dr. Rully Rahmadhani, M.Ke



PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "I" Gestasi 37-42 Minggu dengan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpang Baru Makassar Tahun 2017", yang disusun oleh Ira Ayu Lestari NIM: 70400114072, mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin 06 November 2017 M, bertepatan dengan Tanggal 17 Shafar 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samara, 10 November 2017 M
21 Shafar 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Firdayanti, S.SiT., M.Keb. (.....)

Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb. (.....)

Pembimbing II : dr. Raully Rahmadhani, M.Kes. (.....)

Penguji I : Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT., M.Keb. (.....)

Penguji II : Dr. H. Supardin, M.H.I. (.....)

Dekan, f

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal KTI ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “I” gestasi 37-42 minggu Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar ” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Sehingga penulis dapat mempersembahkan karya tulis ilmiah ini sebagai kado terindah dan sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuanya yaitu bapak abd rahim dan ibu rosmiati yang tidak pernah bosan untuk memberikan doa serta dukungan moril maupun moral meskipun penulis mengetahui bahwa karya tulis ini tidak bisa membalas kedua orang tuanya namun setidaknya karya tulis ini ini bisa membuat orang tuanya menjadi bangga dan tersenyum bahagia.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

3. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan
4. Ibunda Firdayanti, S. Sit., M.keb selaku sekretaris jurusan prodi kebidanan
5. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.Si.T., S.KM., M.Keb. selaku pembimbing I yang senangtiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Ibu dr. Raully Rahmadhani., M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dengan sabar dan ikhlas dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibu Anieq Mumthiah Alkautsar., S.Si.T., M.Keb. selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan KaryaTulis Ilmiah ini.
8. Bapak ustadz Dr. H. Supardin., M.H.I selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
9. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar
10. Kepala Puskesmas Jumpandang Baru dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.

11. Kak Dian Astriani., S.Fam selaku pembimbing Murabbiah dalam Tarbiyah mingguan yang selalu sabar dan ikhlas mengajarkan dan membagi ilmunya tentang ajaran-ajaran islam. Dan teman-teman tarbiyah yang saling mengingatkan satu sama lain untuk menuju kebaikan.
12. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2014. Dan terlebih khusus lagi kepada Miftahul khair wahid, hartina, sinta nur asia k, muliati, rosnani, sulfiani, zuhriani hs, Sunarti,dan Nur Hikmah.

Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih. Namun bila ilmu dipelajari dengan setengah-setengah dan dimanfaatkan semauanya tanpa tahu tujuannya benar atau tidak, maka ilmu itu akan merusak citra keindahan. Inilah yang sangat penting kita pahami agar tidak sembarangan mempergunakan ilmu dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dipelajari dengan niat baik dan tulus untuk diamalkan di jalan Allah SWT melalui kehidupan umat manusia sebagai perantaranya. Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’maalun bi niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang

selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, 06 November 2017

Penulis

Ira ayu lestari



DAFTAR ISI

SAMPUL

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| PERYATAAN KEASLIAN KTI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN KTI | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR ISTILAH | viii |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| a. Latar Belakang | 1 |
| b. Ruang Lingkup | 5 |
| c. Tujuan Penulisan..... | 6 |
| d. Manfaat Penulisan | 7 |
| e. Sistematika Penulisan | 8 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN TEORI..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan normal..... | 10 |
| a. Pengertian..... | 10 |
| b. Etiologi Persalinan | 12 |
| c. fisiologi persalinan..... | 13 |
| d. Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan..... | 17 |
| e. Tahapan persalinan..... | 17 |
| a. Kala I..... | 34 |
| b. Kala II..... | 51 |
| c. Kala III..... | 58 |
| d. Kala IV | 59 |
| B. TINJAUAN KASUS DALAM ISLAM | 65 |
| C. MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN | 65 |
| BAB III STUDI KASUS | 75 |
| KALA I..... | 75 |
| Langkah I. Identifikasi data dasar | 75 |
| Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual..... | 85 |
| Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial..... | 90 |
| Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi | 90 |
| Langkah V. Rencana tindakan | 91 |
| Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan..... | 95 |
| Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan..... | 97 |
| KALA II..... | 98 |

| | |
|--|------------|
| Langkah I. Identifikasi data dasar | 98 |
| Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual..... | 99 |
| Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial..... | 100 |
| Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi/Rujukan..... | 100 |
| Langkah V. Rencana tindakan | 100 |
| Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan..... | 106 |
| Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan..... | 111 |
| KALA III | 111 |
| Langkah I. Identifikasi data dasar | 111 |
| Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual..... | 112 |
| Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial..... | 113 |
| Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi dan Rujukan..... | 113 |
| Langkah V. Rencana tindakan | 113 |
| Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan..... | 117 |
| Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan..... | 119 |
| KALA IV..... | 120 |
| Langkah I. Identifikasi data dasar | 120 |
| Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual..... | 120 |
| Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial..... | 121 |
| Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi | 121 |
| Langkah V. Rencana tindakan | 121 |
| Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan..... | 123 |
| Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan..... | 125 |

| | |
|--|------------|
| SOAP KALA I..... | 126 |
| SOAP KALA II | 133 |
| SOAP KALA III..... | 140 |
| SOAP KALA IV | 145 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 149 |
| Langkah I. Identifikasi data dasar | 149 |
| Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual..... | 156 |
| Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial..... | 163 |
| Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi | 169 |
| Langkah V. Rencana tindakan | 170 |
| Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan..... | 174 |
| Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan..... | 175 |
| BAB V PENUTUP..... | 176 |
| A. Kesimpulan..... | 176 |
| B. Saran | 178 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 3.1 : | Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu..... | 79 |
| Tabel 3.2: | Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his..... | 97 |
| Tabel 3.3: | Evaluasi Tanda-tanda vital pasca persalinan dan estimasi jumlah kehilangan darah..... | 125 |
| Tabel 3.4: | Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his..... | 132 |
| Tabel 3.5: | Evaluasi Tanda-tanda vital pasca persalinan dan estimasi jumlah kehilangan darah..... | 148 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. fleksi, dagu bawah lebih dekat kearah dada janin 40



DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 2.1** Fleksi, dagu dibawah lebih dekat ke arah dada janin
(*Google Image*)..... 40



DAFTAR ISTILAH

A.

| | |
|----------------|--|
| Amniotomi | : pemecahan ketuban secara manual |
| Aorta | : pembuluh darah terbesar |
| Asfiksia lahir | : keadaan dimana bayi tdk mampu bernafas segera setelah lahir |
| Aerobik | : pernapasan yang menggunakan udara |
| Anaerobic | : pernapasan tanpa menggunakan udara |
| Amniotomi | : pemecahan ketuban secara manual |
| asyinclitismus | : arah kepala janin miring dengan bidang PAP atau sutura sagitalis agak kedepan mendekati simfisis/agak kebelakang mendekati promotorium |
| Affacement | : serviks menjadi mendatar |
| Amnion | : air ketuban |

B.

| | |
|---------------|--|
| braxton hicks | : kontraksi uterus yang bersifat tidak teratur dan ringan pada ibu hamil namun sebenarnya belum dalam masa persalinan |
|---------------|--|

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Bloody show | : lendir dan darah |
| Bradikardi | : denyut jantung janin melambat |

C

Chepalo pelvis disproportion : ketidak sesuaian ukuran kepala janin dengan jalan lahir

D

| | |
|------------------|--|
| Dilatasi serviks | : pembukaan serviks |
| dorso cranial | : gerakan mendorong uterus kearah belakang |

| | |
|------------------|--|
| Distosia bahu | : bahu macet |
| Desidua | : bagian dari otot dinding uterus yang banyak mengandung nutrisi bagi janin |
| Distensi | : Rahim yang menjadi besar dan meregang |
| E | |
| uterus | : rahim |
| Estrogen | : hormon seks pada wanita. |
| engagement | : masuknya kepala janin kepintu atas panggul |
| Ekspulsi | : lahirnya seluruh badan bayi |
| Ekstensi | : Kepala bayi mendongak |
| Evaluasi | : pemantauan |
| F | |
| Fetus | : janin |
| Flexi | : gerakan kepala janin ke arah dada |
| G | |
| Gastrointestinal | : lambung dan usus |
| Gagang laminaria | : tongkat kecil yang digunakan sebagai alat untuk merangsang kontraksi , dipasang di mulut rahim |
| H | |
| His | : kontraksi |
| Hipotensi | : tekanan darah rendah |
| Hipoksia | : kekurangan oksigen |
| I | |
| iritasi mekanik | : Tekanan pada ganglio servikale dari pleksus frankenhauser yang terletak di belakang serviks |

K

- Komprehensif : menyeluruh
Kapiler : pembuluh darah
Kardiovaskuler : jantung dan pembuluh darah

L

- Lightening : penurunan fundus uterus

M

- Miometrium : lapisan kedua dari rahim atau uterus
Metabolisme : pembakaran

O

- Oksitosin drips : pemberian oksitosin melalui infus
Ostium Uteri Eksternum : organ genitalia luar

P

- Power : Tenaga /kekuatan
Passage : jalan lahir
Passenger : hasil konsepsi atau janin
pleksus frankenhauser : saraf yang menyebabkan refleks meneran
Progesteron : hormon yang penting untuk perkembangan seksual dan reproduksi, terutama pada wanita
Prostaglandin : zat yang merangsang kontraksi pada rahim

R

- Respirasi : pernapasan

S

- Sub occiput : bagian tulang kepala yang letaknya di bawah tulang oksiput

Symfisis : tulang kemaluan

syinclitismus : arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP
atau suura sagitalis terdapat ditengah-tengah jalan lahir/
tepat diantara simfisis dan promotorium

Serviks : mulut rahim

U

uterus : rahim



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------|---|
| AKI | : angka kematian ibu |
| BULIN | : ibu bersalin |
| BUMIL | ibu hamil |
| DDT | : desinfeksi tingkat tinggi |
| DJJ | : Denyut jantung janin |
| PAP | : pintu atas panggul |
| PD | : Perlindungan diri |
| KMS | : Kartu Menuju Sehat |
| SOAP | : subjektif,objektif,assesment,planning |
| SAR | : Segmen atas rahim |
| WUS | : wanita usia subur |
| WHO | : word healt organisation |
| GPA | : Gestasi, partus, abortus |
| PBP | : Pintu bawah panggul |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Kegiatan Konsultasi Proposal
- Lampiran 2 : Lembar Kegiatan Konsultasi Hasil
- Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Hasil
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbagda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Walikota Makassar
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Walikota Atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Atau Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

Lampiran 8 : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas
Jumpandang baru Makassar

Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Ira Ayu Lestari

Nim : 70400114072

Pembimbing : 1. Hj. Sitti Saleha

2. Raully Rahmadhani

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “I” gestasi 37-42 minggu dengan Persalinaan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017

Persalinan adalah sebagai suatu proses alami dan merupakan peristiwa yang normal namun bila tidak dikelola dengan tepat dapat berubah menjadi abnormal. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan janin letak memanjang dan presentasi belakang kepala yang disusul dengan pengeluaran plasenta. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan metode penelitian manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney

Manajemen asuhan kebidanan intranatal pada Ny “I” gestasi 37-42 minggu dengan persalinaan normal , setelah dilakukan pengumpulan data di puskesmas puskesmas jumpandang baru makassar ,bahwa ibu dengan proses pengeluaran janin yang cukup bulan, lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala, di susul dengan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban dari tubuh ibu, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin adalah persalinan normal . Penanganan pada kasus persalinan normal gestasi 37-42 minggu dengan presentasi belakang kepala yaitu dengan melakukan tindakan asuhan persalinan normal sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan berpedoman pada ketentuan islam. Setelah dilakukan penanganan sesuai asuhan persalinan normal mulai dari kala I, II, III, dan IV maka tidak di temukan adanya penyulit pada persalinan.

Dari hasil studi kasus dapat disimpulkan mulai dari kala I, II, III, dan IV tidak didapatkan kesenjangan antara teori dengan yang didapatkan di lapangan.

Kata kunci: persalinan/ Persalinan Normal , dan 7 langkah varney

ABSTRACT

Name : Ira Ayu Lestari
Student Reg. No. : 70400114072
Supervisors : 1. Hj. SittiSaleha
2. RaulyRahmadhani
Title : The Intranatal Midwifery Care Management on Mrs. "I"
of 37-42 Weeks Gestation with Normal Delivery at
Jumpanang Baru Makassar Public Health Center in
2017

Delivery is a natural process and a normal incidence, however when it is not properly managed, it can become abnormal. Childbirth and normal delivery are fetal expulse processes occurring in term pregnancy (37-42 weeks), spontaneous delivery with elongated fetus and rear-head presentation followed by placentar exclusion. The study is a case study approach using a research method of midwifery care management with seven steps of Varney.

The intranatal midwifery care management on Mrs. "I" of 37-42 weeks gestation with normal delivery reveals that after collecting the data at Jumpanang Baru Makassar Public Health Center, it is found that the mother with fetal expulse process with term pregnancy, born spontaneously with presentation of rear head, and following with expulsion of the placenta and the amniotic membrane from the mother's body, without complications of both mother and fetus. The management of normal delivery of 37-42 weeks gestation with the rear-head presentation is by performing the act of normal delivery care according to standard operational procedures (SOP) and guided by the provisions of Islam. After performing the management based on normal delivery starting from stage I, II, III, and IV, it is not found any complications in the delivery.

From the case study results, it can be concluded that starting from stage I, II, III, and IV there is no discrepancy between the theory and data acquired in the field.

Keywords : Normal Delivery, 7 Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan dan kelahiran merupakan proses kelahiran janin pada tua kehamilan sekurang – kurangnya 28 minggu atau kalau bayi yang dilahirkan beratnya 1000 gram lebih. Definisi ini didasarkan atas kemungkinan hidupnya bayi (viabilitas). Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan janin letak memanjang dan presentasi belakang kepala yang disusul dengan pengeluaran plasenta dan seluruh proses kelahiran itu berlangsung dalam 141/2 jam pada primipara dan 73/4 jam pada multipara. (Miswani, 2013 : 201).

Tujuan persalinan adalah menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui upaya yang terintegrasi dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan (optimal). Dengan pendekatan ini maka setiap intervensi yang diaplikasikan dalam asuhan persalinan normal harus mempunyai alasan dan bukti ilmiah yang kuat tentang manfaat intervensi tersebut bagi kemajuan dan keberhasilan proses persalinan (Sujiyatini, 2012 : 2).

Persalinan adalah sebagai suatu proses alami dan merupakan peristiwa yang normal, namun bila tidak dikelola dengan tepat dapat berubah menjadi abnormal. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat, oleh karena itu, setiap wanita

usia subur (WUS), ibu hamil (bumil), ibu bersalin (bulin), dan bayinya berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Namun sampai sekarang ini persalinan masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dimana angka kematian ibu bersalin yang masih cukup tinggi. Keadaan ini disertai dengan komplikasi yang mungkin saja timbul selama persalinan, sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam bidang kesehatan, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka kematian, kesakitan ibu dan perinatal (Purwandari, dkk, 2014: 47).

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Purwandari, Atik, dkk (2014: 46), sebanyak 99% kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-negara berkembang. Rasio kematian ibu di Negara-negara berkembang merupakan yang tertinggi dengan 450 kematian ibu per 100.000 kelahiran bayi hidup, jika dibandingkan dengan rasio kematian ibu di sembilan negara maju dan 51 negara persemakmuran.

Penelitian yang dilakukan di Afrika dan negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka kematian ibu dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan yang terampil dalam membantu proses persalinan sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama kematian ibu pada daerah tersebut. Dengan demikian, perawatan intra-partum yang meliputi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil sangat penting untuk mengurangi angka kematian pada ibu. (Abdurrahman, dkk, 2016: 64)

Kematian dan kesakitan ibu masih merupakan masalah kesehatan yang serius di negara berkembang. Menurut laporan WHO tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa. Amerika Serikat yaitu 9300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 214 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014). Pada tahun 2013 AKI (Angka Kematian Ibu) di Jawa Timur mencapai 97,39 per 100.000

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Kawasan ASEAN. Pada tahun 2007, ketika AKI di Indonesia mencapai 228, AKI di Singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 33 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 112 per 100.000 kelahiran hidup, serta Malaysia dan Vietnam sama-sama mencapai 160 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2012 SDKI kembali mencaat kenaikan AKI yang signifikan, yakni dari 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target yang diharapkan berdasarkan Melenium Development Goals (MDSGs) pada tahun 2015 yaitu 102/100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti AKI di Indonesia

jauh diatas target yang ditetapkan WHO patau hampir dua kali lebih besar dari target WHO (Depkes Kesehatan Indonesia, 2015).

AKI di Provinsi Sulawesi selatan tahun 2013 dilaporkan sebanyak 115 orang atau 78.38 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 18 orang (15,65%), kematian ibu bersalin 59 orang (51,30%), kematian ibu nifas 38 orang (33,04%) sedangkan pada tahun 2014 jumlah kematian ibu mengalami peningkatan yakni sebanyak 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 15 orang (10,86%), kematian ibu bersalin 54 orang (39,13%), kematian ibu nifas 69 orang (50,00%). (Profil Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan, 2015: 27)

Dari data rekam medik Puskesmas Jumpandang Baru Makassar pada tahun 2013 jumlah ibu bersalin normal sebanyak 877 orang dan tahun 2014 jumlah ibu bersalin normal sebanyak 1020 orang. Pada tahun 2015 jumlah ibu bersalin normal sebanyak 1010 orang dan pada tahun 2016 jumlah ibu bersalin normal sebanyak 1027 orang. Berdasarkan uraian diatas meskipun data dari puskesmas jumpandang baru tidak menunjukkan angka kematian namun penulis tetap tertarik untuk mengambil kasus manajemen asuhan persalinan normal karena setiap ibu yang bersalin memiliki resiko untuk mengalami kesakitan maupun kematian dimanapun dan kapan pun dan data tersebut di atas penulis tertarik untuk mengambil kasus di jumpandang baru karena tingkat persalinannya dari tahun ketahun tambah meningkat sehingga memungkinkan penulis mendapatkan berbagai macam kasus.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ibu tidak mau meminta pertolongan tenaga penolong persalinan terlatih untuk memberikan asuhan selama persalinan dan kelahiran bayi dengan alasan, bahwa tenaga penolong tersebut tidak benar-benar memperhatikan kebutuhan/kebudayaan, tradisi, dan keinginan pribadi para ibu dalam persalinan dan kelahiran bayi. Alasan lain yang juga berperan adalah bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan memiliki peraturan dan prosedur kurang bersahabat dan menakutkan bagi para ibu (Yani, dkk, 2014: 30).

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi dokter ataupun bidan karena profesi tersebut berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan maupun angka kematian ibu, salah satunya dengan mengubah paradigma masyarakat terkhusus ibu hamil bahwa persalinan perlu terlaksana secara aman baik dari segi penolong, tempat ataupun peralatan kesehatan yang diperoleh dengan melakukan persalinan di rumah sakit, puskesmas, BPS, ataupun klinik dokter.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menunjukkan bahwa masih tingginya angka kematian ibu akibat bersalin utamanya di negara berkembang dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinannya di fasilitas kesehatan maka penulis tertarik untuk melakukan asuhan pada ibu bersalin dengan karya tulis ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ibu Dengan Persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017”

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini mencakup penerapan “Manajemen Asuhan Kebidanan *Intranatal* Pada Ibu Dengan Persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan manajemen asuhan kebidanan intranatal pada Ibu Dengan Persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengumpulan data pada kasus kebidanan intranatal pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.
- b. Dilaksanakan diagnosa/masalah aktual pada kasus kebidanan *intranatal* pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.
- c. Dilaksanakan diagnosa/masalah potensial pada kasus kebidanan *intranatal* pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.
- d. Dilaksanakan kebutuhan tindakan segera, konsultasi, kolaborasi, dan rujukan pada kasus kebidanan *intranatal* pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.
- e. Dilaksanakan rencana asuhan pada kasus kebidanan *intranatal* pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.

- f. Dilaksanakan asuhan pada kasus kebidanan *intranatal* pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.
- g. Dilaksanakan evaluasi hasil asuhan pada kasus kebidanan *intranatal* pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.
- h. Dilaksanakan pendokumentasian hasil asuhan kebidanan *intranatal* pada Ibu dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Aplikatif

- a. Dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan khususnya pada ibu yang melakukan persalinan normal dan merupakan salah satu lingkup upaya promosi kesehatan reproduksi dan berguna bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi secara objektif tentang persalinan normal sehingga menjadi pedoman dalam memberikan penyuluhan dalam memberikan pendidikan kesehatan.

2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Peneliti terutama untuk menambah wawasan yang berkenaan dengan persalinan normal, serta menjadi suatu kesempatan yang berharga bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu bahan bacaan dan acuan bagi peneliti berikutnya

E. Sistematika Penulisan

Bab I :Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang mengungkap mengenai persalinan normal dengan memberikan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka membahas mengenai teori berdasarkan judul yaitu mengenai persalinan yang terdiri dari, pengertian, sebab – sebab mulainya persalinan, istilah dalam persalinan, tahapan persalinan normal, tanda-tanda persalinan, proses persalinan normal dan mekanisme persalinan, tinjauan umum tentang standar pelayanan kebidanan, tinjauan umum asuhan persalinan normal, pengertian, tujuan, aspek lima benang merah, proses persalinan, tinjauan kasus dalam islam, proses asuhan kebidanan, pengertian, tahapan, pendokumentasian asuhan kebidanan.

Bab III :Studi kasus membahas mengenai langkah I. identifikasi dan analisa data dasar, langkah II. identifikasi diagnosa/masalah aktual, langkah III. identifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV. tindakan emergency, konsultasi, kolaborasi dan rujukan, langkah V. intervensi/rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI. implementasi/pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, langkah VII. evaluasi tindakan asuhan kebidanan, pendokumentasian asuhan kebidanan.

Bab IV: Membahas mengenai persamaan, perbedaan atau kesenjangan dalam studi kasus yang sedang dilakukan pengkajian. Bab V : Kesimpulan dan saran antara kasus yang diteliti terhadap teori yang telah dibahas pada bab II, dan pada bagian ini juga menjawab tujuan penelitin dan terakhir bab V membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap pihak yang terkait pada kasus yang diteliti



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan normal

1. Pengertian

- a. Persalinan atau partus adalah proses kelahiran janin pada tua kehamilan sekurang – kurangnya 28 minggu, atau kalau bayi yang dilahirkan beratnya 1000 gram lebih (Miswani, 2013: 201).
- b. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Sujiyatini, 2012: 1).

2. Etiologi Persalinan

- a. Teori Penurunan hormon

Satu sampai dua minggu sebelum persalinan terjadi penurunan kadar *estrogen* dan *progesteron*, progesteron mengakibatkan relaksasi otot rahim, sedangkan estrogen meningkatkan kerentanan otot-otot rahim selama kehamilan terjadi keseimbangan antara kadar *estrogen* dan *progesteron*, tetapi pada akhir kehamilan terjadi penurunan kadar *progesteron* sehingga timbul his

b. Teori distensi rahim

Rahim yang menjadi besar dan meregang akan menyebabkan *iskemik* otot-otot rahim sehingga timbul kontraksi untuk

c. Teori iritasi mekanik

Tekanan pada *ganglio servikale* dari *pleksus frankenhauser* yang terletak di belakang serviks. Bila ganglion ini tertekan, kontraksi uterus akan timbul.

d. Teori plasenta menjadi tua

Villi korialis mengalami perubahan – perubahan, sehingga kadar estrogen dan progesterone menurun yang menyebabkan kekejangan pembuluh darah, hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim.

e. Teori prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab permulaan persalinan karena menyebabkan kontraksi pada miomerium pada setiap umur kehamilan

f. Indikasi partus

Partus dapat di timbulkan dengan jalan *Gagang laminaria* beberapalaminaria di masukkan dalam kanalis servikalis dengan tujuan merangsang *pleksusfrankenhauser*, *Amniotomi* : pemecahan ketuban, Oksitosin drips pemberian oksitosin menurut tetesan infus (Ina Kuswanti dkk,2014 : 3-4)

3. fisiologi persalinan

a. *Lightening*

Menjelang minggu ke 36, pada primigravida, terjadi penurunan fundus uterus karena kepala bayi sudah masuk ke dalam panggul. Penyebab dari proses ini adalah kontraksi braxton hicks, ketegangan dinding perut, ketegangan ligamentum rotundum dan gaya berat janin kepala ke arah bawah uterus, persalinan palsu, ketuban pecah, *blood show*, lonjakan energi, gangguan pada saluran cerna. *Lightening* yang dimulai dirasakan kira – kira 2 minggu menjelang persalinan dimana penurunan bagian presentasi kedalam pelviks minor, pada presentasi sefalik, kepala bayi biasanya menancap (*engaged*) setelah *lightening*. *Lightening* menyebabkan tinggi fundus menurun ke posisi yang sama dengan posisi fundus pada usia kehamilan 8 bulan (Sujiyatini, 2010 : 3).

b. Terjadinya his permulaan

Pada saat hamil muda sering terjadi kontraksi *braxton hicks* yang kadang dirasakan sebagai keluhan karena rasa sakit yang ditimbulkan. Biasanya pasien mengeluh adanya rasa sakit di pinggang dan terasa sangat mengganggu (Sulistyawati, 2012 : 6).

c. Dengan pendataran dan pembukaan

Lendir dari canalis servikalis keluar di sertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapiler terputus (Dewi Setiawati, 2013: 54).

d. Pengeluaran cairan

Terjadi akibat pecahnya ketuban atau selaput ketuban robek. Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap tetapi kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, hal ini di sebut dengan ketuban pecah dini (Dewi Setiawati, 2013: 54).

4. Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan

Keberhasilan proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu actor ibu (*power, passage, psikologis*), faktor janin (faktor plasenta), dan faktor penolong persalinan. Hal ini sangat penting, mengingat beberapa kasus kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh tidak terdeteksinya secara dini adanya salah satu dari faktor-faktor tersebut.

a. Power (Tenaga/Kekuatan)

1) His (Kontraksi Uterus)

Merupakan kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, fundus dominial, terkoordinasi dan relaksasi. Kontraksi ini bersifat involunter karena berada dibawah saraf intrinsic.

a) Pembagian his menurut sifat-sifatnya :

(1) His pendahuluan : his tidak kuat, datangnya tidak teratur, menyebabkan keluarnya lendir darah atau *bloody show*

(2) His pembukaan (Kala I) : menyebabkan pembukaan *serviks*, semakin kuat, teratur dan sakit

(3)His pengeluaran (Kala II) : untuk mengeluarkan janin, sangat kuat, teratur, simetris dan terkordinasi.

(4)His pelepasan plasenta (Kala III) : kontraksi sedang untuk melepaskan dan melahirkan plasenta.

(5)His pengiring (Kala IV) : kontraksi lemah, msih sedikit nyeri, terjadi pengecilan dalam beberapa jam atau hari.

b) Perubahan-perubahan akibat his

(1) Pada uterus dan serviks

Uterus teraba keras atau padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatis air ketuban dan tekanan intrauterine naik serta menyebabkan serviks menjadi mendatar (*affacement*) dan terbuka (*dilatasi*)

(2) Pada ibu

Rasa nyeri karena iskemia rahim dan kontraksi rahim .juga ada kenaikan nadi dan tekanan darah.

(3) Pada janin

Pertukaran oksigen pada sirkulasi *utero-plasenter* kurang maka timbul *hipoksia* janin.Denyut jantung janin melambat (*bradikardi*) dan kurang jelas didengar karena adanya *iskemia fisiologis* (Widia, 2015: 23-24).

2) Tenaga mengedan

Setelah pembukaan lengkap dan ketuban pecah atau dipecahkan, serta sebagian presentasi sudah berada di dasar panggul, sifat kontraksinya berubah, yakni bersifat

mendorong keluar dibantu dengan keinginan ibu untuk mengedan atau usaha volunteer. Keinginan mengedan ini di sebabkan karena :

- a) Kontraksi otot-otot dinding perut yang mengakibatkan peninggian tekanan intra abdominalial dan tekanan ini menekan uterus pada semua sisi dan menambah kekuatan untuk mendorong keluar.
- b) Tenaga ini serupa dengan tenaga mengedan sewaktu buang air besar (BAB) tapi jauh lebih kuat.
- c) Saat kepala sampai kedasar panggul, timbul reflex yang mengakibatkan ibu menutup glotisnya, mengkontraksikan otot-otot perut dan menekan diafragmanya kebawah.
- d) Tenaga mengejan ini hanya dapat berhasil bila pembukaan sudah lengkap dan paling efektif sewaktu ada his.
- e) Tanpa tenaga mengedan bayi tidak akan lahir (Ai Nursiah, dkk, 2014: 31-32).

b. Passage (Jalan Lahir)

Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal. (Widia, 2015: 16)

c. Passenger (Janin Plasenta, dan Air Ketuban)

1) Janin

Passenger atau janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin (Ai Nursiah, dkk, 2014: 39).

2) Plasenta

Plasenta juga harus melewati jalan lahir maka dia dianggap sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin. Namun plasenta jarang menghambat proses persalinan normal (Widia, 2015: 29).

3) Air ketuban

Amnion pada kehamilan aterm merupakan suatu membrane yang kuat dan ulet tetapi lentur. *Amnion* adalah jaringan yang menentukan hampir semua kekuatan regangan membrane janin, dengan demikian pembentukan komponen *amnion* yang mencegah rupture atau robekan. Penurunan ini terjadi atas 3 kekuatan yaitu salah satunya adalah tekanan daricairan amnion dan juga saat terjadinya dilatasi serviks atau pelebaran muara dan saluran serviks yang terjadi di awal persalinan, dapat juga karena tekanan yang ditimbulkan oleh cairan amnion selama ketuban masih utuh (Widia, 2015: 29).

d. Faktor Psikis (Psikologi)

Perasaan positif berupa kelegaan hati, seolah-olah pada saat itulah benar-benar terjadi realitas, “kewanitaan sejati” yaitu munculnya rasa bangga bisa melahirkan atau memproduksi anak.

1) Psikologis meliputi :

- a) Kondisi psikologis ibu sendiri, emosi dan persiapan intelektual
- b) Pengalaman melahirkan bayi sebelumnya
- c) Kebiasaan adat
- d) Dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu.

2) Sikap negative terhadap persalinan di pengaruhi oleh :

- a) Persalinan semacam ancaman terhadap keamanan
- b) Persalinan semacam ancaman pada self-image
- c) Medikasi persalinan
- d) Nyeri persalinan dan kelahiran (Widia, 2015: 29-30).

e. Pysician (Penolong)

Peran dari penolong persalinan dalam hal ini adalah bidan, yang mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin(Widia, 2015: 30).

Tidak hanya aspek tindakan yang di berikan, tetapi aspek konseling dan meberikan informasi yang jelas diburuhkan oleh ibu bersalin utuk mengurangi tingkat kecemasan ibu dan keluarga(Ai Nursiah, dkk 2014: 48).

5. Tahapan persalinan

a. Kala I (Pembukaan)

1. Pengertian Kala I

Persalinan kala I meliputi fase pembukaan 1-10 cm, yang di tandai dengan penipisan dan pembukaan serviks, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan

serviks (frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit), cairan lender bercampur darah (show) melalui vagina. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler serta kanalis servikalis karena pergeseran serviks mendatar dan terbuka (Ai Nursiah, dkk 2014:66).

Kala I dibagi atas 2 fase yaitu :

- a) Fase laten, dimana pembukaan serviks berlangsung lambat, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai 3 cm, berlangsung dalam 7-8 jam.
- b) Fase aktif (pembukaan serviks 4-10 cm), berlangsung selama 6 jam dan dibagi dalam 3 subfase, yaitu :
 - (1) Periode akselerasi : berlangsung selama 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.
 - (2) Periode dilatasi maksimal : berlangsung selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
 - (3) Periode deselerasi : berlangsung lambat, dalam 2 jam pembukaan jadi 10 cm atau lengkap (Nurul, 2017: 5-6).

Pada fase aktif persalinan, frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika terjadi 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih). Dan terjadi penurunan bagian terbawah janin.

Dari pembukaan 4 hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata per jam (primipara) atau lebih 1 cm hingga 2 cm (multipara) (Ai Nursiah, dkk 2014: 66).

2. Perubahan Fisiologi Kala I

Selama rentan waktu dari adanya his sampai pembukaan lengkap 10 cm terjadi beberapa perubahan yang fisiologis. Perubahan fisiologis kala I meliputi :

a) Perubahan pada serviks

(1) Pendataran pada serviks/*effacement*

Pendataran pada serviks adalah pendekatan dari kanalis servikalis yang semula berupa sebuah saluran panjang 1-2 cm, menjadi sebuah lubang saja dengan pinggir yang tipis.

(2) Pembukaan serviks

Pembukaan serviks disebabkan karena pembesaran *Ostium Uteri Eksternum* (OUE) karena otot yang melingkar di sekitar *ostium* meregang untuk dilewati kepala. Pada pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap, bibir portio tidak teraba lagi.

b) Perubahan system kardiovaskuler

(1) Tekanan darah

Tekanan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan kenaikan sistolik rata-rata 10-20 mmHg dan kenaikan diastolic rata-rata 5-10 mmHg. Diantara kontraksi tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan dan akan naik lagi jika terjadi kontraksi.

Posisi tidur terlentang selama persalinan akan mengakibatkan adanya penekanan uterus terhadap pembuluh darah besar (aorta), yang menyebabkan sirkulasi darah baik ibu maupun janin akan terganggu, ibu biasanya mengalami hipotensi dan janin mengalami asfiksia.

(2) Denyut jantung

Denyut jantung meningkat selama kontraksi. Dalam posisi terlentang denyut jantung akan menurun. Denyut jantung antara kontraksi sedikit lebih tinggi dibandingkan selama periode segera sebelum persalinan.

c) Perubahan metabolisme

Selama persalinan baik metabolisme karbohidrat *aerobik* maupun *anaerobic* akan naik secara perlahan, kenaikan ini sebagian besar disebabkan karena kecemasan serta kegiatan otot kerangka tubuh.

d) Perubahan sistem respirasi

Pada respirasi atau pernapasan terjadi kenaikan sedikit dibandingkan sebelum persalinan, hal ini disebabkan adanya rasa nyeri, kekhawatiran serta penggunaan teknik pernapasan yang tidak benar.

e) Kontraksi uterus

Kontraksi uterus terjadi karena adanya rangsangan pada otot polos uterus dan penurunan hormone progesterone yang menyebabkan keluarnya hormone oksytosin.

f) Pembentukan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim

Segmen atas rahim (SAR) dibentuk oleh corpus uteri yang sifatnya aktif yaitu berkontraksi, dan dinding tambah tebal dengan majunya persalinan serta mendorong anak keluar.

g) Perubahan hematologist

Haemoglobin akan meningkat 1,2 gram/100 ml selama persalinan dan kembali ke tingkat pra persalinan pada hari pertama setelah persalinan apabila tidak terjadi kehilangan darah selama persalinan.

Jumlah sel darah putih meningkat secara progresif selama kala I persalinan sebesar 5000 sd 15000 WBC sampai dengan akhir pembukaan lengkap.

h) Perubahan renal

Polyuri sering terjadi selama persalinan, di karenakan oleh kardiak out-put yang meningkat serta disebabkan oleh glomerulus serta aliran plasma ke renal. Polyuri tidak begitu kelihatan dalam posisi terlentang yang mengurangi aliran urine selama kehamilan.

i) Perubahan gastrointestinal

Kemampuan pergerakan gastric serta penyerapan makana padat berkurang, menyebabkan pencernaan hampir berhenti selama persalinan dan menyebabkan konstipasi. Makanan yang masuk ke lambung selama fase pendahuluan atau fase kemungkinan besar akan tetap berada dalam perut selama persalinan. Rasa mual-muntah bukanlah hal yang jarang, hal ini menunjukkan berakhirnya kala I persalinan.

j) Perubahan suhu badan

Suhu badan akan sedikit meningkat selama persalinan, suhu mencapai tingkat tertinggi selama persalinan dan segera setelah kelahiran. Kenaikan ini dianggap normal asal tidak melebihi $0,5 - 1^{\circ}$ C. Suhu badan yang naik sedikit merupakan yang

wajar namun jika keadaan ini berlangsung lama, kenaikan suhu mengindikasikan dehidrasi.

k) Perubahan pada vagina dasar panggul

- (1) Pada kala I ketuban ikut meregang, bagian atas vaginanya yang sejak kehamilan mengalami perubahan sedemikian rupa akan bisa dilalui bayi.
- (2) Setelah ketuban pecah segala perubahan terutama pada dasar panggul ditimbulkan oleh bagian depan anak. Oleh bagian depan yang maju tersebut dasar panggul di regang menjadi saluran dengan dinding yang tipis
- (3) Waktu kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap kedepan atas. Dari luar, peregangan oleh bagian depan tampak pada perineum yang menonjol dan menjadi tipis, sedangkan anus semakin terbuka.
- (4) Regangan yang kuat ini dimungkinkan karena bertambahnya pembuluh darah pada bagian vagina dan dasar panggul. Tetapi saat jaringan tersebut robek, akan menimbulkan perdarahan yang banyak (Ai Nursiah, dkk 2014: 67-71).

3. Perubahan Psikologis kala I

Perubahan psikologi pada ibu bersalin selama kala I antara lain sebagai berikut:

- a) Memerlihatkan ketakutan atau kecemasan, yang menyebabkan wanita mengartikan ucapan pemberi perawatan atau kejadian persalinan secara pesimistik atau negative.
- b) Mengajukan banyak pertanyaan atau sangat waspada terhadap sekelilingnya.
- c) Memerlihatkan tingkah laku saat membutuhkan.

- d) Memperllihatkan tingkah laku minder, malu atau tidak berharga.
- e) Memperllihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan.
- f) Menunjukkan ketegangan otot dalam derajat tinggi.
- g) Tampak menuntut, tidak mempercayai, marah atau menolak terhadap para staf.
- h) Menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberi perawatan.
- i) Tampak “lepas control” dalam persalinan (saat nyeri hebat, menggeliat kesakitan, panic, menjerit, tidak merespon saran atau pertanyaan yang membantu.).
- j) Merasa diawasi
- k) Merasa melakukan tanpa hormat. Merasa diabaikan atau dianggap remeh.
- l) Respons “melawan atau menghindari”, yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan dan bentuk stress lainnya (Widia, 2015: 57).

4. Masalah dan Penyulit Pada Kala I

Indikasi-indikasi untuk melakukan tindakan dan/atau rujukan segera selama kala I persalinan:

- a. Perdarahan pervaginam selain dari lender bercampur darah (“*show*”)
- b. Kurang dari 37 minggu (persalinan kurang bulan)
- c. Ketuban pecah disertai dengan keluarnya mekonium kental.
- d. Ketuban pecah bercampur dengan sedikit mekonium disertai tanda-tanda gawat janin

- e. Ketuban telah pecah (lebih dari 24 jam) atau ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan (usia kehamilan kurang 37 minggu).
- f. Tanda-tanda atau gejala-gejala infeksi : temperature tinggi $>38^{\circ}\text{C}$, menggigil, nyeri abdomen, cairan ketuban yang berbau.
- g. Tekanan darah $>160/100$ dan/ atau terdapat protein urin.
- h. Tinggi fundus 40 cm atau lebih.
- i. DJJ <100 atau >180 x/menit pada dua kali penilaian dengan jarak 5 menit.
- j. Primipara dalam persalinan fase aktif dengan palpasi kepala janin masih 5/5.
- k. Presentasi bukan belakang kepala (sungsang, letak lintang, dll).
- l. Presentasi ganda/majemuk (adanya bagian janin, seperti lengan atau tangan, bersamaan dengan presentasi belakang kepala).
- m. Tali pusat menubung (jika tali pusat masih berdenyut)
- n. Tanda dan gejala syok:
 - 1) Nadi cepat, lemah (lebih dari 110 x/menit)
 - 2) Tekanan darahnya rendah (sistolik kurang dari 90 mmHg)
 - 3) Pucat
 - 4) Berkeringat atau kulit lembab, dingin
 - 5) Napas cepat (lebih dari 30 x/menit)
 - 6) Cemas, bingung atau tidak sadar
 - 7) Produksi urin sedikit (kurang dari 30 ml/jam)
- o. Tanda dan gejala persalinan dengan fase laten yang memanjang :
 - 1) Pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam

2) Kontraksi teratur (lebih dari 2 dalam 10 menit)

p. tanda dan gejala belum inpartu :

- 1) Kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit, berlangsung kurang dari 20 detik
- 2) Tidak ada perubahan serviks dalam waktu satu sampai dua jam.

q. Tanda dan gejala partus lama :

- 1) Pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada
- 2) Pembukaan serviks kurang 1 cm per jam
- 3) Kurang dari dua kontraksi dalam waktu 10 menit, masing-masing berlangsung kurang 40 detik (Ibnu Pranoto, dkk 2014: 77).

5. Partograf

Partograf adalah alat untuk mencatat informasi berdasarkan observasi, anamnesis, dan pemeriksaan isik ibu dalam persalinan, dan sangat penting khususnya untuk membuat keputusan klinik selama kala I persalinan.

Tujuan utama penggunaan partograf adalah mengamati dan mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam dan menentukan normal atau tidaknya persalinan serta mendeteksi dini persalinan lama sehingga bidan dapat membuat deteksi mengenai kemungkinan persalinan lama. Partograf dapat di gunakan untuk semua ibu selama fase aktif kala I persalinan; selama persalinan dan kelahiran di semua tempat seperti rumah, puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit dll.

a. **Bagian Partograf**

Partograf berisi ruang untuk mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan selama kala I persalinan yang mencakup kemajuan persalinan, keadaan janin, dan keadaan ibu.

1) Kemajuan Persalinan

Kemajuan persalinan yang di catat dalam partograf meliputi pembukaan serviks, penurunan kepala janin, dan kontraksi uterus.

a) **Keadaan Janin**

Keadaan janin yang dicatat dalam partograf meliputi DJJ, warna dan jumlah air ketuban, molase serta tulang kepala janin.

b) **Keadaan Ibu**

Keadaan ibu mencakup nadi, tekanan darah, suhu, urine, seperti volume dan protein, dan obat serta cairan intravena atau IV.

2) Pencatatan Selama Fase Laten Dan Fase Aktif Persalinan

a) **Pencatatan Selama Fase Laten**

Fase laten ditandai dengan pembukaan serviks 1-3 cm. Selama fase laten persalinan, semua asuhan, pengamatan dan pemeriksaan harus dicatat terpisah dari partogra, yaitu pada catatan atau Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamil. Tanggal dan waktu harus dituliskan setiap kali membuat catatan selama fase laten persalinan dan semua asuhan serta intervensi harus dicatat.

Waktu penilaian, kondisi ibu, dan kondisi janin pada fase laten meliputi :

- (1) Denyut jantung janin, frekuensi dan lam kontraksi uterus, nadi setiap 1 jam

- (2) Pembukaan serviks, penurunan kepala, tekanan darah, dan suhu setiap 2 sampai 4 jam

Apabila di temui tanda penyulit, penilaian kondisi ibu dan bayi harus lebih sering dilakukan.

2) Pencatatan Selama Fase Aktif

Fase aktif ditandai dengan pembukaan serviks 4-10 cm. Selama fase aktif persalinan, pencatatan hasil observasi dan pemeriksaan fisik dimasukkan kedalam partograf. Pencatatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Informasi tentang ibu

- (1) Nama, umur
- (2) Gravida, para, abortus
- (3) Nomor catatan medis atau nomor puskesmas
- (4) Tanggal dan waktu mulai dirawat
- (5) Waktu pecah ketuban

b) Kondisi janin

- (1) Denyut jantung janin setiap 30 menit
- (2) Warna dan adanya air ketuban
- (3) Penyusupan (molase) kepala janin

c) Kemajuan persalinan

- (1) Pembukaan serviks setiap 4 jam
- (2) Penurunan bagian terbawah janin atau presentasi janin
- (3) Garis waspada dan garis bertindak

- d) Jam dan waktu
 - (1) Waktu mulai fase aktif persalinan
 - (2) Waktu actual saat pemeriksaan atau penilaian.
- e) Kontraksi uterus
 - (1) Frekuensi dan lamanya
- f) Obat dan cairan yang diberikan
 - (1) Oksitosin
 - (2) Obat lain dan cairan Intra Vena yang diberikan
- g) Kondisi ibu
 - (1) Nadi, tekanan darah, dan temperatur tubuh
 - (2) Urine (volume, aseton, atau protein)
- h) Asuhan, pengamatan dan keputusan klinik lainnya.

3) Pencatatan Dan Temuan Pada Partograf

Dilengkapi pada bagian awal (atas) partograf, saat memulai asuhan persalinan.

- a) Kesehatan dan Kenyamanan Janin

Menilai dan mencatat setiap 30 menit (lebih sering, jika ada tanda gawat janin). Setiap kotak pada bagian tersebut menunjukkan waktu 30 menit, kisaran normal DJJ terpanjang pada partograf di antara garis tebal angka 180 dan 100. Akan tetapi, penolong harus sudah aspada bila DJJ dibawah 120 atau diatas 160.

b) Warna dan Adanya Ketuban

Warna ketuban dinilai setiap melakukan pemeriksaan dalam, selain warna air ketuban, jika pecah. Catat temuan dalam kontak yang sesuai di bawah lajur DJJ dan gunakan lambing berikut.

U = ketuban utuh (belum pecah)

J = ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih

M = ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium

D = ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah

K = ketuban sudah pecah dan tidak ada air ketuban (kering)

Mekonium dalam air ketuban tidak selalu menunjukkan gawat janin. Apabila terdapat mekonium, pantau DJJ secara seksama untuk mengenali tanda gawat janin (DJJ < 100 atau > 180 kali per menit) selama proses persalinan.

c) Molase (Penyusupan Kepala Janin)

Penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa jauh bayi dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu. Tulang kepala yang saling menyusup menunjukkan kemungkinan adanya disproporsi tulang panggul (*Cephalopelvic disproportion*, CPD). Setiap kali melakukan pemeriksaan dalam, nilai penyusupan kepala janin dan catat temuan dibawah lajur air ketuban dengan menggunakan lambang berikut ini .

0 = Tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi

1 = Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan

2 = Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih, namun masih dapat dipisahkan

3 = Tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat di pisahkan.

d) Kemajuan Persalinan

Kolom dan lajur pada partograf adalah pencatatan kemajuan persalinan. Angka 0-10 pada tepi kolom paling kiri adalah besarnya dilatasi serviks. Skala angka 1-5 juga menunjukkan seberapa jauh penurunan janin. Masing-masing kotak di bagian ini menyatakan waktu 30 menit.

e) Pembukaan Serviks

Penilaian dan pencatatan pembukaan serviks dilakukan setiap 4 jam (lebih sering, jika terdapat tanda penyulit). Tanda "X" harus ditulis di garis waktu yang sesuai dengan laju besarnya pembukaan serviks. Beri tanda untuk temuan pemeriksaan dalam yang dilakukan pertama kali selama fase aktif persalinan di garis waspada. Hubungkan tanda "X" dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh (tidak terputus).

f) Penuruna Bagian Terbawah Atau Presentasi Janin

Setiap melakukan pemeriksaan dalam (4 jam atau lebih), jika terdapat tanda penyulit, catat dan nilai penurunan bagian terbawah atau presentasi janin. Kemajuan pembukaan serviks umumnya diikuti dengan penurunan bagian terbawah atau presentasi janin pada persalinan normal. Akan tetapi, penurunan bagian terbawah janin terkadang baru terjadi setelah pembukaan serviks 7 cm. Penurunan

kepala bayi harus selalu diperiksa dengan memeriksa perut ibu sesaat sebelum pemeriksaan dalam dengan ukuran perlimaan diatas pintu atas pangul (PAP).

Beri tanda “o” pada garis waktu yang sesuai dengan garis tidak terputus 0-5 yang tertera di sisi yang sama dengan pembukaan serviks. Hubungkan tanda “o” dari setiap pemeriksaan dengan garis tidak terputus.

g) Garis Waspada dan Garis Bertindak

Garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan berakhir pada titik dengan pembukaan lengkap yang diharapkan terjadi jika laju pembukaan 1 cm per jam. Pencatatan selama fase aktif persalinan harus dimulai di garis waspadah. Apabila pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada, penyulit yang ada harus di pertimbangkan (misalnya fase aktif memanjang, macet dll).

h) Jam dan Waktu

Waktu dimulai fase aktif persalinan, Bagian bawah partograf (pembukaan serviks dan penurunan kepala janin) tertera kotak-kotak yang diberi angka 1-16. Setiap kotak menandakan waktu satu jam sejak dimulai fase aktif persalinan. Waktu actual saat pemeriksaan dilakukan. Setiap kotak menyatakan satu jam penuh dan berkaitan dengan dua kotak waktu tiga puluh menit pada lajur kotak diatasnya atau lajur kontraksi dibawahnya.

Saat ibu masuk dalam fase aktif persalinan, catatkan pembukaan serviks di garis waspada, lalu catatkan waktu actual pemeriksaan tersebut di kotak yang sesuai.

i) Kontraksi Uterus

Terdapat lima lajur dengan tulisan “ kontraksi setiap 10 menit “ di sebelah luar kolom paling kiri dibawah lajur waktu partograf. Setiap kotak menyatakan satu kontraksi. Tiap 30 menit, raba dan catat jumlah kontraksi dalam 10 menit dan lama satuan detik >40 detik.

j) Obat dan Cairan yang Diberikan

(1) Oksitosin

Apabila tetesan (drip) oksitosin telah dimulai, dokumentasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan intra vena dan satuan tetesan per menit.

(2) Obat lain dan cairan intra vena

Catat semua pemberian obat tambahan dan. Atau cairan intravena dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya.

4) Kesehatan dan Kenyamanan Ibu

Bagian terakhir pada lembar depan partograf berkaitan dengan kesehatan ibu meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Nadi, tekanan darah, dan temperature tubuh. Catat dan nilai nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan (lebih sering jika dicurigai terdapat penyulit). Beri tanda titik (.) pada kolom pada waktu yang sesuai. Nilai tekanan darah ibu dan catatat setiap 4 jam selama fase aktif persalinan (lebih sering jika dicurigai terdapat penyulit). Beri tanda panah dalam kolom waktu yang sesuai pada

partograf. Nilai dan catat juga temperature tubuh ibu setiap 2 jam dan catat temperature tubuh dalam kotak yang seseai.

- b) Volume urine, protein dan aseton. Ukur an catat jumlah produksi urine ibu sedikitnya setiap 2 jam. Apabila memungkinkan, setoap kali ibu berkemih, lakukan pemeriksaan aseton atau protein dalam urine.

5) Asuhan, Pengamatan Dan Keputusan Klinik Lainnya.

Catatan semua asuhan lain, hasil pengamatan, dan keputusan klinik di sisi luar kolom partograf, atau buat catatan terpisah tentang kemajuan persalinan. Cantumkan juga tanggal dan aktu saat membuat catatan persalinan. Asuhan pengamatan, dan/ atau keputusan klinik mencakup jumlah cairan oral yang diberikan, seperti keluhan sakit kepala atau penglihatan kabur, konsultasi dengan penolong persalinan lainnya (dokter obgin, bidan, dokter umum), persiapan sebelum melakukan rujukan dan upaya rujukan.

6) Pencatatan Pada Lembar Belakang Partograf

- a) Data Dasar

Data dasar terdiri atas tanggal, nama bidan, tempat persalinan, alamat tempat persalinan, catatan alasan merujuk, tempat rujukan, dan pendamping saat merujuk.

- (1) Kala I

Data kala I terdiri atas pertanyaan tentang partograf saat melewati garis waspada, masalah yang dihadapi, penatalaksanaan dan hasil penetalaksanaan tersebut.

(2) Kala II

Data kala II terdiri atas *episiotomi*, pendamping persalinan, gawat janin, distosia bahu, masalah penyerta, penatalaksanaan, dan hasilnya. Jawaban di beri tanda “√” pada kotak di samping jawaban yang sesuai.

(3) Kala III

Data kala III terdiri atas lama kala III, pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, masase uterus, plasenta lahir lengkap, plasenta tidak lahir >30 menit, lacerasi, atonia uteri, jumlah perdarahan, masalah penyerta, penatalaksanaan dan hasilnya.

(4) Kala IV

Data kala IV terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahan. Pemantauan kala IV sangat penting untuk menilai resiko atau terjadi perdarahan pasca persalinan. Pemantauan kala IV dilakukan setiap 15 menit pada 1 jam pertama setelah melahirkan dan setiap 30 menit pada 1 jam berikutnya.

(5) Bayi Baru Lahir

Data bayi baru lahir terdiri dari berat dan panjang badan, jenis kelamin, penilaian kondisi bayi baru lahir, pemberian ASI, masalah penyerta, penatalaksanaan terpilih, dan hasilnya (Nurul, 2017: 60-74)

b. Kala II (kala pengeluaran)

1. Pengertian kala II

Kala II persalinan di sebut juga kala pengeluaran yang merupakan peristiwa terpenting dalam proses persalinan karena objek yang dikeluarkan adalah objek utama yaitu bayi. (Widia, 2015: 128)

2. Perubahan fisiologis yang terjadi pada kala II persalinan

- a) His menjadi lebih kuat dan sering
 - (1) Air ketuban yang telah keluar membuat dinding uterus menjadi lebih dekat dengan fetus, sehingga kekuatan kontraksi lebih intensif untuk mendorong keluar fetus.
 - (2) Vagina yang meregang karena turunnya kepala bayi akan membuat kontraksi jadi lebih baik.
- b) Timbulnya tenaga untuk mendedan
 - (1) His yang sering dan kuat disebabkan oleh kontraksi otot dinding perut yang mengakibatkan tingginya tekanan intra abdominal sehingga kepala bayi mnekan otot dasar panggul dan secara releks menimbulkan raa mangedan.
- c) Perubahan dalam dasar panggul
 - (1) Perubahan letak kandung kemih, kandung kemih akan naik kearah rongga perut agar tidak mendapatkan tekanan pada kepala bayi, inilah pentingnya pengosongan kandung kemih agar jalan lahir lebih luas, dan kepala bayi dapat lewat.

- (2) Perubahan pada rectum, dengan adanya kepala bayi di dasar panggul maka dasar panggul bagian belakang akan terdorong kebawah sehingga rectum tertekan oleh kepala bayi.
 - (3) Adanya tekanan pada kepala membuat perineum menjadi tipis dan mengembang atau menonjol.
- d) Lahirnya janin
- (1) Dimulai dengan tampaknya kepala anak di vulva, dengan kontraksi uterus den sedikit mendedan, secara bertahap kepala bayi dapat keluar.
 - (2) Lalu di ikuti dengan pengeluaran bahu bersama cairan ketuban yang tertinggal yang membantu melicinkan jalan lahir lalu di ikuti pengeluaran seluruh badan (Widia, 2015: 128-129).

3. Tanda Dan Gejala Kala II

Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II adalah :

- a) Adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir porsio), ini terjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk kedalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga porsio membuka secara perlahan.
- b) His yang lebih sering dan kuat (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mendedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara *reflektoris* menimbulkan rasa mendedan.

- c) Adanya pengeluaran darah bercampur lender, di sebabkan oleh adanya robekan serviks yang meregang.
- d) Pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam uterus dan diluar uterus sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi uterus akhirnya kantung ketuban pecah.
- e) Anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk kedasar panggul sehingga menekan rectum dan rasa buang air besar, hal ini menyebabkan anus membuka.
- f) Vulva terbuka, perineum menonjol, karena bagian terbawah janin yang sudah masuk PBP dan di tambah pula dengan adanya his serta kekuatan mengedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum bersifat elastic.
- g) Bagian terdepan anak kelihatan pada vulva, karena labia membuka, perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat divulva, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Widia, 2015: 129-130).

4. Perubahan Psikologis Ibu Pada Kala II Persalinan

Perubahan psikologis keseluruhan seorang wanita yang mengalami persiapan persalinan sangat bervariasi, tergantung pada persiapan dan bimbingan antisipasi yang ia terima selama persiapan menghadapi persalinan, dukungan yang diterima wanita dari pasangannya, orang terdekat lain, keluarga dan pemberi perawatan,

lingkungan tempat wanita tersebut berada dan apakah bayi yang dikandung merupakan bayi yang diinginkan atau tidak.

Dukungan yang diterima atau tidak diterima oleh seorang wanita dilingkungan tempat dia melahirkan, termasuk dari mereka yang mendampingiya, sangat mempengaruhi aspek psikologisnya pada saat kondisinya sangat rentan setiap kali kontraksi timbul juga pada saat nyeri timbul secara berkelanjutan (Ai Yeyeh, dkk 2014: 37-38).

5. Mekanisme Persalinan Normal

Pada akhir kala 1, segmen uterus, serviks, dasar panggul, dan pintu keluar vulva membentuk satu jalan lahir yang *continue*. Gaya yang diperlukan untuk mengeluarkan janin berasal dari aktifitas otot uterus dan dari otot *abdomen* sekunder dan diafragma, yang memperkuat kontraksi sewaktu kepala janin melewati panggul, kepala bayi akan melakukan gerakan-gerakan utama meliputi :

a) Turunnya kepala

Turunnya kepala di bagian dalam :

1) Masuknya kepala dalam pintu atas panggul (PAP)/*engagement*

Masuknya kepala kedalam PAP pada primigravida terjadi di bulan akhir kehamilan sedangkan pada multigravida biasanya terjadi pada awal persalinan. Kepala masuk ke PAP biasanya dengan sutura sagitalis melintang dan dengan *flexi* yang ringan. Masuknya kepala melintasi PAP dalam kuadran syinclitismus, yaitu arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP atau sutura sagitalis terdapat

ditengah-tengah jalan lahir/ tepat diantara simfisis dan *promotorium* sehingga, dari parietal depan dan belakang sama tingginya.

Kepala yang masuk dengan keadaan *asyinclitismus* yaitu arah kepala janin miring dengan bidang PAP atau sutura sagitalis agak kedepan mendekati simfisis/agak kebelakang mendekati promotorium. *Asyinclitismus posterior* belakang bila suture sagitalis mendekati simfisis dari parietal biasa lebih rendah dari parietal depan, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip kebelakang dengan PAP. *Asyinclitismus anterior* yaitu bila sutura sagitalis mendekati *promontorium* sehingga parietal depan lebih rendah dari parietal belakang, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip ke depan PAP.

2) Majunya kepala

Pada primigravida majunya kepala terjadi setelah kepala masuk kerongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala II. Pada *multipara* majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi secara bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan *fleksi*, putaran faksi dalam, dan *extensi*.

Penyebab majunya kepala :

- (a) Tingkat cairan intra uterin
- (b) Tekanan langsung oleh fundus pada bokong
- (c) Kekuatan mengedan
- (d) Melurusnya badan anak oleh pelurusan bentuk rahim.

3) *Flexi*

Dengan majunya kepala, biasanya *flexi* juga bertambah hingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Keuntungan dari bertambahnya *flexi* ialah bahwa ukurn kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir : diameter sub occipito bregmatika (9,5 cm) menggantikan sub occipito frontalis (11 cm).

Penyebab *flexi* :

- (a) Anak didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir pintu atas panggul, *serviks*, dinding panggul atau dasar panggul.
- (b) Akibat sumbu kepala janin yang *eksentrik* atau tidak *simetris* dengan sumbu mendekati *subocciput*, tahanan oleh jaringan dibawahnya terhadap kepala anak akan menurun/menurut hukum Koppel.



Gambar 2.1 Fleksi, dagu dibawah lebih dekat ke arah dada janin
(*Google Image*).

4) Putaran paksi dalam

Yang dimaksud putaran paksi dalam ialah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar kedepan kebawah symfisis. Pada presentasi belakang kepala bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil dan bagian inilah yang memutar kedepan kebawah symfisis.

Putaran paksi dalam mutlak perlu untuk kelahiran kepala karena putaran paksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dan bentuk jalan lahir khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Putaran paksi dalam tidak terjadi tersendiri, tetapi selalu bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai hodge III, kadang-kadang baru setelah kepala sampai didasar panggul.

Penyebab putaran paksi dalam.

- (a) Pada letak fleksi, bagian belakang kepala merupakan bagian terendah dari kepala.
- (b) Bagian terendah dari kepala ini mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelah depan atas dimana terdapat hiatus genitalis, m. levator ani kiri dan kanan.
- (c) Ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter anteroposterior.

5) *Ekstensi*

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah kedepan dan atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Pada kepala terjadi dua kekuatan, yang satu mendesaknya kebawah dan satunya disebabkan tahanan dasar panggul yang menolaknya keatas. Resultannya ialah kekuatan kearah depan atas.

Setelah subociput tertahan pada pinggir bawah *symfisis* maka yang dapat maju karena kekuatan tersebut diatas bagian yang berhadapan dengan *subociput*, maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum ubun-ubun besar, dahi hidung, mulut

dan akhirnya dagu dengan gerakan *extensi*. *Subociput* yang menjadi pusat pemutaran disebut *hypomochilion*.

6) Putaran Paksi Luar

Setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran retribusi (putaran balasan). Selanjutnya putaran dilanjutkan hingga belakang kepala berhadapan dengan *tuber ischiadicum* sepihak (disisi kiri). Gerakan yang terakhir ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul.

7) *Ekspulsi*

Setelah putaran paksi luar bahu depan sampai dibawah symphysis dan menjadi hypomochilion dan kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir (Ai Nurasih, dkk 2014: 144)

6. Langkah-langkah Pertolongan Persalinan

a. Mengenali Gejala dan Tanda Kala II

- 1) Mendengar dan melihat tanda gejala kala II
 - a) Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran (dorani)
 - b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina (teknus)
 - c) Perineum tampak menonjol (perjol)
 - d) Vulva dan singter ani membuka (vulka)

b. Menyiapkan pertolongan persalinan

- 2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksanakan komplikasi ibudan BBL.
- 3) Pakai celemek palastik
- 4) Mencuci tangan (sekitar 15 detik) dan keringkan dengan tissue/handuk.
- 5) Pakai sarung tangan DDT pada tangan yang digunakan untuk PD.
- 6) Masukkan oksitosin kedalam spuit (gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT/steril, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada spuit)

c. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik

- 7) Membersihkan vulva dan perineum, mengusapnya dengan hati-hati dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas DTT.
- 8) Lakukan pemeriksaan dalam (PD) untuk memastikan pembukaan lengkap (bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi).
- 9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
- 10) Periksa DJJ setelah kontraksi/ saat relaksasi uterus bahwa DJJ dalam batas normal (120-160x/menit).

d. Menyiapkan Ibu dan Keluarga Untuk Membantu Proses Bimbingan

Meneran

- 11) Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya.
- 12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran (Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu keposisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).
- 13) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran
 - a) Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan aktif.
 - b) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai;
 - c) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi terlentang dalam dalam waktu yang lama; Anjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi;
 - d) Anjurkan keluarga memberi dukungandan semangat untuk ibu; Berikan asupan peroral yang cukup;
 - e) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai; Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit meneran (primigravida) atau 60 menit meneran (multigravida).

- 14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

e. **Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi**

- 15) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.
- 16) Letakkan kain bersih yang di lipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu.
- 17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.
- 18) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.

f. **Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi**

Lahirnya Kepala Bayi

- 19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering.
- 20) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.
- 21) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Lahirnya Bahu

- 22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal.

Lahirnya Badan dan Tungkai

- 23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.

- 24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki serta pegang masing-masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.

g. **Penanganan Bayi Baru Lahir**

- 25) Lakukan penilaian selintas

- a) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan ?
b) Apakah bayi bergerak aktif ?

Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau menggap-mengap lakukan langkah resusitasi (lanjut kelangkah resusitasi pada asfiksia BBL).

- 26) Keringkan tubuh bayi

Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks caseosa. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering. Biarkan bayi di atas perut ibu.

- 27) Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus (hamil tunggal)

- 28) Beritahu ibu bahwa ia akan di suntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

- 29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menuntikkan oksitosin).

- 30) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
- 31) Pemotongan dan pengikatan tali pusat.
- Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi) dan lakukan pengguntikan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
 - Ikut tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci dengan sisi lainnya.
 - Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah di sediakan.
- 32) Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu.
- 33) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi.
- h. **Penatalaksanaan Akti Persalinan Kala III**
- 34) Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.
- 35) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, ditepi atas simpisis, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat.
- 36) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas (*dorso cranial*) secara hati-hati (untuk mencegah inversion uteri).

- a) Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur diatas.
- b) Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi putting susu.

i. Mengeluarkan Plasenta

- 37) Lakukan penegangan tali pusat dan dorongan dorso carnial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan keudian kearah atas, mengikuti proses jalan lahir (tetap melakukan tekanan dorso cranial)
 - a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta.
 - b) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat :
 - (1) Beri dosis ulang oksitosin 10 unit IM
 - (2) Lakukan kateterisasi (aseptic) jika kandung kemih parah.
 - (3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan
 - (4) Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya.
 - (5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan segera lakukan plasenta manual.
- 38) Saat plasenta muncul di intoitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar palsenta hingga selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT/steril untuk melakukan

eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal.

Rangsangan Taktil (Masase) Uterus

- 39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di undus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras).

i. Menilai perdarahan.

- 40) Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastic dan tempat khusus.
- 41) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menimbulkan perdarahan aktif segera lakukan penjahitan.

j. Melakukan prosedur pasca persalinan.

- 42) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
- 43) Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dada ibu paling sedikit 1 jam.
- 44) Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotic profilaksis dan vitamin K 1 mg IM di paha kiri antero lateral.
- 45) Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi Hepatitis B dipaha kanan antero lateral.

k. Evaluasi

- 46) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam
- 47) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
- 48) Evaluasi dan estimulasi jumlah kehilangan darah.
- 49) Memeriksa nadi ibu dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.
- 50) Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik (40-60 x/menit) serta suhu tubuh normal (36,5-37,5⁰ C)

l. Kebersihan dan Keamanan

- 51) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan clorin 0,5 % untuk dekontaminasi.
- 52) Buang bahan – bahan yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai.
- 53) Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lender dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
- 54) Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan.
- 55) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5 %
- 56) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5 %, balik bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit.
- 57) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.

m. Dokumentasi

58) Lengkapi partograf (halaman delapan dan belakang), periksa tanda-tanda vital dan asuhan kala IV (Widia, 2015: 152-161).

7. Komplikasi dan Penyulit Persalinan Kala II

a. Distosia Bahu

Distosia bahu (bahu macet) yaitu kelahiran kepala janin dengan bahu anterior macet di atas simfisis pubis dan tidak dapat masuk melalui pintu bawah panggul, bahu menjadi tidak dapat digerakkan. Bahu posterior juga dapat macet di atas promotorium sacral, walau pun jarang terjadi. Distosia bahu umumnya terjadi pada bayi yang makrosomia, yakni suatu keadaan yang ditandai oleh ukuran badan bayi yang relative lebih besar dari ukuran kepala dan bukan semata-mata berat bayi yang >4000 gram.

Penanganan distosia bahu, yaitu dengan melakukan Manuver *McRobert* (posisi lutut-dada) dengan cara ambil posisi jongkok lebar atau posisi litotomi berlebihan dengan paha menyentuh dada dan ibu dalam posisi setengah duduk. Posisi ini memungkinkan Outlet panggul bertambah lebar. Fleksi yang berlebihan dari kaki akan meluruskan sacrum relative terhadap lumbar tulang punggung. Fleksi yang berlebihan dari panggul dan dengkul akan meluruskan dan memungkinkan sudut panggul untuk menampung diameter yang lebih besar dari bahu (Lailiyana, dkk, 2012: 62-63)

c. Kala III (kala uri)

1. Pengertian Kala III

Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri. Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Oleh karena tempat perlekatan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus (Ina Kuswanti, dkk 2014: 199).

2. Mekanisme Pelepasan Plasenta

Plasenta adalah massa yang bulat dan datar. Permukaan maternal plasenta berwarna antara kebiruan dan kemerahan serta berlobus-lobus. Pertukaran darah janin dan maternal terjadi pada bagian maternal plasenta tersebut. Pertukaran tersebut berlangsung tanpa terjadi pencampuran antara darah maternal dan darah janin. Permukaan fetal plasenta halus, berwarna putih, dan mengkilap serta permukaannya dapat dilihat cabang vena dan arteri umbilikal. Dua selaput ketuban yang melapisi permukaan fetal adalah korion dan amnion, yang memanjang sampai ujung bagian luar kantong yang berisi janin dan cairan amnion.

Tali pusat membentang dari umbilicus janin sampai ke permukaan fetal plasenta. Tali pusat umumnya memiliki panjang sekitar 56 cm. Tali pusat tersebut mengandung tiga pembuluh darah, dua arteri yang berisi darah kotor janin menuju plasenta dan satu vena yang mengandung oksigen menuju janin. Pemisahan plasenta

ditimbulkan dari kontraksi dan retraksi mimetrium sehingga mempertebal dinding uterus dan mengurangi ukuran area plasenta. Area plasenta menjadi lebih kecil, sehingga plasenta mulai memisahkan diri dari dinding uterus. Plasenta tidak elastic seperti uterus memisahkan diri dari dinding uterus.

Plasenta tidak *elastic* seperti uterus yang dapat berkontraksi atau bertraksi. Bekuan darah terbentuk pada area pemisah. Berat bakuan darah tersebut menambah tekanan pada plasenta dan selanjutnya membantu pemisahan. Kontraksi uterus yang selanjutnya akan melepaskan keseluruhan plasenta dari uterus dan mendorongnya keluar vagina disertai dengan pengeluaran selaput ketuban dan bekuan darah retroplasenta (Nurul Jannah, 2017: 142-143).

3. Tanda – Tanda Lepasnya Plasenta

a. Berubahan Bentuk dan Tinggi Fundus

Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya dibawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, uterus berbentuk segi tiga, atau seperti buah pir atau alpukat dan fundus berada diatas pusat (sering kali mengarah ke sisi kanan).

b. Tali pusat memanjang

Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva (tanda ahfeld)

c. Semburan darah yang mendadak dan singkat.

Darah yang terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah (retroplacenta

pooling) dalam ruang diantara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya, darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang lepas (Ai Nursiah, dkk 2014: 154-155).

4. Metode Pelepasan Plasenta

a. Metode *Scultze*

Metode yang lebih umum terjadi adalah plasenta terlepas dari satu titik dan merosot ke vagina melalui lubang dalam kanton amnion, permukaan fetal plasenta muncul pada vulva dengan selaput ketuban yang mengikuti dibelakang seperti payung terbalik saat terkelupas dari dinding uterus.

b) Metode *Matthews Duncan*

Plasenta turun melalui bagian samping dan masuk ke vulva dengan pembatas lateral terlebih dahulu seperti kancing yang memasuki lubang baju, sehingga sebagian plasenta tidak berada dalam kantong. Walaupun demikian sebagian selaput ketuban berpotensi tertinggal dengan metode ini karena selaput ketuban tidak terkelupas semua selengkap metode Schultze. Metode ini berkaitan dengan plasenta letak rendah didalam uterus. Proses pelepasan berlangsung lebih lam dan darah yang hilang sangat banyak karena hanya sedikit serat oblik dibagian bawah segmen (Nurul Jannah, 2017: 144-145).

5. Pengeluaran Plasenta

Plasenta yang sudah lepas dan menempati segmen bawah rahim, kemudian melalui servik, vagina dan dikeluarkan ke introitus vagina. (Ina Kuswanti, dkk 2014)

Dari tempat ini plasenta didorong keluar oleh tenaga menegjan, 20% secara spontan dan selebihnya memerlukan pertolongan. Plasenta dikeluarkan dengan melakukan tindakan manual bila :

- a. Perdarahan lebih dari 400 sampai 500 cc
- b. Terjadi *restensio* plasenta
- c. Bersamman dengan tindakan yang di sertai narkosa
- d. Dari anamnese terdapat perdarahan hibitualis.

Lahirnya plasenta lebih baik dengan bantuan penolong dengan sedikit tekanan pada fundus uteri setelah plasenta lepas. Tetapi pengeluaran plasenta jangan dipaksakan sebelum terjadi pelepasan karena dikhawatirkan menyebabkan inversio uteri. Traksi pada tali pusat tidak boleh digunakan untuk menarik plasenta keluar dari uterus. Pada saat korpus di tekan, tali pusat tetap di regangkan. Maneuver ini diulangi sampai plasenta mencapai introitus, setelah introitus penekanan dilepaskan.

Tindakan hati-hati diperlukan untuk mencegah membrane tidak terputus dan tertinggal., jika membrane robek pegang robekan tersebut dengan klem dan tarik perlahan. Dan periksa plasenta secara hati-hati untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal (Ai Nursiah, 2014: 157-158).

6. Pemeriksaan Plasenta

Pemeriksaan plasenta meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Selaput ketuban utuh atau tidak
- b. Plasenta (ukuran plasenta) terdiri atas

- 1) Bagian maternal, jumlah kotiledon, keutuhan pinggir kotiledon
 - 2) Bagian fetal, utuh atau tidak.
- c. Tali pusat, meliputi :
- 1) Jumlah arteri dan vena,
 - 2) Adakah arteri atau vena yang terputus untuk mendeteksi plasenta suksenturia,
 - 3) Insersi tali pusat, apakah sentral, marginal, panjang tali pusat (Nurul Jannah, 2017: 149).

7. Kebutuhan Ibu Pada Kala III

Kebutuhan ibu bersalin selama kala III dapat meliputi ketertarikan ibu pada bayi, dengan cara mengamati bayinya, menanyakan jenis kelamin bayi, jumlah jari, dan mulai menyentuh bayinya. Selain itu, ibu dapat juga memberikan perhatian pada dirinya sehingga bidan perlu menjelaskan kondisi ibu (seperti ada tidaknya penjahitan) dan memberikan bimbingan tentang kelanjutan tindakan dan perawatan ibu (Nurul Jannah, 2017: 149).

8. Deteksi dan Komplikasi Kala III

a. Perdarahan kala III

Perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan atau hilangnya darah 500 cc atau lebih yang terjadi setelah anak lahir. Perdarahan dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah lahirnya plasenta. Perdarahan menurut waktunya dibagi atas :

- 1) perdarahan post partum primer (*early postpartum hemorrhage*) yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir.

- 2) Perdarahan postpartum skunder (*late postpartum hemorrhage*) yang terjadi antara 24 jam dan 6 minggu setelah anak lahir(Widia, 2015: 204-205).
- 3) Penyebab perdarahan kala III

a) **Atonia Uteri**

Atonia uteri didefinisikan sebagai suatu kondisi kegagalan berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Pada kondisi tertentu, otot rahim tersebut tidak mampu berkontraksi atau walaupun ada, kontraksi tersebut kurang kuat. Akibatnya perdarahan yang terjadi dari tempat implantasi plasenta tidak akan berhenti sehingga kondisi tersebut sangat membahayakan ibu.

(1) Penyebab Atonia Uteri

Penyebab atonia uteri belum diketahui secara pasti. Akan tetapi terdapat beberapa faktor predisposisi atonia uteri.

- (a) Distensi Rahim yang Berlebihan
- (b) Pemanjangan Masa persalinan atau Partus Lama
- (c) Grandemultipara (Paritas 5 atau Lebih)
- (d) Kehamilan dengan Mioma Uteri.

Faktor predisposisi lain adalah persalinan buatan (section caesarea atau SC, forsep, dan ekstraksi vakum), persalinan lewat waktu dan korioamnionitis.

(2) Tanda dan Gejala

Mengenal tanda dan gejala sangat penting dalam penentuan diagnosis dan penatalaksanaannya. Tanda dan gejala tersebut meliputi perdarahan pervaginam, konsistensi rahim lunak, fundus uteri naik dan syok

b) Laserasi Jalan Lahir atau Robekan Perineum

Robekan perineum terjadi hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Akan tetapi, hal tersebut dapat di hindari atau dikurangi dengan cara mencegah kepala janin melewati dasar panggul dengan cepat.

c) Retensio Plasenta

Retensio plasenta adalah keadaan plasenta yang tertahan atau belum lahir hingga melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir. Plasenta biasanya terlepas dari tempat implantasinya pada keadaan normal 15 menit setelah bayi lahir. Penyebab dari Retensio Plasenta yaitu :

- 1) Plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tubuh terlalu melekat lebih dalam. Berdasarkan tingkat perlekatannya, kondisi plasenta menjadi :
 - a. Plasenta adhesif, yang melekat pada desidua endometrium lebih dalam.
 - b. Plasenta akreta, imlantasi jorjot korion memasuki sebagian miometrium.
 - c. Plasenta inkreta, implantasi menembus hingga miometrium.
 - d. Plasenta parkreta, menembus sampai serosa atau peritoneum dinding rahim.
- 2) Plasenta telah lepas, tetapi belum keluar karena :
 - (a) Atonia uteri, yang dapat menyebabkan perdarahan.
 - (b) Terdapat lingkaran kontraksi pada bagian rahim akibat kesalahan penanganan kala III sehingga menghalangi plasenta untuk keluar (plasenta inkarserata)

d) Kelainan Pembekuan Darah

Perdarahan yang telah di jelaskan sebelumnya umumnya terjadi akibat pembekuan darah intravascular merata dan kelainan bawaan pada mekanisme

pembekuan darah. Penyakit kelainan pembekuan darah seperti amfibrinogenemia atau hipofibrinogenemia sangat membahayakan jiwa ibu, bila tidak cepat ditanggulangi (Nurul Jannah, 2017: 151-156).

d. Kala IV (Kala pemantauan)

1. Kala IV

Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi wanita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam post partum). Dengan cara ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Dwi Asri, dkk 2012: 95).

Setelah kelahiran plasenta, periksa kelengkapan dari plasenta dan selaput ketuban. Jika masih ada sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dalam uterus akan mengganggu kontraksi uterus sehingga menyebabkan perdarahan. Jika dalam waktu 15 menit uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka akan terjadi atonia uteri. Oleh karena itu, diperlukan tindakan rangsangan taktil (massase) uterus, dan bila perlu dilakukan kompresi bimanual (Widia, 2014: 226)

2. Perkiraan Darah yang Hilang

Perkiraan darah yang hilang sangat penting untuk keselamatan ibu namun untuk menentukan banyaknya darah yang hilang sangatlah sulit karena bercampur cairan ketuban atau urine dan mungkin terserap kain handuk atau sarung. Sulitnya menilai kekurangan darah secara akurat melalui perhitungan jumlah sarung karena ukuran sarung bermacam-macam dan mungkin telah diganti jika terkena sedikit

darah atau basa oleh darah. Mengumpulkan darah dengan wadah atau pispot yang di letakkan di bawah bokong ibu bukan lah cara yang efektif untuk mengukur kehilangan dan bukan cerminan asuhan sayg ibu karena berbaring diatas pispot sangat tidak nyaman dan menyulitkan ibu untuk memegang dan menyusui bayinya.

Cara yang baik untuk memperkirakan kehilangan darah adalah menyiapkan botol 500 ml yang di gunakan untuk menampung darah dan di nilai berapa botol darah yang di gunakan untuk menampung darah, kalau setengah berarti 250 ml dan kalau dua botol sama dengan 1 liter dan ini merupakan salah satu cara untuk menilai kondisi ibu. Cara tak langsung untuk mengukur jumlah kehilangan darah adalah penampakan gejala dan tekanan darah.kalau menyebabkan lemas, pusing dan kesadaran menurun serta tekanan darah sistolik turun lebih dari 10 mmhg dari kondisi sebelumnya maka telah terjadi perdarahan lebih dari 500 ml.

Jika ibu mengalami syok hivopilemik maka ibu telah kehilangan darah 50% dari total darah ibu (200-2500 ml). Perdarahan pasca persalinan sangat penting di perhatikan karena sangat berhubungan erat dengan kondisi kesehatan ibu. akibat banyaknya darah yang hilang karena dapat menyebabkan kematian ibu (ina kuswanti, 2014: 147-148).

B. Tinjauan Kasus Dalam Islam

Ayat Al- Qur'an Tentang Persalinan di Muat Dalam Qs-Maryam ayat 22-23

تَنِي قَالَتْ النَّخْلَةَ جِذَعٍ إِلَى الْمَخَاضِ فَأَجَاءَهَا ﴿١٢﴾ فَصِيًّا مَكَانًا بِهِ ءَفَأَنْتَبَدَ ﴿١٣﴾ فَحَمَدَ ﴿١٤﴾ تَهُ
 حَتَّكَ رَبُّكَ جَعَلَ قَدْ تَحَزَنِي أَلَّا تَحْتَمَى مِنْ فَنَادَهَا ﴿١٥﴾ مَنَسِيًّا ذَسِيًّا وَكُنْتَ هَذَا أَقْبَلَ مِثْلِي
 جَنِيًّا رُطْبًا عَلَيْكَ تُسْقِطُ النَّخْلَةَ بِجِذَعٍ إِلَيْكَ وَهَزِي ﴿١٦﴾ سَرِيًّا ۝

Terjemahnya:

Maka dia mengandungnya dan menyisahkan diri dengannya ketempat yang jauh maka, rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia ke pangkal pohon kurma ia berkata “aduhai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan”Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu 25. dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, (Kementerian Agama RI,AL-Qur'an Dan Terjemahnya,2012:306).

Setelah menyampaikan ketetapan Allah di atas, malaikat jibril as. Meniupkan ruh ketubuh Maryam as., maka dia pun mengandunfnya, yakni mengandung anak lekaki itu, yakni' isa as., lalu ketika dia sadar akan kandungannya dia mengisihkan diri dengan, yakni dengan kandungannya itu, ketempat yang yang jauh dari tempat yang jauh dari tempatnya sebelum ini. Maka, rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia menuju kepangkal pohon kurma untuk bersandar. Kini, terbayang olehnya sikap dan cemooh yang akan di dengarnya karna dia melahirkan anak tanpa memiliki suami, dan karena itu dia berkata:’ aduhai, alangkah baiknya aku mati, yakni tidak pernag wujud sama sekali di pentas hidup sebelum ini, yakni sebelum kehamilan ini, agar aku tdk memikul aib dan malu dari satu perbuatan yang sama

sama sekali tdk kugerjakan dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dan dilupan selama selama lamanya.”

Mayoritas ulama meneggakkan bahwa bahwa kelahiran nabi isa as. Melalui proses biasa, yakni kehamilan selama sembilan bulan, bukannya seperti pendapat sementara orang bahwa itu terjadi sekejap, antara lain dengan menunjukkan firman-nya yang mengatakan bahwa adam dan isa as. Dilahirkan dengan kalimat kunfayakun (baca QS.al-imran{3}:59). Sebenarnya kalimat kunfayakun sama sekali bukan berarti terjadinya sesuatu dengan kalimat itu atau dalam masa pengucapan kalimat itu. Bukanka terbaca diatas bahwa ada proses yang terjadi pada proses yang terjadi pada saat kelahirannya, proses yang memakan waktu lebih lama dari masa pengucapan kalimat kunfayakum ? itu masa kelahirannya, sedng masa kehamilannya tidak di singgung di sini ayat ini hanya menyisyaratkan bahwa setelah kehamilan itu agaknya setelah tanda- tanda kehamilannya telah sangat sulit di sembunyikan maka ia menjauh dari keluarganya. Banyak ulama berpendapat bahwa lokasi yang di pilihnya adalah *bait lahem*, satu daerah sebelum selatan al- Qudus (Yarusalem) di Palestina, dan disanalah Nabi Isya as.dilahirkan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia menuju kepangkal pohon kurma untuk bersandar akibat gerakan yang sangat keras . desakan janin untuk keluar melalui rahim

mengakibatkan pergerakan anak dalam perut dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit dari sini, kata tersebut di pahami dalam arti sakit yang mendahului kelahiran dan juga dalam ayat ini menjelaskan tentang kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas dan dalam persalinan karna ia muda di cerna, lezat dan mengandung kalori yang tinggi .

dan pada ayat diatas terlihat bagaimana Maryam as. yang dalam keadaan lemah itu masih di perintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk menggerakkan pohon guna memperoleh rezki walaupun boleh jadi pohon itu tidak dapat bergerak karena lemah fisiknya Maryam setelah melahirkan walaupun suasana ketika itu adalah suprasional ini sebagai isyarat kepada semua pihak untuk tidak berpangku tangan menanti datangnya rezki tetapi harus berusaha sepanjang kemampuan yang dimiliki (M.Quraish Shihab,2002: 429-434)

Ayat lain tentang Persalinan juga dimuat dalam surah An-Nahl Ayat 78 dan dianjurkan di baca saat bersalin agar allah memudahkan segala sesuatunya sebagaimana firmanNya:

لَا فِئْدَةَ وَالْأَبْصَرَ السَّمْعَ لَكُمْ وَجَعَلَ شَيْئًا تَعْلَمُونَ لَا أُمَّهَاتِكُمْ بَطُونَ مِّنْ أَخْرَجَكُمْ وَاللَّهُ
تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ وَآ

Terjemahnya

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan memberi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur...(Kementrian Agama RI,AL-Qur'an Dan Terjemahnya,2012:285).

Maksud ayat ini adalah,Allah mengajari apa yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu apapun Allah mengkaruniakan kepada kalian akal untuk memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah membuka mata kalian untuk melihat apa yang tidak kalian lihat sebelumnya,dan memberi kalian telinga untuk mendengar suara-suara sehingga sebagian dari kalian memahami perbincangan kalian, serta memberi kalian mata untuk melihat berbagai sosok, sehingga kalian dapat saling mengenal dan membedakan,

Ayat ini menurut tafsir Al Maraghi mengandung penjelasan bahwa setelah Allah melahirkan kamu dari perut ibumu maka dia menjadikan kamu dapat mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak kamu ketahui.dia telah memberikan kepadamu beberapa macam anugrah seperti, akal, pendengaran, penglihatan, dan perangkat hidup yang lain sehingga kamu dapat mengetahui jalan untuk mencari rezeki dan materi lainnya yang kamu butuhkan, bahkan kamu dapat pula memilih mana yang terbaik bagi kamu dan meninggalkan mana yang jelek.

Semua yang di anugrahan oleh Allah kepadamu tiada maksud lain kecuali supaya kamu bersyukur, artinya kamu gunakan semua anugrah Allah tersebut diatas semata-mata untuk mencapai tujuan hidup sebenarnya. ayat ini

juga membuktikan suatu kuasa Allah dalam hal menghidupkan dan mematikan makhluk. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah untuk melakukan hal semacam itu(Qonitah Hafidzoh 2014:54).

C. Teori Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan (*Midwifery Management*) adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnose kebidanan, perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi.

2. Tahapan dalam Manajemen kebidanan

Langkah – langkah asuhan kebidanan menurut varney (2001), yaitu sebagai berikut:

a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber yang dapat memerikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang akurat dan ekonomis, yang di sebut sebagai sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data skunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu ; Observasi, dimana pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi nafas), penciuman (bau nafas, bau luka), peredaran (suhu badan, nadi). Wawancara, dimana pembicaraan terarah yang umumnya dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting di perhatikan adalah data yang ditanyakan di arahkan data yang relevan. Dan Pemeriksaan, dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan memakai instrument/alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka, irama kuantitas. Misalnya pengukuran tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter.

Data secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subyektif dan data obyektif. Pada waktu mengumpulkan data subyektif harus mengembangkan hubungan antar personal yang efektif dengan pasien/klien/yang diwawancarai, lebih diperhatikan hal-hal yang menjadi keluhan utama pasien dan mencemaskan, berupa pendapatan data/fakta yang sangat bermakna dalam kaitan dengan masalah pasien.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara, anamneses dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data meliputi: riwayat kesehatan, riwayat reproduksi:riwayat haid, riwayat obstetri, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi. Dan pemeriksaan fisik, yang meliputi keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

Pada persalinan kala I umumnya klien akan mengeluh tentang keadaannya dimana klien merasakan mules pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, dan klien juga mengatakan bahwa terdapat pengeluaran lender bercampur dengan darah, serta sifat nyeri yang dirasakan semakin lama semakin sering dan bertambah kuat. Pada persalinan kala II umumnya ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran, adanya tekanan pada anus dan tampak perineum menonjol, vulva, dan spingter ani membuka.

Pada persalinan kala III akan tampak pengeluaran plasenta dimana tali pusat akan bertambah panjang yang di sertai dengan adanya semburan darah dan terjadi perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Serta pada persalinan kala IV atau kala obserfasi akan di tandai dengan kontraksi uterus yang baik, dan tanda-tanda vital dalam batas normal pada 2 jam post partum, dengan pemantauan 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua post partum.

b. Langkah II : Interpretasi Diagnose atau Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnose atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data - data

yang di kumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan di interpretasikan sehingga di temukan masalah atau diagnose yang spesifik. Langkah awal dari perumusan masalah/diagnose kebidanan adalah pengelolaan/analisa data yang menggabungkan dan menghubungkan satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta .

Pada kala I persalinan, lama pembukaan yang berlangsung pada primigravida yaitu berlangsung selama 12 jam sedangkan pada multigravida berlangsung selama 8 jam yang dimulai dari pembukaan 0 cm sampai pembukaan 10 cm. Pada fase laten persalinan yang dimulai sejak awal kontraksi menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap yang berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm yang umumnya berlangsung selama 8 jam.

Kemudian pada fase aktif persalinan frekuensi dan kontraksi uterus meningkat secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika terjadi tiga kali atau lebih dalam 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih), dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan 10 cm dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam pada multigravida dan primigravida, atau lebih dari 1 sampai 2 cm multigravida. Pada kala I persalinan juga perlu adanya pemeriksaan tanda-tanda vital sekitar 2 atau 3 jam dan memperhatikan agar kandung kemih selalu kosong, serta pemantauan denyut jantung janin $\frac{1}{2}$ jam sampai 1 jam.

Pada kala II persalinan, dimulai dari pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi, pada kala II his menjadi lebih kuat, lebih sering dan semakin lama. Proses ini berlangsung selama $\pm 1,5$ jam pada primigravida dan $\pm 0,5$ jam pada multigravida. Ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk

meneran bersama dengan adanya kontraksi, adanya tekanan pada anus dan tampak perineum menonjol, vulva dan sfingter ani membuka, serta meningkatnya produksi pengeluaran lender bercampur darah. tanda pasti kala II di tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina.

Pada kala III persalinan, dimulai sejak lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit setelah penyuntikan oksitosin. Pada manajemen aktif kala III ini bertujuan untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga mencegah terjadinya perdarahan dan mengurangi kehilangan darah. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu terjadinya perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusat memanjang, dan terjadinya semburan darah secara mendadak dan singkat.

Pada kala IV persalinan, dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum, dimana pemantauan dilakukan dengan mengobservasi tanda-tanda vital pasien, kontraksi uterus, perdarahan dan kandung kemih pada 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua post partum.

c. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosa Atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnose potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnose yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap – siap bila diagnose/masalah potensial ini benar – benar terjadi

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnose/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman.

Dalam mengidentifikasi diagnose atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I yaitu terjadinya kala I lama, peningkatan atau penurunan tanda-tanda vital, DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali/menit, terjadinya perdarahan pervaginam selain dari lender dan darah, ketuban pecah yang bercampur dengan mekonium kental yang disertai dengan tanda gawat janin, kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung kurang dari 20 detik serta tidak ditemukan perubahan serviks dalam 1-2 jam, pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu, terjadinya kala II lama yang disertai dengan partus macet/kasep, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan. Pada manajemen aktif Kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan pervaginam dikarenakan terjadinya lacerasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir.

Dan pada Kala IV persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-tanda vital melawati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kontraksi uterus yang tidak baik.

- d. Langkah IV : Mengidentifikasi Dan Menetapkan Kebutuhan Yang Memerlukan Penanganan Segera dan rujukan.

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan .

- e. Langkah V : Merencanakan Asuhan Yang Komprehensif/Menyeluruh

Pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentiikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap di lengkapi .

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Rencana yang dibuat harus rasional dan

benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta *evidence* terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Adapun penatalaksanaan yang diberikan pada persalinan normal yaitu, memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan apakah persalinan dalam kemajuan yang normal, memeriksa perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinan, membantu ibu memahami apa yang sedang terjadi sehingga ia berperan serta aktif dalam menentukan asuhan. Membantu keluarga dalam merawat ibu selama persalinan, menolong kelahiran dan memberikan asuhan pasca persalinan dini, dan mengenali masalah secepatnya dan mengambil keputusan yang tepat guna dan tepat waktu (efektif dan efisien).

Perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan juga dapat berupa, pemantauan terus menerus kemajuan persalinan menggunakan partograf, pemantauan TTV ibu dan keadaan janin, memenuhi kebutuhan nutrisi dan dehidrasi ibu, menganjurkan ibu perubahan ambulasi dan posisi ibu, menganjurkan tindakan yang memberikan pada rasa nyaman, serta menganjurkan keluarga member dukungan.

f. Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan Dan Penatalaksanaan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar – benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnose. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedangkan sebagian belum efektif.

3. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif yang meliputi diagnosis, antisipasi diagnosis atau masalah potensial serta konseling untuk tindak lanjut.

a. Data Subjektif

Merupakan data yang berisi informasi dari klien. Informasi tersebut dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa.


b. Data Objektif

Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan pada waktu pemeriksaan laboratorium, USG, dll. Apa yang dapat diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnose yang akan ditegakkan.

c. *Assessment*

Merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan.

- d. *Planning*/Perencanaan Merupakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan kesimpulan yang dibuat.



Bagan 2.6: Alur Pikir Manajemen Kebidanan Dalam SOAP

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “I”
GESTASI 37-42 MINGGU DENGAN PERSALINAN NORMAL
DI PUSKESMAS JUMPANDANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 16 AGUSTUS 2017**

KALA I

Nomor Register : 63xxx
Tanggal masuk puskesmas : 16 agustus 2017 jam :16:30 wita
Tanggal pengkajian :16 agustus 2017 jam : 16:30 wita
Tanggal partus :16 agustus 2017 jam :18: 45 wita
Nama pengkaji :Ira ayu lestari

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas ibu/ suami

Nama :Ny “I”/ Tn “R”
Umur :32 thn / 32 thn
Nikah/ lamanya :1x / 10 thn
Suku : Makassar/ Makassar
Agama : Islam/ Islam
Pendidikan : SD/ SD
Pekerjaan : IRT/ buruh harian

Alamat : jln. Muh.jufri 1 bundar No. 3A RT/RW 001/004

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Keluhan utama

Ibu mengeluh nyeri perut tembus belakang disertai adanya pelepasan lendir dan darah

b. Riwayat keluhan utama

- 1) Nyeri perut dirasakan sejak tanggal 16 agustus 2017 pukul 07:00 wita
- 2) Pelepasan lendir dan darah terjadi mulai tanggal 16 agustus 2017 pukul 12:00 wita
- 3) Menurut ibu tidak ada pelepasan air

c. Riwayat menstruasi

1. Menarche : 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lamanya : 3-6 hari
4. Disminore : tidak ada

d. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 12-11-2016
- 2) Umur kehamilan 40 minggu 4.hari
- 3) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
- 4) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.
- 5) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di puskesmas

Trimester I : 2x

Trimester II : 2x

Trimester III : 2x

6) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT)

TT 1 : 14-02-2009

TT 2 : 14-03-2009

7) Keluhan-keluhan:

Trimester I : mual muntah dipagi hari

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

8) Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya

e. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

1) Ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.

2) Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti tuberculosi, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.

3) Ibu tidak memiliki riwayat alergi makanan ataupun obat-obatan

4) Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun

f. Ibu tidak memiliki riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di Rumah sakit maupun di Puskesmas.

g. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

| No | Tahun | Jenis partus | Jenis kelamin | BBL | PBL | Tempat partus | penolong | Keadaan |
|----|-------|-----------------------|---------------|------------|-------|---------------|----------|---------|
| 1 | 2009 | Persalinan pervaginam | Perempuan | 3.200 gram | 48 cm | Puskesmas | Bidan | Baik |
| 2 | 2012 | Persalinan pervaginam | Laki-laki | 3.100 Gram | 48 cm | Puskesmas | Bidan | Baik |
| 3 | 2015 | Persalinan pervaginam | Laki-laki | 3000 Gram | 49 cm | Puskesmas | Bidan | Baik |

Tabel 3.1 Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu (Sumber Data Primer).

h. Riwayat nifas yang lalu

- 1) Ibu merasa senang dan tidak Memiliki masalah saat merawat bayinya
- 2) Ibu tidak mengalami depresi setelah persalinan
- 3) tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk
- 4) pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejakusia 6 bulan keatas

i. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual

- 1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.
- 2) Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.
- 3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.
- 4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

j. Riwayat KB

1. Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan
2. Ibu tidak pernah mengganti alat akseptor Kbnya

k. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan:

a) Pola makan : nasi, sayur, lauk

b) Frekuensi : 3 kali sehari

c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

a) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum. Ibu juga mengonsumsi buah kurma.

2) Kebutuhan Eliminasi

Kebiasaan:

a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.

b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

- a) BAK : Ibu masih kuat dan mampu berjalan ke WC untuk BAK
- b) BAB : Ibu belum BAB

3) Personal *Hygiene*

Kebiasaan:

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- c) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu:

- a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan Istirahat dan Tidur

Kebiasaan

- a) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpatu

- a) Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan fisik (data objektif)

a. Pemeriksaan umum:

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Hari taksiran persalinan tanggal 19-08-2017

Palpasi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak nampak adanya polip.

5) Mulut dan gigi

Inspeksi :bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dangusi tidak berdarah.

6) Telinga

Inspeksi :simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

7) Leher

Inspeksi :tidak ada kelainan

Palpasi :tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

8) Payudara

Inspeksi :payudara simetris kiri dan kanan, puting susumenonjol, tampak hiperpigmentasi pada areolamammae.

Palpasi :tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat areola di pencet, tidak ada nyeri tekan.

9) Abdomen

Inspeksi : nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, nampak striae alba, livid dan linea nigra, tidak ada bekas luka operasi dan otot perut kendur.

Palpasi : Leopold I: 3 jari dibawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 32 cm), teraba bokong

Leopold II : punggung kanan (puka)

Leopold III: kepala

Leopold IV : bergerak dalam panggul (3/5)

Lingkar perut: 92 cm

Tafsiran berat janin : 2944 gram

Denyut jantung janin: denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali per menit

His : 3 x 10/menit durasi 35-40

10) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varises, nampak pelepasan lendir dan darah.

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak oedema dan tidak ada nyeri tekan.

11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

12) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada oedema

c. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 16 agustus 2017, jam 16:30 .wita

1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

2) Portio : lunak sedang

3) Pembukaan : 7 cm

4) Air ketuban : utuh

5) Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang

6) Penurunan : hodge III

7) Penumbungan : 0

8) Molase : tidak ada

9) Kesan panggul : normal

10) Pelparsan : lendir dan darah

d. Pemeriksaan *inspekulo*

Tidak di lakukan

e. Pemeriksaan penunjang

Tidak di lakukan

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

GIV PIII A0, gestasi 40 minggu 4 hari , intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I aktif

1. GIV PIII A0

Dasar

Data subjektif: ibu mengatakan kehamilan yang ke empat dan sebelumnya tidak pernah keguguran, ibu merasakan adanya pergerakan janin.

Data objektif : nampak linea nigra, striae alba dan otot perut sudah kendur, terdapat denyut jantung janin, dan pada saat palpasi teraba bagian-bagian janin.

Analisa dan interpretasi data:

Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae albayang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

2. Gestasi 40 minggu 4 hari

Dasar

Data subjektif : hari pertama haid terakhir tanggal

Data objektif : pemeriksaan Leopold I, tinggi fundus uteri 3 jari dibawah *processus xiphoides*, dan hari tafsiran persalinan tanggal 19-08-2017 berdasarkan rumus Neagle.

Analisa dan interpretasi data:

Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal 12 November sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 40 minggu 4 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Intrauterin

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan janinnya bergerak dengan kuat dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

Data objektif : ibu tidak merasakan nyeri ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi Leopold teraba bagian-bagian kecil janin.

Analisa dan interpretasi data:

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin. (Baety, 2012 : 9)

4. Tunggal

Dasar

Data subjektif : -

Data objektif : Pada Leopold I, teraba bokong di fundus yang bulat dan lunak serta tidak melenting, pada Leopold II teraba punggung kiri, pada Leopold III teraba bagian bulat dan melenting (kepala), dan auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali per menit, serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisa dan interpretasi data:

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11)

5. Hidup

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan pergerakan janinnya 12 kali dalam sehari

Data objektif : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali per menit.

Analisa dan interpretasi data:

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

6. Keadaan ibu dan janin baik

Dasar

Data subjektif : tidak ada keluhan-keluhan lain dan kecemasan yang dirasakan ibu selama kehamilan, ibu merasakan pergerakan janin kuat dan biasanya bergerak 12 kali dalam sehari.

Data objektif :keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, denyut jantung janin(DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 130x per menit dan pemeriksaan *head to toe* konjungtiva merah muda, wajah dan tungkai tidak oedema, hemoglobin 10,5g/dl menandakan ibu tidak anemia. Konjungtiva merah muda, hemoglobin yang normal, tidak adanya oedema pada wajah dan tungkai menandakan ibu dalam keadaan baik.

Analisa dan interpretasi data:

Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan denyut jantung janin(DJJ) yang teratur dan berada dalam batasan normal menandakan keadaan ibu dan janin baik, konjungtiva merah muda, hemoglobin 10,5 g/dl (Pantiawati dan Saryono, 2010 : 122).

7. Inpartu kala I fase aktif

Data subjektif :ibu mengatakan ada pengeluaran lendir dan darah

Data objektif :pengeluaran lendir dan darah berwarna merah dan sudah ada kontraksi.

a. Hasil pemeriksaan dalam jam 16.30 wita

- 1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- 2) Portio : tebal/ lunak
- 3) Pembukaan : 7 cm
- 4) Ketuban : utuh
- 5) Presentasi : uuk kanan lintang
- 6) Penurunan : hodge III
- 7) Molase : 0
- 8) Penumbungan : tidak ada
- 9) Kesan panggul : normal
- 10) Pelepasan : lendir dan darah

Analisa dan interpretasi data:

- a. Lendir dari canalis servikalis keluar di sertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapiler terputus (Dewi Setiawati, 2013: 54).
- b. His pembukaan (Kala I) : menyebabkan pembukaan *serviks*, semakin kuat, teratur dan sakit. Uterus terasa keras atau padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatik air ketuban dan tekanan intrauterin naik serta menyebabkan serviks menjadi mendatar (*affacement*) dan terbuka (*dilatasi*) (Widia, 2015: 23-24).
- c. Dilatasi serviks serviks 4-10 cm merupakan fase aktif, (Nurul, 2017: 5-6).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Potensial terjadinya infeksi jalan lahir

DS : Ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah

DO : tampak pelepasan lendir dan darah

Analisa dan interpretasi data

Dengan adanya pelepasan lendir dan darah, serta terbukanya jalan lahir memungkinkan masuknya mikroorganisme patologi yang merupakan penyebab infeksi jalan lahir.

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI/ RUJUKAN

Tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dan Rujukan

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : perlangsungan kala I
2. Tujuan
 - a. Persalinan dapat berlangsung dengan normal, keadaan ibu dan janin baik.
 - b. Mencegah terjadinya masalah potensial.
3. kriteria
 - a. Kala I untuk multipara tidak lebih dari 7 jam dan untuk primipara 13 jam
 - b. Denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120-160 kali per menit)
 - c. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - 1) Tekanan Darah Normal
 - a) systole 100-120 mmHg
 - b) diastole 60-90 mmHg
 - 2) Suhu normal 36,5 – 37,5 °C
 - 3) Nadi normal 60- 100x/ menit
 - 4) Pernapasan normal 16-24x/ menit
 - d. Keadaan ibu dan janin baik
4. Rencana tindakan
 - a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaannya dan memberi dukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.
 - b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit)

Rasional : observasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu seperti memantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi pada ibu sehingga dapat mempermudah melakukan tindakan.

- c. Observasi denyut jantung janin (DJJ) setiap 30 menit

Rasional : saat ada kontraksi, denyut jantung janin (DJJ) bisa berubah sesaat hingga apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

- d. Observasi *vaginal touch* (VT) kontrol tiap 2 jam/ 4 jam, atau jika ada indikasi

Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan.

- e. Observasi his setiap 30 menit

Rasional : karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi turunnya kepala dan dilatasi serviks

- f. Ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Rasional : untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi

- g. Anjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Rasional:

- 1) Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar
- 2) Menghalangi penurunan kepala bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu

h. Berikan intake minum dan makan pada ibu berupa kurma

Rasional : kurma sangat mudah di cerna.lezat dan mengandung kalori yang tinggi sehingga ibudapat memiliki tenaga pada saat meneran

i. Menganjurkan ibu untuk mendengarkan musik klasik atau mengantinya dengan Mendengarkan Murottal Al-Qur'an

Rasional: mamfaat musik kalsik menurut Djohan dalam Setyaningsih, 2009, yaitu sebagai *audioanalgesic* atau penenang, focus perhatian atau mengatur latihan,meningkatkan hubungan antara terapis dank lien, memperkuat proses belajar,mengatur kegembiraan dan interaksi personal yang positif, sebagai penguat ataupinata untuk kesehatan dalam hal keterampilan fisiologis, emosi dan gayahidup, mereduksi stress pada pikiran dan kesehatan tubuh. Penelitian ini didukungoleh penelitian Diah Eko (2011) tentang pengaruh terapi musik terhadap responnyeri, tanda-tanda vital ibu bersalin kala I fase aktif di RS Muhammadiyah Lamongan dan Murottal merupakan salah satu musik yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya (Widayarti, 2011). Terapi murotal dapat mempercepat penyembuhan, hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Ahmad Al Khadi direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research* di Florida, Amerika Serikat. Dalam konferensi tahunan ke XVII Ikatan Dokter Amerika, dengan hasil penelitian bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh alat berbasis komputer, Peneliti menilai, hanya dengan

pembacaan Al-Qur'an saja dapat membuat efek yang baik bagi tubuh, terlebih lagi jika pembacaan Al-Qur'an tersebut diperdengarkan dengan irama yang stabil dan dilakukan dengan tempo yang lambat serta harmonis, maka akan memunculkan ketenangan bagi pendengarnya dan dapat dijadikan penyembuh baik dari gangguan fisik maupun psikis. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara tidak langsung terapi murottal Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai penyembuh sakit seperti yang dikatakan oleh Wahyudi (2012), bahwa Al-Qur'an sebagai penyembuh telah dilakukan dan dibuktikan, orang yang membaca Al-Qur'an atau mendengarkan akan memberikan perubahan arus listrik di otot, perubahan sirkulasi darah, perubahan detak jantung dan perubahan kadar darah pada kulit.

j. Melakukan dan mengajarkan masase punggung pada ibu dan keluarga

Hasil : dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aryani. Pijat punggung yang dimulai di bagian luar dari serviks-7 ke sisi tulang rusuk dapat mengaktifkan serabut saraf untuk menutup bagian pembawa gerbang Rasa sakit dibawa oleh serabut saraf lainnya, sehingga membatasi penyampaian sensasi kedalam korteks serebral dan penyebabnya Rasa sakit berkurang (Mariza Mustika Dewi dkk, 2015: 5-6).Setelah data dari penelitian yang dilakukan oleh wiwin dkk, yang dilaksanakan di Puskesmas Magelang Selatan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pijat punggung memberikan pengaruh yang baik terhadap adaptasi nyeri persalinan. Wanita yang bisaberadaptasi dengan nyeri persalinan dapat lebih mudah menjalani proses persalinan terutama pada kala II sehingga proses

pengeluaran bayi bisa lebih cepat dan menghilangkan kecemasan yang dapat memengaruhi perfusijaringan (Wiwin Renny Rahmawati dkk, 2013: 209).

- k. Mengajukan kepada ibu untuk senangtiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti doanya sebagai berikut:

Laillaha illa anta subhanaka inni kuntum minadzolimin

Rasional : agar ibu berserah diri dan bertawakkal kepada sang pencipta

- l. Mengajukan ibu untuk banyak- banyak beristigfar

Rasional : dalam sebuah hadist yang di riwayatkan rasullah SAW bersabda barang siapa yang yang memperbanyak beristigfar apabila ia dalam kesesuhan maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari kesusahannya

- m. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 16 Agustus 2017 jam 16:30 wita

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Mengobservasi tanda-tanda vitalsetiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

| No | Jam (Wita) | TD (mmHg) | N (x/i) | S (axilla) | DJJ (x/i) | HIS (Frekuensi-Durasi) |
|----|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 17:00 | | 86 | | 138 | 4x10/menit (35-40) |
| 2 | 17:30 | | 86 | | 135 | 4x10/menit (40-45) |
| 3 | 18:00 | | 80 | | 140 | 5x10/menit (45-50) |
| 4 | 18:30 | 120/80 | 84 | 37 °C | 138 | 5x10/menit (45-50) |

Tabel 3.2 Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his (sumber Data Primer)

3. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 16 agustus jam 18:30 wita

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : melesap
- c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- d. Ketuban : jernih
- e. Presentasi : ubun-ubun di bawah symphysis
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Molase : 0
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

4. menganjurkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut
5. menganjurkan ibu untuk mengambil posisi yang nyaman miring kiri atau miring kanan
6. Menganjurkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
7. Memberi makan ibu kurma dan minum jika tidak ada his
8. Menganjurkan kepada keluarga untuk memberikan dukungan serta doa
9. Menganjarkan masase punggung pada ibu dan keluarga
10. Menganjurkan ibu untuk mendengarkan musik klasik atau murottal al-Qur'an
11. Menganjurkan kepada ibu untuk senangtiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti
12. Menganjurkan ibu untuk memperbanyak istigfar
13. Mencatat dalam partograf

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal Keadaan ibu dan janin baik yang ditandai dengan:

- a. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - 1) Tekanan darah: 120/80 mmHg
 - 2) Suhu : 36,8 °C (axilla)
 - 3) Nadi : 84 kali per menit
 - 4) Pernapasan : 22 kali per menit

- b. Denyut jantung janin (DJJ) 130 kali per menit terdengar jelas, kuat dan teratur
 - 1. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:
 - a. His yang adekuat 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik
 - b. Pembukaan lengkap (10 cm) \pm 7 jam setelah vagina *toucher* (VT) pertama dan penurunan kepala hodge IV
 - c. Tidak ada tanda-tanda infeksi
 - d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

KALA II

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif:

- 1) Sakitnya Bertambah Kuat Dan Tembus Kebelakang
- 2) Ibu merasa ingin BAB
- 3) Adanya Dorongan Kuat untuk Meneran
- 4) Serta Adanya Tekanan pada Anus.

Data objektif:

- 1) Perineum Menonjol, Vulva dan Vagina Membuka
- 2) Kontraksi Uterus 5 Kali Dalam 10 Menit dengan Durasi 50-55 Detik
- 3) Penurunan Kepala 0/5
- 4) Penurunan Hodge IV Dan Pelepasan Lenidr, Darah dan Air Ketuban.

Hasil pemeriksaan dalam, jam 18:30 wita

1. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
2. Portio : melesap

- 3. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- 4. Air ketuban : jernih
- 5. Presentasi : ubun-ubun Kecildi bawah symphis
- 6. Penurunan : hodge IV
- 7. Molase :0
- 8. Penumbungan : tidak ada
- 9. Kesan panggul :normal
- 10. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

B. LANGKAH II DENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

- Diagnosa : Perlangsungan Kala II
- Masalah actual : Tidak ada indikasi
- Data subjektif : Ada Penekanan pada anus, ada dorongan kuat untuk meneran, sakitnya sering dan bertambah sakit.
- Data objektif : perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Analisa dan interpretasi data:

Dengan adanya his yang kuat dan teratur, maka akan mempercepat proses persalinan, tekanan yang hebat pada dasar panggul dan bagian terendah janin,

akan mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu mengedan yang berlangsung secara *refleksi* (Kuswanti dan Melina, 2014 : 13)

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak Ada Data Yang Menunjang Terjadinya Diagnosa Potensial

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI DAN RUJUKAN

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah aktual : tidak ada indikasi

Masalah potensial : tidak ada data penunjang

Tujuan:

1. Kala II berlangsung normal
2. Bayi lahir normal tanpa penyulit

Kriteria:

1. Kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernapas tanpa bantuandan bergerak dengan aktif

Rencana tindakan

Tanggal 16 agustus 2017 jam 18:30 wita

1. Melihat adanya tanda dan gejala persalinan kala dua (dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Rasional : untuk mengetahui apakah sudah dapat dilakukan pimpinan meneran

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah diri dari infeksi nosokomial

3. Memakai celemek plastik.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : mencegah infeksi

5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakan kembali ke dalam wadah partus set.

Rasional: mempersiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencilupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Rasional: mencegah terjadinya infeksi silang

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 per menit).

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Rasional: agar ibu tidak khawatir dengan keadaan bayinya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman.

Rasional: dapat membantu memperlancar proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Rasional: memperlancar proses berlangsungnya persalinan

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Rasional: untuk mempercepat penurunan kepala

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Rasional: untuk mengeringkan tubuh bayi

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu atau gunakan *underped*.

Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dngan

satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum)

Rasional: dengan menyokong yang baik, maka akan mengurangi trauma dan mencegah terjadinya ruptur perineum

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Rasional: membersihkan jalan nafas dari air ketuban dan lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal dan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Rasional: membantu mengeluarkan bayi agar tidak terjadi robekan perineum

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Rasional: dengan teknik sanggah susur akan membantu pengeluaran tubuh bayi seluruhnya dan mencegah agar bayi tidak jatuh

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Rasional: membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh

25. Melakukan penilaian selintas :

- a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
- b. Apakah bayi bergerak aktif ?

Rasional: untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Membiarkan bayi di atas perut ibu.

Rasional: mencegah agar bayi tidak mengalami hipotermi

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 16 Agustus 2017, jam 18.30 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).
2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set.

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

a. Partus set

- 1) 2 klem kocher
- 2) ½ kocher
- 3) 1 ½ handscoon steril
- 4) Kateter nelaton
- 5) Penjepit tali pusat
- 6) Kassa steril
- 7) Spoit 3 cc
- 8) Gunting tali pusat

b. Hecting set

- 1) Nelpuder
- 2) Catgut dan jarum
- 3) Pinset anatomi dan sirurgi

4) Gunting benang.

c. Obat dan bahan

- 1) Cairan infus
- 2) Oksitosin
- 3) Lidokain
- 4) Salep mata
- 5) Vitamin K, hepatitis B, betadin.

d. Diluar partus set

- 1) Air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi
- 2) Larutan klorin 0,5%
- 3) Tempat sampah
- 4) Delee dan lenek
- 5) Perlak dan handuk kering
- 6) Tensimeter dan stetoskop
- 7) Termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

- 1) Topi dan masker
- 2) Kacamata dan celemek
- 3) Handscoon
- 4) Alas kaki tertutup/ sepatu boot
3. Memakai celemek plastik.

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
 6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.
 7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.
 8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.
- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
 - d. Air ketuban : pecah, jernih (merembes)
 - e. Presentasi : ubun-ubun kecil depan sympisis
 - f. Penurunan : hodge IV
 - g. Molase : 0
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 x/menit).
11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.
15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.
16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underped*.
17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan
18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat $\frac{1}{3}$ atau gunakan *underped* bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dngan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).
20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin
21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

25. Melakukan penilaian selintas :

- a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
- b. Apakah bayi bergerak aktif ?

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tangga 16 Agustus 2017, jam 18:45 wita

1. Kala II berlangsung normal tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan tanggal 16 Agustus 2017 jam 18:45 wita, menangis kuat dan bernapas tanpa bantuan, serta bayi bergerak aktif
3. Perdarahan \pm 200 cc
4. Terjadi ruptur tingkat II

KALA III

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah

Ibu mengatakan bahwa ari-arinya bayinya belum lahir

Data objektif :

1. bayi lahir spontan pada tanggal 16 agustus 2017, jam 18:45 wita
2. kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
3. tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. plasenta belum lahir.
5. kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala III

Data subjektif : ibu nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya

Data objektif :

1. bayi lahir spontan tanggal 16 agustus 2017, jam 18.45 wita,
2. kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
3. tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. tali pusat masih nampak di vulva

Analisa dan interpretasi data:

Pada waktu kala III, volume uterus telah berkurang, dapat teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, pada saat kontraksi maka akan memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba keras dan bundar (Kuswanti dan Melina, 2014 : 7)

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak Ada Data Yang Menunjang Terjadinya Diagnoso Potensial

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI/ RUJUKAN

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan :

- 1) Kala III berlangsung normal
- 2) plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
- 3) kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- 4) keadaan ibu dan bayi baik

2. kriteria :

- 1) Lamanya kala III tidak lebih dari 30 menit
- 2) plasenta (selaput dan kotiledon) lahir lengkap
- 3) kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) serta keadaan ibu dan bayi baik.

Rencana tindakan

Tanggal 16 agustus 2017, jam 18:45 wita

- 1) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

- 2) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Rasional : mempercepat proses pengeluaran plasenta

- 3) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Rasional : penyuntikan oksitosin untuk membantu kontraksi uterus

- 4) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Rasional : untuk memudahkan memotong tali pusat

- 5) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Rasional : agar bayi dapat dipisahkan dari plasenta

- 6) Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

Rasional : agar darah tidak keluar dari pusat bayi

- 7) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Rasional : agar ibu dan bayi tidak hipotermi dan bisa melakukan kontak kulit

- 8) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : agar dapat memudahkan proses peregangan tali pusat terkendali

- 9) Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi dan tangan lain meregangkan tali pusat.

Rasional : memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

- 10) Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Rasional : dorsokranial memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

- 11) Melakukan peregang dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorsokranial).

Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai dengan kurva jalan lahir sehingga tampak pada vulva

- 12) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Rasional : mencegah robekan dan mencegah tertinggalnya selaput ketuban yang dapat menyebabkan perdarahan

- 13) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Rasional : agar kontraksi baik dan mencegah perdarahan

- 14) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan

- 15) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Rasional : penjahitan laserasi dapat mencegah terjadinya perdarahan

- 16) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan akibat atonia uteri

- 17) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

- 18) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasi yg akan terjadi

19) Setelah satu jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 16 agustus 2017, jam 19:05 wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.
2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.
3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).
4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
6. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

7. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.
8. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva
9. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.
10. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangkan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
11. Melakukan peregangkan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorsokranial).
12. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.
13. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

14. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.
15. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
16. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
17. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
18. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.
19. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Evaluasi tanggal 16 agustus 2017, jam 19.05 wita

1. Kala III berlangsung \pm 5 menit
2. Kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tangl 16 agustus 2017, jam 18.50 wita
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan kala III \pm 200 cc
5. Kontraksi uterus baik , uterus teraba keras dan bundar

6. Keadaan ibu dan bayi baik.

KALA IV

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah.

Data objektif :

- 1) Kala III Berlangsung \pm 5 Menit
- 2) Plasenta Lahir Lengkap Tanggal 16 Agustus 2017 Jam 18.50 Wita
- 3) Tinggi Fundus Uteri Setinggi Pusat
- 4) Kontraksi Uterus Baik (Teraba Keras Dan Bundar)
- 5) Perdarahan \pm 200 Cc Dan Kandung Kemih Kosong.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya

Data objektif : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- 1) Kala III Berlangsung \pm 5 Menit Plasenta Lahir Lengkap Tanggal 16 Agustus 2017
- 2) Tinggi Fundus Uteri Setinggi Pusat, Kontraksi Uterus Baik (Teraba Keras Dan Bundar)
- 3) Perdarahan \pm 100 Cc Dan Kandung Kemih Kosong

Analisa Dan Interpretasi Data:

Setelah plasenta lahir lengkap, maka menunjukkan telah masuk ke kala pengawasan/ kala observasi post partum. Kelelahan disebabkan oleh penggunaan energi dan cairan yang banyak saat persalinan (Kuswanti dan Melina, 2014 : 8).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak Ada Data Yang Menunjang Terjadinya Diagnoso Potensial

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI DAN RUJUKAN

Tidak ada data yang menunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : Kala IV berlangsung normal dan kelelahan dapat teratasi
2. Kriteria : Tidak Terjadi Perdarahan, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), kandung kemih kosong dan tanda-tanda vital dalam batas normal

Rencana tindakan

Tanggal 16 agustus 2017 , jam 19.05 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
Rasional : mencegah terjadinya perdarahan pervaginam
2. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
Rasional : agar kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 jam pada jam kedua pasca persalinan

Rasional : mengetahui jumlah darah yang keluar

4. Memeriksa tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus uteri kontraksi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

Rasional : tanda-tanda vital yang normal dan kandung kemih yang kosong menandakan kala IV berlangsung normal

5. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Rasional : agar bayi dalam keadaan aman dan nyaman

6. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Rasional : larutan klorin 0,5% dapat membunuh bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi

7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

8. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi (DDT), membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Rasional : agar ibu terhindar dari kuman

9. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin makan dan minum

Rasional : dengan makan dan minum akan memberikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinannya

10. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Rasional : untuk membunuh kuman

11. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.

Rasional : mencegah infeksi silang dan sebagai tindakan desinfeksi infeksi

12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : dekontaminasi agar tidak terkontaminasi dengan bakteri

13. Melengkapi partograf

Rasional : sebagai catatan pemantauan persalin

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 16 agustus 2017, jam 19.05 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
2. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi
3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darahsetiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan
4. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus kandung kemih dan perdarahan setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pa

| Jam | Waktu (Wita) | TD (mmHg) | N (x/i) | S (°C) | TFU | Kontraksi | Kandung kemih | Jumlah Perdarahan |
|-----|-----------------|--------------|------------|-----------|-----|-----------|------------------|----------------------|
| I | 19.05 | 130/90 | 88 | 36,8 | STP | Baik | Kosong | ± 50 cc |
| | 19.20 | 130/90 | 85 | | STP | Baik | Kosong | ± 50 cc |
| | 19.35 | 120/80 | 84 | | STP | Baik | Kosong | ± 30 cc |
| | 19.50 | 120/80 | 82 | | STP | Baik | Kosong | ± 20 cc |
| II | 20.20 | 120/80 | 80 | 37 | STP | Baik | Kosong | ± 30 cc |
| | 20.50 | 120/80 | 80 | | STP | Baik | Kosong | ± 20 cc |

Tabel 3.3 Evaluasi Tanda-tanda vital pasca persalinan dan estimasi jumlah kehilangan darah (Sumber Data Primer).

5. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.
6. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
8. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.
9. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
10. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

11. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.
12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
13. Melengkapi partograf (Saifuddin, 2014 : 341-347).

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 16 agustus 2017, jam 19.05 wita

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
2. Jumlah perdarahan \pm 200 cc
3. Kandung kemih kosong
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal
Tekanan darah : 120/80 mmHg Suhu : 37 °C
Nadi : 88x/ menit Pernapasan : 24x/ menit
5. Ibu telah makan dan minum
6. Keadaan ibu dan bayi bayi

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA
NY “I” GESTASI 37– 42 MINGGU DENGAN ASUHAN PERSALINAN
NORMAL DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 16 AGUSTUS 2017**

No. Register : 63xxxx

Tanggal Masuk : 16 Agustus 2017 Pukul 16:30 WITA

Tanggal Pengkajian : 16 Agustus 2017 Pukul 16:30 WITA

Tanggal Partus : 16 Agustus 2017 Pukul 18.45 WITA

Nama pengkaji : Ira Ayu Lestari

LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny “I” / Tn “R”

Umur : 32 Tahun/ 32 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 X / 10 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Jln.Muh. Jufri 1 Bundar No. 3A RT/RW 001/004

KALA I

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ini kehamilan Keempat dan tidak pernah keguguran
2. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 12 November 2016
3. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil
4. Ibu mengatakan telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali di Puskesmas, 2x pada trimester I, 2x pada trimester II, dan 2x pada trimester III
5. Ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 9 bulan
6. Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat pada perut sebelah kiri dan itu dirasakan sampai sekarang
7. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit serius
8. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, asma, diabetes melitus, dan penyakit menular lainnya seperti *Tuberculosis* (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS)
9. Ibu mengatakan tidak pernah dirawat di Puskesmas dan di rumah sakit karena penyakit yang serius.
10. Nyeri perut dirasakan sejak tanggal 16 Agustus 2017 pukul 07:00 wita
11. Pelepasan lendir dan darah terjadi mulai tanggal 16 Agustus 2017 pukul 12:00 wita
12. tidak ada pelepasan air

Pemeriksaan Leopold

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 32 cm, teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP

LP : 92 cm

TBJ : $TFU \times LP = 32 \times 92 = 2944$ gram

HIS : 3 kali dalam 10 menit, dengan durasi 30 – 35 detik

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kiri perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 130 x/menit.

- i. Ekstremitas : keadaan kaki dan tangan lengkap, simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema pada tungkai, tidak ada varises, tidak ada nyeri tekan dan terdapat reflex patella kiri dan kanan.
- j. Genitalia : keadaan genitalia bersih, tidak ada varises, tidak ada oedema, tidak ada pembesaran kelenjar batholin, dan tampak pengeluaran lender dan darah.

Pemeriksaan dalam tanggal 16 Agustus 2017 Pukul 16:30 WITA, oleh mahasiswa "X"

- (1) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
- (2) Portio : Tipis dan Lunak

- (3) Pembukaan : 7 cm
- (4) Ketuban : Utuh
- (5) Presentase : Ubun-ubun kecil kanan lintang
- (6) Penurunan : Hodge III
- (7) Molase : 0
- (8) Penumbungan : Tidak ada
- (9) Kesan panggul : Normal
- (10) Pelepasan : Lendir dan darah

Assesment (A)

Diagnosa : GIVPIIA0, gestasi 40 minggu 4 hari,, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik, Inpartu Kala 1 fase aktif.

Planning (P)

13. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga

Hasil : ibu dan keluarga sudah mengetahui hasil pemeriksaan ibu

14. Mengobservasi tanda-tanda vitalsetiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

| No | Jam (Wita) | TD (mmHg) | N (x/i) | S (axilla) | DJJ (x/i) | HIS (Frekuensi-Durasi) |
|----|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 17:00 | | 86 | | 138 | 4x10/menit (35-40) |
| 2 | 17:30 | | 86 | | 135 | 4x10/menit (40-45) |
| 3 | 18:00 | | 80 | | 140 | 5x10/menit (45-50) |
| 4 | 18:30 | 120/80 | 84 | 37 °C | 138 | 5x10/menit (45-50) |

Tabel 3.4 Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his (Sumber Data Primer)

15. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 16 agustus jam 18:30 wita

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : melesap
- c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- d. Ketuban : jernih
- e. Presentasi : ubun-ubun di bawah syimpisis
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Molase : 0
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal

j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

16. menganjurkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut

Hasil : ibu bersedia melakukannya

17. menganjurkan ibu untuk mengambil posisi yang nyaman miring kiri atau miring kanan

hasil : ibu bersedia melakukannya dan memilih untuk miring kiri

18. Menganjurkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin

Hasil : ibu mengerti dan masih sanggup untuk berjalan ke WC

19. Memberi makan ibu kurma dan minum jika tidak ada his

Hasil : ibu telah memakan kurma

20. Menganjurkan kepada keluarga untuk memberikan dukungan serta doa

Hasil : ibu dan keluarga bersedia dan telah melakukannya

21. Menganjarkan masase punggung pada ibu dan keluarga

Hasil : ibu dan keluarga telah mengetahui cara masase punggung

22. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Hasil : ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT.

23. Menganjurkan ibu untuk memperbanyak istigfar

Hasil :ibu bersedia melakukannya dan telah beristigfar

24. Mencatat dalam partograf

Hasil : partograf telah diisi

KALA II

Data Subyektif (S)

- 1) Sakitnya Bertambah Kuat dan Tembus Kebelakang
- 2) Ibu merasa ingin BAB
- 3) Adanya Dorongan Kuat untuk Meneran
- 4) Serta Adanya Tekanan pada anus.

Data Obyektif (O)

1. Perineum Menonjol, vulva dan vagina membuka
2. Kontraksi Uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik
3. Penurunan Kepala 0/5
4. Penurunan Hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Hasil pemeriksaan dalam, jam 18:30 wita

- Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- Portio : melesap
- Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- Air ketuban : jernih
- Presentasi : ubun-ubun Kecildi bawah symphis
- Penurunan : hodge IV
- Molase : 0

- Penumbungan : tidak ada
- Kesan panggul : normal
- Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

Assessment (A)

Diagnosa actual : perlangsungan kala II

Planning (P)

Tanggal 16 Agustus 2017 pukul 16.30 wita

1. Melihat tanda dan gejala kala II

Hasil : tampak tanda dan gejala kala II

- Adanya dorongan kuat untuk meneran
- Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina
- Perineum menonjol
- Vulva, vagina dan spingter ani membuka

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set.

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

f. Partus set

- 1) 2 klem *kocher*
- 2) $\frac{1}{2}$ *kocher*
- 3) 1 $\frac{1}{2}$ *handscoon steril*
- 4) Kateter nelaton

- 5) Penjepit tali pusat
- 6) Kassa steril
- 7) Spoit 3 cc
- 8) Gunting tali pusat

g. Hecting set

- 1) Nelpuder
- 2) Catgut dan jarum
- 3) Pinset anatomi dan sirurgi
- 4) Gunting benang.

h. Obat dan bahan

1. Cairan infus
2. Oksitosin
3. Lidokain
4. Salep mata
5. Vitamin K, hepatitis B, betadin.

i. Diluar partus set

1. Air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi
2. Larutan klorin 0,5%
3. Tempat sampah
4. Delee dan lenek
5. Perlak dan handuk kering
6. Tensimeter dan stetoskop

7. Termometer.

j. Alat Pelindung Diri (APD)

1. Topi dan masker
2. Kacamata dan celemek
3. Handscoon
4. Alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik

Hasil : celemek telah di pakai

4. Melepas semua perhiasan yang dipakai di tangan, lalu mencuci tangan di bawah air mengalir dengan tekhnik 7 langkah

Hasil : tangan telah di cuci

5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Hasil : sarung tangan telah dipakai

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : spoit telah di isi dengan oksitosin dan telah di letakkan kembali di wadah partus set

7. Membersihkan vulva dan perineum, mengusapnya dengan hati-hati dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas DTT.

Hasil : vulva dan perineum telah dibersihkan

8. Lakukan pemeriksaan dalam (PD) untuk memastikan pembukaan lengkap

Hasil : pemeriksaan dalam pukul 18:30 WITA

- Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- Portio : melelap
- Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- Air ketuban : pecah, jernih (merembes)
- Presentasi : ubun-ubun kecildi bawah symphysis
- Penurunan : hodge IV
- Molase : 0
- Penumbungan : tidak ada
- Kesan panggul : normal
- Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

9. Mendekontaminasi sarung tangan kotor kedalam larutan clorin 0,5 % dan membukanya secara terbalik, lalu rendam selama 10 menit dalam larutan clorin 0,5 %

Hasil : sarung tangan telah dibuka secara terbalik dan didekontaminasi di larutan clorin 0,5 % selama 10 menit.

10. Memeriksa DJJ setelah kontraksi, untuk memastikan DJJ dalam batas normal yaitu 120-160 x/menit

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kiri perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 135 x/menit.

11. Beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin serta ibu dalam keadaan baik.

Hasil : ibu dan keluarga telah di beritahu

12. Minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran (Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu keposisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).

Hasil : keluarga bersedia membantu

13. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran, diantaranya : bimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, berikan dukungan dan semangat atas usaha ibu untuk meneran, anjurkan ibu beristirahat diantara kontraksi dan anjurkan ibu untuk minum di sela-sela kontaksi.

Hasil : telah dilakukan pimpinan meneran, ibu beristirahat dan minum diantara kontraski, serta ibu telah diberi semangat.

14. Jika ibu tidak memiliki keinginan untuk meneran dan, anjurkan ibu untuk berjalan,jongkok, atau mengambil posisi yang dianggap nyaman.

Hasil : ibu telah memilih posisi yang nyaman yaitu dengan posisi miring kiri

15. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih diatas perut ibu.

Hasil : handuk bersih telah di letakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu

Hasil : telah dilakukan

17. Membuka partus set untuk memastikan kelengkapan alat dan bahan.

Hasil : alat dan bahan telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan

Hasil : sarung tangan steril telah dipakai

19. Setelah kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lakukan penyokongan dengan melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, kemudian letakkan tangan yang lain pada kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut untuk mencegah terjadinya gerakan difleksi maksimal.

Hasil : telah dilakukan penyokongan dan kepala bayi telah lahir.

20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.

Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala telah melakukan putaran paksi luar secara spontan

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan, lakukan pegangan secara biparietal, dengan menempatkan kedua tangan pada sisi muka bayi. Anjurkan ibu menerang pada kontraksi berikutnya, dengan lembut tarik bayi kebawah untuk mengeluarkan bahu depan, kemudian tarik keatas untuk mengeluarkan bahu belakang.

Hasil : pegangan biparietal telah dilakukan, dan kedua bahu telah lahir.

23. Setelah kedua bahu bayi lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah, Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.

Hasil : telah dilakukan bahu dan lengan bayi telah lahir.

24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut kepinggung, bokong, tungkai dan kaki serta pegang masing-masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.

Hasil : telah dilakukan, dan bayi lahir spontan tanggal 16 Agustus 2017Pukul 18.45 WITA dengan jenis kelamin perempuan

25. Lakukan penilaian sepintas, dengan menilai apakah bayi menangis kuat, bernafas tanpa kesulitan, bayi bergerak aktif dan bagaimana warna kulitnya.

Hasil : bayi lahir segera menangis, bernafas tanpa kesulitan, bergerak aktif dan kulit tubuh kemerahan.

26. Bersihkan dan keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks caseosa. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering dan biarkan bayi di atas perut ibu.

Hasil : bayi telah dibersihkan dan di keringkan

KALA III

Data Subyektif (S)

1. Ibu Merasa Lelah Setelah Melahirkan Dan Merasakan Nyeri Perut Bagian Bawah
2. Ibu mengatakn bahwa ari-arinya bayinya belum lahir

Data Obyektif (O)

1. Bayi lahir spontan segera menangis, tanggal 16 Agustus 2017Pukul 18.45 WITA,dengan jenis kelaminperempuan, BBL = 3100 gram, PBL = 49 cm, A/S = 8/10

2. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
4. Plasenta belum lahir
5. Kandung kemih ibu kosong

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : perlangsungan kala III

PLANNING (P)

1. Memeriksa kembali uterus ibu untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.
 Hasil : telah dilakukan dan tidak ada bayi lain lagi (tunggal)
2. Memberitahu ibu bahwa akan di suntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik.
 Hasil : ibu telah di beritahu dan ibu bersedia di suntik
3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).
 Hasil : oksitosin telah disuntikkan
4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dengan mendorong tali pusat kearah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
 Hasil : tali pusat telah diklem
5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi),

dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Hasil : tali pusat telah digunting

6. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Atau dilakukan penjepitan tali pusat dengan penjepit tali pusat.

Hasil : tali pusat telah di ikat dengan benang steril.

7. Letakkan bayi secara tengkurap di dada ibu agar ada kontak kulit ibu dan bayi, Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu.

Hasil : telah dilakukan

8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan bersih lalu pasang topi dikepala bayi.

Hasil : bayi dan ibu telah di selimuti dengan kain hangat dan bayi telah di pasangkan topi

9. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.

Hasil : klem telah di pindahkan

10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : telah dilakukan

11. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan

yang lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorso cranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversion uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : telah dilakukan dorongan dorso cranial

12. Melakukan peregang dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Hasil : telah dilakukan

13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil : plasenta telah lahir 5 menit setelah bayi lahir pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 16.50 wita

14. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras).

Hasil : telah dilakukan masase uterus

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap,

dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : plasenta lahir lengkap kotiledon dan selaput ketubannya.

16. Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : telah dilakukan, dan tidak terjadi laserasi pada perineum.

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : telah dilakukan, dan uterus berkontraksi dengan baik teraba bundar dan keras.

18. Biarkan bayi melakukan kontak kulit dengan ibu paling sedikit 1 jam

Hasil : telah dilakukan, dengan membiarkan bayi melakukan kontak kulit selam 1 jam.

19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Hasil : bayi telah di beri tetes mata/salep mata antibiotic profilaksis, dan telah di suntikkan vitamin K secara intramuskuler di paha kiri anterolateral.

- Hasil penimbangan/pengukuran

BBL= 3100 gram

PBL = 49 cm

LK = 33 cm

LD = 33 cm

LP = 30 cm

20. Setelah satu jam pemberian suntikkan vitamin K, lakukan penyuntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan antero lateral secara intramuscular.

Hasil : telah dilakukan penyuntikkan hepatitis B di paha kanan antero lateral secara intramuscular.

KALA IV

Data Subyektif (S)

1. Ibu Merasa Lelah Setelah Persalinannya
2. Ibu Merasa Senang dengan Kelahiran Bayinya
3. Ibu Mengeluh Nyeri Perut Bagian Bawah

Data Obyektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap
4. Ibu tampak kelelahan setelah proses persalinan
5. Konraksi uterus baik, teraba bundar dan keras

Assesment (A)

Diagnosa : Perlangsungan kala IV

Planning (P)

1. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam, 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, dan 30 menit pada jam kedua pasca persalinan

Hasil : telah dilakukan pemantauan dan tidak terjadi perdarahan pervaginam, serta kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras.

2. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil : telah dilakukan dan ibu mengerti yang diajarkan.

3. Mengevaluasi dan mengstimulasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan, dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

Hasil : Evaluasi Sedang Berlangsung

4. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan

Hasil :

| Jam | Waktu (Wita) | TD (mmHg) | N (x/i) | S (°C) | TFU | Kontraksi | Kandung kemih | Jumlah Perdarahan |
|-----|-----------------|--------------|------------|-----------|-----|-----------|------------------|----------------------|
| I | 19.05 | 130/90 | 88 | 36,8 | STP | Baik | Kosong | ± 50 cc |
| | 19.20 | 130/90 | 85 | | STP | Baik | Kosong | ± 50 cc |
| | 19.35 | 120/80 | 84 | | STP | Baik | Kosong | ± 30 cc |
| | 19.50 | 120/80 | 82 | | STP | Baik | Kosong | ± 20 cc |
| II | 20.20 | 120/80 | 80 | 37 | STP | Baik | Kosong | ± 30 cc |
| | 20.50 | 120/80 | 80 | | STP | Baik | Kosong | ±20 cc |

Tabel 3.5 Evaluasi Tanda-tanda vital pasca persalinan dan estimasi jumlah kehilangan darah (Sumber Data Primer)

5. Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 x/menit) serta suhu tubuh normal yaitu (36.5°C - 37.5°C)

Hasil : telah dilakukan pemeriksaan dan bayi bernafas normal dengan pernapasan 44x/menit dan suhu tubuh normal yaitu 36.8°C.

6. Tempatkan semua peralatan bekas pakai kedalam larutan klorin 0.5 % untuk didekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas setelah didekontaminasi.

Hasil : telah dilakukan, dan peralatan telah direndam dilarutan klorin untuk didekontaminasi.

7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi kedalam tempat sampah yang sesuai.

Hasil : telah dilakukan

8. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. dan bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dibersihkan, dan ibu telah memakai pakaian bersih dan kering.

9. Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, dan anjurkan keluarga untuk member ibu minuman dan makanan yang diinginkan.

Hasil : ibu telah merasa nyaman, ibu telah menyusui bayinya, dan ibu telah makan dan minum di bantu oleh keluarga.

10. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0.5 %

Hasil : telah dilakukan

11. Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0.5 %, dan buka secara terbalik dengan bagian dalam ke luar, lalu rendam dalam larutan klorin 0.5 % selama 10 menit.

Hasil : telah dilakukan

12. Cuci kedua tangan dengan sabun dibawah air mengalir dengan menggunakan teknik cuci tangan 7 langkah.

Hasil : telah dilakukan dan tangan telah di cuci.

13. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang)

Hasil : partograf telah di lengkapi.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaka dan studi kasus dalam penerapan proses asuhan kebidanan intranatal pada Ny'I' dengan Gowa tanggal 16 Agustus 2017. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dari asuhan yang nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah.

A. Langkah I identifikasi data dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang akurat dan ekonomis, yang disebut sebagai sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu ;Observasi, dimana pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi nafas), penciuman (bau nafas, bau luka), perabaan (suhu badan, nadi). Wawancara, dimana pembicaraan terarah yang umumnya

dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting di perhatikan adalah data yang ditanyakan di arahkan data yang relevan. Dan Pemeriksaan, dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan memakai instrument/alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka, irama kuantitas. Misalnya pengukuran tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter.

Data secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subyektif dan data obyektif. Pada waktu mengumpulkan data subyektif harus mengembangkan hubungan antar personal yang efektif dengan pasien/klien/ yang diwawancarai, lebih diperhatikan hal-hal yang menjadi keluhan utama pasien dan mencemaskan, berupa pendapatan data/fakta yang sangat bermakna dalam kaitan dengan masalah pasien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara, anamneses dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data meliputi: riwayat kesehatan, riwayat reproduksi: riwayat haid, riwayat obstetri, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi. Dan pemeriksaan fisik, yang meliputi keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil

pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kala I yang telah di dapatkan pada Ny''I'' dengan masalah aktual GIV PIII A0, gestasi 40 minggu 4 hari , intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I aktif penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus nyata , pada kasus Ny''I''di dapatkan data subjektif pada kala I Ibu mengeluh nyeri perut tembus belakang disertai adanya pelepasan lendir dan darah,sejak tanggal 16 Agustus 2017 pukul 07:00 wita, Hari pertama haid terakhir tanggal 12-11-2016, Hari tafsiran persalinan tanggal 19-08-2017 , Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan ,Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang, Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di puskesmas,ibu tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dari keluarga,ibu pernah menjadi akseptor kb suntik 3 bulan, dan ibu mengatakan ini merupakan kehamilan anaknya yang dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya, dan pada data objektif berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan di dapatkan hasil Usia gestasi 40 minggu 4 hari , Tanda-tanda vital, Tekanan darah 120/80 mmHg, Suhu 36,8 °C, Nadi 84x/ menit, Pernapasan 22x/m,dan pada saat di lakukan pemeriksaan fisik terfokus di dapatkan hasil pda pemeriksaan abdomen leopold 1(3 jrbpx ,32 cm,teraba bokong), leopold II (Puka), leopold III teraba kepala, leopold IV (BDP) ,dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam (VT 1) pada tanggal 16 Agustus 2017 pada jam di dapatkan hasil vulva dan vagina dalam keadaan normal , porsio menipis ,pembukaan 7cm, ketuban masih

utuh, presentase uuk kanan lintang penurunan hogde III kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir dan darah, Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam (VT II) pada tanggal 17 agustus di dapatkan hasil di dapatkan hasil vulva dan vagina dalam keadaan normal, porsio Melesap, pembukaan 10 cm, ketuban masih utuh, presentase di bawah syimpis, penurunan hogde IV kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir, air dan darah.

Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014 : 179).

Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 40 minggu 4 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279). Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin. (Baety, 2012 : 9).

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11)

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285). Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan denyut jantung janin(DJJ) yang teratur dan berada dalam batasan normal menandakan keadaan ibu dan janin baik, konjungtiva merah muda, hemoglobin 10,5 g/dl (Pantiawati dan Saryono, 2010 : 122).

Lendir dari canalis servikalis keluar di sertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapiler terputus (Dewi Setiawati, 2013: 54). His pembukaan (Kala I) : menyebabkan pembukaan serviks, semakin kuat, teratur dan sakit. Uterus terasa keras atau padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatik air ketuban dan tekanan intrauterine naik serta menyebabkan serviks menjadi mendatar (affacement) dan terbuka (dilatasi) (Widia, 2015: 23-24). Dilatasi serviks serviks 4-10 cm merupakan fase aktif, (Nurul, 2017: 5-6).

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kala II yang telah di dapatkan pada NY”I” dengan masalah aktual perlangsungan kala II, pada kasus NY”I” didapatkan data subjektif Ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran bersama dengan adanya kontraksi, adanya tekanan pada anus dan tampak perineum menonjol,

vulva dan sfingter ani membuka, serta meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur darah. Dan pada pemeriksaan tanda pasti kala II di tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina sedangkan teori menerangkan bahwa Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II adalah :

- h) Adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir porsio), ini terjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk kedalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga porsio membuka secara perlahan.
- i) His yang lebih sering dan kuat (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara *reflektoris* menimbulkan rasa mencedan.
- j) Adanya pengeluaran darah bercampur lendir, di sebabkan oleh adanya robekan serviks yang meregang.
- k) Pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam uterus dan diluar uterus sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi uterus akhirnya kantung ketuban pecah.
- l) Anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk kedasar panggul sehingga menekan rectum dan rasa buang air besar, hal inimenyebabkan anus membuka.

- m) Vulva terbuka, perineum menonjol, karena bagian terbawah janin yang sudah masuk PBP dan di tambah pula dengan adanya his serta kekuatan mengedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum bersifat elastic.
- n) Bagian terdepan anak kelihatan pada vulva, karena labia membuka, perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat divulva, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Widia, 2015: 129-130). Berdasarkan pegkajian yang di lakukakn pada NY "I" di kala II tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan perlangsungan kala III pada kasus Ny "I" didapatkan data subjektif ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah, dan pada data objektif didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 07 Juli 2017, jam 18:45 wita , kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri setinggi pusatperdarahan \pm 300 cc, kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva dan pada teori menjelaskan bahwa Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri.Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi.Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlengketan plasenta.Oleh karena tempat perlengketan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus (Ina Kuswanti, dkk 2014: 199).Berdasarkan pegkajian yang di

lakukakn pada Ny”I” di kala III tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Dan berdasarkan data pengkajian asuhan kebidanan pada kasus Ny”I” dengan perlangsungan kala IV didapatkan data subjektif ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah dan pada data objektif di dapatkan hasil kala III berlangsung ± 5 menit ,plasenta lahir lengkap tanggal 16 Agustus 2017 jam 18.50 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 200 cc dan kandung kemih kosong dan teori menjelaskan Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi wanita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam post partum). Dengan cara ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Dwi Asri,dkk 2012: 95).Berdasarkan pegkajian yang di lakukakn pada Ny “I” di kala IV tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

B. Langkah II identifikasi diagnosa/ masalah aktual

Dalam menegakkan suatu diagnosa kebidanan, didukung dan ditunjang oleh beberapa data, dan dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan.Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik.Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi

sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kala I yang telah didapatkan pada Ny'P' dengan masalah aktual GIV PIII A0, gestasi 40 minggu 4 hari, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I aktif penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus nyata, pada kasus Ny'P' didapatkan data subjektif pada kala I Ibu mengeluh nyeri perut tembus belakang disertai adanya pelepasan lendir dan darah, sejak tanggal 16 Agustus 2017 pukul 16:30 wita, Hari pertama haid terakhir tanggal 12-11-2016, Hari tafsiran persalinan tanggal 19-08-2017, Menurut ibu kehamilannya ± 9 bulan, Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang, Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di puskesmas, ibu tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dari keluarga, ibu pernah menjadi akseptor kb suntik 3 bulan, dan ibu mengatakan ini merupakan kehamilan anaknya yang dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya, dan pada data objektif berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan hasil Usia gestasi 40 minggu 4 hari, Tanda-tanda vital, Tekanan darah 120/80 mmHg, Suhu 36,8 °C, Nadi 84x/ menit, Pernapasan 22x/m, dan pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terfokus di dapatkan hasil pada pemeriksaan abdomen Leopold I (3 jrbpx, 32 cm, teraba bokong), Leopold II (Puka), Leopold III teraba kepala, Leopold IV (BDP), dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam (VT 1) pada tanggal 16 Agustus 2017 pada jam di dapatkan hasil vulva dan

vagina dalam keadaan normal , porsio menipis ,pembukaan 7cm, ketuban masih utuh,presentase uuk kanan lintang penurunan hogde III kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir dan darah , Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam (VT II) pada tanggal 17 agustus di dapatkan hasil di dapatkan hasil vulva dan vagina dalam keadaan normal , porsio Melesap ,pembukaan 10 cm, ketuban masih utuh,presentase di bawah syimpis ,penurunan hogde IV kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir,air dan darah.

Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae albayang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendor, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 40 minggu 4 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279). Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat.Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin.(Baety, 2012 : 9).

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesara perut sesuai dengan usia kehamilan.Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan

auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11)

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285). Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan denyut jantung janin (DJJ) yang teratur dan berada dalam batasan normal menandakan keadaan ibu dan janin baik, konjungtiva merah muda, hemoglobin 10,5 g/dl (Pantiawati dan Saryono, 2010 : 122).

Lendir dari canalis servikalis keluar di sertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapiler terputus (Dewi Setiawati, 2013: 54). His pembukaan (Kala I) : menyebabkan pembukaan serviks, semakin kuat, teratur dan sakit. Uterus terasa keras atau padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatis air ketuban dan tekanan intrauterine naik serta menyebabkan serviks menjadi mendatar (*affacement*) dan terbuka (dilatasi) (Widia, 2015: 23-24). Dilatasi serviks serviks 4-10 cm merupakan fase aktif, (Nurul, 2017: 5-6)

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kala II yang telah di dapatkan pada Ny”I” dengan masalah aktual perlangsungan kala II, pada kasus Ny”I” didapatkan data subjektif Ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran bersama dengan adanya kontraksi, adanya tekanan pada anus dan tampak perineum menonjol, vulva dan sfingter ani membuka, serta meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur darah. Dan pada pemeriksaan tanda pasti kala II di tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina sedangkan teori menerangkan bahwa Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II adalah :

- a. Adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir porsio), ini terjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk kedalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga porsio membuka secara perlahan.
- b. His yang lebih sering dan kuat (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara *reflektoris* menimbulkan rasa mencedan.
- c. Adanya pengeluaran darah bercampur lendir, di sebabkan oleh adanya robekan serviks yang meregang.
- d. Pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam uterus dan diluar uterus

sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi uterus akhirnya kantung ketuban pecah.

- e. Anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk kedasar panggul sehingga menekan rectum dan rasa buang air besar, hal ini menyebabkan anus membuka.
- f. Vulva terbuka, perineum menonjol, karena bagian terbawah janin yang sudah masuk PBP dan di tambah pula dengan adanya his serta kekuatan mengedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum bersifat elastic.
- g. Bagian terdepan anak kelihatan pada vulva, karena labia membuka, perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat divulva, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Widia, 2015: 129-130). Berdasarkan pegkajian yang di lakukakn pada NY”I” di kala II tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan perlangsungan kala III pada kasus NY”I” didapatkan data subjektif ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah, dan pada data objektif didapatkan dari hasil pemeriksan yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 07 Juli 2017, jam 18:45 wita , kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri setinggi pusatperdarahan \pm 300 cc, kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva dan pada teori menjelaskan bahwa Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri.Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran

bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Oleh karena tempat perlekatan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus (Ina Kuswanti, dkk 2014: 199). Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada NY"1" di kala III tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Dan berdasarkan data pengkajian asuhan kebidanan pada kasus NY"1" dengan perlangsungan kala IV didapatkan data subjektif ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah dan pada data objektif didapatkan hasil kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 16 Agustus 2017 jam 18.50 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 200 cc dan kandung kemih kosong dan teori menjelaskan Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi wanita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam post partum). Dengan cara ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Dwi Asri, dkk 2012: 95). Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada NY"1" di kala IV tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

C. Langkah III antisipasi diagnosa/ masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap – siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar – benar terjadi .

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnosa/masalh potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman.

Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I yaitu terjadinya kala I lama, peningkatan atau penurunan tanda-tanda vital, DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali/menit, terjadinya perdarahan pervaginam selain dari lendir dan darah, ketuban pecah yang bercampur dengan mekonium kental yang di sertai dengan tanda gawat janin, kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung kurang dari 20 detik serta tidak di temukan perubahan serviks dalam 1-2 jam, pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf. Dan berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada NY”I” tidak di dapatkan data penunjang terjadinya diagnosa potensial dimana pada kasus NY”I” didapatkan data

objektif berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan di dapatkan hasil Usia gestasi 40 minggu 4 hari , Tanda-tanda vital, Tekanan darah 120/80 mmHg, Suhu 36,8 °C, Nadi 84x/ menit, Pernapasan 22x/ m, dan pada saat di lakukan pemeriksaan fisik terfokus di dapatkan hasil pda pemeriksaan abdomen leopold I(3 jrbpx ,32 cm,teraba bokong), leopold II (Puka), leopold III teraba kepala, leopold IV (BDP), DJJ 140X/m ,dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam (VT 1) pada tanggal 16 Agustus 2017 pada jam di dapatkan hasil vulva dan vagina dalam keadaan normal , porsio menipis ,pembukaan 7cm, ketuban masih utuh,presentase uuk kanan lintang penurunan hogde III kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir dan darah , Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaaan dalam (VT II) pada tanggal 17 agustus di dapatkan hasil di dapatkan hasil vulva dan vagina dalam keadaan normal , porsio Melesap ,pembukaan 10 cm, ketuban masih utuh,presentase di bawah syimpis ,penurunan hogde IV kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir,air dan darah.

Dan pada teori mengatakan adapun Indikasi – indikasi untuk melakukan tindakan dan/atau rujukan segera selama kala I persalinan:

- b. Perdarahan pervaginam selain dari lender bercampur darah (“*show*”)
- c. Kurang dari 37 minggu (persalinan kurang bulan)
- d. Ketuban pecah disertai dengan keluarnya mekonium kental.
- e. Ketuban pecah bercampur dengan sedikit mekonium disertai tanda-tanda gawat janin
- f. Ketuban telah pecah (lebih dari 24 jam) atau ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan (usia kehamilan kurang 37 minggu).

- g. Tanda-tanda atau gejala-gejala infeksi : temperature tinggi $>38^{\circ}\text{C}$, menggigil, nyeri abdomen, cairan ketuban yang berbau.
- h. Tekanan darah $>160/100$ dan/ atau terdapat protein urin.
- i. Tinggi fundus 40 cm atau lebih.
- j. DJJ <100 atau >180 x/menit pada dua kali penilaian dengan jarak 5 menit.
- k. Primipara dalam persalinan fase aktif dengan palpasi kepala janin masih 5/5.
- l. Presentasi bukan belakang kepala (sungsang, letak lintang, dll).
- m. Presentasi ganda/majemuk (adanya bagian janin, seperti lengan atau tangan, bersamaan dengan presentasi belakang kepala).
- n. Tali pusat menumbung (jika tali pusat masih berdenyut)
- o. Tanda dan gejala syok :
 - 8) Nadi cepat, lemah (lebih dari 110 x/menit)
 - 9) Tekanan darahnya rendah (sistolik kurang dari 90 mmHg)
 - 10) Pucat
 - 11) Berkeringat atau kulit lembab, dingin
 - 12) Napas cepat (lebih dari 30 x/menit)
 - 13) Cemas, bingung atau tidak sadar
 - 14) Produksi urin sedikit (kurang dari 30 ml/jam)
- p. Tanda dan gejala persalinan dengan fase laten yang memanjang :
 - 1. Pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam
 - 2. Kontraksi teratur (lebih dari 2 dalam 10 menit)

q. tanda dan gejala belum inpartu :

- 1) Kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit, berlangsung kurang dari 20 detik
- 2) Tidak ada perubahan serviks dalam waktu satu sampai dua jam.

r. Tanda dan gejala partus lama :

1. Pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada
2. Pembukaan serviks kurang 1 cm per jam
3. Kurang dari dua kontraksi dalam waktu 10 menit, masing-masing berlangsung kurang 40 detik (Ibnu Pranoto, dkk 2014: 77).). Berdasarkan pegkajian yang di lakukakn pada NY "I" di kala I tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu, terjadinya kala II lama yang di sertai dengan partus macet/kasep, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan, pada kasus NY" I" tidak di dapatkan data penunjang terjadinya diagnosa potensial tersebut dimana pada kasus NY "I" bayi lahir spontan tanggal 16 Agustus 2017, jam 18.45 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) , tinggi fundus uteri setinggi pusat, tali pusat masih nampak di vulva.

Dan pada teori dikatakan bahwa distosia bahu (bahu macet) yaitu kelahiran kepala janin dengan bahu anterior macet di atas simfisis pubis dan tidak dapat masuk

melalui pintu bawah panggul, bahu menjadi tidak dapat digerakkan. Bahu posterior juga dapat macet di atas promotorium sacral, walau pun jarang terjadi. Distosia bahu umumnya terjadi pada bayi yang makrosomia, yakni suatu keadaan yang ditandai oleh ukuran badan bayi yang relative lebih besar dari ukuran kepala dan bukan semata-mata berat bayi yang >4000 gram (Lailiyana, dkk, 2012: 62-63). Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada NY "T" di kala II tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Pada manajemen aktif Kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan pervaginam dikarenakan terjadinya laserasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir. Pada kasus NY "T" tidak terdapat data yang menunjang terjadinya diagnosa potensial tersebut dimana pada kasus NY "I" didapatkan data objektif yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 07 Juli 2017, jam 18:45 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri setinggi pusat perdarahan ± 300 cc, kala II berlangsung selama ± 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva dan pada teori mengatakan dikatakan Atonia Uteri apabila gagal berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Pada kondisi tertentu, otot rahim tersebut tidak mampu berkontraksi atau walaupun ada, kontraksi tersebut kurang kuat. Akibatnya perdarahan yang terjadi dari tempat implantasi plasenta tidak akan berhenti sehingga kondisi tersebut sangat membahayakan ibu. Robekan perineum terjadi hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Akan tetapi, hal tersebut dapat dihindari

atau dikurangi dengan cara mencegah kepala janin melewati dasar panggul dengan cepat.

Dan dikatakan retensio plasenta apabila keadaan plasenta yang tertahan atau belum lahir hingga melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir. Plasenta biasanya terlepas dari tempat implantasinya pada keadaan normal 15 menit setelah bayi lahir. Penyebab dari Retensio Plasenta yaitu :

- 3) Plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tubuh terlalu melekat lebih dalam. Berdasarkan tingkat perlekatannya, kondisi plasenta menjadi :
 - a. Plasenta adhesif, yang melekat pada desidua endometrium lebih dalam.
 - b. Plasenta akreta, imlantasi jorjot korion memasuki sebagian miometrium.
 - c. Plasenta inkreta, implantasi menembus hingga miometrium.
 - d. Plasenta parkreta, menembus sampai serosa atau peritoneum dinding rahim.
- 4) Plasenta telah lepas, tetapi belum keluar karena :
 - a. Atonia uteri, yang dapat menyebabkan perdarahan.
 - b. Terdapat lingkaran kontraksi pada bagian rahim akibat kesalahan penanganan kala III sehingga menghalangi plasenta untuk keluar (plasenta inkarserata)

Perdarahan yang telah di jelaskan sebelumnya umumnya terjadi akibat pembekuan darah intravascular merata dan kelainan bawaan pada mekanisme pembekuan darah. Penyakit kelainan pembekuan darah seperti amfibrinogenemia atau hipofibrinogenemia sangat membahayakan jiwa ibu, bila tidak cepat di tangulangi (Nurul Jannah, 2017: 151-156).). Berdasarkan pegkajian yang di

lakukakn pada NY “I” di kala III tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Dan pada Kala IV persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-tanda vital melawati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kontraksi uterus yang tidak baik pada kasus NY”I” di dapatkan data objektif berdasarkan pemeriksaan di dapatkan hasil kala III berlangsung ± 5 menit ,plasenta lahir lengkap tanggal 16 Agustus 2017 jam 18.50 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 200 cc dan kandung kemih kosong sedangkan pada pada teori dikatakan Perdarahan apabila darah yang keluar lebih dari 500 cc, kontraksiuterus tdak baik apabila kontraksi uterus lembek tidak teraba keras dan bundar ,suhu dikatakan meningkat apabila suhu > 37.5 derajat celcius (Widia, 2015: 239)). Berdasarkan pegkajian yang di lakukakan pada NY “I” di kala IV tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

D. Langkah IV identifikasi perlunya tindakan segera/ kolaborasi dan rujukan

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan .

Pada kasus NY”T” tidak didapatkan data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi.

E. Langkah V rencana tindakan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Rencana yang dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang *up to date* serta *evidence based* terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Adapun penatalaksanaan yang diberikan pada NY”T” Dengan persalinan normal yaitu, memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan apakah persalinan dalam kemajuan yang normal, memeriksa perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinan, membantu ibu memahami apa yang sedang terjadi sehingga ia berperan serta aktif dalam menentukan asuhan. Membantu keluarga dalam merawat ibu selama persalinan, menolong kelahiran dan memberikan asuhan pasca persalinana dini, dan mengenali masalah secepatnya dan mengambil keputusan yang tepat guna dan tepat waktu (efektif dan efisien).

Perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan pada NY”I” juga dapat berupa, pemantauan terus menerus kemajuan persalinan menggunakan partograf, pemantauan TTV ibu dan keadaan janin, memenuhi kebutuhan nutrisi dan dehidrasi ibu, menganjurkan ibu perubahan ambulasi dan posisi ibu, menganjurkan tindakan yang memberikan pada rasa nyaman, serta menganjurkan keluarga memberi dukungan dan do’a serta menganjurkan ibu untuk senantiasa berdo’a kepada Allah dan memperbanyak istigfar agar persalinannya berjalan lancar dan bayinya lahir dengan selamat dalam sebuah hadist yang mengatakan bahwa “ Barang siapa yang Memperbanyak Istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesusahan dan kesempitan, dan Allah juga akan mendatangkan kepadanya rezeki dari arah yang tak di sangka-sangka.”(HR Ahmad) (maria hidayah,2014:64). Dan sebuah penelitian yang di lakukan oleh irma nur baeti di dapatkan bahwa Dzikrullah efektif menurunkan tingkat kecemasan dan nyeri persalinan pada ibuprimigravida selama proses persalinan. Ibu primigravida yang dilakukan intervensi dzikir mengalami kecenderungan mengalami kecemasan ringan dalam menghadapi proses kelahiran bayi, sedangkan ibu primigravida yang tidak dilakukan terapi dzikir cenderung mengalami kecemasan sedang Serta terjadi kecenderungan penurunan intensitas nyeri persalinan dalam menghadapi proses kelahiran bayi (Irma Nurbaeti, 2015:36).

Menganjurkan ibu untuk makan kurma, dalam surah Maryam menjelaskan tentang kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas dan dalam persalinan karna ia muda di cerna, lezat dan mengandung kalori

yang tinggi serta dalam sebuah kisah rasulullah selalu makan tujuh buah kurma “ajwa” (matang). Rasulullah bersabda “barang siapa yang makan tujuh butir kurma, maka akan terlindung dari racun.” Dan terbukti ketika seorang wanita yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah dalam sebuah percobaan pembunuhan di perang khaibar, racun yang tertelan oleh beliau kemudian bisa dinetralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma. Bisyr ibnu al Barra’, salah seorang sahabat yang ikut makan racun tersebut akhirnya meninggal (maria hidayah, 2014:35). dan hasil penelitian, didapatkan untuk lama persalinan kala 1 pada kelompok kontrol didapatkan nilai rerata lama persalinan sebesar 930,00 menit, waktu terendah sebesar 855 menit, waktu terlama sebesar 990 dan standar deviasi sebesar 50,49. Untuk lama persalinan kala 1 pada kelompok eksperimen didapatkan nilai rerata lama persalinan sebesar 787,14 menit, waktu terendah sebesar 630 menit, waktu terlama sebesar 980 dan standar deviasi sebesar 125,36. Dari hasil uji statistik Mann-whitney didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,035 yang berarti bahwa pemberian ekstrak kurma muda efektif untuk mempercepat proses kala I persalinan (Nanik Nur Rosyidah dan Bd Kiftiyah,2017: 121)

Dan melakukan masase punggung di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aryani. Pijat punggung yang dimulai di bagian luar dari serviks-7 ke sisi tulang rusuk dapat mengaktifkan serabut saraf untuk menutup bagian pembawa gerbang Rasa sakit dibawa oleh serabut saraf lainnya, sehingga membatasi penyampaian sensasi kedalam korteks serebral dan penyebabnya Rasa sakit berkurang (Mariza

Mustika Dewi dkk, 2015: 5-6).Setelah data dari penelitian yang dilakukan oleh wiwin dkk, yang dilaksanakan di Puskesmas Magelang Selatan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pijat punggung memberikan pengaruh yang baik terhadap adaptasi nyeri persalinan. Wanita yang bisa beradaptasi dengan nyeri persalinan dapat lebih mudah menjalani proses persalinan terutama pada kala II sehingga proses pengeluaran bayi bisa lebih cepat dan menghilangkan kecemasan yang dapat memengaruhi perfusi jaringan (Wiwin Renny Rahmawati dkk, 2013: 209).

Menganjurkan ibu untuk mendengarkan musik klasik mamfaat musik kalsik menurut Djohan dalam Setyaningsih, 2009, yaitu sebagai *audioanalgesic* atau penenang, focus perhatian atau mengatur latihan, meningkatkan hubungan antara terapis dan klien, memperkuat proses belajar, mengatur kegembiraan dan interaksi personal yang positif, sebagai penguat ataupun nara untuk kesehatan dalam hal keterampilan fisiologis, emosi dan gaya hidup, mereduksi stress pada pikiran dan kesehatan tubuh. Penelitian ini didukung oleh penelitian Diah Eko (2011) tentang pengaruh terapi musik terhadap respon nyeri, tanda-tanda vital ibu bersalin kala I fase aktif di RS Muhammadiyah Lamongan.

menganjurkan ibu untuk mendengarkan murottal al- Qur'an , Murottal merupakan salah satu musik yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya (Widayarti, 2011). Terapi murottal dapat mempercepat penyembuhan, hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Ahmad Al Khadi direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research* di Florida, Amerika

Serikat. Dalam konferensi tahunan ke XVII Ikatan Dokter Amerika, dengan hasil penelitian bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh alat berbasis komputer, Peneliti menilai, hanya dengan pembacaan Al-Qur'an saja dapat membuat efek yang baik bagi tubuh, terlebih lagi jika pembacaan Al-Qur'an tersebut diperdengarkan dengan irama yang stabil dan dilakukan dengan tempo yang lambat serta harmonis, maka akan memunculkan ketenangan bagi pendengarnya dan dapat dijadikan penyembuh baik dari gangguan fisik maupun psikis. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara tidak langsung terapi murottal Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai penyembuh sakit seperti yang dikatakan oleh Wahyudi (2012), bahwa Al-Qur'an sebagai penyembuh telah dilakukan dan dibuktikan, orang yang membaca Al-Qur'an atau mendengarkan akan memberikan perubahan arus listrik di otot perubahan sirkulasi darah, perubahan detak jantung dan perubahan kadar darah pada kulit (Rohmi Handayani dkk, 2014:3).

F. Langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Semua rencana telah dilaksanakan seluruhnya dengan memberi makan kurma pada ibu, perdengarkan murottal AL-Qur'an, menganjurkan ibu membaca istigfar dan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017 di puskesmas jumpandang baru Makassar . Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan hambatan, karena adanya

kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek.

G. Langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan kepada Ny'I'di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tanggal 16 Agustus 2017 yaitu pada kala I berlangsung tidak lebih dari 7 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi.

Selanjutnya yaitukala IIjuga berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi lahir spontan tanggal 16 Agustus 2017, jam 18 :45 wita, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan serta bergerak aktif. Pada kala III, tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung ± 5 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 16 Agustus 2017, jam 50 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan ± 150 cc, kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar, serta keadaan ibu dan bayi baik. Terakhir yaitu kala IV atau kala pengawasan, pada kala IV kontraksi uterus baik uterus t' keras dan bundar, jumlah perdarahan ± 200 cc, kandung kemih kosong dan keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari kala I sampai dengan kala IV, semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin.Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui kasus tentang manajemen asuhan intranatal pada Ny”I” Gestasi 37-44 minggu dengan presentase belekang kepala di Puskesmas Jumpandang Baru baru makassar tanggal 16 Agustus 2017 maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran

A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 16 agustus 2017, maka ditemukan bahwa tidak ada penyulit bagi Ibu maupun janin dan keadaan ibu dan janin baik.
2. Diagnosa Ny “I” dengan Asuhan Persalinan Normal ditegakkan berdasarkan adanya keluhan yaitu nyeri pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, yang disertai dengan adanya pelepasan lendir bercampur dengan darah, dan sifat nyeri yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan kuat, serta pada pemeriksaan dalam di dapatkan pembukaan serviks 8 cm.
3. Pada Ny “I” masalah yang mungkin muncul yaitu pada kala I kemungkinan terjadinya infeksi jalan lahir, pada kala II yaitu terjadinya kala II lama, pada kala III persalinan kemungkinan masalah yang bisa terjadi yaitu terjadinya

retensio plasenta, dan pada kala IV kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu kontraksi uterus yang kurang baik.

4. Pada Ny “I” diperlukan tindakan segera, kolaborasi atau rujukan apabila terjadi masalah dalam persalinan tersebut.
5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny “I” dilakukan agar ibu mendapatkan penanganan yang bersih dan aman, sesuai dengan kondisinya dan mencegah terjadinya komplikasi serta mencegah terjadinya trauma berat pada ibu dan bayinya.
6. Tindakan yang dilakukan agar rencana yang disusun tercapai dengan adanya kerjasama antara bidan dengan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pasien.
7. Tindakan evaluasi pada Ny “I” dengan Asuhan Persalinan Normal telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.
8. Pendokumentasian dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017 di Puskesmas Jumpang Baru. Pengkajian dilakukan mulai dari pasien datang sampai proses persalinan dari Kala I-IV persalinan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Saran untuk bidan

- a. Bidan dalam memberikan asuhan harus sesuai kewenangannya, untuk itu manajemen asuhan kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang membantu seorang bidan dalam memecahkan masalah klien dalam berbagai situasi.
- b. Dalam melaksanakan asuhan kebidanan, bidan harus selalu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi, guna mencegah terjadinya infeksi pada ibu, juga perlindungan bagi diri sendiri serta menggunakan asuhan sayang ibu.
- c. Diharapkan seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya disiplin waktu dalam memberikan asuhan kepada klien.
- d. Diharapkan seorang bidan untuk meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat membuat novasi-inovasi pertolongan persalinan terbaru yang dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu.

2. Saran untuk Puskesmas Jumpandang Baru

Sebaiknya pihak Puskesmas Jumpandang Baru, lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin secara optimal melalui penanganan yang cepat dan tepat serta membuat inovasi – inovasi pertolongan yang baru sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu .

3. Saran untuk institusi

Adapun saran untuk institusi yaitu:

- a. Menyediakan tenaga pengajar yang professional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
- b. Perlu peningkatan pembelajaran tentang persalinan normal agar mahasiswa dapat membuat inovasi-inovasi ilmu pertolongan persalinan normal yang terbaru sehingga dapat mengurangi angka kesakitan maupun kematian ibu.

4. Saran untuk klien

Adapun saran untuk klien yaitu:

- a. Setiap ibu hamil harus melaksanakan persalinannya dengan aman baik dari segi penolong, tempat, ataupun peralatan kesehatan yang diperoleh dengan melakukan persalinan di rumah sakit, puskesmas, BPS, ataupun klinik dokter.
- b. Diharapkan kepada ibu untuk segera ber KB
- c. Perlunya dukungan dan keterlibatan suami atau anggota keluarga dalam masa nifas merupakan interaksi terus-menerus yang bersifat saling mencintai, pemenuhan keutuhan emosional dan saling membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya Semarang : Cv.Toha Putra 2015
- Asri, Dwi dan Cristine Clervo P. *Asuhan Persalinan Normal Plus Contoh Askebdan Patologi Persalinan*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.
- Baety, Aprilia Nurul. *Kehamilan dan persalinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Elisabeth. S.W. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : Pustakabarupress. 2015.
- Dewi Mariza Mustika dkk. Effectiveness Of Endorphins Massage And Ice Packs To Relieve The First Stage Of Labor Pain Among ThePregnant Women In Candimulyo Health Center,Indonesia, semarang: 2nd International Conference On Applied Science And Health *Research For Better Society: Developing Science And Technology To Improve Health And Well-Being*
- Handayani Rohmi dkk, *Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Untuk Penurunan Nyeri Persalinan Dan Kecemasan Pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif*. 2 Bidan Prada : Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 5 No. 2 Edisi Desember 2014, hlm. 1-15.
- Hidayah maria, *keajaiban bangun pagi*. Yogyakarta: Abata Press, 2014.
- Ilmiah, WidiaShofa. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2015.
- JNPK-KR. *Asuhan Persalinan Normal*. 2012.
- Jannah, Nurul. *ASKEB II Persalinan Berbasis Kometensi*, Jakarta : ECG, 2017
- Kuswanti, Ina., Fitria Melina, *Askeb II Persalinan* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kementrian kesehatan RI,Profil kesehatan indonesia tahun 2015,jakarta: kementrian kesehatan RI, 2016.
- Kementrian Kesehatan RI, profil kesehatan provensi sulawesi selatan tahun 2014, makassar: kementrian kesehatan 2015
- Kusmindarti, Indah.,Kholifah.” *Faktor Dominan Penyebab Kehamilan Risiko Tinggi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto*”jurnal penelitian

kesehatan, volume 12 NO 2.
<http://ejournal.stikesppni.ac.id/index.php/JKS/article/view/203> (diakses tanggal 5 Mei 2017)

- Maru, Abdurrahman Suleiman, dkk “ *Exploring challenges in decreasing maternal mortality in Africa with respect to failure to achieve Millennium Development Goals (MDGs) year 2016* “. *Journal of Research in Nursing and Midwifery*. Vol. 5 no. 3 (September, 2016). <http://www.interestjournals.org/full-articles/exploring-challenges-in-decreasing-maternal-mortality-in-africa-with-respect-to-failure-to-achieve-millennium-development-goals-mdgs.pdf?view=inline>. (Diakses tanggal 18 Juni 2017)
- Miswani. MS. *Hypnobirthing Melahirkan Tanpa Rasa Sakit dan Tinjauannya Dalam Islam*. Alauddin University Press. 2013
- Nuraisah. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Jakarta : Refika Aditama. 2014
- Nuraisah. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Jakarta : Refika Aditama. 2014
- Naomi, *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : In Medika, 2013
- Nurbaeti Irma. *Efektivitas Dzikirullah Terhadap Penurunan Kecemasan Dan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Ibu Primigravida (The Effectiveness Of Dhikr Toward Decreasing Anxiety And Labor Pain During Active Phase Of First Stage Among Primigravida)*, *Jurnal Ners* Vol. 10 No. 1 April 2015.
- Pantiawati dan Saryono. *Asuhan Kebidanan I (kehamilan)*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2010.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Purwandari Atik, dkk. “ *Studi Kasus Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny. D.N Dengan Persalinan Normal di Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado Tahun 2014* “. *Jurnal Ilmiah Bidan*. Vol 2 no. 1 (Januari – Juni 2014). <http://ejournal.poltekkesmanado.ac.id/index.php/jib/article/view/219.pdf> (Diakses tanggal 17 Juni 2017).
- Rahmawati Wiwin Renny dkk, *Pengaruh Pijat Punggung terhadap Adaptasi Nyeri Persalinan Fase Aktif Lama Kala II dan Perdarahan Persalinan pada Primigravida The Influence of Back Massage toward the Decrease of Labor Pain in Active Phase Length of Stage II and Labor Bleeding in Primigravida*, Semarang: Program Studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, 2013.

Rosyidah, nur nanik dan Kiftiyah. *Efektivitas Pemberian Ekstrak Kurma Muda Terhadap Percepatan Kala I Persalinan* , Jurnal keperawatan dan Kebidanan 2015.

Tobing Hendri P. L. dan Safrina, *Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Intensitas Nyeri Pada Ibu Primigravida Kala I Fase Aktif Persalinan, pematang siantar: Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Volume VIII Nomor 1, Januari 2017*ISSN 2086-3098 (p) -- ISSN 2502-7778 (e)

Sujiyatini. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2010.

Setiawati, Dewi. *KehamilandanPemeriksaanKehamilan*,Makassar :Alauddin University Press, 2013.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta :LenteraHati, 2002.

Sulistiyawati, A. *Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan*. Jakarta : Salemba Medika, 2013.

Varney, Helen dkk, *Buku Saku Bidan*, 2001. *Varney's pocket midwife* , ed. Alfrina Hany. Jakarta: EGC, 2002

Yani Dian Puspita, Dewi Triloka Wulandari. *"Pengaruh Pemberian Asuhan Sayang Ibu Bersalin Terhadap Lama Persalinan Kala Ii Primipara"* JURNAL EDU HEALTH, VOL. 4 NO. 1, APRIL 2014

CATATAN PERSALINAN

- Tanggal : 16 Agustus 2017
- Nama bidan :
- Tempat Persalinan :
 - Rumah Ibu Puskesmas
 - Polindes Rumah Sakit
 - Klinik Swasta Lainnya :
- Alamat tempat persalinan :
- Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
- Alasan merujuk :
- Tempat rujukan :
- Pendamping pada saat merujuk :
 - Bidan Teman
 - Suami Dukun
 - Keluarga Tidak ada

KALA I

- Partogram melewati garis waspada : Ya
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah tsb :
- Hasilnya :

KALA II

- Episiotomi :
 - Ya, indikasi
 - Tidak
- Pendamping pada saat persalinan
 - Suami Teman Tidak ada
 - Keluarga Dukun
- Gawat Janin :
 - Ya, tindakan yang dilakukan
 -
 -
 -
 - Tidak
- Distosia bahu :
 - Ya, tindakan yang dilakukan
 -
 -
 -
 - Tidak
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

KALA III

- Lama kala III : 35 menit
- Pemberian Oksitosin 10 U im ?
 - Ya, waktu : 1 menit sesudah persalinan
 - Tidak, alasan
- Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 - Ya, alasan
 - Tidak
- Penegangan tali pusat terkendali ?
 - Ya
 - Tidak, alasan

- Mesase fundus uteri ?
 - Ya
 - Tidak, alasan
- Plasenta lahir lengkap (intact) Ya Tidak
 - Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 -
 -
 -
- Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya Tidak
 - Ya, tindakan :
 -
 -
 -
- Laserasi :
 - Ya, dimana
 - Tidak
- Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 - Tindakan :
 - Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 - Tidak dijahit, alasan
- Atoni uteri :
 - Ya, tindakan
 -
 -
 -
 - Tidak
- Jumlah perdarahan : ± 200 ml
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

- Berat badan 3.600 gram
- Panjang 49 cm
- Jenis kelamin : L
- Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
- Bayi lahir :
 - Normal, tindakan :
 - mengeringkan
 - menghangatkan
 - rangsang taktil
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - Asfiksia ringan/pucat/biru/lemas/tindakan :
 - mengeringkan bebaskan jalan napas
 - rangsang taktil menghangatkan
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - lain - lain sebutkan
 - Cacat bawaan, sebutkan :
 - Hipotermi, tindakan :
 -
 -
 -
- Pemberian ASI
 - Ya, waktu : 15 menit setelah bayi lahir
 - Tidak, alasan
- Masalah lain, sebutkan :
- Hasilnya :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

| Jam Ke | Waktu | Tekanan darah | Nadi | Tinggi Fundus Uteri | Kontraksi Uterus | Kandung Kemih | Perdarahan |
|--------|-------|---------------|-------|---------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 14.05 | 130/90 mmHg | 88x/1 | 56,8i | STP | baik | Kosong ± 50 cc |
| | 14.20 | 150/90 mmHg | 85x/1 | | STP | baik | Kosong ± 50 cc |
| | 14.35 | 120/80 mmHg | 82x/1 | | STP | baik | Kosong ± 80 cc |
| | 14.50 | 120/80 mmHg | 82x/1 | | STP | baik | Kosong ± 20 cc |
| 2 | 20.20 | 120/80 mmHg | 80x/1 | 37,1i | STP | baik | Kosong ± 30 cc |
| | 20.50 | 120/80 mmHg | 80x/1 | | STP | baik | Kosong ± 20 cc |

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penelitian

Nama : **Ira Ayu Lestari**
Nim : 70400114072
T.T.L : Bantaeng, 06 November 1996
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Borong Kapala, Desa Pattalassang, Kec.
Tompobulu Kab. Bantaeng

Nama Orang Tua

a. Ayah : Abd. Rahim
b. Ibu : Rosmiati

B. Riwayat Pendidikan

Mis Ma'arif Borong Kapala : 2002-2007
Mts Ma'arif Banyorang : 2007-2010
SMA Negeri 2 Bantaeng : 2010-2013.
UIN Alauddin Makassar : 2014-2017