

**ANALISIS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETIL ASETAT KULIT BUAH
NAGA MERAH (*Hylocereus polyrhizus*) DENGAN
METODE DPPH (1,1 difenil-2-pikrilhidrazil)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

RHIDNA SULISTIAWATI AMRA

NIM: 60500110037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhidna Sulistiawati Amra
NIM : 60500110037
Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/ 9 Juni 1992
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/Kimia
Alamat : Jl. BTN Minasaupa Blok F11/No.4
Judul : Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah
(*hylocereus polyrhizus*) Dengan Metode DPPH (1,1 difenil-
2-pikrilhidrazil)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2014

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Rhidna Sulistiawati Amra

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Dari Kulit Buah Naga Merah (*hylocereus polyrhizus*) Dengan Metode DPPH (*1,1 difenil-2-pikrilhidrazil*).” yang disusun oleh Rhidna Sulistiawati Amra, NIM : 60500110037, Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Kamis, tanggal 4 Desember 2014 M, bertepatan dengan 11 Shafar 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 4 Desember 2014 M

11 Shafar 1436 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd (.....)
Sekretaris : Dr. Ir. A. Suarda, M.Si (.....)
Munaqisy I : Syamsidar HS, ST., M.Si (.....)
Munaqisy II : Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si (.....)
Munaqisy III : Saharuddin, S.Ag., M.Ag (.....)
Pembimbing I : Dra. Sitti Chadijah, M.Si (.....)
Pembimbing II : Aisyah, S.Si., M.Si (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
Nip. 19711204 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Dari Kulit Buah Naga Merah (*hylocereus polyrhizus*) Dengan Metode DPPH (1,1 difenil-2-pikrilhidrazil).” Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan sahabatnya yang merupakan suritauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Kedua orang tua penulis ayahanda H. Ambo Rappe dan ibunda Hj. Ratnawati yang selalu memberikan dukungan material dan moril kapan saja penulis butuhkan serta doa dan kesabarannya yang rela mengorbankan seluruh kemampuannya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Rasa terima kasih tak akan pernah cukup untuk ayahanda dan ibunda tercinta. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan-Nya.
3. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Kimia dan sebagai Penguji II serta Ibu Syamsidar HS, S.T., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Kimia

dan sebagai Penguji I yang berkenan memberikan kritik dan saran kepada penulis.

5. Ibu Dra. St. Chadijah, M.Si, selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penelitian berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si, selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penelitian berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Saharuddin, S.Ag., M.Ag selaku penguji III yang berkenan memberikan kritik dan saran bagi penulis.
8. Segenap Dosen Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
10. Kakak Laboran (Fitria Azis, S.Si., S.Pd, Andi Nurahma, S.Si, Ahmad Yani, S.Si, Awaluddin Iwan Perdana, S.Si dan Ismawanti, S.Si) yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran dalam penelitian.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Kimia Angkatan 2010 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar serta teman-teman KKN Reguler Angkatan 49 UIN Alauddin Makassar Kelurahan Tetebatu.
12. Rekan penelitian Dewi Sartika dan Nurfadillah yang senantiasa membantu dan menemani penulis dari awal hingga penyusunan skripsi ini.
13. Keempat saudaraku, Nizwar Amra, Try Harry Muliana Amra, Muh. Ryas Amra dan Nurazizah Amra atas segala doa dan kesabaran menghadapi tingkah laku penulis pada saat penyusunan skripsi ini.

14. Kepada kakanda Darwis S,Pd yang selalu setia memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Kepada Senior dan Junior yang setia memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata Penulis, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan bagi pembaca umumnya

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Makassar, Desember 2014

Penulis

Rhidna Sulistiawati Amra



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	Hal
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii-v
DAFTAR ISI.....	vi-vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x-xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7-21
A. BUAH NAGA.....	7
1. JENIS-JENIS BUAH NAGA.....	7
2. KLASIFIKASI BUAH NAGA MERAH.....	10
3. KANDUNGAN BUAH NAGA MERAH.....	10
B. ANTIOKSIDAN	12
C. MASERASI	14
D. EKSTRAKSI CAIR-CAIR	15
E. KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS	16
F. METODE DPPH.....	17
G. SPEKTROFOTOMETER UV-VIS.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	22-25
A. WAKTU DAN TEMPAT	22
B. ALAT DAN BAHAN.....	22
C. PROSEDUR PENELITIAN.....	22-24
D. ANALISIS DATA	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. HASIL PENELITIAN.....	26-30
B. PEMBAHASAN.....	30-37
BAB V PENUTUP.....	38
A. KESIMPULAN.....	38
B. SARAN.....	38
KEPUSTAKAAN	39-42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	43-64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kandungan Buah Naga Merah	11
Tabel 4.1. Hasil Ekstraksi Cair-Cair Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah.....	27
Tabel 4.2. Hubungan Antara Konsentrasi dengan Peredaman Radikal Bebas (%)	30
Tabel 4.3. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah (<i>Hylocereus Polyrhizus</i>).....	34



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Buah Naga Daging Putih.....	7
Gambar 2.2. Buah Buah Naga Daging Merah	8
Gambar 2.3. Buah Naga Daging Super Merah	8
Gambar 2.4. Buah Naga Daging Putih Kulit Kuning.....	9
Gambar 2.5. Struktur Betacyanin.....	13
Gambar 2.6. Stuktur Kimia DPPH.....	17
Gambar 2.7. Reduksi DPPH Dari Senyawa Peredam Radikal Bebas.....	18
Gambar 2.8. Mekanisme Reaksi DPPH.....	19
Gambar 4.1. Ekstrak Kental Hasil Maserasi.....	26
Gambar 4.2. Ekstrak Kental Hasil Ekstraksi Cair-Cair.....	27
Gambar 4.3. Uji Warna Kulit Buah Naga Merah.....	29
Gambar 4.4 Hasil KLT Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah.....	29
Gambar 4.5 Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Dengan % Peredaman	30
Gambar 4.6 Penyiapan Sampel	31
Gambar 4.7 Reaksi Penangkapan Radikal Bebas DPPH	36

ABSTRAK

Nama : Rhidna Sulistiawati Amra
NIM : 60500110037
Judul Skripsi : Analisis Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) Dengan Metode DPPH (1,1 difenil-2-pikrilhidrazil)

Buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*) merupakan salah satu tumbuhan yang berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Kulit buah naga merah diketahui memiliki aktivitas antioksidan pada beberapa fraksi tertentu. Akan tetapi pengaruh banyaknya larutan pengestrak pada ekstraksi cair-cair terhadap aktivitas antioksidannya belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbandingan ekstrak kulit buah naga (*Hylocereus polyrhizus*) merah dengan pelarut etil asetat sebagai pengestrak terhadap penyerapan zat antioksidan dengan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Ekstraksi cair-cair dilakukan dengan perbandingan 1:3, 1:4 dan 1:5. Dilakukan uji pendahuluan terhadap sampel menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT) dengan fase gerak n-heksan:etil asetat (3:1). Hasil menunjukkan setelah disemprotkan dengan DPPH terdapat bercak kuning keputihan dengan latar belakang ungu. Setiap perbandingan dibuat dalam berbagai konsentrasi 12 ppm, 14 ppm, 16 ppm, 18 ppm dan 20 ppm. Kemudian sampel ditambahkan larutan DPPH ke dalam berbagai variasi konsentrasi tersebut. Absorbansi di ukur dengan alat spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 517 nm setelah 30 menit diinkubasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin besar pula peredaman radikal bebasnya. Dari ketiga perbandingan ekstrak kental kulit buah naga merah dengan pengestrak etil asetat yang paling baik untuk meredam radikal bebas DPPH yaitu pada perbandingan 1:3.

Kata kunci: Kulit Buah Naga Merah, Antioksidan, Metode DPPH

ABSTRACT

Name : Rhidna Sulistiawati Amra
NIM : 60500110037
Title : Analysis of Ethyl Acetate Extract Antioxidant Skin Red Dragon Fruit (*Hylocereus polyrhizus*) Method of DPPH (1,1-diphenyl-2-pikrilhidrazil).

*Red dragon fruit (*Hylocereus polyrhizus*) is that potentially active as antioxidant. Agents Red dragon fruit skin is known to have antioxidant activity in some certain fraction. However, the effect from amount of solvent extraction in liquid extraction for antioxidant activity has not been much explored. This study aims to determine how the effect of solvent ratio of ethyl acetate to extract the red dragon fruit skin (*Hylocereus polyrhizus*) on the absorption of antioxidants using DPPH (1,1-diphenyl-2-pikrilhidrazil). Extraction is done by maceration method was methanol and then fractionated by liquid-liquid extraction with a ratio of 1:3, 1:4 and 1:5. Preliminary tests performed on samples was thin layer chromatography (TLC) with n-hexane: ethyl acetate (3: 1). As the mobile phase the results show after being sprayed with DPPH are whitish yellow spots with a purple background. Each comparison is made in a variety of concentrations of 12 ppm, 14 ppm, 16 ppm, 18 ppm and 20 ppm. DPPH solution was then added into the various concentrations. The absorbance was measured by a UV-Vis spectrophotometer with a wavelength of 517 nm after 30 minutes incubation. The results showed that a higher of extract concentration, the greater a reduction of free radicals. Of the three comparison extract thick red dragon fruit leather with ethyl acetate extraction ethyl acetate extraction is the best to dampen the DPPH free radicals in a 1:3 ratio.*

Keywords: Red Dragon Fruit, antioxidants, DPPH Method

UNIVERSITAS ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lingkungan masyarakat sekarang, telah banyak diungkapkan bahaya-bahaya lingkungan yang tidak sehat yang diakibatkan oleh senyawa radikal bebas. Radikal bebas merupakan senyawa yang terbentuk secara alamiah di dalam tubuh dan terlibat hampir pada semua proses biologis makhluk hidup. Radikal bebas ini memiliki elektron yang tidak berpasangan sehingga menjadi radikal bebas yang sangat reaktif. Radikal bebas akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron sehingga menjadi stabil (Vallyathan dan Shi, 1997: 165). Reaksi ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan menimbulkan reaksi oksidatif.

Reaksi oksidasi ini dapat menyebabkan kerusakan sel dan berbagai penyakit degeneratif lainnya (Freidovich, 1999: 93). Oleh karena itu, tubuh memerlukan suatu substansi penting yaitu antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas sehingga senyawa radikal menjadi stabil dan tidak dapat menginduksi suatu penyakit.

Antioksidan adalah zat yang dapat menetralkan radikal bebas sehingga atom yang tidak berpasangan mendapat pasangan electron sehingga tidak reaktif lagi dan tidak akan membentuk radikal bebas yang baru lagi. Antioksidan ini merupakan substansi yang terkandung dalam bahan pangan, yang mampu mencegah atau memperlambat terjadinya kerusakan oksidatif dalam tubuh (Budilaksono, 2011: 2).

Berkaitan dengan reaksi oksidasi di dalam tubuh, dimana sebagian besar penyakit, diawali dengan adanya reaksi oksidasi yang berlebihan pada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan tumbuhan yang mengandung antioksidan yang dapat mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh reaksi oksidasi tersebut. Pemanfaatan tumbuhan Allah SWT telah di sebutkan pada Q.S. Al-An'Am (6:99) yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ
مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Dari ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa kejadian hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, agar mereka secara mudah dapat memahami kekuasaan, kebijaksanaan, serta kebesaran Allah. Allah menjelaskan bahwa dia menurunkan hujan dari langit yang menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari berbagai ragam bentuk, macam dan rasa serta berbagai macam kegunaanya. Salah satu tumbuhan yang banyak

kegunaannya yaitu buah naga. Dimana buah naga merupakan salah satu tumbuhan yang mengandung antioksidan. (Departement Agama, 2002: 189).

Buah naga (*dragon fruit*) merupakan salah satu jenis tanaman buah yang memiliki daya tarik tersendiri. Buah naga yang awalnya dikenal sebagai tanaman hias ternyata mengandung mineral, vitamin dan senyawa kimia yang menghasilkan aktivitas biologis dalam tubuh. Secara umum kandungan mineral yang ditemukan dalam buah ini adalah besi, fosfor dan kalsium. Kandungan vitamin pada buah ini juga besar dan beragam, secara umum buah naga mengandung vitamin B1, B2, B3 dan C, serta buah naga juga mempunyai zat sebagai antioksidan (sebagai obat) dan antosianin (sebagai zat pewarna alami). Buah naga memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah buah naga merah. (Moshfeghi, 2013: 269).

Buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*) atau sering disebut dengan *red pitaya* memiliki kulit yang berwarna merah yang dikelilingi sirip berwarna hijau dengan daging yang berwarna merah pula. Kulit buah naga merah mempunyai khasiat sebagai antioksidan karena memiliki flavonoid, thiamin, niacin, piridoksin, kobalamin, glukosa, fenolik, betasianin, polifenol dan karoten. Selain itu kulit buah naga merah ini kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, protein, lemak, fosfor dan zat besi (Jaafar, 2009: 1341).

Kelebihan kulit buah naga merah yang kaya akan antioksidan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Namun, pada kenyataannya hanya dianggap sebagai limbah hasil pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan secara baik. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dalam mengkaji kandungan antioksidan yang terdapat dalam kulit buah naga merah, sehingga dapat menambah sumber antioksidan alami yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan manusia dan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis dari kulit buah naga merah tersebut.

Antioksidan pada kulit buah naga merah diperoleh salah satunya adalah dengan proses ekstraksi maserasi. Untuk menarik antioksidan kulit buah naga merah digunakan senyawa pengekstrak seperti metanol dan etil asetat. Pelarut ini digunakan karena relatif mudah didapat dan merupakan pelarut rekomendasi pada isolasi flavonoid. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui antioksidan dari berbagai macam ekstrak kulit buah naga merah telah dilakukan oleh Nurliyana yang menggunakan ekstrak etanol dengan aktivitas antioksidan sebesar (IC_{50} 0,3 mg/mL). Sedangkan dari penelitian Budilaksono yang menggunakan ekstrak n-heksana diketahui memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai (IC_{50} sebesar 206,591 μ g/mL). Berdasarkan dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa uji antioksidan dari kulit buah naga merah masih terbatas pada uji ekstrak saja. Oleh karena itu, untuk mengeksplorasi aktivitas antioksidan pada kulit buah naga merah maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji antioksidan dengan proses ekstraksi cair-cair dengan menggunakan pelarut etil asetat dengan tingkat perbandingan yang berbeda sehingga dapat diketahui hubungan antara yang terdapat antara fraksi hasil pemisahan ekstrak etil asetat kulit buah naga merah dengan tingkat perbandingan tertentu terhadap antioksidan. Penggunaan proses ekstraksi cair-cair ini telah dilakukan oleh Dewi Maulida dan Naufal Zulkarnaen yaitu ekstraksi antioksidan (likopen) dari buah tomat dengan menggunakan pelarut campuran, n-heksana, aseton dan etanol.

Untuk mengetahui antioksidan pada kulit buah naga merah dilakukan dengan uji pelat KLT dan menggunakan metode DPPH (difenilpicril hidroksil). Penentuan kadar menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Metode ini dipilih karena metode ini sangat sederhana untuk evaluasi antioksidan dari senyawa bahan alam. Kelebihan dari metode DPPH adalah telah banyak digunakan dan mudah diterapkan karena senyawa radikal yang digunakan bersifat

relatif stabil dibandingkan dengan metode lainnya. Prinsip dari metode DPPH adalah adanya donasi atom hidrogen dari substansi yang diujikan kepada radikal DPPH yang ditunjukkan oleh terjadinya perubahan warna (Yuhemita dan Juniarti, 2011: 50).

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dilakukanlah penelitian tentang analisis antioksidan ekstrak etil asetat pada kulit buah naga merah dengan menggunakan metode DPPH.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh perbandingan pelarut etil asetat untuk mengekstraksi kulit buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*) yang menghasilkan antioksidan yang optimal untuk menyerap DPPH ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pelarut etil asetat untuk mengekstraksi kulit buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*) yang optimal dalam penarikan zat antioksidan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam membantu peneliti lain untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai senyawa antioksidan yang terdapat pada kulit buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*) dan diharapkan dapat menjadi dasar peneliti lain untuk mengetahui jenis-jenis antioksidan lain yang terdapat pada kulit buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Buah Naga*

Buah naga merupakan tanaman kaktus dari famili Cactaceae. Secara morfologi tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki daun yang mana hanya memiliki akar, batang, bunga, buah serta biji. Buah naga memiliki bentuk bulat agak memanjang, mempunyai kulit buah yang beragam warnanya yaitu merah, merah gelap, dan kuning (Hor dkk, 2012: 106-114).

1. Jenis-Jenis Buah Naga

Menurut Chet (2009: 9-10), terdapat empat jenis tanaman buah naga, yaitu:

- a) Buah naga daging putih (*hylocereus undatus*).



Gambar 2.1. Buah Naga Daging Putih

Jenis ini mudah dijumpai di pasar lokal maupun mancanegara. Kulit merah buah ini amat kontras dengan daging putih di dalamnya. Di dalam daging itu bertebaran biji hitam.

b) Buah naga daging merah (*hylocereus polyrhizus*)



Gambar 2.2. Buah Buah Naga Daging Merah

Sosok tanaman jenis ini lebih kekar. Di bagian batang dan cabang, jarak antar duri tampak lebih rapat.

c) Buah naga daging super merah (*hylocereus costaricensis*).



Gambar 2.3. Buah Naga Daging Super Merah

Batangnya lebih besar dan berwarna loreng ketika tua. Kulit buah merah dan berjumbai.

d) Buah naga kulit kuning daging putih (*selenicereus megalanthus*).



Gambar 2.4. Buah Naga Daging Putih Kulit Kuning

Penampilannya khas dengan kulit kuning dan tanpa sisik atau jumbai. Tekstur kulit cenderung halus, seperti apel, sehingga dijuluki kaktus apel. Kadar kemanisan 15-18 brik, Ukuran buah 80-100 gram.

Penelitian ini menggunakan buah naga berjenis daging merah, dimana buah naga merah ini memiliki nama latin *Hylocereus polyrhizus* termasuk dalam keluarga kaktus. Buah ini berbentuk oval dengan kulitnya yang berwarna merah jambu dan dikelilingi sirip yang berwarna hijau. Jika dibelah daging buahnya berwarna merah cerah dengan dominasi biji berwarna hitam kecil. Batang buah naga berbentuk bercabang dan memiliki duri kecil yang cukup tajam dan bunganya berbentuk seperti terompet (Panjuantiningrum, 2009: 21).

2. Klasifikasi Buah Naga Merah

Klasifikasi buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*) menurut Isvadhila (2012: 12), secara lengkap:

Kingdom	: Plantae
Subkingdom	: Tracheobionta
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Agiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Subkelas	: Hamamelidae
Ordo	: <i>Caryophyllales</i>
Famili	: <i>Cactaceae</i>
Subfamily	: <i>Hylocereanea</i>
Genus	: <i>Hylocereus</i>
Spesies	: <i>Hylocereus polyrhizus</i>

3. Kandungan Buah Naga Merah

Buah naga merah juga memiliki khasiat antara lain untuk melawan kanker, penyakit jantung, menurunkan tekanan darah dan sebagai antioksidan alami. Adanya khasiat-khasiat tersebut disebabkan oleh kandungan nutrisi dalam buah naga merah yang sangat mendukung bagi kesehatan tubuh manusia. Semua yang diciptakan Allah memiliki manfaat termasuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan telah banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk kesehatan dan kecantikan. Hal tersebut berhubungan dengan firman Allah SWT dalam QS Asy-Syu'araa/26:7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik ?”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa masih banyak dari mereka yang tidak memperhatikan bumi. Padahal, Allah telah menciptakan begitu banyak tumbuh-tumbuhan berbagai jenis yang memberi banyak manfaat. Dengan demikian dari ayat ini mengundang manusia untuk lebih menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini (Departemen Agama RI, 2002: 572).

Berikut ini kandungan gizi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kandungan Buah Naga Merah (Panjuantiningrum, 2009: 23-24).

No.	Nutrisi	Jumlah
1	Air	82,5-83 (g)
2	Lemak	0,21-0,61 (g)
3	Betakaroten	0,005-0,012 (mg)
4	Protein	0,16-0,23 (g)
5	Serat	0,7-0,9 (g)
6	Kalsium	6,3-8,8 (mg)
7	Fosfor	30,2-36,1 (mg)
8	Besi	0,55-0,65 (mg)
9	Vitamin B1	0,28-0,30 (mg)
10	Vitamin B2	0,043-0,045 (mg)
11	Vitamin C	8-9 (mg)

Manfaat yang paling menonjol dari buah naga merah adalah sebagai antioksidan. Antioksidan yang sudah diteliti dari buah naga merah yaitu antioksidan likopen.

B. Antioksidan


Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan dari reaksi oksidasi. Senyawa ini dapat berfungsi untuk menghambat kemungkinan terjadinya penyakit degeneratif dan penuaan (Mandal, 2009: 102). Dalam keadaan normal radikal bebas yang diproduksi didalam tubuh akan dinetralsir oleh antioksidan yang ada didalam tubuh. Bila kadar radikal bebas terlalu tinggi maka kemampuan dari antioksidan endogen tidak memadai untuk menetralsir radikal bebas sehingga terjadi keadaan yang tidak seimbang antara radikal bebas dengan antioksidan yang menyebabkan terjadinya peningkatan kebocoran elektron dari mitochondria yang akan menjadi ROS (*Reactive Oxygen Species*) yang disebut dengan stres oksidatif (Kikuzaki dkk, 2002: 2161).

Beberapa senyawa antioksidan yang sering digunakan saat ini adalah senyawa turunan fenol dan amina. Antioksidan golongan fenol sebagian besar terdiri dari antioksidan alam dan sejumlah antioksidan sintesis. Contoh antioksidan fenol sintetik yang biasa digunakan adalah BHA (butil hidroksi anisol), BHT (butil hidroksi toluen) TBHQ (tert-butil hidrokuinon) dan PG (propel galat) yang dapat meningkatkan karsinogenesis, dimana karsinogenesis ini merupakan pembentukan sel-sel kanker dari sel normal. Senyawa fenol tersubstitusi telah banyak digunakan sebagai antioksidan (Amarowicz dkk, 2000: 957).

Oktavitarini dkk (2013: 24), menyatakan berdasarkan mekanisme kerjanya antioksidan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Antioksidan primer yaitu berperan untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang baru dengan memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Contohnya lesitin.
2. Antioksidan sekunder yaitu menangkap senyawa radikal serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Contohnya karotenoid.

Dalam kulit buah naga terdapat antioksidan yaitu betasianin. Betasianin memberikan warna merah dalam kulit buah naga merah dan berfungsi sebagai menghambat terjadinya infeksi yang terdapat dalam tubuh. Berikut ini merupakan struktur dari betasianin.



Gambar 2.5. Struktur Betasianin

Radikal bebas merupakan molekul yang sifatnya sangat tidak stabil. Dimana ketidakstabilan tersebut disebabkan karena molekul tersebut memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas mempunyai peran ganda dalam tubuh yaitu dapat menguntungkan sebagai kekebalan tubuh dan dapat merugikan apabila konsentrasi radikal bebas dalam tubuh cukup tinggi sehingga akan menyebabkan kerusakan struktur sel (Nedecky, 2013: 6045).

C. Maserasi

Untuk menarik senyawa oleh pelarut dari buah naga merah biasanya yang umum dilakukan adalah proses ekstraksi maserasi. Maserasi merupakan salah satu jenis metode ekstraksi dengan proses perendaman sampel dalam air atau dengan pelarut organik sampai meresap dan akan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang terkandung di dalamnya akan larut. Penggunaan pelarut dalam proses maserasi sangat diperhatikan karena harus sesuai dengan senyawa bahan alam (sampel) dan sifat kepolaran pelarut tersebut. Pelarut yang banyak digunakan pada proses maserasi yaitu metanol karena dapat melarutkan sebagian besar golongan senyawa. Tujuan perendaman ini yaitu agar terjadinya penarikan (ekstraksi) senyawa dari sampel yang menyebabkan terjadinya pemecahan dinding sel yang diakibatkan dengan adanya tekanan dari pelarut baik dari dalam maupun luar sel. Sehingga senyawa yang terdapat di dalamnya akan larut sempurna. Proses ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang diinginkan (Nurdiansyah dan Redha, 2011: 219).

Endah Rismawati, dkk (2011), menyatakan dalam proses ekstraksi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasilnya, yaitu:

1. Pelarut meliputi kepolaran, toksisitas dan konsentrasi
2. Interaksi meliputi luas permukaan bidang sentuh, suhu, waktu, pengadukan, pengulangan.
3. Pemisahan pelarut dengan ekstrak yang dihasilkan.

Pada penelitian ini dalam proses maserasi menggunakan pelarut yaitu pelarut metanol. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam pelarut tersebut. Secara umum pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam, karena dapat melarutkan seluruh senyawa metabolit sekunder .

D. Ekstraksi Cair-Cair

Setelah proses maserasi, selanjutnya penelitian ini dilanjutkan dengan proses ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan proses pemisahan senyawa pada dua jenis pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur. Dimana jika dipisahkan terdapat 2 jenis fase, yaitu diluen (rafinat) dan solven (ekstrak). Ekstraksi cair-cair sering juga digunakan untuk melarutkan logam-logam jarang (Hoogerstraete dkk, 2013: 21353).

Pemisahan secara ekstraksi dilakukan jika campuran yang akan dipisahkan berupa larutan homogen (cair-cair). Proses ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut yaitu etil asetat. Etil asetat merupakan senyawa ester dari etanol dan asam asetat dan senyawa ini disingkat dengan EtOAc, dimana Et mewakili gugus etil dan Oac mewakili asetat. Etil Asetat ini memiliki bau yang khas dan merupakan pelarut yang tidak berwarna (Puspasari, 2010: 74).

E. Kromatografi Lapis Tipis

Istilah kromatografi berasal dari kata latin *chroma* berarti warna dan *graphein* berarti menulis. Jadi, kromatografi merupakan tulisan warna. Kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh Michael Tswett (1903) seorang ahli botani dari Rusia. Michael Tswett dalam percobaannya berhasil memisahkan klorofil dan pigmen-pigmen warna lain dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan serbuk kalsium karbonat yang diisikan ke dalam kolom kaca dan petroleum eter sebagai pelarut. Proses pemisahan diawali dengan menempatkan larutan cuplikan pada permukaan atas kalsium karbonat kemudian dialirkan pelarut petroleum eter. Hasilnya berupa pita-pita berwarna yang terlihat sepanjang kolom sebagai hasil pemisahan komponen-komponen dalam ekstrak tumbuhan (Striegel, 1996: 5).

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan metode pemisahan dimana komponen didistribusikan menjadi dua fase. Fase pertama adalah stasioner (fase diam) kemudian fase kedua yaitu fase gerak. Fase diam biasanya berbentuk padat berpori luas permukaan yang tinggi dan dapat dimodifikasi secara kimia. Kromatografi lapis tipis merupakan metode yang sangat sederhana, cepat dan murah untuk proses pemisahan (Poole, 1991: 2).


Menurut Striegel (1996, hal: 14) pemisahan yang dihasilkan kromatografi lapis tipis dianalisis berdasarkan nilai faktor retardasi (R_f) yang merupakan parameter karakteristik KLT. R_f didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh komponen (zat terlarut) terhadap jarak yang ditempuh pelarut (fase gerak).

Perhitungan nilai harga Rf yaitu:

$$R_f = \frac{\text{Jarak yang ditempuh zat terlarut}}{\text{Jarak yang ditempuh pelarut}}$$


F. Metode DPPH

Metode DPPH merupakan metode uji aktifitas antioksidan yang paling banyak dilakukan. Prinsip metode uji antioksidan DPPH didasarkan pada reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan. DPPH berperan sebagai radikal bebas yang diredam oleh antioksidan dari sampel. Antioksidan dapat mengubah DPPH menjadi molekul radikal bebas yang berwarna ungu berubah menjadi senyawa yang sangat stabil dengan warna kuning (Yuhernita dan Juniarti, 2011: 50).



Gambar 2.5. Struktur kimia DPPH.


Metode DPPH dapat digunakan untuk berbagai sampel dalam penentuan aktifitas antioksidannya. Pengukuran absorbansi DPPH dapat dilakukan dengan peredaman warna. Pada reaksi di bawah dijelaskan bahwa reaksi DPPH tereduksi menjadi DPPH-H (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazin*) yang didasarkan atas reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat antioksidan (Prakash dkk, 2001: 1).



Gambar 2.6. Reduksi DPPH Dari Senyawa Peredam Radikal Bebas

Prinsip dari metode DPPH adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat antioksidan. Mekanisme reaksi dari senyawa antioksidan terhadap radikal DPPH merupakan reaksi reduksi yang menunjukkan aktivitas antiradikal. Aktivitas ini dapat diamati berdasarkan penurunan absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm. Apabila DPPH direduksi maka ditunjukkan dengan penurunan warna keunguan menjadi warna kuning. Donasi proton menyebabkan radikal DPPH (berwarna ungu) menjadi senyawa non-radikal. Senyawa non-radikal DPPH tersebut tidak berwarna. Dengan demikian penangkapan radikal dapat dihitung dari peluruhan radikal DPPH. Kadar radikal DPPH tersisa diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 517 nm. Berikut ini adalah mekanisme reaksi senyawa antioksidan terhadap radikal bebas DPPH.

M A K A S S A R



Gambar 2.7. Mekanisme Reaksi Senyawa Antioksidan dengan DPPH

G. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan gabungan antara prinsip spektrofotometri UV dan Visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visibel. Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Teknik ini sangat sederhana, cepat, cukup sensitive serta berlaku untuk senyawa dalam jumlah kecil. Hukum yang mengatur analisis spektrofotometer UV-Vis adalah Hukum Lambert-Beer (Behera, 2012: 1).

Henry (2002: 2) menyatakan bahwa hukum Lambert Beer merupakan hubungan antara serapan cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan. Dibawah ini adalah persamaan Lambert beer:

$$A = -\log T \quad \text{atau} \quad A = \epsilon \cdot b \cdot c$$

Dimana:

A = Absorbans

T = Transmitan

ϵ = Absorvitas molar (mol^{-1})

c = Konsentrasi zat (mol/jam)

b = Panjang sel (cm)

Menurut Henry (2002: 2), komponen-komponen spektrofotometer UV-Vis beserta fungsinya antara lain:

1. Sumber cahaya berfungsi untuk memancarkan radiasi yang stabil dengan intensitas yang tinggi. Sumber cahaya pada spektrofotometer UV-Vis ada dua macam yaitu lampu tungsten (wolfram) dan lampu deuterium.
2. Monokromator berfungsi alat yang akan memecah cahaya dengan panjang gelombang tertentu menjadi cahaya tunggal.
3. Kuvet berfungsi untuk menaruh sampel yang akan dianalisis.
4. Detektor berfungsi untuk menangkap sinar yang diteruskan oleh suatu larutan.
5. Visual Display berfungsi untuk membaca besarnya absorban pada suatu larutan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Agustus tahun 2014 di Laboratorium Analitik, Lab. Organik serta Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: spektrofotometer UV-VIS, lampu UV, evaporator, oven, neraca analitik, corong pisah, alat-alat gelas, bulp, pisau, dan botol semprot.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquadest, aluminium foil, etil asetat ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OC}(\text{O})\text{CH}_3$), metanol p.a (CH_3OH), n-heksan (C_6H_{14}), kristal DPPH (*1,1 difenil-2-pikrilhidrazil*), kulit buah naga merah (*Hylocereus polyhizus*) dan pelat KLT.

C. Prosedur Kerja

1. Persiapan Bahan

Sampel yang digunakan yaitu buah naga merah yang diperoleh dari perkebunan buah naga di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa. Buah naga yang diambil adalah buah naga yang siap dipetik dan yang sudah tua, kemudian dipisahkan dari daging buahnya menggunakan pisau sehingga yang diperoleh kulit dari buah naganya saja. Kemudian Kulitnya dibersihkan dari sisa-sisa daging buah naga yang masih menempel.

Setelah itu dipotong-potong kecil dan selanjutnya dikeringkan pada suhu kamar sampai beratnya konstan.

2. Proses Maserasi

Menyiapkan toples yang telah diisi sampel kemudian dimaserasi (perendaman) dengan menggunakan pelarut metanol selama 3 x 24 jam di lakukan penggantian pelarut satu kali dalam sehari. Selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan *rotary evaporator vacuum* sehingga diperoleh ekstrak kental.

3. Ekstraksi cair-cair

Ekstrak kental hasil maserasi diekstraksi cair-cair dengan cara dimasukkan dalam corong pisah dengan perbandingan etil asetat (1:3), (1:4) dan (1:5) dalam 100 mL. Kemudian dikocok hingga terjadi pemisahan pelarut. Setelah itu dipekatkan dengan dievaporasi sehingga menghasilkan ekstrak etil asetat.

4. Pembuatan Larutan Induk Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah

Ekstrak etil asetat dibuat larutan induk pada konsentrasi 1000 ppm dengan menimbang 100 mg ekstrak kental, kemudian ditambah larutan metanol p.a sampai volume 100 mL.

5. Pembuatan Deret Kerja Ekstrak Atil Asetat Kulit Buah Naga Merah

Dari larutan induk ekstrak atil asetat kulit buah naga merah 1000 ppm dibuat masing-masing variasi konsentrasi (12 ppm, 14ppm, 16 ppm, 18 ppm dan 20 ppm) dalam 10 mL.

6. Pembuatan Larutan DPPH 40 ppm

Kristal DPPH 4 mg dilarutkan dalam metanol sampai 100 mL sehingga didapatkan konsentrasi 40 ppm. Larutan ini segera digunakan dan dijaga tetap terlindungi dari cahaya.

7. Uji Daya Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah Secara Kualitatif

- a. Larutan ekstrak uji sebanyak 0,01 gr ditambahkan larutan DPPH 40 ppm sebanyak 5 tetes untuk tiap konsentrasi. Jika hasilnya positif, warna larutan akan berubah dari ungu menjadi ungu pucat dan semakin memudar sampai menjadi tidak berwarna.
- b. Ekstrak dari kulit buah naga merah ditotolkan pada lempeng silika gel GF₂₅₄ yang selanjutnya dielusi dengan fase gerak n-heksan:etil asetat (3:2). Setelah elusi selesai lempeng dikeringkan dan disemprotkan dengan larutan DPPH 0,1 mM dalam metanol. Komponen ekstrak yang bersifat antiradikal bebas menghasilkan bercak kuning pucat dengan latar belakang ungu dalam waktu 30 menit.

8. Uji Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah Secara Kuantitatif

Larutan uji masing-masing dipipet sebanyak 1 mL kedalam tabung reaksi yang ditambahkan 2 mL larutan DPPH 40 ppm. Kemudian campuran ini dihomogenkan dan diinkubasi selama 30 menit agar reaksi sempurna, selanjutnya diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis. Pada panjang gelombang maksimum.

D. Analisa Data

Perhitungan kapasitas antiradikal bebas sebagai % peredaman absorben pada puncak 517 nm menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ peredaman DPPH} = \frac{A_{DPPH} - A_{\text{sampel}} + DPPH}{A_{DPPH}} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Absorbansi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4. Maserasi Serbuk Kulit Buah Naga Merah


Proses maserasi serbuk kulit buah naga merah menggunakan pelarut metanol. Total jumlah pelarut yang digunakan selama proses maserasi adalah 6,5 liter. Maserasi ini dilakukan selama 3 hari, setiap 24 jam pelarut diganti dan dilakukan pengadukan tiga kali sehari sehingga diperoleh ekstrak kental metanol kulit buah naga merah berwarna coklat sebanyak 45,47 gram.



Gambar 4.1. Ekstrak Kental Hasil Maserasi

5. Ekstraksi Cair-Cair

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan tiga perbandingan yaitu 1:3, 1:4 dan 1:5. Untuk tiap perbandingan dilakukan replikasi sebanyak tiga kali sehingga diperoleh ekstrak kental kulit buah naga merah yang berwarna merah kecokelatan.



Gambar 4.2. Ekstrak Kental Hasil Ekstraksi Cair-Cair

Dari proses ekstraksi ini diperoleh ekstrak etil asetat sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil Ekstraksi Cair-Cair Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah

No.	Perbandingan (ekstrak kental:etilasetat)	Berat ekstrak (gr)	
		I	II
1	1:3	4,289	10,0669
2	1:4	1,9409	4,9097
3	1:5	1,224	2,8682

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat berat ekstrak yang paling besar adalah pada perbandingan 1:3 simplo dan duplo dan secara berturut-turut 1:4 dan 1:5.

3. Uji Kualitatif


Identifikasi antioksidan dalam ekstrak kulit buah naga merah secara kualitatif dilakukan uji warna, dengan cara menimbang ekstrak kulit buah naga merah sebanyak 0,01 gram kemudian ditambahkan 5 tetes larutan DPPH 40 ppm. Dari percobaan yang telah dilakukan membuktikan bahwa dalam sampel positif memiliki antioksidan yang ditandai dengan perubahan warna dari ungu pucat menjadi kuning pucat. Perubahan warna ini terjadi karena penambahan DPPH berfungsi sebagai radikal bebas yang akan bereaksi dengan senyawa antioksidan dalam menangkap radikal dengan cara menyumbangkan elektron atau hydrogen kepada DPPH. Setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau hidrogen akan bereaksi dan akan memudarkan DPPH. Intensitas warna DPPH akan berubah dari ungu menjadi kuning oleh elektron yang berasal dari senyawa antioksidan.

Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan warna pada setiap perbandingan, dimana pada perbandingan 1:3 memiliki warna yang paling kuning dibandingkan dengan perbandingan 1:4 dan 1:5. Karena secara kualitatif, semakin kuning warna larutan campuran maka aktivitas antioksidan semakin besar. Sementara, secara kuantitatif dapat ditentukan melalui uji dengan metode DPPH.



Gambar 4.3. Uji warna kulit buah naga merah

Secara kualitatif selain uji warna juga dilakukan uji kromatografi lapis tipis (KLT). KLT merupakan metode pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan distribusi dua fase yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan adalah plat silika gel, sedangkan eluen yang digunakan sebagai fase gerak adalah n-heksan:etil asetat (3:2). Hasil kromatografi ekstrak etil asetat kulit buah naga merah dapat dilihat pada Gambar. 4.4. di bawah ini.



(a) (b) (c)

Gambar 4.4. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah


(a). Pengamatan Visual, (b). dengan Larutan DPPH 40 ppm, (c). dengan Sinar UV 366 nm.

4. Uji Kuantitatif

Uji secara kuantitatif dilakukan dengan metode DPPH. Metode DPPH dapat memberikan informasi mengenai kemampuan senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas DPPH yang diamati dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm. Hasil yang diperoleh dari penentuan % peredaman ekstrak etil asetat kulit buah naga merah dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Gambar 4.3.

Tabel 4.2. Hubungan Antara Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Naga Merah dengan Peredaman Radikal Bebas (%)

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi			Peredaman Radikal Bebas (%)		
		1:3	1:4	1:5	1:3	1:4	1:5
1	12	0,208	0,394	0,317	78,99	74,90	78,99
2	14	0,139	0,359	0,256	86,32	77,92	81,82
3	16	0,087	0,303	0,226	90,77	82,58	83,04
4	18	0,077	0,283	0,214	92,01	83,03	85,64
5	20	0,064	0,281	0,144	92,23	84,24	88,22



Gambar 4.5. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Kulit Buah Naga Merah dengan Peredaman Radial Bebas (%)

B. Pembahasan

1. Preparasi Sampel

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel kering kulit buah naga merah. Selama proses pengeringan terdapat perubahan warna, tekstur dan berat. Kulit buah naga merah segar berwarna merah pada bagian atasnya dan berwarna ungu pada bagian tengahnya. Setelah proses penjemuran, terjadi perubahan warna menjadi coklat, serta perubahan tekstur menjadi keras dan kaku sehingga dapat dipatahkan dengan tangan. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh terjadinya foto-oksidasi pada kulit buah naga merah, sedangkan perubahan tekstur dan berat disebabkan karena kehilangan beberapa persen kandungan air yang terdapat pada kulit buah naga merah. Pengeringan ini juga bertujuan agar sampel tidak mudah rusak dengan adanya pertumbuhan jamur sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama.

Buah naga merah yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 25 kg. Dari jumlah tersebut diperoleh kulit buah naga merah yang sudah kering sebesar 600 gram. Kulit buah naga merah kemudian diolah menjadi serbuk dengan cara di haluskan. Bobot yang dihasilkan dari tahapan diatas sebanyak 554.0 gram.



(a)

(b)

(c)

Gambar 4.6.Penyiapan Sampel (a) Buah Naga Merah (*Hylocereus polyhizus*), (b) Kulit Buah Naga Merah Kering, (c) Serbuk Kulit Buah Naga Merah.

2. Proses Ekstraksi

Proses ekstraksi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode maserasi. Metode maserasi dipilih karena peralatan dan pengerjaannya sangat sederhana dan dapat mengekstrak senyawa dengan baik. Pada proses maserasi menggunakan pelarut metanol. Metanol merupakan salah satu pelarut yang bersifat universal sehingga banyak dipakai untuk proses maserasi dan dapat melarutkan sebagian besar golongan senyawa flavanoid. Maserasi dilakukan selama tiga hari. Alasannya karena semakin lama waktu ekstraksi kesempatan untuk bersentuhan antara sampel dan pelarut makin besar sehingga senyawa yang terkandung didalamnya diperkirakan terekstrak semuanya. Selama 3 hari setiap 24 jam pelarut diganti dan dilakukan pengadukan tiga kali sehari. Penggantian pelarut dilakukan untuk mempercepat proses ekstraksi, karena pelarut pertama kemungkinan sudah jenuh oleh senyawa sehingga tidak dapat melarutkan kembali senyawa yang diharapkan.

Hasil maserasi disaring untuk memisahkan filtrat dan residunya. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan disaring. Kemudian filtrat tersebut dipekatkan menggunakan *rotary evaporator vacuum* dan penangas air pada suhu 45°C hingga pelarut menguap dan menjadi ekstrak kental.

Dari hasil maserasi diperoleh ekstrak kental metanol yang berwarna coklat sebanyak 45,47 gram. Ekstrak yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah, difraksinasi dengan ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut etil asetat yang terlebih dahulu dimurnikan. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan tiga perbandingan yaitu 1:3, 1:4 dan 1:5. Untuk tiap perbandingan dilakukan replikasi sebanyak tiga kali. Hasil fraksinasi dikumpulkan dan dipekatkan dengan *evaporator* pada suhu 45°C hingga diperoleh ekstrak kental

etil asetat. Ekstrak etil asetat selanjutnya diuji KLT, uji warna dan uji antioksidan menggunakan metode DPPH.

3. Uji Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah Secara Kualitatif

1. Uji warna

Untuk mengetahui adanya antioksidan dalam tumbuhan maka dilakukan uji warna, dengan cara menimbang ekstrak kulit buah naga merah sebanyak 0,01 gram kemudian ditambahkan 5 tetes larutan DPPH 40 ppm. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya antioksidan dalam ekstrak yang ditandai dengan perubahan warna dari ungu pucat menjadi kuning pucat. Dari percobaan yang telah dilakukan membuktikan bahwa dalam sampel positif memiliki antioksidan.

Pada uji antioksidan secara kualitatif, selain uji warna juga dilakukan uji secara kromatografi lapis tipis (KLT). KLT merupakan pemisahan suatu senyawa berdasarkan kepolaran sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini menggunakan fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan adalah silika gel yang telah diaktifkan pada oven dengan suhu 105°C selama 10 menit dan fase gerak n-heksan:etil asetat (3:2). Selanjutnya proses pemisahan dilakukan dengan cara menotolkan ekstrak etil asetat kulit buah naga merah pada pelat KLT menggunakan pipa kapiler. Totolan dibuat kecil dan bundar agar bercak yang dihasilkan tidak melebar. Bercak yang melebar akan menghasilkan pemisahan yang kurang sempurna. Kemudian, pelat diletakkan dalam *chamber* yang berisi eluen. Eluen yang digunakan adalah pencampuran antara n-heksan:etil asetat dengan perbandingan (3:2). Penggunaan eluen tersebut dengan pertimbangan sifat kepolaran dari fase diam dan sampel. Setelah itu dari setiap perbandingan ekstrak etil asetat kulit buah naga merah disemprotkan DPPH 40 ppm. Bercak yang

diperoleh menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terbentuknya warna kuning keputih-putihan dengan latar ungu. Hasil kromatografi pada setiap perbandingan kulit buah naga merah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*)


Perbandingan	Noda		Rf	
	I	II	I	II
1:3	Biru	Biru	0,07	0,09
	Kuning	Kuning	0,2	0,25
	Merah	Merah	0,45	0,56
1:4	Biru	Biru	0,5	0,7
	Kuning	Kuning	1,5	1,2
	Merah	Merah	3,5	3,4
1:5	Biru	Biru	0,07	0,09
	Kuning	Kuning	0,21	0,25
	Merah	Merah	0,69	0,56

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh enam bercak dari semua perbandingan yang memberikan hasil positif bercak kuning dengan latar belakang ungu dengan nilai Rf simple secara berturut-turut 0,2; 1,5; 0,21 dan duplo secara berturut-turut 0,25; 1,2; 0,25. Berdasarkan ukuran noda, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran noda yang dihasilkan, maka semakin banyak jumlah senyawa yang memberikan aktivitas antioksidan. Bercak yang menunjukkan hasil positif antioksidan ditandai dengan terbentuknya warna kuning keputihan dengan latar belakang ungu disebabkan oleh adanya reaksi antara senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen di dalam ekstrak dengan DPPH sehingga DPPH tereduksi menjadi DPPH-H.

4. Uji Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah Secara Kuantitatif

Setelah dilakukan ekstraksi dan uji secara kualitatif sampel kulit buah naga merah, selanjutnya dilakukan uji antioksidan ekstrak kulit buah naga merah secara kuantitatif dengan menggunakan metode DPPH. Metode DPPH merupakan metode yang mudah, cepat, sensitif, sederhana dan banyak digunakan dalam pengujian aktivitas antioksidan pada beberapa tanaman. Metode DPPH dapat memberikan informasi mengenai kemampuan senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas DPPH yang bisa diamati dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm. Larutan pereaksi DPPH yang digunakan memiliki konsentrasi 40 ppm. Sebanyak 2 mL larutan standar (metanol p.a) direaksikan dengan 1 mL larutan DPPH dalam tabung reaksi. Kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm. Selanjutnya dilakukan uji antioksidan sampel dengan konsentrasi 120 μL , 140 μL , 160 μL , 180 μL dan 200 μL untuk masing-masing perbandingan dengan volume total 3 mL. Sebelum dianalisis terlebih dahulu diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit untuk mempercepat terjadinya reaksi DPPH.


Prinsip dari metode DPPH adalah penangkalan radikal bebas melalui mekanisme pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan oleh radikal bebas sehingga radikal bebas menangkap satu elektron dari antioksidan yang menyebabkan terjadinya perubahan warna DPPH dari ungu pucat menjadi kuning pucat. Berikut ini adalah mekanisme reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat antioksidan.



Gambar 4.7. Reaksi Penangkapan Radikal Bebas DPPH

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai kemampuan sampel dalam meredam radikal bebas DPPH. Dari ketiga perbandingan bahwa ekstrak etil asetat kulit buah naga merah yang paling baik untuk meredam radikal bebas DPPH yaitu terdapat pada perbandingan 1:3. Besarnya nilai peredaman radikal bebas (%) berbanding lurus dengan nilai konsentrasi, dimana semakin tinggi konsentrasi maka peredaman radikal bebas (%) semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teori dimana semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin besar pula peredamannya yang ditandai dengan terbentuknya warna kuning (Windono dkk, 2004: 29). Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi tinggi senyawa yang terkandung akan semakin banyak dan menyebabkan semakin besar pula aktivitas antioksidannya. Hal ini dapat dilihat dari ketiga perbandingan tersebut (1:3), (1:4) dan (1:5) dengan konsentrasi yang sama diperoleh peredaman radikal bebas (%) yang paling tinggi adalah 1:3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak etil asetat yang digunakan pada ekstraksi cair-cair, peredaman radikal bebas (%) yang diperoleh semakin menurun. Kemungkinan ini disebabkan semakin banyak jumlah pengestrak semakin banyak senyawa lain yang ikut terekstrak yang dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan. Hasil yang di peroleh ini berbeda dengan penelitian

sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan buah tomat dengan pelarut campuran n-heksana, aseton dan etanol pada perbandingan 1:1 sampai 1:5. Dari hasil yang diperoleh peredaman radikal bebas (%) yang paling optimal berada pada perbandingan 1:4.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji antioksidan tanaman buah naga merah dengan metode DPPH adalah bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin besar pula peredaman radikal bebasnya. Dari ketiga perbandingan ekstrak kental kulit buah naga merah dengan pengestrak etil asetat yang baik untuk meredakan radikal bebas DPPH yaitu pada perbandingan 1:3.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan maka disarankan perlunya dilakukan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode yang lain seperti metode FRAP dan metode CUPRAC agar didapatkan hasil yang lebih akurat.




DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen RI. *Al-Quran dan Terjemhannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Amarowicz, R., Naczek, M., and Shahidi, F., 2000, Antioxidant Activity of Crude Tannins of Canola and Rapeseed Hulls, *JAOCs*, 77, 957-961.
- Behera, Siladitya dan dkk, "Uv-Visible Spectrophotometric Method Development And Validation Of Assay Of Paracetamol Tablet Formulation,". *J Anal Bioanal Techniques* 2012, 3:6.
- Budilaksono, Widyo, Sri Wahdaningsih dan Andhi Fahrurroji, "Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi N-Heksana Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus Lemairei* Britton Dan Rose) Menggunakan Metode Dpph (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil)," (Program studi farmasi, Universitas Tanjungpura, 2011).
- Chet, NG Wei, "Total Phenolic And Total Flavonoids Content Of Pitaya Peels By Water Extraction,"
- Fredovich, I, "Fundamental Aspects Of Reactive Oxygen Species, or What's the Matter With Oxygen," *Ann. N.Y. Acad. Sci* 893, 13.
- Henry, Arthur, Suryadi MT dan Any Yanuar, "Analisis Spektrofotometri Uv-Vis Pada Obat Influenza Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Persamaan Linier,". Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 21 - 22 Agustus 2002.
- Hoogerstraete, Tom, Bieke Onghena dan Koen Binnemans, "Homogeneous Liquid-Liquid Extraction of Rare Earths with the Betaine-Betainium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide Ionic Liquid System,". *Int. J. Mol. Sci.* 2013, 14, 21353-21377.
- Hor, S. Y., Ahmad, M., Farsi, E., Yam, M. F., Hashim, M. A., Lim, C. P., et al. 2012. Safety Assessment Of Methanol Extract Of Red Dragon Fruit (*Hylocereus polyrhizus*) : Acute And Subchronic Toxicity Studies. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 63, 106-114.
- Husin, Husni, Lia Mairiza dan Zuhra, "Oksidasi Parsial Metana Menjadi Metanol dan Formaldehida Menggunakan Katalis CuMoO₃/SiO₂ : Pengaruh Rasio Cu:Mo, Temperatur Reaksi dan Waktu Tingga," *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan* Vol. 6, No. 1, hal. 21-27, 2007.
- Isvadhila, "Efek Pemberian Buah Naga Merah (*Hylocereus Polyrhizus*) Terfermentasi Terhadap Kadar Ldl Dan Hdl Tikus Putih Galur Wistar Yang Diberi Diet Tinggi Lemak,".

- Jaafar, Ruzainah Ali,"*Proximate Analysis of Dragon Fruit (Hycleereus polyhizus)*," American Journal of Applied Sciences 6 (7): 1341-1346, 2009.
- Kikuzaki, H., M. Hisanto, dan dkk," Antioxidants properties of ferulic Acid and Its Related Compound. J. Agric Food Chem, 50, 2161-2168, 2002.
- Leoputra, Sujendra,"*Regenerasi Katalis Alumina Terdeaktivasi Oleh Reaksi Dehidrasi Metanol Menjadi Dimetil Eter*," Regenerasi katalis, Sujendra Leoputra, FMIPA UI, 2007.
- Mandal, Sulekha dan dkk,"Antioxidants: A Review," *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 2009, 1 (1):102-104.
- Maulida, Dewi dan Naufal Zulkarnaen," *Ekstraksi Antioksidan (Likopen) Dari Buah Tomat Dengan Menggunakan Solven Campuran, N – Heksana, Aseton, Dan Etanol*," (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).
- MS, Purwati,"Pertumbuhan Bibit Buah Naga (Hpylocereus Costaricensis) Pada Berbagai Ukuran Stek Dan Pemberian Hormon Tanaman Unggul Multiguna Exclusive,"*Media Sains*, Volume 5 Nomor 1, April 2013.
- Munawaroh, Safaatul dan Prima Astuti handayani," Ekstraksi Minyak Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix D.C.) Dengan Pelarut Etanol dan N-Heksana," *Jurnal Kompetensi Teknik* Vol. 2, No.1, November 2010.
- Moshfeghi, Nazli dan dkk," Introducing A New Natural Product From Dragon Fruit Into The Market,"*IJRRAS* 15 (2) May 2013.
- Nabila, Norma,"Pengaruh Pemberian Metanol dan Etanol Terhadap Tingkat Kerusakan Sel Hati Tikus Wistar," (Diponegoro: Universitas Diponegoro, 2008).
- Nedecky, Branislav Ruttkay dan dkk,"*The Role of Metallothionein in Oxidative Stress*,"*Int. J. Mol. Sci.* 2013, 14, 6044-6066.
- Nurdiansyah dan Abdi Redha,"Efek Lama Maserasi Bubuk Kopro Terhadap Rendemen, Densitas, dan Bilangan Asam Biodiesel yang Dihasilkan dengan Metode Transesterifikasi In Situ," *Jurnal Belian* Vol. 10 No. 2 Sep. 2011: 218 – 224.
- Oktavitarini, Ndaru dan dkk,"Pembuatan Biodiesel Dari Minyak Goreng Menggunakan Katalis KOH Dengan Penambahan Ekstrak Jagung," *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*, Vol 2, No 3, halaman 24-29.


- Panjuantiningrum, Feranose, " Pengaruh pemberian buah naga merah (*hylocereus polyrhizus*) terhadap kadar glukosa darah Tikus putih yang diinduksi aloksan," (Surakarta: Fakultas kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 2009). h.21.
- Poole, Colin F dan Salwa K.Poole.Chromatography Today. Amsterdam: *Elsevier Scientific Publishing*, 1991.
- Prakash A., Rigelhof, F., Miller, E., 2001, Antioxidant Activity, *Medalliaon Laboratories Analytical Progress*, vol 10, No.2.
- Shahidi, F. dan M. Nazck. 1995. Food Phenolics, Sources, Chemistry, Effects, Applications. Technomics Publishing Co.Inc : Lancaster-Basel, USA.
- Striegel, Mary F dan Jo Hill.Thin-Layer Chromatography for Binding Media Analysis.Los Angeles: *The Getty Conservation Institute*. 1958.
- Uttara, Bayani dan dkk," Oxidative Stress and Neurodegenerative Diseases: A Review of Upstream and Downstream Antioxidant Therapeutic Options," *Current Neuropharmacology*,2009, 7, 65-74.
- Vallyathan, Val dan Xianglin Shi,"The Role Of Oxygen Free Radicals In Occupational And Environmental Lung Diseases,"*Environmental Health Perspectives* Vol 105, Supplement 1 February 1997.
- Windono,T., dkk. 2004. Studi Hubungan Struktur-Aktivitas Kapasitas Peredaman Radikal Bebas Senyawa Flavonoid terhadap 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil (DPPH). *Artocarpus* 4 (1) : 42-52.
- Wulandari, Sri, Imam Mahadi dan Riza Hanizah,"Pengembangan Sumber Belajar Konsep Bioteknologi Berbasis Riset Pengaruh 2.4 D Dan BAP Terhadap Multiplikasi Eksplan Buah Naga (*Hylocereus Costaricensis*) Melalui Teknik Kultur Jaringan,"*Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung*, 2013.
- Yuhernita dan Juniarti," Analisis Senyawa Metabolit Sekunder Dari Ekstrak Metanol Daun Surian Yang Berpotensi Sebagai Antioksidan," (*Makara, Sains*, VOL. 15, NO. 1, APRIL 2011: 48-52).
- Zainoldin, K. D. 2012," The Effect of *Hylocereus polyrhizus* and *Hylocereus undatus* on Physicochemical, Proteolysis, and Antioxidant Activity in Yogurt,"*International Journal of Biological and Life Sciences* 8:2, 93-98.

Lampiran 1.Skema penelitian




Lampiran 2. Bagan Prosedur Kerja

1. Penyiapan Bahan




2. Pembuatan Larutan DPPH 40 ppm




3. Uji antioksidan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah Secara Kualitatif


a. Uji warna



b. kromatografi lapis tipis (KLT)



4. Uji Antioksidan Kulit Buah Naga Merah Secara Kuantitatif



Lampiran 3.Perhitungan rendamen ekstrak metanol kulit buahnagamerah

Berat bubuk kulit nagamerah = 554gr

Volume metanol untuk maserasi = 6,5 L

Bobot kosong cawan = 100,9019 gram


Bobot cawan + sampel = 146,3780 gram

Bobot sampel = 45,4761 gram

Rendemen $= \frac{\text{berat ekstrak(gram)}}{\text{berat sampel(gram)}} \times 100\%$

$$= \frac{45,4761 \text{ gram}}{554 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 8,20868 \%$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4. Pembuatan perbandingan ekstrak dengan etil asetat

1. untuk 1:3

$$\frac{1}{4} \times 100 \text{ mL} = 25 \text{ mL}$$

$$\frac{3}{4} \times 100 \text{ mL} = 75 \text{ mL}$$

$$m = \rho \times v$$

$$\rho_{\text{metanol}} = 0,7918 \text{ g/mL}$$

$$\begin{aligned} m &= 0,7918 \text{ g/mL} \times 25 \text{ mL} \\ &= 19,795 \text{ gr} \end{aligned}$$

10 gr dilarutkan dalam 20 mL metanol dan 5 mL aquadest

2. untuk 1:4

$$\frac{1}{5} \times 100 \text{ mL} = 20 \text{ mL}$$

$$\frac{4}{5} \times 100 \text{ mL} = 80 \text{ mL}$$

$$m = \rho \times v$$

$$\rho_{\text{metanol}} = 0,7918 \text{ g/mL}$$

$$\begin{aligned} m &= 0,7918 \text{ g/mL} \times 20 \text{ mL} \\ &= 15,836 \text{ gr} \end{aligned}$$

7,5 gr dilarutkan dalam 15 mL metanol dan 5 mL aquadest

3. untuk 1:5

$$\frac{1}{6} \times 100 \text{ mL} = 16,666 \text{ mL}$$

$$\frac{5}{6} \times 100 \text{ mL} = 83,333 \text{ mL}$$

$$m = \rho \times v$$

$$\rho_{\text{metanol}} = 0,7918 \text{ g/mL}$$

$$\begin{aligned} m &= 0,7918 \text{ g/mL} \times 16,666 \text{ mL} \\ &= 13,1961 \text{ gr} \end{aligned}$$

5 gr dilarutkan dalam 11,666 mL metanol dan 5 mL aquadest

Lampiran 5. Hasil ekstraksi cair-cair

a. 1:3 simple

Bobot kosong cawan = 184,5284 gram

Bobot cawan + sampel = 188,7673 gram

Bobot sampel = 4,289 gram

b. 1:3 duplo

Bobot kosong cawan = 108,0298 gram

Bobot cawan + sampel = 118,0967 gram

Bobot sampel = 10,0669 gram

Tabel 1. Ekstraksi cair-cair kulit buah naga merah

No.	Ekstrak etil asetat	Bobot kosong cawan (gram)		Bobot cawan + sampel (gram)		Bobot sampel (gram)	
		I	II	I	II	I	II
1	1:3	184,5284	108,0298	188,7673	118,0967	4,289	10,0669
2	1:4	182,3720	144,0390	184,3129	148,3131	1,9409	4,9097
3	1:5	181,8750	169,8723	183,0990	172,7405	1,224	2,8682

Lampiran 6.Perhitungan Rf ekstrak etil asetat kulit buahnagamerah

$$Rf = \frac{\text{jarak yang ditempuh noda}}{\text{jarak eluen}}$$

a. Untuk Rf (1:3) simplo

$$Rf = \frac{0,5}{5,5} = 0,09$$

$$Rf = \frac{1,5}{5,5} = 0,27$$

$$Rf = \frac{3,5}{5,5} = 0,63$$

Tabel 2.Hasil KLT ekstrak etil asetat kulit buahnagamerah

Perbandingan	Noda		Rf	
	I	II	I	II
1:3	Biru	Biru	0,07	0,09
	Kuning	Kuning	0,2	0,25
	Merah	Merah	0,45	0,56
1:4	Biru	Biru	0,5	0,7
	Kuning	Kuning	1,5	1,2
	Merah	Merah	3,5	3,4
1:5	Biru	Biru	0,07	0,09
	Kuning	Kuning	0,21	0,25
	Merah	Merah	0,69	0,56

Lampiran 7.Perhitungan Pembuatan larutan Uji

a. Penyiapan larutan DPPH 40 ppm

Dik $= v = 100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$

ppm = 40 ppm

Dit = mg... ?

Peny $= ppm = \frac{mg}{l}$

$$40 \text{ ppm} = \frac{mg}{0,1 \text{ l}}$$

mg = 4 mg

b. Penyiapan larutan ekstrak

Sebanyak 100 mg ekstrak etil asetat diencerkan dengan metanol p.a pada labu ukur 100 mL hingga kadarnya 1000 ppm sebagai larutan stok dan dibuat pengenceran larutan dengan konsentrasi 12 ppm, 14 ppm, 16 ppm, 18 ppm dan 20 ppm.

Untuk 12 ppm \longrightarrow $V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$
 $V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times 12 \text{ ppm}$
 $V_1 = \frac{120 \text{ mL} \times \text{ppm}}{1000 \text{ ppm}}$
 $V_1 = 0,12 \text{ mL} = 120 \mu\text{L}$

Untuk 14 ppm \longrightarrow $V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$
 $V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times 14 \text{ ppm}$
 $V_1 = \frac{140 \text{ mL} \times \text{ppm}}{1000 \text{ ppm}}$
 $V_1 = 0,14 \text{ mL} = 140 \mu\text{L}$

Untuk 16 ppm \longrightarrow $V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$

$$\begin{aligned}
 V_1 \times 1000 \text{ ppm} &= 10 \text{ mL} \times 16 \text{ ppm} \\
 V_1 &= \frac{160 \text{ mL} \times \text{ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\
 V_1 &= 0,16 \text{ mL} = 160 \mu\text{L}
 \end{aligned}$$

Untuk 18 ppm →

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 1000 \text{ ppm} &= 10 \text{ mL} \times 12 \text{ ppm} \\
 V_1 &= \frac{180 \text{ mL} \times \text{ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\
 V_1 &= 0,18 \text{ mL} = 180 \mu\text{L}
 \end{aligned}$$

Untuk 20 ppm →

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 1000 \text{ ppm} &= 10 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm} \\
 V_1 &= \frac{200 \text{ mL} \times \text{ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\
 V_1 &= 0,20 \text{ mL} = 200 \mu\text{L}
 \end{aligned}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 8.Tabel Hasil pengukuran data

Tabel 1.Hasil pengukuran serapan DPPH pada ekstrak etil asetat kulit buahnagamerah dengan perbandingan 1:3

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-rata	Peredaman (%)
		I	II		
1	12	0,208	0,342	0,275	81,22
2	14	0,139	0,222	0,180	87,71
3	16	0,087	0,152	0,119	91,87
4	18	0,077	0,131	0,104	92,90
5	20	0,064	0,131	0,097	93,37

Tabel 2.Hasil pengukuran serapan DPPH pada ekstrak etil asetat kulit buahnagamerah dengan perbandingan 1:4

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-rata	Peredaman (%)
		I	II		
1	12	0,394	0,331	0,362	75,29
2	14	0,359	0,313	0,336	77,06
3	16	0,303	0,240	0,271	81,50
4	18	0,283	0,238	0,260	82,25
5	20	0,281	0,215	0,248	83,07


Tabel 3.Hasil pengukuran serapan DPPH pada ekstrak etil asetat kulit buahnagamerah dengan perbandingan 1:5

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-rata	Peredaman (%)
		I	II		
1	12	0,317	0,306	0,311	78,77
2	14	0,256	0,271	0,263	82,04
3	16	0,226	0,259	0,242	83,48

4	18	0,214	0,250	0,232	84,16
5	20	0,144	0,183	0,163	88,87

Tabel 4. Hasil pengukuran serapan blanko DPPH 40 ppm

Absorbansi		Rata-rata
I	II	
1,454	1,476	1,465



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 9. Perhitungan % Peredaman DPPH

$$\% \text{ peredaman} = \frac{A_{DPPH} - A_{sampel + DPPH}}{A_{DPPH}} \times 100\%$$

Ket: A_{DPPH} adalah absorbansi DPPH

$A_{sampel + DPPH}$ adalah absorbansi sampel ditambah DPPH

a. Ekstrak etil asetat (1:3)

1. Konsentrasi 12 ppm = $\frac{1,465 - 0,275}{1,454} \times 100\% = 81,22\%$

2. Konsentrasi 14 ppm = $\frac{1,465 - 0,180}{1,454} \times 100\% = 87,71\%$

3. Konsentrasi 16 ppm = $\frac{1,465 - 0,119}{1,454} \times 100\% = 91,87\%$

4. Konsentrasi 18 ppm = $\frac{1,465 - 0,104}{1,454} \times 100\% = 92,90\%$

5. Konsentrasi 20 ppm = $\frac{1,465 - 0,097}{1,454} \times 100\% = 93,37\%$

b. Ekstrak etil asetat (1:4)

1. Konsentrasi 12 ppm = $\frac{1,465 - 0,362}{1,454} \times 100\% = 75,29\%$

2. Konsentrasi 14 ppm = $\frac{1,465 - 0,336}{1,454} \times 100\% = 77,06\%$

3. Konsentrasi 16 ppm = $\frac{1,465 - 0,271}{1,454} \times 100\% = 81,50\%$

4. Konsentrasi 18 ppm = $\frac{1,465 - 0,260}{1,454} \times 100\% = 82,25\%$

5. Konsentrasi 20 ppm = $\frac{1,465 - 0,248}{1,454} \times 100\% = 83,07\%$

c. Ekstrak etil asetat (1:5)


1. Konsentrasi 12 ppm = $\frac{1,465 - 0,311}{1,454} \times 100\% = 78,77\%$

2. Konsentrasi 14 ppm = $\frac{1,465-0,263}{1,454} \times 100 \% = 82,04 \%$

3. Konsentrasi 16 ppm = $\frac{1,465-0,242}{1,454} \times 100 \% = 83,48 \%$


4. Konsentrasi 18 ppm = $\frac{1,465-0,232}{1,454} \times 100 \% = 84,16 \%$

5. Konsentrasi 20 ppm = $\frac{1,465-0,163}{1,454} \times 100 \% = 88,87 \%$




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Lampiran 10. Gambar grafik hasil dari peredaman radikal bebas (%)



Gambar 1. Grafik hubungan antara konsentrasi dengan peredaman radikal bebas (%) pada perbandingan 1:3.



Gambar 2. Grafik hubungan antara konsentrasi dengan peredaman radikal bebas (%) pada perbandingan 1:4.



Gambar 3. Grafik hubungan antara konsentrasi dengan peredaman radikal bebas (%) pada perbandingan 1:5.

Lampiran 9. Dokumentasi penelitian



Gambar 4. buah manggis (*garcinia mangostana L*)



Gambar 2. Ekstrak kental metanol kulit buah naga merah



Gambar 2. Serbuk kuit buah naga merah



Gambar 3. Pengilingan kulit naga merah



Gambar 4. Maserasi serbuk kulit buah naga merah





Gambar 6. Ekstraksi cair-cair



Gambar 7. Ekstrak kental etil asetat kulit buah naga merah




Gambar 8. Hasil uji warna



Gambar 9. Hasil KLT



Gambar 10. Pereaksi DPPH 40 ppm



Gambar 11. Larutan induk kulit naga merah 1000 ppm



Gambar 12. Larutan standar kulit naga merah (12, 14,16,18 dan 20) ppm



Gambar 13. Neraca analitik



Gambar 14. Alat destilasi



Gambar 15. Oven



Gambar 16. Sinar UV



Gambar 17. Inkubasi



Gambar 18. Spektrofometer UV-Vis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rhidna Sulistiawati Amra lahir di Bulukumba 9 Juni 1992. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan Bapak H. Ambo Rappedan Ibu Hj. Ratnawati. Memulai pendidikannya di SD 172 Borongkalukue, Bulukumba pada tahun (1998-2004), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bulukumba pada tahun (2004-2007) dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba pada tahun (2007-2010). Untuk meraih gelar sarjana S1, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia. Selain aktif sebagai mahasiswa di UIN Alauddin Makassar, penulis juga aktif di beberapa komunitas kampus dan sebagai surveyor di beberapa lembaga survey yang ada di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R