

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY “F”
DENGAN PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan D III Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURHIKMA
70400114065

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (UIN)
MAKASSAR
2017**

PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NURHIKMA**
Tempat/Tgl. Lahir : Tuppu, 10 September 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Diploma
Alamat : Tuppu, Kec Lembang Kab. Pinrang
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Pada Ny [”F”
Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syeck
Yusuf Gowa Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, September 2017

Penyusun

NURHIKMA
Nim.70400114065

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurhikma

Nim : 70400114065

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Post Partum dengan Perdarahan akibat Rest Plasenta Di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017

Karya Tulis Ilmiah ini Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT.,SKM.,M.Keb

dr. Nurhira Abdul Kadir., MPH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Pada Ny "F" Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017", yang disusun oleh **NURHIKMA** NIM: 70400114065, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 27 November 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	Firdayanti, S.SiT, M.Keb	(.....)
Pembimbing I	Dr. Hj. Sitti Salcha, S.S.IT., SKM., M.keb	(.....)
Pembimbing II	dr. Nurhira Abdul Kadir., MPH	(.....)
Penguji I	dr. Raully Rahmadhani, M.Kes	(.....)
Penguji II	Prof. Dr. Mukhtar Lutfi., M.Ag	(.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Pada Ny “F” dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Sehingga penulis dapat mempersembahkan karya tulis ilmiah ini sebagai kado terindah dan sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuanya yaitu bapak Nurdin dan ibu Isah yang tidak pernah bosan untuk memberikan doa serta dukungan moril maupun moral meskipun penulis mengetahui bahwa karya tulis ini tidak bisa membalas kedua orang tuanya namun setidaknya karya tulis ini ini bisa membuat orang tuanya menjadi bangga dan tersenyum bahagia.

Dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

3. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan
4. Ibunda Firdayanti, S. Sit., M.keb selaku sekertaris jurusan prodi kebidanan
5. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.Si.T., S.KM., M.Keb.selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan ilmu yang bermamfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Ibunda dr. Nurhira Abdul Kadir., MPH selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda dr.Rauly rahmadhani M.kes selaku penguji 1 yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini
8. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi., M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar
10. Kepala RSUD Syekh Yusuf Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.

11. Kepada sahabat-sahabatku tercinta “SNENET” (Ratih, Geni, Sunarti, Ratika, Anha, Wana) yang telah memberikan support yang membangun dan telah menemani dalam suka maupun duka dalam perjalanan menuju kesuksesan saya.
12. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya ira ayu letari, zuhriani, muliati, dan miss bulukumba serta teman-teman kebidanan 2014.

Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih. Namun bila ilmu dipelajari dengan setengah-setengah dan dimanfaatkan semaunya tanpa tahu tujuannya benar atau tidak, maka ilmu itu akan merusak citra keindahan. Inilah yang sangat penting kita pahami agar tidak sembarangan menggunakan ilmu dalam kehidupan kita. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, 27 November 2017

Penulis

Nurhikma

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR ISTILAH	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Ruang Lingkup.....	6
c. Tujuan Penulisan.....	7
d. Manfaat Penulisan.....	8
e. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN TEORI	10
A. TINJAUAN UMUM TENTANG NIFAS	10
a. Pengertian.....	10
b. Tujuan Asuhan Masa Nifas.....	10
c. Tahapan Masa Nifas	11
d. Proses Involusio	11
e. Kunjungan Masa Nifas	12
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERDARAHAN	13
a. Pengertian.....	13

b. Etiologi	13
c. Diagnosa Perdarahan Postpartum	14
C. TINJAUAN KHUSUS TENTANG REST PLASENTA	15
a. Pengertian	16
b. anatomi plasenta	17
c. Mekanisme Lahirnya Plasenta.....	18
d. Etiologi	19
e. Gejala Klinik	20
f. Diagnosis	20
g. Komplikasi	22
h. Pencegahan	22
i. Penatalaksanaan.....	23
D. TINJAUAN ISLAM DALAM MASA NIFAS	24
E. MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN	26
BAB III TINJAUAN KASUS.....	33
Langkah I. Identifikasi data dasar	33
Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual	43
Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	45
Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi	48
Langkah V. Rencana tindakan	49
Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan	52
Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan	56
SOAP HARI PERTAMA	57

SOAP HARI KEDUA	60
SOAP HARI KETIGA.....	65
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
Langkah I. Identifikasi data dasar	69
Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual.....	75
Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	78
Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi	82
Langkah V. Rencana tindakan	83
Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	85
Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	91
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Riwayat Persalinan.....	35
Tabel 3.2 Pemantauan Kala IV	40



DAFTAR ISTILAH

A

Amnion : air ketuban

Aborsi : pengguguran

atonia uteri : uterus tdk berkontraksi dengan baik

C

cavum uteri : Rongga uteri

D

desidua : membran mukosa yang melapisi rahim

E

Eksplorasi : Pencarian atau penjelelahan

H

Hemorraghe : perdarahan

I

Inspekulo : Pemeriksaan Yang Di Lakukan Untuk Menilai Servik ,Tanda
Tanada Infeksi, Dan Cairan Dari Ostium Uteri

Involusio : proses kembalinya uterus seperti semula

K

korion frondosum : komponen plasenta

kotiledon : selaput pembungkus plasenta

Kustner : Dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada atau diatas
simpisis, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat masuk

berarti plasenta sudah lepas, tetapi bila diam atau maju berarti plasenta sudah lepas.

Klein : Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit, bila tali pusat kembali berarti plasenta belum lepas, tetapi bila diam turun berarti plasenta sudah lepas.

Komprehensif : menyeluruh

L

Lochea : cairan sekret yang berasal dari cavum uteri dan vagina dalam masa nifas.

Sanguinolenta : berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, mekoneum, selama 2 hari pasca persalin

Lochea alba : cairan putih selama 2 minggu.

Lochea serosa : berwarna kuning cairan tidak berdarah lagi, pada hari ke 7-14 pasca persalinan.

purulenta : infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk

Lanugo : rambut halus dan tipis yang muncul pada kulit janin

M

Mekoneum : Kotoran atau feses yang di hasilkan bayi selama dalam rahim

P

Post Partum : setelah persalinan

Puerperium : masa setelah persalinan yang di perlukan untuk pulihnya alat kandunagan yang lamanya 6 minggu

R

Remote puerperium : Waktu Yang Di Perlukan Untuk Pulih Dan Sehat Sempurna

S

Strassman : Tegangan tali pusat dan ketok pada fundus, bila tali pusat bergeta berarti plasenta belum lepas, tetapi bila tidak bergetar plasenta sudah lepas

syok. : Suatu keadaan yang dapat mengancam jiwa

U

Uterotonica : obat obatan yang mebuat kontraksi uterus

uterus : Rahim

V

verniks kaseosa : Sejenis subtansi lemak yang menyerupai keju yang berasal dari kelenjar minyak bayi yang terdiri dari sel minyak serta sel kulit yang telah mengelupas

DAFTAR SINGKATAN

TFU : Tinggi fundus uteri

WHO : word healt organisation

RSUD : rumah sakit umum daerah

AKI : angka kematian ibu



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : lembar kegiatan konsultasi proposal
- Lampiran 2 : lembar kegiatan konsultasi hasil
- Lampiran 3 : lembar persetujuan hasil
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbagda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Walikota Makassar
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Walikota Atau Badan Kesatuan Bangsa dan politik kab. Gowa Kepada di rektur RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran 8 : surat keterangan selesai penelitan dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, SEPTEMBER 2017**

Nurhikma,

Pembimbing I: Hj.Sitti Saleha

Pembimbing II: Nurhira Abdul Kadir

“Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Pada Ny “F” dengan Pendarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”

Rest plasenta yang tidak segera ditangani akan berdampak pada ibu. Dampak yang bisa ditimbulkan yaitu memudahkan terjadinya anemia yang berkelanjutan dan infeksi puerperium dan kematian akibat perdarahan postpartum (Karlina, dkk. 2016).

Studi kasus ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Pada Ny “F” dengan Pendarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP yaitu langkah I identifikasi data dasar, langkah II identifikasi masalah aktual, langkah III identifikasi masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V intervensi, langkah VI implementasi, dan langkah VII evaluasi.

Hasil studi kasus yang telah dilakukan pada Ny “F” setelah dilakukan asuhan, tidak ditemukannya hambatan selama asuhan yang diberikan. Selama dilakukannya asuhan perdarahan aktif sudah tidak ada atau sudah teratasi ditandai dengan TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik yaitu fundus teraba keras dan bundar.

Dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus Ny “F” dengan pendarahan post partum akibat rest plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap Ny “F” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan dan Tidak Syok Hipovolemik.

Kata Kunci: Post Partum, Pendarahan dan Rest Plasenta

ABSTRACT

MIDWIFERY MANAGEMENT UIN ALAUDDIN MAKASSAR SCIENTIFIC PAPER, SEPTEMBER 2017

Nurhikma,

Supervisor I : Hj.Sitti Saleha

Supervisor II : Nurhira Abdul Kadir

"Post-Partum Midwifery Care Management on Mrs. "F" with Hemorrhage Due to Placental Rest at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017"

Placental rest which is not treated immediately will have an impact on the mother. The potential impacts are to facilitate the onset of sustained anemia and puerperal infections and deaths from postpartum hemorrhage (Karlina, et. al., 2016).

This case study is aimed at implementing the Post-Partum Midwifery Care Management on Mrs. "F" with Hemorrhage Due to Placental Rest at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017 based on 7 steps of Varney and SOAP, namely from the first to seventh step respectively are identifying the basic data, the actual problem, the potential problem, taking immediate actions/collaboration, intervention, implementation, and evaluation.

The results of the case study applied on Mrs. "F" after the care being performed, it is not found any obstacles during the care process. The active bleeding is not existed or already resolved that is characterized by the TFU of two fingers below the navel, a good uterine contraction of the hard and round fundus.

From the case study that is 7 steps of Varney and SOAP implemented for the process of obstetrics problem solving, it has been conducted assessment and data analysis of Mrs. "F" case with post-partum hemorrhage due to placental rest at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017 and documented all findings and actions that have been performed on Mrs. "F" with the results of no discrepancy and no hypovolemic chock.

Keywords : Post-Partum, Hemorrhage and Placental Rest



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa nifas adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta lepas dari rahim sampai enam minggu berikutnya disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti permukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan. Masa nifas merupakan masa yang kritis bagi ibu dan bayi karena kemungkinan timbul masalah dan penyulit selama masa nifas, jika tidak segera ditangani secara efektif akan membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama (Astuti,dkk. 2012).

Kesehatan dan kelangsungan ibu dan bayi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu, anak, keluarga dan masyarakat. Setiap ibu nifas akan menghadapi risiko yang bisa mengancam keberlangsungan masa nifas. Kematian ibu dapat disebabkan oleh masalah perdarahan post partum maupun infeksi pada masa nifas hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan ibu tentang pra dan pasca persalinan, faktor tempat pelayanan kesehatan, faktor gizi, dan faktor penyebab kematian ibu nifas yaitu sepsis puerpuralis, perdarahan, perlukaan jalan lahir, dan trombo embolismus (Holmes dan Baker, 2013).

Salah satu gangguan dalam masa nifas tersebut diantaranya adalah pendarahan post partum. Pendarahan dalam kehamilan dan persalinan terdiri dari pendarahan ante, intra dan postpartum (pasca persalinan). Rest plasenta merupakan salah satu penyebab pendarahan post partum dengan angka kejadian berkisar antara 5%-15% dari laporan-laporan pada negara maju maupun negara berkembang, termasuk di dalamnya adalah pendarahan karena rest plasenta. Insidensi pendarahan pasca persalinan akibat rest plasenta dilaporkan berkisar 23% - 24%. Diperkirakan bahwa 60 % kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50 % kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama (Mastiningsih, 2013).

Perdarahan Post partum adalah pendarahan lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah anak lahir. Termasuk pendarahan karena retensio plasenta. Pendarahan post partum adalah pendarahan dalam kala IV lebih dari 500-600 cc dalam 24 jam setelah anak dan plasenta lahir (Rukiyah, 2012). Pendarahan pasca persalinan lanjut sebagian besar pasien akan kembali lagi ke tempat bersalin dengan keluhan pendarahan setelah beberapa hari pulang kerumah dan subinvolisio uterus (Nugroho, T. 2012).

Secara global, 80% kematian ibu pada penyebab secara langsung, yaitu pendarahan (25%) biasanya pendarahan pasca persalinan, sepsis (15%), hipertensi dalam kehamilan (12%), partus macet (8%), komplikasi aborsi tidak aman (13%) dan sebab-sebab lain (8%) dan (6%) anemia (Depkes, 2014). Menurut Gani (2013) prevalensi pendarahan pasca persalinan adalah 21,3% pada populasi penelitian

yang terdiri dari 1000 ibu yang di interview faktor-faktor yang terkait dengan perdarahan pasca persalinan adalah usia, jumlah kehamilan, lama persalinan, penyisipan obat-obatan buatan sendiri di vagina, *rest plasenta*, dan istirahat selama masa post partum.

Menurut Talluri, dkk (2016) perdarahan pasca persalinan juga bisa menjadi penyebab morbiditas berat jangka panjang dengan sekitar 12% wanita yang bertahan dalam perdarahan post partum akan mengalami anemia berat. Perdarahan pasca persalinan adalah penyebab utama kematian ibu nifas di negara-negara berpenghasilan rendah dan penyebab utama hampir seperempat dari semua kematian maternal secara global. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi primer dan sekunder tergantung pada waktu perdarahan setelah persalinan. Perdarahan post partum primer/perdarahan postpartum awal terjadi dalam waktu 24 jam setelah persalinan dan post partum sekunder terjadi dari 24 jam setelah melahirkan sampai minggu ke 6 dari masa nifas.

Perdarahan post partum merupakan penyebab penting kematian maternal khususnya dinegara berkembang. Faktor-faktor yang menyebabkan perdarahan post partum adalah grande multipara, jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun, persalinan yang dilakukan dengan tindakan seperti pertolongan kala III sebelum waktunya sehingga terjadi *rest plasenta*, pertolongan persalinan oleh dukun, persalinan dengan tindakan paksa, dan persalinan dengan narkosa (Manuaba dkk, 2013).

Menurut Karlina (2016) rest plasenta merupakan tertinggalnya bagian plasenta dalam uterus yang dapat menimbulkan perdarahan post partum primer atau perdarahan post partum sekunder, rest plasenta adalah apabila setelah plasenta lahir masih terdapat perdarahan secara terus menerus, saat diperiksa kontraksi uterus ada, tetapi TFU tidak turun segera periksa kelengkapan plasenta (Mochtar, 2012).

Rest plasenta terjadi karena berbagai macam diantaranya terjadi pengeluaran plasenta tidak secara hati-hati, dimana plasenta dilahirkan tidak sesuai kurve jalan lahir, kesalahan dalam pimpinan kala II, dan terjadi lingkaran konstriksi pada bagian bawah uterus. Perdarahan rest plasenta menjadi nomor urut kedua dalam kasus ginekologi. Rest plasenta yang tidak segera ditangani akan berdampak pada ibu. Dampak yang bisa ditimbulkan yaitu memudahkan terjadinya anemia yang berkelanjutan dan infeksi puerperium dan kematian akibat perdarahan post partum (Karlina, dkk. 2016).

Data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2012 menunjukkan sebanyak 558.000 perempuan meninggal dunia akibat masalah persalinan, lebih rendah dari jumlah kematian ibu tahun 2013 yaitu sebanyak 581.000. Kematian ibu sebanyak 99 persen akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara berkembang. WHO menyatakan bahwa kematian maternal adalah kematian seseorang wanita waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan (WHO, 2015).

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yaitu 359/100000 kelahiran hidup. AKI di Indonesia bahkan lebih buruk dari negara Vietnam. Target yang ingin dicapai sesuai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), pada tahun 2030 AKI turun menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup (Departemen Kesehatan, RI. 2015).

Jumlah kematian ibu pada tahun 2012 menurut Profil Kesehatan Kabupaten / Kota Makassar yang dilaporkan menjadi 160 orang atau 110,26 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 45 orang (28,1%), kematian ibu bersalin 60 orang (40%), kematian ibu nifas 55 orang (30%). Sedangkan tahun 2013 menurun menjadi 115 orang atau 78,38 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 18 orang (15,65%), kematian ibu bersalin 59 orang (51,30%), kematian ibu nifas 38 orang (33,04%). Tahun 2014 jumlah kematian ibu yang dilaporkan menjadi 138 orang atau 93,20 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 15 orang (10,86%), kematian ibu bersalin 54 orang (39,13%), kematian ibu nifas 69 orang (50,00%) (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014: 27).

Dari data rekam medik yang diperoleh dari RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2013 jumlah ibu nifas sebanyak 246 orang dan yang mengalami rest plasenta sebanyak 66 orang. Tahun 2014 jumlah ibu nifas sebanyak 2619 orang dan yang mengalami rest plasenta sebanyak 159 orang. Tahun 2015 jumlah ibu nifas sebanyak 2826 orang dan yang mengalami rest plasenta sebanyak 172 orang. tahun 2016 jumlah ibu nifas sebanyak 3887 orang dan yang mengalami rest

plasenta sebanyak 13 orang dan tahun 2017 jumlah ibu nifas sebanyak 993 orang dan yang mengalami rest plasenta sebanyak 8 orang.

Pemberian asuhan kebidanan kepada ibu dalam masa nifas sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, melaksanakan deteksi dini adanya komplikasi dan infeksi, memberikan pendidikan pada ibu serta memberikan pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi. Selama masa nifas ibu akan mengalami perubahan. Pelayanan atau asuhan merupakan cara penting untuk memonitor dan mendukung kesehatan ibu nifas normal dan mengetahui secara dini bila ada penyimpangan yang ditemukan dengan tujuan agar ibu dapat melalui masa nifasnya dengan selamat (Widyasih, dkk. 2013).

Melihat pentingnya kontribusi rest plasenta terhadap kasus kematian ibu akibat perdarahan post partum, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum pada Ny “F” dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”.

B. Ruang Lingkup

Dalam studi kasus ini, adapun ruang lingkup dalam studi kasus ini adalah “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Pada Ny “F” dengan Perdarahan akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan manajemen asuhan kebidanan post partum pada Ny “F” dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengumpulkan data pada kasus kebidanan post partum pada Ny “F” dengan perdarahan akibat rest plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.
- b. Mengidentifikasi diagnosa/ masalah aktual pada kasus kebidanan post partum pada Ny “F” dengan perdarahan akibat rest plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.
- c. Mengidentifikasi diagnosa/ masalah potensial pada kasus kebidanan post partum pada Ny “F” dengan perdarahan akibat rest plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.
- d. Menetapkan kebutuhan tindakan segera, konsultasi, kolaborasi, dan rujukan pada kasus kebidanan post partum pada Ny “F” Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.
- e. Menyusun rencana asuhan pada kasus kebidanan post partum pada Ny “F” Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017
- f. Dilaksanakannya asuhan pada kasus kebidanan post partum pada Ny “X” Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.

- g. Mengevaluasi hasil asuhan pada kasus kebidanan post partum pada Ny “F” Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.
- h. Melakukan pendokumentasian hasil asuhan kebidanan post partum pada Ny “F” Dengan Perdarahan Akibat Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.
- i. Melakukan penelusuran mendalam terhadap literatur untuk mencari dan mendiskusikan kesenjangan antara teori dan fakta kasus di lapangan tentang kasus rest plasenta
- j. Melakukan penerapan nilai-nilai keislaman dalam manajemen asuhan kebidanan post partum dengan perdarahan akibat rest plasenta.

D. Manfaat Penulisan

- 1. Manfaat Aplikatif
 - a. Dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan khususnya pada ibu yang mengalami rest plasenta dan merupakan salah satu lingkup upaya promosi kesehatan reproduksi dan berguna bagi masyarakat pada umumnya.
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi secara objektif tentang perdarahan akibat rest plasenta sehingga menjadi pedoman dalam memberikan penyuluhan dalam memberikan pendidikan kesehatan.
- 2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Peneliti terutama untuk menambah wawasan yang berkenaan dengan perdarahan akibat rest plasenta, serta

menjadi suatu kesempatan yang berharga bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu bahan bacaan dan acuan bagi peneliti berikutnya

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang mengungkap mengenai rest plasenta dengan memberikan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka membahas mengenai teori berdasarkan judul yaitu mengenai masa nifas, tujuan masa nifas, peran, periode masa nifas, proses laktasi dan menyusui, proses involusio, perawatan masa nifas, nasehat untuk ibu nifas, kunjungan masa nifas, perubahan fisiologis dalam masa nifas, perubahan psikologis pada ibu nifas. tinjauan kasus dalam islam, proses asuhan kebidanan, pengertian, tahapan, pendokumentasian asuhan kebidanan.

Bab III Studi kasus membahas mengenai langkah I. identifikasi dan analisa data dasar, langkah II. identifikasi diagnosa/masalah aktual, langkah III. identifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV. tindakan emergency, konsultasi, kolaborasi dan rujukan, langkah V. intervensi/rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI. implementasi/pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, langkah VII. evaluasi tindakan asuhan kebidanan, pendokumentasian asuhan kebidanan.

Bab IV: Membahas mengenai persamaan, perbedaan atau kesenjangan dalam studi kasus post partum dengan perdarahan akibat rest plasenta.

Bab V : Kesimpulan dan saran antara kasus yang diteliti terhadap teori yang telah dibahas pada bab II, dan pada bagian ini juga menjawab tujuan penelitian dan terakhir bab V membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap pihak yang terkait pada kasus post partum dengan perdarahan akibat rest plasenta .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian

Ada beberapa pendapat terhadap pengertian masa nifas. Menurut Widyasih dkk (2013), masa nifas (*puerperium*) adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta lepas dari rahim sampai enam minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti permukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masa nifas atau *puerperium* dimulai setelah kelahiran plasenta, dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu (Rukiyah, dkk. 2012).

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Adapun tujuan pelaksanaan masa nifas di dalam buku Widyasih dkk (2013) yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis, melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu berkaitan dengan: gizi, menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya, perawatan bayi sehat dan keluarga berencana, memberikan pelayanan KB.

3. Tahapan Masa Nifas

Tahapan masa nifas yaitu:

- a. Puerperium dini yaitu kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan.
- b. Puerperium intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu.
- c. Remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi (Rukiyah, dkk. 2012).

4. Proses Involusio

a. *Lochea*

Lochea adalah cairan sekret yang berasal dari cavum uteri dan vagina dalam masa nifas.

- 1) *Lochea rubra* berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, mekoneum, selama 2 hari pasca persalinan.
- 2) *Lochea sanguinolenta* berwarna merah kuning berisi darah dan lendir, hari ke 3-7 pasca persalinan.
- 3) *Lochea serosa* *Lochea alba* cairan putih selama 2 minggu.
- 4) *Lochea purulenta* terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk (Rukiyah, dkk. 2012).

5. Kunjungan Masa Nifas

a. Enam sampai Delapan Jam Post Partum

Mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri. Mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut. Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri. Pemberian ASI awal. Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi. Setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik.

b. Enam Hari Post Partum

Memastikan involusi uterus barjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan. Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir.

c. Dua Minggu Post Partum

Asuhan pada 2 minggu post partum sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari post partum yaitu Memastikan involusi uterus barjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan

perdarahan. Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir.

d. 6 Minggu Post Partum

Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas dan memberikan konseling KB secara dini (Suherni, dkk. 2013).

B. Tinjauan Umum Tentang Perdarahan

1. Pengertian

Perdarahan Postpartum adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah anak lahir. Termasuk perdarahan karena rest plasenta. Perdarahan postpartum adalah perdarahan dalam kala IV lebih dari 500-600 cc dalam 24 jam setelah anak dan plasenta lahir (Rukiyah, 2012).

2. Etiologi

Adapun penyebab-penyebab terjadinya perdarahan pada post partum yaitu :

- a. Atonia uteri
- b. Retensio plasenta
- c. Rest plasenta
- d. Robekan jalan lahir

3. Diagnosa Perdarahan Postpartum

Hemorraghe postpartum digunakan untuk persalinan dengan umur kehamilan lebih dari 20 minggu, karena apabila umur kehamilan kurang dari 20 minggu disebut sebagai aborsi spontan.

Beberapa gejala yang bisa menunjukkan hemorraghe postpartum :

- a. Perdarahan yang tidak dapat dikontrol
- b. Penurunan tekanan darah
- c. Peningkatan detak jantung
- d. Penurunan hitung sel darah merah (hematocrit)
- e. Pembengkakan dan nyeri pada jaringan daerah vagina dan sekitar perineum

Perdarahan hanyalah gejala, penyebabnya haruslah diketahui dan ditatalaksana sesuai penyebabnya. Perdarahan postpartum dapat berupa perdarahan yang hebat dan menakutkan sehingga dalam waktu singkat ibu dapat jatuh kedalam keadaan syok.

Pada perdarahan melebihi 20% volume total, timbul gejala penurunan tekanan darah, nadi dan napas cepat, pucat, extremitas dingin, sampai terjadi syok. Pada perdarahan sebelum plasenta lahir biasanya disebabkan retensio plasenta atau laserasi jalan lahir, bila karena retensio plasenta maka perdarahan akan berhenti setelah plasenta lahir. Pada perdarahan yang terjadi setelah plasenta lahir perlu dibedakan sebabnya antara atonia uteri, sisa plasenta, atau trauma jalan lahir. Pada pemeriksaan obstetrik kontraksi uterus akan lembek dan membesar jika ada atonia

uteri. Bila kontraksi uterus baik dilakukan eksplorasi untuk mengetahui adanya sisa plasenta atau laserasi jalan lahir.

Berikut langkah-langkah sistematis untuk mendiagnosa perdarahan postpartum:

- a. Palpasi uterus : bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri
- b. Memeriksa plasenta dan ketuban : apakah lengkap atau tidak
- c. Lakukan ekplorasi kavum uteri untuk mencari :
 1. Sisa plasenta dan ketuban
 2. Robekan rahim
 3. Plasenta succenturiata
- d. *Inspekulo* : untuk melihat robekan pada cervix, vagina, dan varises yang pecah.
- e. Pemeriksaan laboratorium : bleeding time, Hb, Clot Observation test dan lain-lain.

C. Tinjauan khusus tentang Rest plasenta

1. Pengertian

Ada beberapa pendapat tentang pengertian rest plasenta yaitu rest plasenta merupakan tertinggalnya bagian plasenta dalam uterus yang dapat menimbulkan perdarahan post partum primer atau perdarahan post partum sekunder (Karlina, dkk. 2016), selain itu sumber lain mengatakan bahwa rest plasenta adalah apabila setelah plasenta lahir masih terdapat perdarahan secara terus menerus, saat diperiksa kontraksi uterus ada, tetapi TFU tidak turun segera diperiksa kontraksi uterus ada, tetapi TFU tidak turun segera periksakan kelengkapan plasenta (Mochtar, 2012).

Demikian pula didalam buku Maartaadisoebrata (2013), rest plasenta adalah apabila kontraksi uterus jelek atau kembali lembek setelah kompresi bimanual ataupun masase dihentikan, bersamaan pemberian *uterotonica* lakukan eksplorasi. Penemuan secara dini, hanya dimungkinkan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta setelah dilahirkan. Pada kasus sisa plasenta dengan perdarahan pasca persalinan lanjut, sebagian besar pasien akan kembali lagi ke tempat bersalin dengan keluhan perdarahan setelah beberapa hari pulang kerumah dan subinvolisio uterus (Nugroho, T. 2012).

Sewaktu suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Tetapi mungkin saja pada beberapa keadaan tidak ada perdarahan dengan sisa plasenta (Puspita, A. 201).

2. Anatomi Plasenta

a. Bentuk dan ukuran

Adapun bentuk dan ukuran plasenta yaitu :

- 1) Plasenta berbentuk bundar atau oval
- 2) Ukuran berdiameter 15-20 cm, tebal 2-3 cm, berat 500-600 gram
- 3) Biasanya plasenta atau uri berbentuk lengkap pada kehamilan kira-kira 16 minggu, dimana ruang amnion telah mengisi seluruh rongga rahim

b. Letak uri dalam rahim

- 1) Letak uri normal uumn pada korpus bagian depan atau belakang agak keras fundus uteri

- 2) Bila letaknya pada bagian bawah dikatakan [lasenta revia parsial, marginal, dan totalis.

c. Pembagian Plasenta

Plasenta dibagi 2 bagian yaitu bagian fetal (janin) dan bagian maternal (bagian ibu) dimana bagian fetal terdiri dari korion frondosum dan vili, Bagian permukaan janin diliputi oleh amnion yang kelihatan licin, Di bawah bagian amnion ini berjalan cabang-cabang pembuluh darah tali pusat, Tali pusat akan berinsersi pada uri bagian permukaan janin dan adupun bagian maternal yaitu Terdiri atas desidua kompakta yang berbentuk dari beberapa lobus dan kotiledon (15-20 buah), Desidua basalis pada uri matang disebut lempeng korion dimana sirkulasi utero-plasenta, berjalan ke ruang-ruang intervili melalui tali pusat, Jadi sebenarnya peredaran darah ibu dan janin adalah terpisah

d. Pembagian plasenta

Pembagian plasenta terbagi dua yaitu plsenta menurut bentuknya dan plasenta menurut letaknya dimana plasenta menurut bentuknya terbagi enam yaitu:

- a) Plasenta normal
- b) Plasenta membranosa (tipis)
- c) Plasenta suksenturiata (1 lobus)
- d) Plasenta spuria
- e) Plasenta bilobus (2 lobus)
- f) Plasenta trilobus (3 lobus)

Sedangkan Menurut perlekatannya plasenta di bagi menjadi 4 bagian yaitu :

- a) Plasenta adhesive (melekat)
- b) Plasenta akreta (lebih melekat)
- c) Plasenta ankreta (lekat sampai ke otot polos)
- d) Plasenta perkreta (sampai serosa)

3. Mekanisme Lahirnya Plasenta

Menurut Mochtar (1998) fase-fase dalam pengeluaran plasenta meliputi:

1) Fase pelepasan plasenta

Terdapat 3 Cara Pengeluaran plasenta yaitu dengan menggunakan metode

Kustner: klein dan strassman adapun uariannya sebagai berikut :

- a) Mekanisme schultz: pelepasan plasenta yang dimulai dari sentral / bagian tengah sehingga terjadibekuan retroplasenta. &anda pelepasan dari tengah ini mengakibatkan peredaran tidak terjadi sebelumplasenta lahir. peredaran terjadi setelah placenta lahir
- b) Mekanisme *Duncan* : terjadi pelepasan placenta dari pinggir atau bersamaan dari pinggir dan tengahmengakibatkan semburan darah sebelum plasenta lahir

2) Fase pengeluaran plasenta

- a) *Kustner*: Dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada atau diatas simpisis, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat masuk berarti plasenta sudah lepas, tetapi bila diam atau maju berarti plasenta sudah lepas.
- b) Klein : Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit, bila tali pusat kembali berarti plasenta belum lepas, tetapi bila diam turun berarti plasenta sudah lepas.

c) *Strassman* : Tegangkan tali pusat dan ketok pada fundus, bila tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, tetapi bila tidak bergetar plasenta sudah lepas.(Jannah, 2012: 75)

4. Etiologi

Penyebab terjadinya rest plasenta antara lain:

- a. Pengeluaran plasenta tidak secara hati- hati, dimana plasenta dilahirkan tidak sesuai kurve jalan lahir
- b. Salah dalam pimpinan nkala III, terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta.
- c. Terjadi lingkaran konstriksi pada bagian bawah uterus (Lisnawati, 2013).

5. Gejala Klinik

Sewaktu suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Tetapi mungkin saja pada beberapa keadaan tidak ada perdarahan dengan sisa plasenta. Tertinggalnya sebagian plasenta (rest plasenta). Perdarahan pascapartum menggambarkan suatu peristiwa

- a. Gejala dan tanda yang selalu ada pada kasus rest plasenta yaitu

Terdapat 2 tanda dan gejala sering muncul pada rest plasenta adalah :

- 1) Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap.
- 2) Perdarahan segera yang terjadi setelah plasenta lahir.

- b. Gejala dan tanda kadang-kadang ada

Terdapat 2 gejala dan tanda yang kadang ada pada kasus rest plasenta yaitu :

1) Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang

Diagnosis biasanya tidak sulit, terutama apabila timbul perdarahan banyak dalam waktu pendek. Tetapi bila perdarahan sedikit dalam jangka waktu lama, tanpa disadari pasien telah kehilangan banyak darah sebelum ia tampak pucat. Nadi serta pernafasan menjadi lebih cepat dan tekanan darah menurun. Seorang wanita hamil yang sehat dapat kehilangan darah sebanyak 10% dari volume total tanpa mengalami gejala-gejala klinik.

2) Gejala-gejala baru tampak pada kehilangan darah 20%. Jika perdarahan berlangsung terus, dapat timbul syok. Diagnosis perdarahan pascapersalinan dipermudah apabila pada tiap-tiap persalinan setelah anak lahir secara rutin diukur pengeluaran darah dalam kala III dan satu jam sesudahnya. Apabila terjadi perdarahan pascapersalinan dan plasenta belum lahir, perlu diusahakan untuk melahirkan plasenta segera. Jika plasenta sudah lahir, perlu dibedakan antara perdarahan akibat atonia uteri atau perdarahan karena perlukaan jalan lahir (Karlina, 2016)

6. Diagnosis

Sisa plasenta bisa diduga bila kala uri berlangsung tidak lancar atau setelah melakukan plasenta manual atau menemukan adanya kotiledon yang tidak lengkap pada saat melakukan pemeriksaan plasenta dan masih ada perdarahan dari ostium uteri eksternum pada saat kontraksi rahim sudah baik dan robekan jalan lahir sudah terjahit (Lisnawati, 2013)

Diagnosis pada rest plasenta dapat ditegakkan berdasarkan:

- a) Palpasi uterus: bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri
- b) Memeriksa plasenta dan ketuban apakah lengkap atau tidak.
- c) Lakukan eksplorasi cavum uteri untuk mencari
 - 1) Sisa plasenta atau selaput ketuban
 - 2) Robekan rahim
 - 3) Plasenta suksenturiata (Mochtar, 2012)
- c. Inspekulo: untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan varises yang pecah
- d. Pemeriksaan Laboratorium periksa darah yaitu Hb, COT (Clot Observation Test), dll

7. Komplikasi

Perdarahan pasca persalinan ada kalanya merupakan perdarahan yang hebat dan menakutkan hingga dalam waktu singkat ibu dapat jatuh kedalam keadaan syok. Atau dapat berupa perdarahan yang menetes perlahan-lahan tetapi terus menerus yang juga bahaya karena kita tidak menyangka akhirnya perdarahan berjumlah banyak, ibu menjadi lemas dan juga jatuh dalam presyok dan syok. Karena itu, adalah penting sekali pada setiap ibu yang bersalin dilakukan pengukuran kadar darah secara rutin, serta pengawasan tekanan darah, nadi, pernafasan ibu, dan periksa juga kontraksi uterus perdarahan selama 1 jam (Mochtar, 2012). Selain itu perdarahan pasca persalinan juga dapat memudahkan terjadinya anemia yang berkelanjutan dan infeksi puerperium serta yang terburuk adalah terjadinya kematian akibat perdarahan post partum (Maartaadisoebrata, 2013)

8. Pencegahan

Pencegahan terjadinya perdarahan post partum merupakan tindakan utama, sehingga dapat menghemat tenaga, biaya dan mengurangi komplikasi upaya preventif dapat dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, sehingga tidak terjadi anemia dalam kehamilan.
- b. Melakukan persiapan pertolongan persalinan secara legeartis.
- c. Meningkatkan usaha penerimaan KB.
- d. Melakukan pertolongan persalinan di rumah sakit bagi ibu yang mengalami perdarahan post partum.
- e. Memberikan uterotonika segera setelah persalinan bayi, kelahiran plasenta dipercepat.

9. Penatalaksanaan

Beberapa ahli menganjurkan eksplorasi secepatnya, akan tetapi hal ini sulit dilakukan tanpa general anastesi kecuali pasien jatuh dalam syok. Jangan hentikan pemberian uterotonika selama dilakukan eksplorasi. Setelah eksplorasi lakukan masase dan kompresi bimanual ulang tanpa menghentikan pemberian uterotonika.

Menurut (Maartaadisoebrata, 2013) pertolongan khusus pada perdarahan post partum sekunder dengan rest plasenta adalah:

- a. Pemasangan infus dan pemberian uterotonika untuk mempertahankan keadaan umum ibu dan merangsang kontraksi uterus dan dapat mengakibatkan manual plasenta.

- b. Pemberian narkose ringan, seperti : Ketaiar, pentotal dan diprivan
- c. Persiapan kuretase diikuti dengan pemberian antibiotik.

Adapun terapi yang biasa digunakan (Mastiningsih, 2013):

- a. Pemasangan infus dan pemberian uterotonika untuk mempertahankan keadaan umum ibu dan merangsang kontraksi uterus.
- b. Kosongkan kandung kemih
- c. Berikan antibiotik untuk mencegah infeksi
- d. Antiobiotika ampisilin dosis awal 1 gr IV dilanjutkan dengan 3x1 gram per oral dikombinasikan dengan metrodinazol 1 gram suppositoria dilanjutkan dengan 3x500 mg.
- e. Oksitosin 1) Methergin 0,2 mg peroral setiap 4 jam sebanyak 6 dosis. Dukung dengan analgesik bila kram. 2) Mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit untuk dilatasi dan kuretase bila terdapat perdarahan.
- f. Observasi tanda – tanda vital dan perdarahan g. Bila kadar HB <8 gr % berikan tranfusi darah. Bila kadar Hb >8 gr%, berikan sulfas ferosis 600mg/hari selama 10 hari
- g. Keluarkan sisa plasenta dengan tangan, cunam ovum atau kuret besar
- h. Jika perdarahan berlanjut, lakukan uji pembekuan darah dengan menggunakan uji pembekuan darah sederhana. Kegagalan terbentuknya bekuan darah setelah 7 menit atau terbentuknya bekuan darah yang lunak yang mudah hancur menunjukkan adanya kemungkinan kuagulopati (Saifuddin, AB. 2010).

D. Tinjauan Islam Dalam Masa Nifas

Masa nifas adalah darah yang keluar pada saat sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta diikuti dengan tanda – tanda akan melahirkan seperti rasa sakit. Rasa sakit yang dimaksud disini adalah rasa sakit yang diikuti dengan proses melahirkan apabila darah keluar tidak disertai dengan proses persalinan / melahirkan maka darah tersebut tidak dinamakan darah nifas. Selain itu semua, dinamakan darah nifas apabila darah tersebut keluar setelah wanita melahirkan seorang bayi yang sudah berbentuk manusia, walaupun belum sempurna. Dan apabila seorang wanita mengalami keguguran dan bayi yang dikeluarkan belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar tidak disebut dengan darah nifas. Namun di hukuminya dengan darah *istihadah* (darah penyakit) yang tidak menghalangi shalat, puasa dan ibadah lainnya. Berikut adalah beberapa pengertian nifas menurut para Ulama:

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah: 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Kementrian Agama, RI. 2013).

Di dalam al- qur'an juga dijelaskan tentang makanan yang baik bagi ibu nifas seperti yang di terangkan dalam Qur'an Surah Maryam: 22-25

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ ۖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ
 النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِن
 تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
 تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Maka dia mengandungnya dan menyisihkan diri dengannya ketempat yang jauh maka, rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia ke pangkal pohon kurma ia berkata “aduhai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan”Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu 25. dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. (Kementrian Agama RI,AL-Qur'an Dan Terjemahnya,2012:306).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia menuju kepangkal pohon kurma untuk bersandar akibat gerakan yang sangat keras . desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit dari sini, kata tersebut di pahami dalam arti sakit yang mendahului kelahiran dan juga dalam ayat ini menjelaskan tentang kurma merupakan

makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas dan dalam persalinan karena ia muda di cerna, lezat dan mengandung kalori yang tinggi .

dan pada ayat diatas terlihat bagaimana Maryam as. yang dalam keadaan lemah itu masih di perintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk menggerakkan pohon guna memperoleh rezki walaupun boleh jadi pohon itu tidak dapat bergerak karena lemah fisiknya Maryam setelah melahirkan walaupun suasana ketika itu adalah suprasional ini sebagai isyarat kepada semua pihak untuk tidak berpangku tangan menanti datangnya rezki tetapi harus berusaha sepanjang kemampuan yang dimiliki (M.Quraish Shihab,2002: 429-434)

E. Tinjauan Islam tentang pekerjaan professionalisme

Berbicara soal profesi, maka perlu dipahami makna kata itu sendiri “professionalisme” merupakan sikap seorang professional, dan professional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, sebagai “profesi” dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Kata “profesi” berasal dari kata Yunani “*prophaino*” yang berarti “menyatakan secara publik” dan didalam bahasa latin disebut *professio* yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik.

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas syari’ah, sebagaimana dijelaskan dalam QS.At-Taubah 9:105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Kementerian Agama, RI. 2013)

Alqur'an

F .Pandangan islam tentang plasenta

Ari-ari atau plasenta secara medis berfungsi sebagai penyedia makanan dan saluran lainnya, yang menghubungkan antara janin dengan ibunya. Selama berbulan-bulan, plasenta ini sangat berguna bagi bayi di dalam rahim sang ibu. Namun begitu bayi lahir, maka perannya usai sudah. Namun, dalam masyarakat tertentu, ada semacam kepercayaan tertentu bahwa di balik fungsi medis, ada hubungan ‘ghaib’ tertentu antara bayi dengan plasentanya. Karena itu, sebagian masyarakat yang mewarisi tradisi kuno ini masih terlihat melakukan ritual yang tidak ada kaitannya dengan agama. Salah satunya adalah mengubur plasenta dekat rumah, bahkan harus diberi pelita (lampu). dan bersamanya juga di kuburkan benda-benda tertentu yang di percaya akan berpengaruh atas nasib dan kehidupan si bayi bila kelak dewasa.

Tentu saja tidak ada satupun dalil baik berupa potongan ayat alquran atau hadis nabawi, tentang masalah menanam ari-ari. Bahkan hadis yang paling dhaif atau

bahkan hadis palsu sekalipun sama sekali tidak pernah memuat masalah ini. Jadi ritual ini betul-betul produk lokal, jauh dari bau-bau islam dan syariatnya tak satu ayat quran menyebutkannya, tidak satupun hadis nabi menyinggungnya dan tidak ada dalam syariat islam tentang aturan mainnya, sementara dari sisi akidah yang bersih kepercayaan antara ada hubungan ghaib plasenta dengan nasib seseorang, jelas telah melanggar wilayah syirik. Sehingga ritual tertentu yang dilakukan terhadap plasenta ini sangat mengganggu hubungan kita dengan Allah SWT.

Kalau sekedar mengubur plasenta didalam tanah, tanpa niat apapun kecuali untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan, tentu boleh dan baik. Sebab plasenta itu akan segera membusuk bila tidak segera di kubur. (rumah fiqih ahmad sarwad, Lc,2017)

G. Standar Pelayanan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada pasien rest plasenta melibatkan 2 standar asuhan pelayanan yaitu standar 14 dan standar 15 adapun uraian untuk kedua standar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standar 14: Penanganan pada dua jam pertama setelah persalinan

Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan

2. Standar 15: Pelayanan Bagi Ibu dan Bayi Pada Masa Nifas

Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjunga rumah pada hari ketiga, minggu kedua dan minggu keenam setelah persalinan, untuk

membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI serta imunisasi KB.

F. Tinjauan Umum tentang Manajemen Asuhan Kebidanan

a. Pengertian

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangka tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien.

b. Prinsip-prinsip manajemen kebidanan

Adapun prinsip-prinsip manajemen kebidan terbagi atas 9 yaitu :

1. Secara sistematis mengumpulkan dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan dengan melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien, termasuk mengumpulkan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik.
2. Mengidentifikasi masalah dan membuat diagnose berdasarkan interpretasi data dasar.
3. Mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kebidanan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan tujuan asuhan kebidanan bersama klien.

4. Memberi informasi dan support sehingga klien dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya.
 5. Membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien.
 6. Secara pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individu.
 7. Melakukan konsultasi, perencanaan dan melaksanakan manajemen dengan kolaborasi dan merujuk klien untuk mendapatkan asuhan selanjutnya.
 8. Merencanakan manajemen terhadap komplikasi tertentu, dalam situasi darurat dan bila ada penyimpangan dari keadaan normal.
 9. Melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan dan merevisi rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses manajemen kebidanan

Adapun proses manajemen asuhan kebidanan menurut varney 2003 yaitu :

a. Langkah I. Pengumpulan dan Analisa Data.

Pada langkah pertama dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara: Data yang dikaji meliputi subjektif dan data objektif. Data subjektif di dapat langsung dari pasien atau keluarganya seperti identitas pasien, riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, dll. Sedangkan data objektif diambil melalui pemeriksaan baik pemeriksaan umum yaitu tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan dan tanda – tanda vital, pemeriksaan khusus yaitu memeriksa kondisi klien pasca melahirkan, dan pemeriksaan penunjang

Dari kasus rest plasenta data subyektif yang didapat yaitu ibu mengatakan bahwa ada pengeluaran darah dari jalan lahir, nyeri perut bagian bawah. dan data objektif terlihat keadaan umum ibu samnolent, pada pemeriksaan fisik yaitu konjungtiva pucat, pemeriksaan dalam terdapat bagian-bagian plasenta dan dari hasil USG terdapat bagian plasenta dalam rahim.

b. Langkah II. Merumuskan Diagnosis/Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosis dan masalah digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis akan tetapi tetap membutuhkan penanganan. Pada kasus ini masalah aktual yaitu post partum hari ke 3 dengan rest plasenta.

c. Langkah III. Merumuskan Diagnosis/Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah ditetapkan pada langkah II. Dari kumpulan masalah dan diagnosis, identifikasi faktor-faktor potensial yang memerlukan antisipasi segera tindakan pencegahan dan persiapan untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sambil menunggu dan mempersiapkan pelayanan untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi Dari data diatas tidak ada masalah potensial yang terjadi.

Pada kasus ini masalah potensial yang akan terjadi yaitu anemia pada ibu post partum.

d. Langkah IV. melaksanakan Tindakan Segera (Emergency), Konsultasi, Kolaborasi dan Rujukan

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera konsultasi, kolaborasi atau rujukan sesuai dengan kondisi klien. Proses manajemen kebidanan dilakukan secara kontinyu sehingga menghasilkan data baru yang segera harus dinilai. Jika data yang muncul menggambarkan suatu keadaan darurat maka bidan harus bertindak segera untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi.

Pada kasus rest plasenta dibutuhkan kolaborasi dengan dokter untuk dilakukan USG dan pemeriksaan selanjutnya.

e. Langkah V. Perencanaan tindakan asuhan kebidanan.

Pada langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi

Dikembangkan berdasarkan identifikasi saat sekarang dan antisipasi diagnosis. Rencana tindakan keadaan klien, hubungannya dengan masalah yang dialami, antisipasi bimbingan klien dan bila perlu konseling mengenai ekonomi, agama, budaya maupun psikologi. Rencana tindakan berdasarkan persetujuan dari klien yang sudah didiskusikan sebelumnya. Semua tindakan diambil secara rasional,

relevan dan diakui kebenarannya serta sesuai situasi dan kondisi dimana tindakan harus dapat diambil secara teoritis.

Pada kasus rest plasenta rencana tindakan yang dilakukan yaitu konseling pada untuk dilakukannya kuretase.

f. Langkah VI. Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah V dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien.

Implementasi dapat dikerjakan secara keseluruhan oleh bidan ataupun kerjasama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus bertanggung jawab pada tindakan langsung atau tindakan konsultasi dan kolaborasi. Implementasi yang efisien akan mengurangi waktu dan biaya perawatan serta peningkatan kualitas pelayanan pada klien. Pada kasus rest plasenta melakukan tindakan kuretase untuk mengeluarkan sisa-sisa plasenta dengan tujuan mencegah terjadinya perdarahan post partum.

g. Langkah VII. Evaluasi Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ke VII dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan. Apakah benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam diagnosis dan masalah

Langkah akhir manajemen kebidanan adalah evaluasi, namun sebenarnya evaluasi dilakukan pada setiap langkah manajemen kebidanan. pada tahap evaluasi, bidan harus mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien itu tercapai. Pada prinsipnya tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap

klien untuk menjawab pertanyaan klien seberapa jauh tercapainya rencana yang telah dilakukan (varney 2001).

4. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian dalam asuhan kebidanan menggunakan pendekatan

SOAP terdiri atas empat langkah yang disajikan dalam manajemen kebidanan.

a. Subjektif (S)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I varney.

b. Objektif (O)


Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, pemeriksaan penunjang untuk mendukung asuhan yang telah diberikan sebagai langkah I varney. data Objektif ibu dalam keadaan baik tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU setinggi pusat, nampak pengeluaran *lochea rubra*.

c. Assesment (A)

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi sebagai langkah 2, 3 dan 4 varney. Diagnosa nifas normal dapat ditegakan dengan cara anamnesis secara lengkap, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang

d. Planning (P)

Menggambarkan pendokumentasian dari hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian asuhan yang telah diberikan sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney



Gambar 2.6: Alur Pikir Manajemen Kebidanan Dalam SOAP

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY “F”
DENGAN PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 02-04 SEPTEMBER 2017

No. Register : 51xxxx
Tanggal MRS : 01 September 2017 Jam 23:30 WITA
Tanggal Partus : 02 September 2017 Jam 02:20 WITA
Tanggal Pengkajian : 02 September 2017 Jam 02:20 WITA
Pengkaji : Nurhikma

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

A. Identitas Istri/Suami

Nama : NY "F"/Tn "R"
Umur : 28 tahun/30 tahun
Nikah : 1 kali / ± 4 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMA/SMA
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jln Mangka Dg Bombong

A.Data Subjektif

1. Ibu melahirkan tanggal 02 September 2017 jam 02.20 WITA
2. Ibu merasakan banyak darah keluar dari jalan lahir sekitar jam 04.30 WITA (\pm 3 jam) setelah ibu dipindahkan ke ruang perawatan nifas.
3. Ibu Merasa pusing dan lemah
4. Riwayat Persalinan yang lalu

Tahun	Tempat Pesalinan	Diagnosa Persalinan	Penolong	Data Bayi				Nifas
				Berat Badan	Panjang Badan	Sex	APGAR Score	
2014	Rumah Sakit Syekh Yusuf	-Spontan -Presentase belakang kepala -Hidup -Tunggal -Sesuai masa kehamilan -Bayi cukup bulan	Bidan	2700 Gram	49 cm	Laki-laki	Niai APGAR score tidak diketahui, namun menurut ibu bayinya menangis kuat.	Tidak ada keluhan perdarahan, riwayat penyembuhan baik.

Tabel 3.1 riwayat persalinan (Sumber Data Primer)

5. Data Ibu merasa cemas dengan keadaannya
6. Ibu dan keluarga senang dengan kelahiran bayi
7. Keluarga mengharapkan agar ibu cepat sehat dan pulang ke rumah
8. Ibu selalu berdoa kepada Allah SWT, agar diberikan kesehatan bagi dirinya, bayinya dan seluruh keluarganya
9. Penghasilan suami cukup untuk biaya sehari-hari

10. Ibu melakukan pekerjaan rumah dibantu oleh suaminya
11. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun
12. Ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius
13. Ibu tidak sedang menderita penyakit apapun
14. Ibu tidak memiliki alergi terhadap obat dan juga makanan
15. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) GIPIA0
- 2) HPHT : 28-11-2016
- 3) HTP 04-09-2017
- 4) Usia kehamilan 39 minggu 5 hari
- 5) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.

- 6) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di RSUD Syekh Yusuf Gowa

Trimester I : 2x

Trimester II : 2x

Trimester III : 2x

- 7) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT)

TT 1 : 14-01-2017

TT 2 : 14-02-2017

- 8) Keluhan-keluhan:

Trimester I : mual muntah dipagi hari

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

9) Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya

16. Riwayat persalinan sekarang

1) Tahapan kala I ibu sebagai berikut :

a. Ibu merasakan sakit perut tembus belakang tanggal 01 september 2017 jam 08.00

WITA

b. Masuk rumah sakit tanggal 01 september 2017 jam 23. 30 WITA

c. Hasil VT I jam 23:30 WITA tanggal 01 september 2017

Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

Portio : lunak sedang

Pembukaan : 7 cm

ketuban : utuh

Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang

Penurunan : hodge III

Penumbungan : 0

Molase : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelparsan : lendir dan darah

d. Hasil pemeriksaan dalam jam 02.05 WITA

Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 Portio : melelap
 Pembukaan : 10 cm
 Ketuban : jernih
 Presentasi : uuk kanan lintang
 Penurunan : hodge IV
 Molase : 0
 Penumbungan : tidak ada
 Kesan panggul : normal
 Pelepasan :lendir dan darah dan air

e. Lamanya kala I \pm 7 jam

f. Ketuban masih utuh

2) Tahapan Kala II ibu sebagai berikut

a. Melahirkan tanggal 02 september 2017jam 02.20 WITA

b. Jenis persalinan normal, presentase belakang kepala,spontan, dan sesuai masa kehamilan Berat badan lahir: 3100 gram Panjang badan :49 cm
 Apgar Skor: 8/10

c. Hasil VT II jam 02.05 WITA

Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 Portio : melelap
 Pembukaan : 10 cm

Ketuban : jernih
Presentasi : uuk kanan lintang
Penurunan : hodge IV
Molase : 0
Penumbungan : tidak ada
Kesan panggul : normal
Pelepasan : lendir dan darah dan air

d. Lamanya kala II \pm 15 menit

3) Adapun tahapan Kala III ibu sebagai berikut :

- a. Plasenta lahir kesan tidak lengkap 02:25 WITA karena ketika dilakukan pemeriksaan pada kotiledon didapatkan jumlah kotiledon sebanyak 15 kurang dari jumlah normal (16-18)
- b. Terdapat pengeluaran darah yang menggumpal ketika dilakukan eksplorasi
- c. Perdarahan \pm 250 cc
- d. TFU STP, kontraksi uterus kurang baik, teraba lembek.
- e. Terjadi ruptur pada perineum tingkat II dan telah dilakukan penjahitan dengan tehnik jelujur oleh bidan menggunakan benang cutgut

4) Adapun proses Kala IV Ibu Berlangsung Normal yaitu sebagai berikut:

Jam	Waktu (Wita)	TD (mmHg)	N (x/i)	S (°C)	TFU	Kontraksi Uterus	Kandung kemih	perdarahan
I	02.40	110/70	88 Teratur	36,8 Axiler	STP	baik	Kosong	±100 cc
	02.55	110/70	85 Teratur		STP	Baik	Kosong	±50 cc
	03.10	110/70	84 Teratur		STP	baik	Ibu berkemih dengan kateter nelaton sebanyak 150 cc	±50 cc
	03.25	110/70	82 Teratur		STP	baik	Kosong	±50 cc
II	03.55	110/70	80 Teratur	37	STP	baik	Kosong	±30 cc
	04.25	110/70	80 Teratur		STP	baik	Ibu berkemih dengan kateter nelaton sebanyak 150 cc	±20 cc

3.2 Pemantauan Kala IV (Sumber Data Murni).

ibu di pindahkan ke ruang niifas jam 04.30 wita

B. Data objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi wajah nampak lesu
4. TFU 1 jari diatas pusat, kontraksi uterus kurang baik teraba lembek dan lunak
6. terdapat pengeluaran darah yang cukup banyak dari jam 04.40 sebanyak \pm 500cc
5. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah :110/70mmHg
 - Nadi :88x/m Teratur
 - Pernafasan :24 x/m Teratur
 - Suhu :37 °c Axiler

a. Mata

Inspeksi : Konjungtiva pucat, tidak ada oedema

b. Wajah

Inspeksi :Ekspresi wajah cemas, pucat, tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedeme

c. Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Pulpasi : Tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI

d. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus kurang baik , uterus tidak teraba bundar dan keras, TFU 1 Jrpst, kandung kemih kosong.

e. Genetalia

Inspeksi : Tidak ada varices, tampak pengeluaran darah segar dan abnormal , tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah

Palpasi : Tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum

f. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : Tidak ada oedema

g. Pemeriksaan laboratorium

Praeksplorasi tanggal 02 september 2017 , Hb 11 gram%,

h. Hasil pemeriksaan usg

Oleh dokter Obgyn : dr.R.A

Tanggal 02 september 2017 jam 07.15 wita

Hasil : tampak sisa jaringan plasenta

Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa : post partum hari I ,rest plasenta.

1. Post partum hari I

Data Subjektif : Ibu mengatakan melahirkan tanggal 02 september 2017 pukul 02.20 WITA

: Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah

Data objektif : Tinggi fundus uteri setinggi pusat

: Kontraksi uterus kurang baik, teraba lunak

: terdapat luka jahitan pada perineum dan masih tampak basah

: pengeluaran lochia rubra

Analisa dan interpretasi data

Post partum hari pertama yaitu mulai lahirnya bayi tanggal 02 september 2017 jam 14.20 WITA sampai tanggal pengkajian tgl 02 september 2017 13.05 WITA. Setelah janin dilahirkan fundus uteri kira-kira 1 jrbpst.

Lokhia adalah sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas. Pada hari pertama dan kedua lochia rubra atau lochia kuenta, terdiri atas darah segar bercampur sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, sisa-sisa verniks caseosa, lanugo dan mekonium. (Rukiyah, dkk. 2012).

2. Rest plasenta

Data subjektif : Ibu merasakan banyak darah keluar dari jalan lahir sekitar jam 04.30 WITA

: Ibu merasa pusing dan lelah

Data objektif : Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir \pm 500 cc

- : Plasenta lahir kesan tidak lengkap
- : TFU meningkat dari STP menjadi setinggi pusat 1 Jari atas pusat
- : Kontraksi uterus teraba lunak dan tidak teraba bundar berubah semula dari teraba bundar dan keras

Analisa dan interpretasi data

Sewaktu suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Tetapi mungkin saja pada beberapa keadaan tidak ada perdarahan dengan sisa plasenta. Tertinggalnya sebagian plasenta (rest plasenta). Berikut ini adalah penjelasan lanjut mengenai penegekan diagnosa rest plasenta :

- a. Gejala dan tanda yang selalu ada pada kasus rest plasenta yaitu
 1. Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap.
 2. Perdarahan segera yang terjadi setelah plasenta lahir.
- b. Gejala dan tanda kadang-kadang ada

Terdapat 2 gejala dan tanda yang kadang ada pada kasus rest plasenta yaitu :

 1. Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang. Diagnosis biasanya tidak sulit, terutama apabila timbul perdarahan banyak dalam waktu pendek. Tetapi bila perdarahan sedikit dalam jangka waktu lama, tanpa disadari pasien telah kehilangan banyak darah sebelum ia tampak

pucat. Nadi serta pernafasan menjadi lebih cepat dan tekanan darah menurun. Seorang wanita hamil yang sehat dapat kehilangan darah sebanyak 10% dari volume total tanpa mengalami gejala-gejala klinik.

2. Gejala-gejala baru tampak pada kehilangan darah 20%. Jika perdarahan berlangsung terus, dapat timbul syok. Diagnosis perdarahan pascapersalinan dipermudah apabila pada tiap-tiap persalinan setelah anak lahir secara rutin diukur pengeluaran darah dalam kala III dan satu jam sesudahnya. Apabila terjadi perdarahan pascapersalinan dan plasenta belum lahir, perlu diusahakan untuk melahirkan plasenta segera. Jika plasenta sudah lahir, perlu dibedakan antara perdarahan akibat atonia uteri atau perdarahan karena perlukaan jalan lahir (Karlina, 2016)

Langkah. III Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Potensial terjadinya syok hipovolemik, Anemia, infeksi puerperium.

1. Syok hipovolemik

Data subjektif

- 1) Ibu mengeluh mengeluarkan darah yang banyak dari jalan lahir
- 2) Ibu mengeluh pusing dan lemah

Data objektif

- 1) Nampak keluar darah yang banyak dari jalan lahir
- 2) Hb 11 gram %
- 3) Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80x/menit Teratur
 Pernafasan : 24x/menit Teratur
 Suhu : 37°c Axiller

Analisa dan interpretasi data

Darah mengandung sel eritrosit yang terdiri dari hemoglobin untuk mengikat O₂. Adanya darah yang terus menerus mengalir keluar mengakibatkan suplai O₂ keotak berkurang yang menyebabkan ibu pusing dan lemah serta akibatnya apabila hal tersebut tidak di tangani dengan segera maka perdahhan akan makin banyak dan dapat menyebabkan pasien mengalami syok hipovolemik.(Rukiyah, 2012).

2. Anemia

Data subjektif

1. Ibu mengeluh mengeluarkan darah yang banyak dari jalan lahir
2. Ibu mengeluh pusing dan lemah

Data objektif

1. Nampak keluar darah yang banyak dari jalan lahir
2. Hb 11 gram %
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80x/menit Teratur

Pernafasan : 24x/menit Teratur

Suhu : 37°c Axiller

Analisa dan interpretasi data

Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel merah (eritrosit) dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Kadar hemoglobin normal umumnya berbeda dari laki-laki dan perempuan. Untuk pria, anemia biasanya kadar hemoglobin kurang dari 13,5 gram/100ml dan pada wanita sebagai hemoglobin kurang dari 12,0 gram/100ml (Proverawati 2011: 1).

3. Infeksi Puerperium

Data subjektif

1. Ibu mengatakan terdapat luka jahitan

Data objektif

1. Terdapat luka jahitan yang masih basah

Analisa dan interpretasi data dasar

Infeksi *peurperium* atau infeksi pada masa nifas yang di sebabkan oleh kuman yang masuk melalui organ genetalia pada saat persalinan dan masa nifas, infeksi ini di sebabkan oleh *bakteri traktus genetalia* yang terjadi setelah melahirkan dan di tandai dengan meningkatnya suhu tubuh menjadi 38°C atau lebih selama dua hari.

Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi Jam 03.05 wita

1. Masasse pada fundus uteri jam 02.20 WITA

Rasional: Dengan melakukan masase maka akan merangsang uterus berkontraksi

2. Eksplorasi cavum uteri

Rasional: Ekspolorasi cavum uterimerupakan tindakan untuk membersihkan sisa-sisa plasenta yang tertinggal atau sisa jaringan plasenta yang melekat sehingga mengurangi perdarahan

3. Pemasangan infus RL + oxytosin 20 unit, 40 tetes/menit

Rasonal:Cairan yang di berikan melalui intravena dapat membantu mengganti cairandalam tubuh yang keluar terlalu banyak. Uterotonika akan merangsang resport yang terletak dalam miometrium untuk berkontraksi sehingga mengurangi perdarahan.

4. Lakukan USG (ultrasonografi)

Rasional: Dengan melakukan USG dapat mengetahui sisa jaringan yang tertinggal di kavum uteri

5. Lakukan kuretase

Rasional:Kuretase dilakukan untuk membersihkan sisa jaringan yang terdapat pada cavum uteri yang lebih bersih dan hanya boleh di lakukan oleh dokter.

Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Diagnosa : Post Partum Hari 1

Rest plasenta

Masalah aktual : Kecemasan

Masalah potensial : Potensial terjadi syok hipovolemik, anemia, infeksi peurperium.

Tujuan : Post partum hari pertama berlangsung normal

Perdarahan post partum akibat rest plasenta dapat teratasi

Tidak terjadi syok hipovolemik

Tidak terjadi anemia

Tidak terjadi infeksi periperium

Ibu tidak cemas

1. Kriteria

a. Perdarahan berkurang /sedikit

b. Sisa plasenta dapat dikeluarkan dari cavum uteri

c. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras.

d. TFU Turun 1 cm setiap hari

e. Tidak Terlihat Tanda -Tanda Infeksi Pada Luka Jahitan

f. Luka jahitan tidak tampak merah, tidak ada pus.

g. Tidak terjadi syok hipovolemik

h. Tidak terjadi anemia

i. Pengeluaran lochia normal

j. Hb 11 gram

k. Tidak ada tanda-tanda infeksi seperti

- 1) Merah
- 2) Bengkak
- 3) Bernanah
- 4) Panas

l. Tanda-tanda vital dalam batas normal

- 1) Tekanan darah : Sistol : 100-130 mmHg
: Diastol: 60 – 90 mmHg

- 2) Nadi : 80-100x/menit
- 3) Suhu : 36,5^oc – 37,5⁰c
- 4) Pernapasan : 16-24x/menit

Rencana tindakan :

1. Jelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan

Rasional: Dengan memberikan penjelasan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, pasien akan lebih mengerti dan mau diajak kerja sama untuk melakukan tindakan tersebut agar dapat berjalan lancar.

2. Observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital setiap 4 jam

Rasional: Observasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu dan mempermudah melakukan tindakan.

3. Observasi tetesan infus setiap 2 jam

Rasional: Untuk mengetahui dan mempertahankan jumlah tetesan cairan infus.

4. Observasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus setiap 30 menit

Rasional: Untuk mengetahui jumlah perdarahan, membuat diagnosa banding dan menentukan jumlah penggantian. Untuk menentukan peningkatan kontraksi uterus, dan sebagai dasar untuk menentukan perawatan selanjutnya.

5. Ajarkan pada ibu untuk melakukan masase fundus uteri

Rasional: Untuk membantu memperbaiki kontraksi uterus

6. Beri penjelasan tentang keadaan yang dialaminya

Rasional: Agar ibu mengerti dapat menerima keadaannya

7. Beri intake yang adekuat

Rasional: Intake yang adekuat dapat mengembalikan kehilangan cairan tubuh akibat perdarahan dan memulihkan tenaga ibu.

8. Jelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuretase, jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 02 september 2017, pukul 10:00 WITA.

Rasional: dengan penjelasan kepada klien/keluarganya diharapkan dapat menyetujui rencana tindakan kuret dan ibu dapat menyiapkan fisik dan psikis.

9. Infomed consent untuk pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: sebagai pernyataan persetujuan dari ibu/keluarga untuk tindakan dan sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan bidan dalam melakukan tindakan.

10. Persiapan pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: dengan persiapan yang dilakukan yakni dengan persiapan alat, penolong dan persiapan pasien maka akan memudahkan dalam melakukan prosedur kerja sesuai dengan protap.

11. Bantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Rasional: mengatur posisi yang diinginkan akan memberikan rasa nyaman pada ibu.

12. Beri kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya.

Rasional: dengan mengungkapkan perasaannya dan mendengarkan keluhannya klien akan merasa diperhatikan sehingga ia akan lebih tenang

13. Beri dorongan spiritual kepada ibu

Rasional: dengan dorongan spiritual memberikan ketenangan hati bahwa segala tindakan yang diberikan untuk proses penyembuhan dan tetap berdoa kepada yang maha kuasa.

14. Libatkan orang terdekat klien selama perawatan

Rasional: klien akan merasa nyaman dan aman bila didampingi oleh orang terdekatnya khususnya suami.

15. Anjurkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan mengganti doek atau pembalut setiap kali basa.

Rasional: dengan menjaga kebersihan diri akan memberi rasa nyaman dan mencegah berkembangnya kuman pathogen penyebab infeksi.

16. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi buah kurma

Rasional : karena kurma mengandung protein dan vitamin yang baik untuk ibu yang mengeluarkan banyak darah pasca bersalin.

17. Menganjurkan ibu untuk memperbanyak beristigfhar

Rasional : dalam sebuah hadist mengatakan barang siapa yang memperbanyak beristigfhar, jika dia dalam kesusahan maka Allah akan memberikan jalan baginya.

Langkah VI. Melaksanakan Tindakan Asuhan Kebidanan

Tanggal 02 september 2017 jam 10.00 wita

1. Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia dilakukan tindakan

2. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital setiap 4 jam

Hasil tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80x/menit Teratur

Pernafasan : 24x/menit Teratur

Suhu : 36⁰c Axiler

3. Mengobservasi tetesan infus setiap 2 jam.

Hasil: tetesan infus 40 kali/ menit.

4. Mengobservasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus setiap 30 menit.

Hasil: kontraksi uterus tidak baik uterus tidak teraba bundar dan keras

5. Mengajarkan pada ibu untuk melakukan masase fundus uteri.

Hasil: ibu bersedia melakukan masase fundus uteri dengan cara menggunakan empat jari palmar

6. Memberi penjelasan tentang keadaan yang dialaminya

hasil: ibu telah mengetahui keadaannya bahwa keadaannya kurang baik

7. Memberi intake yang adekuat.

Hasil: ibu telah diberikan minum

8. Melakukan kuret, jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 02 september 2017 jam 10.00 WITA.

Hasil: ibu/keluarga mengerti dan setuju, maka akan dilakukan tindakan kuretase

9. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pelaksanaan tindakan kuretase.

Hasil : dokter bersedia melakukan kuretase pada tanggal 02 september pada jam 10.00 WITA.

10. Melakukan *informend concent* pada ibu dan suami untuk dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 02 september 2017 jam 10.00 WITA.

Hasil: suami setuju dan telah menandatangani persetujuan tindakan kuret, rencana kuret tanggal 03 september 2017, pukul 10:00 WITA.

11. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretasi yakni berupa persiapan alat, penolong dan persiapan pasien.

a) Persiapan alat kuret

Adapun persiapan kuret yaitu :

- 1) Handscoon 2 pasang
- 2) Kain kasa secukupnya
- 3) Duk steril 1 buah
- 4) Kateter 1 buah
- 5) Spekulum anterior dan posterior
- 6) Tampongtan
- 7) Tenakulum
- 8) Sonde uterus
- 9) Abortus tang
- 10) Kuret tajam dan kuret tumpul
- 11) Kapas DTT
- 12) Larutan betadin

13) Menyiapkan obat –obatan sesuai dengan instruksi dokter.

b) Persiapan penolong

Adapun persiapan penolong yaitu :

- 1) Masker
- 2) Celemek
- 3) Kacamata
- 4) Tutup kepala
- 5) Sepatu boot

c) Persiapan alat-alat lain

- 1) Tempat darah
- 2) Tempat sampah
- 3) Larutan klorin
- 4) Lampu sorot
- 5) Tabung oksigen

d) Persiapan pasien

Hasil: persiapan kuret telah lengkap

12. Membantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Hasil: ibu merasa nyaman dengan posisinya sekarang dengan posisi berbaring miring kiri.

13. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya.

Hasil: ibu meraa tenang telah mengungkapkan perasaannya

14. Memberi dorongan spiritual kepada ibu

Hasil: ibu mengerti dan tampak mulai berdoa

15. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan

Hasil: klien didampingi oleh suami

16. Mengajarkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan mengganti pembalut setiap kali basah.

Hasil: ibu mengerti dan melakukannya

17. Mengajarkan ibu untuk mengonsumsi buah kurma

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan

18. Mengajarkan ibu untuk memperbanyak istigfhar

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan

Langkah VII . Evaluasi Tindakan Asuhan Kebidanan

Tanggal 02 september 2017, jam 12.05 wita

1. Ibu di pindahkan keruang Post natal care pada jam 13.05 setelah dilakukan kuretase dari jam 10.00 sampai 12.00
2. Perdarahan aktif sudah tidak ada atau sudah teratasi ditandai dengan TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik yaitu fundus teraba keras dan bundar.
3. Kecemasan teratasi ditandai dengan Ibu dapat beradaptasi dengan keadaannya
4. Sisa plasenta dapat dikeluarkan seluruhnya dan uterus kosong
5. Syok hipovolemik tidak terjadi ditandai dengan

Tanda – tanda vital

Tekanan darah :110/70 mmHg

Nadi : 80 x/menit Teratur

suhu : 36°c Axiler

Pernapasan : 22 x/menit Teratur

6. Tidak terjadi anemia di tandai dengan

Hb 11 gr.



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM HARI

IPADA NY "F" DENGAN PERDARAHAN AKIBAT REST PLASENTA

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 02 SEPTEMBER 2017

No. Register : 51xxxxx
Tgl. MRS : 01 september 2017 jam 23.30 WITA
Tgl. Partus : 02 september 2017 jam 02.20 WITA
Tgl. Pengkajian : 02 September 2017 jam 02.20 WITA
Pengkaji : Nurhikma

A. Identitas istri/suami

1. Nama : Ny "F"/Tn "R"
2. Umur : 28 tahun/30 tahun
3. Nikah : 1 kali /± 4 tahun
4. Suku : Makassar / Makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : SMA / SMA
7. Pekerjaan : IRT / WiraSwasta
8. Alamat : Jln.Mangka dg bombong

B. Data Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan tanggal 02 september 2017.jam 02.20 WITA
2. Ibu merasakan banyak darah keluar dari jalan lahir
3. Ibu merasa pusing dan lemah

C. Data Objektif (O)

1. Tanggal pengkajian 02 September 2017 jam 02.20 WITA
2. Tampak keluar darah banyak dari jalan lahir lebih dari 250 cc
3. Kontraksi uterus tidak keras dan tidak bundar
4. Tanda-tanda vital

TD : 110/70 mmHg

N : 80x/menit Teratur

S : 37⁰C Axiler

P : 24x/menit Teratur

5. Hb: 11 gr %

D. Assesment (A)

Diagnosa : Perdarahan post partum hari 1

Rest plasenta

Masalah potensial : Potensial terjadinya syok hipovolemik, anemia dan infeksi perurperium

E. Planning (P)

Tanggal 02 september 2017 jam 10.00 WITA

1. Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan

Hasil : Ibu mengerti dan mau diajak kerja sama untuk tindakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : TD : 110/70 mmHg

N : 83x/menit Teratur

S : 36⁰C Teratur

P : 24x/menit Teratur

3. Mengobservasi tetesan infus

Hasil : Tetesan infus 40 tetes/menit

4. Mengobservasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus

Hasil : Jumlah perdarahan lebih dari 250 cc dan kontraksi uterus lemah dan tidak teraba bundar

5. Mengajarkan pada ibu untuk melakukan masase fundus uteri

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukannya

6. Memberikan penjelasan pada ibu tentang keadaan yang dialaminya

Hasil : Ibu mengerti dan mau menerima keadaannya

7. Memberi intake yang adekuat

Hasil : Tenaga ibu sudah mulai pulih kembali

8. Memberikan obat sesuai dengan instruksi dokter yaitu amoxan 1 tablet (500 mg) dan nufagrobin 1 tablet (500 mg)

Hasil : Ibu bersedia meminum obat yang diberikan 1 kali sehari.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM HARI KE II
PADA NY “F” DENGAN POST KURETASE REST PLASENTA
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA HARI KEDUA
TANGGAL 03 SEPTEMBER 2017**

No. Register : 51xxxx
Tgl. MRS : 02 september 2017 jam 23.30 WITA
Tgl. Partus : 02 september 2017 jam 02.20WITA
Tgl. Pengkajian : 03 September 2017 jam 08.00 WITA
Pengkaji : Nurhikma

A. Identitas istri/suami

1. Nama : Ny “F”/Tn “R”
2. Umur : 28 tahun/30 tahun
3. Nikah : 1 kali /± 1 tahun
4. Suku : Makassar / Makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : SD / SD
7. Pekerjaan : IRT / Swasta
8. Alamat :Jln.Mangka dg bombong

B. Data Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan tanggal 02 september 2017,jam 02.20 WITA
2. Ibu mengatakan bahwa telah dilakukan kuretase mulai jam 10.00-12-00 WITA

3. Ibu sudah tidak merasa pusing
4. Ibu tidak mengeluh nyeri pada perineumnya
5. Ibu mengatakan pengeluaran darah sudah tidak banyak
6. Ibu masih merasa senang dengan kelahiran bayinya
7. Ibu sudah mulai menyusui bayinya
8. Asi sudah mulai keluar tapi belum lancar
9. Ibu telah BAB sebanyak satu kali berwarna kuning dan padat
10. Ibu telah BAK sebanyak dua kali berwarna kekuningan dan ibu tidak merasa nyeri saat berkemih

C. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran kompos mentis
3. TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar
4. Tampak pengeluaran lochia rubra
5. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan Darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 80 x/menit teratur
 - c. Suhu : 37,2⁰C axiler
 - d. Pernapasan : 22 x/menit teratur
6. Tampak luka perineum yang masih basah
7. Tidak ada tanda-tanda infeksi
8. Hb : 11 gr %

9. Kongjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus

D. Assesment (A)

1. Diagnosa Post partum hari ke II, post kuretase hari ke I

E. Planning (P)

Tanggal 03 September 2017 jam 08.30 WITA

1. Menjelaskan pada pasien tentang tindakan penanganan masa nifas secara umum

Hasil : Ibu mengerti dan mau diajak kerja sama untuk tindakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : TD : 110/80 mmHg

N : 80 x/menit teratur

S : 37⁰C axiler

P : 22 x/menit teratur

3. Mengobservasi tetesan infus

Hasil : Tetesan infus RL 40 tetes/menit sesuai intruksi dokter

4. Mengobservasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus

Hasil : Jumlah perdarahan kurang dari 500 cc dan kontraksi uterus keras dan terababundar.

5. Mengajarkan pada ibu untuk melakukan massase fundus uteri dengan menggunakan palmar 4 jari, sehingga dapat merangsang terjadinya kontraksi uterus pada proses involusio uteri untuk mengembalikan uterus ke bentuk semula sebelum hamil.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukannya

6. Memberikan penjelasan pada ibu tentang keadaan yang dialaminya

Hasil : Ibu mengerti dan mau menerima keadaannya

7. Memberikan dukungan pada ibu untuk memulai ASI eksklusif

Hasil : Ibu mau melakukannya

8. Mengajarkan kepada ibu melakukan perawatan payudara

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukannya

9. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : Telah dilakukan dan ibu mengerti

10. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan pada perineum yaitu :

- a. Memberitahu ibu agar tidak mencuci vagina menggunakan air hangat karna dapat menyebabkan benang penjahit terlepas
- b. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan perineumnya dengan cara mengganti pembalut ketika lembab dan full

Hasil : telah dilakukan dan ibu telah mengerti

11. Menganjurkan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*

Hasil : Ibu mau melakukannya

12. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi dan seimbang

Hasil : Ibu telah di beri makan dan minum

13. Memberikan ibu cairan infus

Hasil:Telah terpasang cairan infus

14. Penatalaksanaan obat sesuai instruktur dokter yaitu

amoxan 1 tablet (500mg) 3x1

nufagrobion (500mg) 1 tablet

Hasil : Ibu bersedia meminum obat yang telah di berikan



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUMHARI III

PADA NY “F” DENGAN POST KURETASE REST PLASENTA

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA HARI KE TIGA

TANGGAL 04 SEPTEMBER 2017

No. Register : 51xxxxX
Tgl. MRS : 01 september 2017 jam 23.30 WITA
Tgl. Partus : 02 september 2017 jam 02.20 WITA
Tgl. Pengkajian : 04 september 2017 jam 08.00 WITA
Pengkaji : Nurhikma

A. Identitas Istri/Suami

1. Nama : Ny “F”/Tn “R”
2. Umur : 28 tahun/30 tahun
3. Nikah : 1 kali /± 1 tahun
4. Suku : Makassar / Makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : SD / SD
7. Pekerjaan : IRT / Swasta
8. Alamat :Jln.Mangka dg bombong

B. Data Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan tanggal 02 september 2017jam 02.20 WITA
2. Ibu mengatakan pengeluaran darah berupa bercak
3. Ibu sudah tidak merasa pusing
4. Ibu sudah merasa lebih sehat
5. Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya
6. Ibu mengatakan bahwa bayinya sudah mulai menyusui dan menghisap dengan kuat
7. ASI ibu sudah mulai lancer
8. Ibu telah BAB sebanyak satu kali berwarna kuning dan padat
9. Ibu telah BAK sebanyak 2 kali berwarna kuning dan ibu tidak merasa nyeri saat berkemih

C. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Ekspresi wajah tampak ceria
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. tampak pengeluaran *lochia* rubra dan sudah tidak terjadi perdarahan
6. TFU 3 jari di bawah pusat
7. Tidak terdapat infeksi pada luka jahitan
8. Tampak luka perineum yang masih basah
9. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80 x/menit Teratur
 - c. Suhu : 37⁰C Axiler
 - d. Pernapasan : 22 x/menit Teratur
10. Hb :11 gr %

D. Assesment (A)

Diagnosa Post partum hari ke III, post kuretase hari ke II

E. Planning (P)

Tanggal 21 Juli 2017 jam 08.30 wita

1. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : TD : 110/70 mmHg

N : 80 x/menit Teratur

S : 37⁰C Axiler

P : 22 x/menit Teratur

2. Melepaskan Infus

Hasil : Infus telah dilepas

3. Mengobservasi kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

4. Memberikan penjelasan pada ibu tentang keadaan sudah baik

Hasil : Ibu nampak lega

5. Memberikan dukungan pada ibu untuk memulai ASI eksklusif

Hasil :Ibu mau melakukannya

6. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : Telah dilakukan dan ibu mengerti

7. Memberikan *healt education* pada ibu tentang

a. *Self care*

b. Istrahat yang cukup

c. Pola nutrisi

d. Asuhan bayi baru lahir

e. Senam nifas dan mobilisasi dini

Hasil: telah di lakukan dan ibu mengerti

8. Menjelaskan pada ibu tentang jenis-jenis KB yaitu :

- Kb pil
- Kb suntik terbagi dua yaitu suntik 1 bulan dan 3 bulan
- Kb implant
- AKDR/IUD

Hasil : ibu telah mengerti dan ibu memilih kb suntik sesuai dengan kb yang telah digunakan sebelumnya

9. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demant

Hasil :Ibu mau melakukannya

10. .Melakukan pendokumentasian

Hasil : telah dilakukan semua asuhan dan temuan telah dicatat

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara konsep dasar, tinjauan pustaka dengan tinjauan khusus. Dalam penerapan proses Manajemen Asuhan Kebidanan kasus perdarahan post partum akibat *rest plasenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 02-04 September 2017.

Dalam hal ini, pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah Varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I Pengumpulan data

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang akurat dan ekonomis, yang di sebut sebagai sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu observasi, dimana pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi nafas), penciuman (bau nafas, bau luka), peredaran (suhu badan, nadi). Wawancara, dimana pembicaraan terarah yang umumnya dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting di perhatikan adalah data yang ditanyakan di arahkan data yang relevan dan pemeriksaan, dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan memakai instrument/alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka, irama kuantitas. Misalnya pengukuran tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter.

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini dapat dilihat dari profesi ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Tindakan yang pertama kali dilakukan di ruangan intranatal care RSUD Syekh Yusuf yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk ke puskesmas, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data

secara objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), dan penunjang berupa pemeriksaan *laboratorium* dan *USG*

Ny “F” usia 28 tahun, GIIPIA0 masuk keruang bersalin RSUD Syekh Yusuf dengan keluhan nyeri perut pada bagian bawah yang menjalar kepinggang yang disertai dengan pelepasan lendir dan darah tanggal 1 september 2017 pukul 23.20 WITA, nyeri yang dirasakan ibu semakin lama semakin sering dan bertambah kuat, pasien mengatakan selama hamil ia melakukan kunjungan *antenatal care* (ANC) sebanyak 6 kali di RSUD Syekh Yusuf, pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 28 November 2016, pasien mengatakan selama hamil ia tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat. Pasien tidak pernah mengalami trauma selama kehamilan yang sekarang maupun kehamilan yang lalu.

Pasien tidak pernah mengalami penyulit dan trauma selama persalinan dan nifas yang lalu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, asma jantung, diabetes dan penyakit menular lainnya, pasien tidak memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obatan selama hamil tanpa resep dari bidan/dokter, pasien tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan tidak pernah dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas. Selama hamil, nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien tetap melakukan pekerjaan rumah tangga. Pasien mengatakan melahirkan tanggal 02 september 2017 pukul 02.20 WITA, pasien mengatakan plasenta tidak lahir seutuhnya setelah bersalin, pasien merasakan banyak pengeluaran darah dari jalan lahir sekitar jam 04.30 WITA.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu. 37°C, pernapasan 24 x/menit, ekspresi wajah tampak lesu, tidak tenang dan tampak meringis menahan sakit serta tidak ada edema dan pembengkakan pada wajah, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan tidak ikterik, tidak ada pembesaran kelenjar tyroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae. Pada pemeriksaan abdomen kontraksi uterus kurang baik tidak teraba bundar dan keras, TFU setinggi pusat dan kandung kemih kosong.

Pada pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium dan USG di dapatkan hasil laboratorium 11 gram % dan pada hasil pemeriksaan USG didapatkan sisa jaringan plasenta. Pengkajian pada kasus ini maka dilanjutkan dengan perencanaan *kuretase*.

Menurut Widyasih dkk (2013), masa nifas (*puerperium*) adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta lepas dari rahim sampai enam minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti permukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masa nifas atau *puerperium* dimulai setelah kelahiran plasenta, dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu (Rukiyah, dkk. 2012).

Perdarahan Post partum adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah anak lahir. Termasuk perdarahan karena rest plasenta. Perdarahan post

partum adalah perdarahan dalam kala IV lebih dari 500-600 cc dalam 24 jam setelah anak dan plasenta lahir (Rukiyah, 2012).

Beberapa gejala yang bisa menunjukkan perdarahan post partum diantaranya perdarahan yang tidak dapat dikontrol, penurunan tekanan darah, peningkatan detak jantung, penurunan hitung sel darah merah (hematocrit), pembengkakan dan nyeri pada jaringan daerah vagina dan sekitar perineum, perdarahan hanyalah gejala, penyebabnya haruslah diketahui dan ditatalaksana sesuai penyebabnya. Perdarahan postpartum dapat berupa perdarahan yang hebat dan menakutkan sehingga dalam waktu singkat ibu dapat jatuh kedalam keadaan syok.

Berdasarkan teori didapatkan gejala-gejala yang ditimbulkan dari perdarahan dengan rest plasenta adalah nampak adanya perdarahan, pasien pusing dan gelisah, nampak adanya sisa plasenta yang tertinggal. Pemeriksaan terfokus yaitu palpasi uterus, kontraksi uterus lembek dan plasenta lahir tidak lengkap. Lakukan eksplorasi cavum uteri, inspekulo untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan varises yang pecah dan Pemeriksaan laboratorium periksa darah yaitu Hb 11 gr.

Perdarahan post partum didefinisikan sebagai kehilangan darah secara berlebihan 500 ml dalam persalinan pervaginam dan lebih dari 1 liter dalam persalinan sesar. Adapun yang menjadi penyebab pendarahan post partum terdiri atas empat diantaranya *tonus* (atonia uteri), *trauma* (robekan jalan lahir), *tissue* (sisa-sisa jaringan plasenta), *trombin* (pembekuan darah) (FIGO, 2016: 109). Begitupun dengan yang dikatakan oleh (Rukiyah, 2012) bahwa Perdarahan Post partum adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah anak lahir, termasuk

perdarahan karena rest plasenta. Perdarahan post partum adalah perdarahan yang terjadi dalam kala IV lebih dari 500-600 cc dalam 24 jam setelah bayi dan plasenta lahir.

Dengan melihat data yang diperoleh tidak terdapat perbedaan-perbedaan dari tinjauan pustaka dan kasus nyata pada klien dengan perdarahan post partum dengan *rest plasenta* di mana teori mengatakan bahwa perdarahan post partum adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah bayi lahir, termasuk perdarahan karena *rest plasenta*. Perdarahan post partum adalah perdarahan dalam kala IV lebih dari 500-600 cc dalam 24 jam setelah bayi dan plasenta lahir (Rukiyah, 2012). *Rest plasenta* apabila setelah plasenta lahir masih terdapat perdarahan secara terus menerus, saat diperiksa kontraksi uterus ada, tetapi TFU tidak turun segera diperiksa kontraksi uterus ada, tetapi TFU tidak turun segera periksakan kelengkapan plasenta (Mochtar, 2012).

Demikian pula didalam buku Maartaadisoebrata (2013), *rest plasenta* adalah apabila kontraksi uterus jelek atau kembali lembek setelah kompresi bimanual ataupun massase dihentikan, bersamaan pemberian *uterotonica* lakukan eksplorasi. Penemuan secara dini, hanya dimungkinkan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta setelah dilahirkan. Pada kasus sisa plasenta dengan perdarahan pasca persalinan lanjut, sebagian besar pasien akan kembali lagi ke tempat bersalin dengan keluhan perdarahan setelah beberapa hari pulang kerumah dan *subinvolusio uterus*.

Berdasarkan uraian di atas yang dimulai dari pasien masuk sampai dilakukan tindakan kuretase, terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus rest plasenta. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada momenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (Betty mangkuji dkk, 2014 : 5).

Dalam menegakkan suatu diagnosa atau masalah kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif, maupun data objektif yang diperoleh pada hasil pengkajian melalui hasil pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien.

Berdasarkan teori masalah aktual yang terjadi pada post partum hari 1 dengan *rest plasenta* yaitu perdarahan dan kecemasan. Hasil pemeriksaan ini didapatkan data subjektif ibu mengeluh sakit pada daerah genetalia setelah melahirkan bayi dengan berat badan lahir 2500 kg, panjang badan lahir 47 cm, ibu merasakan banyak darah keluar dari jalan lahir sekitar jam 04.30 WITA (\pm 3 jam) setelah ibu dipindahkan ke

ruang perawatan nifas ibu merasa sering pusing dan lemah. Pada pemeriksaan objektif di dapatkan pemeriksaan inspeksi nampak adanya darah dari jalan lahir, kongjungtiva pucat, perdarahan lebih dari 500cc, sebelum eksplorasi tanggal 03 September 2017 jam 02.25 wita, Hb 11 gram% serta adanya sisa plasenta yang belum lepas.

Dalam tinjauan pustaka di jelaskan bahwa terjadinya rest plasenta dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pengeluaran plasenta tidak secara hati-hati, dimana plasenta dilahirkan tidak sesuai kurve jalan lahir, salah dalam pimpinan kala III, terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta, terjadi lingkaran konstriksi pada bagian bawah uterus (Lisnawati, 2013).

Pada kasus Ny “F” ditemukan masalah aktual perdarahan, dan kecemasan, teori mengatakan bahwa perdarahan post partum adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah anak lahir.

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan pada hari ke dua didapatkan masalah aktual pada ibu yaitu post partum hari ke dua didapatkan dari hasil data subjektif yaitu ibu melahirkan tanggal 02 September 2017 jam 02.20 WITA, Ibu mengatakan pengeluaran darah tapi tidak terlalu banyak, ibu masih merasa senang dengan kelahiran bayinya, ibu sudah mulai menyusui bayinya, ASI sudah mulai keluar tapi belum lancar. Data objektif yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tampak pengeluaran lochea rubra, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 x/menit, suhu: 37⁰C, pernapasan 22 x/menit, Hb 11 gr %,

kongjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus dan dari pengkajian teori masa nifas (*puerperium*) adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta lepas dari rahim sampai enam minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti permukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masa nifas atau *puerperium* dimulai setelah kelahiran plasenta, dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu (Rukiyah, dkk. 2012). *Lochea rubra* berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel *desidua*, *verniks kaseosa*, *lanugo*, *mekonium*, selama 3 hari pasca persalinan.

Dari data pengkajian asuhan kebidanan pada Ny''F'' dengan post partum hari ke tiga di dapatkan diagnosa aktual post partum hari ke tiga yang didapatkan dari data subjektif ibu melahirkan tanggal 02 September 2017 jam 02.20 WITA, ibu mengatakan pengeluaran darah berupa bercak, ibu sudah tidak merasa pusing, ibu sudah merasa lebih sehat, ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya, ibu mengatakan bahwa bayinya sudah mulai menyusui dan menghisap ASI dengan kuat, ASI ibu sudah mulai lancar. Data objektif yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran komponentis, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, tampak pengeluaran *lochea rubra* dan sudah tidak terjadi perdarahan, TFU 3 jrbpst, tanda-tanda vital, tekanan darah: 110/70 mmHg, Nadi: 80 x/menit, Suhu: 37°C, pernapasan: 22 x/menit, Hb:11 gr.

Pada saat bayi lahir fundus uteri setinggi pusat dengan berat 1000 gram, pada akhir kala III TFU teraba 2 jrbpst, tahapan masa nifas yaitu *puerperium dini* yaitu kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan, *puerperium intermedial* yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 minggu, *remote puerperium* yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi (Rukiyah, dkk. 2012). *Lochea rubra* berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel *desidua*, *verniks kaseosa*, *lanugo*, *mekonium*, selama 2 hari pasca persalinan.

Dari data yang diperoleh baik dari tinjauan pustaka maupun dari data pengkajian tidak terdapat kesenjangan yang berarti pada kasus perdarahan post partum hari ke tiga dengan *rest plasenta*.

C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman (Mufdillah, dkk 2012: 116).

Berdasarkan teori masalah potensial yang dapat terjadi selama penanganan yaitu potensial terjadinya *syok hipovolemik*, anemia dan infeksi *puerperium*. Pada teori kasus *rest plasenta* masalah potensial yang terjadi yaitu, potensial terjadinya *syok hipovolemik*, anemia dan infeksi *puerperium*. Darah mengandung sel *eritrosit*

yang terdiri dari Hb mengikat O₂ adanya darah yang terus menerus mengalir keluar mengakibatkan suplai O₂ ke otak berkurang yang menyebabkan ibu pusing-pusing dan lemah dan apabila hal tersebut tidak tertangani dengan segera maka perdarahan akan makin banyak dan dapat menyebabkan pasien mengalami *syok hipovolemik* (Sarwono, 2014).

Syok terdapat bermacam-macam sesuai dengan konteks klinis dan tingkat kedalaman analisisnya. Secara patofisiologi syok merupakan gangguan sirkulasi yang diartikan sebagai kondisi tidak adekuatnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik. Syok hipovolemik merupakan kegagalan perfusi jaringan yang disebabkan oleh kehilangan cairan intra vaskuler. Proses kegagalan perfusi akibat kehilangan volume intra vaskuler terjadi melalui penurunan aliran darah balik ke jantung (venous return) yang menyebabkan volume sekuncup dan curah jantung berkurang. Penurunan hebat curah jantung menyebabkan hantaran oksigen dan perfusi jaringan tidak optimal dalam keadaan berat menyebabkan syok.

Gejala klinis syok hipovolemik baru jelas terlihat bila kekurangan volume sirkulasi lebih dari 15% karena pada tahap awal perdarahan kurang mekanisme kompensasi sistem kardiovaskelur dan saraf otonom masih dapat menjaga fungsi sirkulasi dalam keadaan normal. Gejala dan tanda klinis juga tidak muncul pada waktu yang bersamaan seperti perubahan tekanan darah sistolik lebih lambat dari adanya perubahan tekanan nadi, frekuensi jantung dan penurunan produksi urine. Oleh karena itu pemeriksaan dan penatalaksanaan yang cermat harus dilakukan untuk

penatalaksanaan yang tepat serta penanggulangan segera kasus-kasus yang beresiko agar tidak jatuh dalam kondisi syok. Adapun komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien syok hipovolemik adalah kerusakan organ susunan saraf, kerusakan hati, kerusakan ginjal.

Adapun penanganan pada pasien syok hipovolemik diantaranya lakukan ABC (*Airway-breathing-circulation*) dahulu, tinggikan posisi kaki pasien, jaga jalur pernapasan, berikan cairan intravena (infus) 2-4 liter dalam waktu 20-30 menit. Seperti cairan infuse RL (hati-hati pemberian terlalu cepat pada pasien asidosis hiperkloremia), jika perdarahan atau kehilangan cairan belum bias di atasi maka lakukan cek kadar hemoglobin, jika hasilnya ≤ 10 g/dl maka berikan transfuse darah, pastikan darah sesuai dengan golongan darah pasien serta di sarankan darah yang digunakan sudah menjalani tes uji silang. Perlu diingat selain resusitasi cairan saluran pernafasan harus tetap dijaga (Hardisman, 2013).

Anemia seperti yang didefinisikan oleh *WHO*, *hemoglobin* kurang dari 11 gr% adalah penyebab tersering morbiditas dan mortalitas ibu terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan zat besi adalah penyebab paling umum anemia pasca melahirkan, dengan tingkat yang tinggi seperti 50,0% dilaporkan pada minggu pasca partum pertama. Pengobatan anemia post partum adalah terapi besi oral, besi parenteral dan transfusi darah (Singh, dkk, 2016: 5).

Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel merah (eritrosit) dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Kadar hemoglobin normal umumnya berbeda dari laki-laki dan perempuan. Untuk pria, anemia

biasanya kadar hemoglobin kurang dari 13,5 gram/100ml dan pada wanita hemoglobin kurang dari 12,0 gram /100ml (Proverawati 2011: 1). Adapun gejala-gejala yang timbul pada anemia seperti lemah dan lesu, lemah dan lesu terjadi karena organ-organ tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk berfungsi dengan baik, yaitu oksigen.

Adapun penyebab-penyebab anemia terbagi menjadi 3 yaitu anemia yang di sebabkan oleh kehilangan darah, anemia yang di sebabkan oleh penurunan produksi sel darah merah dan anemia yang di sebabkan oleh kerusakan sel darah merah.

Adapun penanganan yang baik untuk ibu dengan anemia adalah menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi kurma, surah Maryam menjelaskan tentang kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas dan dalam persalinan karna ia muda di cerna, lezat dan mengandung kalori yang tinggi serta dalam sebuah kisah rasulullah selalu makan tuujuh buah kurma “ajwa” (matang). Rasulullah bersabda “barang siapa yang makan tujuh butir kurma, mka akan terlindung dari racun.” Dan terbukti ketika seorang wanita yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah dalam sebuah percobaan pembunuhan di perang khaibar, racun yang tertelan oleh beliau kemudian bisa dinetralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma. Bisyr ibnu al Barra’, salah seorang sahabat yang ikut makan racun tersebut akhirnya meninggal (maria hidayah, 2014:35).

Infeksi *peurperium* atau infeksi pada masa nifas yang di sebabkan oleh kuman

yang masuk melalui organ genitalia pada saat persalinan dan masa nifas, infeksi ini di sebabkan oleh *bakteri traktus genitalia* yang terjadi setelah melahirkan dan di tandai dengan meningkatnya suhu tubuh menjadi 38°C atau lebih selama dua hari. Infeksi nifas masih berperan sebagai penyebab utama kematian ibu terutama di Negara berkembang seperti Indonesia, masalah itu terjadi akibat dari pelayanan kebidanan yang masih jauh dari sempurna. Faktor penyebab lain terjadinya infeksi masa nifas yaitu daya tahan tubuh yang kurang baik, perawatan nifas yang kurang baik, kurang gizi atau malnutrisi, anemia, hygiene yang kurang baik, serta kelelahan.

Oleh sebab itu potensial untuk infeksi *syok hipovolemik* dan anemia tidak akan terjadi jika ditangani dengan segera. Sedangkan pada kasus, klien mengerti tentang penyebab dari keluhan yang dialaminya dan bersedia untuk dilakukan kuretase. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus.

D. Langkah IV Melaksanakan Tindakan Segera / Kolaborasi

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Pada teori dijelaskan bahwa tindakan segera/ kolaborasi pada kasus perdarahan post partum dengan *rest plasenta* adalah pemasangan infus, *uterotonika*, manual plasenta, pemberian antibiotik, USG, dan kuretase. Beberapa ahli menganjurkan eksplorasi secepatnya, akan tetapi hal ini sulit dilakukan tanpa general anestesi kecuali pasien jatuh dalam syok. Jangan hentikan pemberian *uterotonika* selama dilakukan eksplorasi. Setelah eksplorasi lakukan masase dan *kompresi bimanual* ulang tanpa menghentikan pemberian *uterotonika* (Muchtar, 2012: 56).

Tindakan kolaborasi untuk menunjang diagnosa adalah pemeriksaan USG dan pemasangan infus RL + oxytosin 20 unit, 40 tetes/menit, eksplorasi cavum uteri dengan manual plasenta, pemberian antibiotik sesuai dengan intruksi dari dokter. Hasil pemeriksaan USG didapatkan hasil pemeriksaan yaitu terdapat sisa jaringan plasenta (Muchtar, 2012: 56).

Sebelum dilakukan kuretase, biasanya pasien akan diberikan obat anestesi (dibius) secara total dengan jangka waktu singkat, sekitar 2-3 jam. Setelah pasien terbius, barulah proses kuretase dilakukan. Ketika melakukan kuret, ada 2 pilihan alat bantu bagi dokter. Dilihat dari tindakan *emergency* dan kolaborasi pada kasus dan teori tidak terdapat adanya kesenjangan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan

manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi (Mufdillah, dkk 2012: 118)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Rencana tindakan komprehensif bukan hanya meliputi kondisi klien serta hubungannya dengan masalah yang dialami oleh klien, serta konseling bila perlu mengenai ekonomi, agama, budaya ataupun masalah psikologis. Rencana asuhan disetujui oleh klien sebab itu harus berdasarkan rasional yang relevan kebenarannya serta situasi dan kondisi tindakan harus secara teoritis.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Rencana yang dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta evidence based terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Pada teori dijelaskan bahwa rencana tindakan untuk kasus *rest plasenta* yaitu meningkatkan kesehatan ibu sehingga tidak terjadi anemia dalam kehamilan, melakukan pertolongan persalinan di rumah sakit bagi ibu yang mengalami perdarahan post partum, memberikan *uterotonika* segera setelah persalinan bayi, kelahiran plasenta dipercepat, melakukan pemasangan infus dan pemberian *uterotonika* untuk mempertahankan keadaan umum ibu dan merangsang kontraksi

uterus

Beberapa tujuan dan tindakan kuretase antara lain menentukan penyebab atau menghentikan perdarahan vagina, membuang janin yang mengalami keguguran atau sisa jaringan lain yang masih tertinggal di dalam *endometrium*, menentukan derajat keparahan dari suatu kanker *endometrium*. Untuk menentukan tindakan kuretase yang sudah di rencanakan sebelumnya, maka pasien diwajibkan untuk puasa selama 6-8 jam sebelum tindakan. Pada umumnya pasien dibius total, namun ada juga yang hanya dilakukan bius sebagian atau hanya diberikan obat penenang sehingga pasien tetap sadar. Pemilihan penggunaan obat bius di sesuaikan dengan kondisi pasien dan riwayat penyakitnya.

Kuretase ini memiliki beberapa manfaat tidak hanya untuk calon ibu atau wanita yang mengalami keguguran, namun juga beberapa hal lainnya untuk memeriksa masalah atau kesehatan pada rahim. Adapun manfaatnya yaitu membersihkan rahim sesudah keguguran, mendiagnosa keadaan tertentu yang ada pada rahim, membersihkan jaringan plasenta yang tersisa sesudah proses persalinan di kemudian hari, menghilangkan *blighted ovum* atau tidak ada janin dalam kandung telur, menghindari rahim tidak bisa kontraksi karena pembuluh darah pada rahim tidak menutup sehingga terjadi pendarahan, membersihkan sisa jaringan pada dinding rahim yang bias menjadi tempat kuman berkembang biak dan timbul infeksi

Pasien yang akan melakukan tindakan kuretase harus berbaring dengan posisi *litotomi* dimana kedua kaki di tekuk kearah perut sehingga daerah vagina menjadi terbuka. Vagina dan serviks kemudian di bersihkan menggunakan *speculum* untuk

membuka lubang vagina dan menggunakan alat dan obat yang khusus untuk membuka lubang serviks proses ini di sebut dilatasi. Setelah dilatasi maksimal, maka kuret di masukkan ke dalam rongga rahim untuk membersihkan sisa-sisa jaringan (Mochtar, 2012: 36).

Setelah menjalani prosedur, kondisi umum pasien tetap dimonitor selama beberapa jam sampai benar-benar stabil dan tetap memantau tanda-tanda vital dan kemungkinan terjadinya perdarahan. Pasien yang telah menjalani tindakan *kuretase* akan kembali pulih normal setelah beberapa hari. Pasien tidak boleh menggunakan tampon, memasukkan apapun ke jalan lahir, dan tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 2 minggu untuk mencegah terjadinya infeksi (Nugroho, T. 2012: 60).

Kuretase juga memiliki efek samping pada umumnya proses kuretase ini terbilang aman untuk dijalankan, akan tetapi pada setiap prosedur juga memiliki resiko serta efek samping dan komplikasi seperti halnya pada proses kuretase ini seperti infeksi di dalam rahim, kerusakan dan luka pada rahim yang dinamakan *sindrom asherman* yang bisa menimbulkan keguguran saat kehamilan berikutnya, nyeri saat datang bulan atau menstruasi, mengalami kemandulan, terjadi pelubangan pada usus karena instrument operasi membuat lubang pada rahim. Resiko terjadinya komplikasi pada kasus kuretase ini meningkat pada beberapa kondisi sebagai berikut, kelainan posisi rahim, adanya infeksi pada rahim dan sudah pernah menjalani operasi sebelumnya pada rahim seperti operasi sesar (Maartaadisoebrata, 2013: 102).

Pada kasus Ny”F” adapun rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu :

Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, mengobservasi tetesan infus, mengobservasi jumlah perdarahan dan kontraksi uterus, mengajarkan pada ibu untuk melakukan massase fundus uteri, memberi penjelasan tentang keadaan yang dialaminya, memberi intake adekuat, berkolaborasi dengan dokter untuk pelaksanaan tindakan kuretase, berkolaborasi dengan dokter pemberian obat antibiotic.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya melakukan kunjungan kepada klien untuk memantau keadaannya dan memberikan asuhan sesuai apa yang dibutuhkan klien. Pemantauan pertama hari ke dua Ny.F dengan perdarahan post partum, pada kunjungan ini ibu mengeluh masih banyak darah yang keluar dari jalan lahir, kepala pusing, dan merasa lemas. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, pemeriksaan fisik pada perut TFU 2 jari di bawah pusat dan ada pengeluaran *lochea* rubra dari jalan lahir. Rencana asuhan yang diberikan adalah menjelaskan kepada ibu bahwa darah yang keluar dari jalan lahirnya merupakan perdarahan yang normal yang keluar pada masa nifas.

Menjelaskan kepada ibu mengenai health education tentang personal hygiene, menganjurkan ibu untuk mandi 2x sehari menjaga kebersihan tubuhnya mengganti pakaian bila terasa kotor dan basah menjaga daerah genitalia tetap bersih dan kering mengganti pembalut jika sudah penuh mengganti pakaian dalam bila terasa lembab dan basah, pola istirahat menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang kurang lebih tidur 2 jam per hari, dan tidur malam kurang lebih 6-8 jam per

hari dan pola nutrisi menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan sayuran ikan dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu selama masa nifas.

Pemantauan kedua hari ke tiga Ny.F dengan perdarahan post partum, pada kunjungan ini ibu mengatakan sudah tidak banyak darah yang keluar, tidak merasa pusing lagi. Pada kunjungan ini menjelaskan kepada ibu mengenai health education tentang personal hygiene menganjurkan ibu untuk mandi 2x sehari menjaga kebersihan tubuhnya mengganti pakaian bila terasa kotor dan basah menjaga daerah genitalia tetap bersih dan kering mengganti pembalut jika sudah penuh mengganti pakaian dalam bila terasa lembab dan basah, pola istirahat menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang kurang lebih tidur 2 jam per hari, dan tidur malam kurang lebih 6-8 jam perhari dan pola nutrisi menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan sayuran ikan dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu selama masa nifas.

Pada kasus dan teori tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus karena pada kasus dijelaskan tindakan pertolongan yang dilakukan pada kasus *rest plasenta* yaitu dengan kuretase dan pada teori dilakukan tindakan kuretase. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

F. Langkah VI Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh klien, atau

anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan penatalaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana) (Dwi Asri, dkk. 2012 : 31).

Pada studi kasus Ny”F” dengan *rest plasenta*, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti menyampaikan hasil pemeriksaan dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bersama, dalam hal ini pasien diberi waktu sebelum dihadapkan pada keputusan untuk tindakan *kuretase*, memberikan penjelasan tentang *rest plasenta* dan penatalaksanaannya, memberikan dukungan moral kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting.

Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga memutuskan untuk dilakukan *kuretase*, kemudian memberitahu ibu dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan agar sisa jaringan plasenta sesegera mungkin dikeluarkan berkolaborasi dengan dokter ahli kandungan untuk memberikan terapi dan tindakan untuk *kuretase*. Setelah mendiskusikan tindakan *kuretase* pada ibu dan keluarga, maka tindakan tersebut telah dikolaborasikan dengan dokter ahli kandungan. Hasil kolaborasi dengan dokter ahli kandungan dengan memberikan obat analgetik, antibiotik.

Setelah bayi lahir melakukan pengecekan fundus dan tidak ada lagi bayi dalam uterus, kemudian memberitahu ibu dan menyuntikkan oksitosin dan suntikan oksitosin, dan menjepit dan memotong tali pusat. Pemantauan selanjutnya, yaitu pada kala III persalinan. Kala III dimulai setelah bayi lahir pukul 02.20 wita, dan ditandai

dengan adanya semburan darah tiba-tiba serta tali pusat bertambah panjang. Tindakan yang dilakukan pada saat kala III yaitu melakukan manajemen aktif kala III, plasenta dan selaput ketuban lahir spontan pukul 02.25 WITA, kontraksi uterus tidak baik dan TFU setinggi pusat. Lama kala III adalah 5 menit, plasenta dan selaput ketuban lahir kesan tidak lengkap, perdarahan ± 500 cc dan terjadi robekan pada vagina dan perineum. Melakukan katektisasi dengan jumlah urin yaitu ± 150 cc. Pemantauan lanjutan dari kala III adalah memastikan adanya sisa plasenta dengan kolaborasi dokter ahli kandungan untuk tindakan USG. Pemeriksaan USG dilakukan pada tanggal 02 September 2017 pukul 07.15 wita, hasil pemeriksaan USG tampak sisa jaringan. Membersihkan sisa jaringan dengan melakukan kuretase oleh dokter ahli kandungan pada tanggal 03 September 2017 pukul 10.00 wita.

Pemantauan dilanjutkan pada kala IV persalinan. Kala IV persalinan dimulai setelah plasenta lahir. Ibu merasakan lega setelah melahirkan dan masih sedikit mules, keadaan umum ibu baik, ibu tampak menangis, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 88x/i, Suhu 37 °C, Pernafasan 24 x/i, kontraksi uterus tidak baik, TFU setinggi pusat. Tindakan yang dilakukan yaitu menjelaskan pada ibu tentang kondisinya saat ini dan keluhan yang dialami adalah normal pasca persalinan, memberi dukungan mental kepada ibu dan keluarga dan pendampingan pada ibu untuk tetap tabah dan sabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah swt.

Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, meminta keluarga agar selalu menemani dan memenuhi kebutuhan ibu, mengajarkan ibu dan keluarga cara memantau kontraksi uterus, memberikan penjelasan tentang persiapan *prakonsepsi*

dan masa subur, membicarakan kejadian yang dialami ibu dan pencegahan yang perlu dilakukan di masa mendatang, dan meyakinkan ibu bahwa kejadian yang dialami adalah kehendak Allah swt, menganjurkan ibu dan keluarga untuk senantiasa berdo'a kepada Allah swt agar dikaruniakan keturunan yang baik dan sholeh, memindahkan ibu ke ruang perawatan pada pukul 04.30 wita, dan dilakukan kolaborasi dengan dokter ahli kandungan untuk tindakan USG untuk melihat ada tidaknya sisa plasenta yang dapat menyebabkan perdarahan. Tindakan USG akan dilakukan pada tanggal 02 September 2017 pukul 07.15 wita dengan hasil tampak sisa jaringan. Penatalaksanaan pada Ny "F" adalah tindakan kuretase pada tanggal 03 September 2017 pukul 10.00 wita.

Semua intervensi yang ada pada langkah V dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien di RSUD Syek Yusuf Gowa, Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus.

G. Langkah VII Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi (Mufdillah, dkk

2012: 119). Hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pemeriksaan USG, diagnosa yang ditegakkan pada Ny “F” adalah *rest plasenta*. Rencana asuhan yang telah disusun berorientasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan sehingga tidak ditemukan hambatan pada saat pelaksanaan asuhan.

Adapun Evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun evaluasi yang diperoleh pada 02 september 2017 masalah perdarahan post partum dengan *rest plasenta* diatasi yang ditandai dengan ekspresi wajah klien tidak meringis lagi, ibu tidak bertanya-tanya dan memahami penjelasan yang telah diberikan. Masalah potensial sudah dapat diatasi. Dengan melihat hasil yang diperoleh seperti yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian tujuan yang ingin dicapai telah dievaluasi.

Evaluasi pada tanggal 03 september 2017 yaitu kecemasan telah berkurang, anemia belum teratasi ditandai dengan Hb 11 gr %, perdarahan teratasi ditandai dengan kontraksi baik dan *involusio* sesuai dengan hari nifas.

Evaluasi tanggal 04 september 2017, anemia teratas ditandai dengan Hb11 gr % keadaan ibu sudah membaik di tandai dengan ibu melahirkan tanggal 02 september 2017 jam 02.20 WITA, ibu mengatakan pengeluaran darah berupa bercak, ibu sudah tidak mersa pusing, ibu sudah mersa lebih sehat, ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya, ibu mengatakan bahwa bayinya sudah mulai menyusui dan menghisap dengan kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan hari pertama

sampai dengan hari ke tiga setelah persalinan yang dilakukan secara bertahap.Semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu.Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menguraikan kasus Ny “F” dengan Perdahan Post Partum Akibat *Rest Plasenta* maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Pada kasus Ny “F” tidak ada perbedaan antara kasus dan pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar.
2. Pada kasus Ny “F” tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus nyata dalam menentukan diagnosa/masalah aktual. Diagnosa / masalah aktual yaitu post partum hari 1, rest plasenta, perdarahan, anemia, dan kecemasan
3. Pada kasus Ny “F” tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus nyata dalam menentukan diagnosa / masalah potensial. diagnosa / masalah potensial yaituantisipasi terjadinya syok hipovolemik.
4. Pada kasus Ny “F” tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus dalam tindakan *emergency*, kolaborasi dan rujukan. tindakan *emergency*, kolaborasi yaitu pemasangan infus RL + oxytosin 20 unit, 40 tetes/menit, melakukan kuretase, dan pemberian antibiotik.
5. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus nyata dalam rencana tindakan asuhan kebidanan yaitu pada kasus dijelaskan tindakan pertolongan yang dilakukan pada kasus *rest plasenta* yaitu dengan melakukan kuretase. sedangkan pada teori dilakukan tindakan kuretase.

6. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus nyata dalam melakukan asuhan kebidanan.
7. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus nyata dalam melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan selama 3 hari, adapun evaluasi yang diperoleh pada tanggal 02 september 2017 masalah perdarahan post partum akibat *rest plasenta* diatasi yang ditandai dengan ekspresi wajah klien tidak meringis lagi, ibu tidak bertanya-tanya dan memahami penjelasan yang telah diberikan. Masalah potensial sudah dapat diatasi.

Dengan melihat hasil yang diperoleh seperti yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian tujuan yang ingin dicapai telah dievaluasi.

Evaluasi pada tanggal 03 september 2017 yaitu ditandai dengan kontraksi baik dan involusio sesuai dengan hari nifas. Evaluasi tanggal 04 september 2017, keadaan ibu sudah membaik dan berlangsung normal ditandai dengan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, ekspresi wajah tampak ceria, kontraksi uterus teraba keras dan bundar ,tampak pengeluaran lochia rubra dan sudah tidak terjadi perdarahan ,TFU 3 jrbpst, Tanda-tanda vital Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 80 x/menit, Suhu 37°C Pernapasan 22 x/menit, Hb 11 gr %

8. Mendokumentasikan semua temuan dan tidakan kedalam metode SOAP.

B. Saran

1. Untuk Klien

Adapun saran-saran untuk klien adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar mengkomsumsi makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi akan memenuhi kebutuhan energi, juga untuk mempercepat proses penyembuhan dan pengembalian alat reproduksi mendekati keadaan sebelum hamil serta untuk memperbanyak produksi ASI.
- b. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar senantiasa menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genetaliaanya untuk mencegah terjadinya infeksi pada diri ibu.
- c. Diperlukan keterlibatan suami/keluaga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antar pasien dengan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai kelanjutan perawatan dirumah.

2. Untuk Bidan

Adapun saran-saran untuk bidan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagai bidan sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari klien.

- c. Diharapkan bidan dalam memberikan asuhan kepada klien menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
- d. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dalam proses manajemen kebidanan, karena hal ini merupakan bukti pertanggung jawaban bidan terhadap klien.
- e. Dalam pandangan Islam dalam memberikan asuhan kepada klien harus menerapkan kaidah agama di dalamnya agar klien dapat mengerti tentang larangan dalam melakukan hubungan badan antara suami istri apabila dalam keadaan haid atau nifas.

3. Untuk RSUD Syekh Yusuf Gowa

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, perlu menyediakan fasilitas atau alat-alat yang memadai untuk menunjang pelaksanaan petugas-petugas.

4. Untuk institusi

Menyediakan tenaga pengajar yang professional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali TS, Gani N. Prevalence And Factors Associated With Maternal Postpartum Haemorrhage In Khyber Agency, Pakistan. *J Ayub Med Coll Abbottabad* 2013;25(1-2)
- Astuti, I. *Panduan Belajar Praktikum Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta : TIM . 2012
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*
- Depkes. *Angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan*. 2015.
- FIGO. *Prevention and treatment of postpartum hemorrhage in low-resource. International Journal of Gynecology and Obstetric*. 2012.
- Gavi. *Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan*. 2015
- Holmes, D. *Buku Ajar Ilmu Kebidanan*. Jakarta : EGC. 2012
- Hidayah maria, *keajaiban bangun pagi*. Yogyakarta: Abata Press, 2014.
- Jannah Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Yogyakarta: C.V OFFSET. 2012
- Karlina. *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Bogor. In Medika. 2016.
- Lisnawati, L. *Asuhan Kebidanan Terkini Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : TIM. 2013
- Manuaba, Ida Ayu Chandranita, dkk. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*, Jakarta :EGC. 2013.
- Marmi. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta : TIM. 2011.
- Maartaadisoebrata. *Obstetri Patologi*. Jakarta : EGC. 2013
- Mastiningsih Putu. "Rest Placenta Pada Ibu Nifas P1a1 6 Jam Post Partum Di Ruang Bersalin Rsud Wangaya". 2012
- Mufdillah, dkk. *Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta :NuhaMedika : 2012

- Mochtar, R. *Sinopsis Obstetri*. Jakarta : EGC. 2012.
- Mustika, D. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2013
- Nugroho, T. 2012. *Buku Ajar Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta : Nuha Medika.
- Rukiyah. *Asuhan Kebidanan IV Patologi Bagian 2*. Jakarta : TIM. 2012.
- Rukiyah. *Asuhan Kebidanan III (Nifas)*. Jakarta : TIM. 2012.
- Ahmad Sarwat. *rumah fiqih*, diakses 2017.
- Saragih Junita. “Perdarahan Pasca Persalinan Serta Komplikasinya Pada Berbagai Kondisi”. *Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU”* Vol.1 No.1 Januari 2015
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta :LenteraHati, 2002.
- Singh, dkk. Ferric Carboxymaltose: *A Better Option For Treatment Of Postpartum Iron Deficiency Anemia*. *International Journal of Basic and Applied Medical Sciences* ISSN: 2277-2103 (Online) An Open Access, Online International Journal Available at <http://www.cibtech.org/jms.htm> 2016 Vol. 6 (1) January-April, 2016.
- Suherni. *Perawatan Masa Nifas*. Fitramaya : Yogyakarta. 2013.
- Saifuddin. AB. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : YBP-SP. 2010.
- Talluri Bhavishya. Acquired Uterine Hypoplasia After Postpartum Haemorrhage With Worst Prognosis – A Case Report. *J. Evid. Based Med. Healthc.*, pISSN-2349-2562, eISSN- 2349-2570/ Vol. 3/Issue 24/Mar. 24, 2016.
- Tarwoto. *Buku Saku Anemia Pada Ibu Hamil*. Jakarta: Trans Info Medika. 2013.
- Varney, Helen dkk, *Varney’s midwifery* , america : jhones and Barttlet publisher, 2003
- WHO. *Angka Kejadian nifas* <http://www.AngkaKejadianNifas.com>. Diakses tanggal 15 Februari 2017. Makassar,
- Widyasih. Dkk. *Perawatan Masa Nifas*. Fitramaya : Yogyakarta. 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Nur Hikmah
NIM : 70400114065
TTL : Tuppu , 10 september 1996
Suku : makassar
Agama : Islam
Alamat : BTN. Tamarunang Indah 2 Blok D1/4

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 : SDN 170 Tuppu
2. Tahun 2009-2011 : SMP Negeri 1 Lembang
3. ,Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 1 lembang
4. ,;Tahun 2014-2017 : Universitas Islma Negeri Alauddin Makassar