

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN
PENGOBATAN *ANTIRETROVIRAL* (ARV) PADA ORANG
DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA) DI PUSKESMAS
JUMPANDANG BARU
TAHUN 2017**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURIHWANI

NIM : 70200113034

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurihwani
NIM : 70200113034
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 21 Januari 1996
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Epidemiologi
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ S1 Reguler
Alamat : Dusun Lempangan Desa Puncak Kecamatan Sinjai
Selatan Kabupaten Sinjai
Judul : Hubungan Dukungan Keluarga terhadap
Kepatuhan Pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada
Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di
Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Juli 2017
Penyusun,

Nurihwani
NIM : 70200113034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017", yang disusun oleh Nurihwani, NIM: 70200113034, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 16 Agustus 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Sitti Raodhah, SKM, M.Kes	(.....)
Penguji I	: Nildawati, SKM, M.Epid	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP: 19650203-198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'laikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin tak henti-hentinya penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah *Shubehanahu Wa Ta'ala* yang memberi penulis rahmat, kesehatan dan kesempatan waktu luang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan Antiretroviral (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017*”. Salawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*, nabi dan rasul terakhir yang membawa dan menyampaikan risalah Allah kepada manusia agar menjadi insan yang memiliki derajat yang lebih tinggi baik di dunia terlebih lagi di akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak masukan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi. Armyun Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes, selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh staf dan dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberi bantuan dan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Emmi Bujawati SKM, M.Kes, selaku Pembimbing I dan Dr. Sitti Raodhah SKM, M.Kes selaku Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sejak awal hingga akhir dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Nildawati, SKM., M.,Epid selaku penguji I dan Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberi saran serta kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Pegawai Puskesmas Jumpandang Baru yang telah memberikan izin pengambilan data awal dan melakukan penelitian terutama bagian lab.VCT yang selalu baik dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan “DIMENSION” angkatan 2013 khususnya pada teman saya Siti Rahma Juni Sari dan Nur Rahma Wahyuddin yang senantiasa memberikan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Keluarga besar peminatan Epidemiologi angkatan 2013.
9. Teman-teman dari Study Club (SC) Al-‘Aafiyah yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan motivasi selama penulis menyusun skripsi ini.
10. Penghargaan dan penghormatan sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Abd.Haris dan

Ibunda Hj.Fatimah, atas ketulusan doa, cinta, kasih sayangnya serta dukungan moral dan material yang diberikan kepada penulis yang tidak mungkin mampu penulis membalasnya.

11. Salam hangat untuk kakakku Wahdaniar dan adik-adikku tercinta Sri Wahyuni, Muh.Ihwan, Muh.Fadil dan Azwina Azzahra yang menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis memohon kepada Allah *Shubehanahu Wa Ta'ala* atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga Allah memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan yang berupa saran dan kritik yang membangun dari para pembaca akan sangat membantu. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang terkait.

Aamiiin ya rabbal alamin...

Wassalamu'alikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Samata-Gowa, Maret 2017

Penyusun

NURIHWANI

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Ii
LEMBAR PENGESAHAN	Iii
KATA PENGANTAR	Iv
DAFTAR ISI.....	Vii
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR	Xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xiii
ABSTRAK	Xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis Penelitian.....	7
D. Defenisi Operasional.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-48
A. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).....	13
1. Pengertian HIV dan AIDS	13
2. Riwayat Penyakit	15
3. Proses Infeksi HIV	16
4. Transmisi HV dan AIDS	19
5. Faktor Risiko Terinfeksi HIV dan AIDS	22
6. Pencegahan Penularan HIV dan AIDS	23
B. Antiretroviral (ARV).....	25
1. Defenisi ARV.....	25
2. Penggolongan ARV	25
3. Tujuan Pengobatan/Terapi ARV.....	26
4. Manfaat Pengobatan/Terapi ARV.....	26
5. Dosis Pemberian ARV	27
C. Dukungan Keluarga	33
1. Defenisi Dukungan Keluarga.....	33
2. Tipe Keluarga.....	34

3. Fungsi Keluarga dalam Pandangan Islam.....	35
4. Fungsi Dukungan Keluarga.....	37
5. Cara Menilai Dukungan Keluarga	41
D. Kepatuhan Pegobatan ARV	41
1. Pengertian Kepatuhan	41
2. Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan	42
3. Cara Mengukur Tingkat Kepatuhan.....	43
4. Jenis Ketidapatuhan	44
5. Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan.....	45
E. Kerangka Teori.....	47
F. Kerangka Konsep.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49-56
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Validasi dan Realibilitas Kuesioner	53
G. Alur Penelitian	53
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
I. Etika Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57-83
A. Gambaran Umum Puskesmas Jumpandang Baru	57
1. Keadaan Geografi.....	57
2. Visi dan misi	58
3. Tujuan	58
4. Falsafah	59
5. Sumber Daya Kesehatan	59
B. Hasil Penelitian	62
1. Analisis Univariat.....	62
2. Analisis Bivariat.....	70
C. Pembahasan.....	74
1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	74
2. Karakteristik Berdasarkan Umur.....	76
3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan	77
4. Karakteristik Berdasarkan Lama Pengobatan	77
5. Hubungan Dukungan Emosional dan Penilaian Terhadap Kepatuhan Pengobatan ARV	79
6. Hubungan Dukungan Instrumental Terhadap Kepatuhan	

Pengobatan ARV.....	80
7. Hubungan Dukungan Informasional Terhadap Kepatuhan Pengobatan ARV	81
8. Hubungan Dukungan Keluarga secara Keseluruhan Terhadap Kepatuhan Pengobatan ARV	82
BAB V PENUTUP.....	84-86
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	xiv



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Devenisi Operasional.....	8
Tabel 1.2	Kajian Pustaka	9
Tabel 2.1	Faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko peningkatan transmisi	22
Tabel 2.2	Obat ARV yang beredar di Indonesia.....	28
Tabel 4.1	Luas wilayah, jumlah RT/RW menurut kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru	56
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Puskesmas Jumpandang Baru	62
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Puskesmas Jumpandang Baru	63
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di Puskesmas Jumpandang Baru	63
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Jumpandang Baru	64
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Tinggal di Puskesmas Jumpandang Baru	64
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Menikah di Puskesmas Jumpandang Baru	65
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Pengobatan di Puskesmas Jumpandang Baru	65
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kondisi Saat Ini di Puskesmas Jumpandang Baru	66
Tabel 4.10...	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Emosional dan Penilaian di Puskesmas Jumpandang Baru	66
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Instrumental di Puskesmas Jumpandang Baru.....	67
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Informasional di Puskesmas Jumpandang Baru	67
Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga secara Keseluruhan di Puskesmas Jumpandang Baru.....	68

Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Kepatuhan di Puskesmas Jumpandang Baru.....	68
Tabel 4.15	Hubungan Dukukngan Emosional dan Penilaian terhadap Kepatuhan Pengobatan ARV di Puskesmas Jumpandang Baru	69
Tabel 4.16	Hubungan Dukukngan Instrumental terhadap Kepatuhan Pengobatan ARV di Puskesmas Jumpandang Baru.....	70
Tabel 4.17	Hubungan Dukukngan Informasional terhadap Kepatuhan Pengobatan ARV di Puskesmas Jumpandang Baru.....	71
Tabel 4.18	Hubungan Dukukngan Keluarga secara Keseluruhan terhadap Kepatuhan Pengobatan ARV di Puskesmas Jumpandang Baru	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori Penelitian	46
Gambar 2.2	Kerangka Konsep Penelitian.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari UPT – P2T, BKPMMD Prov. Sul-Sel
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Wali Kota Makassar
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Penjelasan Penelitian
- Lampiran 6 Lembar Persetujuan Jadi Responden
- Lampiran 7 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 8 Master Tabel
- Lampiran 9 Keterangan Master Tabel
- Lampiran 10 Output SPSS
- Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 12 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Nurihwani
Nim : 70200113034
Judul : **Hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jungpandang Baru Tahun 2017**

HIV dan AIDS merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan kekhawatiran di berbagai belahan dunia, yang dapat mengancam kehidupan. Karena HIV dan AIDS merupakan penyakit yang belum ditemukan obatnya. Virus yang ada di dalam tubuh penderita HIV dan AIDS tidak bisa keluar, sehingga seseorang harus menjalani pengobatan ARV seumur hidup dan tepat waktu. Jadwal ketat pengobatan ARV diharapkan mampu menekan jumlah virus di dalam tubuh. Jika tidak patuh maka obat akan menjadi resisten terhadap tubuh. Salah faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat adalah dukungan keluarga. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jungpandang Baru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan desain *Cross Sectional Study*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 129 orang dan sampel berjumlah 56 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu *asidental sampling*. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan yaitu uji *chi-square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV pada ODHA di Puskesmas Jungpandang Baru ($p=0,652$).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pengobatan ARV, disebabkan ODHA tidak memberi tahu kepada keluarga tentang penyakitnya karena takut dikucilkan dan di telantarkan akibat stigma tentang penderita HIV dan AIDS dianggap telah melanggar norma-norma keluarga. Sehingga ODHA lebih terbuka kepada pendamping ODHA, sahabat sesama ODHA, dan petugas kesehatan. Dari hasil penelitian, disarankan kepada petugas kesehatan agar memberi tahu ODHA dampak jika tidak patuh dalam pengobatan ARV dan memberikan motivasi kepada ODHA, untuk memberi tahu keluarganya tentang penyakitnya.

Kata kunci: Dukungan Keluarga, Kepatuhan pengobatan *Antiretrivial*, HIV dan AIDS, ODHA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah jenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan yang disebabkan oleh HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh maka orang tersebut sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal. Pengidap HIV memerlukan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV dalam tubuh agar tidak masuk kedalam stadium AIDS, sedangkan pengidap AIDS memerlukan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya (Kemenkes RI, 2014).

HIV dan AIDS merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan kekhawatiran di berbagai belahan dunia, yang dapat mengancam kehidupan. Pada Saat ini tidak ada negara yang terbebas dari HIV dan AIDS (Abbas, 2011). Pada tahun 2015 ada 2,1 juta (1.800.000-2.400.000) infeksi HIV baru diseluruh dunia,menambahkan hingga total 36.700.000 (34,0 juta-39,8 juta) orang yang hidup dengan HIV. Hal ini meningkat dari akhir tahun 2014, ada sekitar 34.300.000-41.400.000 orang dengan HIV dan 2 juta (1.900.000-2.200.000) orang terinfeksi HIV serta 1,2 juta (980.000-1.600.000) orang meninggal karena penyakit terkait AIDS (Global AIDS up date , 2016).

World Health Organization (WHO) melaporkan pada tahun 2013 terdapat 35 juta orang di dunia hidup dengan HIV dan AIDS. Bila dibandingkan dengan pada tahun 2001 sebesar 29,8 juta orang. Trend kematian yang disebabkan oleh

AIDS berbeda disetiap bagian negara seluruh dunia dan wilayah Afrika terkena dampak parah dari HIV dimana 1 dari setiap 20 orang dewasa yang hidup dengan HIV dan pada tahun 2013, jumlahnya mencapai 24,7 Juta yang hidup dengan HIV dan AIDS dari total global (Kemenkes RI, 2014).

Kasus HIV dan AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan di Bali tahun 1987. Hingga saat ini sudah menyebar di 386 kabupaten/kota diseluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kumulatif penderita HIV sejak tahun 1987 sampai september 2014 sebanyak 150.296 orang , sedangkan total kumulatif kasus AIDS sebanyak 55.779 orang (Kemenkes RI, 2014).

Indonesia termasuk salah satu dari 3 negara yang merupakan daerah infeksi HIV baru (Global Statistics UNAIDS, 2015). Jumlah penderita HIV pada akhir september 2014 sekitar 22.869 orang. 10 besar kasus HIV terbanyak ada di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan (Kemenkes RI, 2014).

Data Kemenkes menunjukkan adanya kenaikan angka penderita HIV. Jika semula pada 2014 penderita HIV mencapai 32.711 jiwa, saat ini Kemenkes mencatat hingga Juni 2015 penderita HIV berjumlah 17.325 jiwa. Angka ini dimungkinkan masih meningkat hingga akhir tahun (Muhammad, 2015).

Di Kawasan Timur Indonesia, Sulawesi Selatan adalah provinsi terbesar kedua setelah Papua dalam hal tingkat pandemi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV dan AIDS). Sulawesi Selatan juga merupakan daerah dengan jumlah penderita HIV yang cukup banyak. Jumlah penderita HIV di Sulawesi Selatan pada akhir september tahun 2014 sebanyak 4.314 kasus (Global Statistics UNAIDS, 2015). Pada akhir Juni 2015, jumlah penderita HIV dan AIDS di Sulawesi Selatan mencapai 9.871 orang. Angka itu

mengalami peningkatan cukup pesat selama enam bulan terakhir, dan setiap satu hari ada empat orang yang terinfeksi HIV di Sulawesi Selatan (Rahma, 2015).

Semua wilayah kabupaten/kota didalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kasus HIV dan AIDS. Tiga diantaranya yang tertinggi adalah Makassar, Parepare, dan Bulukumba. Bahkan, Kota Makassar disebut masuk peringkat tiga kota penderita HIV dan AIDS tertinggi di Indonesia, setelah Jayapura dan Jakarta (Alfianti, 2011).

Kasus HIV dan AIDS di Kota Makassar terus bertambah. Dari data tahun 2015, kasus HIV sudah mencapai 5.647 orang sedangkan AIDS sebanyak 2.058 orang. Sementara sampai semester pertama tahun 2016, terdapat tambahan 364 orang yang terinfeksi baru. Jika 364 orang terinfeksi dalam enam bulan, berarti setiap hari ada dua orang yang terinfeksi baru HIV dan AIDS di Makassar (Yani, 2016).

HIV dan AIDS menular melalui hubungan seksual, melalui darah, yaitu dengan transfusi darah yang mengandung HIV, tertusuk jarum yang mengandung HIV, terpapar mukosa yang mengandung HIV dan HIV juga ditularkan dari ibu ke anak melalui persalinan, selama kehamilan dan melalui air susu ibu (ASI) (Mansjoer, 2000).

Individu dengan HIV positif sistem imunitasnya akan mengalami penurunan dan membutuhkan beberapa tahun hingga ditemukannya gejala tahap lanjut dan dinyatakan sebagai penderita AIDS. Hal ini sangat bergantung pada kondisi fisik dan psikologisnya. Ketika individu dinyatakan terinfeksi HIV, sebagian besar menunjukkan perubahan karakter psikologisnya seperti: hidup dalam *stress*, depresi, merasa kurangnya dukungan sosial dan perubahan perilaku. Penderita HIV dan AIDS menghadapi sendiri kondisinya tanpa dukungan dari teman bahkan dari keluarga sehingga memberikan dampak kecemasan, depresi, rasa bersalah

dan pemikiran atau perilaku bunuh diri (Nasruddin, 2014) dalam (Hardiyatmi, 2016).

Pengobatan setelah terjadi pajanan infeksi HIV pada seseorang adalah terapi *Antiretroviral*, yang berarti mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Karena HIV adalah retrovirus maka obat ini disebut sebagai obat *Antiretroviral* (ARV). ARV tidak membunuh virus itu, namun hanya dapat memperlambat laju pertumbuhan virus, begitu juga penyakit HIV (Spiritia,2012) dalam (Hardiyatmi, 2016).

HIV merupakan salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya. Virus yang ada di dalam tubuh penderita ini tidak bisa keluar, sehingga seseorang harus mengonsumsi obat ARV seumur hidup dan tepat waktu. Jadwal ketat minum obat HIV ini tidak boleh meleset agar bisa menekan jumlah virus di tubuhnya. Jika tidak disiplin maka obat akan menjadi resisten terhadap tubuh (Kemenkes RI, 2014).

HIV adalah retrovirus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel T CD4 dan makrofag yang merupakan komponen vital dari sistem kekebalan tubuh. Hal inilah yang membuat ODHA memiliki sistem kekebalan tubuh lemah dan mudah terkena infeksi. Karenanya seseorang harus mengonsumsi obat ARV untuk mempertahankan kekebalan tubuhnya (Kemenkes RI, 2014).

Keluarga sangat berperan penting terutama dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang menderita HIV dan AIDS baik dari segi kepatuhan pengobatan, motivasi hidup dan sejenisnya. Fungsi keluarga biasanya didefinisikan sebagai hasil atau konsekuensi dari struktur keluarga. Adapun fungsi keluarga tersebut adalah Fungsi afektif (fungsi pemeliharaan kepribadian), Fungsi

sosialisasi dan fungsi penempatan sosial, Fungsi reproduktif, Fungsi ekonomis; Fungsi perawatan kesehatan (Friedman, 2010).

Menurut Sarason (1983) dalam (Pratiwi, 2011) Dukungan keluarga adalah keberatan, kesedihan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita, pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cobb (2002) mendefinisikan dukungan keluarga sebagai adanya kenyamanan, perhatian, penghargaan atau menolong orang dengan sikap menerima kondisinya, dukungan keluarga tersebut diperoleh dari individu maupun kelompok. Salah satu dukungan keluarga yang sangat dibutuhkan oleh penderita HIV dan AIDS adalah pengontrolan kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV).

Kepatuhan adalah tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokter atau oleh orang lain (Sarafino, 1994) dalam (Pratiwi, 2011). Sementara ini masih ada kecenderungan dari pasien untuk berperilaku kurang patuh terhadap nasehat atau saran tersebut. Secara umum ketidakpatuhan dapat meningkatkan risiko berkembangnya masalah kesehatan, atau memperburuk, atau memperpanjang sakit yang diderita.

Kepatuhan menentukan seberapa baik pengobatan *Antiretroviral* (ARV) dalam menekan jumlah *viral load*. Ketika lupa meminum satu dosis, meskipun hanya sekali, virus akan memiliki kesempatan untuk menggandakan diri lebih cepat. Hasil yang tidak dapat dielakkan dari semua tantangan ini adalah ketidakpatuhan, perkembangan resistensi, kegagalan terapi dan risiko pada kesehatan masyarakat akibat penularan jenis virus yang resistan. Obat ARV perlu diminum sesuai petunjuk dokter baik dosis maupun waktunya. Mengingat bahwa HIV adalah virus yang selalu bermutasi, maka jika tidak mematuhi aturan pemakaian obat ARV, obat yang dikonsumsi tidak bisa lagi memperlambat

laju HIV menuju ke tahap AIDS, sehingga perlu diganti dengan obat lain yang mungkin lebih mahal atau lebih sulit diperoleh.

Hasil penelitian (Mahardining, 2010) di Semarang menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terapi ARV adalah motivasi, pengetahuan dan dukungan keluarga merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi kepatuhan terapi ARV. Hasil penelitian Junaidy (2009) di Lantera Minangkabau menyimpulkan bahwa kepatuhan dari penderita ODHA berhubungan dengan keberhasilan terapi ARV.

Penelitian di Kota Makassar pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ODHA yang menggunakan pengobatan *antiretroviral* berjumlah 1.029 orang dan yang dinilai kepatuhannya berjumlah 983 orang. Sebanyak 920 (93,5%) ODHA memiliki kepatuhan tinggi atau lebih dari 95% dan 63 (6,4%) ODHA mempunyai kepatuhan rendah atau lebih rendah dari 95% (Dinkes Makassar, 2013).

Hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pengobatan *antiretroviral* ODHA di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pengukuran kepatuhan pengobatan *antiretroviral* ODHA di kota lain yang ada di Indonesia. Puskesmas Jumpang Baru adalah salah satu unit layanan kesehatan di Kota Makassar dengan fasilitas klinik *Voluntary Counseling and Test* (VCT) dan layanan pengobatan *antiretroviral*. Pada tahun 2013, puskesmas tersebut memiliki tingkat kepatuhan pasien ODHA yang tinggi, mencapai 96,9% (Rahma, 2015).

Beberapa penelitian yang lain telah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong ODHA untuk patuh terhadap pengobatan *antiretroviral*. Program kepatuhan terhadap obat-obatan individu penderita HIV dan AIDS ternyata bukan hanyalah masalah pasiennya saja. Pentingnya dukungan keluarga terlihat dalam hasil penelitian Nurbani (2007) terhadap orang dengan

penderita HIV dan AIDS (ODHA). Dukungan sosial yang diterima ODHA berdampak positif terhadap aspek kesehatan, psikologis, sosial dan pekerjaan ODHA.

Selain itu hasil penelitian Hardiyatmi (2016) menunjukkan pentingnya dukungan keluarga terhadap keberlangsungan pengobatan karena keluarga adalah orang terdekat pasien yang selalu memantau dan mengawasi pasien terutama pada saat semangat pasien menurun. Sehingga hal tersebut membantu ODHA dalam meningkatkan kesehatan guna memerangi virus HIV.

Maka berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan: “Seberapa besar pengaruh hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru?”

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ha Ada hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.
2. Ho Tidak ada hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang

dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas
Jumpanyang Baru.

D. Defenisi Operasional

Tabel 1.1
Defenisi Operasional

No	Variable	Defenisi Operasional	Parameter	Alat Ukur	Skala	Skor
1	Independen Dukungan keluarga	Yang di maksud dukungan keluarga dalam penelitian ini adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya dalam bentuk dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan emosional, dan dukungan instrumental.	skala <i>likert</i> yaitu 1= tidak pernah 2= kadang-kadang 3=Sering, 4=Selalu.	Quesioner	Ordinal	a. Mendukung: jika responden mendapatkan skor ≥ 25 b. Tidak mendukung: jika responden mendapatkan skor < 25
2	Dependent Kepatuhan pengobatan ARV	Yang di maksud kepatuhan pengobatan ARV dalam penelitian ini adalah kepatuhan yang dilihat dari segi perilaku ODHA sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.	skala <i>gutman</i> yaitu 1= Tidak 2=Ya	Quesiner	Nominal	a. Patuh: jika responden mendapatkan skor $\geq 16,5$ b. Tidak patuh: jika responden mendapatkan skor $< 16,5$

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2
Kajian Pustaka

NO	Nama Peneliti	Tempat Dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
				Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Enditira Yuli Pratiwi	Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor, Tahun 2011	Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Menjalankan Program Terapi Pada Pasien Terapi Rumatan Metadon Di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor.	Kepatuhan, dukungan keluarga	Pendekatan kuantitatif	Penelitian ini menggunakan populasi sebagai subjek penelitiannya dikarenakan subyek yang hanya berjumlah 45 orang.	Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan, pengaruh tersebut sebesar 19,8%.
2	Henny Kristian Siboro	Rumah Singgah Caritas PSE Medan, Tahun 2013	Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Keberfungsian Sosial Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) Di Rumah Singgah Caritas PSE Medan	Dukungan Keluarga, Keberfungsian Sosial	Analisis Kuantitatif	Orang dengan HIV dan AIDS merupakan dampingan atau klien dari rumah singgah Caritas PSE yang berjumlah 50 orang, dan terdata mulai dari tahun	Nilai koefisien korelasi $R^2 = 0,67$, Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dukungan keluarga memiliki hubungan positif yang mantap terhadap keberfungsian sosial Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)

						2011 sampai mei 2013	
3	Dhea Ariesta Khaerunnisa	Kelompok dukungan sebaya kuldesak di Kota Depok, Tahun 2015	Efektivitas Dukungan Sosial Bagi ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) di Kelompok Sebaya Kuldesak Kota Depok	Dukungan sosial	Penelitian Kuantitatif	Pengambilan sampel total sampling sebanyak 40 responden ODHA dari berbagai status	Efektivitas dukungan sosial bagi ODHA di kelompok dukungan sebaya kuldesak memiliki rata-rata skor (2,49) berdasarkan rata-rata skor tersebut dikategorikan kurang efektif
4	Hardiyatmi	Poliklinik VTC (<i>Voluntary Conseli Test</i>) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, Tahun 2016	Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan Penderita HIV dan AIDS di Poliklinik VCT (<i>Voluntary Counseling Test</i>) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	Dukungan keluarga, kepatuhan program pengobatan	Penelitian korelasi dengan <i>cross sectional</i>	Seluruh pasien HIV dan AIDS yang berobat di Poliklinik VTC (<i>Voluntary Conseli Test</i>) sebanyak 42 pasien dengan teknik <i>Total sampling</i>	Ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan pengobatan pasien HIV dan AIDS di Poliklinik VTC (<i>Voluntary Conseli Test</i>) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, status tinggal, status menikah, lama pengobatan dan kondisi pada pasien HIV dan AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru.
- b. Mengetahui tingkat kepatuhan terhadap pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.
- c. Mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya dan dokumentasi ilmiah sehingga hasilnya akan lebih luas dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Responden

Memberikan informasi mengenai pentingnya dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).

b. Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baru dalam bidang penelitian dan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).

c. Bagi Puskesmas Jumpandang Baru

Sebagai tempat untuk mengaplikasikan hasil penelitian tentang hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)

1. Pengertian HIV dan AIDS

Orang dengan HIV dan AIDS yang sering disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV dan AIDS. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah sejenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia (Kemenkes RI, 2014). HIV memiliki sifat retrovirus yang berarti virus yang dapat menggunakan sel tubuhnya sendiri untuk memproduksi kembali dirinya.

HIV merupakan virus sitopatik diklasifikasikan dalam famili *Retrovirus*, subfamili *Lentivirinae*, genus *Lentivirus*. Menurut Nursalam (2009), ada dua tipe HIV yang dapat menyebabkan AIDS, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantara darah, semen, cairan serviks, cairan vagina, ASI, air liur, serum, urine, air mata, cairan alveolar dan cairan serebrospinal. Akan tetapi, sejauh ini transmisi HIV secara efisien terjadi melalui darah, cairan sperma, cairan vagina dan serviks, dan air susu ibu (ASI) (Nasrodin, 2007).

Untuk dapat terjadi infeksi HIV diperlukan reseptor spesifik pada *sel host* yaitu molekul CD4 (Nasrodin, 2007). Menurut Nursalam (2009), target virus HIV adalah CD4 yang terdapat dalam nodus limfa dan thymus. Molekul CD4 mempunyai afinitas yang sangat besar terhadap HIV, terutama terhadap molekul glikoprotein (gp120) dari selubung virus. Menurut Nasrodin (2007), molekul CD4 paling banyak ditemukan di limfosit T.

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh maka orang tersebut sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal (Kemenkes, 2014).

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sindrom yang menunjukkan adanya defisiensi imun seluler pada seseorang tanpa adanya penyebab yang diketahui untuk dapat menerangkan terjadinya defisiensi tersebut, seperti keganasan, obat-obatan supresi imun, penyakit infeksi yang sudah dikenal dan sebagainya.

AIDS (*Acquired immunodeficiency syndrome*) juga merupakan sindrom dengan gejala penyakit infeksi oportunistik atau kanker tertentu akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) (Hesti, 2011).

Pada masa ini jumlah $CD4 < 200$ (Mansjoer, 2000). Pada masa ini terjadi penurunan daya tahan tubuh yang lanjut sehingga menyebabkan tubuh lebih mudah terinfeksi berbagai penyakit, seperti penyakit konstitusional, penyakit syaraf dan penyakit infeksi sekunder (Nursalam, 2009).

Menurut Mansjoer *et al* (2000) dan Nasronudin (2007) gejala-gejala terinfeksi HIV dan AIDS ada dua yaitu gejala mayor dan gejala minor. Gejala mayor dari penyakit HIV dan AIDS antara lain berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronik yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, dan ensefalopati.

Gejala minor dari penyakit HIV dan AIDS antara lain batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, herpes zoster multisegmental berulang,

kandidiasis orofaringeal, herpes simpleks kroniks progresif, limfadenopati generalisata, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita dan retinitis oleh virus sitomegalo (Mansjoer, 2000 dan Nasronudin, 2007).

2. Riwayat Penyakit

Adapun riwayat penyebab penyakit HIV dan AIDS yaitu:

a. Agens penyakit

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

b. Reservoir infeksi: manusia

c. Faktor host

Tidak ada yang spesifik kecuali prevalensi penularan tinggi pada usia produktif, pekerja seks, homoseksual dan etnis tertentu.

d. Periode masa inkubasi

Masa inkubasi penyakit ini bervariasi, waktu dari penularan hingga berkembang atau terdeteksinya antibodi biasanya satu sampai tiga bulan. Penularan virus HIV hingga terdiagnosa sebagai AIDS sekitar kurang lebih satu tahun hingga 15 tahun atau bahkan lebih. Median masa inkubasi pada anak-anak yang terinfeksi lebih pendek dari orang dewasa (Mandal, 2008 dan S. Kathy,2009).

Masa inkubasi pada orang dewasa berkisar tiga bulan sampai terbentuknya antibodi anti HIV. Manifestasi klinis infeksi HIV dapat singkat maupun bertahun –tahun tergantung tingkat kerentanan individu terhadap penyakit, fungsi imun dan infeksi lain. Khusus pada bayi dibawah umur satu tahun, diketahui bahwa viremia sudah dapat dideteksi pada bulan – bulan awal kehidupan dan tetap terdeteksi hingga usia satu tahun. Manifestasi klinis infeksi oppurtunistik sudah dapat dilihat ketika usia dua bulan (Mandal, 2008 dan S. Kathy,2009).

e. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial memegang peran penting, seperti gaya hidup, tempat hiburan malam dan wisata.

3. Proses Infeksi HIV

Menurut Mansjoer (2000), proses terjadinya infeksi HIV yaitu setelah HIV masuk ke dalam tubuh, virus menuju ke kelenjar limfe dan berada dalam sel dendritik dalam beberapa hari. Kemudian terjadi sindrom retroviral akut semacam flu disertai viremia hebat dengan keterlibatan berbagai kelenjar limfe. Sindrom ini akan hilang sendiri setelah 1-3 minggu.

Kadar virus yang tinggi dalam darah dapat diturunkan oleh sistem imun tubuh. Proses ini berlangsung berminggu-minggu sampai terjadi keseimbangan antara pembentukan virus baru dan upaya eliminasi oleh respons imun. Titik keseimbangan disebut *set point* dan sangat penting karena menentukan perjalanan penyakit selanjutnya.

Serokonversi (perubahan antibodi negatif menjadi positif) terjadi 1-3 setelah infeksi, tetapi pernah juga dilaporkan 8 bulan. Kemudian pasien akan memasuki masa tanpa gejala. Dalam masa ini terjadi penurunan terhadap jumlah CD4 (jumlah normal 800-1.000) yang terjadi setelah replikasi persisten HIV dengan kadar RNA virus relatif konstan.

Mula-mula penurunan jumlah CD4 sekitar 30-60/tahun, tapi pada dua tahun terakhir penurunan jumlah CD4 menjadi lebih cepat yaitu 50-100/tahun, sehingga tanpa pengobatan rata-rata masa dari infeksi HIV sampai masa AIDS adalah 8-10 tahun, dimana jumlah CD4 akan mencapai dibawah 200. CDC (*Centers for Disease Control*, USA 1868) menetapkan klasifikasi infeksi HIV pada orang dewasa (Daili, 2009), sebagai berikut:

- a. Kelompok I : Infeksi akut
- b. Kelompok II : Infeksi asimtomatis
- c. Kelompok III : Limfadenopati Generalisata Persisten (LGP)
- d. Kelompok IV : Penyakit-penyakit lain
- e. Kelompok IVa : Penyakit konstitusi (panas, diare, kehilangan berat badan)
- f. Kelompok IVb : Penyakit-penyakit neurologis (ensefalitis, demensia)
- g. Kelompok IVc : Penyakit-penyakit infeksi sekunder (*Pneumocystis carinii*, *Cytomegalo virus*)
- h. Kelompok IVd : Kanker sekunder (sarkoma kaposi, limfoma nonhodgkin)
- i. Kelompok IVe : Keadaan-keadaan lain

Gambaran klinis yang sesuai dengan perjalanan penyakit akan diuraikan dalam fase-fase berikut:

- a. Infeksi akut : CD4 = 750-1000

Infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologis ketika antibodi terhadap virus tersebut berubah dari negatif menjadi positif (Nursalam, 2009).

Menurut Daili *et al* (2009), gejala infeksi akut biasanya timbul sesudah masa inkubasi selama 1-3 bulan. Gejala yang timbul umumnya seperti influenza (*flu like syndrome*: demam, artralgia, malaise, anoreksia), gejala kulit (bercak merah, urtikaria), gejala syaraf (sakit kepala, nyeri retrobulber, radikulopati, gangguan kognitif dan afektif), gangguan gastrointestinal (nausea, vomitus, diare, kandidiasis orofaringitis). Sedangkan menurut Mansjoer (2000), gejala yang timbul yaitu demam, pembesaran kelenjar, hepatosplenomegali, nyeri tenggorokan, mialgia, rasa seperti morbili, ulkus pada mukokutan, diare, leukopenia, dan limfatik atipik.

Gejala tersebut diatas, merupakan reaksi tubuh terhadap masuknya virus dan berlangsung selama 1-2 minggu. Serokonversi terjadi pada fase ini dan antibodi virus mulai dapat dideteksi kira-kira 3-6 bulan sesudah infeksi (Daili, 2009)

b. Infeksi asimtomatik : $CD4 > 500/ml$

Asimtomatik berarti bahwa di dalam organ tubuh terdapat HIV tetapi tubuh tidak menunjukkan gejala-gejala (Nursalam, 2009). Keadaan ini berlangsung selama 5-10 tahun. Pada masa ini sudah mulai terjadi penurunan jumlah sel CD4 sebagai petunjuk menurunnya kekebalan tubuh penderita, tetapi masih berada pada tingkat 500/ml (Daili, 2009). Menurut Mansjoer (2000), pada masa ini terjadi penurunan jumlah CD4 secara bertahap, disebut juga masa jendela (*window period*).

c. Infeksi simtomatik (gejala dini)

Menurut Mansjoer (2000), pada masa ini jumlah CD4 antara 100-300 sedangkan menurut Daili (2009), jumlah CD4 pada masa ini yaitu 200-500. Gejala yang timbul yaitu akibat infeksi pneumonia bakterial, kandidosis vagina, sariawan, herpes zoster, leukoplakia, ITP, dan tuberkulosis paru (Mansjoer, 2000).

Masa ini disebut juga *AIDS Related Complex* (ARC). Menurut Daili *et al* (2009), ARC adalah keadaan yang ditandai oleh paling sedikit dua gejala dari gejala-gejala yakni demam yang berlangsung > 3 bulan, penurunan berat badan $> 10\%$, limfadenopati berlangsung > 3 bulan, diare, kelelahan dan keringan malam.

Dengan ditambah paling sedikit dua kelainan laboratorium antara lain $T4 < 400/ml$, $ratio\ T4/T8 < 1,0$, leukotrombositopenia dan anemia,

peningkatan serum imunoglobulin, penurunan blastogenesis sel limfosit dan tes kulit anergi (Daili, 2009).

4. Transmisi HIV dan AIDS

Transmisi HIV dan AIDS dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Transmisi melalui kontak seksual

Kontak seksual merupakan salah satu cara utama transmisi HIV di berbagai negara. Hubungan seksual secara vagina, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Virus HIV dapat ditemukan dalam cairan semen, cairan vagina dan cairan serviks (Nursalam, 2009).

Virus akan terkonsentrasi dalam cairan semen, terutama bila terjadi peningkatan jumlah limfosit dalam cairan, seperti pada keadaan peradangan genitalia misalnya uretritis, epididimitis, dan kelainan lain yang berkaitan dengan penyakit menular seksual (Nasronudin, 2007). Selama hubungan seksual berlangsung, cairan semen, cairan vagina dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur atau mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut masuk ke dalam darah (Nasronudin, 2007).

Tidak ada satu agama di dunia ini yang membolehkan pengikutnya untuk melakukan seks diluar nikah, pandangan dari berbagai agama mengenai seks bebas pastilah negatif terlebih lagi di agama Islam. Dalam memperoleh keturunan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mensyari'atkan bahwa hal tersebut harus dalam ikatan suami istri, dan sudah dihalalkan dalam islam sehingga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengharamkan zina. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengharamkan hambanya untuk berbuat zina, Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010).

Diterangkan di dalam ayat tersebut bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan termasuk jalan yang sesat, karena perzinahan akan menimbulkan dampak negatif, seperti timbulnya penyakit-penyakit kelamin, yang berakhir dengan kematian. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mendekati zina dan harus menjauhi zina.

Al-Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata tentang ayat ini “Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya” (Tafsir Ibnu Katsir 5/55).

Asy-Syaikh As-Sa’di *rahimahullah* menjelaskan pula tentang ayat ini dalam tafsirnya, “larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan terjerumus kepadanya. Terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina” (Tafsir Al-Karim Ar-Rahman hal 457).

Adapun hukuman yang diterapkan di agama Islam adalah dengan menegakkan hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah berupa rajam dengan lemparan batu hingga meninggal agar seluruh anggota tubuhnya merasakan siksaan itu sebagai hukuman bagi keduanya.

Keduanya dilempar dengan batu sebagai gambaran bahwa mereka telah menghancurkan suatu rumah tangga, maka keduanya dirajam dengan menggunakan batu-batu dari bangunan yang telah mereka hancurkan itu. Bila

keduanya belum berkeluarga, maka mereka dicambuk sebanyak 100 kali dengan cambukan yang paling keras dan dibuang dari negeri asalnya selama satu tahun.

Di Indonesia tidak dapat memberlakukan hukum rajam karena Indonesia merupakan negara yang demokrasi, hukum rajam berlaku di negara Islam seperti Arab Saudi.

b. Transmisi melalui darah atau produk darah

HIV dapat ditransmisikan melalui darah dan produk darah. Terutama pada individu pengguna narkoba intravena dengan pemakaian jarum suntik secara bersama dalam satu kelompok (Nasronudin, 2007). Dapat juga pada individu yang menerima transfusi darah atau produk darah yang mengabaikan tes penapisan HIV.

c. Transmisi secara vertikal.

Transmisi secara vertikal dapat terjadi dari ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya sewaktu hamil, sewaktu persalinan, dan setelah melahirkan melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) (Nasronudin, 2007). Angka penularan selama kehamilan sekitar 5-10%, melalui persalinan 10-20%, dan saat pemberian ASI 10-20% (Nasronudin, 2007). Penularan selama persalinan terjadi melalui transfusi *fetomaternal* atau kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat melahirkan (Lily, 2004 dalam Nursalam, 2009).

d. Transmisi melalui alat kesehatan yang tidak steril.

Alat pemeriksaan kandungan seperti spekulum, tenakulum, dan alat-alat lain yang menyentuh darah, cairan vagina atau cairan semen yang terinfeksi HIV dan langsung digunakan untuk orang lain yang tidak terinfeksi bisa menularkan HIV (Nursalam, 2009).

e. Transmisi pada petugas kesehatan dan petugas laboratorium.

Risiko penularan HIV terdapat pada kelompok pekerja yang terpapar HIV seperti petugas kesehatan, petugas laboratorium, dan orang yang bekerja dengan spesimen atau bahan yang terinfeksi HIV, terutama bila menggunakan benda tajam (Nasronudin, 2007). Berbagai penelitian multi institusi menyatakan bahwa risiko penularan HIV setelah kulit tertusuk jarum atau benda tajam lainnya yang tercemar oleh darah seseorang yang terinfeksi HIV adalah sekitar 0,3% sedangkan risiko penularan HIV akibat paparan bahan yang tercemar HIV ke membran mukosa atau kulit yang mengalami luka adalah sekitar 0,09% (Nasronudin, 2007).

Tabel 2.1
Faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko peningkatan transmisi (Mandal, 2006), sebagai berikut:

Transmisi	Faktor yang meningkatkan risiko
Umum pada setiap orang	Viral load tinggi
	Adanya AIDS
	Serokonversi
	Hitung CD4 rendah
Ibu ke anak	Pecah ketuban lama
	Persalinan pervaginam
	Menyusui
	Tidak ada profilaksis HIV
Seksual	Terjadi bersama dengan PMS lain
	Anal seks yang reseptif vs insertif
	Tidak di sirkumsisi
	Peningkatan jumlah pasangan seksual
Penggunaan obat suntik	Menggunakan alat secara bersama-sama dan penggunaan berulang
	Suntikan IV vs subkutan
Pekerjaan	Trauma dalam
	Darah yang terlihat dalam peralatan
	Penempatan alat arteri atau vena sebelumnya

5. Faktor Risiko Terinfeksi HIV dan AIDS

Nasronudin (2007) menyebutkan faktor risiko epidemiologis infeksi HIV yaitu perilaku berisiko tinggi antara lain hubungan seksual dengan pasangan tanpa menggunakan kondom, pengguna narkotika intravena terutama bila

pemakaian jarum secara bersama tanpa sterilisasi yang memadai, hubungan seksual yang tidak aman meliputi multipartner, pasangan seks individu yang diketahui terinfeksi HIV dan kontak seks peranal.

Selain itu riwayat infeksi menular seksual dan riwayat menerima transfusi darah berulang tanpa tes penapisan, riwayat perlukaan kulit, tato, tindik atau sirkumsisi dengan alat yang tidak steril juga merupakan faktor risiko terkena infeksi HIV (Nasronudin, 2007).

6. Pencegahan Penularan HIV dan AIDS

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat yang efektif untuk mencegah atau menyembuhkan AIDS/Infeksi HIV, sehingga untuk menghindari terinfeksi HIV dan menekan penyebarannya cara yang utama adalah perubahan perilaku.

Pencegahan HIV dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan penularan HIV antara lain pengetahuan, sikap, dan lingkungan keluarga (Hasanudin, 2013) .

Cara pencegahan penularan HIV yang paling efektif adalah dengan memutus rantai penularan. Penularan dikaitkan dengan cara – cara penularan HIV (Wartono,1999):

- a. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual
- b. Pencegahan penularan melalui darah
 - 1) Tranfusi darah
 - 2) Alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit
 - 3) Pencegahan penularan dari ibu ke anak

Saat ini Program penanggulangan AIDS di Indonesia mempunyai 4 pilar, yang semuanya menuju pada paradigma *Zero new infection, Zero AIDS-related death* dan *Zero Discrimination*. Empat pilar tersebut adalah (Kemenkes RI, 2011):

- a. Pencegahan (prevention); yang meliputi pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual dan alatsuntik, pencegahan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pencegahan HIV dari ibu ke bayi (*Prevention Mother to Child Transmission, PMTCT*), pencegahan di kalangan pelanggan penaja seks, dan lain-lain.
- b. Perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP); yang meliputi penguatan dan pengembangan layanan kesehatan, pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik, pengobatan *antiretroviral* dan dukungan serta pendidikan dan pelatihan bagi ODHA. Program PDP terutama ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan rawat inap, angka kematian yang berhubungan dengan AIDS, dan meningkatkan kualitas hidup orang terinfeksi HIV (berbagai stadium). Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan pemberian terapi *antiretroviral* (ARV).
- c. Mitigasi dampak berupa dukungan psikosocio-ekonomi.
- d. Penciptaan lingkungan yang kondusif (*creating enabling environment*) yang meliputi program peningkatan lingkungan yang kondusif adalah dengan penguatan kelembagaan dan manajemen, manajemen program serta penyelarasan kebijakan dan lain-lain.

B. Antiretroviral (ARV)

1. Definisi ARV

Antiretroviral (ARV) adalah obat yang menghambat replikasi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Terapi dengan ARV adalah strategi yang secara klinis paling berhasil hingga saat ini.

Terapi *antiretroviral* (ARV) berarti mengobati infeksi HIV dengan obat-obatan. Obat tersebut (yang disebut ARV) tidak membunuh virus itu, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus, waktu pertumbuhan virus diperlambat, begitu juga penyakit HIV. Karena HIV adalah retrovirus, obat-obat ini biasa disebut sebagai terapi *antiretroviral* (ARV) (Spiritia, 2008).

2. Penggolongan ARV

Ada tiga golongan ARV, yaitu (Depkes RI, 2006):

- a. Penghambat masuknya virus yaitu bekerja dengan cara berikatan dengan subunit GP41 selubung glikoprotein virus sehingga fusi virus ke target sel dihambat. Satu – satunya obat penghambat fusi ini adalah enfuvirtid.
- b. Penghambat reverse transcriptase Inhibitor (RTI), terdiri dari 3 bagian , yaitu :
 - 1) *Analog nukleosida* (NRTI), NRTI diubah secara intraseluler dalam 3 tahap penambahan atau 3 gugus fosfat dan selanjutnya berkompetisi dengan natural nukleotida menghambat RT sehingga perubahan RNA menjadi DNA terhambat. Selain itu, NRTI juga menghentikan pemanjangan DNA.

- 2) *Analog nukleotida* (NtRTI), mekanisme kerjanya pada penghambatan replikasi HIV sama dengan NRTI tetapi hanya memerlukan 2 tahapan proses fosforilasi.
 - 3) *Non nukleosida* (NNRTI), mekanisme kerjanya tidak melalui tahapan fosforilasi intraseluler tetapi berikatan langsung dengan reseptor pada RT dan tidak berkompetisi dengan nukleotida natural. Aktivitas antiviral terhadap HIV – 2 tidak kuat.
- c. *Protease inhibitor* (PI), berikatan secara reversible dengan enzim protease yang mengkatalisa pembentukan protein yang dibutuhkan untuk proses akhir pematangan virus. Akibatnya virus yang terbentuk tidak masuk dan tidak mampu menginfeksi sel lain.

3. Tujuan Pengobatan/Terapi ARV

Pengobatan/terapi *antiretroviral* (ARV) kombinasi bertujuan menekan replikasi HIV secara maksimal. Sehingga meningkatkan peluang bertahan hidup. Akan tetapi, jika tidak mengikuti aturan obat dengan baik, penyakit bisa bertahan dan penanganan bisa gagal. Pasien harus paham bahwa aturan medikasi harus dipatuhi dengan saksama dan bisa dibutuhkan selama beberapa tahun maupun seumur hidup (Jurnal Nursing, 2011).

Selain dari tujuan tersebut masih terdapat beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai dari pengobatan/terapi ARV seperti; mengurangi laju penularan HIV di masyarakat, memulihkan dan/atau memelihara fungsi imunologis (stabilisasi/peningkatansel CD4), menurunkan komplikasi akibat HIV, menekan

replikasi virus secara maksimal dan secara terus-menerus serta menurunkan angka kesakitan dan kematian yang berhubungan dengan HIV (Depkes RI,2006).

4. Manfaat Pengobatan/Terapi ARV

Manfaat pengobatan/terapi antiretroviral adalah sebagai berikut (Depkes RI,2006) :

- a. Menurunkan morbiditas dan mortalitas
- b. Pasien yang ARV tetap produktif
- c. Memulihkan sistem kekebalan tubuh sehingga kebutuhan profilaksis infeksi oportunistik berkurang atau tidak perlu lagi.
- d. Mengurangi penularan karena *viral load* menjadi rendah atau tidak terdeteksi, namun ODHA dengan *viral load* tidak terdeteksi, namun harus dipandang tetap menular.
- e. Mengurangi biaya rawat inap dan terjadinya yatim piatu
- f. Mendorong ODHA untuk meminta tes HIV atau mengungkapkan status HIVnya secara sukarela.

5. Dosis Pemberian ARV

Pemberian terapi *antiretroviral* tidak dapat diberikan begitu saja namun mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: kemampuan, kesanggupan pengobatan jangka panjang, resistensi obat, efek samping, jangkauan memperoleh obat, saat yang tepat untuk memulai terapi.

Tersedianya obat *antiretroviral* (ARV) penatalaksanaan HIV di Indonesia mengalami perubahan yang dramatis. Obat ARV bekerja langsung menghambat replikasi HIV, bila diberikan secara kombinasi akan dapat mengurangi jumlah

virus berkisar 1.000.000 kopi/ml. Terapi ARV kombinasi secara teratur dan berkesinambungan diharapkan dapat menurunkan jumlah virus menjadi 50 kopi/ml, bila terapi kombinasi diteruskan 2 tahun dan seterusnya diharapkan jumlah virus akan semakin turun menjadi sekitar 5 kopi/ml.

Jumlah terendah tersebut harus tetap dipertahankan melalui pemberian ARV berkesinambungan. Sisa virus tersebut diharapkan dapat dieliminasi oleh sistem kekebalan tubuh, maka upaya memperkuat status imun melalui dukungan nutrisi berbasis mikronutrien sangat diperlukan oleh tubuh ODHA dengan mengendalikan asam eliminasi.

Waktu memulai ARV harus dipertimbangkan dengan seksama karena obat ARV akan diberikan dalam jangka panjang. Obat ARV direkomendasikan pada semua pasien yang telah menunjukkan gejala yang termasuk dalam kriteria diagnosis AIDS atau menunjukkan gejala yang termasuk dalam kriteria diagnosis AIDS atau menunjukkan gejala yang sangat berat, tanpa melihat jumlah CD4+. Obat ini juga direkomendasikan pada pasien asimtomatik dengan jumlah limfosit CD4+ kurang dari 200 sel/mm^3 . Pasien dengan jumlah limfosit CD4+ $200-350 \text{ sel/mm}^3$ dapat ditawarkan untuk memulai terapi.

Pada pasien asimptomatik dengan jumlah limfosit CD4+ lebih dari 350 sel/mm^3 dan viral load lebih dari 100.000 kopi/ml terapi ARV dapat dimulai, namun dapat pula ditunda. Terapi ARV tidak dianjurkan dimulai pada pasien dengan jumlah limfosit CD4+ lebih dari 350 sel/mm^3 dan viral load kurang dari 100.000 kopi/ml (Zubari Djoerban, 2006).

Tidak semua obat ARV yang ada beredar di Indonesia. Adapun beberapa obat ARV yang beredar di Indonesia :

Tabel 2.2
Obat ARV yang Beredar di Indonesia
(Nama Dagang, Golongan, Sediaan, dan Dosis per Hari)

Nama Dagang	Nama Generik	Golongan	Sediaan	Dosis (Per Hari)
Duviral			Tablet, kandungan: zidovudin 300 mg, lamivudin 150 mg	2x1 tablet
Stavir Zerit	Staviudin	NsRTI	Kapsul : 30 mg. 40 mg	>60 kg : 2x40mg <60 kg : 2x40mg
Heviral 3TC	Lamivudin (3TC)	NsRTI	Tablet 150 mg Lar.oral 10 mg/ml	2x150 mg <50kg ; 2/kg, 2x/hari
Viramune Neviral	Nevirapin (NVP)	NsRTI	Tablet 200 mg	1x200 mg selama 14 hari dilanjutkan 2x200 mg
Retrovir Adovi Videx	Zidovudin (ZDV, AZT)	NsRTI	Kapsul 100 mg	2x30 mg, atau 2x250 (dosis alternative)
	Didanosis (ddl)	NsRTI	Tablet Kunyah : 100 mg	>60 kg : 2x200 mg, atau 1x40 mg <60 kg : 2x125 mg atau 1x250 mg
Stocrin	Efavirens (EFV, EFZ)	NNRTI	Kapsul 250 mg	1x 600 mg, malam
Nelvex	Nelfinarir (NFV)	PI	Tablet 250 mg	2x250 mg

HIV juga dapat menjadi resisten terhadap sejenis obat bila tingkat darah obat tersebut terlalu rendah untuk menghentikan reproduksi virus. Selagi HIV terus bereproduksi, jenis-jenis virus yang mampu reproduksi tanpa terpengaruh obat (jenis yang resisten terhadap obat) menjadi lebih unggul dari pada jenis yang sensitive terhadap obat dan akan menjadi dasar bagi populasi HIV yang baru di dalam tubuh (Spiritia, 2006).

Resistensi HIV terjadi apabila terjadi mutasi atau perubahan pada struktur genetik HIV, sehingga HIV menjadi kuat melawan obat *antiretroviral* (ARV) tertentu. Dengan kata lain, terjadinya perubahan genetik yang memungkinkan HIV terus melakukan replikasi walaupun pasien menjalani terapi *antiretroviral*. Idealnya, setiap sel baru hasil proses replikasi yang terjadi didalam tubuh sama persis seperti sel awal yang direplikasi. Tapi kadang-kadang terjadi kesalahan kecil di dalam sebuah sel yang kemudian terbawa pada sel baru. Sampai pada suatu saat, sel-sel yang mengandung kesalahan-kesalahan kecil ini menjadi banyak. Perubahan kecil di dalam komposisi genetic sel disebut “mutasi”. Mutasi sering terjadi pada HIV karena cepatnya proses replikasi sel berlangsung dan ketidak hadirannya mekanisme untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini (Spiritia. 2007).

Mutasi menyebabkan HIV menjadi mampu melawan obat ARV. Dengan kata lain, telah terjadi resistensi HIV. Biasanya, mutasi terjadi di dalam sel apabila terjadi kondisi tertentu atau disebabkan oleh faktor tertentu. Misalnya stress akibat lingkungan, paparan terhadap toksin (racun di dalam tubuh), paparan terhadap berbagai obat secara berulang-ulang. Tapi seringkali, resistensi timbul akibat ketidak patuhan terhadap ARV atau terputusnya terapi ARV (Spiritia,2007).

Terputusnya terapi ini bisa disebabkan karena pasien merasa lebih fit sehingga beranggapan tidak perlu meneruskan terapinya, atau bisa juga karena penyediaan obat terhenti. Walaupun kebanyakan replikasi HIV dapat dicegah oleh obat ARV, beberapa virus tetap mengalami mutasi sehingga mengakibatkan berlipat gandanya salah satu lini (strain) yang resisten ini, maka obat ARV menjadi berkurang efektifitasnya (Spiritia, 2007).

Di Negara-negara maju, di mana banyak pilihan obat ARV, hal ini bisa mengakibatkan sulitnya mencari kombinasi obat ARV yang tepat. Berkat

tersedianya obat ARV, banyak orang yang terkena HIV bisa hidup lebih lama. Tapi dengan mereka hidup lebih lama dengan HIV. Kemungkinan untuk virus bermutasi atau menjadi kuat melawan obat ARV juga menjadi lebih besar. Resistensi HIV merupakan masalah yang sering terjadi, yang banyak berpengaruh pada pasiennya yang menjalani terapi *antiretroviral*.

Di Indonesia, sesuai pendekatan Kesehatan Masyarakat yang diujarkannya oleh WHO dalam hal pemakaian obat ARV di negara berkembang jika terapi lini pertama dirasakan mulai “gagal” (bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap terapi *antiretroviral*), maka rejimen pengobatan akan dialihkan ke lini-2, dengan mengganti semua obat yang dipakai untuk mengobati HIV lini-1. Di negara-negara maju, jika telah terjadi resistensi HIV, dokter biasanya melakukan tes resistensi HIV (berupa tes darah) untuk mengetahui obat ARV yang mana kiranya yang paling efisien untuk melawan virus yang telah bermutasi dan yang mana perlu dihindari. Ada dua macam tes resistensi yang tersedia, yaitu (Spiritia, 2007):

1) *Genotypic Testing*

Tes ini meneliti HIV yang ada di dalam darah pasien dan memeriksa apakah telah terjadi mutasi. Jika dokter mengetahui bahwa mutasi genetik tertentu telah terjadi, maka ia bisa mengetahui virus telah menjadi resisten terhadap obat ARV yang mana atau jenis obat ARV yang mana secara spesifik. Jenis tes ini cepat hasilnya dan terjangkau harganya (di negara maju).

2) *Phenotypic Testing*

Tes ini berbeda dengan *Genotypic Testing* karena tes ini mengambil virus dan memaparkannya terhadap obat ARV dengan konsentrasi yang berbeda-beda untuk memastikan obat ARV yang mana yang efektif. Metode ini dipakai pada tahap dini pengembangan sebuah obat itu dibolehkan dikonsumsi oleh

manusia. Tes ini lambat prosesnya dan mahal harganya sehingga hanya sedikit orang yang bisa memanfaatkannya.

Seperti disebut di atas, tes resistensi HIV bisa membantu dokter merancang jenis terapi yang cocok untuk pasien yang terpapar pada berbagai macam kombinasi obat ARV. Namun dewasa ini banyak terjadi kasus dimana orang yang baru saja didiagnosa mengidap HIV ternyata sudah terinfeksi oleh virus yang resisten. Dengan kata lain, pasien tertular oleh virus yang sudah dalam keadaan resisten terhadap obat ARV tertentu.

Tentu saja hal ini merupakan masalah, baik di negara-negara berkembang di mana pilihan obat ARV tidak banyak maupun di negara-negara maju karena membuat sulit memilih terapi mana yang paling baik, mengingat bahwa kombinasi obat ARV tertentu yang biasanya diberikan kepada orang yang baru saja terinfeksi HIV menjadi tidak bisa diberikan kepada orang yang virusnya sudah resisten terhadap obat ARV tertentu ini. Padahal. Seperti kita ketahui, bagaimana seorang pasien mendapatkan pengobatan pada tahap awal infeksi sangat mempengaruhi jalan penyakitnya atau prognosinya (Spiritia, 2007).

Keberhasilan terapi dapat dilihat dari tanda-tanda klinis pasien yang membaik setelah terapi, salah satunya infeksi oportunistik tidak terjadi. Ukuran jumlah sel CD4⁺ menjadi predictor terkuat terjadinya komplikasi HIV. Jumlah CD4⁺ yang menurun diasosiasikan sebagai perbaikan yang lambat dalam terapi, meski pada kenyataannya pasien yang memulai terapi pada saat CD4⁺ rendah, akan menunjukkan perbaikan yang lambat. Namun jumlah CD4⁺ di bawah 100 sel/mm³ menunjukkan resiko yang signifikan untuk terjadinya penyakit HIV yang progresif. Maka, kegagalan imunologik.

C. Dukungan Keluarga

1. Definisi Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang akan terjadi sepanjang masa kehidupan, sifat dan jenis dukungan berbeda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan sosial internal, seperti dukungan dari suami, istri atau dukungan dari saudara kandung dan dapat juga berupa dukungan keluarga eksternal bagi keluarga inti.

Dukungan keluarga didefinisikan oleh Gottlieb (1983) dalam Zainudin (2002) yaitu informasi verbal, sasaran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek didalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau pengaruh pada tingkah laku penerimaannya. Dalam hal ini orang yang merasa memperoleh dukungan sosial, secara emosional merasa lega diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya.

Dukungan keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Sebagai akibatnya, hal ini akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga (Friedman, 2010).

Dukungan keluarga juga merupakan sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya. Keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya. Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan (Friedman, 1998).

Menurut Sarason (1983) dalam Zainudin (2002). Dukungan keluarga adalah keberatan, kesedihan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita, pandangan yang samajuga dikemukakan oleh

Cobb (2002) mendefinisikan dukungan keluarga sebagai adanya kenyamanan, perhatian, penghargaan atau menolong orang dengan sikap menerima kondinya, dukungan keluarga tersebut diperoleh dari individu maupun kelompok.

Eagly & Chaiken (1993), menyatakan bahwa pihak yang memberikan dukungan (motivator) sangat berperan dalam memotivasi individu untuk merubah perilakunya. Makin tinggi status pihak yang memberi dukungan makin besar kemungkinan individu merubah perilakunya. Menurut Notoatmodjo (2007), lingkungan keluarga merupakan faktor yang dominan dalam merubah perilaku seseorang. Menurut Bandura (1986), jika kita mau seseorang melakukan perubahan maka penting untuk memberikan penghargaan untuk perilaku tersebut.

2. Tipe Keluarga

Dukungan keluarga terhadap seseorang dapat dipengaruhi oleh tipe keluarga. Menurut Suprajitno (2004), pembagian tipe keluarga tergantung pada konteks keilmuan dan orang yang mengelompokkan. Secara tradisional tipe keluarga dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi atau keduanya
- b) Keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah seperti kakek, nenek, paman dan bibi.

Tipe keluarga yang dianut oleh masyarakat di Indonesia adalah tipe keluarga tradisional. Menurut Allender & Spradley (2001) dalam Achjar (2010). Tipe keluarga tradisional dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Keluarga inti (*nuclear family*) yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak (anak kandung atau anak angkat).

- b) Keluarga besar (*extended family*), yaitu keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman dan bibi.
- c) Keluarga *dyad* yaitu keluarga yang terdiri dari suami istri tanpa anak.
- d) *Single parent* yaitu keluarga yang terdiri dari satu orang tua dengan anak kandung atau anak angkat.
- e) Keluarga usia lanjut yaitu keluarga yang terdiri dari suami istri yang berusia lanjut.

Menurut Friedman (1998), individu yang tinggal dalam keluarga besar (*extended family*) akan mendapatkan dukungan keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang tinggal dalam keluarga inti (*nuclear family*).

3. Fungsi Keluarga dalam Pandangan Islam

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Al- Qur'an surat *At-Takhrim* ayat 6 menjelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلَّا مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010).

Wahai orang-orang yang dipercayakan kepada Allah dan Rasul-Nya hendaklah sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan kepada Allah dan menuruti segala perintah-Nya. dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian ini melalui nasehat dan pengajaran (A. Mustafa Al-Maraghi, 1993).

Dalam suatu riwayat disebutkan ketika turun ayat itu Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita? Rasulullah menjawab:” kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintah mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan diri mereka dari neraka”.

Selain surat *At-Tahrim* ayat 6 tersebut, ada ayat lain yang memiliki redaksi dan kandungan yang sama, juga terdapat pada surat *Thaaha* ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya:”Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”. (Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010).

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW, dan setiap kepala keluarga muslim bahwa *dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat* secara

baik dan berkesinambung pada setiap waktunya *dan bersungguh-sungguhlah* engkau wahai Nabi Muhammad dalam *bersabar atasnya*, yakni dalam melaksanakannya. *Kami tidak meminta kepadamu rezeki* dengan perintah shalat ini, atau Kami tidak membebanimu untuk menanggung rezeki bagi dirimu atau keluargamu, *Kami-lah yang memberi jaminan rezeki kepadamu*. Dan *kesudahan* yang baik di dunia dan di akhirat *adalah bagi* orang-orang yang menghiasi dirinya dengan *ketakwaan* (M. Quraish Shihab, 2002).

4. Fungsi Dukungan Keluarga

Fungsi dukungan keluarga menurut Caplan (1964) dalam Friedman (1998), antara lain:

a. Dukungan informasional

Keluarga memberikan saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan dalam mengungkapkan suatu masalah. Manfaat dari dukungan ini yaitu dapat menekan munculnya stres karena informasi yang diberikan memberikan semangat pada individu. Aspek-aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk dan pemberian informasi.

b. Dukungan penilaian

Keluarga bertindak untuk membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, penghargaan, perhatian.

c. Dukungan instrumental

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya kesehatan penderita dalam hal kebutuhan makan dan minum, istirahat, dan terhindar dari kelelahan.

d. Dukungan emosional

Keluarga sebagai tempat nyaman untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan.

Fungsi pokok keluarga biasanya didenifikasikan sebagai hasil atau konsekuensi dari struktur keluarga. Adapun fungsi keluarga tersebut adalah (Friedman,2010) :

- a. Fungsi afektif (fungsi pemeliharaan kepribadian): untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, saling mengasuh dan memeberikan cinta kasih, serta saling menerima dan mendukung.
- b. Fungsi sosialisidan fungsi penempatan sosial: proses perkembangan dan perubahan individu keluarga, tempat anggota keluarga berinteraksi sosial dan belajar berperan dilingkungan.
- c. Fungsi reproduktif: untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia.
- d. Fungsi ekonomis: untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti sandang, pangan dan papan.
- e. Fungsi perawatan kesehatan: untuk merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan.

Adapun fungsi keluarga sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai tugas dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan. Friedman (2010) membagi 5 tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya

Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga, maka apabila menyadari adanya perubahan perlu segera dicatat kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi dan seberapa besar perubahannya

2. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi keluarga.

Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga maka segera melakukan tindakan yang tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan seyoganya meminta bantuan orang lain dilingkungan sekitar keluarga.

3. Memberikan keperawatan anggotanya yang sakit atau yang tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya terlalu muda. Perawatan ini dapat dilakukan dirumah apabila keluarga memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama atau pelayanan kesehatan untuk memperoleh tindakan lanjutan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi.

4. Mempertahankan suasana dirumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga.

5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan (pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada).

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga lainnya adalah kelas sosial ekonomi orang tua. Kelas sosial ekonomi disini meliputi tingkat pendapatan atau pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan. Dalam keluarga kelas menengah,

suatu hubungan yang lebih demokratis dan adil mungkin ada, sementara dalam keluarga kelas bawah, hubungan yang ada lebih otoritas atau otokrasi. Selain itu orang tua dengan kelas sosial menengah mempunyai tingkat dukungan, afeksi dan keterlibatan yang lebih tinggi daripada orang tua dengan kelas sosial bawah.

Kewajiban kita juga sebagai manusia untuk saling memberikan dukungan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Huujurat ayat 10 berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu. Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010)

Dalam ayat diatas dikatakan “bersaudara” dan karena kita bersaudara maka kita harus menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan saling mendukung baik dalam suka maupun duka. Dapat diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh ada diskriminasi atau pembedaan diantara sesama manusia karena pada dasarnya manusia itu sama di mata Allah *Shubhanahu wa Ta'ala*. Untuk itu, dengan ayat tersebut sebagai manusia yang takut dan taat kepada Allah *Shubhanahu wa Ta'ala* kita tidak boleh membeda-bedakan terlebih lagi mengecilkan ODHA. Justru kitalah yang seharusnya menolong dan memberikan dukungan kepada mereka.

5. Cara Menilai Dukungan Keluarga

Menurut Nursalam (2013), untuk mengetahui besarnya dukungan keluarga dapat diukur dengan menggunakan kuisioner dukungan keluarga yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari 10 buah pertanyaan, pertanyaan no 1-3 mengenai dukungan emosional dan penilaian, pertanyaan no 4-7 mengenai dukungan instrumental, dan pertanyaan no 8-10 mengenai dukungan informasional.

Masing-masing dari pertanyaan tersebut terdapat 4 alternatif jawaban yaitu “selalu”, “sering”, “kadang-kadang”, dan “tidak pernah”. Jika menjawab “selalu” akan mendapat skor 4, menjawab “sering” mendapat skor 3, menjawab “kadang-kadang” mendapat skor 2, dan menjawab “tidak pernah” mendapat skor 1. Total skor pada kuisioner ini adalah 1-40. Jawaban dari responden dilakukan dengan skoring.

D. Kepatuhan Pengobatan *Antiretrovial* (ARV)

1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2003:837) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut, taat, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan sendiri berarti sifat patuh, ketaatan. Chaplin (2005: 493) dalam kamus Psikologi mendefinisikan “kepatuhan (*submissiveness*) sebagai satu sikap yang mengarahkan seseorang untuk mencari dan menerima dominasi orang lain”. Menurut Smet B (1994:254) perilaku kepatuhan atau ketaatan sering diartikan sebagai “usaha pasien untuk mengendalikan kesehatannya”.

Kepatuhan (*adherence*) adalah suatu bentuk perilaku yang timbul akibat adanya interaksi antara petugas kesehatan dan pasien sehingga pasien mengerti rencana dengan segala konsekuensinya dan menyetujui rencana tersebut serta melalkukannya (Kemenkes RI, 2011).

Sarafino dalam Smet (1994:250) mendefinisikan “kepatuhan atau ketaatan adalah sebagai tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau oleh orang lain.” Secara umum ketidakpatuhan meningkatkan resiko berkembangnya masalah kesehatan atau memperpanjang atau memperburuk kesakitan yang sedang diderita.

Kepatuhan adalah derajat dimana pasien mengikuti anjuran klinis dari dokter yang mengobatinya (Kaplan, 2007). Menurut Sacket dalam Niven (2000) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah sejumlah mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh professional kesehatan. Kepatuhan berarti memakai obat persis sesuai dengan aturan, yaitu obat yang benar, pada waktu yang benar, dengan cara yang benar (Spiritia, 2002).

Jadi, dari penjelasan para ahli tentang kepatuhan maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku atau usaha pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan kepadanya dengan segala konsekuensinya dan menyetujui rencana tersebut serta melaksanakannya secara maksimal.

2. Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan

Perilaku ketaatan sering diartikan sebagai usaha pasien untuk mengendalikan perilakunya, bahkan jika tidak dilakukan, hal tersebut

menimbulkan resiko terhadap kesehatannya. Faktor penting ini sering terlupakan. Banyak dokter beranggapan bahwa pasien akan mengikuti apa yang dinasehatkan, tanpa menyadari bahwa para pasien tersebut akan melakukannya atau tidak (Taylor dalam Smet 1994 : 254).

Beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan menurut Muliawan (2008) adalah :

- a. Variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosio ekonomi dan pendidikan.
- b. Variabel penyakit seperti keparahan penyakit dan hilangnya gejala akibat terapi.
- c. Variabel program terapeutik seperti kompleksitas program dan efek samping yang tidak menyenangkan
- d. Variabel psikososial seperti intelegensia, sikap terhadap tenaga kesehatan, penerimaan, atau penyangkalan terhadap penyakit, keyakinan agama atau budaya dan biaya finansial.

3. Cara Mengukur Tingkat Kepatuhan

Setidaknya terdapat lima cara yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pada pasien (Brannon dan Feist, 1997:191-192) :

1) Menanyakan pada petugas klinis

Metode ini adalah metode yang hampir selalu menjadi pilihan terakhir untuk digunakan karena keakuratan atas estimasi yang diberikan oleh dokter pada umumnya salah.

2) Menanyakan pada individu yang menjadi pasien

Metode ini lebih valid dibandingkan dengan metode yang sebelumnya. Metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu: pasien mungkin saja berbohong untuk menghindari ketidaksukaan dari pihak tenaga kesehatan, dan mungkin

pasien tidak mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan mereka sendiri. Jika dibandingkan dengan beberapa pengukuran objektif atas konsumsi obat pasien, penelitian yang dilakukan cenderung menunjukkan bahwa para pasien lebih jujur saat mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengkonsumsi obat.

3) Menanyakan pada individu lain yang selalu memonitor keadaan pasien

Metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, observasi tidak mungkin dapat selalu dilakukan secara konstan, terutama pada halhal tertentu seperti diet makanan dan konsumsi alkohol. Kedua, pengamatan yang terus menerus menciptakan situasi buatan dan seringkali menjadikan tingkat kepatuhan yang lebih besar dari pengukuran kepatuhan yang lainnya. Tingkat kepatuhan yang lebih besar ini memang sesuatu yang diinginkan, tetapi hal ini tidak sesuai dengan tujuan pengukuran kepatuhan itu sendiri dan menyebabkan observasi yang dilakukan menjadi tidak akurat.

4) Menghitung berapa banyak pil atau obat yang seharusnya dikonsumsi pasien sesuai saran medis yang diberikan oleh dokter

Prosedur ini mungkin adalah prosedur yang paling ideal karena hanya sedikit saja kesalahan yang dapat dilakukan dalam hal menghitung jumlah obat yang berkurang dari botolnya. Tetapi, metode ini juga dapat menjadi sebuah metode yang tidak akurat karena setidaknya ada dua masalah dalam hal menghitung jumlah pil yang seharusnya dikonsumsi. Pertama, pasien mungkin saja, dengan berbagai alasan, dengan sengaja tidak mengkonsumsi beberapa jenis obat. Kedua, pasien mungkin mengkonsumsi semua pil, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan saran medis yang diberikan.

5) Memeriksa bukti-bukti biokimia

Metode ini mungkin dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada metode-metode sebelumnya. Metode ini berusaha untuk menemukan bukti-

bukti biokimia, seperti analisis sampel darah dan urin. Hal ini memang lebih reliabel dibandingkan dengan metode penghitungan pil atau obat di atas, tetapi metode ini lebih mahal dan terkadang tidak terlalu ‘berharga’ dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.

Cara yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pada penelitian ini adalah menanyakan kepada individu yang menjadi pasien (*self report*) dengan menggunakan metode angket. Meskipun cara ini memiliki kelemahan, beberapa penelitian yang dilakukan cenderung menunjukkan bahwa para pasien lebih jujur saat mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengonsumsi obat.

4. Jenis Ketidakpatuhan (*Non Compliance*)

1) Ketidakpatuhan yang disengaja (*Intentional non Compliance*)

Ketidakpatuhan yang disengaja dapat disebabkan oleh :

- a) Keterbatasan biaya pengobatan
- b) Sikap apatis pasien
- c) Ketidakpercayaan pasien akan efektifitas obat

2) Ketidakpatuhan yang tidak disengaja (*Unintentional non Compliance*)

Ketidakpatuhan yang tidak disengaja dapat disebabkan karena :

- a) Pasien lupa minum obat
- b) Ketidaktahuan akan petunjuk pengobatan
- c) Kesalahan dalam hal pembacaan etiket

5. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dapat digolongkan menjadi empat bagian menurut Niven (2002) antara lain :

1) Pemahaman tentang intruksi

Tak seorang pun dapat mematuhi intruksi jika ia salah paham tentang intruksi yang diberikan kepadanya.

2) Kualitas Interaksi

Kualitas interaksi antara professional kesehatan dan pasien merupakan bagian yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan.

3) Isolasi sosial dan keluarga

Keluarga dapat menjadi factor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan nilai kesehatan individu serta juga dapat menentukan tentang program pengobatan yang dapat mereka terima.


4) Keyakinan, sikap dan kepribadian

Becker et al (1979) dalam Niven (2002) telah membuat suatu usulan bahwa model keyakinan kesehatan berguna untuk memperkirakan adanya ketidakpatuhan.



E. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan maka bentuk kerangka teori penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka Teori

Sumber: Sarason (1983) dalam Zainuddin (2002), Muliawan (2008), Niven(2002), Caplan (1964) dalam Friedman 1998


Keterangan:

———— : diteliti

- - - - - : tidak diteliti

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan fokus penelitian yang akan diteliti, kerangka konsep ini terdiri dari variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Adapun kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 kerangka konseptual

Keterangan:

———— : diteliti

----- : tidak diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan desain *cross sectional study* untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Klinik *Voluntary Counseling and Test* (VCT) Puskesmas Jumpandang Baru Makassar. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 Mei – 29 Juni 2017 yang bertempat di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional Study*, penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Dimana variabel *dependen* dan variabel *independen* diamati pada saat bersamaan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita HIV dan AIDS yang sedang menjalani pengobatan ARV usia diatas >20 Tahun sampai bulan Februari 2017 yang berjumlah 129 orang di Puskesmas Jumpandang Baru.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah penderita HIV dan AIDS yang sedang menjalani pengobatan ARV sampai Februari 2017 di Puskesmas Jumpang Baru.

Berdasarkan pertimbangan yang logis seperti kepraktisan, keterbatasan biaya, waktu dan tenaga, tidak semua anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini, melainkan diambil beberapa orang sampel yang dianggap representatif untuk mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah penderita HIV dan AIDS yang sedang menjalani pengobatan ARV di Puskesmas Jumpang Baru yang ditentukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

1) Kriteria Inklusi

- a) Bersedia menjadi responden
- b) Ada pada saat penelitian
- c) Dapat berkomunikasi dengan baik
- d) Keluarga penderita dengan HIV/AIDS
- e) Penderita yang telah terdiagnosis HIV/AIDS
- f) ODHA yang sedang menjalankan terapi ARV
- g) Berada di Kabupaten/Kota Makassar

2) Kriteria Eksklusi:

- a) Pasien yang tidak kooperatif dan dianggap dapat menghambat proses meneliti
- b) Tidak ada pada saat penelitian
- c) Meninggal

Agar sampel yang diambil dapat dikatakan representatif maka dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus sampel (Nursalam, 2013)

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

Keterangan:

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

d = Tingkat Ketepatan yang diinginkan 10% (0,1)

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

$$n = \frac{129}{1 + 129(0,1)^2}$$

$$n = \frac{129}{1 + 129 (0.01)}$$

$$n = \frac{129}{1 + 1,29}$$

$$n = \frac{129}{2,29}$$

$$n = 56$$

Maka berdasarkan rumus diatas, jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 56 sampel, di Puskesmas Jungpandang Baru.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara menyebarkan atau membagikan kuesioner kepada responden dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sebelum kuesioner diserahkan kepada responden, peneliti memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian.
- b. Setelah responden memahami tujuan penelitian, maka responden diminta kesediaannya untuk mengisi kuesioner.
- c. Jika responden telah menyatakan bersedia, maka kuesioner diberikan dan responden diminta untuk mempelajari terlebih dahulu tentang cara pengisian kuesioner.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku rekam medik di Puskesmas Jumpandang baru dan melakukan studi pustaka dengan membaca referensi dari; buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner yang berisi identitas responden, pertanyaan yang terdiri; dukungan keluarga yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari 10 buah pertanyaan, pertanyaan no 1-3 mengenai dukungan emosional dan penilaian, pertanyaan no 4-7 mengenai dukungan instrumental, dan pertanyaan no 8-10 mengenai dukungan informasional.

Masing-masing dari pertanyaan tersebut terdapat 4 alternatif jawaban yaitu “selalu”, “sering”, “kadang-kadang”, dan “tidak pernah”. Jika menjawab

“selalu” akan mendapat skor 4, menjawab “sering” mendapat skor 3, menjawab “kadang-kadang” mendapat skor 2, dan menjawab “tidak pernah” mendapat skor 1. Total skor pada kuisioner ini adalah 1-40. Jawaban dari responden dilakukan dengan *scoring*.

Sedangkan kepatuhan pengobatan *antiretroviral* terdiri dari 11 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan tersebut terdapat 2 alternatif jawaban yaitu “ya” dan “tidak”. Jika “ya” akan mendapat skor 2 dan “tidak” akan mendapat skor 1. Jawaban dari responden dilakukan dengan *scoring*.

F. Validasi dan Reliabilitas Kuesioner

Validitas kuisioner dilakukan dengan melakukan perhitungan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Suatu kuisioner dinyatakan valid bila mampu mengukur dengan tepat apa yang akan diukur (Hastono, 2007). Kuesioner ada yang sudah baku karena sudah teruji validitasnya, tetapi banyak juga belum baku. Jika kita menggunakan kuisioner yang sudah baku tidak perlu dilakukan uji validitas lagi, sedangkan kuisioner yang belum baku perlu dilakukan uji coba kuisioner. Dikatakan reliabel instrumen dilakukan dengan membandingkan *Alpha Cronbach's* dengan r tabel. Untuk menjamin tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan pada penelitian ini digunakan kuisioner baku atau kuisioner yang sudah dipakai pada peneliti sebelumnya.

G. Alur Penelitian

1. Tahap Persiapan, meliputi :
 - a. Studi pendahuluan sebagai data awal tentang jumlah kasus HIV/AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru dan pasien yang telah menjalani pengobatan/terapi ARV.

- b. Mengumpulkan kepustakaan hasil penelitian dengan mengumpulkan jurnal kesehatan yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti.
 - c. Menentukan subjek penelitian
 - d. Menyusun proposal penelitian
 - e. Membuat instrument atau alat ukur penelitian (Kuesioner)
2. Tahap pelaksanaan, meliputi :
- a. Mengajukan surat izin penelitian ke C4 Kepala UPTP2T BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Surat izin peneliian yang ada dilanjutkan ke Walikota Makassar
 - c. Selanjutnya surat izin dari walikota Makassar diteruskan ke Dinas Kesehatan Kota Makassar
 - d. Surat perizinan penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dibawa ke Puskesmas Jumpandang Baru untuk memulai penelitian
 - e. Selanjutnya koordinasi pelaksanaan pengumpulan data
 - f. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner.
 - g. Pengambilan surat bukti penyelesaian pengambilan data atau penelitian di Puskesmas Jumpandang Baru.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. *Editing*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

2. *Coding*

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori.

3. Entri data

Entri data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan kedalam *master table* atau *data base computer*, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat *table kontigensi*.

4. *Cleaning data*

Setelah data di masukkan ke dalam lembar kerja SPSS kemudian dicek kembali apakah ada data yang *missing* atau terjadi kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan kemudian apabila ditemukan ada data yang *missing*, maka dilakukan pembetulan atau koreksi.

5. Melakukan Teknik Analisis

a) Analisa univariat

Analisa ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variable penelitian. Dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel. Dan dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel.

b) Analisa bivariat

Analisa data ditunjukkan untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesa penelitian untuk mengetahui adanya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji statistik *chi square* (χ^2) dengan nilai kemaknaan ($\alpha = 0,05$). setelah uji hipotesa dilakukan dengan taraf kesalahan (*alpha*) yang digunakan yaitu 5 % atau 0,05, maka penilaian hipotesis yaitu : apabila $p \leq \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a (hipotesis penelitian) diterima, yang berarti ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

sedangkan bila $p > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a (hipotesis penelitian) ditolak, yang berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berusaha memperhatikan hak-hak responden sebagai subyek peneliti. Didalam penelitian ini, peneliti juga memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak institusi atas pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian dalam hal ini di Puskesmas Jumpandang Baru. Setelah mendapat persetujuan barulah dilakukan penelitian dengan menekankan masalah etika penelitian yang meliputi :

1. *Informed consent* (lembaran persetujuan)

Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian. Bila responden menolak maka peneliti tidak akan memaksakan kehendak dan tetap menghormati hak-hak responden.

2. *Anonimity* (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden namun lembar kuesioner tersebut diberikan kode/inisial.

3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden akan dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Puskesmas Jumpandang Baru

1. Keadaan Geografi

Puskesmas jumpandang baru didirikan pada tahun 1968 dan merupakan Puskesmas Perawatan pertama di Makassar (RSP I). Puskesmas Jumpandang baru terletak di Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan luas wilayah kerja 4,76 KM². Dari sejumlah 5 kelurahan terdapat 21 ORW dan 150 ORT. Seluruh wilayah tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat., kecuali kelurahan Lakkang dimana untuk sampai kewilayah tersebut harus melewati sungai dengan menggunakan perahu. Pemanfaatan potensi lahan dan ahli fungsi terjadi sedemikian rupa, yang akan membawa perubahan terhadap kondisi, perkembangan sosial dan keamanan masyarakat. Luas wilayah kerja Jumpandang Baru seluruhnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah RT/RW menurut Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2015

No.	Kelurahan	Luas (KM ²)	ORW	ORT
1.	Rappojawa	1,18	5	42
2.	WalaWalaya	1,05	5	47
3.	Kalukuang	0,41	5	25
4.	La'latang	0,47	4	28
5.	Lakkang	1,65	2	8
Jumlah		4,76	21	150

Sumber : Data Sekunder 2014

Adapun letak dan batas-batas wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kalukubodoa
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rappokalling
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pannampu
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Malimongan Baru
2. Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Puskesmas Jumpandang Baru

- a. Visi Pembangunan Kesehatan

Visi Pembangunan Kesehatan Indonesia yang ingin dicapai dinyatakan dalam motto **“Indonesia Sehat 2015”**. Adapun visi Puskesmas Jumpandang Baru adalah **“Pusat Pelayanan dan Informasi Kesehatan Terdepan”**.

- b. Misi Pembangunan Kesehatan

Untuk dapat mewujudkan Visi Puskesmas Jumpandang Baru sebagai **“Pusat Pelayanan dan Informasi Kesehatan Terdepan”** ditetapkan 3 Misi Pembangunan Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Perubahan perilaku petugas, disiplin kerja, peningkatan sumber daya manusia (SDM).
- 2) Berupaya setiap saat memberikan pelayanan prima sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Berupaya menanamkan pengalaman perilaku hidup sehat yang mandiri melalui promosi kesehatan.

3. Tujuan Puskesmas Jumpandang Baru

Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan mandiri.

4. Falsafah Puskesmas Jumpandang Baru

Dengan semangat pengabdian yang tulus kami siap berikan pelayanan yang terbaik. Visi dan misi tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan 6 upaya kesehatan wajib puskesmas dan upaya kesehatan pengembangan.

- a. Upaya kesehatan Wajib Puskesmas tersebut adalah:
 - 1) Upaya Promosi Kesehatan
 - 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
 - 3) Upaya kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
 - 4) Upaya Perbaikan Gizi
 - 5) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
 - 6) Upaya Pengobatan
- b. Upaya Kesehatan Pengembangan
 - 1) Upaya Kesehatan Sekolah
 - 2) Upaya Kesehatan Olahraga
 - 3) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
 - 4) Upaya Kesehatan Kerja
 - 5) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 6) Upaya Kesehatan Jiwa
 - 7) Upaya Kesehatan Usia Lanjut
 - 8) Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional
- c. Pelayanan Dokter Spesialis
 - 1) Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - 2) Spesialis Internis
 - 3) Spesialis THT
 - 4) Spesialis Mata

- 5) Spesialis Kulit
- d. Upaya Kesehatan Pengembangan Khusus
 - 1) Kelompok kerja *Harm Reduction* (Penanggulangan Dampak Buruk Narkoba Jarum Suntik)

12 langkah *Harm Reduction*:

 - a) Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - b) Pencegahan infeksi (*Universal Precaution*)
 - c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 - d) Konseling
 - e) Tes HIV Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing = VST*)
 - f) Terapi Narkoba
 - g) Dukungan perawatan dan pengobatan (*Care Support and Treatment = CST*)
 - h) *Needle Excellent Programme* (NEP)
 - i) Pemusnahan jarum suntik
 - j) *Peer Educator*
 - k) Penjangkauan/pendamping (*Outreach*)
 - l) Substitusi Oral (*Methadon*)
 - 2) Peralihan Status dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C

5. Sumber Daya Kesehatan

Upaya kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya tenaga, biaya dan sarana kesehatan terpenuhi.

1. Tenaga

Jumlah tenaga tetap Puskesmas Jumpandang Baru sebanyak 53 orang ditambah dengan tenaga kerja honorer 10 orang, tenaga tidak tetap 6

orang, berdasarkan klasifikasi tenaga pada tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tenaga tetap kesehatan Puskesmas Jumpandang Baru

Tabel 4.2
Tenaga Tetap Kesehatan Puskesmas Jumpandang Baru
Tahun 2015

No.	Tenaga Tetap Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	5 Orang
2	Dokter SpOg	1 Orang
3	Dokter Ahli Penyakit Dalam	1 Orang
4	Dokter Gigi	2 Orang
5	Perawat	18 Orang
6	Magister Kesmas	1 Orang
7	Bidan	11 Orang
8	Laboran	2 Orang
9	Kesling	2 Orang
10	Rekam Medis	3 Orang
11	Nutrisionis	2 Orang
12	Perawat Gigi	1 Orang
13	Apoteker	3 Orang
14	Administrasi	5 Orang
15	Surveilans	2 Orang
Jumlah		59 Orang

Sumber: Profil Jumpandang Baru, 2015

b) Tenaga Honorer

Tabel 4.3
Tenaga Honorer Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2015

No	Tenaga Honorer	Jumlah
1	Dapur	2 Orang
2	<i>Cleaning Service</i>	6 Orang
3	Keamanan	1 Orang
4	Tukang Cuci	1 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Profil Jumpandang Baru, 2015

c) Tenaga Tidak Tetap

Tabel 4.4
Tenaga Tidak Tetap Puskesmas Jumpandang Baru
Tahun 2015

No	Tenaga Tidak Tetap	Jumlah
1	Dokter Spesialis	
	a. Interna	1 Orang
	b. Gizi	1 Orang
	c. Anak	1 Orang
	d. Mata	1 Orang
e. Kulit dan Kelamin	1 Orang	
2	Dokter Umum	1 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber: Profil Jumpandang Baru, 2015

2. Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu perhatian utama pembangunan dibidang kesehatan, bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan. Puskesmas Jumpandang Baru merupakan Puskesmas dengan Perawatan Rawat Inap dan memiliki 1 PUSTU yang terletak di Kelurahan Lakkang serta sebanyak 19 Posyandu.

B. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuan pengobatan *antiretroviral* (ARV) pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru pada tanggal 29 Mei - 29 Juni 2017 dengan jumlah responden sebanyak 56 responden di bagian Klinik VCT Puskesmas Jumpandang Baru. Pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

Deskripsi dimulai dari analisa univariat yaitu gambaran keadaan responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keadaan responden

berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, status tinggal, status menikah, lama pengobatan dan kondisi saat ini. Sedangkan analisis bivariat menampilkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hasil pengumpulan data diolah menggunakan program komputer SPSS versi 16.0 yang disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* dengan nilai derajat kemaknaan $p < 0,05$. Bila probabilitas lebih kecil dari pada $\alpha = 0.05$, maka H_0 di tolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dari hasil penelitian ini, data yang diperoleh setelah diolah, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Analisa Univariat

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.5
Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin
di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Jenis Kelamin	N	%
Laki-laki	45	80.4
Perempuan	11	19.6
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di Puskesmas Jumpandang Baru dilihat dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari jenis kelamin, maka jenis kelamin responden yang paling dominan ataupun yang paling banyak adalah laki-laki sebanyak 45 responden (80.4%)

sedangkan yang paling sedikit adalah perempuan sebanyak 11 responden (19.6%).

- b. Karakteristik responden berdasarkan umur

Tabel 4.6
Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur
di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Umur	N	%
20-25 Tahun	16	28.6
26-31 Tahun	9	16.1
32-37 Tahun	14	25.0
38-43 Tahun	12	21.4
44-49 Tahun	2	3.6
50-55 Tahun	3	5.4
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia di Puskesmas Jumpandang Baru dilihat dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari umur, maka usia responden yang paling dominan ataupun yang paling banyak adalah umur 20-25 tahun sebanyak 16 responden (28.6%) sedangkan yang paling sedikit adalah umur 44-49 tahun sebanyak 3 responden (3.6%).

- c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4.7
Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan di
Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Pendidikan	N	%
SLTP	10	17.9
SLTA	25	44.6
Akademi/Sarjana	21	37.5
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pendidikan di Puskesmas Jumpang Baru dilihat dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari tingkat pendidikan, maka tingkat pendidikan yang paling dominan adalah SLTA sebanyak 25 responden (44.6%) sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit adalah SLTP sebanyak 10 responden (17.9%).

d. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.8
Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan
di Puskesmas Jumpang Baru Tahun 2017

Pekerjaan	N	%
Tidak Bekerja	18	32.1
Bekerja	38	67.9
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan di Puskesmas Jumpang Baru dilihat dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari pekerjaan, maka yang bekerja sebanyak 38 responden (67.9%) dan yang tidak bekerja sebanyak 18 responden (32.1%).

e. Karakteristik responden berdasarkan status tinggal

Distribusi frekuensi berdasarkan status tinggal di Puskesmas Jumpang Baru dilihat dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari status tinggal, maka yang tinggal sendiri sebanyak 14 responden (25.0%), bersama dengan keluarga

sebanyak 41 responden (73.2%) dan yang tinggal bersama teman sebanyak 1 responden (1.8%).

Tabel 4.9
Distribusi frekuensi responden berdasarkan status tinggal di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Status Tinggal	N	%
Sendiri	14	25.0
Keluarga	41	73.3
Teman	1	1.8
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

- f. Karakteristik responden berdasarkan status menikah

Tabel 4.10
Distribusi frekuensi responden berdasarkan status menikah di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Status Menikah	N	%
Menikah	19	33.9
Belum Menikah	37	66.1
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

Distribusi frekuensi berdasarkan status menikah di Puskesmas Jumpandang Baru dilihat dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari status menikah, maka yang telah menikah sebanyak 19 responden (33.9%), dan yang belum menikah sebanyak 37 responden (66.1%).

- g. Karakteristik responden berdasarkan lama pengobatan

Distribusi frekuensi berdasarkan lama pengobatan di Puskesmas Jumpandang Baru dilihat dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari lama pengobatan, maka responden yang paling banyak adalah pengobatan 1-2 tahun sebanyak 14

responden (25.0%). Sedangkan responden yang paling sedikit adalah pengobatan 5-6 tahun sebanyak 3 responden (5.4%).

Tabel 4.11
Distribusi frekuensi responden berdasarkan lama pengobatan di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Lama Pengobatan	N	%
<1 Tahun	11	19.6
1-2 Tahun	14	25.0
3-4 Tahun	9	16.1
5-6 Tahun	3	5.4
7-8 Tahun	7	12.5
9-10 Tahun	12	21.4
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

- h. Karakteristik responden berdasarkan kondisi saat ini

Tabel 4.12
Distribusi frekuensi responden berdasarkan kondisi saat ini di Puskesmas Jumpandang Baru

Kondisi Saat Ini	N	%
Batuk	3	5.4
Demam	2	3.6
Gangguan Kejiwaan	1	1.8
Fisik Sehat	47	83.9
TB	3	5.4
Total	56	100.0

Sumber : Data Primer Juni 2017

Distribusi frekuensi berdasarkan kondisi saat ini di Puskesmas Jumpandang Baru dilihat dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 56 jumlah responden yang dilihat dari kondisi saat ini, maka responden yang paling banyak adalah fisik sehat sebanyak 47 responden (83.9%). Sedangkan responden yang paling sedikit adalah gangguan kejiwaan sebanyak 1 responden (1.8%).

- i. Hasil univariat berdasarkan dukungan emosional dan penilaian

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan
Emosional dan Penilaian dari Keluarga
di Puskesmas Jumpandang Baru
Tahun 2017

Dukungan Emosional dan Penilaian	N	%
Dapat Dukungan	30	53.6
Tidak Dapat Dukungan	26	46.4
Total	56	100

Sumber : Data Primer Juni 2017

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 56 responden berdasarkan dukungan emosional dan penilaian dari keluarga didapatkan sebanyak 30 responden (53.6%) dapat dukungan dan tidak dapat dukungan sebanyak 26 responden (46.4%).

- j. Hasil univariat berdasarkan dukungan instrumental

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan
Instrumental dari keluarga di Puskesmas
Jumpandang Baru Tahun 2017

Dukungan Instrumental	N	%
Dapat Dukungan	41	73.2
Tidak Dapat Dukungan	15	26.8
Total	56	100

Sumber : Data Primer Juni 2017

Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 56 responden berdasarkan dukungan instrumental dari keluarga didapatkan sebanyak 41 responden (73.2%) dapat dukungan dan tidak dapat dukungan sebanyak 15 responden (26.8%).

- k. Hasil univariat berdasarkan dukungan informasional

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan
Informasional dari Keluarga di Puskesmas
Jumpandang Baru Tahun 2017

Dukungan Informasional	N	%
Dapat Dukungan	32	57.1
Tidak Dapat Dukungan	24	42.9
Total	56	100

Sumber : Data Primer Juni 2017

Pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 56 responden berdasarkan dukungan informasional dari keluarga didapatkan sebanyak 32 responden (57.1%) dapat dukungan dan tidak dapat dukungan sebanyak 24 responden (42.9%).

- l. Hasil univariat berdasarkan dukungan keluarga secara keseluruhan

Tabel 4.16
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga
di Puskesmas Jumpandang Baru
Tahun 2017

Dukungan Keluarga	N	%
Dapat Dukungan	36	64.3
Tidak Dapat Dukungan	20	35.7
Total	56	100

Sumber : Data Primer Juni 2017

Pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 56 responden berdasarkan dukungan keluarga didapatkan sebanyak 36 responden (64.3%) dapat dukungan keluarga dan tidak dapat dukungan keluarga sebanyak 20 responden (35.7%).

m. Hasil univariat berdasarkan tingkat kepatuhan pengobatan

Tabel 4.17
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Kepatuhan
Pengobatan di Puskesmas Jumpandang Baru
Tahun 2017

Tingkat Kepatuhan	N	%
Patuh	49	87.5
Tidak Patuh	7	12.5
Total	56	100

Sumber : Data Primer Juni 2017

Pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 56 responden berdasarkan tingkat kepatuhan didapatkan patuh sebanyak 49 responden (87.5%) dan yang tidak patuh sebanyak 7 responden (12.5%).

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan dukungan emosional dan penilaian dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Tabel 4.18
Hubungan dukungan emosional dan penilaian dari keluarga terhadap
kepatuhan pengobatan Antiretroviral (ARV) pada ODHA di
Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Dukungan Emosional dan Penilaian	Kepatuhan Pengobatan				Total		p
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	N	%			
Dapat Dukungan	27	48.2	3	5.4	30	53.6	0.418
Tidak Dapat Dukungan	22	39.3	4	7.1	26	46.4	
Total	49	87.5	7	12.5	56	100.0	

Sumber: Data Primer Juni 2017

Berdasarkan analisa data yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dilihat dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 56 responden, yang mendapat dukungan emosional dan penilaian dari keluarga dan patuh yaitu

sebanyak 27 responden (48.2%) dan yang tidak dapat dukungan dan tidak patuh sebanyak 4 responden (7.1%).

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan uji *Chi-Square* maka diperoleh nilai $p=0,418 > (\alpha =0,05)$. H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.

b. Hubungan dukungan instrumental dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Tabel 4.19
Hubungan dukungan instrumental dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan Antiretroviral (ARV) pada ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Dukungan Instrumental	Kepatuhan Pengobatan				Total		p
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Dapat Dukungan	36	64.3	5	8.9	41	73.2	0.612
Tidak Dapat Dukungan	13	23.2	2	3.6	15	26.8	
Total	49	87.5	7	12.5	56	100.0	

Sumber: Data Primer Juni 2017

Berdasarkan analisa data yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dilihat dari tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 56 responden, yang mendapat dukungan instrumental dari keluarga dan patuh yaitu sebanyak 36 responden (64.3%) dan yang tidak dapat dukungan dan tidak patuh sebanyak 2 responden (3.6%).

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan uji *Chi-Square* maka diperoleh nilai $p=0,612 > (\alpha =0,05)$. H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.

c. Hubungan dukungan informasional dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Tabel 4.20
Hubungan dukungan informasional dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan Antiretroviral (ARV) pada ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Dukungan Informasional	Kepatuhan				Total		p
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Dapat Dukungan	28	50.0	4	7.1	36	64.3	0.652
Tidak Dapat Dukungan	21	37.5	3	5.4	20	35.7	
Total	49	87.5	7	12.5	56	100.0	

Sumber: Data Primer Juni 2017

Berdasarkan analisa data yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dilihat dari tabel 4.20 dibawah, menunjukkan bahwa dari 56 responden, yang mendapat dukungan informasional dari keluarga dan patuh yaitu sebanyak 28 responden (50.0%) dan yang tidak dapat dukungan dan tidak patuh sebanyak 3 responden (5.4%).

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan uji *Chi-Square* maka diperoleh nilai $p=0,652 > (\alpha =0,05)$. H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan

dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.

d. Hubungan dukungan keluarga secara keseluruhan terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Tabel 4.21
Hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan Antiretroviral (ARV) pada ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017

Dukungan Keluarga	Kepatuhan Pengobatan				Total		p
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Dapat Dukungan	32	57.1	4	7.1	36	64.3	0.487
Tidak Dapat Dukungan	17	30.4	3	5.4	20	35.7	
Total	49	87.5	7	8.9	12.5	100.0	

Sumber: Data Primer Juni 2017

Berdasarkan analisa data yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dilihat dari tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 56 responden, yang mendapat dukungan keluarga dan patuh yaitu sebanyak 32 responden (57.1%) dan yang tidak dapat dukungan keluarga dan tidak patuh sebanyak 3 responden (5.4%).

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan uji *Chi-Square* maka diperoleh nilai $p=0,487 > (\alpha =0,05)$. H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru.

C. Pembahasan

1. Jenis Kelamin

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan wanita yaitu mencapai 80,4 %. Presentasi terbanyak berdasarkan jenis kelamin pada sebagian besar penelitian mengenai HIV dan AIDS adalah laki-laki. Data ini sesuai dengan data PPM dan PL (2010) dimana penderita HIV dan AIDS terbanyak adalah laki-laki dengan presentasi mencapai 73% dan sesuai juga dengan penelitian Fitriani Rayasari (2011) dimana penderita HIV dan AIDS terbanyak adalah laki-laki dengan presentasi mencapai 85,7%.

Tingginya presentase laki-laki yang menderita HIV dan AIDS disebabkan karena faktor risiko tertular HIV ini banyak dilakukan oleh laki-laki. Pada survei yang dilakukan oleh BKKBN didapatkan seorang pekerja seks wanita yang terkena HIV sedikitnya dapat menularkan kepada 6 pria yang melakukan hubungan seks dengannya, selain itu hubungan seks sesama jenis sebagai salah satu risiko penular HIV. Dengan demikian data ini sejalan dengan data dari PPM dan L (2010), faktor risiko penularan HIV terbanyak adalah melalui hubungan heteroseksual maupun homoseksual. Data dari BNN dari tahun 2003 hingga tahun 2006 didapatkan pengguna narkoba sebagai salah satu faktor risiko penularan HIV yang didominasi oleh pria dan berbanding antara pria dan wanita adalah 8:1. Hal ini juga sesuai dalam firman

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam al-Qur'an surah Asy-Syu'ara' ayat 165-166:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿١٦٦﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas" (Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010).

Setelah nabi Luth melarang mereka melakukan perbuatan *fahisyah* dan menggauli laki-laki, seraya memberi petunjuk kepada mereka untuk mendatangi kaum wanita yang telah diciptakan Allah buat mereka, maka tiada lain jawaban mereka seperti yang disebutkan dalam firmanNya, yang artinya "sesungguhnya jika engkau tidak berhenti, hai Luth benar-benar kamu termasuk orang-orang yang di usir". Hal yang sama telah disebutkan pula dalam surah Al-A'raf, surah ud dan surah Al-Hijr yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Luth agar berangkat membawa keluarganya kecuali istrinya. Mereka tidak ada yang menoleh kebelakang manakala mereka mendengar suara mengguntur yang menimpa kaumnya. Dan mereka bersabar menaatiperintah Allah, lalu meneruskan langkahnya. Allah menurunkan azab yang menimpa kaum yang berdosa itu secara keseluruhan, Allah menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubu-tubi (Tafsir Qur'an Ibnu Katsir).

Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* , dimana Allah mengazab atau menimpakan kepada orang-orang yang melakukan homoseksual, heteroseksual maupun zina dengan penyakit HIV dan AIDS dimana hingga saat ini belum ditemukan obatnya.

2. Umur

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa rata-rata umur responden ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru adalah 20-25 tahun (28,6%). Data ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh UNAIDS (2010), kelompok terbanyak untuk penderita HIV dan AIDS diseluruh dunia terjadi pada kelompok usia 20-40 tahun.

Selain itu data ini juga sesuai dengan persentase kasus AIDS tertinggi di Indonesia dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 15.305 kasus (35,05%), diikuti kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 12.332 kasus (28,24%) dan kelompok umur 40-49 tahun sebanyak 4.383 kasus (10,04%). Rasio kasus HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1, sedangkan rasio kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Faktor resiko AIDS tertinggi adalah hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (59,90%), penggunaan jarum suntik tidak steril pada Penasun (17,94%), dan transmisi perinatal (2,73%) (Kemenkes RI, 2013).

Dilihat dari rata-rata umur responden, jika dihubungkan dengan faktor risiko pertama kali penularan kemungkinan pada masa remaja dan dewasa muda. BKKBN mencatat pada tahun 2010 didapatkan 51%

remaja DKI Jakarta sudah melakukan seks pranikah dan 3,2 juta orang pecandu narkoba (78%) adalah usia remaja. Data ini juga sejalan dengan PPM dan PL (2010) bahwa penularan HIV dan AIDS terbanyak adalah melalui hubungan seksual dan penggunaan narkoba dengan IDU mencapai lebih 50%.

3. Pendidikan

Pendidikan responden dari penelitian ini terbesar adalah SLTA yaitu mencapai 44,6%, sementara itu SLTA hanya 17,9%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfitri (2008) dan Kusuma (2010) di poliklinik VCT RS. Adam Malik Padang yang menunjukkan presentasi terbesar adalah pendidikan SLTA dan juga sejalan dengan penelitian Fitriani Rayasari (2011) yaitu mencapai 91,8% berpendidikan tinggi (SLTA dan PT).

4. Lama Pengobatan Antiretroviral (ARV)

Dalam penelitian ini menunjukkan lama pengobatan ARV pada responden adalah 1-2 tahun pengobatan. Pada penelitian ini lama pengobatan ARV penting diperhatikan karena berkaitan dengan banyak hal, diantaranya tingkat kepatuhan, peningkatan terhadap status kesehatan dan efek samping yang dirasakan oleh ODHA.

Menurut Dirjen P3L Kemenkes RI (2011), bahwa pengobatan ODHA dilaksanakan apabila pemeriksaan laboratorium jumlah sel CD4 <350 sel/mm. untuk memulai terapi ARV perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4 dan pemantauan stadium klinis infeksi

HIVnya. Dalam buku panduan pengobatan HIV dan AIDS yang diterbitkan Kemenkes RI (2011) disebutkan bahwa HIV sangat cepat bermutasi sehingga resisten terhadap obat. Untuk mengurangi kemungkinan tersebut, maka didalam penanganan infeksi HIV digunakan terapi ARV yang sangat aktif (*highly ative antiretroviral therapy*, disingkat HAART).

Pilihan terbaik HAART saat ini, berupa kombinasi dari setidaknya tiga obat (*koktail*) yang terdiri dari sedikitnya dua macam atau kelas bahan ARV. Kombinasi yang umum digunakan adalah *nucleoside analogue reserse transcriptase inhibitor* (NRTI) yang terdiri dari: Zidovudin (AZT/ZDV), Lamivudin (3TC), Tenofovir (TDF), Emtricitabine (FTC) dengan *non-nucleosidereserve transcriptase inhibitor* (NNRTI) yang terdiri dari Nevirapin(NVP), Efavirenz (EFV) (Dirjen P3L Kemenkes RI, 2011).

Pengobatan ARV pada ODHA akan terjadi sepanjang hidupnya, karena HIV merupakan penyakit yang hingga saat ini belum ditemukan obat untuk mematikan replikasi virus dan meningkatkan sistem *immune*. Sehingga dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk memotivasi ODHA agar tidak timbul perasaan bosan dan putus asa dalam minum obat ARV.

5. Hubungan dukungan emosional dan penilaian dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dilihat tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai $p > 0.05$ maka, tidak ada hubungan antara dukungan emosional dan penilaian dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru.

Hal ini disebabkan karena responden dipenelitian ini lebih banyak yang berstatus belum menikah yaitu 66,1 % dan 42,9 % keluarga tidak memaklumi bahwa sakit yang dialami adalah sebuah musibah sehingga beberapa responden lebih banyak yang menyembunyikan status ODHA dari keluarga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardiyati (2016) yang menyatakan bahwa satu faktor penyebab tertinggi ODHA kurang mendapatkan dukungan emosional dan penilaian karena tingginya stigma yang terkait dengan penyakit HIV dan AIDS. Sehingga anggota keluarga yang menderita penyakit ini seringkali dianggap telah melanggar norma-norma dalam keluarga dan memalukan keluarga serta seringkali dikucilkan atau ditelantarkan bahkan diisolasi dari lingkungan sosial.

Menurut pandangan peneliti, hal inilah yang menyebabkan responden lebih terbuka kepada sesama penderita HIV atau kependamping ODHA. Sehingga motivasi dalam hal emosional dan

penilaian atau penghargaan lebih sering mereka dapatkan dari sahabat sesama penderita ODHA atau pendamping ODHA.

6. Hubungan dukungan instrumental dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dilihat tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai $p > 0.05$ maka, tidak ada hubungan antara dukungan instrumental terhadap kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru.

Hal ini disebabkan karena responden dalam penelitian ini 100% memiliki jaminan kesehatan (BPJS) sehingga ARV dibagikan secara gratis di puskesmas dan responden mengikuti komunitas-komunitas ODHA yang saling memberi motivasi. Selain itu, keluarga yang bersedia membiayai perawatan pengobatan ODHA sebanyak 50%. Berdasarkan hasil penelitian ini pula dapat dilihat bahwa dukungan keluarga yang didapatkan oleh ODHA masih beragam antara yang member dukungan atau tidak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Hardiyatmi (2016) bahwa sebagian besar responden mendapatkan dukungan keluarga yang baik sebanyak 57,1% terhadap ODHA, dan menurutnya dukungan keluarga yang didapatkan oleh ODHA walaupun masih beragam namun sebagian besar mendapatkan

dukungan yang baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden dapat selalu berinteraksi dengan keluarganya.

Menurut pandangan peneliti tidak adanya pengaruh dukungan instrumental dari keluarga kepada ODHA kemungkinan disebabkan karena ada faktor lain yang menjadi faktor utama penyebab ODHA patuh seperti pemberian obat ARV secara gratis di puskesmas, motivasi dari konseler VCT (tenaga kesehatan) setiap pengambilan ARV dan adanya pertemuan rutin seluruh ODHA dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

7. Hubungan dukungan informasional dari keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dilihat tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai $p > 0.05$ maka, tidak ada hubungan antara dukungan informasional terhadap kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru.

Dilihat dukungan informasional dari keluarga, dimana 48,2% keluarga yang mengingatkan kepada ODHA tentang perilaku-perilaku yang memperburuk penyakit ODHA. Hal ini disebabkan karena responden dalam penelitian ini lebih memilih tidak memberitahu kepada keluarga tentang penyakitnya. Sehingga keluarga tidak dapat memberikan informasi tentang ARV. ODHA lebih banyak mendapatkan informasi dari petugas kesehatan dan dari teman-teman

dikomunitas sesama ODHA. Hal ini sesuai dengan pendapat Komang Diatmi dkk (2014), bahwa ODHA lebih banyak mendapatkan informasi dari komunitas atau yayasan sesama ODHA serta informasi dari tenaga kesehatan.

8. Hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV

Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dilihat tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai $p > 0.05$ maka, tidak ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti (2008) terhadap ODHA yang mengemukakan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah dukungan sosial atau dukungan keluarga yang diterima dengan kepatuhan menjalani pengobatan ARV. Namun berbeda dengan hasil penelitian Ika Silvitasari, dkk (2013) terhadap 40 ODHA bahwa dukungan keluarga berpeluang menjadikan ODHA patuh mengonsumsi obat sebesar 23.500 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan dukungan keluarga.

Sebagai suatu sistem, setiap anggota keluarga diharapkan dapat berperan dalam memberikan perawatan jika ada anggota keluarga yang mengalami sakit, demikian juga agar ODHA mencapai status kesehatan yang optimal. Dukungan yang dapat diberikan berupa

dukungan emosional dan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan informasional.

Menurut pandangan peneliti, hal ini disebabkan karena ODHA lebih banyak yang belum menikah dan memiliki penghasilan sendiri serta pengobatan ARV dijamin oleh BPJS sehingga pemberian ARV di puskesmas secara gratis, selain itu setiap bulan ada pertemuan seluruh ODHA yang ada di Makassar untuk pemberian informasi mengenai ODHA yang meningkatkan pengetahuan dan motivasi mereka untuk patuh untuk minum obat serta ODHA menganggap ARV sebagai nyawa kedua mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Pengobatan *Antiretroviral* (ARV) pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017” maka diperoleh sebagai berikut:

1. Karakteristik responden di Puskesmas Jumpandang Baru yaitu:
 - a. Frekuensi karakteristik jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 80,4%.
 - b. Frekuensi karakteristik umur yang paling banyak adalah umur 20-25 tahun yaitu sebanyak 28,6%.
 - c. Frekuensi karakteristik pendidikan yang paling banyak adalah SLTA yaitu sebanyak 44,6%.
 - d. Frekuensi karakteristik status tinggal yang paling banyak adalah tinggal bersama keluarga yaitu sebanyak 73,3%.
 - e. Frekuensi karakteristik status menikah yang paling banyak adalah belum menikah yaitu sebanyak 66,1%.
 - f. Frekuensi karakteristik lama pengobatan yang paling banyak adalah 1-2,5 tahun yaitu sebanyak 39,3%.
 - g. Frekuensi karakteristik kondisi saat ini yang paling banyak adalah sehat yaitu sebanyak 83,9%.

2. Tingkat kepatuhan pengobatan ARV pada ODHA sebanyak 87,5% patuh dan 12,5% tidak patuh dalam pengobatan ARV.
3. Nilai $p > 0,05$ maka tidak ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV pada ODHA.

B. Saran

1. Bagi Responden

Bagi responden agar kiranya jangan lupa untuk minum obat *antiretroviral* (ARV) secara teratur dan tepat waktu sehingga pengobatan ARV tidak resisten.

2. Bagi Keluarga penderita HIV dan AIDS

Bagi keluarga jangan lupa mendorong kepatuhan pengobatan ARV dan memberikan motivasi kepada ODHA dengan cara mengingatkan ODHA agar patuh dan minum ARV secara tepat waktu.

3. Bagi Institusi/Tempat Penelitian

Bagi tempat penelitian di Puskesmas Jumpang Baru Khususnya di Klinik VCT diharapkan agar petugas sebaiknya memberikan informasi tentang dampak yang diakibatkan oleh penyakit HIV dan AIDS serta dampak jika tidak patuh dalam pengobatan/terapi ARV dan memberikan dukungan kepada ODHA, serta memotivasi keluarga, agar memberikan dukungan kepada ODHA.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan khususnya UIN Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat agar dapat mengembangkan kurikulum yang

menunjang peningkatan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu penyakit menular dalam meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat yang nantinya akan memberikan informasi pencegahan terjadinya penyakit atau terjadinya komplikasi penyakit kepada penderita HIV dan AIDS serta menjaga kepatuhan pengobatan *antiretroviral* (ARV).

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan desain dan variable yang lebih banyak lagi sehingga mampu mengetahui faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan *antiretroviral* (ARV).




DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, F. 2011. Makassar peringkat ketiga penderita HIV/AIDS.
- Bart, Smet, 1994. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Brannon, K dan Feist, J.1997. *Health PsychologyI: An Introduction to Behavior and Health*. California: Brooks/Cole Publishing
- Cobb, M.H. 2002. *Pharmacological Inhibitors of MAPK Pathways*. Trend in Pharmacological Sciences.
- Departemen Agama RI.2010.Al-Qur'an dan terjemahan.
- Departemen Kesehatan RI.2010. *Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV-AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counseling and Testing)*. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2013. *Laporan jumlah penderita HIV/AIDS dan perawatan ARV pasien HIV*. Makassar, Sulawesi Selatan: Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2017. *Pengambilan Data Awal di Puskesmas Jumpandang Baru*.
- Ditjen PPM & PL Departemen Kesehatan RI.2010. *Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia*.
- Friedman, Marlyn, M., 2010,. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori dan Praktek, Edisi Ketiga*. Jakarta:EGC.
- Global Statistics UNAIDS*. In W. A. Day. UNAIDS. 2015.
- Global Statistics UNAIDS*. UNAIDS.2016
- Hardiyatmi, 2016. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan Penderita HIV dan AIDS di Poliklinik VCT (Voluntary Counseling Test) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2016
- Ika, Silvitasari, Hermawati, Martini., 2014. *Efektivitas dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan ARV pada ODHA di kelompok dukungan sepaya Kartasura*.

- In S. Hestri.2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku* (p. 3). Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
- Kathy, S., 2009. *HIV/AIDS*. California: Greenwood Publising Group
- Kemenkes, RI., 2011. *Pedoman Tata Laksana Klinis Infeksi HIV dan Terapi Antiretroviral Pada Orang Dewasa*. Dirljen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Jakarta.
- Kemenkes RI. 2014. *Infodatin Situasi dan analisis HIV/AIDS*. Pusat data dan informasi kesehatan kementerian kesehatan.
- Kemenkes RI, 2014. *Situasi dan Analisi HIV AIDS*. Jakarta: Pusat data dan Informasi.
- Kemenkes RI, 2016. *Indonesia Tingkatkan Komitmen Penanggulangan HIV-AIDS*. New York.
- Khaerunnisa, Dhea Ariesta, 2015. *Efektivitas Dukungan Sosial Bagi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) di Kelompok Sebaya Kuldesak Kota Depok*. Diakses pada tanggal 10 November 2016
- KPA,Makassar.2015. wow-kasus-hiv/aids-di-makassar-tercatat-7.106 orang. Diakses Juni 11,2016 dari <http://sulsel.pojoksatu.id/read>.
- Kusuma,H.,Nuracmah,E dan Gayatri,D.2010.*Hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan di RSUPN Mangunkusumo Jakarta*. Jakarta.
- Mansjoer, dkk. 2009. *Global effect HIV-AIDS Dimensi Psikoreligi*. Jakarta:FKIU
- Mansjoer. 2000. *HIV/AIDS*. Jakarta: Erlangga.
- M.Quraish Shihab.2002. *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Kesan keserasian al-Qur'an, Lentera hati)*. Jakarta.
- Nasronudin dan Maramis, 2007. *Konseling, Dukungan Perawatan dan Pengobatan ODHA*. Surabaya: Airlangga University Press
- Nurbani, Farah. 2007. *Dukungan Sosial Pada Odha*. Jurnal Universitas Ginadarma. 1-11
- Nursalam, 2009. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* . Jakarta:PT Salemba Medika

- Pratiwi, Enditira Yuli, 2011. *Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Menjalankan Program Terapi Pada Pasien Terapi Rumatan Metadon Di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor.*
- Prof Dr Haji Abdul Malik Abdul Karim Arullah.2007. *Tafsir Al Azhar.*Singapur: Kerjaya Print
- Profil Puskesmas Jumpandang Baru.2015.
- Rahma. 2015. Makassar, Berita Kota. In *suara Lokal,Pembela Rakyat* (p. 1). Makassar: Ujung Pandang Ekspres.
- Rayasari,Fitriani.2011.*Hubungan Depresi dan Self Care Practice dengan Tingkat Fatigue pada Pasien HIV/AIDS di Pokja HIV/AIDS RSPI.*Prof Dr.Sulianti Saroso. Depok:UI
- Siboro,Henny Kristian. 2013. *Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Keberfungsian Sosial Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) Di Rumah Singgah Caritas PSE Medan.* Diakses pada tanggal 12 Desember 2016
- Spiritia,2002. *Hubungan yang konsisten antara Depresi dan Kepatuhan yang rendah terhadap terapi HIV.*
- Spiritia.2015. *Pengobatan untuk AIDS:Ingin Mulai?.*Jakarta:Yayasan Spiritia
- Sugiyono, 2014. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta
- Tafsir Al-Mustapa Al-Parigi. 1993.
- Tafsir Al-Karim Ar-Rahman hal.457
- Tafsir Ibnu Katsir 5/55
- Wartono, H., *Aids dikenal untuk Dihindari.* 1999, Jakarta: Lembaga Pengembangan Informasi
- Zubari, Djoerban, 2012. *Meningkatkan Tes HIV dan terapi ART di Indonesia. File presentasi disampaikan pada acara Pokdisus Awar 2012.* Jakarta: UPT HIV RSCM

LAMPIRAN 11





KUISIONER
PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Dengan hormat,

Saya Nurihwani, selaku peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi, bermaksud mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi tentang :

**“HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN
PENGobatan ANTIRETROVIRAL (ARV) PADA ORANG DENGAN
HIV DAN AIDS (ODHA) DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU TAHUN 2017”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas saya mohon kesediaan saudara untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sesuai petunjuk. Keikutsertaan saudara dalam memberikan jawaban dan mengisi kuisisioner ini bersifat sukarela.

Saya sebagai peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban yang sudah saudara berikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam kuisisioner hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja dan akan kami musnahkan setelah selesai penelitian. Atas kesediaan dan bantuan saudara saya ucapkan terimakasih.

Makassar,

2017

Hormat saya,
Peneliti

Nurihwani
70200113034



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jl Sultan Alauddin No.63 Telp (0411) 864924 Fax (0411) 864923 Makassar
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 SamataGowa

Kode :
*)diisi oleh peneliti

PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dalam penelitian yang berjudul **“HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL (ARV) PADA ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA) DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU TAHUN 2017”**, saya telah diberitahu peneliti bahwa jawaban angket ini bersifat sukarela, rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Setelah selesai maka data akan dimusnahkan oleh peneliti.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2017

Hormat saya,
Responden

(.....)

B. Kuesioner Dukungan Keluarga

Kuisisioner Respon Penilaian Pasien Terhadap Dukungan Keluarga (Sosial) (Nursalam, 2013)

No	Dukungan	Selalu (4)	Sering (3)	Kadang kadang (2)	Tidak pernah (1)
1	Keluarga mendampingi saya dalam perawatan				
2	Keluarga memberi pujian dan perhatian kepada saya				
3	Keluarga dan tetangga memaklumi bahwa sakit yang saya alami sebagai suatu musibah				
4	Keluarga menyediakan waktu dan fasilitas jika saya memerlukan untuk keperluan pengobatan				
5	Keluarga berperan aktif dalam setiap pengobatan dan perawatan sakit saya				
6	Keluarga bersedia membiayai biaya perawatan dan pengobatan				
7	Keluarga berusaha untuk mencari kekurangan sarana dan peralatan perawatan yang saya perlukan				
8	Keluarga memberitahu tentang hasil pemeriksaan dan pengobatan dari dokter yang merawat kepada saya				
9	Keluarga mengingatkan saya tentang perilaku-perilaku yang memperburuk penyakit saya				
10	Keluarga menjelaskan kepada saya setiap saya bertanya hal-hal yang tidak jelas tentang penyakit saya				
	TOTAL				

C. Kuesioner Kepatuhan Pengobatan Antiretroviral

1. Saya selalu minum ARV sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter/perawat/relawan.

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

2. Saya selalu minum ARV sesuai dengan frekuensi yang dianjurkan oleh dokter/perawat/relawan

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

3. Saya selalu minum obat ARV pada waktu/jam yang sama setiap hari/perawat/relawan

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

4. Saya memeriksakan/test laboratorium CD4 secara teratur setiap 6 bulan

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

5. Meskipun banyak efek samping yang ditimbulkan, namun saya tetap minum ARV sesuai dosis.

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

6. Saya merasa tenang dapat melakukan pengobatan antiretroviral (ARV)

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

7. Saya paham risiko jika tidak patuh minum ARV

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

8. Saya selalu membawa obat kemanapun saya pergi

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

9. Walaupun banyak obat ARV yang harus saya minum, saya tidak bosan dan tetap minum obat sesuai dosis

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

10. Karena sudah terbiasa minum ARV, maka saya sudah hafal frekuensi minum obat setiap hari


- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....

11. Saya biasanya memakai jam atau HP yang berisi alarm yang bias diatur agar berbunyi setiap waktunya minum obat

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:.....
.....



No_Respond	JK	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ST	SM	TD	LP	KONDISI	DK1	DK2	DK3	DEP	JDEP
1	1	25	5	2	1	2	11 Juni 2016	1 Tahun	Sehat	1	3	4	3	2
2	1	28	4	2	1	2	21 Agustus 2015	2 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1
3	1	20	5	2	2	2	6 Desember 2015	2 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
4	1	39	4	2	2	2	Oktober 2010	7 Tahun	Sehat	2	2	2	6	2
5	1	24	5	2	1	2	Mei 2014	3 Tahun	Sehat	1	1	4	6	2
6	2	33	4	2	2	1	28 April 2007	10 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1
7	1	20	5	1	2	2	20 November 2016	6 Bulan	Sehat	1	1	1	3	2
8	1	41	3	2	1	2	Mei 2008	9 Tahun	Sehat	4	4	1	9	1
9	1	39	4	2	2	1	April 2005	10 Tahun	Batuk	4	3	2	9	1
10	2	34	4	2	2	1	April 2009	8 Tahun	Sehat	4	2	1	7	2
11	1	38	5	1	1	2	13 Februari 2016	2 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
12	2	51	4	1	2	1	September 2012	5 Tahun	Sehat	3	2	3	8	1
13	1	29	3	2	2	2	Februari 2014	3 Tahun	Demam	4	4	4	12	1
14	1	35	5	2	2	2	3 Oktober 2005	13 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1
15	1	24	5	2	2	2	25 Februari 2016	1 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
16	2	47	4	2	2	2	Agustus 2007	7 Tahun	Sehat	2	4	1	7	2
17	1	27	3	1	2	2	4 Mei 2015	2 Tahun	TB	4	3	2	9	1
18	1	32	4	2	2	2	Juni 2015	2 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1
19	1	30	3	2	2	1	6 Juni 2014	3 Tahun	Sehat	4	4	2	10	1
20	2	39	4	1	2	1	Mei 2014	3 Tahun	Sehat	4	2	2	8	1
21	1	33	4	1	2	1	Maret 2013	3 Tahun	Sehat	4	2	2	8	1
22	1	25	4	2	1	2	Februari 2017	4 Bulan	Sehat	4	4	4	12	1
23	1	22	3	2	2	2	Januari 2016	1 Tahun	Sehat	2	4	1	7	2
24	1	33	4	2	1	2	Juni 2010	7 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1
25	1	30	5	1	2	2	7 November 2016	7 Bulan	Sehat	1	1	1	3	2
26	1	32	3	1	2	1	Agustus 2014	3 Tahun	TB	4	1	4	9	1
27	1	23	5	1	2	2	Agustus 2015	2 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
28	1	23	5	1	4	2	25 Maret 2017	3 Bulan	Sehat	1	1	1	3	2
29	1	27	4	1	2	1	Mei 2015	2 Tahun	Gangguan Kejiwa	4	4	4	12	1
30	1	23	4	2	2	2	14 Mei 2014	1 Bulan	Sehat	4	4	1	9	1
31	1	32	5	2	2	1	28 Februari 2017	4 Tahun	Sehat	3	2	2	7	2
32	1	35	4	2	2	1	Juni 2010	7 Tahun	Sehat	1	4	1	6	2
33	1	34	5	2	2	1	Juli 2009	8 Tahun	Sehat	4	3	3	10	1
34	1	25	5	2	1	2	11 Juni 2016	1 Tahun	Sehat	1	3	4	8	1
35	1	28	4	2	1	2	21 Agustus 2015	2 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1

36	1	20	5	2	2	2	6 Desember 2015	2 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
37	1	39	4	2	2	2	Oktober 2010	7 Tahun	Sehat	2	2	2	6	2
38	1	24	5	2	1	2	Mei 2014	3 Tahun	Sehat	1	1	4	6	2
39	2	33	4	2	2	1	28 April 2007	10 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1
40	1	20	5	1	2	2	20 November 2016	6 Bulan	Sehat	1	1	1	3	2
41	1	41	3	2	1	2	Mei 2008	9 Tahun	Sehat	4	4	1	9	1
42	1	39	4	2	2	1	April 2005	10 Tahun	Batuk	4	3	2	9	1
43	2	34	4	2	2	1	April 2009	8 Tahun	Sehat	4	2	1	7	2
44	1	38	5	1	1	2	13 Februari 2016	2 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
45	2	51	4	1	2	1	1 Agustus 2012	5 Tahun	Sehat	3	2	3	8	1
46	1	29	3	2	2	2	Maret 2014	3 Tahun	Demam	4	4	4	12	1
47	1	35	5	2	2	2	3 Oktober 2005	13 Tahun	Sehat	4	4	4	12	1
48	1	24	5	2	2	2	25 Februari 2016	1 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
49	2	47	4	2	2	2	Agustus 2007	7 Tahun	Sehat	2	4	1	7	2
50	1	27	3	1	2	2	4 Mei 2015	2 Tahun	TB	4	3	2	9	1
51	1	20	5	1	2	2	20 November 2016	6 Bulan	Sehat	1	1	1	3	2
52	1	41	3	2	1	2	Mei 2008	9 Tahun	Sehat	4	4	1	9	1
53	1	39	4	2	2	1	April 2005	10 Tahun	Batuk	4	3	2	9	1
54	2	34	4	2	2	1	April 2009	8 Tahun	Sehat	4	2	1	7	2
55	1	38	5	1	1	2	13 Februari 2016	2 Tahun	Sehat	1	1	1	3	2
56	2	51	4	1	2	1	18 September 2012	5 Tahun	Sehat	3	2	3	8	1

DK4	DK5	DK6	DK7	DI	JDI	DK8	DK9	DK10	DIF	JDIF	JUMLAHDK	DUKUNGAN	KPA1	KPA2	KPA3	KPA4	KPA5	KPA6	KPA7	KPA8
4	4	4	1	16	1	1	4	1	6	2	27	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	2	1	7	2	35	1	2	2	2	1	2	2	2	1
4	1	1	1	7	2	1	4	1	6	2	16	2	2	1	1	1	2	1	2	2
4	2	2	2	10	1	4	3	1	8	1	24	2	2	2	2	1	2	2	2	2
1	1	4	4	10	1	1	4	4	9	1	25	1	1	1	1	2	2	1	1	2
4	4	4	4	16	1	4	4	3	11	1	39	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	1	4	13	1	4	4	2	10	1	32	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	4	4	14	1	3	3	3	9	1	32	1	2	2	2	1	2	2	2	2
4	4	2	1	11	1	1	4	1	6	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	36	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	40	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	4	4	14	1	4	4	4	12	1	38	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	31	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	37	1	1	2	1	2	1	1	1	1
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	40	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	3	11	1	37	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4	4	3	3	14	1	4	4	4	12	1	34	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	3	3	14	1	4	4	4	12	1	34	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	1	1	10	1	3	4	2	9	1	31	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	35	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3	2	2	2	9	2	2	3	2	7	2	28	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	4	4	10	1	1	1	4	6	2	19	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	37	1	2	2	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	40	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1	4	1	1	7	2	1	1	1	3	2	19	2	2	2	1	1	1	1	2	2
3	3	3	2	11	1	2	3	2	7	2	25	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1	2	1	1	5	2	1	1	1	3	2	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	2	2	10	1	3	4	3	10	1	30	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	1	13	1	1	4	1	6	2	27	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	2	1	7	2	35	1	2	2	2	1	2	2	2	1

4	1	1	1	7	2	1	4	1	6	2	16	2	2	1	1	1	2	1	2	2
4	2	2	2	10	1	4	3	1	8	1	24	2	2	2	2	1	2	2	2	2
1	1	4	4	10	1	1	4	4	9	1	25	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	3	11	1	39	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	1	4	13	1	4	4	2	10	1	32	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	4	4	14	1	3	3	3	9	1	32	1	2	2	2	1	2	2	2	2
4	4	2	1	11	1	1	4	1	6	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	36	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	40	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	4	4	14	1	4	4	4	12	1	38	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	31	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	37	1	1	2	1	2	1	1	1	1
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	1	4	13	1	4	4	2	10	1	32	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	4	4	14	1	3	3	3	9	1	32	1	2	2	2	1	2	2	2	2
4	4	2	1	11	1	1	4	1	6	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	10	2	1	1	1	2	2	1	2	1
4	4	4	4	16	1	4	4	4	12	1	36	1	2	2	2	2	2	2	2	2

KPA9	KPA10	KPA11	JUMLAHKPA	KEPATUHAN
2	2	2	22	2
1	2	2	19	2
1	2	1	16	2
2	2	2	21	2
2	2	1	16	1
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	21	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	1	21	2
1	2	2	20	2
1	1	1	13	1
2	2	2	22	2
2	2	2	21	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	1	16	1
1	2	1	14	1
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	18	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
1	2	2	19	2



1	2	1	16	1
2	2	2	21	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	21	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	1	21	2
1	2	2	20	2
1	1	1	13	1
2	2	2	22	2
2	2	2	22	2
2	2	2	21	2
2	2	2	22	2
2	2	1	16	1
2	2	2	22	2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA UMUM

1. Nama : Nurihwani
2. Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 21 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Lempangan Desa Puncak
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai
6. Nama Orang Tua :
 - Ayah : H. Abd Haris
 - Ibu : Hj. Fatimah
7. Alamat E-mail : Nurihwaniharis@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 45 Lempangan Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tamat Tahun 2007.
2. SMP Negeri 6 Sinjai Selatan Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tamat Tahun 2010.
3. SMA Negeri 1 Sinjai Selatan Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tamat Tahun 2013.
4. Melanjutkan pendidikan pada program studi Kesehatan Masyarakat peminatan Epidemiologi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2013.

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Black Panther UIN Alauddin Makassar Periode 2014-2015 M.
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Periode 2014-2015 M.
3. Pengurus Study Club (SC). Al-‘Aafiyah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Periode 2015-2016 M dan Periode 2017-2018 M.
4. Pengurus Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) UIN Alauddin Makassar Periode 2016-2017 M.

