

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS PADA NY “M” DENGAN LUKA
EPISIOTOMI DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH:

TITIN PRAHAYU
NIM: 70400114026

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama: Titin Prahayu

NIM: 70400114026

Judul: Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny "M" Pasca Episiotomi di
RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk
diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Saniata, Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb

Dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH

NIP. 19760126 200604 2 001

NIP. 19760921 200502 2 004

UIN ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Prahayu
NIM : 70400114026
Tempat/Tanggal Lahir : Lamasi, 18 Mei 1996
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma
Alamat : Jalan Mustafa Daeng Bunga VI, Samata
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny
"M" dengan Luka Episiotomi di RSUD Syech Yusuf
Gowa Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALA UDDIN
M A K A S S A R
Samata, Agustus 2017
Penyusun



Titin Prahayu
70400114026

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny "M" dengan Luka Episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa Tahun 2017", yang disusun oleh Titin Prahayu, NIM: 70400114026, Mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Agustus 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Sampata 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGLUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc	()
Sekretaris	: Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb	()
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb	()
Pembimbing II	: dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH	()
Penguji I	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	()
Penguji II	: Dr. H. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I	()

Dekan


/ Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny “M” dengan Luka Episiotomi di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa 2017”**.

Terwujudnya Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada;

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. dr. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb, Ketua Jurusan Kebidanan, sebagai pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan KTI ini.
4. Ibunda dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan pula waktunya demi membantu, membimbing serta memberikan saran yang membangun dalam penyusunan KTI ini.
5. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.Keb, selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah

memberikan kontribusi yang besar baik saran maupun motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan KTI ini.

6. Bapak Dr. H. Kasjim Salenda, SH., M.TH.I, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini.
7. Segenap Dosen terkhususnya di lingkup Prodi Kebidanan, staf Akademi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas kontribusinya dalam penyelesaian penyusunan KTI ini.
8. Bidang Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan atas pemberian izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Direktur RSUD Syech Yusuf Gowa dan jajarannya atas bantuannya dan perizinannya sehingga KTI ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman Kebidanan angkatan 2014 terkhususnya Masni dan Fitri yang telah memberikan dorongan berupa semangat dalam menyelesaikan KTI ini.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis telah berusaha menyelesaikan KTI ini dengan sebaik-baiknya, dan penulis sangat menyadari bahwa KTI ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan KTI ini agar menjadi jauh lebih baik lagi serta dapat bermanfaat bagi semua.

Terakhir dan yang teristimewah kepada Ayahanda Alm. Muh. Aris. C dan ibunda tersayangku Hasmawati yang selalu memberiku semangat yang tiada henti-hentinya, memberikan perhatian yang hingga saat ini masih menjadi kebiasaannya, kasih sayang, ajaran kesabaran dan moral yang menjadi pegangan teguh dalam menghadapi setiap masalah. Al-ghifari yang merupakan adikku satu-satunya. Terima kasih untuk semangat serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan KTI ini.

Samata, Agustus 2017

Penulis

Titin Prahayu
70400114026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan umum tentang persalinan	10
B. Tinjauan khusus tentang asuhan dalam persalinan kala pengeluaran	14
C. Tinjauan khusus tentang tindakan episiotomi	16

D. Tinjauan khusus tentang masa nifas.....	29
E. Tinjauan khusus tentang asuhan pada ibu nifas dengan luka episiotomi.....	33
F. Tinjauan Islam tentang persalinan	42
G. Proses manajemen asuhan kebidanan pasca episiotomi.....	47
H. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP)	62

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	65
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 16 Juni 2017	88
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 19 Juni 2017	97
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 23 Juni 2017	103
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 30 Juni 2017	110
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 7 Juli 2017	114

BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar	117
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	120
C. Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	123
D. Langkah IV: Tindakan Emergency Dan Kolaborasi	124
E. Langkah V: Intervensi.....	126
F. Langkah VI: Implementasi.....	132
G. Langkah VII: Evaluasi	135

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	140
---------------------	-----

B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN.....	xvii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Genitalia Eksterna Wanita (Perineum).....	12
Gambar 2.2. Daerah Perineum.....	13
Gambar 2.3. Episiotomi	17
Gambar 2.4. Episiotomi Secara Median	19
Gambar 2.5. Episiotomi Secara Mediolateral	19



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Prosedur kerja tindakan episiotomi.....	21
Table 2.2. prosedur kerja penjahitan luka episiotomy	25
Tabel 3.1.Pemantauan Kala IV	68
Table 3.2.Pemantauan Luka Jahitan Episiotomi.....	69



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2017

Titin Prahayu, 70400114026

Pembimbing I: Hj. Sitti Saleha

Pembimbing II: Nurhira Abdul Kadir

“Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny “M” dengan Luka Episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa Tahun 2017”

Tingkat nyeri post episiotomi yang bervariasi terjadi karena insisi dan penjahitan pada saat episiotomi menimbulkan nyeri tajam dengan tingkat yang berbeda hal ini dikarenakan aktifnya nosiseptor perifer yang merupakan reseptor khusus penghantar stimulus noxious. Ada sebanyak 70,9% ibu mengalami nyeri di sekitar jahitan episiotomi dan ada sebanyak 73% nyeri post episiotomi sangat mengganggu kenyamanan ibu yang mengakibatkan kesulitan pada saat buang air besar, buang air kecil, serta insomnia.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny “M” dengan Luka Episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil studi kasus yang telah dilakukan pada Ny “M” dengan luka episiotomi, tidak ditemukannya hambatan selama asuhan yang diberikan. Pemantauan dilakukan sebanyak 5 kali selama kurang lebih 1 bulan. Selama dilakukannya asuhan serta kunjungan rumah didapatkan nyeri pada luka episiotomi sejak setelah ibu melahirkan pada tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan hari ke-4 masa nifas, 1 minggu masa nifas Ny “M” tidak merasakan nyeri luka episiotomi, tetapi 2 minggu masa nifas ibu kembali merasakan nyeri pada genitalianya setelah melakukan koitus. Setelah dilakukan asuhan dan pemantauan pada Ny “M” didapatkan nyeri telah berhenti, dan luka jahitan episiotomi telah kering dan sembuh.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa 2017 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap Ny “M” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan dan tidak terjadi infeksi pada luka jahitan episiotomi.

Daftar Pustaka: 33 (2002-2017)

Kata Kunci: Masa Nifas, Episiotomi, Nyeri, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC WRITING, JUNE 2017

Titin Prahayu, 70400114026

Advisor I: Hj. Sitti Saleha

Advisor II: Nurhira Abdul Kadir

“Management of Midwifery Nursery postpartum on Ny "M" With Episiotomy Injury at Syech Yusuf Gowa Hospital Year 2017”

Post episiotomy post pain rates vary due to incision and suturing at the time of episiotomy causing sharp pain with different levels this is due to the activation of peripheral nociceptors which is a special receptor conducting noxious stimulus. There are as many as 70.9% of mothers experiencing pain around the episiotomy sutures and there are as many as 73% post episiotomy pain is very disturbing maternal comfort resulting in difficulty during bowel movements, urination, and insomnia.

Scientific Writing is aimed at implementing Nutrition Midwifery Management at Ny "M" with Episiotomy Injury at Syech Yusuf Gowa Hospital Year 2017 in accordance with 7 steps Varney and SOAP.

The results of a case study that had been done on Ny “M” with episiotomy injury, no obstacles found during the care provided. The results of a case study that had been done on Mrs M with episiotomy injury, no obstacles found during the care provided. Monitoring is done 5 times for approximately 1 month. During the treatment and home visits, there was pain in the episiotomy wound since after the mother gave birth on June 16, 2017 until the 4th day of the puerperium, 1 week postpartum Ny "M" did not feel episiotomy wound pain, but 2 weeks back maternal period Feel the pain in her genitals after doing coitus. After care and monitoring on Ny "M" the pain has stopped, and the episiotomy suture has dried and healed.

The conclusion of the case study that is 7 steps Varney and SOAP used for the process of problem solving obstetrics have been done assessment and data analysis on the case of Ny "M" with episiotomy injury in RSUD Syech Yusuf Gowa 2017 and documented all findings and actions that have been done to Ny "M" with the result of no discrepancy and no infection of episiotomy wound suture.

References: 33 (2002-2017)

Keywords: Childbirth, Episiotomy, Episiotomy Pain, 7 Step Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau hampir cukup bulan dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lahir lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Proses persalinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain fisik/tenaga ibu, jalan lahir, janin, psikologi ibu dan penolong.

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal dalam kehidupan. Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial bagi ibu dan keluarga. Peranan ibu adalah melahirkan bayinya, sedangkan peranan keluarga adalah memberikan bantuan dan dukungan pada ibu ketika terjadi proses persalinan. Dalam hal ini peranan petugas kesehatan tidak kalah pentingnya dalam proses persalinan, dalam memberikan asuhan dan bantuan serta dukungan pada ibu agar seluruh rangkaian proses persalinan dapat berjalan lancar, bersih serta aman bagi ibu serta bayinya yang telah lahir (Savitri dkk, 2015:84).

Pertolongan persalinan secara pervaginam baik dengan bantuan tindakan maupun tanpa tindakan harus mengacu pada prinsip untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Menurut World Health Organization (WHO) Tahun 2011, saat ini AKI di Indonesia merupakan angka tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 AKI

di Indonesia 228/100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 359/100.000 kelahiran hidup. Data ini menunjukkan semakin jauhnya Indonesia dari target MDG's 2015 yaitu AKI 102 per 100.000 kelahiran hidup (Karningsih dkk, 2015:42).

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun terdapat penurunan, persalinan oleh tenaga kesehatan dari 90,88% pada tahun 2013 menjadi 88,55% pada tahun 2015 (Profil Kesehatan Indonesia, 2015:112).

Pada Profil Kesehatan Indonesia (2015:113) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 79,72% ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara nasional, indikator tersebut telah memenuhi target Renstra 2015 sebesar 75%. Namun demikian masih terdapat 18 Provinsi (52,9%) yang belum memenuhi target tersebut. Provinsi di Yogyakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 99,81% dan Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 26,34%

Profil Kesehatan Sulawesi Selatan (2014) menunjukkan bahwa pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan sebuah proses persalinan dapat terealisasi atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau penolong dari proses persalinan itu sendiri, menurut Profil Kesehatan Sulawesi Selatan pada Tahun 2014 pertolongan persalinan mencapai 92,69 %.

Di sisi lain, Profil Kesehatan Kabupaten Gowa (2014) menunjukkan bahwa pada tahun 2012 tercatat sebesar 95% dari 13.293 ibu bersalin, pada tahun 2013 tercatat sebesar 91% dari 13.647 ibu bersalin, dan pada tahun 2014 tercatat sebesar 93% dari 13.647 ibu bersalin. Ini menunjukkan bahwa jumlah ibu bersalin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Di RSUD (RSUD) Syech Yusuf Gowa pertolongan persalinan pada tahun 2015 tercatat 821 jumlah persalinan tahun 2016 tercatat 1417 persalinan dan pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai Maret tercatat sebanyak 207 jumlah persalinan. Ini menunjukkan bahwa jumlah persalinan aterm selama 2 tahun 3 bulan terakhir sebanyak 2.465 persalinan.

Faktor jalan lahir mempunyai peranan penting baik sebelum maupun sesudah proses persalinan. Perineum merupakan salah satu jalur yang dilalui pada saat proses persalinan dapat robek ketika melahirkan atau secara sengaja digunting guna melebarkan jalan keluarnya bayi (episiotomi). Persalinan pervaginam sering disertai dengan ruptur. Pada beberapa kasus ruptur ini menjadi lebih berat, vagina mengalami laserasi dan perineum sering robek terutama pada primigravida, ruptur dapat terjadi secara spontan selama persalinan pervaginam (Savitri dkk, 2015:84).

Episiotomi adalah insisi pudendum untuk melebarkan orifisium vulva sehingga mempermudah jalan keluarnya bayi. Keuntungan episiotomi yaitu untuk mencegah robekan perineum, mengurangi tekanan kepala janin, mempersingkat persalinan kala dua dengan menghilangkan tahanan otot-otot pudendum, dan dapat diperbaiki dengan lebih memuaskan dibanding robekan yang tidak teratur (Benson dan Pernoll, 2013:176).

Tindakan episiotomi merupakan hal yang cukup dikenal dalam bidang kebidanan. Kumera dkk (2015) menyatakan bahwa selama masa studinya, ada 310 ibu hamil yang datang di bangsal Rumah Sakit Umum Mizan Aman dari 1 Januari sampai 30 Maret 2013 terdapat 30,6% pasien yang diepisiotomi. Sementara di kota Erbil Irak, Ali dan Zangana (2016) menunjukkan bahwa penyebab episiotomi dari 221 wanita saat menjalani episiotomi terdapat 65,6% dari mereka dikarenakan perineum kaku, 12,2% karena kelelahan ibu, dan presentase kecil karena tindakan episiotomi sebagai prosedur rutin untuk persalinan normal ialah 8,6%, dengan ukuran bayi 5,9%, serta riwayat sedera perineum sebelumnya ada 5,4%.

Di RSUD Syech Yusuf Gowa ditemukan data jumlah ruptur perineum tingkat II hingga tingkat III akibat persalinan pervaginam dengan tindakan maupun tanpa tindakan (episiotomi). Pada tahun 2015 didapatkan sebanyak 297 kejadian, dan pada Tahun 2017 bulan Januari dan Februari tercatat sebanyak 114 dari 120 jumlah persalinan pervaginam. Ini menunjukkan tingginya kejadian ruptur perineum pada saat proses persalinan, baik dengan tindakan maupun tanpa tindakan (episiotomi).

Menurut Wenniarti dkk (2016) bahwa tingkat nyeri post episiotomi yang bervariasi terjadi karena insisi dan penjahitan pada saat episiotomi menimbulkan nyeri tajam dengan tingkat yang berbeda hal ini dikarenakan aktifnya nosiseptor perifer yang merupakan reseptor khusus penghantar stimulus noxious. Jahitan episiotomi selain memiliki manfaat, ternyata menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu kenyamanan ibu. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Kunchayana bahwa sebanyak 70,9% ibu mengalami nyeri di sekitar jahitan episiotomi. Selain itu Oliveira juga mengatakan sebanyak 73% nyeri post episiotomi

sangat mengganggu kenyamanan ibu yang mengakibatkan kesulitan pada saat buang air besar, buang air kecil, serta insomnia. Nyeri dapat terjadi pada hari pertama sampai hari ke empat post episiotomi karena proses inflamasi dan terjadi pelepasan zat-zat kimia seperti prostaglandin yang dapat meningkatkan transmisi nyeri (Wenniarti dkk, 2016:378).

Berdasarkan uraian di atas, tindakan episiotomi pada proses persalinan masih banyak rumah sakit yang melakukan prosedur episiotomy, sedangkan kita ketahui bahwa sudah tidak ada *evidence based* terhadap tindakan episiotomy. Meskipun episiotomi memiliki manfaat tetapi bila merujuk kepada komplikasi-komplikasi atau keluhan-keluhan yang akan ibu postpartum alami akan menjadi dampak besar bagi proses masa nifas yang normal bagi ibu bahkan mengakibatkan trauma pada ibu yang nantinya bisa mengganggu psikisnya. Sedangkan kita ketahui bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses alami yang akan dialami oleh kaum wanita. Sehingga untuk menerapkan tindakan episiotomi sangat memerlukan pertimbangan yang kuat. Maka dari itu penulis tertarik menerapkan prinsip-prinsip asuhan manajemen kebidanan pada ibu nifas dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa tahun 2017.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah meliputi: Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ibu Nifas Ny “M” dengan Luka Episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan terbagi atas 2 yakni tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada ibu nifas Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan sesuai wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat dilaksanakannya pengkajian dan analisis data ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.
- b. Dapat dirumuskannya diagnosa/masalah aktual ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.
- c. Dapat dirumuskannya diagnosa/masalah potensial ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.
- d. Dapat diidentifikasinya perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.
- e. Dapat ditetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.
- f. Dapat dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.
- g. Dapat mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan/evaluasi kepada ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.

- h. Dapat mendokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan kepada ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini memiliki 5 manfaat yakni:

1. Manfaat praktis

Adapun hasil penulisan ini sebagai salah satu masukan dan informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di RSUD Syech Yusuf Gowa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2. Manfaat institusi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wacana dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan pembaca di perpustakaan mengenai asuhan kebidanan ibu nifas dengan luka episiotomi.

3. Manfaat ilmiah

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta menjadi bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena dengan adanya penulisan ini mampu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang masa nifas dengan luka episiotomi.

E. Metode penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan persalinan khususnya dengan episiotomi.

2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney (2003), yaitu dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah dilakukan.

Pengumpulan data untuk pengkajian ini menggunakan beberapa tehnik. Tehnik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan kepada pasien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk menilai kesehatan dan kenyamanan fisik ibu dan bayinya. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis yaitu secara berurut yang dimulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian ini meliputi pengkajian status emosional ibu, respon terhadap kondisi yang dialami oleh ibu serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, lingkungannya serta petugas kesehatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal (spontan) adalah proses lahirnya bayi secara spontan dengan letak belakang kepala atau dengan tenaga ibu sendiri tanpa melalui pacuan, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin, tanpa buatan dan bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam dan persalinan dengan usia kehamilan yang aterm yaitu 37-42 minggu dan berat janin di atas 2500 gram (Asri dan Cristine, 2012:1).

2. Tahapan persalinan

Proses persalinan tidaklah hanya terjadi begitu saja namun akan melalui berbagai tahapan. Tahapan persalinan ada 4 tahapan yakni kala I proses dilatasi serviks, kala II proses pengeluaran bayi, kala III proses pelepasan plasenta dan kala IV. Adapun tindakan episiotomi dilakukan apabila ada indikasi, terdapat pada kala II dan prosedur penjahitan luka episiotomi dilakukan pada kala III.

a. Kala II

Kala II disebut juga sebagai kala pengeluaran bayi. Persalinan kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Pada kala II his menjadi jauh lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2 sampai sampai 3 menit sekali. Dalam fase ini dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang dapat menimbulkan rasa mengedan. Ibu akan merasa

tekanan pada rektum dan hendak buang air besar. Kemudian perineum akan mulai menonjol dan menjadi lebar serta anus membuka. Labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak pada vulva pada saat his. Pada primigravida kala II berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multigravida rata-rata 0,5 jam.

Tanda pasti kala II ditentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya adalah:

- 1) Ibu merasakan adanya dorongan untuk meneran,
- 2) Adanya tekanan pada anus,
- 3) Perineum menonjol,
- 4) Vulva vagina dan spinter ani membuka,
- 5) Meningkatnya pengeluaran lendir darah.

Pada saat proses persalinan ibu dengan sekuat tenaga menyeimbangkan kontraksi yang dirasakan dan selama proses persalinan ibu mengedan dengan sekuat tenaga demi kelahiran bayinya sehingga tenaga ibu terkuras dan merasa kelelahan pada kala ini.

b. Kala III

Persalinan kala III dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta serta selaput ketuban. Kala III juga disebut sebagai kala uri. Setelah bayi lahir, uterus akan teraba bundar dan keras dengan tinggi fundus uteri sedikit diatas pusat. Beberapa menit kemudian uterus akan berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta pada perlekatannya. Biasanya plasenta akan lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri atau dilakukannya dorsol cranial. Pelepasan

plasenta pada perlekatannya biasa disertai dengan pengeluaran darah, kira-kira 100-200 cc.


c. Kala IV

Perlangsungan kala IV dimulai setelah plasenta lahir sampai 2 jam postpartum. Kala IV sangat perlu pengawasan selama 1-2 jam setelah kelahiran bayi dan plasenta, kala IV dilakukan untuk mengamati keadaan ibu terutamanya terhadap bahaya perdarahan postpartum (Kuswanti dan Melina, 2014:7-8).

3. Faktor-faktor yang memengaruhi persalinan

Adapun faktor yang memengaruhi persalinan ialah jalan lahir dibagi menjadi 2 yakni bagian keras (tulang-tulang panggul atau rangka panggul) dan bagian yang lunak seperti otot-otot, jaringan-jaringan dan *ligament-ligament* serta perineum. Perineum inilah salah satu jalan lahir lunak yang nantinya lokasi dilakukannya episiotomi untuk memperlebar jalan lahir. Perineum, merupakan bagian permukaan dari pintu bawah panggul.

Gambar 2.1 Genitalia eksterna wanita (perineum)




(Sumber: Coad dan Dunstall, 2006).

Perineum ini terdiri atas 2 bagian:

- a. *Regio analis* di sebelah belakang, di sini terdapat *musculus spinter ani externus* yang mengelilingi anus.
- b. *Regio urogenital*. Di sini terdapat: *musculus bulbocavernosus*, yang mengelilingi vulva, *musculus ischio cavernosus*, dan *musculus transversus perinei superfisialis* (Kuswanti dan Melina, 2014:11-22).

Gambar 2.2 Daerah perineum



(Sumber: Fitriani, 2013).

1) *Mosculo Bulbocavernosus*

M.bulbocavernosus mengelilingi vagina. Bersama *M.spincterani extemus* membentuk angka delapan yang mengelilingi vagina dan rektum. Otot tersebut juga disebut *M.bulbospongiosus*. Origo-nya pada titik pusat perineum dan insertionya pada permukaan *dosalcorpus clitoridis*. Setelah melewati tepi *orificium vaginae*, otot ini mengelilingi *bulbus vestibuli*. *M.bulbocavernosus* menekan jaringan erektil sekeliling *orificium vaginae*

(bulbus vestibuli) dan membantu ereksi klitoris dengan menutup vena dorsalis. Otot tersebut bekerja sebagai *sphincter vaginae* yang lemah. *Spincier vaginae* yang sebenarnya adalah bagian *M.levatorani*, yakni *M. pubovaginalis*.

2) *Mosculo Ischiocavernosus*

M.ischiocavernosus menyelubungi *crura clitoridis*. Origonya masing-masing adalah ramus inferior osis pubis, dan otot-otot tersebut berinsertio pada permukaan lateral crus. Otot-otot ini menekan crura sehingga menghalangi kembalinya darah venosa yang akan mengakibatkan ereksi klitoris.

3) *Mosculo Transversus perinei superficialis*

M.transversus perinei superficialis merupakan bagian superficial otot-otot yang letaknya lebih dalam dan mempunyai origo disertai insertio yang sama. Otot-otot tersebut berada di luar diapragma urogenitale. Kadang-kadang *M.perinei trasversus superficialis* ini sama sekali tidak ada (Ariestanti dan Purwaningtias, 2016:53).

B. Tinjauan Khusus tentang Asuhan dalam Persalinan Kala Pengeluaran

1. Tujuan Asuhan persalinan

Asuhan persalinan yaitu untuk merupakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat optimal (Tando, 2013:8).

Asuhan persalinan memiliki tujuan yakni memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya untuk mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayinya, dengan memerhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi.

a. Asuhan sayang ibu

Salah satu prinsip asuhan sayang ibu adalah dengan mengikutsertakan suami dan keluarga selama proses persalinan. Asuhan sayang ibu sangatlah membantu ibu dan keluarganya untuk merasa aman, nyaman selama dalam proses persalinan. Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang efektif, aman, nyaman dan dapat diterima oleh ibu bersalin maupun suami serta keluarganya.

Prinsip-prinsip umum asuhan sayang ibu yaitu sebagai berikut:

- 1) Merawat ibu serta bayi dengan penuh hormat,
- 2) Mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh ibu.
Hormati pengetahuan dan pemahaman mengenai tubuhnya,
- 3) Menghargai hak-hak ibu dan memberikan asuhan yang bermutu baik serta sopan,
- 4) Memberikan asuhan dengan memerhatikan privasi ibu,
- 5) Menjelaskan setiap prosedur kerja dari tindakan yang akan dilakukan serta meminta izin terlebih dahulu kepada ibu,
- 6) Selalu mendiskusikan temuan-temuan yang ditemukan kepada ibu, suami serta keluarga ibu,
- 7) Mengizinkan ibu untuk memilih siapa yang akan mendampingi selama proses persalinan, kelahiran dan dengan luka persalinan,

- 8) Mengizinkan ibu untuk memilih posisi bersalin yang menurut ibu nyaman,
 - 9) Menghindari penggunaan tindakan medis yang tidak perlu, tetapi dapat dilakukan dengan syarat indikasi yang kuat,
 - 10) Memfasilitasi *bounding attachment*.
- b. Pencegahan infeksi


Asuhan persalinan yang bermutu tinggi, penolong harus dapat melindungi pasien, diri sendiri dan rekan kerjanya dari infeksi. Cara yang efektif dan ekonomis dalam melakukan tindakan pencegahan infeksi yakni dengan mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan pelindung, serta pengolahan dan pembuangan sampah yang aman (Lailiyana dkk, 2012:6).

C. Tinjauan khusus tentang episiotomi

1. Pengertian episiotomi

Episiotomi adalah pengguntingan berupa sayatan kecil pada perineum yang dilakukan pada saat proses persalinan berlangsung. Episiotomi dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pembukaan vagina sehingga bayi dapat keluar lebih mudah tujuan tindakan episiotomi ialah memperlebar jalan lahir, mempercepat persalinan kala II lama yang berlangsung lebih dari 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi, yang ditandai dengan tanda dan gejala klinis pembukaan serviks lengkap dan ibu mengedan tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala, menghindari robekan perineum spontan, serta mengendalikan robekan perineum untuk memudahkan menjahit (Asri dan Clervo, 2012:86).

Gambar 2.3 Episiotomi



(Sumber: Verralls, 1997).

Prinsip tindakan episiotomi ialah pencegahan kerusakan yang lebih hebat pada jaringan lunak yang diakibatkan daya regang yang melebihi kapasitas adaptasi atau keelastisitasan jaringan tersebut, serta tindakan ini bertujuan untuk mencegah trauma pada kepala janin, mencegah kerusakan pada *sfincter ani* serta lebih mudah untuk melakukan penjahitan. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk melakukan tindakan episiotomi harus mengacu pada penilaian klinik yang tepat dan tehnik yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Dengan demikian tidak lagi dianjurkan untuk melakukan tindakan episiotomi secara rutin.

Pada kenyataannya tindakan episiotomi dapat menyebabkan peningkatan jumlah kehilangan darah ibu, bertambahnya luka pada perineum bagian posterior, meningkatkan kerusakan pada *sfincter ani* dan peningkatan rasa nyeri pada hari-hari pertama postpartum. Nyeri luka episiotomi disebabkan karena terputusnya jaringan atau otot-otot perineum akibat tindakan episiotomi maka aliran darah pada jaringan tersebut terhambat dan mengantarkan respon nyeri ke hypothalamus dan presepsikan ke saraf parifer dan menimbulkan nyeri, serta terbentuknya jaringan parut dan mengakibatkan *dispareuni* atau nyeri pada vagina atau nyeri di

dalam panggul juga dapat terjadi selama melakukan hubungan seksual (Pudiastuti, 2012:1).

2. Indikasi episiotomi

Tindakan episiotomi tidaklah boleh dilakukan secara rutin karena dapat meningkatkan ruptur menjadi tingkat III atau IV, meningkatnya jumlah darah yang hilang, risiko infeksi serta nyeri dengan luka persalinan. Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan episiotomi membutuhkan pertimbangan klinis dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang memperbolehkan dalam melakukan prosedur episiotomi. Berdasarkan ruang lingkup 24 standar kebidanan, penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi terdapat pada standar 12 (Purwoastuti dan Walyani, 2014: 152). Indikasi dalam melakukan episiotomi yang umum adalah:

- a) Fasilitasi untuk persalinan dengan tindakan atau dengan menggunakan instrument. Persalinan pervaginam dengan penyulit, misalnya presentasi bokong, distosia bahu, akan dilakukannya ekstraksi forcep, dan ekstraksi vakum.
- b) Mencegah terjadinya robekan perineum yang kaku/pendek atau diperkirakan tidak mempunyai perineum untuk beradaptasi terhadap regangan yang berlebihan misalnya bayi yang sangat besar atau makrosomia, untuk mengurangi tekanan pada kepala bayi dengan prematuris, bahkan terhadap ibu yang tidak mengetahui cara mengedan yang baik dan benar.
- c) Mencegah terjadinya kerusakan jaringan pada ibu dan bayi pada kasus letak/presentasi abnormal (bokong, muka, ubun-ubun kecil di belakang)

dengan menyediakan tempat lebih luas untuk persalinan yang aman (Pudiastuti, 2012:2).

3. Jenis-jenis Episiotomi

Menurut Benson dan Pernoll (2013) ada dua jenis episiotomi yang digunakan saat ini, yakni:

a) Episiotomi Median

Gambar 2.4 Episiotomi secara Median



(Sumber: Verralls, 1997).

Episiotomi median merupakan episiotomi yang paling mudah dilakukan dan diperbaiki. Metode ini hampir tidak mengeluarkan darah dan setelah melahirkan lebih terasa tidak sakit ketimbang jenis lainnya. Lakukan insisi rafe median perineum hampir mencapai *sfincter ani* dan perpanjang insisi ini paling sedikit 2-3 cm di atas septum *rektovagina*. Namun terkadang pula terdapat robekan tingkat tiga bahkan sampai tingkat empat.

b) Episiotomi mediolateral

Gambar 2.5 Episiotomi secara mediolateral



(Sumber: Verralls, 1997).

Insisi mediolateral digunakan secara luas pada obstetri operatif dikarenakan aman. Melakukan insisi ke bawah dan ke luar, ke arah batas *lateral sfingter ani* dan paling sedikit separuh jarak ke dalam vagina. Namun, insisi ini dapat menimbulkan banyak perdarahan dan dapat tetap akan terasa nyeri meskipun setelah nifas.

4. Waktu dilakukannya episiotomi

Prosedur episiotomi sebaiknya dilakukan ketika bagian terendah janin mulai meregang perineum pada janin matur, sebelum bagian terendah sampai pada otot-otot perineum pada janin imatur, segera sebelum memasang forsep dan tetap sebelum ekstraksi bokong (pada persalinan bokong) (Benson dan Pernoll, 2013: 176-177).

5. Prosedur Episiotomi

Berikut ini uraian tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan tindakan episiotomi serta prosedur kerja sebagai berikut:

a. Alat dan bahan:


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Alat pelindung diri (celemek, masker, tutup kepala, alas kaki atau sepatu booth) | |
| 2) Sarung tangan steril/DTT | 8) Waskom berisi larutan klorin 0,5% |
| 3) Pincet anatomis | |
| 4) Gunting episiotomi | 9) Bengkok/ <i>nierbeken</i> |
| 5) Kassa steril | 10) Sabun cuci tangan |
| 6) Lidocain 1% | 11) Air mengalir |
| 7) Spuid 10 ml | 12) Handuk bersih |

b. Prosedur kerja

Berikut ini table prosedur kerja dalam melakukan tindakan episiotomi sebagai berikut:

Pelaksanaan		
No	Langkah	Ilustrasi gambar
1	Siapkan alat yang akan digunakan dan susun secara ergonomis	
2	Jelaskan pada ibu tentang apa yang akan dilakukan dan bantulah agar ibu merasa tenang	
3	Jaga privasi ibu dengan menutup tirai atau sampiran	
4	Atur posisi ibu yaitu dengan posisi dorsal recumbent	
5	Pakailah alat pelindung diri secara lengkap	
6	Mencuci tangan dengan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan dengan handuk kering dan bersih	
7	Pakailah sarung tangan steril	

8	Pasanglah jarum no.22 pada spuit 10 ml, kemudian isi spuit dengan bahan anastesi (lidokain HCl 1% atau Xilokain 10 mg/ml)	
9	Letakkan 2 jari (telunjuk dan jari tengah) di antara kepala janin dan perineum. Masuknya anastesi (secara tidak disengaja) ke dalam sirkulasi bayi, dapat menimbulkan akibat yang fatal oleh karena itu gunakan jari-jari penolong sebagai pelindung kepala bayi	
10	Tusukkan jarum tepat di bawah kulit perineum pada daerah komisura posterior (<i>fourchette</i>) yaitu bagian sudut bawah vulva	
11	Arahkan jarum dengan membuat sudut 45 derajat ke sebelah kiri/kanan, garis tengah perineum. Lakukan aspirasi untuk memastikan bawah ujung jarum tidak memasuki pembuluh darah (terlihat cairan darah dalam spuit). Karena bila bahan anastesi local masuk ke dalam pembuluh darah, dapat menyebabkan syok pada ibu	
12	Sambil menarik mundur jarum suntik, infiltrasikan 5-10 ml lidokain 1%	

13	Tunggu 1-2 menit agar efek anastesi bekerja maksimal, sebelum episiotomi dilakukan. Penipisan dan peregangan perineum berperan sebagai anastesi alamiah.	
14	Apabila kepala bayi menjelang ke luar, lakukan episiotomi dengan segera	
15	Letakkan dua jari (telunjuk dan jari tengah) tangan kiri di antara kepala janin dan perineum agak meregang secara mediolateral, dan beri sedikit tekanan lembut ke arah luar perineum (lakukan pada saat ada his berikutnya dibagian yang telah dianestesi)	
16	Ambil gunting episiotomi (yang tajam) dengan tangan kanan, dan gunting perineum sepanjang 3-4 cm secara mediolateral yaitu irisan dimulai dari garis tengah dan diarahkan ke lateral sekitar 45 derajat (pengguntingan dilakukan dengan mantap dan tidak secara sedikit-sedikit, untuk mencegah tepi yang tidak rata sehingga menyulitkan penjahitan dan	

	waktu penyembuhan yang lebih lama)	
17	Keluarkan gunting, rendam dalam larutan klorin 0,5%	
18	Beritahu ibu tindakan yang telah dilakukan	
19	Jaga perineum dengan tangan saat kepala bayi lahir, agar insisi tidak meluas atau bila kepala bayi belum lahir tekan luka dengan kassa steril untuk mencegah perdarahan	

Tabel 2.1. Prosedur kerja tindakan episiotomi (Sumber: Pudiastuti, 2012: 2-4).

6. Penjahitan Luka Episiotomi

Sebelum dilakukannya tindakan episiotomi, pasien perlu diberikan anetesi lokal, yaitu dengan lidokain 1% tanpa epineprin, jika tidak tersedia gunakan lidokain 2% yang dilarutkan dengan air steril dengan perbandingan 1:1 yang digunakan untuk menginfiltrasi jaringan dan mengeblok saraf sensorik. Episiotomi adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit, dengan anastesi lokal merupakan bagian dari asuhan sayang ibu. Ibu yang diepisiotomi dengan anastesi lokal tetap dalam keadaan sadar dan waspada selama dilakukannya tindakan, sehingga sangat penting konseling untuk meningkatkan kerjasama dan meminimalkan ketakutan ibu. Obat dan peralatan kegawatdaruratan (penyedot oksigen, alat resusitasi) harus siap tersedia dan dalam kondisi siap pakai dan seluruh anggota tim terlatih menggunakannya (Tando, 2013: 125).

a. Alat dan bahan:


- 1) Alat pelindung diri (celemek, masker, tutup kepala, alas kaki atau sepatu booth)




- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2) Sarung tangan steril/DTT | 11) Betadin |
| 3) Pincet anatomis | 12) Spuid 10 ml |
| 4) Pincet sirurgi | 13) Waskom berisi larutan klorin 0,5% |
| 5) Nald fooder | 14) Bengkok/ <i>nierbeken</i> |
| 6) Gunting benang | 15) Sabun cuci tangan |
| 7) Jarum | 16) Air mengalir |
| 8) Benang Catgut | 17) Handuk bersih |
| 9) Kassa steril | |
| 10) Lidocain 1% | |


b. Prosedur kerja

Berikut ini table prosedur kerja dalam melakukan tindakan penjahitan luka episiotomi sebagai berikut:

Pelaksanaan		
No	Langkah	Ilustrasi gambar
1	Jelaskan pada ibu apa yang akan dilakukan dan bantu ibu agar merasa nyaman	
2	Siapkan alat dan bahan	
3	Tempelkan jarum 22 sepanjang 4 cm ke tabung suntik tersebut. Hisap 10 ml larutan lidokain 1 % dalam alat suntik sekali pakai 10 ml	

4	Suntikkan jarum ke ujung laserasi lalu tarik jarum sepanjang tepi luka. Aspirasi untuk memastikan jarum tidak masuk ke pembuluh darah	
5	Suntikkan anastesi sejajar dengan permukaan luka pada saat jarum suntik di tarik secara perlahan-lahan. Tarik jarum hingga sampai ke bawah tempat dimana jarum tersebut disuntikkan	
6	Arahkan jarum ke daerah atas tengah luka dan ulangi langkah ke 4. Tusukkan jarum untuk yang ketiga kalinya dan sekali lagi sehingga garis di satu sisi luka mendapatkan anetesi local	
7	Ulangi pada sisi lain, setiap sisi luka akan membutuhkan kurang lebih 5 ml lidokain 1% untuk mendapatkan anestesi yang cukup	
8	Tarik jarum hingga sampai kebawah tempat dimana jarum tersebut disuntikkan.	
9	Setelah memberikan anestesi lokal dan memastikan daerah tersebut	

	sudah dianestesi, telusuri luka untuk menentukan batas-batasnya	
10	Butlah jahitan pertama kurang lebih 1 cm di atas ujung laserasi dibagian dalam vagina, setelah itu ikat dan potong pendek benang	
11	Tutup mukosa vagina dengan jahitan jelujur, jahit ke bawah cincin hymen	
12	Tepat sebelum cincin hymen, masukkan jarum ke dalam mukosa vagina lalu ke bawah cincin hymen sampai jarum ada di bawah laserasi	
13	Periksa bagian antara ujung jarum di perineum dan bagian atas laserasi. Perhatikan seberapa dekat jarum ke puncak luka	

14	Teruskan ke arah bawah tapi tetap pada luka, menggunakan jahitan jelujur hingga mencapai bagian bawah laserasi. Pastikan jarak setiap jahitan sama dan otot telah dijahit	
15	Setelah mencapai ujung laserasi, arahkan jarum keatas dan teruskan penjahitan menggunakan jelujur untuk menutup lapisan sub kutikuler. Jahitan ini akan menjadi jahitan lapis kedua	
16	Tusukkan jarum dari robekan perineum ke dalam vagina. Jarum harus keluar dari belakang cincin <i>hymen</i>	
17	Ikat benang dengan membuat simpul di dalam vagina, potong ujung benang dan sisakan 1,5 cm. jika benang dipotong terlalu pendek, simpul akan longgar dan laserasi akan terbuka	
18	Ulangi pemeriksaan vagina dengan lembut	
19	Dengan lembut masukkan	

	jari paling kecil ke dalam anus. Rabah apakah ada jahitan pada rektum. Jika ada jahitan, ulangi pemeriksaan rektum 6 minggu dengan luka persalinan. Jika penyembuhan belum sempurna, rujuk	
20	Cuci daerah genetalia dengan lembut menggunakan sabun dan air DTT kemudian keringkan	
21	Nasehati ibu agar menjaga perineumnya, hindari obat-obatan tradisional, cuci 3-4 kali sehari, kontrol 1 minggu kemudian atau jika ada keluhan seperti demam, bau busuk, maka segera datang pelayanan kesehatan	

Tabel 2.2. Prosedur melakukan penjahitan luka episiotomi (Sumber: Tando, 2013:125-128).

D. Tinjauan Khusus tentang Masa Nifas

1. Pengertian masa nifas

Masa nifas adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Saleha, 2013:2). Periode post partum adalah waktu penyembuhan dan perubahan, waktu kembali ke keadaan tidak hamil. Dalam masa nifas, alat-alat genetalia interna maupun eksterna akan berangsur-angsur pulih seperti keadaan sebelum hamil (Marmi, 2014:135).

2. Peran Bidan pada Masa Nifas

Peran bidan pada masa nifas adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan yang terus-menerus selama masa nifas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan ibu agar mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama persalinan dan nifas
- b. Sebagai promotor hubungan yang erat antara ibu dan bayi secara fisik dan psikologis
- c. Mengondisikan ibu untuk menyusui bayinya dengan cara meningkatkan rasa nyaman (Saleha, 2013: 5).

3. Tahapan masa nifas

Masa nifas terbagi menjadi tiga tahapan, yakni:

- a. Puerperium dini

Suatu masa kepulihan di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan.

- b. Puerperium intermedial

Suatu masa di mana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih enam minggu.

- c. Remote puerperium

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama ibu bila selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi (Yanti dan Sundawati, 2014: 2).

4. Perubahan system reproduksi

Selama masa nifas, alat-alat interna maupun eksterna berangsur-angsur kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan keseluruhan alat genitalia ini disebut *involusi*.

a. Uterus

Segera setelah lahirnya plasenta, pada uterus yang berkontraksi posisi fundus uteri berada kurang lebih pertengahan antara umbilicus dan simfisis, atau sedikit lebih tinggi. Dua hari kemudian, kurang lebih sama dan kemudian mengerut, sehingga dalam dua minggu telah turun masuk ke dalam rongga pelvis dan tidak dapat diraba lagi dari luar.

- 1) Bayi lahir Tinggi Fundus Uteri (TFU) setinggi pusat atau bahkan 2 jari bawah pusat dan berat uterus 1.000 gram
- 2) Satu minggu dengan luka persalinan TFU berada di pertengahan simfisis-pusat dan berat uterus 750 gram
- 3) Dua minggu dengan luka persalinan TFU tidak teraba di atas simfisis dan berat uterus 500 gram
- 4) Enam minggu dengan luka persalinan TFU telah normal kembali dan berat uterus 50 gram
- 5) Delapan minggu dengan luka persalinan TFU telah normal seperti keadaan sebelum hamil dan berat uterus 30 gram (Saleha, 2013: 54-55).

b. Serviks

Segera setelah persalinan bentuk serviks akan terbuka seperti corong. Hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang berkontraksi sedangkan serviks tidak berkontraksi. Warna serviks berubah menjadi merah kehitaman karena

mengandung banyak pembuluh darah dengan konsistensi lunak. Segera setelah janin dilahirkan, serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Setelah 2 jam persalinan serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari dan setelah 1 minggu dengan luka persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari.

c. Vagina

Selama proses persalinan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar, terutama pada saat melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, vagina tetap berada dalam keadaan kendur. Selama 3 minggu vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali.

Sesuai dengan fungsinya sebagai bagian lunak jalan lahir dan merupakan saluran yang menghubungkan cavum uteri dengan tubuh bagian luar, vagina juga berfungsi sebagai saluran tempat dikeluarkannya secret yang berasal dari cavum uteri selama masa nifas yang di sebut *Lochea* (Maritalia, 2012: 19-20).

Lochea adalah cairan secret yang berasal dari cavum uteri dan vagina selama masa nifas. *Lochia* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *lochea rubra*, *sanguilenta*, *serosa* dan *alba*.

Berikut ini beberapa jenis *lochea* yang terdapat pada ibu nifas, sebagai berikut:

- 1) *Lochea rubra (cruenta)* berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo dan mekoneum selama 2 hari dengan lukapersalinan. Inilah *lochea* yang akan keluar selama 2-3 hari postpartum.

- 2) *Lochea sanguilenta* berwarna merah kuning berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 dengan luka persalinan.
- 3) *Lochea serosa* adalah *lochia* yang keluar dari hari ke-7 sampai hari ke-14 dengan luka persalinan. Dimulai dengan versi yang lebih pucat dari *lochia rubra*. *Lochea* ini berbentuk serum dan berwarna merah jambu kemudian menjadi kekuningan.
- 4) *Lochea alba* adalah *lochia* yang terakhir. Dimulain dari hari ke-14 kemudian makin lama makin sedikit hingga sama sekali berhenti sampai satu atau dua minggu berikutnya. *Lochea* yang keluar berwarna putih seperti cream serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua (Saleha, 2013: 56).

d. Vulva

Vulva mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan vulva tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan labia menjadi lebih menonjol (Maritalia, 2012: 21).

E. Tinjauan Khusus tentang Asuhan pada Ibu Nifas dengan Luka Episitomi

1. Tujuan asuhan masa nifas

Tujuan dari pemberian asuhan pada masa nifas ialah:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis
- b. Melaksanakan *skrining* secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya.

- c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari.
- d. Memberikan pelayanan keluarga berencana.
- e. Mendapatkan kesehatan emosi (Yanti dan Sundawati, 2014:1-2).

2. Asuhan selama masa nifas

Persalinan merupakan proses yang melelahkan, itulah mengapa ibu disarankan tidak langsung turun ranjang setelah melahirkan karena dapat menyebabkan jatuh pingsan akibat sirkulasi darah yang belum berjalan baik. Adapun beberapa asuhan yang diberikan pada ibu nifas dengan luka episiotomy, yaitu:

a. Pemenuhan Nutrisi dan cairan

Nutrisi yang dikonsumsi harus bermutu tinggi, bergizi dan cukup kalori. Wanita dewasa memerlukan 2.200 kalori. Ibu menyusui memerlukan kalori yang sama dengan wanita dewasa + 700 kalori pada 6 bulan pertama kemudian + 500 kalori bulan selanjutnya. Sedangkan fungsi cairan sebagai pelarut zat gizi dalam proses metabolisme tubuh.

1) Karbohidrat

Makanan yang dikonsumsi dianjurkan mengandung 50-60% karbohidrat. Laktosa (gula susu) adalah bentuk utama dari karbohidrat yang ada dalam jumlah lebih besar dibandingkan dalam susu sapi. Laktosa membantu bayi menyerap kalsium dan mudah di metabolisme menjadi dua gula sederhana (galaktosa dan glukosa) yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak yang cepat yang terjadi selama masa bayi.

2) Lemak

Lemak 25-35% dari total makanan. Lemak menghasilkan kira-kira setengah kalori yang diproduksi oleh air susu ibu.

3) Protein

Jumlah kelebihan protein yang diperlukan oleh ibu pada masa nifas adalah sekitar 10-15%.

4) Vitamin dan mineral

Kegunaan vitamin dan mineral adalah untuk melancarkan metabolisme tubuh. Vitamin dan mineral yang paling mudah menurun kandungannya dalam makanan adalah Vit B6, tiamin, As.Folat, kalsium, seng dan magnesium. Sumber vitamin adalah hewani dan nabati sedangkan sumber mineral adalah ikan, daging banyak mengandung kalsium, fosfor, zat besi, seng dan yodium (Marmi, 2012: 135-137).

b. Ambulasi pada masa nifas

Mobilisasi hendaknya dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan gerakan mirirng kanan dan ke kiri. Pada hari kedua ibu telah dapat duduk, lalu pada hari ketiga ibu telah dapat menggerakkan kaki yakni dengan jalan-jalan. Hari keempat dan kelima, ibu boleh pulang. Mobilisasi ini tidak mutlak, bervariasi tergantung pada adanya kpmplikasi persalinan, nifas dan sembuhnya luka (Marmi, 2012: 138).

c. Menjaga kebersihan diri dan perineum

Kebersihan adalah salah satu tanda dari hygiene yang baik. Terutama bagi ibu nifas. Pada prinsipnya, urgenis kebersihan vagina pada saat nifas dilandasi beberapa alas an yaitu:

- 1) Banyak darah dan kotoran yang keluar dari vagina
- 2) Vagina berada dekat saluran buang air kecil atau air besar yang tiap hari kita lakukan
- 3) Adanya luka di daerah perineum yang bila terkena kotoran dapat terinfeksi
- 4) Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman, dan kemudian menjalar ke rahim (Marmi, 2012:139).

d. Istirahat

Istirahat yang memuaskan bagi ibu yang baru merupakan masalah yang sangat penting, dengan tubuh yang letih dan mungkin pula pikiran yang sangat aktif, ibu sering perlu diingatkan dan dibantu agar mendapatkan istirahat yang cukup.

1) Istirahat malam

Sebagian ibu menemukan bahwa lingkungan yang asing baginya mengalihkan perhatian dan sebagian lainnya merasa terganggu oleh luka bekas episiotomi sehingga semua ini akan menghalangi tidur ibu ketika pengaruh pembiusan sudah hilang, maka sangat memerlukan pemeriksaan dan analgesik. Waktu istirahat di malam hari yaitu kurang lebih delapan jam.

2) Istirahat siang

Priode istirahat yang jelas perlu disediakan secara teratur dan krapkali di perlukan selama satu jam sebelum makan siang tirai ditarik, radio dimatikan, staf kebidanan harus bekerja tanpa suara, tamu yang berkunjung dilarang.

3) Tidur

Masa nifas berkaitan dengan gangguan pola tidur, terutama segera setelah melahirkan. Banyak orang yang mengalami sulit tidur. Orang dewasa butuh rata-rata 7-8 jam untuk tidur. Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal yaitu:

- a) Mengurangi jumlah Air Susu Ibu (ASI) yang di produksi
- b) Memperlambat proses involusi uterus dan meningkatkan perdarahan
- c) Menyebabkan depresi yang ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri (Marmi, 2012:143-146).

e. Seksual

Nifas merupakan masa pembersihan rahim, sama halnya seperti masa haid. Darah nifas mengandung trombosit, sel-sel degenerative, sel-sel mati dan sel-sel endometrium sisa. Masa setelah melahirkan selama 6 minggu atau 40 hari. Batasaan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi dan luka bekas *Section Cesarean* (SC) biasanya telah sembuh dengan baik. Meskipun hubungan telah dilakukan setelah 6 minggu adakala ibu-ibu tertentu mengeluh hubungan masih terasa sakit atau nyeri meskipun telah beberapa bulan proses persalinan. Cairan pelumas yang minim akan berakibat gesekan penis dan dinding vagina tidak terjadi dengan lembut, akibatnya akan terasa nyeri (Marmi, 2012:146-147).

f. Eliminasi

Eliminasi disini ialah Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK).

1) Miksi/BAK. Buang air kecil sendiri sebaiknya dilakukan secepatnya.

Buang air kecil normal bila dapat terjadi setiap 3-4 jam.

- 2) Defekasi/BAB. Ibu diharapkan dapat BAB sekitar 3-4 hari post partum. Apabila mengalami kesulitan BAB, harus memenuhi cairan yang cukup, konsumsi makanan berserat, berikan rangsangan per oral atau per rektal (Marmi, 2012:148).

3. Perawatan luka episiotomi

Luka episiotomi merupakan rusaknya jaringan atau otot-otot perineum, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada dengan luka persalinan masih terdapat pengeluaran darah atau yang disebut *lochia* dan kotoran yang keluar dari vagina. Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar proses pemulihan berlangsung seperti yang diharapkan. Berikut cara perawatan jahitan luka episiotomi:

- a. Mencuci tangan
- b. Menganjurkan ibu berbaring
- c. Membuka pakaian bawah ibu
- d. Menggunakan handscoon
- e. Melihat keadaan luka episiotomi
- f. Membersihkan dengan betadin
- g. Mengompres bekas luka jahitan episiotomi dengan kassa betadin
- h. Memasang pembalut, celana dalam dan pakaian bawah ibu
- i. Membereskan alat
- j. Melepas handscoon
- k. Mencuci tangan

Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar proses pemulihan berlangsung seperti yang diharapkan

- 1) Ibu disarankan segera melakukan mobilisasi setelah cukup beristirahat.
- 2) Siram vagina dan perineum hingga bersih dengan air biasa setiap kali habis BAB dan BAK. Air yang digunakan tak perlu matang asalkan bersih.
- 3) Basuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum seperti air seni maupun *feses* yang mengandung kuman dan bisa menimbulkan infeksi pada luka jahitan.
- 4) Vagina boleh dicuci menggunakan sabun maupun cairan antiseptic karena dapat berfungsi sebagai penghilang kuman.
- 5) Untuk menyentuh daerah vagina maupun perineum tangan harus dalam keadaan bersih.
- 6) Setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru.
- 7) Yang kadang terlupakan, setelah vagina dibersihkan, pembalut tidak diganti. Bila seperti itu maka akan percuma. Pembalut tidak diganti maka vagina dan perineum akan tetap dalam keadaan lembab yang akan menyebabkan kuman dan bakteri bersarang sehingga dapat menyebabkan infeksi.
- 8) Frekuensi mengganti pembalut ialah 3 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman.
- 9) Ibu dianjurkan pula untuk menjaga kelembapan pakaian dalam dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi.

- 10) Setelah semua langkah dilakukan, perineum dapat diolesi salep antibiotik yang diresepkan oleh dokter.
- 11) Jangan sekali-kali menaburi daerah perineum dengan bubuk bedak atau bahan lainnya karena itu dapat menyebabkan risiko infeksi.
- 12) Untuk menghindari rasa sakit kala BAB, ibu dianjurkan memperbanyak konsumsi yang berserat seperti buah-buahan dan sayuran. Dengan begitu *feses* yang dikeluarkan menjadi tidak keras dan ibu tidak perlu mengejan. Kalau perlu, dokter akan memberikan obat untuk melunakkan *feses*.
- 13) Jika ibu benar-benar takut untuk menyentuh luka jahitan disarankan untuk duduk berendam dalam larutan antiseptic selama 10 menit. Dengan begitu, kotoran berupa sisa air seni dan *feses* juga akan hilang (Marmi, 2012: 141-142).

Infeksi bisa terjadi karena ibu kurang telaten melakukan perawatan dengan luka persalinan. Ibu takut menyentuh luka yang ada di perineum sehingga memilih tidak membersihkannya. Padahal, dalam keadaan luka, perineum rentan didatangi kuman dan bakteri sehingga mudah terinfeksi.

Gejala-gejala infeksi yang dapat diamati adalah:

- a. Suhu tubuh melebihi 37,5°C
- b. Menggigil, pusing dan mual
- c. Keputihan
- d. Keluar cairan seperti nanah dari vagina
- e. Cairan yang keluar disertai bau yang sangat menyengat
- f. Keluarnya cairan serta dengan rasa nyeri
- g. Terasa nyeri di perut

- h. Perdarahan kembali banyak padahal sebelumnya sudah sedikit (Marmi, 2012:142).

4. Fisiologis penyembuhan luka

Dalam penelitian Primadona dan Susilowati (2015) mengatakan bahwa proses penyembuhan luka terdapat tiga fase, yaitu: fase inflamasi (24 jam pertama–48 jam), fase proliferasi (48 jam–5 hari), dan Fase maturasi (5 hari–berbulan-bulan). Dalam proses penyembuhan luka sebaiknya mendapatkan asuhan yang baik, apabila tidak mendapat asuhan yang baik maka akan menimbulkan keadaan yang patologi. Fase-fase penyembuhan luka sebagai berikut:

a. Fase Inflamasi

Fase inflamasi adalah fase peradangan. Pada fase inflamasi, terjadi peristiwa inflamasi (respons selular dan vaskular) yang meliputi antara lain vasodilatasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, serta rekrutmen sel-sel fagosit untuk mengeliminasi agen penyebab luka. Peradangan berfungsi mengisolasi jaringan yang rusak dan mengurangi penyebaran infeksi. Selain itu fase inflamasi juga terjadi penggumpalan darah untuk menyatukan daerah yang terpisah akibat episiotomi (Majid dan Prayogi, 2013).

b. Fase Proliferasi

Pada fase proliferasi terjadi pertumbuhan jaringan baru melalui proses granulasi, kontraksi luka, dan epitelialisasi. Selama granulasi, kapiler dari sekitar pembuluh darah tumbuh ke dasar luka. Jaringan granulasi yang sehat berwarna merah terang, halus, bercahaya, dan dasarnya tampak mengerut dan tidak mudah berdarah. Setelah luka berisi jaringan ikat, fibroblas terkumpul di

sekitar tepi luka dan berkontraksi, merapatkan kedua tepi luka. Terbentuk jaringan parut epitel fibrosa yang lebih kuat pada saat fibroblas dan serat kolagen mulai menyusut, menimbulkan kontraksi pada area tersebut (Primadona dan Susilowati, 2015:2-3).

c. Fase Maturasi

Pada fase maturasi, keropeng yang terbentuk akan menyeluruh dan digantikan dengan jaringan sehat dan kulit kembali keketebalannya semula. Tubuh berusaha menormalkan kembali semua yang menjadi abnormal karena proses penyembuhan. Kolagen menjadi lebih tersusun dan yang berlebih diserap dan sisanya mengerut sesuai dengan regangan yang ada, fibroblast berkurang dan kapiler darah telah normal kembali.

Akibat pertumbuhan jaringan luka yang tidak normal atau berlebih setelah pulihnya luka tersebut akan terbentuk *keloid* yang merupakan lesi kulit berserat yang tidak berpotensi menjadi ganas (Majid dan Prayogi, 2013).

F. Tinjauan Islam tentang Persalinan

Allah swt. telah menciptakan dunia beserta isinya dengan penuh kesempurnaan, termaksud makhluk ciptaan-Nya. Manusia adalah makhluk yang memiliki kepribadian, penciptaan yang sempurna dan memiliki banyak potensi, baik akal pikiran, spiritual, perasaan, keinginan, dan emosi, semua itu terdapat dalam satu tubuh yang menakjubkan maha suci Allah swt. pencipta yang paling baik.

Begitupun dengan seorang wanita yang telah diberikan hidayah sebuah organ reproduksi beserta dengan fungsinya dimana seorang wanita mampu mengandung serta melahirkan umat baru ciptaan Allah swt., Sehingga dapat dikatakan bahwa

wanita merupakan awal dari pelestarian umat manusia, maka bukankah sungguh mulia makhluk ciptaan Allah swt (Martaadisoebrata dkk, 2011:3).

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S Fatir/35; 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا كَمَلُ مِنْ أَنْثَى

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ

إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١)

Terjemahannya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuz). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah” (Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012).

Ayat ini masih melanjutkan pembuktian tentang kuasa Allah membangkitkan manusia. Di sini dinyatakan setelah sebelumnya menegaskan kuasa Allah mengirimkan angin lalu ia menggerakkan awan bahwa: *Dan*, di samping hal tersebut menjadi bukti kuasa-Nya membangkitkan yang telah mati, dalam penciptaan kamu pun terdapat bukti kuasa-Nya.

Allah menciptakan asal usul kamu, yakni Adam as., dari tanah kemudian menciptakan kamu semua dari sperma yang asal usulnya pun bersumber antara lain dari makanan yang dihasilkan oleh tanah, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung janin dan tidak pula melahirkan anak melainkan dengan seizing dan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan tercatat dalam Kitab Lauh

Mahfuzh atau pengetahuan Allah. *Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah* (Tafsir Al-Mishbah, 2002).

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Insaan/76; 2:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢)

Terjemahannya:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat” (Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012).

Setelah mengisyaratkan tentang penciptaan manusia yang sebelumnya pernah mengalami ketiadaan, ayat di atas menjelaskan proses awal penciptaannya serta tujuannya. *Sesungguhnya Kami telah menciptakan semua manusia anak cucu Adam dan Hawwa, kecuali Isa as., dari setetes mani yang bercampur, yakni dari sperma laki-laki dan indung telur wanita, yang tujuan Kami menciptakan adalah hendak mengujinya dengan berbagai perintah dan larangan, maka karena itu Kami menjadikannya mampu amat mendengar dengan telinganya dan amat melihat dengan mata kepala dan hatinya agar ia mendengar tuntunan Kami serta melihat dan memikirkan ayat-ayat Kami* (Tafsir Al-Mishbah, 2002: 565).

Dari ayat di atas menjelaskan sebuah proses penciptaan manusia. Dari tetes mani yang bercampur yakni dari sperma seorang laki-laki dan indung telur wanita yang tujuan diciptakannya adalah hendak mengujinya dengan berbagai perintah dan larangan, maka karena itu kami menjadikannya mampu amat mendengar dengan telinganya dan amat melihat dengan mata kepala dan hatinya, agar ia kelak mampu mendengar tuntunan kami serta melihat dan memikirkan ayat-ayat kami.

Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nahl/16; 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahannya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012).

Ayat ini dapat juga dihubungkan dengan ayat yang lalu dengan menyatakan bahwa uraiannya merupakan salah satu bukti kuasa Allah menghidupkan kembali siapa yang meninggal dunia serta kebangkitan pada Hari Kiamat. Ayat ini menyatakan: *Dan sebagaimana Allah mengeluarkan kamu* berdasar kuasa dan ilmunya *dari perut ibu-ibu kamu* sedang tadinya kamu tidak wujud, demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika Dia mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua *dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun* yang ada di sekeliling kamu *dan aneka hati* sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan *agar kamu bersyukur* dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kamu (Tafsir Al-Mishbah, 2002: 672).

Kemudian dijelaskan pula dalam Q.S Luqman/31; 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ
أَنَّ اشْكُرْ لِي ۖ وَ لِوَالِدَيْكَ ۖ إِنَّ لِيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada

Aku kembalimu” (Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012).

Ayat di atas menyatakan: *Dan Kami wasiatkan*, yakni berpesan dengan amat kukuh, kepada semua *manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya*; Pesan kami disebabkan karena *ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan*, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu, dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyukannya setiap saat, bahkan di tengah malam ketika saat manusia lain tertidur nyenyak.

Demikian hingga tiba masa menyapikannya *dan penyapiannya di dalam dua tahun* terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini jika orangtuanya ingin menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu adalah: *Bersyukurlah kepada-Ku!* Karena Aku yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, *dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak kamu* karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena *hanya kepada-Kulah*—tidak kepada selain Aku—*kembali kamu* semua, wahai manusia, untuk kamu pertanggungjawabkan kesyukuran itu (Tafsir Al-Mishbah, 2002: 300).

Dari ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa perjuangan seorang ibu tidaklah ada tandingannya, mulai ia mengandung kita selama sembilan bulan dalam keadaan lemah bahkan beban tersebut senantiasa bertambah dari saat ke saat. Lalu ia melahirkan kita dengan penuh perjuangan, selama proses persalinan tidak satupun yang mengetahui komplikasi apa saja yang dapat terjadi selama persalinan berlangsung, bahkan seorang ibu rela dilakukan pensayatan di vaginanya (episiotomi) agar persalinannya berjalan dengan lancar agar kamu dapat lahir dengan selamat

hingga kamu mampu hidup di bumi Allah dan bertakwa kepada kedua orangtua serta kepada-Nya.

Tidak hanya pada proses persalinan ibu merasakan sakit tetapi ia pun membawa rasa sakit tersebut dimasa postpartumnya. Kemudian ia memelihara kita dengan penuh kasih sayang, bahkan ia rela jam tidurnya di malam hari berkurang demi membuat tidur kita pulas bahkan ia pun rela menjeda makannya demi kita dikala kita menangis kelaparan. Begitu banyak pengorbanan seorang ibu, maka hendaklah hormati ibumu, ibumu, ibumu, lalu kemudian ayahmu.

G. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan luka Episiotomi

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh seorang bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan intervensi, pelaksanaan dan evaluasi.

Pengertian manajemen kebidanan dan prosesnya perlu diperjelaskan untuk memberikan kesamaan pandangan. Varney (2003) mengatakan proses manajemen terdiri dari 7 langkah sekuensial, yang secara berkala disempurnakan. Ini dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan evaluasi. Langkah 7 Varney ini merupakan keseluruhan kerangka kerja yang berlaku dalam semua situasi. Setiap langkah kemudian dapat dipecah menjadi tugas yang terbatas yang bervariasi sesuai dengan kondisi pasien. Harus diakui bahwa langkah-langkah ini diambil berkolaborasi dengan pasien, atau berkerjasama dengan pasien atau keluarga pasien.

Langkah-langkah manajemen kebidanan/proses manajemen terdiri dari 7 langkah yakni sebagai berikut:

1. Langkah I (pertama): pengumpulan data dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien. Data yang dikumpulkan adalah data yang tepat yaitu data yang relevan dengan situasi yang sedang ditinjau atau data yang memiliki berhubungan dengan situasi yang ditinjau. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu: observasi, wawancara, pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik,kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi napas), penciuman (bau nafas, bau luka) serta perabaan (suhu badan, nadi).

a. Data Subjektif

Adalah data yang diperoleh dengan cara anamnesa. Anamnesa adalah pengkajian dalam rangka mendapatkan data pasien ibu nifas dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik secara langsung pada pasien ibu bersalin maupun kepada keluarga pasien (Walyani dan Purwoastuti, 2015:185).

1) Biodata

Adalah identitas untuk mengetahui status klien secara lengkap sehingga sesuai dengan sasaran. Identitas meliputi:

- a) Nama: untuk mengetahui dan mengenal pasien
- b) Umur: untuk mengetahui faktor resiko dan tingkat kesuburan
- c) Suku bangsa: dikaji untuk mengetahui lebih jauh tentang sosial budaya pasien
- d) Agama: untuk mengetahui kepercayaan yang dianut oleh pasien

- e) Pendidikan: untuk mengetahui tingkat pendidikan yang nantinya penting dalam pemberian KIE
- f) Pekerjaan: untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi keluarga
- g) Alamat: dikaji untuk mengetahui keadaan sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal (Marmi, 2014: 179).

2) Keluhan Utama

Untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh ibu setelah melahirkan. Pada kasus ini keluhan yang biasa muncul pada ibu nifas dengan luka episiotomi yaitu nyeri pada bekas jahitan episiotomi, nyeri terasa apabila bergerak dan ada nyeri tekan.

3) Riwayat kehamilan yang lalu

- a) Untuk mengetahui kapan ibu hari pertama haid terakhir (HPHT), karena dengan HPHT kita bisa mengetahui apakah bayi yang dilahirkan cukup bulan atau tidak.
- b) Apakah ibu pernah periksa antenatal care (ANC) dan berapa kali.
- c) Berapa kali ibu mendapatkan suntikkan imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT).
- d) Apakah pernah mengalami masalah selama kehamilan
- e) Kapan pertama kali ibu merasakan gerakan janinnya

4) Riwayat persalinan yang lalu

- a) Jenis persalinan: Untuk mengetahui apakah klien melahirkan secara spontan atau SC. Pada ibu nifas normal klien melahirkan secara spontan.

- b) Komplikasi dalam persalinan: untuk mengetahui selama persalinan normal atau tidak. Pada kasus ibu nifas dengan luka episiotomi selama persalinan normal namun memerlukan tindakan episiotomi karena mengalami indikasi dari tindakan episiotomi.
 - c) Perineum: untuk mengetahui apakah perineum ada robekan atau tidak. Pada nifas normal pun bias juga dilakukan episiotomi.
 - d) Perdarahan: untuk mengetahui jumlah darah yang keluar pada kala I, II, III selama proses persalinan, pada masa nifas normal perdarahan tidak boleh lebih dari 500 cc.
 - e) Proses persalinan (bayi)
 - (1) tanggal lahir: untuk mengetahui usia bayi
 - (2) Berat Badan (BB) dan Panjang Badan (PB): untuk mengetahui BB bayi normal atau tidak. Normalnya 2500-4000 gram.
 - (3) Apgar score baik: 7-10
 - (4) Cacat bawaan: bayi normal atau tidak
 - (5) Air ketuban: jernih, mekonium, darah.
- 5) Riwayat penyakit
- Riwayat penyakit yang dikaji ialah sebagai berikut:
- a) Riwayat penyakit sekarang
 - Untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit yang diderita ibu pada saat ini yang ada hubungannya dengan proses persalinan dan kepada bayinya.

b) Riwayat penyakit keluarga

Untuk mengetahui adanya riwayat atau penyakit akut bahkan kronis seperti penyakit *Diabetes Mellitus*, jantung, asma, hipertensi yang bisa saja berpengaruh pada proses persalinan.

6) Riwayat Kontrasepsi

Untuk mengetahui apakah pasien pernah menjadi akseptor KB atau tidak, jika iya dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi tersebut, serta rencana KB setelah bersalin (Marmi, 2014:180).

b. Data objektif

Data yang diperoleh dari apa saja yang dilihat dan dirasakan sewaktu melakukan pemeriksaan dan hasil laboratorium (Kuswanti dan Melina, 2014:77).

Pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi serta tingkat kenyamanan fisik ibu bersalin serta mendeteksi dini adanya komplikasi.

1) Status generalis

a) Keadaan umum: untuk mengetahui keadaan umum ibu baik normal atau tidak. Untuk ibu nifas dengan luka episiotomi keadaan ibu biasanya terlihat lelah dan sedikit meringis ketika ada gerakan.

b) Kesadaran: untuk mengetahui tingkat kesadaran yaitu apakah komplementis, apatis, samnolen atau koma.

c) Tanda-tanda vital, yakni:

(1) Tekanan darah: normalnya 120/80 mmHg

(2) Nadi: normalnya 80-100 x/m

(3) Suhu badan: normalnya 36,5-37,5°C

(4) Pernapasan: normalnya 16-24 x/m

2) Inspeksi

Adalah pemeriksaan yang dilakukan secara melihat dengan indra penglihat. Adapun pemeriksaan fisik yang dilakukan secara inspeksi yakni sebagai berikut:

- a) Wajah: pucat atau tidak
- b) Mata: conjungtiva pucat atau tidak, sklera ikterus atau tidak dan mata cekung atau tidak
- c) Hidung: apakah ada pernapasan cuping hidung atau tidak.
- d) Mulut: kering atau lembab, pucat atau tidak
- e) Leher: apakah ada pembesaran kelenjar tyroid atau tidak.
- f) Payudara: apakah pembesaran payudara normal atau tidak, apakah ada hyperpigmentasi pada daerah areola, apakah ada penonjolan puting susu atau tidak. Pada kasus masa nifas, setelah ibu bersalinan kondisi puting susu sangat menunjang ketika bayi menghisap puting susu ibu untuk mendapatkan ASI.
- g) Abdomen: apakah ada bekas luka operasi atau tidak, pembesaran perut ibu sesuai dengan masa involusi uteri atau tidak.
- h) Genitalia: ada pengeluaran lochia, adakah varices, oedem, ada jahitan atau tidak, pada kasus episiotomi terdapat luka ruptur II jika ruptur episiotomi tidak bertambah menjadi ruptur III dan IV, bila pada ruptur terjadi infeksi maka akan terjadi kemerahan mengeluarkan nanah serta bau busuk.

- i) Anus: ada hemoroid atau tidak.
- j) Ekstremitas: ada varices atau tidak, pada ibu nifas dengan luka episiotomi pergerakan ekstremitas bawah agak lamban akibat nyeri yang dirasakan ibu di jahitan episiotomi bila terlalu bergerak.

3) Palpasi

Palpasi ialah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara meraba. Pemeriksaan fisik terfokus dengan cara palpasi sebagai berikut:

- a) Wajah: ada oedem atau tidak.
- b) Mata: apakah konjungtiva merah muda atau pucat.
- c) Leher: apakah ada pembesaran kelenjar limfe atau tidak, adakah pembesaran vena jugularis atau tidak.
- d) Payudara: untuk mengetahui apakah ada pengeluaran colostrums atau tidak dan apakah ada nyeri tekan atau tidak.
- e) Abdomen: untuk menentukan Tinggi Fundus Uteri (TFU) untuk ibu nifas TFU di hari pertama ialah 1 jari bawah pusat, apakah kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras) atau tidak.
- f) Genitalia: untuk mengetahui warna, jumlah, bau konsistensi lochia, ada jahitan atau tidak, jahitan ruptur tingkat berapa. Pada ibu nifas dengan luka episiotomi 1 hari post partum lochia berwarna merah jumlah ± 50 cc dan terdapat jahitan bekas episiotomi tingkat II dan jahitan masih basah serta adanya sedikit nyeri tekan.
- g) Ekstremitas: ada oedem atau tidak.

4) Uji Diagnostik

- a) Darah: pemeriksaan Hb, Hb ibu nifas normalnya 11 gr%.

- b) Golongan darah: untuk transfuse darah apabila terjadi komplikasi (Marmi, 2014:181-182).

2. Langkah II (kedua): Interpretasi data dasar

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Langkah awal dari perumusan masalah/diagnosa kebidanan adalah pengolahan/analisa data yaitu menggabungkan dan menghubungkan data satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta (Asri dan Clervo, 2012:26-28).

a. Diagnosa kebidanan

Masalah/diagnosa adalah suatu pernyataan dari masalah pasien/klien yang nyata atau potensial dan membutuhkan tindakan (Asri dan Clervo, 2012:29). Diagnosa pada kasus ini ditegakkan ibu nifas dengan luka episiotomi.

Dasar:

- 1) Data subyektif
 - a) Ibu merasa lelah
 - b) Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
 - c) Ibu mengatakan bahwa ia mendapatkan beberapa jahitan dan merasa nyeri
- 2) Data obyektif
 - a) Keadaan umum ibu nifas dengan luka episiotomi baik
 - b) Kesadaran composmentis

- c) Tanda-tanda vital ibu nifas dengan luka episiotomi biasanya dalam batas normal bila tidak ada komplikasi.
- d) Luka perineum derajat dua, keadaan masih basah, jenis heating jelujur dan zigzag subcutis (Walyani dan Purwoastuti, 2015).

3) Masalah

Adalah kesenjangan yang diharapkan dengan fakta/kenyataan. Masalah disini ialah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman pasien dengan pengkajian. Dalam kasus ibu nifas dengan luka episiotomi adalah nyeri bekas jahitan yang dirasakan oleh ibu, ibu takut untuk bergerak, serta ada nyeri tekan.

4) Kebutuhan

Merupakan hal-hal yang dibutuhkan ibu pasien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa (Marmi, 2014:183).

3. Langkah III (ketiga): Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial

Pada langkah ini untuk mengidentifikasikan, masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien diharapkan dapat pula bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Dalam kasus persalinan dengan episiotomi yang bias menjadi masalah potensial adalah dapat terjadinya nyeri yang berlebihan dan dapat terjadinya infeksi pada luka jahitan perineum.

4. Langkah IV (keempat): Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera.

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Bahkan dapat pula memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan yang lain. Penolong mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Antisipasi pertama untuk mencegah terjadinya infeksi yang dilakukan pada ibu nifas dengan luka episiotomi yakni berkolaborasi dengan dokter, untuk meresepkan obat-obat yang sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu nifas dengan luka episiotomi dan antisipasi/bila terjadi infeksi, seperti analgetik, antiinflamasi, dan antibiotik.

5. Langkah V (kelima): Merencanakan asuhan yang komprehensif / menyeluruh

Pada langkah ini perencanaan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi. Dalam suatu rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini di penolong dengan yang ditolong, karena meski penolong yang hanya menyetujuinya maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari yang ditolong. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan asuhan yang komprehensif harus merefleksikan

alasan yang benar berlandaskan pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan *up to date*. Adapun intervensi yang diberikan kepada ibu nifas dengan luka episiotomi yaitu:

- a. Beritahu ibu hasil pemeriksaan

Rasional: Agar ibu mengetahui kondisinya saat ini.

- b. Observasi Tinggi Fundus Uteri (TFU)

Rasional: Pemeriksaan TFU dilakukan untuk mengetahui bahwa proses involusi uteri berjalan normal atau tidak, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/hari yang teraba bundar dan keras (Saleha, 2013: 130).

- c. Observasi kontraksi uterus

Rasional: Menilai kontraksi uterus merupakan salah satu upaya pencegahan perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri dan memperlambat proses involusi (Saleha, 2013: 131).

- d. Jelaskan penyebab nyeri luka episiotomi yang dirasakan ibu

Rasional: Adanya pemisahan jaringan otot-otot perineum pada saat dilakukan episiotomi yang mengakibatkan nyeri (Pudiastuti, 2012:1).

- e. Anjurkan ibu mobilisasi dini secara bertahap

Rasional: Mobilisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan akibat tersumbatnya pembuluh darah (Marmi, 2012:137).

- f. Lakukan perawatan luka episiotomi

Rasional: Melakukan perawatan luka episiotomi dapat mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan (Marmi, 2012: 141).

- g. Berikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup

Rasional: Memulihkan kembali tenaga ibu yang terkuras selama proses persalinan (Marmi, 2012:137).

- h. Jelaskan kepada ibu tentang akibat kurang istirahat

Rasional: Kurang istirahat akan mengurangi produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri (Marmi, 2012:145).

- i. Jelaskan kepada ibu tentang manfaat dari ASI eksklusif

Rasional: Komposisi sesuai kebutuhan, kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung zat pelindung, perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat, manfaat bagi ibu dapat mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula (Saleha, 2013:31-32).

- j. Anjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi

Rasional: Makan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013:31-131).

- k. Anjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum

Rasional: Menjaga kebersihan daerah perineum ibu dan mencegahnya dari infeksi serta membantu mempercepat proses penyembuhan luka jahitan episiotomi (Marmi, 2012:139).

- l. Ajarkan kepada ibu tentang cara perawatan luka episiotomi

Rasional: Mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi yang benar, maka ibu dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka episiotomi (Marmi, 2012: 142).

- m. Jelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi

Rasional: Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada jahitan luka episiotomi, diharapkan ibu dapat lebih memperhatikan serta mencegah sedini mungkin terjadinya infeksi (Marmi, 2012:142).

- n. Observasi pengeluaran lochia

Rasional: Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa masa nifas berlangsung normal dengan ditandai pengeluaran lochia yang sesuai dengan waktu dan warna serta baunya (Maritalia, 2012: 21).

- o. Jelaskan kepada ibu tentang tehnik menyusui yang baik dan benar

Rasional: Bayi akan tampak tenang karena mudah mnghisap ASI, pemenuhan nutrisi bayi cukup, dan mencegah terjadinya puting susu lecet dan tidak terasa nyeri (Saleha, 2013:38).

- p. Anjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan

Rasional: Batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik (Marmi, 2012:147).

- q. Anjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik serta zat besi yang telah diberikan.

Rasional: Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu dan obat antibiotik dapat menghambat mikroba atau jenis lain penyebab infeksi, serta dengan pemberian zat besi pada ibu nifas karena di masa nifas kebutuhan Fe meningkat akibat kehilangan darah pada saat proses persalinan (Saleha, 2013:31-132).

6. Langkah VI (keenam): Melaksanakan perencanaan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan meningkatkan waktu dan meningkatkan mutu asuhan. Adapun rencana asuhan yang diberikan adalah:

- a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan
- b. Mengobservasi Tinggi Fundus Uteri (TFU)
- c. Mengobservasi kontraksi uterus
- d. Menjelaskan penyebab nyeri perineum yang dirasakan ibu
- e. Menganjurkan ibu mobilisasi dini secara bertahap
- f. Melakukan perawatan luka episiotomi
 - 1) Mencuci tangan

- 2) Menganjurkan ibu berbaring
 - 3) Membuka pakaian bawah ibu
 - 4) Menggunakan handscoon
 - 5) Melihat keadaan luka episiotomi
 - 6) Membersihkan dengan betadin
 - 7) Memasang pembalut, celana dalam dan pakaian bawah ibu
 - 8) Membereskan alat
 - 9) Melepas handscoon
 - 10) Mencuci tangan
- g. Memberikan pendidikan kesehatan istirahat yang cukup
 - h. Menjelaskan kepada ibu akibat kurang istirahat
 - i. Menjelaskan kepada ibu manfaat dari ASI eksklusif
 - j. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi
 - k. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum
 - l. Mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi
 - m. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi
 - n. Mengobservasi pengeluaran lochia
 - o. Menjelaskan kepada ibu tehnik menyusui yang baik dan benar
 - p. Menganjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik, analgesik dan antibiotik serta zat besi yang telah diberikan.

7. Langkah VII (ketujuh): Evaluasi

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar

telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian belum efektif.

Evaluasi asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan luka episiotomi yaitu masa nifas yang dilalui ibu berjalan normal antara lain keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, nadi dan suhu normal, jumlah perdarahan dalam batas normal, kontraksi uterus baik dan memastikan kandung kemih kosong serta tidak ada tanda dan gejala infeksi pada luka jahitan luka episiotomi (Asri dan Clervo, 2012:29-31).

H. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Format SOAP pada umumnya digunakan untuk pengkajian awal pada pasien.

1. Subjektive (S)

Menggambarkan pendokumentasian hanya pengumpulan data klien melalui anamnesa. Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil bertanya dari pasien, suami atau keluarga (identitas umum, keluhan, riwayat *menarche*, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit, riwayat penyakit dalam keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikososial, pola hidup). Catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa. Pada orang yang bisu, dibagian data belakang "S" diberi tanda "O" atau "X" ini yang akan menjadi tanda orang bisu. Data subjektif menguatkan diagnosa yang akan dibuat.

2. Objektif (O)

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, hasil lab, dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assesment. Tanda gejala objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (tanda keadaan umum, *fital sign*, fisik, khusus kebidanan, pemeriksaan dalam, laboratorium dan pemeriksaan penunjang). Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi kajian teknologi (hasil laboratorium, sinar X, rekaman CTG, dan lain-lain) dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam kategori ini. Apa yang diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan.

3. *Asessment* (A)

Masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun onjektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru bagi subjektif maupun objektif, dan sering diungkapkan secara terpisah-pisah, maka proses pengkajian adalah suatu proses yang dinamik. Sering menganalisa adalah suatu yang penting dalam mengikuti perkembangan pasien dan menjamin suatu perubahan baru cepat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif suati identifikasi diagnosa masalah dan antisipasi masalah lain/diagnosa potensial.

4. *Planning (P)*

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi berdasarkan asesment. Untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi dimasukkan dalam “P”.

a. Perencanaan

Membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang. Untuk mengusahakan tercapainya kondisi yang sebaik mungkin atau menjaga mempertahankan kesejahteraannya. Proses ini termasuk kriteria tujuan tertentu dari kebutuhan pasien yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu, tindakan yang diambil harus membantu pasien mencapai kemajuan dalam kesehatan dan harus sesuai dengan instruksi dokter.

b. Implementasi

Pelaksanaan rencana tindakan untuk menghilangkan dan mengurangi masalah klien. Tindakan ini harus disetujui oleh klien kecuali bila tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan klien. Oleh karena itu, klien harus sebanyak mungkin menjadi bagian dari proses ini. Bila kondisi klien berubah, intervensi mungkin juga harus berubah-ubah atau disesuaikan.

c. Evaluasi

Tafsiran dari efek tindakan yang telah dilakukan merupakan hal penting untuk menilai keefektifan asuhan yang diberikan. Analisa dari hasil yang dicapai menjadi fokus dari ketepatan nilai tindakan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, proses evaluasi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan alternatif sehingga mencapai tujuan (Heryani, 2011:125-127).

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS PADA NY "M" PASCA
EPISIOTOMI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 16 JUNI 2017**

No. Register : 47.4x.xx
Tanggal partus : 16 Juni 2017, Pukul 10.15 wita
Tanggal masuk : 16 Juni 2017, Pukul 12.52 wita
Tanggal pengkajian : 16 Juni 2017, Pukul 13.00 wita

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas

Identitas istri/suami

Nama : Ny. M / Tn. A
Umur : 19 tahun / 19 tahun
Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Tombolo, Kec. Barombong Kab. Gowa

B. Data Subjektif

1. Keluhan utama

Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitan bekas pengguntingan pada jalan lahir

2. Riwayat keluhan utama

- a. Ibu mengatakan pada saat proses persalinan dilakukan pengguntingan pada jalan lahir
- b. Nyeri dirasakan setelah melahirkan pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 10.15 wita
- c. Sifat nyeri dirasakan lebih terasa jika bergerak atau bila ditekan
- d. Usaha ibu untuk mengatasinya yaitu ibu berbaring dan bergerak lebih hati-hati

3. Riwayat kehamilan dan persalinan

a. Riwayat kehamilan

- 1) Merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
- 2) Hari pertama haid terakhir tanggal 5 Oktober 2016
- 3) Hari taksiran persalinan tanggal 12 Juli 2017
- 4) Selama hamil ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali
- 5) Selama hamil telah mendapatkan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid sebanyak 2 kali

TT 1 : 8 Februari 2017 di BPS Rahmat, Tombolo, Kec. Barombong
Kab. Gowa

TT 2 : 6 Maret 2017 di BPS Rahmat, Tombolo, Kec. Barombong Kab.
Gowa

- 6) Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes, asma dan penyakit serius lainnya
 - 7) Tidak ada riwayat penyakit menurun, menular dan menahun dalam keluarga
 - 8) Selama hamil ibu tidak pernah mengalami mual muntah berlebih, nyeri perut yang hebat, perdarahan atau tanda bahaya kehamilan lainnya
- b. Riwayat persalinan

1) Kala I

Ibu datang dengan rujukan dari Klinik Rahmat pada pagi hari pukul 09.50 wita, dengan G1P0A0, gestasi 36 minggu 2 hari, pembukaan 10 cm sejak 3 jam 20 menit yang lalu (pukul 06.30 wita), ketuban pecah jernih pada subuh hari (pukul 04.30 wita), partus kala II lama, terpasang infuse RL 28 kali/menit, Denyut Jantung Janin (DJJ) 132 kali/menit, his 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 35-40 detik.

- a) Keadaan umum ibu baik
- b) Kesadaran composmentis
- c) Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 82 kali/menit, teratur

Suhu : 36,9 °C, aksilarr

Pernapasan : 24 kali/menit, saat istirahat

2) Kala II

Mengajarkan tehnik mengedan yang benar, pukul 10.10 wita pagi dilakukan episiotomi mediolateral, dengan his yang adekuat dan kekuatan

mengedan ibu maka pada pukul 10.15 wita lahir bayi laki-laki dengan Presentasi Belakang Kepala (PBK), Berat Badan Lahir (BBL) 2800 gram, Panjang Badan Lahir (PBL) 46 cm, dan APGAR *score* 7/10.

3) Kala III

Pukul 10.15 wita pagi dilakukan manajemen aktif kala III yaitu penyuntikan oxytosin, Peregangan Tali pusat Terkendali (PTT) selama 7 menit dan pada pukul 10.22 wita plasenta lahir lengkap dengan kotiledon dan selaput yang utuh, dan dilakukan penjahitan luka episiotomi secara mediolateral dengan anastesi. Tidak dilakukan pengikatan pembuluh darah karena tidak ada perdarahan aktif, penjahitan menggunakan benang *plain catgut* ukuran 2/0. Penjahitan pada mukosa vagina menggunakan teknik jelujur, sementara pada perineum menggunakan teknik satu-satu dengan jumlah jahitan sebanyak 4 dengan jarak setiap jahitan adalah 1 cm dan jarak antara jahitan terakhir dengan pangkal luka adalah 0,5 cm. Penjahitan dilakukan oleh bidan.

4) Kala IV

Table 3.1 Pemantauan Kala IV

Jam ke	Waktu (WITA)	TD (mmHg)	Nadi (kali/menit)	Suhu (°C)	TFU jrbpst	Kontraksi uterus	Kandung kemih	Perdarahan
I	10.37	110/70	87	36,8	1 jrbpst	Baik	Kosong	±100
	10.52		85		1 jrbpst	Baik	Kosong	±50

	11.07		85		1 jrbpst	Baik	Kosong	±50
	11.22		80		1 jrbpst	Baik	Kosong	±25
II	11.52	110/70	80	36,6	1 jrbpst	Baik	Kosong	±15
	12.22		80		1 jrbpst	Baik	Kosong	±10

Table 3.2 Pemantauan Jahitan Luka Episiotomi

Waktu (WITA)	Keadaan luka	Kondisi jahitan	Perdarahan	Tanda infeksi
10.37	Lembab	Utuh	Tidak ada	Tidak ada
11.37	Lembab	Utuh	Tidak ada	Tidak ada
12.37	Lembab	Utuh	Tidak ada	Tidak ada

4. Riwayat kesehatan yang lalu

- a. Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan asma
- b. Tidak ada riwayat operasi
- c. Tidak ada riwayat alergi obat

5. Riwayat keluarga berencana

Ibu belum pernah menjadi akseptor KB

6. Riwayat psikososial, spiritual dan ekonomi

- a. Ibu, suami dan keluarga sangat senang dengan kelahiran anak ibu
- b. Ibu dan suami senantiasa berdoa agar anaknya selalu sehat
- c. Biaya persalinan ditanggung oleh suami.

7. Pola pemenuhan dasar

a. Nutrisi

1) Sebelum nifas

Ibu mengatakan makan 2-3 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan dan kadang-kadang buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu dan the

2) Selama nifas

Ibu mengatakan sudah makan 1 kali, menu dari rumah sakit, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan, buah dan minum 1 gelas air putih dan 1 gelas teh.

b. Eliminasi

1) Sebelum nifas

Buang Air Kecil (BAK) 6-7 kali sehari, warna urine kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada nyeri saat BAK

Buang Air Besar (BAB) 1-2 kali sehari, warna kuning kecoklatan, lunak, dan tidak ada keluhan

2) Selama nifas

Ibu mengatakan telah BAK 1 kali setelah melahirkan tanggal 16 Juni 2017 pukul 12.30 wita.

Ibu mengatakan belum BAB setelah melahirkan

c. Istirahat/tidur

1) Sebelum nifas

Ibu mengatakan tidur siang 2-4 jam dan tidur malam 8 jam

2) Selama nifas

Ibu mengatakan baru tidur \pm 1½ jam setelah melahirkan

d. Keadaan psikologis

Ibu mengatakan merasa bahagia dan sangat senang dengan kelahiran anak pertamanya dalam keadaan sehat

e. Spiritual

1) Sebelum nifas

Ibu mengatakan sering melewatkan salat 5 waktu, ibu sesekali membaca Al-Qur'an dan tidak terlalu memahami tajwidnya

2) Selama nifas

Ibu mengetahui bahwa selama 40 hari masa nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dan setelah 40 hari ibu harus mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah.

f. Riwayat social budaya

1) Dukungan keluarga

Ibu mengatakan suami dan keluarganya sangat mendukung dan merasa senang dengan kelahiran anaknya

2) Keluarga lain yang tinggal serumah

Ibu mengatakan iparnya pun senang dengan kelahiran anaknya

3) Kebiasaan adat istiadat

Ibu mengatakan bahwa setelah bayi lahir ari-arinya ditanam dekat rumah

4) Penggunaan obat-obatan

Ibu mengatakan hanya minum obat dari bidan atau dokter.

C. Data Objektif

1. Status generalis

- a. Masa nifas hari pertama
- b. Keadaan umum ibu baik
- c. Kesadaran composmentis
- d. Ekspresi ibu tampak meringis bila bergerak
- e. Tanda-tanda vital

Tekanan darah	: 110/70 mmHg
Nadi	: 85 kali/menit, teratur
Suhu	: 36,6 °C, aksilar
Pernapasan	: 24 kali/menit, saat istirahat

2. Pemeriksaan fisik *Head to Toe*

- a. Wajah

Inspeksi	: Tidak pucat, tampak meringis
Palpasi	: Tidak ada <i>pitting</i> oedem
- b. Mata

Inspeksi	: konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterus
----------	--
- c. Hidung

Inspeksi	: tidak ada pernapasan cuping hidung, dan polip
Palpasi	: tidak ada nyeri tekan

d. Mulut

Inspeksi : bibir tidak pucat dan tidak pecah-pecah atau kering, keadaan mulut bersih, gigi tidak caries

e. Telinga

Inspeksi : tidak ada kelainan dan tidak ada serumen

Palpasi : tidak ada nyeri tekan

f. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, dan vena jugularis

g. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu sedikit menonjol, tampak hiperpigmentasi pada aerola, ada pembesaran, tidak ada peradangan

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, bila ditekan daerah aerola terdapat pengeluaran kolostrum

h. Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : ada sedikit nyeri tekan, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras.

i. Vulva dan perineum

Inspeksi : tidak varices, tampak pengeluaran lochia rubra, terdapat luka jahitan episiotomi secara mediolateral, luka jahitan masih lembab.

Palpasi : pada luka jahitan terdapat nyeri tekan, tidak ada *pitting* oedem

Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka.

j. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varices

Palpasi : tidak ada *pitting* oedem

LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Nyeri luka jahitan dengan luka episiotomi

Data dasar

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya pada tanggal 16 juni 2017 pukul 10.15 wita
2. Ibu mengatakan saat bersalin dilakukan pengguntingan pada jalan lahir dan mendapatkan beberapa jahitan
3. Ibu mengatakan nyeri pada jahitan bekas pengguntingan jalan lahir dan ada pengeluaran darah dari jalan lahir.

Data Objektif :

1. Keadaan umum ibu sedikit terlihat lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 100/70 mmHg
 - Nadi : 85 kali/menit, teratur
 - Suhu : 36,6 °C, aksilar
 - Pernapasan : 24 kali/menit, saat istirahat
4. TFU 1 jari di bawah pusat
5. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
6. Tampak pengeluaran lochia rubra
7. Tampak jahitan luka episiotomi mediolateral

Analisa dan interpretasi data

1. Ibu tampak lemah karena pada saat proses persalinan ibu dengan sekuat tenaga menyeimbangkan kontraksi yang dirasakannya dan selama proses persalinan ibu berkuat untuk melahirkan bayinya sehingga tenaga ibu terkuras dan ibu merasa kelelahan (Kuswanti dan Melina, 2014:7).
2. Pada hari pertama postpartum, didapatkan tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat. Lochia adalah cairan secret yang berasal dari cavum uteri dan vagina selama masa nifas. Pada hari pertama postpartum sampai hari kedua lochia yang keluar adalah lochia rubra (*cruenta*) berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo,

dan nekrosis, lochia ini yang akan keluar selama dua sampai tiga hari masa nifas (Saleha, 2013: 56).

3. Luka episiotomi adalah pengguntingan berupa sayatan kecil pada perineum yang dilakukan pada saat proses persalinan berlangsung. Episiotomi dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pembukaan vagina sehingga bayi dapat keluar lebih mudah tujuan tindakan episiotomi ialah memperlebar jalan lahir, mempercepat persalinan kala II lama yang berlangsung lebih dari 2 jam pada primi, yang ditandai dengan tanda dan gejala klinis pembukaan serviks lengkap dan ibu mencedan tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala (Asri dan Clervo, 2012:86).
4. Nyeri luka episiotomi disebabkan oleh terputus/rusaknya jaringan-jaringan dasar panggul atau terputusnya otot-otot perineum dari tindakan episiotomi maka aliran darah pada jaringan tersebut terhambat dan mengantarkan respon nyeri ke hypothalamus dan preseptikan ke saraf parifer dan menimbulkan nyeri. Dan dengan adanya jaringan parut dapat mengakibatkan *dispareunia* atau nyeri pada vagina atau nyeri di dalam panggul juga dapat terjadi selama melakukan hubungan seksual (Pudiastuti, 2012:1).

Kebutuhan :

Memberikan perawatan luka episiotomi dan *Health Education* tentang perawatan luka episiotomi.

LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa : Antisipasi terjadi infeksi luka episiotomi

Data Dasar

Data Subjektif :

1. Ibu melahirkan tanggal 16 juni 2017 pukul 10.15 wita
2. Ibu merasa nyeri pada jahitan luka jahitan
3. Ibu merasa adanya pengeluaran darah dari jalan lahir

Data Objektif :

1. Tampak jahitan luka episiotomi secara mediolateral
2. Nyeri tekan pada perineum
3. Luka jahitan episiotomi terlihat masih lembab
4. Tampak pengeluaran lochia rubra

Analisa dan interpretasi data

Luka episiotomi merupakan rusaknya jaringan daerah perineum tersebut, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada masa nifas masih terdapat pengeluaran darah lochia dan kotoran yang keluar dari vagina. Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim. Padahal, dalam keadaan luka, perineum rentan didatangi kumam dan bakteri sehingga mudah terinfeksi (Marmi, 2012: 141).

LANGKAH IV: TINDAKAN EMERGENCY DAN KOLABORASI

Tindakan kolaborasi yang dilakukan dengan dokter yaitu meresepkan dan pemberian obat analgetik, analgesik, antiinflamsi dan zat besi untukantisipasi terjadi infeksi.

- a. Asam Mafenamat 500 mg dosis 3 kali sehari
Sebagai obat analgetik, analgesik, dan antiinflamasi.
- b. Cefadroxil 500 mg dosis 2 kali sehari
Sebagai antibiotik dengan spektrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif
- c. Multi Vitamin dengan Fero Sulfat 500 mg dosis 1 kali sehari
Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

LANGKAH V: INTERVENSI

- Diagnosa : Masa nifas hari pertama dengan luka episiotomi
- Masalah Aktual : Nyeri luka episiotomi
- Masalah Potensial : Antisipasi infeksi luka episiotomi
- Tujuan : 1. Masa nifas berlangsung normal
2. Nyeri pada luka episiotomi berkurang
3. Tidak terjadi infeksi
- Kriteria : 1. Keadaan umum ibu baik
2. Ekspresi wajah ibu senang
3. Ibu tidak mengeluh nyeri pada luka bekas jahitan
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- a. Tekanan darah systole 90-130 mmHg dan diastole 60-90 mmHg

- b. Nadi 80-100 kali/menit
- c. Suhu 36,5-37,5°C
- d. Pernapasan 16-24 kali/menit
- 5. TFU turun 1 cm setiap hari
- 6. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
- 7. Pengeluaran lochia sesuai waktunya

Intervensi tanggal 16 juni 2017 pukul 13.15 wita

1. Jelaskan ibu hasil pemeriksaan

Rasional: Agar ibu mengetahui dan mengerti kondisinya saat ini.
2. Observasi Tinggi Fundus Uteri (TFU), kontraksi uterus, pengeluaran lochia

Rasional: Pemeriksaan TFU dilakukan untuk mengetahui bahwa proses involusi uteri berjalan normal atau tidak, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/hari yang teraba bundar dan keras (Saleha, 2013: 130). Menilai kontraksi uterus merupakan salah satu upaya pencegahan perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri dan memperlambat proses involusi (Saleha, 2013: 131). Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa masa nifas berlangsung normal dengan ditandai pengeluaran lochia yang sesuai dengan waktu dan warna serta baunya (Maritalia, 2012: 21).
3. Jelaskan penyebab nyeri luka episiotomi yang dirasakan ibu

Rasional: Adanya pemisahan jaringan otot-otot perineum pada saat dilakukan episiotomi yang mengakibatkan nyeri (Pudiastuti, 2012:1).
4. Anjurkan ibu mobilisasi dini secara bertahap

Rasional: mobilisasi dini dapat memulihkan kondisi tubuh dengan cepat, system sirkulasi di dalam tubuh pun bisa berfungsi normal kembali. Bahkan

dapat mencegah aliran darah terhambat. Hambatan aliran darah dapat menyebabkan terjadinya thrombosis vena dalam dan dapat menyebabkan infeksi (Marmi, 2012:137).

5. Lakukan perawatan luka episiotomi

Rasional: Melakukan perawatan luka episiotomi dapat mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan (Marmi, 2012: 141).

6. Berikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup

Rasional: Memulihkan kembali tenaga ibu yang terkuras selama proses persalinan (Marmi, 2012:137).

7. Jelaskan kepada ibu tentang akibat kurang istirahat

Rasional: Kurang istirahat akan mengurangi produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri (Marmi, 2012:145).

8. Jelaskan kepada ibu tentang manfaat dari ASI eksklusif

Rasional: Komposisi sesuai kebutuhan, kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung zat pelindung, perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat, manfaat bagi ibu dapat mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula (Saleha, 2013:31-32).

9. Anjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi

Rasional: Makan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013:31-131).

10. Anjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum
Rasional: Menjaga kebersihan daerah perineum ibu dan mencegahnya dari infeksi serta membantu mempercepat proses penyembuhan luka jahitan episiotomi (Marmi, 2012:139).
11. Ajarkan kepada ibu tentang cara perawatan luka episiotomi
Rasional: Mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi yang benar, maka ibu dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka episiotomi (Marmi, 2012: 142).
12. Jelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi
Rasional: Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada jahitan luka episiotomi, diharapkan ibu dapat lebih memperhatikan serta mencegah sedini mungkin terjadinya infeksi (Marmi, 2012:142).
13. Jelaskan kepada ibu tentang tehnik menyusui yang baik dan benar
Rasional: Bayi akan tampak tenang karena mudah mnghisap ASI, pemenuhan nutrisi bayi cukup, dan mencegah terjadinya puting susu lecet dan tidak terasa nyeri (Saleha, 2013:38).
14. Anjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan
Rasional: Batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik (Marmi, 2012:147).
15. Anjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik serta zat besi yang telah diberikan.

Rasional: Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu dan obat antibiotik dapat menghambat mikroba atau jenis lain penyebab infeksi, serta dengan pemberian zat besi pada ibu nifas karena di masa nifas kebutuhan Fe meningkat akibat kehilangan darah pada saat proses persalinan (Saleha, 2013:31-132).

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Tanggal 16 juni 2017 pukul 13.15 wita

1. Menjelaskan kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik
Hasil: ibu mengerti dan telah mengetahui kondisinya saat ini
2. Mengobservasi Tinggi Fundus Uteri (TFU), kontraksi uterus, pengeluaran lochia
Hasil: TFU 1 jari di bawah pusat, Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras dan tampak pengeluaran lochia rubra, tidak berbau
3. Menjelaskan penyebab nyeri luka jahitan episiotomi yang dirasakan ibu disebabkan oleh adanya pemisahan jaringan atau otot-otot perineum dari akibat tindakan episiotomi.
Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan beradaptasi dengan keadaan tersebut
4. Menganjurkan ibu mobilisasi dini secara bertahap
Hasil: ibu telah dapat miring kanan dan kiri serta mulai duduk secara perlahan-lahan.
5. Melakukan perawatan luka episiotomi
 - 1) Mencuci tangan

- 2) Menganjurkan ibu berbaring
- 3) Membuka pakaian bawah ibu
- 4) Menggunakan handscoon
- 5) Melihat keadaan luka episiotomi
- 6) Membersihkan dengan betadin
- 7) Mengompres bekas luka jahitan episiotomi dengan kassa betadin
- 8) Memasang pembalut, celana dalam dan pakaian bawah ibu
- 9) Membereskan alat
- 10) Melepas handscoon
- 11) Mencuci tangan

Hasil: telah dilakukan perawatan luka episiotomi

6. Membantu ibu mengganti pembalut/popok

Hasil: Popok ibu telah diganti

7. Memberikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup \pm 8 jam di malam hari dan \pm 2 jam di siang hari

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Menjelaskan kepada ibu akibat kurang istirahat dapat mengakibatkan kurangnya produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menjelaskan kepada ibu manfaat dari ASI eksklusif yakni mengandung kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung

zat pelindung, perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat, manfaat bagi ibu dapat mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan member ASI kepada bayinya secara eksklusif

10. Mengajukan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Selain itu dengan pemenuhan nutrisi bergizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

11. Mengajukan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum, dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi dan mengganti pembalut ialah 3 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

12. Mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi yang pertama sebelum menyentuh daerah vagina maupun perineum tangan harus dalam keadaan bersih, membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum, setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru dan jangan sekali-kali menaburi daerah perineum dengan bubuk bedak atau bahan lainnya karena itu dapat menyebabkan risiko infeksi

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

13. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi yakni terdapat warna kemerahan daerah luka episiotomi, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas daerah genitalia, mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari luka episiotomi hingga jalan lahir, dan suhu tubuh melebihi $37,5^{\circ}\text{C}$.

Hasil: ibu mengenali tanda-tanda infeksi dan akan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah luka episiotominya.

14. Menjelaskan kepada ibu tehnik menyusui yang baik dan benar yaitu mencuci tangan yang bersih dengan sabun, perah sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting, kemudian memilih posisi duduk atau berbaring.
- a. Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi menyanggah seluruh tubuh bayi, kepala dan tubuh bayi lurus menghadap ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu ibu.
 - b. Segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa, sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu.
 - c. Meletakkan mulut bayi dengan benar yaitu dagu menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, dan bibir bawah bayi membuka lebar.

Hasil: ibu mengerti dan sedang melakukannya

15. Menganjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan dengan batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

16. Menganjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik yang telah diberikan.

a. Asam Mafenamat : 6 tablet dosis 3 kali sehari

Sebagai obat analgetik dan antiinflamasi.

b. Cefadroxil : 6 tablet dosis 2 kali sehari

Sebagai antibiotik dengan spectrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif

c. Fero Sulfat : 3 tablet dosis 1 kali sehari

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obatnya sampai habis.

LANGKAH VII: EVALUASI

Tanggal 16 juni 2017 pukul 13.30 wita

1. Masa nifas berlangsung normal ditandai dengan;

a. Masa nifas hari pertama

b. Keadaan umum ibu baik

c. Ibu dapat beristirahat dengan tenang

d. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80 kali/menit teratur

Suhu : 36,6°C aksilar

Pernapasan : 23 kali/menit saat istirahat

- e. TFU 1 jari bawah pusat
 - f. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
 - g. Pengeluaran lochia rubra dan tidak berbau
 - h. Ibu menyusui bayinya
 - i. Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang bergizi serta menjaga personal hygiene.
2. Nyeri luka episiotomi belum berkurang ditandai dengan;
- a. Ibu masih sedikit meringis ketika bergerak
 - b. Ibu masih mengeluh nyeri luka episiotomi
 - c. Nyeri tekan pada perineum
3. Potensial terjadi infeksi ditandai dengan;
- a. Luka jahitan masih lembab
 - b. Ada pengeluaran lochia
 - c. Nyeri tekan pada perineum.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS
PADA NY “M” DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RSUD SYECH YUSUF GOWA
TANGGAL 16 JUNI 2017**

No. Register : 47.4x.xx
Tanggal partus : 16 Juni 2017, Pukul 10.15 wita
Tanggal masuk : 16 Juni 2017, Pukul 12.52 wita
Tanggal pengkajian : 16 Juni 2017, Pukul 13.00 wita

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny. M / Tn. A
Umur : 19 tahun / 19 tahun
Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Tombolo, Kec. Barombong Kab. Gowa

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitan bekas pengguntingan pada jalan lahir setelah melahirkan tanggal 16 juni 2017 pukul 10.15 wita.

2. Sifat nyeri dirasakan lebih terasa jika terlalu banyak bergerak
3. Usaha ibu untuk mengatasinya yaitu ibu berbaring dan bergerak lebih hati-hati
4. Ibu mengatakan mendapatkan beberapa jahitan
5. Ibu mengatakan ada pengeluaran darah dari jalan lahir
6. Ibu mengatakan masih merasa lemas
7. Ibu senang dengan kelahiran bayinya.
8. Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan asma
9. Tidak ada riwayat penyakit menular, menular dan menahun dalam keluarga
10. Ibu belum pernah menjadi akseptor KB

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi ibu tampak meringis bila bergerak
4. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 85 kali/menit teratur

Suhu : 36,6 °C aksilar

Pernapasan : 24 kali/menit saat istirahat

5. Pemeriksaan fisik *Head to Toe*

- a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tampak meringis

Palpasi : Tidak *pitting* oedem

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

c. Hidung

Inspeksi : tidak ada pernapasan cuping hidung dan polip

Palpasi : tidak ada nyeri tekan

d. Mulut

Inspeksi : bibir tidak pucat dan tidak pecah-pecah atau kering, keadaan mulut bersih, gigi tidak caries

e. Telinga

Inspeksi : tidak ada kelainan dan tidak ada serumen

Palpasi : tidak ada nyeri tekan

f. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, dan vena jugularis

g. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu sedikit menonjol, tampak hiperpigmentasi pada aerola, ada pembesaran, tidak ada peradangan

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, bila ditekan daerah aerola terdapat pengeluaran kolostrum

h. Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : ada sedikit nyeri tekan, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras

i. Vulva dan perineum

Inspeksi : tidak varices, tampak pengeluaran lochia rubra, terdapat luka jahitan episiotomi secara mediolateral, luka jahitan masih lembab.

Palpasi : pada luka jahitan terdapat nyeri tekan, tidak ada *pitting* oedem

Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka

j. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varices

Palpasi : tidak ada *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari pertama dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 16 juni 2017 pukul 13.15 wita

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik
Hasil: ibu mengerti dan telah mengetahui kondisinya saat ini
2. Mengobservasi Tinggi Fundus Uteri (TFU), kontraksi uterus, pengeluaran lochia

Hasil: TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, dan tampak pengeluaran lochia rubra, tidak berbau

3. Menjelaskan penyebab nyeri luka jahitan episiotomi yang dirasakan ibu disebabkan oleh adanya pemisahan jaringan atau otot-otot perineum dari akibat tindakan episiotomi.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan beradaptasi dengan keadaan tersebut

4. Mengajarkan ibu mobilisasi dini secara bertahap

Hasil: ibu telah dapat miring kanan dan kiri serta mulai duduk secara perlahan-lahan.

5. Melakukan perawatan luka episiotomi

- a. Mencuci tangan
- b. Mengajarkan ibu berbaring
- c. Membuka pakaian bawah ibu
- d. Menggunakan handscoon
- e. Melihat keadaan luka episiotomi
- f. Membersihkan dengan betadin
- g. Mengompres bekas luka jahitan episiotomi dengan kassa betadin
- h. Memasang pembalut, celana dalam dan pakaian bawah ibu
- i. Membereskan alat
- j. Melepas handscoon
- k. Mencuci tangan

Hasil: telah dilakukan perawatan luka episiotomi

6. Membantu ibu mengganti pembalut/popok

Hasil: Popok ibu telah diganti

7. Memberikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup \pm 8 jam di malam hari dan \pm 2 jam di siang hari

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Menjelaskan kepada ibu akibat kurang istirahat dapat mengakibatkan kurangnya produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menjelaskan kepada ibu manfaat dari ASI eksklusif yakni mengandung kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung zat pelindung, perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat, manfaat bagi ibu dapat mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan member ASI kepada bayinya secara eksklusif

10. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Selain itu dengan pemenuhan nutrisi bergizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

11. Mengajarkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum, dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi dan mengganti pembalut ialah 3 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

12. Mengajarkan kepada ibu cara perawatan luka episiotomi yang pertama sebelum menyentuh daerah vagina maupun perineum tangan harus dalam keadaan bersih, membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum, setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru dan jangan sekali-kali menaburi daerah perineum dengan bubuk bedak atau bahan lainnya karena itu dapat menyebabkan risiko infeksi

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

13. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi yakni terdapat warna kemerahan daerah luka episiotomi, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas daerah genitalia, mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari luka episiotomi hingga jalan lahir, dan suhu tubuh melebihi $37,5^{\circ}\text{C}$.

Hasil: ibu mengenali tanda-tanda infeksi dan akan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah luka episiotominya.

14. Menjelaskan kepada ibu tehnik menyusui yang baik dan benar yaitu mencuci tangan yang bersih dengan sabun, perah sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting, kemudian memilih posisi duduk atau berbaring.

- a. Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi menyanggah seluruh tubuh bayi, kepala dan tubuh bayi lurus menghadap ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu ibu.
- b. Segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa, sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu.
- c. Meletakkan mulut bayi dengan benar yaitu dagu menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, dan bibir bawah bayi membuka lebar.

Hasil: ibu mengerti dan sedang melakukannya

15. Menganjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan dengan batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

16. Menganjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik yang telah diberikan.
 - a. Asam Mafenamat : 6 tablet dosis 3 kali sehari
Sebagai obat analgetik dan antiinflamasi.
 - b. Cefadroxil : 6 tablet dosis 2 kali sehari
Sebagai antibiotik dengan spectrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif
 - c. Fero Sulfat : 3 tablet dosis 1 kali sehari
Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke

otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Hasil: ibu bersedia mengkonsumsi obatnya sampai habis.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS
PADA NY “M” DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, TOMBOLO TOMBOLO
TANGGAL 19 JUNI 2017**

Tanggal kunjungan : 19 Juni 2017, Pukul 14.15 wita

Tanggal pengkajian : 19 Juni 2017, Pukul 14.20 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Tombolo

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengeluh masih merasakan nyeri pada daerah luka jahitan
2. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran darah dari jalan lahir
3. Ibu telah dapat beranjak dari tempat tidur tanpa dibantu
4. Ibu belum dapat beraktivitas seaktif biasanya
5. Ibu telah mengganti pembalutnya dengan rutin dan pada saat kunjungan
6. Ibu telah menyusui bayinya dan pengeluaran ASI lancar
7. Ibu telah BAB 2 kali setelah melahirkan yaitu pada tanggal 17 juni 2017 dan pagi ini dengan konsistensi feses lunak, berwarna kuning, dan tidak bercampur darah.

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari ketiga
2. Keadaan umum ibu baik

3. Kesadaran composmentis
4. Ekspresi ibu sedikit meringis bila terlalu banyak bergerak
5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80 kali/menit, teratur

Suhu : 36,6°C, aksilar

Pernapasan : 22 kali/menit, saat istirahat

6. Berat badan sewaktu hamil : 58 kg
7. Berat badan sekarang : 53 kg
8. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat

Palpasi : tidak ada *pitting* oedem

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus

c. Payudara

Inspeksi : tampak pembesaran, tidak ada peradangan, puting susu mulai menonjol

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, bila dilakukan penekanan pada aerola ada pengeluaran ASI

d. Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, TFU 3 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras

e. Vulva dan perineum

Inspeksi : tidak ada varices, terdapat pengeluaran lochia rubra, terdapat luka jahitan episiotomi secara mediolateral, luka jahitan tampak masih sedikit lembab

Palpasi : terdapat nyeri tekan, tidak *pitting* oedem

Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka

f. Ekstremitas

Inspeksi : tidak varices

Palpasi : tidak ada *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari ketiga dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 19 Juni 2017 pukul 14.30 wita

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik
Hasil: ibu mengerti dan telah mengetahui kondisinya saat ini
2. Mengobservasi kontreaksi uterus sebagai upaya pencegahan perdarahan postpartum
Hasil: kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras.

3. Menjelaskan kepada ibu penyebab masih keluarnya darah dari jalan lahir yaitu disebabkan oleh terjadinya involusi uteri atau proses pengecilan uterus kembali seperti keadaan sebelum hamil, dan pengeluaran darah yang keluar tidaklah banyak dan masih berwarna merah.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah tidak merasa khawatir.

4. Menganjurkan ibu tetap melakukan aktivitas secara bertahap dan menghindari pekerjaan yang terlalu berat, karena dengan mobilisasi dini dapat membantu proses penyembuhan luka serta pencegahan infeksi pada luka episiotomi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia beraktivitas secara bertahap

5. Menganjurkan ibu saat membersihkan daerah genitalianya dengan membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum, setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu mengganti pembalutnya sekali dalam \pm 4 jam atau jika ibu merasa pembalut telah penuh bahkan jika ibu merasa sudah tidak nyaman

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Menganjurkan kepada ibu bila membasuh daerah genitalia cukup menggunakan air biasa yang bersih, jangan pernah menaburinya dengan bedak atau ramuan-ramuan

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Memberikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup yaitu \pm 8 jam di malam hari dan \pm 2 jam di siang hari untuk masa pemulihan tenaga ibu setelah melahirkan

Hasil: ibu bersedia melakukannya

9. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Selain itu dengan pemenuhan nutrisi bergizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat agar saat buang air besar ibu tidak kesulitan atau terjadi konstipasi.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Menganjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan hubungan suami istri selama 6 minggu atau 40 hari karena batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi yakni terdapat warna kemerahan daerah luka episiotomi, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas daerah genitalia, bahkan mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari luka episiotomi hingga jalan lahir, bahkan suhu tubuh melebihi $37,5^{\circ}\text{C}$.

Hasil: ibu mengenali tanda-tanda infeksi dan akan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah luka episiotominya.

12. Menganjurkan kepada ibu untuk segera ke pelayanan kesehatan segera mungkin bila merasa ada tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi atau bila memiliki keluhan lainnya

Hasil: ibu bersedia melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS
PADA NY “M” DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, TOMBOLO TOMBOLO
TANGGAL 23 JUNI 2017**

Tanggal kunjungan : 23 Juni 2017, Pukul 14.00 wita

Tanggal pengkajian : 23 Juni 2017, Pukul 14.05 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Tombolo

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri pada luka episiotomi
2. Ibu mengatakan masih ada darah yang keluar dari jalan lahir tetapi sudah tidak sangat merah
3. Ibu telah beraktivitas seperti biasanya
4. Ibu sudah memberikan ASI pada bayinya dan ASI ibu lancar
5. Ibu mengatakan sulit tidur di malam hari

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari ketujuh
2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis
4. Ekpresi wajah ibu tampak ceria
5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg
Nadi : 78 kali/menit, teratur
Suhu : 36,5°C, aksilar
Pernapasan : 24 kali/menit, saat istirahat

6. Berat badan yang lalu : 53 kg

7. Berat badan sekarang : 55 kg

8. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat

Palpasi : tidak *pitting* oedem

b. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah mudah, skleras tidak ikterus

c. Payudara

Inspeksi : tampak pembesaran, tidak ada peradangan, puting susu menonjol

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, bila dilakukan penekanan pada aerola ada pengeluaran ASI lancar

d. Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, TFU pertengahan simfisis-pusat

e. Vulva dan perineum

Inspeksi : tidak ada varices, terdapat pengeluaran lochia sanguilenta, jahitan luka episiotomi tampak kering,

Palpasi : pada luka jahitan tidak ada nyeri tekan dan *pitting* oedem

Pada luka jahitan tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah luka.

f. Ekstremitas

Inspeksi : tidak varices

Palpasi : tidak *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari ketujuh dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 22 juni 2017 pukul 14.15 wita

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik
Hasil: ibu mengerti dan telah mengetahui kondisinya saat ini
2. Menjelaskan kepada ibu penyebab masih keluarnya darah dari jalan lahir yaitu disebabkan oleh terjadinya involusi uteri atau proses pengecilan uterus kembali seperti keadaan sebelum hamil dan pada hari ke 4-7 darah yang keluar sudah tidak merah tetapi kemerah muda atau kecoklatan.
Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah tidak merasa khawatir.
3. Memberikan pendidikan kesehatan istirahat yang cukup \pm 8 jam di malam hari dan \pm 2 jam di siang hari dan bila ibu menyusui bayinya saat berbaring ibu dapat pula memejamkan mata untuk beristirahat, jangan makan makanan berat kurang dari tiga jam sebelum pergi tidur, hindari kopi, the, minum segelas susu

hangat setengah jam sebelum tidur, dan berhenti bekerja setidaknya sejam sebelum waktu tidur dan baca buku atau mendengar music menenangkan atau bahkan ayat suci Al-Qur'an.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menjelaskan kepada ibu akibat kurang istirahat dapat mengakibatkan kurangnya produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Mengajukan kepada ibu tetap memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin

Hasil: ibu bersedia melakukannya

6. Mengajukan kepada ibu tetap mempertahankan makan makanan yang bergizi seimbang.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Mengajukan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum meski ibu merasa bahwa bekas jahitan sudah mulai kering, dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi dan mengganti pembalut atau pakaian dalam 3- 4 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman sebagai upaya pencegahan infeksi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Mengajukan kepada ibu untuk tetap membersihkan daerah genitalianya dengan membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa

kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum, setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru atau pakaian dalam ibu.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi yakni terdapat warna kemerahan daerah luka episiotomi, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas daerah genitalia, bahkan mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari luka episiotomi hingga jalan lahir, bahkan suhu tubuh melebihi 37,5°C.

Hasil: ibu mengenali tanda-tanda infeksi dan akan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah luka episiotominya.

10. Memberikan konseling kontrasepsi secara dini kepada ibu dengan KB yang tidak mengganggu ASI
 - a. Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. MAL merupakan kontrasepsi bila menyusui secara penuh, belum haid setelah melahirkan dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Keuntungan efektivitas tinggi, segera efektif, tidak mengganggu senggama, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu biaya.
 - b. Pil progestin (Mini Pil) bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma, mengganggu motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Keuntungan; tidak mengganggu senggama, efektif bila digunakan secara benar, kesuburan segera kembali, dapat dihentikan setiap saat, tidak mempengaruhi ASI. Kerugian; harus

- digunakan setiap hari pada waktu yang sama bila lupa 1 maka kegagalan menjadi lebih besar, mual, pusing timbul jerawat
- c. Suntik 3 bulan bekerja dengan mencegah terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menghambat transportasi gamet oleh tuba, membuat selaput lendir rahim tipis. Keuntungan; mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, tidak berpengaruh pada senggama, membantu mencegah Ca endometrium dan kehamilan ektopik. Kerugian; pasien sangat bergantung pada pelayanan kesehatan, kesuburan terlambat kembali karena belum habisnya pelepasan obat suntikan dari depo), kering pada vagina, libido menurun, sakit kepala, timbul jerawat.
- d. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) bekerja dengan cara mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi, lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Keuntungan; daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, pengembalian kesuburan dengan cepat setelah pencabutan, tidak mengganggu senggama, tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Kerugian; nyeri kepala, perasaan mual, kepala pusing, membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan, perubahan pola haid.
- e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) menghambat kemampuan sperma masuk ke tuba fallopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan; efektivitas tinggi, dapat efektif setelah pemasangan, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume

ASI, tidak ada efek samping hormonal. Kerugian; perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, saat haid terasa lebih nyeri, AKDR dapat keluar dengan sendirinya, tidak mencegah kehamilan ektopik, akseptor harus memeriksa posisi benang AKDR.

Hasil: ibu mengerti jenis kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan ingin berdiskusi dahulu dengan suaminya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS
PADA NY “M” DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, TOMBOLO TOMBOLO
TANGGAL 30 JUNI 2017**

Tanggal kunjungan : 30 Juni 2017, Pukul 15.30 wita

Tanggal pengkajian : 30 Juni 2017, Pukul 15.35 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Tombolo

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengeluh nyeri pada vagina
2. Nyeri dirasakan dengan tingkat nyeri ringan yaitu tidak mengganggu aktivitas ibu dan ibu masih dapat tidur nyaman di siang maupun malam hari
3. Nyeri dirasakan sejak 3 hari lalu setelah melakukan hubungan dengan suami
4. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan berwarna kekuning-kuningan
5. Ibu mengatakan ASI nya lancar dan memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin
6. Ibu mengatakan telah dapat tidur dengan nyenyak di malam hari

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari keempat belas
2. Keadaan umum ibu baik

3. Kesadaran composmentis

4. Ekspresi wajah ibu tampak lesu

5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80 kali/menit, teratur

Suhu : 36,7°C, aksilar

Pernapasan : 23 kali/menit, saat istirahat

6. Berat badan yang lalu : 55 kg

7. Berat badan sekarang : 56 kg

8. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Mata : konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus

b. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid, tidak ada nyeri tekan, TFU sudah tidak teraba diatas simfisis.

c. Vulva dan perineum : tidak ada kelainan, tidak ada varices, terdapat jaringan baru pada vulva dan terdapat pengeluaran lochia serosa. Jahitan luka episiotomi telah kering dan pada luka jahitan terdapat nyeri tekan dengan tingkat nyeri ringan yaitu ibu hanya mengerutkan alis ketika dilakukan penekanan pada daerah vulva. Tidak ada *pitting* oedem, tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu tubuh sekitarnya, serta tidak ada bau busuk dari daerah luka.

d. Ekstremitas : tidak varices dan tidak *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari keempat belas dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 30 juni 2017 pukul 15.45 wita

1. Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan atau tanda bahaya dan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal

Hasil: ibu mengerti dan tidak cemas lagi

2. Menjelaskan kepada ibu bahwa cairan yang keluar dari jalan lahir merupakan cairan normal yang berwarna kekuningan di masa nifas hari keempat belas

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Menjelaskan kepada ibu bahwa nyeri yang dirasakan karena cairan pelumas yang minim akan berakibat gesekan penis dan dinding vagina tidak terjadi dengan lembut, akibatnya akan terasa nyeri serta dapat sebagai pengantar terjadinya infeksi akibat dari masuknya kuman-kuman dan minimnya pelumas atau lendir vagina diakibatkan karena ibu masih merasa khawatir dengan bekas jahitannya serta adanya jaringan parut yang muncul, karena dalam berhubungan keadaan psikis haruslah tenang dan merasa nyaman.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk menghindari stress dengan cara beristirahat yang cukup, tidak terlalu memikirkan banyak hal, karena jika ibu dalam keadaan

stress maka proses semua perubahan atau pemulihan dalam diri ibu setelah melahirkan akan terganggu terutamanya dalam produksi ASI

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Menganjurkan kepada ibu tetap menjaga pola istirahat yang cukup

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga pola makan gizi seimbang

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Menganjurkan kepada ibu tetap menjaga personal hygienenya, terutama saat ini dengan nyeri yang dirasakan ibu

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Menganjurkan kepada ibu untuk tidak bekerja berat hingga nyeri yang dirasakan ibu berkurang

Hasil: ibu bersedia melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk tidak memakai pakaian dalam yang sangat ketat atau celana jeans yang dapat membuat gesekan terhadap daerah genitalia ibu

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Menganjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan bahkan hingga 2 tahun

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

11. Menganjurkan ibu segera ke pelayanan kesehatan bila nyeri yang dirasakan tidak berkurang bahkan jika semakin nyeri

Hasil: ibu mengerti dan bersedia segera ke pelayanan kesehatan

12. Menganjurkan ibu memperhatikan imunisasi bayinya

Hasil: ibu bersedia melakukannya dan ingin memenuhi imunisasi bayinya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS
PADA NY “M” DENGAN LUKA EPISIOTOMI
DI RUMAH PASIEN, TOMBOLO TOMBOLO
TANGGAL 7 JULI 2017**

Tanggal kunjungan : 7 Juli 2017, Pukul 15.05 wita

Tanggal pengkajian : 7 Juli 2017, Pukul 15.10 wita

Tempat pengkajian : Rumah pasien, Tombolo

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri pada vaginanya
2. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan dari jalan lahir tetapi tidak banyak dan seperti keputihan normal
3. Ibu mengatakan belum menggunakan KB, ibu ingin menggunakan KB pada saat telah haid pertama setelah melahirkan
4. Ibu mengatakan ASI semakin lancar dan bayinya menyusui dengan kuat

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari kedua puluh satu
2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis
4. Ekpresi wajah ibu sangat senang
5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

- Nadi : 80 kali/menit, teratur
- Suhu : 36,5°C, aksilar
- Pernapasan : 22 kali/menit, saat istirahat
6. Berat badan yang lalu : 56 kg
7. Berat badan sekarang : 55 kg
8. Pemeriksaan fisik terfokus
- Mata : konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus
 - Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae livid, tidak ada nyeri tekan, TFU sudah tidak teraba diatas simfisis.
 - Vulva dan perineum : tidak dilakukan pemeriksaan pada vulva dan perineum karena ibu menolak. Tujuan dari pemeriksaan telah dijelaskan tetapi ibu tetap menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Ekstremitas : tidak varices dan tidak *pitting* oedem

ASSESSMENT

Masa nifas hari kedua puluh satu dengan luka episiotomi

PLANNING

Tanggal 7 juli 2017 pukul 15.20 wita

- Menjelaskan kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang disampaikan dan ibu sangat senang

2. Menganjurkan kepada ibu tetap memperhatikan personal hygiene bahkan jika masa nifas ibu telah usai
Hasil: ibu bersedia melakukannya
3. Menganjurkan kepada ibu tetap menjaga pola nutrisi dan istirahat
Hasil: ibu bersedia melakukannya
4. Menganjurkan kepada ibu tetap memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif dan memperhatikan imunisasi bayinya
Hasil: ibu bersedia melakukannya
5. Menganjurkan kepada ibu segera ke pelayanan kesehatan bila memiliki keluhan
Hasil: ibu bersedia melakukannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pelaksanaan asuhan pada Ny “M” masa nifas dengan pasca episiotomi yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 1 hari pada tanggal 16 Juni 2017 dan dilakukannya kunjungan rumah sebanyak 4 kali mulai tanggal 19 Juni sampai 7 Juli 2017.

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah Varney (2003).

A. LANGKAH I: PENGUMPULAN DATA DASAR

Pengumpulan data dasar adalah menghimpun informasi tentang klien. Data yang dikumpulkan adalah data yang tepat yaitu data yang relevan dengan situasi yang sedang ditinjau atau data yang memiliki berhubungan dengan situasi yang ditinjau. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu: observasi, wawancara, pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi napas), penciuman (bau nafas, bau luka) serta perabaan (suhu badan, nadi) (Asri dan Clervo, 2012:26-27).

Pada tahap pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena pada saat pengumpulan data pada Ny “M” maupun keluarga serta bidan dan dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Pengkajian data dasar pada kasus ibu nifas dengan luka episiotomi dilakukan pertama kali pada saat ibu masuk keruangan nifas. Pengkajian meliputi anamnesis langsung diperoleh dari ibu sendiri. Pengkajian ini berupa identitas ibu, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat keluarga berencana, riwayat psikososial, spiritual dan ekonomi serta pola pemenuhan dasar. Pengkajian data objektif diperoleh melalui pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik.

Berdasarkan studi kasus pada Ny "M" dengan luka episiotomi hari pertama masa nifas ditemukan data ibu diepisiotomi karena partus kala II lama dimana ibu telah dipimpin mendedan yang baik dan benar selama tiga jam di Klinik Rahmawati tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala. Setelah kala II berakhir dilakukan manajemen aktif kala III, setelah plasenta lahir utuh dan lengkap, dilakukan penjahitan luka episiotomi secara mediolateral dengan anastesi. Tidak dilakukan pengikatan pembuluh darah karena tidak ada perdarahan aktif, penjahitan menggunakan benang *plain catgut* ukuran 2/0. Penjahitan pada mukosa vagina menggunakan teknik jelujur, sementara pada perineum menggunakan teknik satu-satu dengan jumlah jahitan sebanyak 4 dengan jarak setiap jahitan adalah 1 cm dan jarak antara jahitan terakhir dengan pangkal luka adalah 0,5 cm. Penjahitan dilakukan oleh bidan.

Pada tinjauan pustaka dikatakan bahwa luka episiotomi adalah pengguntingan berupa sayatan kecil pada perineum yang dilakukan pada saat proses persalinan berlangsung. Episiotomi dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pembukaan vagina sehingga bayi dapat keluar lebih mudah tujuan tindakan episiotomi ialah

memperlebar jalan lahir, mempercepat persalinan kala II lama yang berlangsung lebih dari 2 jam pada primi, yang ditandai dengan tanda dan gejala klinis pembukaan serviks lengkap, ibu mengedan tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala (Asri dan Clervo, 2012:86).

Tindakan episiotomi tidaklah boleh dilakukan secara rutin karena dapat meningkatkan ruptur menjadi tingkat III atau IV, meningkatnya jumlah darah yang hilang, risiko infeksi serta nyeri dengan luka persalinan. Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan episiotomi membutuhkan pertimbangan klinis dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang memperbolehkan dalam melakukan prosedur episiotomi. Berdasarkan ruang lingkup 24 standar kebidanan, penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi terdapat pada standar 12 (Purwoastuti dan Walyani, 2014: 152).

Pada kasus Ny “M” dilakukan tindakan episiotomi secara mediolateral, dengan pertimbangan untuk menghindari resiko ruput bertambah menjadi ruptur tingkat III. Seperti yang dikatakan teori bahwa insisi episiotomi secara mediolateral digunakan secara luas pada obstetri operatif dikarenakan aman. Melakukan insisi ke bawah dan ke luar, ke arah batas *lateral sfingter ani* dan paling sedikit separuh jarak ke dalam vagina. Namun, insisi ini dapat menimbulkan banyak perdarahan dan dapat tetap akan terasa nyeri meskipun setelah nifas. Selain menimbulkan rasa nyeri saat masa nifas, episiotomi secara mediolateral juga memberi manfaat bagi ibu, yaitu ketika ibu BAB ibu tidak takut akan jahitannya dapat terlepas sewaktu-waktu jika ibu mengejan, dan ibu tetap dapat menjaga kebersihan anusnya setelah BAB karena jahitan bekas episiotomi secara mediolateral tidak mendekati anus (Benson dan Pernoll, 2013:176).

Pada saat dilakukan tindakan episiotomi pada kasus Ny “M” dilakukannya anastesi local terlebih dahulu, serta pada saat akan dilakukan penjahitan luka episiotomi ibu kembali di berikan anastesi local. Seperti teori mengatakan bahwa sebelum dilakukannya tindakan episiotomi, pasien perlu diberikan anetesi lokal, yaitu dengan lidokain 1% tanpa epineprin, jika tidak tersedia gunakan lidokain 2% yang dilarutkan dengan air steril dengan perbandingan 1:1 yang digunakan untuk menginfiltrasi jaringan dan mengeblok saraf sensorik. Episiotomi adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit, dengan anastesi lokal merupakan bagian dari asuhan sayang ibu. (Tando, 2013: 125).

Dengan demikian penjelasan pada tinjauan teori penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan.

B. LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Langkah awal dari perumusan masalah/diagnosa kebidanan adalah pengolahan/analisa data yaitu menggabungkan dan menghubungkan data satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta (Asri dan Clervo, 2012:27-28).

Hasil pengkajian pada kasus Ny “M” didapatkan data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosa nyeri luka jahitan dengan luka episiotomi. Pasien mengeluhkan merasakan nyeri pada jahitan bekas pengguntingan pada jalan lahir pada saat setelah melahirkan. Persalinan Ibu adalah persalinan anak pertamanya, dari hasil pemeriksaan vulva dan perineum didapatkan jahitan bekas luka episiotomi secara mediolateral.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa nyeri pada luka episiotomi disebabkan karena terputusnya jaringan atau otot-otot perineum akibat tindakan episiotomi maka aliran darah pada jaringan tersebut terhambat dan mengantarkan respon nyeri ke hypothalamus dan presepikan ke saraf parifer dan menimbulkan nyeri (Pudiastuti, 2012:1). Oleh karena itu, sangat pertimbangkan untuk melakukan tindakan episiotomi harus mengacu pada penilaian klinik yang tepat dan tehnik yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi, dengan demikian tidak lagi dianjurkan untuk melakukan tindakan episiotomi secara rutin.

Prinsip tindakan episiotomi ialah pencegahan kerusakan yang lebih hebat pada jaringan lunak yang diakibatkan daya regang yang melebihi kapasitas adaptasi atau keelastisitasan jaringan tersebut, serta tindakan ini bertujuan untuk mencegah trauma pada kepala janin, mencegah kerusakan pada *sfincter ani* (Pudiastuti, 2012:1).

Selain nyeri luka episiotomi yang dirasakan ibu nifas dengan luka episiotomi ada beberapa yang menjadi perhatian bidan yaitu memperhatikan keadaan luka episiotomi tersebut. Pada kasus Ny "M" pada pemeriksaan luka episiotomi didapatkan hasil keadaan luka tersebut masih lembab, jahitan masih dalam keadaan basah, kondisi luka tidak menunjukkan adanya oedem dan tidak adanya tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi seperti adanya pus/nanah, bau busuk dan suhu sekitar luka lebih tinggi dari pada suhu tubuh ibu.

Selain menimbulkan rasa nyeri saat masa nifas, episiotomi secara mediolateral juga memberi manfaat bagi ibu, yaitu ketika ibu BAB ibu tidak takut akan jahitannya dapat terlepas sewaktu-waktu jika ibu mengejan, dan ibu tetap dapat menjaga kebersihan anusnya setelah BAB karena jahitan bekas episiotomi secara mediolateral

tidak mendekati anus. Episiotomi mediolateral dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa perluasan laserasi akan lebih kecil kemungkinannya mengenai sfingter ani.

(Benson dan Pernoll, 2013:176).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Zangana (2016) bahwa episiotomi dikaitkan dengan meningkatnya kehilangan darah pada saat persalinan, pembentukan hematoma, infeksi, dan jarang abses dan pembentukan fistula recto-vaginal. Episiotomi garis tengah dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi kerusakan sfingter anus dan rektum bila dibandingkan dengan episiotomi mediolateral.

Proses penyembuhan luka terdapat tiga fase, yaitu fase inflamasi selama 24 jam pertama-48 jam, fase proliferasi (48 jam-5 hari, dan fase maturasi (5 hari-berbulan-bulan). Pada fase inflamasi terjadi pengumapalan darah untuk menyatukan daerah yang terpisah akibat episiotomi (Majid dan Prayogi, 2013) sehingga pada hari pertama sampai 2 hari biasa pada luka episiotomi akan terjadi pembengkakan kecil.

Sedangkan pada fase proliferasi terjadi pertumbuhan jaringan baru melalui proses granulasi, kontraksi luka dan epitelialisasi. Pada fase ini pula akan terbentuk jaringan parut epitel fibrosa yang lebih kuat pada saat fibroblas dan serat kolagen mulai menyusut, menimbulkan kontraksi pada area tersebut (Primadona dan Susilowati, 2015:2-3). Pada fase maturasi tubuh berusaha menormalkan kembali semua yang menjadi abnormal karena proses penyembuhan. Kolagen menjadi lebih tersusun dan yang berlebih diserap dan sisanya mengerut sesuai dengan regangan yang ada, fibroblast berkurang dan kapiler darah telah normal kembali (Majid dan Prayogi, 2013).

Pada hari pertama sampai hari kedua masa nifas sangatlah rentan akan terjadinya infeksi, karena pada waktu inilah luka masih dalam keadaan lembab, dan

keadaan luka masih basah diakibatkan karena lochia yang keluar dari jalan lahir akan melewati luka tersebut. Infeksi nifas yaitu infeksi bakteri pada dan melalui traktus genitalia yang terjadi sesudah melahirkan, ditandai kenaikan suhu sampai 38°C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama (Fauziyah, 2012:163) oleh sebab itulah keadaan luka episiotomi sangatlah penting untuk diperhatikan hingga jahitan kering. Sebab, ibu nifas dengan luka episiotomi sangatlah rentan akan terjadinya infeksi pada luka tersebut yang ditandai dengan adanya pus/nanah, bau busuk dan suhu sekitar luka lebih tinggi dari pada suhu tubuh ibu.

Dengan demikian penerapan tinjauan teori pada studi kasus Ny “M” penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan.

C. LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Pada tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial, melakukan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien diharapkan dapat pula bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi (Asri dan Clervo, 2012:29-30).

Kebersihan vagina selama masa nifas harus dilakukan karena vagina merupakan daerah yang dekat dengan tempat buang air kecil dan tempat buang air besar yang tiap hari dilakukan, adanya luka di daerah perineum yang bila terkena kotoran dapat terinfeksi, dan vagina merupakan organ terbuka sehingga memudahkan kuman yang ada di daerah tersebut lebih mudah untuk menginfeksi.

Infeksi bisa terjadi karena ibu kurang disiplin melakukan perawatan pada lukanya. Ibu takut menyentuh luka yang ada di perineum sehingga memilih tidak

membersihkannya. Padahal, dalam keadaan luka, perineum rentan didatangi kuman dan bakteri sehingga mudah terinfeksi (Marmi, 2012:142-143).

Kondisi ibu pada kasus Ny “M” saat ini dengan nyeri luka episiotomi akibat rusaknya otot-otot perineum dari tindakan episiotomi, terdapat pengeluaran lochia pada jalan lahir, hal inilah yang dapat memicu terjadinya infeksi luka episiotomi. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa luka episiotomi merupakan rusaknya jaringan daerah perineum tersebut, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada masa nifas masih terdapat pengeluaran darah lochia dan kotoran yang keluar dari vagina. Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim (Marmi, 2012: 141).

Ibu yang melahirkan dengan mendapatkan luka episiotomi akan memiliki rasa takut untuk menyentuh luka jahitan, akibatnya ibu enggan untuk memberishkan vaginanya dengan baik dan benar, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan vagina bila ibu benar-benar takut untuk menyentuh luka jahitan yaitu dengan cara duduk berendam dalam cairan antiseptik selama 10 menit. Lakukan setelah BAK atau BAB. Terkadang yang terlupakan setelah vagina dibersihkan, pembalutnya tidak diganti. Bila seperti itu caranya maka akan percuma saja karena pembalut yang kotor dan tidak digantik makan akan menyebabkan vagina akan tetap lembab dan kotor (Marmi, 2012: 141).

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny “M” dapat diidentifikasi masalah potensial yaitu antisipasi terjadinya infeksi. Dengan demikian penerapan teori dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny “M” nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan.

D. LANGKAH IV: TINDAKAN EMERGENCY DAN KOLABORASI

Dilangkah ini bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Bahkan dapat pula memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan yang lain. Penolong mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Antisipasi pertama untuk mencegah terjadinya infeksi yang dilakukan pada ibu nifas dengan luka episiotomi yakni berkolaborasi dengan dokter, untuk meresepkan obat-obat yang sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu nifas dengan luka episiotomi dan antisipasi/bila terjadi infeksi, seperti analgetik, antiinflamasi, antibiotic (Asri dan Clervo, 2012:30).

Perbaikan dini terhadap luka episiotomi yang terbuka sangat diperlukan, berupa tindakan pencegahan yang dilakukan pada ibu nifas dengan dengan luka episiotomi yaitu salah satu terapi kombinasi antibiotik berspektrum luas diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi. Rasa nyeri diringankan dengan penggunaan preparat analgetik yang efektif (Fauziyah, 2012: 170).

Pada kasus Ny "M" antisipasi yang dilakukan yaitu pemberian analgetik, antibiotik dan multi vitamin dengan Fero Sulfat seperti: Asam Mafenamat 6 tablet dosis 3 kali sehari sebagai obat analgetik dan antiinflamasi. Cefadroxil 6 tablet dosis 2 kali sehari sebagai antibiotik dengan spectrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif. Fero Sulfat 3 tablet dosis 1 kali sehari, diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Laserasi vagina sering terjadi, khususnya setelah persalinan dengan tindakan yang menimbulkan trauma, salah satunya adalah episiotomi. Luka laserasi ini bisa mengalami infeksi. Infeksi pada luka episiotomi merupakan infeksi masa nifas yang paling sering ditemukan pada genetalia eksterna. Tepi luka tampak merah dan membengkak. Jahitan sering putus pada jaringan yang membengkak, sehingga luka yang mengalami purulen (nanah). Luka perineum menjadi nyeri, merah dan bengkak akhirnya luka terbuka dan mengeluarkan nanah. Perasaan nyeri dan panas timbul pada luka yang terinfeksi dan jika terjadi pernanahan dapat disertai dengan suhu yang tinggi dan menggigil. Dengan cara ini, terjadi kerusakan total pada tempat episiotomi tersebut (Fauziah, 2012: 168-169). Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan pada teori dan kasus yang didapatkan.

E. LANGKAH V: INTERVENSI

Pada langkah ini perencanaan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam suatu rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini di penolong dengan yang ditolong, karena meski penolong yang hanya menyetujuinya maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari yang ditolong (Asri dan Clervo, 2012:30-31).

Adapun sasaran dalam rencana asuhan pada kasus Ny “M” mengacu pada diagnosa pada kasus Ny “M” yaitu infeksi luka episiotomi serta untuk mencegah terjadinya masalah potensial yang bisa saja terjadi. Bila diagnosa nyeri luka episiotomi ditegakkan, rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu penyebab dari nyeri yang dirasakan oleh ibu. nyeri pada luka episiotomi disebabkan

karena terputusnya jaringan atau otot-otot perineum akibat tindakan episiotomi maka aliran darah pada jaringan tersebut terhambat dan mengantarkan respon nyeri ke hypothalamus dan presepikan ke saraf parifer dan menimbulkan nyeri (Pudiastuti, 2012:1).

Selain menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri yang dirasakannya, dilakukan pula observasi kontraksi uterus karena dengan mengobservasi kontraksi uterus yang baik merupakan salah satu upaya pencegahan perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri dan memperlambat proses involusi (Saleha, 2013: 131).

Pada saat ini kondisi ibu lemas setelah melahirkan, sehingga menyebabkan ibu untuk lebih memilih untuk beristirahat. Luka yang didapatkan ibu akibat dari tindakan episiotomi pada saat proses persalinan mengharuskan ibu merasakan nyeri, yang mengakibatkan ibu takut untuk melakukan gerakan dikarenakan nyeri akan sangat terasa bila ibu bergerak. Sehingga diberikan asuhan berupa mengajarkan kepada ibu melakukan mobilisasi dini secara bertahap.

Persalinan merupakan proses yang melelahkan, itu mengapa ibu disarankan tidak langsung turun ranjang setelah melahirkan karena dapat menyebabkan jatuh pingsan akibat sirkulasi darah yang belum berjalan baik. Ibu harus cukup beristirahat, dimana ibu harus tidur terlentang selama 8 jam post partum untuk mencegah perdarahan post partum. Setelah itu, mobilisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan akibat tersumbatnya pembuluh darah ibu. Ibu diminta untuk melakukan latihan menarik nafas yang dalam serta latihan tungkai yang sederhana, balik badan kekanan dan kekiri secara perlahan, duduk serta mengayunkan tungkai dari tepi ranjang. Setelah itu ibu bias pergi ke kamar mandi. Dengan begitu sirkulasi darah di dalam tubuh akan berjalan dengan baik.

Mobilisasi hendaknya dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan gerakan miring ke kanan dan ke kiri. Pada hari kedua ibu telah dapat duduk, lalu hari ketiganya ibu telah dapat menggerakkan kaki yakni dengan jalan-jalan. Kondisi tubuh akan cepat pulih jika ibu melakukan mobilisasi dengan benar dan tepat. System sirkulasi di dalam tubuh pun bias berfungsi normal kembali akibat mobilisasi. Bahkan penelitian menyebutkan *early ambulation* (gerakan sesegera mungkin) bisa mencegah aliran darah terhambat. Hambatan aliran darah bias menyebabkan terjadinya trombotis vena dalam atau *Deep Vein Thrombosis* (DVT) dan bisa menyebabkan infeksi (Marmi, 2012: 137-138).

Perawatan luka episiotomi dan mengajarkan kepada ibu tentang cara perawatan luka episiotomi. Melakukan perawatan luka episiotomi dapat mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Luka episiotomi merupakan rusaknya jaringan atau otot-otot perineum, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada dengan luka persalinan masih terdapat pengeluaran darah atau yang disebut *lochia* dan kotoran yang keluar dari vagina.

Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim. Siram vagina dan perineum hingga bersih dengan air biasa setiap kali habis BAB dan BAK. Air yang digunakan tak perlu matang asalkan bersih. Basuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum seperti air seni maupun *feses* yang mengandung kuman dan bisa menimbulkan infeksi pada luka jahitan.

Vagina boleh dicuci menggunakan sabun maupun cairan antiseptic karena dapat berfungsi sebagai penghilang kuman. Untuk menyentuh daerah vagina maupun perineum tangan harus dalam keadaan bersih. Setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru. Frekuensi mengganti pembalut ialah 3 jam sekali atau bila keadaan pembalut telah penuh atau dirasa tak nyaman. Ibu dianjurkan pula untuk menjaga kelembapan pakaian dalam dengan mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi. Jangan sekali-kali menaburi daerah perineum dengan bubuk bedak atau bahan lainnya karena itu dapat menyebabkan risiko infeksi (Marmi, 2012: 141-142).

Dikondisi Ny “M” saat setelah melalui proses persalinan dimana ibu mendapatkan tindakan episiotomi mengharuskan ibu merasakan nyeri akibat tindakan episiotomi tersebut yang dapat mengganggu istirahat/tidur ibu. Sehingga, perlu dijelaskan kepada ibu bahwa akibat kurang istirahat akan mengurangi produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri, memperlambat proses involusi uterus dan meningkatkan perdarahan (Marmi, 2012:145).

Selain anjuran kepada ibu untuk beristirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi jugalah penting. Pada masa nifas masalah diet perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Diet yang diberikan harus bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein dan banyak mengandung cairan (Saleha, 2013:71). Makan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif

terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013:131).

Pada kasus Ny “M” dengan luka episiotomi dapat mengarah atau terjadinya masalah potensial yaitu infeksi luka episitomi. Sehingga, anjuran kepada ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah perineum. Setelah melahirkan ibu masih harus menjalani proses yang tak kalah merepotkan dari masa kehamilan, yakni proses “pembersihan diri” alias masa nifas. Biasanya 40 hari. Tahapan-tahapan selama masa nifas ini, vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya darah tersebut mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati (nekrosis), serta sel-sel dinding rahim (endometrium), yang disebut lokia. Pada prinsipnya, urgensi kebersihan vagina maupun perineum dilandasi beberapa alasan yaitu banyak darah dan kotoran yang keluar dari vagina, vagina berada dekat saluran buang air kecil dan buang air besar yang tiap hari kita lakukan, adanya luka di daerah perineum yang bila terkena kotoran dapat terinfeksi, vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki oleh kuman sehingga dengan menjaga kebersihan daerah perineum ibu dan mencegahnya dari infeksi serta membantu mempercepat proses penyembuhan luka jahitan episiotomi (Marmi, 2012:139-140).

Infeksi pada luka episiotomi sangat tidak diharapkan oleh pihak petugas kesehatan terutamanya bagi ibu sendiri. Diharapkan dengan menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi diharapkan ibu dapat mengenali tanda dan gejala infeksi tersebut, sehingga ibu dapat mengambil tindakan segera yaitu kepelayanan kesehatan bila mengalami salah satu tanda infeksi.

Adapun tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi ialah pada luka jahitan terdapat pus/nanah, adanya bau busuk, suhu perineum lebih hangat dari suhu

sekitarnya. Bila hal tersebut sampai terjadi maka penderita akan mengalami suhu tubuh melebihi 37,5°C, menggigil pusing, mual, keputihan, keluar cairan nanah dari vagina, berbau sangat menyengat yang disertai rasa nyeri, dan terasa nyeri di perut dan perdarahan kembali banyak padahal sebelumnya sudah sedikit. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada jahitan luka episiotomi, diharapkan ibu dapat lebih memperhatikan serta mencegah sedini mungkin terjadinya infeksi (Marmi, 2012:142).

Ibu dianjurkan pula untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu dengan luka persalinan. Ibu yang baru melahirkan boleh melakukan hubungan seksual kembali setelah 6 minggu persalinan. Batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik. Meskipun hubungan telah dilakukan setelah 6 minggu adakalanya ibu tertentu mengeluh hubungan masih terasa sakit atau nyeri meskipun telah beberapa bulan proses persalinan. Gangguan seperti ini disebut *dyspareunia* atau rasa nyeri waktu senggama.

Pada kasus semacam ini ada kemungkinan yang bisa menjadi penyebab yaitu jaringan baru yang terbentuk karena proses penyembuhan luka guntingan jalan lahir masih sensitive dan faktor psikologis yaitu kecemasan yang berlebihan turut berperan. Hubungan seksual yang memuaskan memerlukan suasana hati yang tenang. Kecemasan akan menghambat proses perangsangan sehingga produksi cairan pelumas pada dinding vagina akan terhambat (Marmi, 2012:147).

Pada kasus Ny “M” bidan dan dokter melakukan kolaborasi dalam pemberian obat analgetik, antibiotik dan multi vitamin sebagai upaya untuk mencegah terjadinya infeksi. Agar kolaborasi bidan dan dokter terlaksana efektif, maka ibu dianjurkan

untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik serta zat besi yang telah diberikan. Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu dan obat antibiotik dapat menghambat mikroba atau jenis lain penyebab infeksi (Asri dan Clervo, 2012:30). Serta dengan pemberian zat besi pada ibu nifas karena di masa nifas kebutuhan Fe meningkat akibat kehilangan darah pada saat proses persalinan (Saleha, 2013:31-132).

Namun, apabila masalah potensial yaitu infeksi luka episiotomi terjadi maka harus direncanakan asuhan atau tindakan apa yang akan dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan pertama kali yaitu kolaborasi dengan dokter Sp.OG. Luka perineum yang terinfeksi, seperti halnya luka bedah yang terinfeksi, harus diatasi dengan pemasangan drainase. Jahitan harus dilepas dan luka yang terinfeksi itu dilepas. Kegagalan dalam tindakan ini bukan saja menyebabkan perluasan infeksi ke dalam jringan ikat paraservikal dan paravaginal, tetapi juga menyebabkan hasil akhir anatomi yang jelek.

Salah satu terapi kombinasi antibiotik berspektrum luas harus diberikan pada keadaan ini. Rasa nyeri diringankan dengan penggunaan preparat analgesic yang efektif dan bila terjadi retensi urin, pemasangan kateter harus dilakukan. Perbaikan dini terhadap luka episiotomi yang terbuka, dengan menekankan bahwa sebelum tindakan tersebut dikerjakan, infeksi harus diatasi terlebih dahulu (Fauziyah, 2012: 170).

Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan. Dimana rencana asuhan yang teori katakana memiliki kesamaan dengan kasus yang didapatkan.

F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan meningkatkan mutu asuhan (Asri dan Clervo, 2012:31).

Pada studi kasus Ny “M” dengan dengan luka episiotomi hari pertama masa nifas semua tindakan telah direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik oleh ibu serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang nifas RSUD Syech Yusuf Gowa.

Penjelasan telah disampaikan bahwa kondisi ibu saat ini baik, hasil didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus ibu baik teraba bundar dan keras, sehingga dapat mencegah terjadinya perdarahan postpartum yang diakibatkan dari atonia uteri.

Nyeri yang dirasakan ibu akibat dari tindakan episiotomi yang dilakukan pada saat proses persalinan karena adanya kerusakan otot-oto perineum. Ibu tak perlu khawatir karena dengan ibu menjaga dan merawat luka episiotomi tersebut luka ibu akan segera sembuh dan dengan mobilisasi dini secara perlahan ibu akan mampu

beradaptasi dengan nyeri yang dirasakannya dan akan membantu proses penyembuhan luka dengan cepat.

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan luka episiotomi yaitu melakukan perawatan luka episiotomi sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Pertama yang dilakukan adalah menjelaskan kepada ibu tujuan dari prosedur kerja, kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah, mengajurkan kepada ibu untuk berbaring lurus dan membuka pakaian bagian bawah ibu tanpa lupa untuk menutup sampiran. Setelah mencuci tangan 6 langkah dengan bersih, keringkan tangan dengan handuk yang bersih dan kering kemudian menggunakan handscoon steril dikedua tangan.

Tindakan selanjutnya yaitu melihat keadaan luka episiotomi untuk memastikan tidak ada kelainan atau tanda infeksi luka episiotomi. Tidak ditemukan kelainan ataupun tanda infeksi pada luka episiotomi ibu, sehingga tindakan dapat dilanjutkan yaitu membersihkan luka episiotomi dengan betadin dengan prinsip dari depan kebelakang. Kemudian, mengompres bekas luka jahitan episiotomi dengan kassa betadin. Setelah itu, lakukan pemasangan pembalut baru, pakaian dalam dan pakaian luar ibu. Membereskan alat, melepaskan handscoon dan yang terakhir mencuci tangan kembali dengan 6 langkah.

Setelah perawatan luka episiotomi dilakukan, dilanjutkan dengan menjelaskan kepada ibu tentang akibat kurang istirahat. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu bersedia mengatur pola istirahat yang cukup, seperti ibu memejamkan mata disaat ibu menyusui bayinya.

Pada saat di rumah sakit ibu makan dengan pola yang teratur dengan lauk pauk serta buah dan terkadang minum susu. Dan ibu ingin tetap menerapkan hal yang

sama ketika ibu telah pulang kerumah, ibu tetap ingin makan diwaktu yang tepat dan berusaha ingin memenuhi 4 sehat 5 sempurna.

Dari penjelsan yang diberikan kepada ibu mengenai tanda-tanda infeksi, ibu ingin berusaha dan disiplin dalam menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genitalianya. Ibu telah paham tentang cara merawat luka episiotomi sewaktu ibu telah pulang kerumahnya, mulai dari cara membasuh vagina yang baik dan benar, menjaga personal hygienenya yaitu mengganti pembalut kurang lebih 4 setiap 4 jam atau ketika pembalutnya penuh atau bahkan ketika ibu tidak nyaman lagi.

Setelah menjelaskan kepada ibu manfaat dari obat-obat yang diberikan kepadanya ibu sangat bersedia untuk menghabiskan obatnya. Ibu merasa ketakutan akan terjadinya infeksi pada luka episiotominya sehingga ibu benar-benar ingin menjaga kebersihan daerah genitalianya.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan telah mengarah pada kebutuhan pasien.

G. LANGKAH VII: EVALUASI

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya (Asri dan Clervo, 2012:31).

Pada kasus Ny "M" dengan luka episiotomi evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis,

tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU turun 1 cm perhari, pengeluaran lochia sesuai dengan masa involusi uteri, luka jahitan episiotomi telah kering dan tidak ada nyeri tekan serta tanda-tanda infeksi seperti pada luka jahitan dengan luka episiotomi tidak terdapat pus/nanah, suhu perineum kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya, tidak ada bau busuk dari daerah bekas luka.

Berdasarkan studi kasus ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi penulis menemukan hal yang menyimpang dari evaluasi kunjungan hari keempat belas, dimana ibu merasakan kembali nyeri pada vaginanya akibat telah melakukan hubungan dengan suami sebelum 40 hari masa nifas. Berdasarkan keluhan yang dirasakan ibu pada hari keempat belas, penulis memberikan asuhan tentang menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan oleh ibu serta asuhan terhadap nyeri sehingga dua hari setelah kunjungan penulis ibu telah tidak merasakan nyeri lagi.

Menurut Marmi (2012) bahwa batasaan masa setelah melahirkan selama 6 minggu atau 40 hari didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi biasanya telah sembuh dengan baik, sehingga pada masa sebelum 40 hari sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri untuk tidak melakukan hubungan seksual. Meskipun hubungan telah dilakukan setelah 6 minggu adakalanya ibu tertentu mengeluh hubungan masih terasa sakit atau nyeri meskipun telah beberapa bulan proses persalinan. Gangguan seperti ini disebut *dyspareunia* atau rasa nyeri waktu senggama. Pada kasus semacam ini ada kemungkinan yang bisa menjadi penyebab yaitu jaringan baru yang terbentuk karena proses penyembuhan luka guntingan jalan lahir masih sensitive dan faktor psikologis yaitu kecemasan yang berlebihan turut berperan.

Hubungan seksual yang memuaskan memerlukan suasana hati yang tenang. Kecemasan akan menghambat proses perangsangan sehingga produksi cairan pelumas pada dinding vagina akan terhambat. Cairan pelumas yang minim akan berakibat gesekan penis dan dinding vagina tidak terjadi dengan lembut, akibatnya akan terasa nyeri dan tidak jarang akan ada luka lecet baik pada dinding vagina maupun kulit penis suami. Kondisi inilah yang menyebabkan rasa sakit. Selain itu ada dua lagi penyebab yang mungkin menurunkan gairah seksual ibu nifas. Pertama penyebab langsung seperti luka pada persalinan. Kemudian penyebab tidak langsung seperti depresi atau kelelahan, sehingga ibu disarankan untuk mengurangi stress atau banyak pikiran. Tetapi pada kasus Ny “M” pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan lecet pada vagina ibu, melainkan kondisi vagina maupun jahitan luka episiotomi ibu baik-baik saja atau tidak ada tanda infeksi.

Islam pun mengajarkan hal yang sama tentang larangan hubungan intim saat istri dalam keadaan nifas/haid. Ketentuan yang berlaku untuk darah nifas sama dengan ketentuan yang berlaku pada darah haid karena Nabi menyebutkan haid dengan nifas pada saat bertanya kepada Aisyah yang sedang menangis pada waktu haji wada'. Ijma' para ulama juga menyebutkan hokum nifas sama dengan hokum haid. Nifas ialah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya atau sebelumnya (2 atau 3 hari) yang disertai dengan rasa sakit. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: “Darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas.” Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari. Dan maksudnya yaitu rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan nifas (Mallapiang, 2012:231).

Secara umum batas maksimal nifas adalah 40 hari dihitung dari proses melahirkan atau 2 atau 3 hari sebelum melahirkan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ummu Salamah sebagai berikut.

Artinya: “*Adalah wanita nifas pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam berdiam diri selama 40 hari*”(HR. Tirmidzi dan lainnya).

Hukum yang berlaku untuk wanita istihadhah adalah diharamkan bersetubuh bagi wanita nifas dengan suaminya, tetapi diperkenankan bersenang-senang dan bercumbu tanpa bersetubuh (Mallapiang, 2012:233).

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2;222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Terjemahannya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri” (Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya, 2012).

Sesaat setelah turunnya ayat ini. Nabi saw. menyampaikan maksud jawaban Ilahi dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat Islam, “Lakukanlah segala sesuatu (yang selama ini dibenarkan) kecuali hubungan seks” (HR.Muslim).

Haid/nifas mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. rasa sakit sering kali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antara pasangan, apalagi dengan darah yang selalu siap keluar. Itu adalah gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria, di samping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami. *Karena itu*—lanjut ayat di atas— *jauhilah istri pada waktu hai*, dalam arti tidak bersetubuh atau pada tempat haid itu keluar. Ini berarti boleh mendekati asal bukan pada tempat haid. Nabi mengizinkan untuk bercumbu pada bagian atas, tidak di bagian bawah (Tafsir Al-Mishbah, 2002:583)

Hubungan intim antara suami dan istri dapat dilakukan kapan saja, tetapi dengan syarat, *janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci*. Bila redaksi katanya seperti itu, *jangan dekati*, bukan *jangan lakukan*, karena nafsu seksual sering kali sulit dibendung. Namun, *mendekati* yang dimaksud di sini adalah mendekati tempat di mana dapat terjadi hubungan intim yang berbuah.

Ada dua bacaan yang diperkenalkan dalam ayat ini, *yathhurna* yang berarti suci yakni berhenti haidnya atau masa nifasnya dan *yatathahharna* yang berarti *amat suci* yakni mandi setelah haidnya berhenti atau masa nifasnya telah berhenti. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri*.

Bertaubat adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedang menyucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau berwudhu. Demikianlah penyucian jasmani dan

rohani digabung oleh penutup ayat ini, sekaligus member isyarat bahwa hubungan suami istri baru dapat dibenarkan jika haid atau masa nifas telah berhenti dan istri telah mandi wajib (Tafsir Al-Mishbah, 2002:584).

Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan, karena setelah melakukan keseluruhan asuhan evaluasi yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.



BAB V

PENUTUP

1) KESIMPULAN

Setelah melaksanakan asuhan kebidanan ibu nifas pasca episiotomi pada Ny “M” dari pengkajian hingga evaluasi, dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa.

- i. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisis data ibu nifas pada Ny “M” pasca episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Hasil dari analisa data didapatkan ny “M”, UMUR 19 TAHUN, PIA0 dengan keluhan nyeri luka episiotomi setelah melahirkan pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 10. 15 wita.
- j. Telah dirumuskann diagnosa/masalah aktual ibu nifas pada Ny “M” pasca episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Hasil dari interpretasi data sehingga Ny “M”, umur 19 tahun mengalami masalah aktual nyeri luka episisotomi.
- k. Telah dirumuskan diagnosa/masalah potensial ibu nifas pada Ny “M” pasca episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Hasil dari analisa dan interpretasi data aktual Ny “M” berpotensi mengalami infeksi luka episiotomi.
- l. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu nifas pada Ny “M” pasca episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk meresepkan obat-obat yang sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu nifas pasca episiotomi dan antisipasi/bila terjadi infeksi, seperti analgetik, antiinflamasi, antibiotik.
- m. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu nifas pada Ny “M” pasca episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu perencanaan

berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial seperti perawatan luka episiotomi, *health education* tentang personal hygiene.

6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah disusun pada ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu semua perencanaan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan.
7. Telah mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa dengan hasil yaitu seluruh asuhan telah diberikan dan tidak ada hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan teori.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas pada Ny “M” dengan luka episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa. Dalam bentuk SOAP.

B. SARAN

1. Untuk Masyarakat
 - a. Diharapkan kepada ibu-ibu masa nifas dapat meningkatkan kondisi fisik dan psikis, serta personal hygiene untuk menghindari komplikasi yang lebih berat dalam masa nifas utamanya pada ibu nifas dengan luka episiotomi
 - b. Perlunya dukungan dan ketelibatn suami dalam masa nifas terkhususnya pada kasus ibu nifas dengan dengan luka episiotomi yang merupakan interaksi terus menerus yang bersifat penuh perhatian, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dan saling membutuhkan.

2. Untuk Bidan

Untuk tenaga kesehatan yang bekerja didalam lingkungan kebidanan diharapkan tetap dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih professional, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat. Memberikan asuhan sesuai dengan wewenang dan kode etik bidan serta dalam melakukan pendokumentasian petugas kesehatan harus lebih teliti dan cermat yang dilakukan sebagai pembuktian pertanggungjawaban.

3. Untuk Institusi Pendidikan

Dengan mengetahui permasalahan yang dapat timbul pada ibu nifas dengan luka episiotomi, diharapkan institusi pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta perkembangan sesuai prosedur dalam memberikan asuhan dan dalam pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan dalam memecahkan suatu masalah kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Huda Juma'a dan Jwan M. Sabir Zangana. *Rate of Perineal Injuries and Episiotomy in a Sample of Women at Maternity Teaching Hospital in Erbil City*. Journal of Education and Practice, Vol. 7 no. 20 (2016). <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1109181.pdf> (Diakses tanggal 21 Mei 2017 pukul 22:00 wita).
- Ariestanti, Dwi Ryan dan Eva Purwaningtias. *Judul Analisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kejadian Rupture Perineum pada Ibu Bersalin*. Jurnal Kebidanan Mutiara Mahakam. Vol. IV no.2. (September 2016). <https://www.akbidmm.ac.id/ojs/index.php/akbidmm/article/view/22> (Diakses tanggal 8 Mei 2017 pukul 15:51 wita).
- Asri, Dwi dan Cristine Clervo. *Asuhan Persalinan Normal*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Benson, Ralph C dan Martin L.Pernoll. *Buku Saku Obstetri & Ginekologi*. Jakarta: EGC. 2013.
- Coad, Jane dan Melvyn Dunstall. *Anatomi dan Fisiologi untuk Bidan*. Jakarta: EGC. 2006.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. "Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2015". Official Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2014/27_Sulawesi_Selatan_2014.pdf (Diakses tanggal 30 Maret 2017 pukul 20:41 wita)
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. "Profil Kesehatan Kabupaten Gowa 2014". Official Website Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014
- Fauziyah, Yulia. *Obstetri Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Fitriani, Rini. *Onkologi Sistem Reproduksi Manusia*. Makassar: AlauddinUniversity Press. 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. 2012.
- Heryani, Reni. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. Jakarta: CV. Trans Info Media. 2011.
- Karningsih dkk. *Karakteristik Ibu Berhubungan Dengan Pemilihan Tenaga Penolong Persalinan*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Vol. 2 no. 2. (Maret 2015). <http://ejurnal.poltekkesjakarta3.ac.id/index.php/JITEK/article/view/91> (Diakses tanggal 10 Mei 2017 pukul 1:23 wita).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Profil Kesehatan Indonesia 2015". Official Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-Indonesia-2015.pdf> (Diakses tanggal 21 Mei 2017 pukul 21:30 wita).

- Kumera, Mitiku Getachew dkk. *Assessment of Episiotomy Practice in Mizan Aman General Hospital, Ethiopia*. Journal of Health, Medicine and Nursing. Vol. 20 (2015). <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/download/27158/27841> (Diakses tanggal 21 Mei 2017 Pukul 23:07 wita).
- [/7306 Sulsel Kab Gowa 2014.pdf](#) (Diakses tanggal 30 Maret 2017 pukul 20:45 wita).
- Kuswanti, Ina dan Fitria Melina. *Askeb II Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Lailiyana, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: EGC. 2012.
- Primadona, Prakirtia dan Dewi Susilowati. *Penyembuhan Luka Perineum Fase Proliferasi pada Ibu Nifas*. Journal Profesi. Vol. 13 no 1 (September 2015). <https://ejournal.stikespku.ac.id/index.php/mpp/article/view/97/87> (Diakses tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 22:00 wita).
- Pudiastuti, Ratna Dewi. *Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Purwoastuti, Th.Endang dan Elisabeth Siwi Walyani. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2014.
- Majid, Abdul dan Agus Sarwo Prayogi. *Perawatan Pasien Luka Bakar*. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2013.
- Mallapiang, Fatmawati. *Sistem Reproduksi Wanita Fisiologi dan Integrasinya Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Marmi. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peurperium Care"*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2012.
- Maritalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Martaadisoebrata, Djamhoer dkk. *Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2011.
- Saleha, Sitti. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Savitri, Wewet dkk. *Pengaruh Pemijatan Perineum pada Primigravida terhadap Kejadian Ruptur Perineum saat Persalinan di Bidan Praktek Mandiri di Kota Baengkulu Tahun 2014*. Jurnal Kesehatan Andalas 2015. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/204> (Diakses tanggal 22 April 2017 pukul 22:41 wita).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Tando, Naomy Marie. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: In Media. 2013.
- Varney, Helen dkk. *Varney's Midwifery*. America: Jones and Bartlett Publishers. 2003.
- Verralls, Sylvia. *Anatomi dan Fisiologi Terapan dalam Kebidanan*. Jakarta: EGC. 1997.

Walyani, Elisabeth Siwi dan Th. Endang Purwoastuti. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS. 2015.

Wenniarti dkk. *Pengaruh Terapi Ice Pack terhadap Perubahan Skala Nyeri pada Ibu Post Episiotomi*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Vol. 3 no. 1. (Januari 2016).

<http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk/article/view/2857> (Diakses tanggal 23 April 2017 pukul 23:03 wita).

Yanti, Damai dan Dian Sundawati. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Belajar Menjadi Bidan Profesional*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Titin Prahayu
Nim : 70400114026
Tempat/Tanggal lahir : Lamasi, 18 Mei 1996
Alamat : Jl. Mustafa Daeng Bunga VI, Samata, Kab Gowa
No.Hp : 081245853553

B. Riwayat Pendidikan

- 1) Tahun 2002-2008: SDN 108 Bone Pute, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- 2) Tahun 2008-2011: SMP Negeri 1 Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- 3) Tahun 2011-2014: SMA Negeri 1 Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- 4) Tahun 2014-2017: Jurusan Kebidanan

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Sulawesi Selatan.

C. Riwayat Organisasi

- 1) Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 1 Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- 2) Bendahara Umum UKS SMA Negeri 1 Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- 3) Anggota Remaja Masjid SMA Negeri 1 Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- 4) Anggota Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- 5) Anggota Divisi Pengembangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Diploma (HMD) Kebidanan Periode 2015-2016 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- 6) Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Diploma Kebidanan (HMD) Kebidanan Periode 2016-2017 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.