

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA  
PADA NY "M" AKSEPTOR LAMA DEPO PROGESTIN DENGAN  
AMENORHEA DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU  
MAKASSAR TAHUN 2017**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin  
Makassar**

**Oleh**

**NUR ASIA K  
70400114066**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KTI**


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2017

Penyusun

**Nur Asia K**

**70400114066**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Nur Asia K

Nim : 70400114066

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny M Akseptor  
Lama Depo Progesterin dengan *Amenorhea* di Puskesmas Jumpandang  
Baru Makassar.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam  
seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran  
dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Allauddin Makassar.

Samata-Gowa, November 2017

Pembimbing I



Anieq Mumth'ah Alkautzar.,S.ST.,M.Keb

Pembimbing II



dr.Rini Fitriani, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny “M” Akseptor Lama Depo Progestin dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017”, yang disusun oleh Nur Asia K NIM: 70400114066, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis 16 November 2017 M, bertepatan dengan Tanggal 27 Shafar 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 17 November 2017 M  
28 Shafar 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Firdayanti, S.SiT., M.Keb. (.....)

Pembimbing I : Anieq Mumthiah Alkautsar., S.ST., M.Keb. (.....)

Pembimbing II : dr. Rini Fitriani, M.Kes. (.....)

Penguji I : dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH. (.....)

Penguji II : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag. (.....)

af  
Pekan, f

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP: 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan baik meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana ini. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang berusaha menyelamatkan manusia dari kesesatan. Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Klien Akseptor Lama Depo Progestin dengan *Amenorhea* di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar“**, penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, namun berkat bimbingan dan bantuan orang disekitar sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.

Karya tulis ilmiah ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah tulus, ikhlas memberikan nasihat, kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materi agar penulis sukses dalam menggapai mimpi

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan kepada Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Kepada Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin M.Sc Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan
4. Ibunda Anieq Mumth'ah Alkautzar, S.ST, M.Keb selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar, ikhlas dan senantiasa memberikan semangat.
5. Ibunda dr. Rini Fitriani, M.Kes sebagai pembimbing II, pendamping yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing, serta memberikan saran yang membangun dalam penyusunan proposal dan studi kasus laporan akhir ini.
6. Ibunda dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH selaku penguji yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi dan memberikan saran.
7. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

8. Segenap dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf Akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing peneliti selama dalam penyusunan proposal ini.
9. Yang tercinta orang tua saya serta saudara-saudaraku dan orang yang memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tak henti-hentinya kepada peneliti.
10. Teman seangkatan tahun 2014 Kebidanan serta teman yang lain di luar sana yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan memberikan saran serta membantu peneliti dalam Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu peneliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang kebidanan pada umumnya. Penulis menyadari kekurangan yang tak dapat dihindari pada karya tulis ilmiah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

*Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Samata-Gowa, Agustus 2017

Peneliti  
**Nur Asia K**  
**70400114066**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana.....	13
1. Pengertian Tentang Keluarga Berencana .....	13
2. Pengertian Kontrasepsi.....	14
3. Tujuan Kontrasepsi .....	14
4. Jenis – Jenis Kontrasepsi.....	15
B. Tinjauan Tentang Kontrasepsi Suntikan <i>Depoprogestin</i> .....	19
1. Pengertian Tentang Kontrasepsi Suntikan <i>Depoprogestin</i> .....	20

2. Macam-Macam Kontrasepsi Suntikan .....	20
3. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin .....	20
4. Kontra Indikasi Suntikan .....	21
5. Keuntungan Dan Kerugian.....	21
6. Cara Penggunaan .....	22
7. Waktu Pemberian Suntikan DMPA .....	23
8. Efek Samping.....	24
9. Penanganan Komplikasi .....	24
C. Tinjauan Khusus tentang Amenorhea Akibat Efek Samping Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin.....	27
D. Tinjauan Manajemen Kebidanan .....	28
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan .....	31
F. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam.....	33
<b>BAB III STUDI KASUS .....</b>	<b>39</b>
<b>PEMANTAUAN TANGGAL 15 MEI 2017</b>	
A. Langkah I. Identifikasi data dasar .....	39
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual.....	43
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	44
D. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi .....	46
E. Langkah V. Rencana tindakan .....	46
F. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	47
G. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	48

PEMANTAUAN TANGGAL 15 MEI 2017

A. Identitas Istri/Suami .....	49
B. <i>Subjektif</i> .....	49
C. <i>Objektif</i> .....	50
D. <i>Assessment</i> .....	51
E. <i>Planning</i> .....	51

PEMANTAUAN TANGGAL 16 MEI 2017

A. Identitas Istri/Suami .....	53
B. <i>Subjektif</i> .....	53
C. <i>Objektif</i> .....	53
D. <i>Assessment</i> .....	54
E. <i>Planning</i> .....	55

PEMANTAUAN TANGGAL 15 JULI 2017

A. Identitas Istri/Suami .....	56
B. <i>Subjektif</i> .....	56
C. <i>Objektif</i> .....	56
D. <i>Assessment</i> .....	57
E. <i>Planning</i> .....	58

PEMANTAUAN TANGGAL 07 AGUSTUS 2017

A. Identitas Istri/Suami .....	59
B. <i>Subjektif</i> .....	59
C. <i>Objektif</i> .....	59
D. <i>Assessment</i> .....	60

E. <i>Planning</i> .....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>GAMBAR KUNJUNGAN</b> .....	84



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran 2 :Surat isin/rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Selatan kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- Lampiran 3 :Surat rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kota Makassar Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Lampiran 4 :Surat keterangan selesai Penelitian dari Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- Lampiran 5 :Dartar Riwayat hidup.



## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, MAY 2017

Nur Asia K, 7040011406

Supervisor I : Anieq Mumth'ah Alkautzar

Supervisor II : Rini Fitriani

**“Family Planning Midwifery Care Management on Mrs. “M” of the Old Acceptor of Depo Progestin with *Amenorrhea* at Jumpandang Baru Public Health Center of Makassar in 2017”**

---

Family Planning Program is one of the population policies aiming at meeting the demand for quality reproductive health services and controlling the birth rates to improve the population and family quality. The three-month-injectable contraception is one of the most effective family planning methods to prevent pregnancy.

This research paper explains the implementation of family planning midwifery care management on Mrs. “M” of the old acceptor of *depo progestin* with amenorrhea at Jumpandang Baru Public Health Center in 2017 according to the approach of 7 steps of Varney and SOAP.

The diagnosis of Mrs. "M" was confirmed by the subjective data, the presence of non-menstrual complaints during the last 1 year and the objective data revealed that the mother was a three-month-injectable of *depo progestin*. It was identified that amenorrhea experienced by Mrs. "M" was physiology for the family planning of depo progestin users. By the availability of counseling, the mother was no longer feeling anxious and worried on her condition.

It can be concluded that after collecting the primary data namely the diagnostic identification and action for Mrs. "M", it was in accordance with the case of family planning of depo progestin acceptor with amenorrhea. The mother understood that menstruation was a side effect of depo progestin users. Whenever the mother wished to get menstruation, she could switch to another contraceptive. Another important point was that the mother conceived that Islam advocates efforts to improve the family quality including through a family planning.

**References : 34 (2003-2017)**

**Keywords : Family Planning, 7 Steps of Varney, Family Planning acceptor of depo progestin injection**



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, MEI 2017

Nur Asia K, 7040011406

Pembimbing I : Anieq Mumth'ah Alkautzar

Pembimbing II : Rini Fitriani

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “M” Akseptor Lama Depo Progestin dengan *Amenorhea* Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017”**

Program Keluarga Berencana adalah salah satu kebijakan kependudukan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran dalam meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga. Kontrasepsi suntik 3 bulan merupakan salah satu metode keluarga berencana yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan.

KTI ini memaparkan pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny “M” akseptor lama depo progestin dengan *amenorrhea* di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017 sesuai pendekatan 7 langkah Varney dan SOAP.

Diagnosis pada Ny “M” ditegakkan dengan data subjektif, adanya keluhan tidak haid selama 1 tahun terakhir dan data objektif didapatkan bahwa ibu pengguna suntik 3 bulan depo progestin. Diketahui bahwa *amenorrhea* yang dialami Ny “M” merupakan hal fisiologi bagi pengguna KB depo progestin dengan adanya konseling maka ibu tidak lagi merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah telah dilakukan pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa dan tindakan untuk Ny “M” dan sesuai dengan kasus akseptor KB depo progestin dengan *amenorrhea*. Ibu mengerti bahwa tidak haid merupakan efek samping dari pengguna depo progestin. Apabila ibu ingin mendapatkan menstruasi ibu bisa beralih ke kontrasepsi yang lain. Hal lain yang penting adalah ibu memahami bahwa Islam menganjurkan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga termasuk melalui KB.

**Daftar pustaka : 34 (2003-2017)**

**Kata kunci : KB, 7 Langkah Varney, Akseptor KB suntik depo progestin.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Paradigma baru program keluarga berencana nasional telah diubah visinya dari mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) menjadi visi untuk mewujudkan “Keluarga Berkualitas Tahun 2015”. Program Keluarga Berencana (KB) salah satu kebijakan kependudukan yang sangat populer dalam bidang kelahiran (fertilitas). Menurut Sulistyawati (2012), program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Penentuan jarak kehamilan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran, menentukan berapa jarak yang akan direncanakan diantara kehamilan yang satu dengan yang lain (Mustikawati, 2015: 16).

Berdasarkan pandangan dari *World Health Organisation* (WHO) tahun 1970 keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen.

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Sundari, 2016: 9).

*World Health Organization* (WHO) tahun 2014 penggunaan kontrasepsi telah meningkat di banyak bagian dunia, terutama di Asia dan Amerika Latin dan terendah di Sub-Sahara Afrika. Secara global, pengguna kontrasepsi modern telah meningkat tidak signifikan dari tahun 1990 sampai tahun 2014, mengalami peningkatan dari 54% menjadi 57,4% pada tahun 2014. Secara regional, proporsi pasangan usia subur 15-49 tahun melaporkan penggunaan metode kontrasepsi modern telah meningkat minimal 6 tahun terakhir. Di Afrika dari 23,6% menjadi 27,6%, di Asia telah meningkat dari 60,9% menjadi 61,6%, sedangkan Amerika latin dan Karibia naik sedikit dari 66,7% menjadi 67,0% (WHO, 2014).

Adapun data yang diperoleh dari Depkes cakupan peserta KB baru dan KB aktif di Indonesia pada tahun 2014 dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 47.019.002. Peserta KB baru sebesar 7.761.961 (16,15%) meliputi suntik sebanyak 3.855.254 (49,67%), pil KB sebanyak 1.951.252 (25,14%), kondom sebanyak 441.141 (5,68%), implan sebanyak 826.627 (10,65%), IUD (*Intra Uterine Device*) sebanyak 555.241 (7,15%), Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 116.384 (1,5%), Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 16.062 (0,2%). Sedangkan peserta KB aktif sebanyak 35.202.908 meliputi IUD sebanyak 3.896.081 (11,07%), MOW sebanyak 1.238.749 (3,52%), MOP sebanyak 241.642 (0,69%), implant sebanyak 3.680.816 (10,46%), kondom sebanyak 1.110.341 (3,15%), suntikan sebanyak 16.734.917 (47,54%), dan pil KB sebanyak 8.300.362 (29,58%).

Data Depkes RI tahun 2014 Sulawesi Selatan peserta KB baru, presentase metode kontrasepsi yang terbanyak digunakan adalah suntikan, yakni sebesar 50,60%. Metode terbanyak kedua adalah pil 28,87 %. Metode yang paling sedikit dipilih oleh para peserta KB baru adalah Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 0,14%, kemudian Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 0,65% dan kondom 8,06%. Adapun metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntikan (51,44%) dan terbanyak kedua adalah pil (29,99). Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif adalah Metode Operasi Pria (MOP) yakni sebanyak 0,11% kemudian lainnya sebanyak 0,01 (Depkes RI, 2014: 83-84).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2013 Jumlah keseluruhan peserta KB baru di Makassar sebanyak 54,043 atau 115.43% sedangkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 113,654 atau 242.75%. Jumlah keseluruhan peserta KB MKJP sebanyak 27,390 atau 24.10% IUD 10,803 atau 9.51%, MOP sebanyak 628 atau 0.55%, MOW sebanyak 4,270 atau 3.76%, Implant sebanyak 11,689 atau 10.28% dan jumlah keseluruhan non MKJP sebanyak 86,264 atau 75.90% yaitu kondom sebanyak 4,160 atau 3.66%, suntik sebanyak 48,989 atau 43.10%, pil sebanyak 33,115 atau 29.14% (Dinkes, 2014)

Faktor-faktor dalam menentukan jarak kehamilan pada saat merencanakan kehamilan yang harus dihindari yaitu: terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun). Komplikasi yang biasa terjadi jika terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil, yaitu perdarahan

trimester III, plasenta previa, anemia, Ketuban Pecah Dini (KPD), endometriosis masa nifas, kematian saat melahirkan, kehamilan dengan jarak yang terlalu jauh dapat menimbulkan resiko tinggi seperti persalinan lama, dan jarak kehamilan yang terlalu dekat menyebabkan *sibling rivalry* (Riestya, 2016: 48).

Pencegahan kematian dan kesakitan ibu merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan keluarga berencana. Masih banyak alasan lain, misalnya membebaskan wanita dari rasa khawatir terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak perempuan mengalami kesulitan di dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya terbatasnya metode yang tersedia tetapi juga oleh ketidak tahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut (Prihatin & lisa, 2015: 30).

Kematian dan kesakitan pada ibu hamil dan bersalin serta bayi baru lahir sejak lama telah menjadi masalah, khususnya di negara-negara berkembang. sekitar 25-50% kematian wanita usia subur disebabkan oleh hal yang berkaitan kehamilan (Firdayanti, 2012: 11). Berdasarkan visi dan misi tersebut, program keluarga berencana nasional mempunyai kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk. Kontribusi pelaksanaan program keluarga berencana nasional tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program *Making Prengnancy Safer* dimana pesan kunci program ini adalah bahwa setiap kehamilan harus merupakan kehamilan yang diinginkan (Hartanto, 2010: 45).

Di sisi lain, KB termasuk masalah yang kontroversional. Secara umum, umat Islam masih ada dua kubu antara yang membolehkan KB dan yang menolak KB. Namun, Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

melalui fatwa-fatwa tarjih. seperti yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa/4: 9 secara umum dapat menjadi motivasi KB.

وَالَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Kementrian Agama RI, 2013).

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Islam menganjurkan agar kehidupan anak-anak jangan sampai terlantar sehingga menjadi tanggungan orang lain. Ayat tersebut mengingatkan agar orang tua selalu memikirkan kesejahteraan jasmani dan rohani anak-anaknya (Sri, 2016: 3).

Di kalangan pemuka-pemuka agama Islam yang lain, menurut Ma'ruf Farid, ada yang menghalalkan dengan pertimbangan harus memenuhi dua syarat yaitu masalah motivasi dan teknik, yang dimaksud dengan motivasi adalah mencegah kehamilan untuk mengatur kelahiran, sementara tekniknya adalah dengan jalan *azl* (menumpahkan sperma di luar rahim) sedangkan yang mengharamkan memiliki alasan karena program KB (keluarga berencana) sama halnya dengan membatasi jumlah populasi penduduk (*tahdid anl-nasl*) (Qadariyah, 2012: 2).

Berbagai macam kontrasepsi terdiri dari metode nonhormonal, hormonal, mekanis dan kontrasepsi mantap. Kontrasepsi nonhormonal meliputi metode kalender, suhu basal, lendir serviks, simpto, coitus interruptus, kondom, barrier, metode hormonal, yaitu kontrasepsi pil, Suntik, implant, kontrasepsi mekanis

yaitu IUD, sedangkan kontrasepsi mantap yaitu tubektomi dan vasektomi (Siti dan Mega, 2013:1)

KB suntik juga mempunyai banyak efek samping seperti peningkatan berat badan, sakit kepala, dan nyeri payudara. Efek-efek samping seperti ini tidak berbahaya dan cepat hilang. Pemberian kontrasepsi suntikan juga sering menimbulkan gangguan haid seperti *spotting* dan *amenorhea*. *Amenorhea* adalah keadaan tidak terjadinya menstruasi pada seorang wanita *amenorhea* sendiri terbagi menjadi dua yaitu amenorea primer dan sekunder. *Amenorhea* primer, yang menurut definisinya adalah kegagalan mencapai *menarche*, seringkali merupakan hasil penyimpangan kromosom yang menyebabkan insufisiensi ovarium primer (misalnya, *sindrom Turner*) atau kelainan anatomis (misalnya *agenesis Müllerian*). *Amenorhea* sekunder didefinisikan sebagai penghentian menstruasi reguler selama tiga bulan atau penghentian menstruasi tidak teratur selama enam bulan (Klein, AD, 2013:1)

Suntik depo progestin dengan gangguan haid berupa *amenorhea* disebabkan oleh progesteron dalam komponen *Depo Medroksi Progesteron Asetat* (DMPA) menekan *Luteinizing Hormone* (LH). Meningkatnya DMPA dalam darah akan menghambat LH, perkembangan folikel dan ovulasi selama beberapa bulan. Selain itu, DMPA juga mempengaruhi penurunan *Gonadotropin Releasing Hormone* (GnRH) dari hipotalamus yang menyebabkan pelepasan *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH) dari hipofisis anterior berkurang. Penurunan FSH akan menghambat perkembangan folikel sehingga tidak terjadinya ovulasi atau pembuahan. Pada pemakaian DMPA menyebabkan

endometrium menjadi lebih dangkal dan atropis dengan kelenjar- kelenjar yang tidak aktif sehingga membuat endometrium menjadi kurang baik atau tidak layak untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi (Riyanti, 2011: 8).

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari hasil temuan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tahun 2016 sejumlah 1870 akseptor dengan 1613 akseptor lama (86,2%), yang menggunakan suntikan sebanyak 1058 akseptor (56,6%), Pil 447 akseptor (23,9%), Implant 61 akseptor (3,26%), IUD 27 akseptor (1,44%) dan Kondom 20 akseptor (1,1%). Akseptor Baru 257 akseptor (13,7%), yang menggunakan suntikan sebanyak 122 akseptor (6,5%), Pil 1 akseptor (0,05%), Implant 97 akseptor (5,18%), IUD 35 akseptor (1,87%), dan Kondom 2 akseptor (0,1). Dan akseptor suntik 3 bulan depo progestin yang mengalami *amenorhea* sebanyak 535 akseptor (75,1%) dan 177 akseptor (24.8%) mengalami *spotting*.

Dari data di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Klien Akseptor Depo Progestin Dengan *Amenorhea* Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut “Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "M" Akseptor Lama Depo Progestin Dengan *Amenorhea* di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017”.

### ***C. Tujuan Penulisan***

#### 1. Tujuan Umum

Dilakukannya asuhan secara komprehensif pada klien akseptor lama depo Progestin dengan *amenorhea*.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengumpulan data pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorhea*
- b. Dilakukannya identifikasi diagnosa / masalah aktual pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorhea*
- c. Diidentifikasinya diagnosa / masalah potensial pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorhea*
- d. Ditetapkannya kebutuhan tindakan segera, konsultasi, kolaborasi, dan rujukan pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorhea*
- e. Diperolehnya pengalaman nyata dengan merencanakan tindakan asuhan kebidanan pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorrhea*
- f. Disusunnya rencana asuhan pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorrhea*.
- g. Dilakukannya asuhan pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorhea*.
- h. Dilakukannya evaluasi hasil asuhan pada klien akseptor suntikan depo progestin dengan *amenorhea*.
- i. Dilakukan pendokumentasian hasil asuhan kebidanan pada klien suntik depo progestin dengan *amenorhea* di puskesmas Ujung Pandang Baru Makassar.

- j. Dilakukannya pengintegrasian nilai ke Islaman berdasarkan teori dan penerapannya pada manajemen kasus ini.

#### **D. Manfaat penulisan**

##### **1. Manfaat praktis**

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program, baik di departemen kesehatan Makassar maupun pihak di Puskesmas Jumpandang Baru dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program keluarga berencana.

##### **2. Manfaat ilmiah**

Sebagai sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

##### **3. Manfaat institusi**

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan Mahasiswi Kebidanan Universitas Islam Negeri dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada klien suntik depo progestin dengan *amenorhe*.

##### **4. Manfaat bagi penulis**

Sebagai pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan dan menambah wawasan tentang keluarga berencana.

#### **E. Metode Penulisan**

##### **1. Studi Kepustakaan**

Bahan pustaka Merupakan hal yang sangat penting di dalamnya tersimpan bahan bacaan dan informasi yang dapat mengarahkan kita dalam menciptakan pemahaman yang tepat tentang kasus yang dibahas.

## 2. Studi kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses Manajemen Kebidanan Komprehensif, data yang dihimpun hingga evaluasi yang didapatkan dengan menggunakan metode :

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan klien dan tim kesehatan yang terkait.

### b. Observasi

Observasi yaitu penulis memperoleh data dengan melakukan pemantauan secara langsung dengan klien.

### c. Pemeriksaan fisik

Pengkajian fisik yaitu mengkaji keadaan umum klien dengan melakukan pemeriksaan secara sistematis pada klien meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi.

### d. Pemeriksaan penunjang

pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan untuk mengetahui apa klien sedang hamil atau tidak.

## 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mempelajari status klien berdasarkan catatan medik yang terkait dengan kasus klien.

#### **4. Diskusi**

Penulis mengadakan diskusi dengan dokter dan bidan yang menangani secara langsung dan tanya jawab dengan pembimbing proposal untuk kelancaran penulisan karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir.

#### **F. Sistematika penulisan**

Bab I penulis membahas tentang latar belakang masalah tentang keluarga berencana, rumusan masalah yaitu manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana pada ny "M" akseptor lama depo progestin dengan amenorhea, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, penulis membahas mengenai tinjauan umum kontrasepsi dan kontrasepsi suntik depo progestin, tinjauan khusus tentang *amenorhea*, tinjauan management kebidanan, tinjauan kontrasepsi menurut pandangan Islam.

Bab III studi kasus, penulis membahas tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Bab IV pembahasan, Pada bab ini penulis akan menguraikan asuhan kebidanan pada ny "X" secara nyata manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney mulai dari pengkajian sampai evaluasi dan data perkembangan. Membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Puskesmas Jumpandang Baru dalam

memberikan asuhan kebidanan pada ibu *amenorhea* akibat efek samping dari kontrasepsi suntikan depo progestin.

Bab V penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dalam menangani kasus KB suntik depo progestin dengan *amenorhea*, Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan kasus sedangkan saran merupakan alternatif pemecahan dan tanggapan dari kesimpulan. semua temuan serta pengetahuan yang di dapatkan dari hasil asuhan di Puskemas Jumpandang Baru. Daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana*

##### 1. **Pengertian Tentang Keluarga Berencana**

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan (purwoastuti, 2015: 182), menurut Abu Bakar Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Abu bakar, 2014: 15), sedangkan menurut UU No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Setyorini, 2014: 35), sedangkan sumber lain mengemukakan Menurut WHO (*Expert committee, 1970*), tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Sulistyawati, 2012: 13)

## 2. Pengertian Kontrasepsi

Menurut Firdayanti, 2012 kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang berarti mencegah atau melawan dan “konsepsi” yaitu pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Secara singkat Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini yang dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen (Firdayanti, 2012: 40). Kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan Kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan, dan merupakan hak setiap individu sebagai mahluk seksual (Biran Affandi, 2013: U-46). Sedangkan menurut Abu bakar Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri (pasutri) untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara ,alat dan obat kontrasepsi (Bakar, 2014: 35).

## 3. Tujuan Kontrasepsi

### a. Tujuan umum

Memberikan dukungan dan pematapan penerimaan gagasan KB yaitu dihayatinya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKBS) (Firdayanti, 2012:41).

### b. Tujuan khusus

Penurunan angka kelahiran guna mencapai tujuan. Dikategorikan dalam 3 fase untuk mencapai pelayanan tersebut yaitu:

- 1) Fase menunda/mencegah kehamilan, dimana pada fase menunda ini ditujukan pada pasangan usia subur dengan istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya
- 2) Fase menjarangkan kehamilan, dimana pada periode usia istri antara 20-35 tahun merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kehamilan 2-4 tahun, ini dikenal dengan catur warga.
- 3) Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan, dimana periode ini umur istri diatas 30 tahun terutama 35 tahun sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 orang anak (Firdayanti, 2012:41-42).

#### **4. Jenis-Jenis Kontrasepsi**

##### **a. Metode Sederhana**

##### **1) Metode pantang berkala**

Prinsip pantang berkala ialah tidak melakukan persetubuhan pada masa subur istri, untuk menentukan masa subur istri dipakai 3 patokan yaitu:

- a) Ovulasi terjadi 14 kurang 2 hari sebelum haid yang akan datang.
- b) Sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi.
- c) Ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi.

Jadi jika kontrasepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam) yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam sesudah ovulasi terjadi (Sulistyawati, 2012: 50).

## 2) Metode suhu basal

Menjelang ovulasi suhu basal tubuh akan turun dan kurang lebih 24 jam setelah ovulasi suhu basal akan naik lagi sampai lebih tinggi dari pada suhu sebelum ovulasi. Suhu basal dapat meningkat sebesar 0,2-0,5°C ketika ovulasi (Taufika, 2014: 51).

## 3) Metode lendir serviks

Metode lendir serviks dilakukan dengan wanita mengamati lendir serviksnya setiap hari. Lendir serviks terlihat lengket dan jika direntangkan di antara kedua jari akan putus menandakan lendir tidak subur, saat lendir serviks meningkat menjadi jernih dan melar, apabila dipegang di antara dua jari, lendir dapat diregangkan dengan mudah tanpa terputus, lendir ini digambarkan terlihat seperti putih telur mentah disebut lendir subur (Everett, 2012: 43).

## 4) Metode *coitus interruptus*

Alat kelamin pria (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah (Sulistiawati, 2012:56)

## 5) Metode *Amenorhea* laktasi (MAL)

Metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya (Endang, 2015: 203).

## 6) Kondom

Jenis kontrasepsi menggunakan alat untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit kelamin dengan cara menghentikan sperma untuk masuk kedalam vagina (Purwoastuti, 2015: 205).

### b. Metode modern

#### 1) Hormonal

Kontrasepsi hormonal adalah alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ovulasi dimana bahan bakunya mengandung *preparat* estrogen dan progesteron. Berdasarkan jenis dan cara pemakaiannya dikenal 3 macam kontrasepsi hormonal yaitu kontrasepsi Oral (Pil), suntikan, dan kontrasepsi implant (Affandi, 2013:MK-28).

#### a) Pil KB

Pil kontrasepsi dapat berupa pil kombinasi (berisi hormon estrogen dan progesteron) ataupun juga hanya berisi progesteron saja. Pil kontrasepsi bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi dan mencegah terjadinya penebalan dinding rahim.

#### (1) Pil kombinasi

Menekan ovulasi, mencegah implantasi, lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Jenis-jenis pil kombinasi antara lain; monofasik, bifasik, trifasik (Affandi, 2013: MK-31).

(2) Pil progestin

Adalah pil yang mengandung progesteron dan disiapkan untuk ibu yang menyusui (Affandi, 2013: MK-50).

b) Suntik

(1) Suntik kombinasi

Jenis suntik kombinasi adalah 25 mg *Depo Medroksi progesteron Asetat* dan 5 mg *Estradiol Sipionat* yang diberikan injeksi I.M (*intramuskular*). sebulan sekali, dan 50 mg noretindron Enantat dan 5 mg *Estradiol valerat* yang diberikan injeksi I.M.(*intramuskular*) sebulan sekali

(2) Suntik progestin

Tersedia 2 jenis kontrasepsi yang mengandung progestin yaitu *Depo Medroksi progesteron Asetat* (DMPA), mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik I.M dan *Depo noretisteron Enanta* (*/Depo noristeran*), yang mengandung 200 mg noretindron Enantan, diberikan setiap 2 bulan dengan cara suntik I.M (Affandi, 2013: MK-43).

c) Implant/susuk

(1) Norplant terdiri dari 6 batang silastik lembut berrongga dengan panjang 3,4 cm, diameter 2,4 mm, berisi 36 mg levonogon dengan lama kerja tiga tahun.

(2) Jadena dan indoplant, terdiri dari dua batang silastik lembut berongga dengan panjang 4,3 cm ber diameter 2,5 mm, berisi 75 mg levonogestrel dengan lama kerja 3 tahun.

(3) Implanon, terdiri dari satu batang silastik lembut dengan berongga dengan panjang kira-kira 4,0 cm diameter 2 mm, berisi 68 mg ketodesogestrel dengan lama kerja 3 tahun (Sulistiyawati, 2012: 81).

## 2) Mekanis

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan didalam rahim untuk menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi (Affandi, 2013: MK-80).

## c. Metode mantap

### 1) Tubektomi

Adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seorang perempuan secara permanen dengan mengoklusi tuba falopi mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum.

### 2) Vasektomi

Adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi vasa deferentia sehingga alat transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi (Firdayanti, 2012: 100).

## **B. Tinjauan tentang kontrasepsi suntikan Depo Progestin**

### **1. Pengertian kontrasepsi suntikan Depo Progestin**

KB suntik 3 bulan yaitu salah satu jenis kontrasepsi suntik yang hanya mengandung hormon *progesterone* / progestin yang di suntikkan setiap 3 bulan sekali. Mengandung 150 mg *Depo Medroksiprogesteron Asetat* (DMPA) yang

diberikan dengan cara disuntik intramuskular (di daerah bokong) (Sulistiyawati, 2012: 75), sedangkan Menurut BKKBN, 2002 kontrasepsi suntik adalah metode kontrasepsi yang diberikan secara intramuscular setiap tiga bulan yaitu metode yang dalam penggunaannya mempunyai efektifitas atau tingkat kelangsungan pemakai relatif lebih tinggi serta angka kegagalan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan alat kontrasepsi sederhana (Siti dan Mega, 2013: 93)

## **2. Macam-macam kontrasepsi suntikan**

KB suntik depo progestin terdiri atas dua jenis yaitu *Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA)*, mengandung 150 mg *DMPA*, yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik Intra Muskuler (di daerah bokong), dan *Depo Noretisteron Enontat (Depo Noristerat)*, yang mengandung 200 mg *Noretindron Erontat*, diberi setiap 2 bulan dengan cara disuntik Intra muskuler (Affandi, 2013: MK-43).

## **3. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin**

Menekan ovulasi, kadar progestin di dalam sirkulasi cukup tinggi sehingga kadar FSH (*Folicle Stimulating Hormone*) dan LH (*Luteinizing Hormone*) menurun dan tidak terjadi lonjakan LH. Pada keadaan normal terjadi puncak sekresi LH pada pertengahan siklus sehingga menyebabkan pelepasan ovum dari folikel. Sedangkan dengan kadar LH yang menurun maka tidak akan terjadi lonjakan folikel dan produksi sel telur akan berkurang sehingga menyebabkan tidak terjadinya pelepasan ovum dari folikel dan menyebabkan tidak terjadi ovulasi. Perubahan pada endometrium (atrofi) dan selaput rahim tipis, hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu

kadar puncak FSH dan LH sehingga meskipun terjadi produksi progesteron yang berasal dari korpus luteum menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atrofi sehingga menyebabkan penghambatan dari implantasi.

Lendir serviks yang kental, Kontrasepsi suntik depo progestin bekerja menghambat terjadinya pembuahan dengan cara menghalangi naiknya sperma ke dalam kavum uteri dengan membuat lender serviks menjadi kental sehingga sperma tidak mampu untuk menembus serviks dan pembuahan tidak akan terjadi. Menghambat transportasi gamet/ovum oleh tuba, kontrasepsi kontrasepsi suntik progestin menyebabkan perubahan peristaltic tuba fallopi sehingga pergerakan gamet dihambat dan konsepsi (pertemuan antara sel telur dan sperma) akan dihambat maka kemungkinan terjadinya perubahan kecil. Luteulisis Pemberian jangka panjang progesterone dapat menyebabkan fungsi luteum yang tidak adekuat pada siklus haid yang mempunyai ovulasi (Firdayanti, 2012: 102-103).

#### **4. Kontra Indikasi Suntikan**

Kontra indikasi dari suntikan depo progestin diantaranya yaitu hamil atau dicurigai hamil (resiko cacat pada janin 7 per 100.000 kelahiran), perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, terutama *amenorhea*, menderita penyakit kanker payudara atau riwayat kanker payudara, diabetes melitus disertai komplikasi (Affandi, 2013: MK-52).

#### **5. Keuntungan dan kerugian**

Keuntungan suntikan Depo Progestin yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak terpengaruh pada hubungan suami istri, tidak

memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul, menurunkan krisis anemia bulan sabit. sedangkan kerugian/keterbatasan suntik depo progestin yaitu gangguan siklus haid, haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, *spotting* atau tidak haid sama sekali, tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu, permasalahan berat badan efek yang paling sering, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang (*densitas*), pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat (Rahma, 2012: 182).

#### **6. Cara penggunaan**

Penggunaan suntik depo progestin yaitu kontrasepsi suntikan *DMPA* diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuscular di daerah bokong. Apabila suntikan diberikan terlalu dangkal, penyerapan kontrasepsi suntikan akan lambat dan tidak bekerja segera dan efektif. Suntikan diberikan setiap 90 hari atau injeksi diberikan setiap 12 minggu. selanjutnya bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol yang dibasahi oleh *etil/isopropyl* alkohol 60-90%, biarkan kulit kering sebelum disuntik. Setelah kulit kering baru disuntik, kocok dengan baik, hindarkan terjadinya gelembung-gelembung udara. Kontrasepsi suntik tidak

perlu didinginkan. Bila terdapat endapan putih pada dasar ampul, upayakan menghilangkannya dengan menghangatkannya (Affandi, 2013: MK-47).

### **7. Waktu Pemberian Suntikan DMPA**

Setiap saat selama siklus haid, asal ibu tersebut tidak hamil, Mulai hari pertama sampai hari ke tujuh siklus haid, ibu yang tidak haid, injeksi pertama dapat diberikan setiap saat, asalkan saja ibu tersebut tidak hamil, selama tujuh hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual. ibu yang telah menggunakan kontrasepsi hormonal (pil) dapat diberikan selama ibu tersebut tidak hamil, suntikan pertama dapat diberikan tanpa menunggu haid yang akan datang. Ibu menggunakan kontrasepsi jenis lain, jenis suntikan dan ingin menggantinya dengan jenis kontrasepsi suntikan 3 bulan, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikan yang sebelumnya, ibu yang menggunakan kontrasepsi non hormonal dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal dapat segera diberikan asal tidak hamil, bila ibu disuntik setelah hari ke tujuh haid, ibu tersebut selama tujuh hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual, ibu ingin mengganti AKDR dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama diberikan pada hari pertama sampai hari ke tujuh siklus haid, atau dapat diberikan setiap saat setelah hari ke tujuh siklus haid, asal saja ibu yakin ibu tidak dalam kondisi hamil, ibu tidak hamil atau ibu dengan pendarahan tidak teratur, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat, asal saja ibu tersebut tidak hamil, dan selama tujuh hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual (Affandi, 2013: MK-45).

## 8. Efek Samping

Efek samping dari suntikan depo progestin yaitu gangguan haid seperti *amenorhea* yaitu tidak datang minimal 3 bulan berturut-turut yang dipengaruhi kandungan hormon progesteron dalam suntikan, yang menghambat terjadinya ovulasi, selanjutnya spotting yaitu bercak-bercak perdarahan diluar haid yang terjadi selama menggunakan kontrasepsi suntikan kemudian *metrorrhagia* yaitu perdarahan yang berlebihan jumlahnya (Affandi, 2013: MK-48), perubahan berat badan, biasanya berat badan bertambah atau turun beberapa kilogram dalam beberapa bulan setelah pemakaian suntik KB, sakit kepala rasa berputar atau sakit kepala yang terjadi pada satu sisi, kedua sisi atau keseluruhan dari bagian kepala. Insiden sakit kepala adalah sama pada DMPA maupun NET-EN dan terjadi pada kurang dari 1-17% akseptor disebabkan peningkatan hormon progesteron yang mempengaruhi peredaran darah (plasma) termasuk pembuluh darah yang menuju ke kepala (saraf) sehingga menyebabkan gangguan sakit kepala (Ayu, dkk, 2012: 171). *Hematoma* bengkak pada daerah suntikan dan berwarna kebiruan disertai rasa nyeri pada daerah suntikan akibat perdarahan dibawah kulit dan bisa juga akibat pemakaian spoit yang berulang atau kesalahan tehnik penyuntikan (Marfuah, 2012).

## 9. Penanganan Komplikasi

- a. Gangguan haid
  - 1) *Amenorhea*
- a) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
  - 1) Jelaskan sebab terjadinya

- 2) Jelaskan bahwa gejala atau keluhan tersebut dalam rangka penyesuaian diri, bersifat sementara dan individu
  - 3) Menganjurkan ibu agar tetap memakai suntikan (Firdayanti, 2012:107).
- b) Tindakan medis
- 1) Tindakan dilakukan yaitu dengan memberikan konseling pada akseptor depo provera/depo progesterin.
  - 2) Bila klien tidak dapat menerima kelainan tersebut, suntikan jangan dilanjutkan. anjurkan pemakaian jenis kontrasepsi lain.  
Diberikan pil KB 3x1 tablet dari hari III, 1x1 tablet mulai dari hari IV selama 4-5 hari (Firdayanti, 2012:107).
- 2) *Spotting*
- a) Informasikan bahwa perdarahan ringan sering dijumpai, tetapi hal ini bukanlah masalah serius, dan biasanya tidak memerlukan pengobatan. Bila klien tidak dapat menerima perdarahan tersebut dan ingin melanjutkan suntikan, maka dapat disarankan 2 pilihan pengobatan.
  - b) 1 siklus pil kontrasepsi kombinasi (30-35  $\mu\text{g}$  *etinilestradiol*), *ibuprofen* (sampai 800 mg, 3x/hari untuk 5 hari), atau obat jenis lain. Jelaskan bahwa selesai pemberian pil kontrasepsi kombinasi dapat terjadi perdarahan. Bila terjadi perdarahan banyak selama pemberian suntikan ditangani dengan pemberian 2 tablet pil kontrasepsi kombinasi/hari 3-7 hari dilanjutkan dengan 1 siklus pil kontrasepsi hormonal atau diberi 50  $\mu\text{g}$  *etinilestradiol* atau 1,25 mg *estrogen equin konjugasi* untuk 14-21 hari (Affandi, 2013: MK-48).

b. Meningkatnya/menurunnya Berat Badan

Informasikan bahwa kenaikan/penurunan berat badan sebanyak 1-2 kg dapat saja terjadi. Perhatikan diet klien bila perubahan berat badan terlalu mencolok. Bila berat badan berlebihan, hentikan suntikan dan anjurkan metode kontrasepsi lain (Affandi, 2013: MK-48).

c. Sakit kepala

1) Konseling

Menjelaskan pada akseptor bahwa efek samping tersebut mungkin ada tetapi jarang terjadi dan biasanya bersifat sementara. Rasa berputar atau sakit kepala yang terjadi pada satu sisi, kedua sisi atau 4 keseluruhan dari bagian kepala disebabkan peningkatan hormon progesteron yang mempengaruhi peredaran darah (plasma) termasuk pembuluh darah yang menuju ke kepala (saraf) sehingga menyebabkan gangguan sakit kepala.

2) Pengobatan

Pemberian asam mefenamat 500 mg 3x1 untuk mengurangi keluhan (Qadariyah 2012: 23).

d. Hematoma

1) Konseling

Menjelaskan kepada calon akseptor bahwa pada daerah suntikan dapat terjadi bengkak dan berwarna kebiruan disertai rasa nyeri pada daerah suntikan akibat perdarahan dibawah kulit dan bisa juga akibat pemakaian spuit yang berulang atau kesalahan tehnik penyuntikan (Marfuah, 2012).

## 2) Pengobatan

Kompres dingin di daerah yang membiru selama 2 hari setelah itu diubah menjadi kompres hangat hingga warna biru/kuning menjadi hilang (Marfuah, 2012).

### **C. Tinjauan Khusus tentang Amenorhea Akibat Efek Samping Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin.**

#### **1. Hubungan Depo Progestin Dengan Amenorhea**

*Amenorhea* di definisikan sebagai ketidakhadiran lengkap atau anomali penghentian siklus menstruasi pada wanita selama masa reproduksi. Hanya dalam tiga situasi *amenorhea* dianggap fisiologis: selama kehamilan, menyusui dan menopause. Dalam semua situasi lainnya, *amenorhea* dapat disebabkan oleh banyak kondisi patologis dan patut mendapat penilaian yang cermat (Chiavaroli, V. 2011:427).

*Amenorhea* diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder sesuai dengan kejadian sebelum atau sesudah *menarche*, *amenorhea* didefinisikan primer ketika *menarche* tidak terjadi pada usia 16 tahun pada seorang gadis dengan perkembangan seksual sekunder yang lengkap, atau pada usia 14 tahun pada seorang gadis tanpa perkembangan seksual sekunder. Amenore didefinisikan sekunder saat siklus haid menghilang selama 6 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi tidak teratur atau selama 3 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi teratur (Chiavaroli, V. 2011:427).

*Amenorhea* dapat terjadi akibat stimulasi hormon progesteron berupa *DMPA* yang menyebabkan umpan balik negatif terhadap ovarium, hipotalamus

dan hipofisis yang menyebabkan *FSH* dikeluarkan sangat sedikit yang tidak mampu menstimulasi ovarium dalam proses *steroidogenesis* dan *oogenesis*, sehingga efeknya adalah produksi estrogen dan endogen (*E2*) tidak banyak sehingga di dalam endometrium tidak terjadi proses poliferasi. Akibatnya tidak terjadi menstruasi dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek *amenorhea*.

*DMPA* mengakibatkan makin berkurangnya perdarahan dalam setiap siklus. Jika terus digunakan selama lebih dari dua tahun maka haid akan berhenti atau *amenorhea* (Bilings, 2007). Kadar estrogen yang rendah menghambat pertumbuhan endometrium. Keadaan *hipoestrogen* yang terus menerus menyebabkan endometrium menjadi dangkal dan *atrofis* dengan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif. Pada pemakaian jangka panjang endometrium dapat menjadii semakin sedikit, sehingga tidak didapatkannya sedikit sekali jaringan apabila dilakukan biopsi sehingga menyebabkan *amenorhea*. Tetapi perubahan-perubahan tersebut akan menjadi normal dalam waktu 90 hari setelah suntikan *DMPA* yang terakhir (Yeti, 2014).

#### **D. Tinjauan Manajemen Kebidanan**

##### **1. Pengertian manajemen kebidanan**

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnose kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Qadariyah, 2012: 24). Proses manajemen terdiri dari 7 langkah berurutan dimana setiap langkah disempurnakan secara periodik.

## 2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

Proses Manajemen 7 langkah Menurut Varney (2003), antara lain:

### a. Langkah I : Identifikasi data dasar

Langkah ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data atau fakta untuk perumusan masalah. Langkah ini merupakan proses berfikir yang ditampilkan oleh bidan dalam tindakan yang akan menghasilkan rumusan masalah yang diderita oleh pasien atau klien.

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu:

#### 1). Data Subjektif

Menanyakan identitas, HPHT, Menanyakan keluhan, riwayat keluhan, menanyakan riwayat kesehatan yang lalu, riwayat keluarga, riwayat reproduksi, riwayat KB, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, data psikologi dan spiritual.

#### 2). Data Objektif

Dapat dilihat pada kartu akseptor dimana tercantum bahwa klien memakai suntikan *Depo Progestin*, Pemeriksaan Umum, Pemeriksaan fisik secara sistematis, Pemeriksaan Laboratorium.

### b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas dasar data-

data yang telah dikumpulkan, di interpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Pada kasus akseptor suntik depo progestin dengan *amenorhea* dapat ditegakkan diagnosa dengan adanya hasil anamnesa dari klien yaitu berhenti menstruasi selama 3 bulan berturut-turut.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain, yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman. Masalah yang bisa timbul dari pemakaian kontrasepsi suntikan depo progestin dengan *amenorhea* yaitu drop out.

d. Langkah IV : Penetapan Tindakan segera / Kolaborasi

Proses terus menerus ini menghasilkan data baru segera dinilai. Data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak atau menyelamatkan klien. Terjadinya *amenorhea* yang merupakan efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan jenis *depo progestin* tidak memerlukan tindakan apapun.

e. Langkah V : Intervensi / Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Dikembangkan berdasarkan intervensi saat sekarang dan antisipasi diagnosa dan problem serta data-data tambahan setelah data dasar. Rencana

tindakan komprehensif bukan hanya meliputi kondisi klien serta konseling yang mantap.

Adapun tujuan keberhasilan dalam asuhan yang diberikan kepada klien adalah klien tetap menjadi akseptor KB dan ibu mengerti tentang *amenorhea* yang terjadi. Adapun kriteria keberhasilan yang diberikan pada klien adalah klien mengerti tentang efek samping dari suntikan depo progestin yaitu *amenorhea*. Rencana asuhan yang diberikan yaitu jelaskan tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin, efek samping depo progestin.

f. Langkah VI : Implementasi / Pelaksanaan Tindakan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dengan melaksanakan yang telah direncanakan, yaitu menjelaskan tentang keuntungan, keterbatasan, dan efek samping dari suntik depo progestin.

g. Langkah VII : Evaluasi Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dievaluasi keefektifan asuhan yang telah diberikan, apakah telah memenuhi kebutuhan asuhan yang telah teridentifikasi dalam diagnosis maupun masalah. Pelaksanaan rencana asuhan tersebut dapat dianggap *efektif*.

**E. Pendokumentasian Hasil Asuhan**

Metode empat pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Digunakan untuk mendokumentasikan hasil klien dalam rekaman medis klien sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu :

### **1. Subjektif (S)**

Data atau fakta yang merupakan informasi yang termasuk biodata, mencakup nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan, status perkawinan, pendidikan serta keluhan-keluhan, diperoleh dari hasil wawancara langsung pada pasien atau dari keluarga kesehatan lainnya. Keluhan yang dirasakan klien, riwayat keluhan, sifat keluhan, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat ginekologi, dan riwayat KB.

### **2. Objektif (O)**

Dapat dilihat pada kartu akseptor dimana tercantum bahwa klien memakai suntikan Depo Progestin.

#### **a) Pemeriksaan Umum**

Keadaan umum (tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, dan BB). Tekanan darah, kelebihan dan kekurangan berat badan dapat mengganggu fungsi hormonal tubuh sehingga sering kali mengalami amenorhea.

#### **b) Pemeriksaan fisik secara sistematis**

Inspeksi daerah wajah perhatikan ekspresi wajah ibu, palpasi pada daerah leher untuk memastikan tidak adanya pembesaran kelenjar tiroid, yang dapat menyebabkan produksi prolaktin sehingga hormone yang bertanggung jawab pada kesuburan wanita menjadi terganggu, akibatnya siklus menstruasi menjadi terganggu.

#### **c) Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan untuk memastikan tidak terjadi kehamilan.**

### **3. *Assesment (A)***

Merupakan keputusan yang ditegakan dari hasil perumusan masalah yang mencakup kondisi, masalah dan prediksi terhadap kondisi tersebut. Penegakan diagnosa kebidanan dijadikan sebagai dasar tindakan dalam upaya menanggulangi ancaman keselamatan pasien/klien.

### **4. *Planning (P)***

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dengan melaksanakan yang telah direncanakan, yaitu menjelaskan tentang keuntungan, keterbatasan, dan efek samping dari suntik depo progestin.

Pemantauan pada akseptor KB depo progestin dilakukan setiap bulan selama 2 kali, pemeriksaan dilakukan mencakup penimbangan BB, TTV, serta keluhan yang lain.

### **F. *Tinjauan Umum tentang Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam***

Keluarga Berencana adalah merupakan program pemerintah yang masih *debatable* kebolehanannya dalam Islam. Bahkan golongan Islam ekstrim menganggap KB merupakan propaganda orientalis agar umat Islam tidak menjadi besar jumlahnya serta menjadi kuat dan sulit ditaklukan. Sehingga, ada sebagian umat Islam yang menganggap KB haram dalam bentuk apapun (Pajarianto, H dan Ahmad, M, 2011: 187-188).

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang menjadi pedoman hidup umat Islam secara eksplisit yang melarang atau memerintahkan

untuk melaksanakan keluarga berencana. Karena itu, hukum keluarga berencana harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*qaidah fiqhiyah*), selain berpedoman pada kaidah hukum Islam tersebut di atas, umat Islam dapat menemukan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan indikasi, bahwa pada dasarnya Islam membolehkan kepada umatnya untuk ber-KB. Hukum KB dapat berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram, sebagaimana halnya hukum pernikahan bagi orang Islam yang hukum asalnya juga mubah. Namun, hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat atau negara (Maloko, 2013).

Pelaksanaan KB bukan hanya diperbolehkan dari segi medis melainkan juga dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi:

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Nisaa/4 : 9

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Kementrian Agama RI, 2013).

Dari kata ذُرِّيَّةً ضِعْفًا (dalam keadaan lemah) yakni hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak dan ahli waris yang lemah, janganlah sampai membuat wasiat yang akan membawa mudharat dan mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu. Hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan dibelakang mereka yakni setelah kematian mereka, anak-anak lemah itu karena

masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir tentang kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu, sehingga hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa depan (Shihab, 2002).

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KB di perbolehkan dalam Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Agar masa depan anak tidak terlantar yang pada akhirnya akan jadi masalah bagi masyarakat dan negara, dikarenakan pengeluaran negara bertambah akibat pertambahan penduduk yang besar dengan kondisi perekonomian yang lemah. maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut agar tidak berdosa dikemudiana hari bila meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah.

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan. Sistem interval, seperti yang tercantum dalam firman Allah swt Q.S surah Al- Baqarah /2 : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. (Kementerian Agama RI, 2013).

Dari ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya sejak kelahiran hingga dua tahun penuh. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama

dua tahun, walaupun diperintahkan, bukanlah suatu kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan lebih dari dua tahun karena dua tahun telah di nilai sempurna oleh Allah swt. (Shihab, 2002).

Pada kalimat para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi yang menyempurnakan penyusunan secara tidak langsung ayat ini menjelaskan bahwa dengan menyusui secara teratur dapat mencegah kehamilan (Qadariyah, 2012).

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hasyr/59: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Kementrian Agama RI).*

Dari Ayat tersebut, menyebutkan perintah bertaqwa kepada Allah (*ittaquLlaaha*) yang dimana taqwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari laranganNya. Pada ayat *وَأَنْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ* dan hendaklah seseorang melihat apa yang telah ia perbuat (di masa lalu) untuk hari esok. *Apakah kebajikan yang akan menyelamatkannya, atau kejahatan yang akan menjerumuskannya 'ghad'* sesuai dengan makna aslinya, yakni besok. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, yakni untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan.

Al-Quran dan hadis merupakan satu kesatuan dalam menjadi pedoman hidup bagi umat muslim, sehingga penggunaan kontrasepsi bukan hanya di benarkan dalam firman Allah tetapi juga di perkuat dalam sebuah hadis, sebagaimana terdapat sebuah hadist yang memperbolehkan kita untuk berKB. Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan dari Jabir ra:

كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ - وَفِي لَفْظِ آخَرَ: كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - إِلا لَهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيِّ لَهُ - اللّٰهُصَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا


Artinya:

“Kami pernah melakukan ‘*azl* (coitus interruptus) di masa Rasulullah s.a.w, sedangkan al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun (HR. Bukhari-Muslim dari Jabir). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan ‘*azl* (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim, yang bersumber dari ‘Jabir).

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan ‘*azl*’, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah *coitus interruptus*, karena itu meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat yang melakukannya, pada saat ayat-ayat al-Quran masih (selalu) turun, perbuatan tersebut dinilai ‘mubâh’ (boleh). Dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi s.a.w. ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliaupun tidak melarangnya, inilah pertanda bahwa melakukan ‘*azl* (*coitus interruptus*)’ dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.

Pencegahan kehamilan bukanlah pembunuhan dan bukan pula pengguguran janin, karena mani (nuthfah), yang darinya suatu janin diciptakan, bukannya

suatu makhluk manusia dengan sendirinya. Setelah mani bercampur dengan ovum wanita dalam proses pembuahan, janin terbentuk, yang seperti telah kami tunjukkan tidak akan menjadi makhluk bernyawa sebelum 120 hari. Pencegahan kehamilan adalah tindakan mencegah mani lelaki bercampur dengan ovum si wanita, dan ini bukanlah pembunuhan (firdayanti, 2012: 205). Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat Islam.



**BAB III**  
**STUDI KASUS**

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA  
NY

“M” AKSEPTOR LAMA DEPO PROGESTIN DENGAN AMENORHEA  
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR

TANGGAL 15 MEI 2017

No Register : 127xxx  
Tanggal Kunjungan : 15 Mei 2017 Jam : 10.15 Wita  
Tanggal Pengkajian : 15 Mei 2017 Jam : 10.20 Wita  
Nama Pengkaji : Nur Asia K

**A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**1. Identitas Istri / Suami**

Nama : Ny “M” / Tn “K”  
Umur : 33 tahun / 35 tahun  
Nikah : 1x / ± 14 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SD / SMP  
Pekerjaan : IRT /Buruh harian  
Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa Makassar

**2. Data Biologis / Fisiologis**

- a. Keluhan Utama : Tidak haid selama ± 1 tahun terakhir

b. Riwayat Keluhan :

- 1) Ibu menjadi akseptor suntikan Depo Progestin sejak tahun 2015
- 2) Ibu menggunakan KB suntik depo progestin selama 2 tahun, dan tahun pertama mengalami spotting dan 1 tahun berikutnya mengalami Amenorhea.
- 3) Keluhan yang menyertai: Kenaikan Berat Badan.
- 4) Usaha mengatasi keluhan : tidak ada

c. Riwayat Kesehatan yang lalu

Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, DM dan penyakit lainnya. Ibu tidak pernah menderita penyakit menular, Ibu tidak pernah menderita penyakit menurun, tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan.

d. Riwayat Kesehatan Keluarga

Tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes melitus, kanker dan penyakit jantung.

e. Riwayat Menstruasi

- 1) Menarche : 14 tahun
- 2) Siklus : 28 hari
- 3) Lamanya : 7 hari
- 4) Disminorhea : tidak ada

f. Riwayat Obstetrik

Ibu mempunyai 3 orang anak, anak pertama umur 12 tahun, anak kedua umur 10 tahun dan anak ketiga umur 2 tahun. Ibu tidak pernah mengalami keguguran

## g. Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan nifas yang lalu

Anak	Tahun	Kehamilan	Tempat	Jenis	JK	Nifas
1	2005	Aterm	Puskesmas	Spontan	Lk	Tdk ada penyulit
2	2007	Aterm	Puskesmas	Spontan	Pr	Tdk ada penyulit
3	2015	Aterm	Puskesmas	Spontan	pr	Tdk ada penyulit

## h. Riwayat Ginekologi

Ibu tidak pernah mengalami Penyakit Menular Seksual (PMS)

## i. Riwayat KB

Ibu jadi akseptor KB sejak tahun 2015, pada kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntik Depo Progestin, ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi lain selain KB suntik 3 bulan.

**3. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar.**

Ibu makan sebanyak 3 kali sehari dan minum air sebanyak 7-8 gelas sehari, nafsu makan baik. Ibu tidak mengalami gangguan sistem pencernaan dan sistem perkemihan, ibu BAB 1-2 kali sehari dan BAK 3-4 kali sehari. Ibu menjaga kebersihan dirinya dengan cara mandi dan sikat gigi sebanyak 2 kali sehari dan ibu mencuci rambutnya sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Ibu juga selalu menjaga kesehatan dan istirahat yaitu tidur siang sebanyak  $\pm$  1 jam dan tidur malam  $\pm$  7-8 jam.

**4. Data Psikologi dan Spiritual**

Ibu merasa cemas dengan apa yang dialaminya, Ibu belum ada rencana untuk hamil lagi, Pengambilan keputusan dalam keluarga dengan cara musyawarah, ibu

dan suaminya bersama dalam mengambil keputusan untuk berKB, ibu berkeyakinan bahwa tidak ada larangan dalam agama untuk berKB, ibu menjalankan shalat 5 waktu sehari.

### 5. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum ibu baik.
- b. Kesadaran composmentis.
- c. Tanda-tanda vital.

TD: 120/90 mmHg

N : 80 x/menit (beraturan)

P : 22 x/menit (beraturan)

S : 36,6 °C

- d. BB : 65 kg

- e. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

## 6. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan tes kehamilan plano test (Negatif)

### B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa: Akseptor KB suntik Depo progestin dengan *amenorhea*

#### a. Data Subjektif

ibu menjadi akseptor KB suntik depo progestin sejak 2015. Ibu mengatakan selama menjadi akseptor suntika Depo Progestin selalu mendapatkan haid bercak-bercak setiap bulan sebelum amenorhea.ibu mulai merasakan tidak haid 1tahun berturut-turut sejak bulan mei 2016 yang lalu. Ibu belum mempunyai rencana untuk hamil.

#### b. Data Objektif

Pada Kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan 3 bulan Depo Progestin. Plano test negatif (-).

c. Analisa dan Interpretasi Data

- 1) Salah satu jenis suntikan KB adalah Depo Progestin yang mengandung 150 mg Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA), diberikan setiap 3 bulan dengan cara suntik intra muskuler di daerah bokong (Affandi,2013).
- 2) Jenis suntikan Depo Progestin mengandung hormon progesteron yang dapat menghambat dan mencegah terjadinya pelepasan sel telur dari ovarium serta mengganggu keseimbangan endometrium, sehingga pertemuan antara sel sperma dan ovum juga terganggu, terjadi pengentalan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma (Affandi,2013).
- 3) Amenorhea dapat terjadi akibat stimulasi hormon progesteron berupa DMPA yang menyebabkan umpan balik negatif terhadap ovarium, hipotalamus dan hipofisis yang menyebabkan FSH dikeluarkan sangat sedikit yang tidak mampu menstimulasi ovarium dalam proses steroidogenesis dan oogenesis, sehingga efeknya adalah produksi E2 tidak banyak sehingga di dalam endometrium tidak terjadi proses proliferasi. Akibatnya, tidak terjadi menstruasi dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek *amenorhea* (camelia, 2013).

**C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa Masalah Potensial**

Masalah Potensial : Drop Out

a. Data Subjektif

Ibu menjadi akseptor KB depo progestin sejak tahun 2015 dan mendapatkan haid terakhir pada bulan Mei 2016. Ibu menggunakan KB suntik 3 bulan untuk mengjarakan kehamilan.

b. Data Objektif

Pada Kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan Depo Progestin.

c. Analisa dan Interpretasi Data

- 1) Apabila ibu merasa cemas dengan masalahnya, ibu dapat berhenti menggunakan KB suntikan 3 bulan dan beralih ke kontrasepsi yang lain (Titin,2015).
- 2) Amenorhea atau tidak datangnya haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor KB Depo progestin karena hal tersebut tidak membahayakan kesehatan dan bersifat sementara. Ketika suntikan dihentikan maka kesuburan akan kembali secara berangsur-angsur.
- 3) Hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu kadar puncak FSH dan LH, yang menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atropi sehingga menyebabkan penghambatan dari implantasi (Firdayanti, 2012).

#### **D. Langkah IV. Tindakan Segera atau Kolaborasi**

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan segera /konsultasi / kolaborasi / rujukan.

#### **E. Langkah V, Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan**

Diagnosa : Akseptor Lama Depo Progestin

Masalah Aktual : Amenorhea

Masalah Potensial : Drop Out

##### 1. Tujuan

- a. Agar ibu tetap menjadi akseptor KB selama waktu yang ditentukan.
- b. Ibu dapat beradaptasi dengan suntikan Depo Progestin.

##### 2. Kriteria

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- c. ibu mendapatkan suntikan secara teratur
- d. Ibu datang pada kunjungan berikutnya dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan suntikan ulang tanggal 08-08-2017

##### 3. Rencana tindakan

Tanggal 15 mei 2017 pukul 10.15 wita

- a. Sambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).

Rasional : Dengan 5S, akan terjalin hubungan baik antara klien dan petugas kesehatan selain itu ibu akan merasa nyaman.

- b. Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya

Rasional :Agar klien mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan masalah yang dialaminya.

- c. Jelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin

Rasional : mencegah kekhawatiran pada ibu bila terjadi efek samping.

- d. Beri tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

Rasional : Agar klien dapat kooperatif dalam setiap pelaksanaan tindakan.

- e. Berikan konseling pada ibu tentang penyebab amenorhea.

Rasional : Agar ibu tidak cemas dan khawatir.

- f. Anjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Rasional : Agar klien mendapatkan pertolongan secara dini dan tepat waktu.

- g. Meminta persetujuan secara langsung sebelum melakukan suntikan.

Rasional : Agar ibu merasa nyaman.

- h. Berikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM (intramuscular)

Rasional :Agar kebutuhan klien terpenuhi dalam kesinambungan pelayanan

- i. Anjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 15 Juli 2017.

Rasional : Suntikan diberikan setiap 90 hari atau 12 minggu untuk mencegah kehamilan sebagai akibat dari pemberian suntikan yang terlambat.

#### ***F. Langkah VI. Implementasi Tindakan***

Tanggal: 15 Mei 2017 pukul 10.15 wita

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).

2. Memberikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya
3. Menjelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntikan Depo Progestin
4. Memberi tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
5. Memberikan konseling pada ibu tentang penyebab amenorhea.
6. Mengajukan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.
7. Memberikan persetujuan secara langsung sebelum melakukan suntikan.
8. Memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM.
9. Mengajukan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal : 08 agustus 2017.

***G. Langkah VII. Evaluasi***

Tanggal: 15 Mei 2017 pukul 10.15 wita

1. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan kepadanya.
2. Ibu mengerti tentang penyebab amenorhea dan tidak merasa cemas dengan hal tersebut.
3. Ibu masih ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA.
4. Ibu bersedia datang kembali pada tanggal 08 Agustus 2017 untuk mendapatkan suntikan ulang.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA  
BERENCANA PADA NY "M" AKSEPTOR KB LAMA SUNTIK  
DEPO PROGESTIN DENGAN AMENORHEA  
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU  
TANGGAL 15 MEI 2017

No Register : 1274/ 15  
 Tanggal Kunjungan : 15 Mei 2017 Jam : 10.15 Wita  
 Tanggal Pengkajian : 15 Mei 2017 Jam : 10.20 Wita  
 Nama Pengkaji : Nur Asia K

**A. Identitas istri/suami**

Nama : Ny "M" / Tn "K"  
 Umur : 33 tahun / 35 tahun  
 Nikah : 1x / ± 14 tahun  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SD / SMP / SMP  
 Pekerjaan : IRT /Buruh harian  
 Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa makassar

**B. Subjektis (S)**

Ibu menjadi akseptor KB suntik DMPA sejak Mei 2015, ibu mengeluh haidnya tidak teratur sejak ber-KB, ibu tidak mendapatkan haid mulai bulan mei 2016 selama 1 tahun berturut-turut, ibu dan suaminya bersama dalam mengambil keputusan untuk ber-KB.

**C. Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.

2. Tanda-tanda vital:

TD : 120/90 mmHg

N : 80 x/menit (beraturan)

P : 24 x/menit (beraturan)

S : 36,6 °C

3. BB : 65 kg

4. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

c. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

## f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

## g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

Pada kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan DMPA 150 mg.

## j. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan kehamilan dengan pleno test (negatif)

**D. Assesment (A)**

Diagnosa : Akseptor Lama Depo Progestin

Masalah Aktual : Amenorhea

Masalah Potensial : Drop Out

**E. Planning (P)**

Tanggal : 15 Mei 2017

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).

Hasil : Ibu telah disambut dengan 5S.

2. Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya

Hasil : Agar klien mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan masalah yang dialaminya

3. Jelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin

Hasil : mencegah kekhawatiran pada ibu bila terjadi efek samping.

4. Memberitahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

Hasil : Ibu telah diberitahu.

5. Memberikan konseling pada ibu tentang penyebab amenorhea.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

6. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang kembali jika ada masalah.

7. Melakukan *informed consent* sebelum melakukan suntikan.

Hasil : Ibu setuju untuk disuntik.

8. Memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM.

Hasil : Ibu telah disuntikkan DMPA 150 mg secara IM.

9. Menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 08 agustus 2017.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA  
BERENCANA PADA NY "M" AKSEPTOR KB LAMA SUNTIK  
DEPO PROGESTIN DENGAN AMENORHEA  
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU  
TANGGAL 16 MEI 2017

**A. Identitas istri/suami**

Nama : Ny "M" / Tn "K"  
Umur : 33 tahun / 35 tahun  
Nikah : 1x / ± 14 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SD / SMP / SMP  
Pekerjaan : IRT /Buruh harian  
Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa Makassar

**B. Subjektis (S)**

Ibu mendapatkan haid terakhir pada bulan Mei tahun 2016 dan belum mendapatkan haid sampai sekarang.

**C. Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.

2. Tanda-tanda vital:

TD : 120/80 mmHg

N : 80 x/menit

P : 20 x/menit

S : 36,5 °C

3. BB : 65 kg

#### 4. Pemeriksaan fisik

##### a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

##### b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

##### c. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

##### d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

##### e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

##### f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

##### g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

#### **D. Assesment (A)**

Diagnosa : Akseptor Lama Depo Progestin

Masalah Aktual : Amenorhea

Masalah Potensial : Drop Out

**E. Planning (P)**

Tanggal : 16 mei 2017 pukul 13.00 wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Hasil : 5s telah diterapkan.

2. Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain *amenorhea*.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

3. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA  
BERENCANA PADA NY "M" AKSEPTOR KB LAMA SUNTIK  
DEPO PROGESTIN DENGAN AMENORHEA  
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU  
TANGGAL 15 JULI 2017

**A. Identitas istri/suami**

Nama : Ny "M" / Tn "K"  
Umur : 33 tahun / 35 tahun  
Nikah : 1x / ± 14 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SD / SMP / SMP  
Pekerjaan : IRT /Buruh harian  
Alamat : Jl. korban 40.000 jiwa makassar

**B. Subjektis (S)**

Ibu mendapatkan haid terakhir pada bulan mei tahun 2016 dan belum mendapatkan haid sampai sekarang. Ibu mengeluh masalah kenaikan berat badan

**C. Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Tanda-tanda vital:
  - TD : 120/80 mmHg
  - N : 80 x/menit (beraturan)
  - P : 20 x/menit (beraturan)
  - S : 36,5 °C

3. BB : 66 kg

4. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

c. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

**D. Assesment (A)**

Diagnosa : Akseptor Lama Depo Progestin

Masalah Aktual : Amenorhea dan kenaikan berat badan

Masalah Potensial : Drop Out

### **E. Planning (P)**

Tanggal : 15 Juli 2017 pukul 15.30 wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Hasil : 5s telah diterapkan.

2. Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain *amenorhea*.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

3. Memberikan konseling tentang perubahan berat badan

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Memberitahukan ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA  
BERENCANA PADA NY “M” AKSEPTOR KB LAMA SUNTIK  
DEPO PROGESTIN DENGAN AMENORHEA  
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU  
TANGGAL 07 AGUSTUS 2017

**A. Identitas istri/suami**

Nama : Ny “M” / Tn “K”  
Umur : 33 tahun / 35 tahun  
Nikah : 1x / ± 14 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SD / SMP / SMP  
Pekerjaan : IRT /Buruh harian  
Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa makassar

**B. Subjektis (S)**

Ibu mendapatkan haid terakhir pada bulan mei tahun 2016 dan belum mendapatkan haid sampai sekarang.

**C. Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.

2. Tanda-tanda vital:

TD : 120/80 mmHg

N : 80 x/menit (beraturan)

P : 22 x/menit (beraturan)

S : 36,5 °C

3. BB : 66 kg

4. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

c. mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

**D. Assesment (A)**

Diagnosa : Akseptor Lama Depo Progestin

Masalah Aktual : Amenorhea

Masalah Potensial : Drop Out

### **E. Planning (P)**

Tanggal : 07 Agustus 2017 pukul 09.30

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Hasil : 5s telah diterapkan.

2. Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain *amenorhea*.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

3. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

4. Anjurkan ibu agar datang kembali ke Puskesmas Jumpandang Baru untuk melakukan penyuntikan ulang depo progestin pada esok hari

Hasil : Ibu bersedia dilakukan penyuntikan ulang suntik 3 bulan

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil studi pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny “M” akseptor KB suntik lama depo progesterin dengan *amenorhea* di Puskesmas Ujung Pandang Baru tanggal 15 Mei – 07 Agustus 2017.

Penulis akan menguraikan berdasarkan 7 langkah Varney dan SOAP dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang dimulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada kasus Ny “M”.

#### **A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar**

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan langkah pertama dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang / laboratorium (Manguji dkk, 2012: 5).

KB suntik 3 bulan yaitu salah satu jenis kontrasepsi suntik yang hanya mengandung hormon *progesterone* / progestin yang disuntikkan setiap 3 bulan sekali. Mengandung 150 mg *Depo Medroksiprogesteron Asetat* (DMPA) yang diberikan dengan cara disuntik intramuskular (di daerah bokong) (Sulistyawati, 2012: 75).

Menurut Biran Affandi (2013), yang boleh menggunakan KB suntik depo progestin adalah usia reproduksi, remaja dan yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektifitas tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, setelah melahirkan, setelah abortus atau keguguran, telah banyak anak, tetapi belum menghendaki tubektomi, tekanan darah <129/90 mmHg, dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit, tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung *estrogen*, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi, mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi, dan menyarankan bahwa pencegahan kehamilan hanya pada keadaan darurat dan dibolehkan dengan syarat persetujuan pasangan serta tidak mendapatkan mudarat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan bahwa, sebenarnya dalam Islam tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan KB.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan Pada kasus Ny. "M" Pengumpulan data awal dilakukan dimulai dari data subjektif dan objektif. Data subjektif antara lain identitas istri/ suami, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. Riwayat KB, riwayat kesehatan dan pola kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, pola istirahat, personal hygiene, aktivitas dan data psikososial, ekonomi dan spritual. Adapun

data subjektif yang didapatkan pada saat menanyakan identitas klien yaitu nama Ny "M" berumur 33 tahun sebagai ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD dan alamat di jalan korban 40.000 jiwa Makassar rencana ibu datang kerumah sakit yaitu ingin memakai KB suntik 3 bulan, ibu memiliki riwayat menstruasi dan tidak pernah mengalami disminorhea, selama memakai suntik 3 bulan ibu tidak pernah merasa terganggu dengan aktifitas setiap harinya.

Ibu tidak memiliki riwayat penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes melitus, kanker payudara dan penyakit jantung, tidak pernah diopname dirumah sakit ataupun puskesmas, tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan. Ibu telah membicarakan kepada suami dan keluarganya untuk keinginannya ber- KB dan suami setuju apabila istrinya menggunakan KB suntik untuk menjarangkan kehamilannya. Suami ikut mengambil peran dalam memberikan motivasi kepada ibu agar ibu tetap menjadi akseptor KB suntik depo progestin.

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada Ny "M" yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, berat badan sekarang 65 kg, Pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu tekanan darah 120/90, didapti hasil dengan cara meggunakan tensi meter, kemudian nadi 80 x/menit dan teratur, suhu diukur pada aksila 36,6°c, pernafasan 24 x/menit. Pemeriksaan fisik pada wajah tidak ditemukan oedema, tidak pucat dan tidak ada kelainan, tampak pada mata kongjungtiva berwarna merah dan sclera tidak ikterus. Dada simetris kanan dan kiri, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, radang dan luka pada payudara, tidak terdapat luka bekas operasi, tidak ada pembesaran uterus, Ekstermitas atas dan bawah tidak cacat, tidak terdapat oedema dan varises, pada pemeriksaan tes kehamilan di dapati plano test negatif. Pada kunjungan ulang tgl 16 mei 2017 melakukan

pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil TD 120/80 mmHg, nadi 80 x/i, suhu 36,5°c, pernapasan 20x/i dan BB 66 kg. Pada kunjungan kedua tgl 15 juli 2017 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36,5°c dan BB 66 kg. Pada kunjungan ketiga tanggal 07 agustus 2017 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 22x/i, suhu 36,5°c, BB 66 kg

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan indikasi suntik 3 bulan antara teori dengan kasus sehingga penulis tidak ada hambatan yang berarti karena pada saat pengumpulan data baik klien, bidan dan dokter di lokasi praktek bersedia memberikan informasi atau data dan keinginan ibu sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

Dapat disimpulkan bahwa pada kasus Ny. "M" yang dikumpulkan dari hasil pengkajian yaitu ibu ingin memakai KB suntik 3 bulan depo progestin untuk menjarangkan kehamilannya dalam jangka panjang. Memperhatikan uraian tersebut di atas dengan apa yang dijelaskan pada konsep dasar dan yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

#### **B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual**

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. (Nurhayati dkk, 2013). Dalam langkah ini data yang di interpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien. Manajemen kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif yang diperoleh dari hasil pengkajian Ny "M"

maka penulis merumuskan diagnosa masalah aktual akseptor KB Suntik depo progesterin dengan amenorrhea dan masalah potensial pada akseptor KB depo progesterin dengan *amenorhea* adalah drop out.

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan (purwoastuti, 2015: 182), sedangkan sumber lain mengemukakan Menurut WHO (*Expert committee, 1970*), tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Pada ny”M” menyatakan ingin memakai KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilannya.

Amenore sekunder didefinisikan saat siklus haid menghilang selama 6 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi tidak teratur atau selama 3 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi teratur (Chiavaroli, V. 2011:427). *Amenorhea* dapat terjadi akibat stimulasi hormon progesteron berupa *DMPA* yang menyebabkan umpan balik negatif terhadap ovarium, hipotalamus dan hipofisis yang menyebabkan *FSH* dikeluarkan sangat sedikit yang tidak mampu menstimulasi ovarium dalam proses *steroidogenesis* dan *oogenesis*, sehingga efeknya adalah produksi estrogen dan endogen (*E2*) tidak banyak sehingga di dalam endometrium tidak terjadi proses proliferasi. Akibatnya tidak terjadi menstruasi dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek *amenorhea*. atau

*DMPA* mengakibatkan makin berkurangnya perdarahan dalam setiap siklus. Jika terus digunakan selama lebih dari dua tahun maka haid akan berhenti atau *amenorhea* (Bilings, 2007). Kadar estrogen yang rendah menghambat pertumbuhan endometrium. Keadaan *hipoestrogen* yang terus menerus menyebabkan endometrium menjadi dangkal dan *atrofis* dengan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif. Pada pemakaian jangka panjang endometrium dapat menjadi semakin sedikit, sehingga tidak didapatkan sedikit sekali jaringan apabila dilakukan biopsi sehingga menyebabkan *amenorhea*. Tetapi perubahan-perubahan tersebut akan menjadi normal dalam waktu 90 hari setelah suntikan *DMPA* yang terakhir.

Masalah/diagnosa *amenorhea* ditetapkan berdasarkan Ny “M” mengeluh haidnya tidak teratur yaitu tidak haid selama 1 tahun berturut-turut sejak Mei 2016 pemakaian KB suntik Depo progestin. Secara teori *amenorhea* merupakan tidak datangnya haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih selama akseptor mengikuti KB. *amenorhea* dapat terjadi akibat pemakaian kontrasepsi suntik yang berisi *DMPA*.

Masalah kenaikan berat badan juga ditetapkan berdasarkan hasil penimbangan BB Ny “M” yaitu pada bulan pertama BB Ny “M” yaitu 65 kg dan bulan berikutnya naik menjadi 66 kg, dalam hal ini teori menjelaskan bahwa kenaikan berat badan disebabkan mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, akibatnya pemakaian suntik dapat menyebabkan kenaikan berat badan

bertambah. Sedangkan masalah spotting ditetapkan berdasarkan Ny “M” mengeluh haid sedikit-sedikit setelah kurang lebih +1 tahun mengalami haid sedikit, haid yang ibu alami hanya bercak-bercak yang berlangsung selama lebih dari 1 minggu dan ibu tidak memakai pembalut saat haid karena jumlahnya sangat sedikit.

*Amenorhea, Spotting* dan kenaikan berat badan merupakan salah satu efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA 150 mg, masalah *Amenorhea, Spotting* dan kenaikan berat badan merupakan hal yang biasa terjadi pada akseptor KB suntikan DMPA dan tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu kesehatan.

Penerepan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny “M” secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Ny “M” ingin memakai KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilannya dan telah membicarakan kepada suami dan keluarga untuk keinginannya ber-KB. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dan laboratorium normal sehingga diagnosa yang ditegakkan yaitu Ny “M” dengan akseptor suntik 3 bulan dengan *amenorhea*. Apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampak tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

### **C. Langkah III. Identifikasi Masalah Potensial**

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau

diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi, berdasarkan temuan tersebut, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien.

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian pada klien yang mengalami amenorhea yaitu klien akan drop out. Apabila ibu merasa cemas dengan masalahnya ibu dapat berhenti menggunakan suntik depo progestin sehingga dapat terjadi kehamilan atau ibu bisa beralih ke kontrasepsi yang lain (Titin, 2015). *Amenorhea* atau tidak datangnya haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor KB suntik depo progestin karena hal tersebut tidak membahayakan kesehatan dan bersifat sementara. Ketika suntikan di hentikan maka kesuburan akan kembali secara berangsur-angsur.

Hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu kadar puncak FSH dan LH, yang menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atrofi sehingga menyebabkan penghambatan dari implantasi (firdayanti, 2012). Jadi penggunaan depo progestin yang cukup lama mengakibatkan endometrium menjadi atrofi sehingga setiap bulan terjadi pendarahan sedikit-sedikit, dan berlangsung beberapa tahun dan terjadi atrofi endometrium mengakibatkan infertilitas.

#### **D. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi**

Menurut Mangkuji dkk (2012), perlunya tindakan segera dan kolaborasi dilakukan jika klien mengalami efek samping atau keluhan yang mengancam maka dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya

untuk menangani akseptor KB suntik 3 bulan. Tidak ada data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian tidak ada data yang mendukung untuk melakukan tindakan segera dan atau kolaborasi.

Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny “M” secara garis besar tampak ada persamaan yaitu tidak perlu dilakukan kolaborasi, jika tidak ada efek samping yang mengancam, sehingga apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

#### **E. Langkah V. Rencana Tindakan**

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya. Menurut HPTM (2011), salah satu syarat untuk mencegah kehamilan yaitu dengan adanya persetujuan pasangan, agar tidak mendapatkan mudarat jasmani dan rohani.

Dalam membuat rencana tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah aktual dan masalah potensial).

Secara teori penatalaksanaan *amenorhea* yaitu sangat penting untuk menjelaskan kepada klien penyebab terjadinya amenorhea, klien perlu memahami bahwa gejala atau keluhan tersebut merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan.

Pada kondisi tertentu jika klien tidak dapat menerima keadaan tersebut maka dianjurkan untuk mengganti dengan metode kontrasepsi lain.

Pada kasus Ny “M” ingin menjadi akseptor KB penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa masalah aktual. Menurut Saifuddin (2010), yaitu Lakukan pendekatan pada ibu/klien dan suami serta keluarga, berikan kesempatan pada klien untuk mengemukakan masalahnya jelaskan tentang suntik 3 bulan (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan kekurangan, efek samping suntik 3 bulan). Lakukan permintaan persetujuan sebagai bukti bahwa ibu dan suaminya setuju dengan tindakan yang akan dilakukan, jelaskan kepada klien tentang hasil pemeriksaan,

Pada kasus Ny “M” tujuan yang ingin dicapai yaitu agar ibu ingin tetap menjadi akseptor KB suntik depo progestin, kriteria keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu mendapatkan suntikan KB secara teratur dan ibu datang pada kunjungan berikutnya dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun rencana tindakan yang akan dilakukan pada Ny “M” akseptor KB suntik depo progestin dengan *amenorhea* yaitu : Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S), Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya, Jelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin, yaitu Keuntungan suntikan Depo Progestin yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak terpengaruh pada hubungan suami istri, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia >35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan

ektopik, mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul, menurunkan krisis anemia bulan sabit (*sickle cell*). sedangkan kerugian/keterbatasan suntik depo progestin yaitu gangguan siklus haid, haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, *spotting* atau tidak haid sama sekali, tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu, permasalahan berat badan efek yang paling sering, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang (*densitas*), pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat (Rahma, 2012: 182). memberi tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, bahwa akan dilakukan penyuntikan di daerah bokong ibu, menjelaskan pada ibu tentang penyebab amenorhea, spotting dan kenaikan berat badan untuk mencegah kekhawatiran pada ibu, Suntik depo progestin dengan gangguan haid berupa *amenorhea* disebabkan oleh progesteron dalam komponen *Depo Medroksi Progesteron Asetat* (DMPA) menekan *Luteinizing Hormone* (LH). Meningkatnya DMPA dalam darah akan menghambat LH, perkembangan folikel dan ovulasi selama beberapa bulan. Selain itu, DMPA juga mempengaruhi penurunan *Gonadotropin Releasing Hormone* (GnRH) dari hipotalamus yang menyebabkan pelepasan *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH) dari hipofisis anterior berkurang. Penurunan FSH akan menghambat perkembangan folikel sehingga tidak terjadinya ovulasi atau pembuahan. Pada pemakaian DMPA menyebabkan endometrium menjadi lebih dangkal dan atropis

dengan kelenjar- kelenjar yang tidak aktif sehingga membuat endometrium menjadi kurang baik atau tidak layak untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi (Riyanti, 2011: 8). Sedangkan pada kenaikan berat badan disebabkan karena hormon progesteron mempercepat perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak sehingga. Sehingga lemak di bawah kulit bertambah, selain itu hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktifitas fisik, akibatnya pemakain suntikan dapat menyebabkan berat badan bertambah. menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya agar klien mendapatkan pertolongan secara dini dan tepat waktu, melakukan *informed consent* sebelum melakukan suntikan agar ibu merasa nyaman, memberikan suntikan DMPA 150 mg secara IM agar kebutuhan klien terpenuhi dalam kesinambungan pelayanan KB, memastikan ibu akan tetap memakai suntikan DMPA 150 mg, menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2017 karena suntikan diberikan setiap 90 hari atau 12 minggu untuk mencegah kehamilan sebagai akibat dari pemberian suntikan yang terlambat. Pada tahap ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan KB

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada klien untuk memantau keadaannya setelah memakai suntik 3 bulan depo progestin dan diberikan sesuai dengan keluhan yang dirasakan klien akseptor KB suntik 3 klien

1. Kunjungan pertama tanggal 16 mei 2017

ibu mengeluh mendapatkan haid terakhir pada bulan mei 2016 dan belum mendapatkan haid hingga sekarang. keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 24x/i, suhu 36,5°C, BB 65 kg, wajah tidak pucat,tidak ada edema, konjungtiva merah muda,sclera putih,tidak terdapat luka bekas operasi dan tidak ada pembesaran uterus.

Rencana asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5 S ( senyum, sapa, salam, sopan dan santun). Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian sutikan 3 bulan yaitu *amenorhea* (tidak datangnya haid tiap bulan) dan efek samping yang di timbulkan DMPA selain Amenorhea yaitu perubahan berat badan, pusing/sakit kepala/ migran, keputihan. Mengajukan kepada ibu agar datang ketempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsi.

## 2. Kunjungan kedua tanggal 15 juli 2017

ibu mengeluh mendapatkan haid terakhir pada bulan mei 2016 dan belum mendapatkan haid hingga sekarang. keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/90 mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 24x/i, suhu 36,5°C, BB 66 kg, wajah tidak pucat,tidak ada edema, konjungtiva merah muda,sclera putih,tidak terdapat luka bekas operasi dan tidak ada pembesaran uterus.

Rencana asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5 S ( senyum, sapa, salam, sopan dan santun). Memberikan

konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan 3 bulan yaitu *amenorhea* (tidak datangnya haid tiap bulan) dan efek samping yang di timbulkan DMPA selain Amenorhea yaitu perubahan berat badan, pusing/sakit kepala/ migran, keputihan. Mengajukan kepada ibu agar datang ketempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsi.

### 3. Kunjungan ke 3 tanggal 07 agustus 2017

ibu mengeluh mendapatkan haid terakhir pada bulan mei 2016 dan belum mendapatkan haid hingga sekarang. keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 24x/i, suhu 36,5°C, BB 66 kg, wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi dan tidak ada pembesaran uterus.

Rencana asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain *amenorrhea*. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya. Anjurkan ibu agar datang kembali ke puskesmas jumpandang baru untuk melakukan penyuntikan ulang depo progesterin pada esok hari.

#### **F. Langkah VI. Implementasi**

Tindakan asuhan kebidanan berdasarkan dengan perencanaan asuhan kebidanan yang telah dibuat dilaksanakan seluruhnya dengan baik di Puskesmas JUMPANDANG BARU tahun 2017. Sehingga penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari ibu dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan arahan pembimbing dari lahan praktek. Pada kasus Ny “M” dilakukan implementasi yaitu:

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).
2. Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya
3. Memberi tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
4. Memberikan konseling pada ibu tentang penyebab *amenorhea*, *spotting* dan kenaikan berat badan.
5. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.
6. Melakukan *informed consent* sebelum melakukan suntikan dan ibu setuju untuk disuntik.
7. Memberikan suntikan DMPA 150 mg secara IM pada daerah bohong ibu 1/3 SIAS (*Spina Illiaca Anterior Superior*).
8. Memastikan bahwa ibu akan tetap menjadi akseptor KB suntikan DMPA sampai batas yang ditentukan.
9. Menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2017.

### **G. Langkah VII. Evaluasi**

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang telah diberikan kepada klien dengan pedoman dan tujuan serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada kasus Ny “M” dilakukan evaluasi yaitu:

- a. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan.
- b. Ibu mengerti dengan efek samping dari suntikan DMPA 150 mg.
- c. Ibu masih ingin menjadi akseptor suntikan DMPA.
- d. Ibu bersedia datang kembali pada tanggal yang telah ditentukan untuk mendapatkan suntikan ulang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah mempelajari teori, konsep dan prinsip-prinsip serta tinjauan pustaka dari hasil pengkajian Manajemen Asuhan keluarga berencana pada Ny “M” Akseptor suntikan 3 bulan Depo Progestin dengan *amenorhea* di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tanggal 15 MEI 2017 April s/d 07 agustus Juli 2017, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengumpulan data dasar dilakukan dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada ibu. Data subjektif saat ini ibu mengeluh tidak pernah haid selama menggunakan KB suntik 3 bulan. Data objektif pada kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan 3 bulan.
2. Pada Ny “M” didapatkan bahwa sejak menggunakan suntikan depo progestin mengalami amenorhea.
3. Diagnosa Ny “M” ditegakkan berdasarkan adanya keluhan haid tidak teratur yaitu ibu tidak mengalami haid selama 1 tahun berturut-turut atau lebih.
4. Pada Ny “M” ada data yang menunjang untuk terjadinya masalah potensial yaitu drop out
5. Pada Ny “M” tidak perlu dilakukan tindakan segera karena tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi.

6. Tindakan yang dilakukan pada Ny “M” bertujuan agar ibu tetap mempertahankan untuk menjadi akseptor KB suntik depo progestin dan melakukan suntikan ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
7. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang dilakukan tercapai dengan adanya kerja sama antara bidan dengan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.
8. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah asuhan yang diberikan berhasil atau tidak.

## **B. Saran**

1. Untuk Klien
  - a. Mengingatkan pada ibu agar memperhatikan kapan ibu harus kembali untuk mendapatkan suntikan ulang.
  - b. Ibu harus mengerti dan mengetahui dengan jelas apakah efek samping dari alat kontrasepsi yang digunakan.
2. Untuk Bidan
  - a. Bidan dalam memberikan konseling kepala akseptor KB lebih diarahkan kepada mekanisme kerja dan efek samping yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi.
  - b. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam penerapan kasus keluarga berencana pada umumnya dan metode kontrasepsi suntikan pada khususnya.
  - c. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi dan penanggulangan efek samping secara dini yang dialami oleh akseptor.

### 3. Untuk Institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya pembelajaran tentang penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan profesional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Sukawati. *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2014
- Afandi, Biran. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Edisi 3: Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo. 2013.
- Arum, Erika, dkk. *Pola Menstruasi Pada Akseptor KB Suntik 3 Bulan*. *Jurnal Kebidanan Volume 9 no.(1 Maret 2015)*, (diakses 11 mei, 2017)
- Ayu, dkk. *Ilmu kebidanan penyakit kandungan dan kb*. Edisi 2: jakarta: EGC.2014.
- Biran, Erdjan. *Ilmu Kandungan*. PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; Jakarta. 2011
- Camelia, Rezki. *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "S" Akseptor Depo Progestin dengan Amenorhea: Makassar*. 2013
- Departement Agama, RI. *AL-Quran Dan Terjemahannya Bandung*. Diponegoro, 2012
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Official Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (diakses 28 mei 2017 pukul 21.00 WITA
- Everett, Suzanne. *Buku Saku Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi*. Edisi Kedua: Jakarta: EGC. 2012.
- Firdayanti. *Unmeet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Kementrian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan*. Jakarta. 2014
- Klein, AD. "Amenorhea: An Approach to Diagnosis and Management." *American Family Physician*, vol.87 no. 3 (Juni 1, 2013). (Diakses 10 Mei 2017).
- Marfuah. *KTI Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Klien Akseptor Suntikan Depo Progestin dan Kenaikan Berat Badan*. Makassar. 2012.
- Maloko, Thahir. *Ar-Radha'ah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*. Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Mangkuji, Betty. dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta : EGC, 2012.

- Mustikawati, ari. "*Gambaran tingkat pengetahuan akseptor KB suntik tentang efek samping pemakaian KB suntik depo-provera di BPM Yuliana Banaran Sragen*". Surakarta. 2015.
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika, 2013
- Pajarianto,Hadi dan Mardiana Ahmad. *Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan*. Makassar : Pustaka Refleksi, 2011.
- Purwoastuti, Endang. dan Elisabeth Siwi, Walyani. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Puskesmas Jumpandang Baru Makassar *Data akseptor KB dan klien yang mengalami amenorhea pada tahun 2016 di Puskesmas jumpandang Baru*. 2017
- Prihatin Ningsih Mahdalena dan Lisa Rahmawati "*faktor-faktor yang mempengaruhi kurang partisipasi PUS dalam memilih metode kontrasepsi pria di desa Pauh timur wilayah kerja Puskesmas kota pariaman*" Padang. 2015
- Qadariyah, Nur. "*Manajemen Asuhan KebidananSn Keluarga Berencana pada Ny "N" Akseptor Suntikan Depo Progesterin dengan Efek Samping di Puskesmas Plus Bara-baraya.*" KTI, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. 2012.
- Rahma, Andi Siti. *Fisiologi Laktasi*. Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Rahmawati, Siti. "*Asuhan kebidanan pada akseptor KB suntik 3 bulan Dengan Amenorhea Di Pustu Desa Karangampel Kecamatan BAREGBEG Kabupaten Ciamis*". Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis, 2016.
- Riyanti, Septi, handoko Riwidikdo dan Afroh Fauziah "*Hubungan Lama Penggunaan Depo Medroxyprogesterone Acetat Dengan Kejadian Amenorea Sekunder Pada Akseptor Kb Suntik Di Bps Sumarni Pundong Bantul Yogyakarta*". Yogyakarta. 2011. (diakses tanggal 10-Mei-2017).
- Siti. Mulyani nina dan Mega Rinawati. *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*. Yogyakarta: Nuha Medica. 2013.
- Sulistyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medica. 2012.
- Shihab, M Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sundari. "Gambaran tingkat kepuasan PUS terhadap pemakaian KB suntik 3 bulan di BPM Lilik Rukiyah , Di desa lembeyan wetan kab. Magetan" Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun, 2016.

Suratun, dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: TIM.2013.

Taufika, Yuhedi Lucky dan Titik Kurniawati. *Kependudukan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC. 2015.

Titin, Windi. 2015. *Gambaran Lama Penggunaan KB Suntik Depo Progestin Dengan Kejadian Amenorhea Sekunder*. *Midwiferia/Vol.1;No.1/April 2015*.(diakses Kamis 11 Mei 2017)

Varney, Helen dkk. *Varney's midwifery. America*: Jones and Bartlet publishers. 2003.

Yeti, Sri. 2014. *Tinjauan Lama Pemakaian Kontrasepsi DMPA Berdasarkan Kejadian Amenorhea Gaster Vol.11 No.2 Februari 2014* (diakses Kamis, 11 Mei 2017).

GAMBAR KUNJUNGAN



Kunjungan tanggal 16 mei 2017



Kunjungan tanggal 16 mei 2017



Kunjungan tanggal 15 juli 2017



Kunjungan tanggal 15 juli 2017



Kunjungan tanggal 07 agustus  
2017



Kunjungan tanggal 07 agustus  
2017

Nomor : B-049 /FKIK/PP.00.9/05/2017  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 05 Mei 2017

Kepada Yth.  
**Gubernur Prop. Sulawesi Selatan**  
**Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.**  
di-  
Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Nur Asia  
NIM : 70400114066  
Program Studi : Kebidanan  
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Klien Akseptor Lama Depoprogestin Dengan Aminore.  
Tempat Penelitian : Puskesmas Jumpandang Baru  
Dosen Pembimbing : 1. Anieq Mumthia Al Kautsar, S.SiT., M.Keb.  
2. dr. Rini Fitriani, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam  
an. **Dekan,**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.**  
NIP. 19810405 200604 2 003

**Tembusan :**

- 1.Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
- 2.Masing-masing Pembimbing
- 3.Mahasiswa yang bersangkutan.
- 4.Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7915/S.01P/P2T/06/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.850/FKIK/PP.00.9/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR ASIA**  
Nomor Pokok : 70400114066  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA KLIEN AKSEPTOR LAMA DEPOPROGESTIN DENGAN AMINORE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juni s/d 06 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 06 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN

JL. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221



Nomor : 440/26.22/PSDK/ VII /2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth,

Ka.Puskesmas Jumpangang baru

Di-

Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik ,No. 070/2322 - II/BKBP/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017, perihal tersebut di atas,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

NAMA : Nur Asia  
NIM : 70400114066  
JURUSAN : D III Kebidanan  
INSTITUSI : UIN Makassar  
JUDUL : Manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana pada klien akseptor lama Depoerogestin dengan Amnorhea

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja saudara, yang akan di laksanakan mulai tanggal 22 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017.  
Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih

Makassar, 4 Juli 2017  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar



dr. H. A. NAISYAH T. AZIKIN, M.Kes  
Nip.19601011198902 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS/RSP I JUMPANDANG BARU**



Jalan Ir.H.Juanda No. 1. ☎. (0411) 448359 Fax. (0411) 421154 Email :  
[pkmjumbar@yahoo.co.id](mailto:pkmjumbar@yahoo.co.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 277 /PKM-JB/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dengan ini, menerangkan bahwa :

Nama : NUR ASIA  
NIM / Jurusan : 70400114066/ KEBIDANAN  
Instansi / Fakultas : MAHASISWA (D3) UIN MAKASSAR

Benar telah melakukan PENELITIAN sejak tanggal 22 Juni S/D 31 Juli 2017 di Puskesmas Jumpandang Baru, dalam rangka penyelesaian KTI dengan judul :  
**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA KLIEN AKSEPTOR LAMA DEPOPROGESTIN DENGAN AMENORHEA DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Makassar, 29 Agustus 2017

Kepala Puskesmas/RSP I Jumpandang Baru



dr. Hj. Ehy Murtini, M. Kes

NIP. 19591110 198911 2 001

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penelitian

Nama :Nur Asia Karim  
Nim :70400114066  
T.T.L :Ujung Pandang, 19 Juli 1994  
Suku :Makassar  
Agama :Islam  
Alamat :Jln Regge 2 Lr 3 no 2  
Nama Orang Tua  
a. Ayah :Abd Karim  
b. Ibu :St Halima

### B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 71 Makassar :2000-2006  
SMP Negeri 4 Makassar :2006-2009  
SMA Negeri 16 Makassar :2009-2012  
UIN Alauddin Makassar :2014-2017

