

**PENENTUAN WAKTU OPTIMUM PERENDAMAN UMBI DAN DAUN
SINGKONG PAHIT (*Manihot Esculenta Crantz*) DENGAN KALSIUM
HIDROKSIDA ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) DAN PENGUKUSAN TERHADAP
PENURUNAN KADAR ASAM SIANIDA (HCN)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Sains Kimia Jurusan Kimia
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

NUR ILMI USMAN
NIM: 60500113013

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ilmi Usman
NIM : 60500113013
Tempat/tgl. Lahir : Pinrang/30 Januari 1995
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul Skripsi : Penentuan Waktu Optimum Perendaman Umbi dan Daun Singkong Pahit (*Manihot Esculenta* Crantz) dengan Kalsium Hidroksida (Ca(OH)_2) dan Pengukusan Terhadap Penurunan Kadar Asam Sianida (HCN)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa November
2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penyusun

Nur Ilmi Usman
NIM: 60500113013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penentuan Waktu Optimum Perendaman Pada Umbi dan Daun Singkong Pahit (*Manihot Esculenta Crantz*) dengan Kalsium Hidroksida (Ca(OH)_2) dan Pengukusan Terhadap Penurunan Kadar Asam Sianida (HCN)” yang disusun oleh Nur Ilmi Usman, NIM: 60500113013 mahasiswa jurusan kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 27 November 2017 bertepatan 8 Rabi’ul-Awwal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 27 November 2017
8 Rabi’ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M. HI	(.....)
Sekretaris	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Aan Parhani, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Firnanelty, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP: 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penentuan Waktu Optimum Perendaman Umbi dan Daun Singkong Pahit (*Manihot Esculenta* Crantz) dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)_2) dan Pengukusan Terhadap Penurunan Kadar Asam Sianida (HCN)”, dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban tertulis untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. Usman Tjokke, S.Ag dan Almarhuma ibunda Muliana Haleda terima kasih untuk nasehat, motivasi serta dukungan yang selalu membangkitkan semangat untuk ananda tercinta. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan menjaga mereka, terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Musafir Pababbari M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof Dr. Arifuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph. D. Selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus dosen penguji I

4. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si, dan Firnanelty, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan batuan serta saran selama proses pengajuan waktu dan memberikan bantuan serta saran selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan skripsi ini.
5. Bapak H. Asri Saleh, S.T.,M.Si dan Bapak Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen dan staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Para Laboran Jurusan Kimia, kak Awaluddin Ip, S. Si., M.Si. kak Ahmad Yani, S.Si. kak Andi Nurahma, S.Si. kak. Fitria Aziz, S.Si., S.Pd. kak Nuraini, S.Si dan terkhusus kak Ismawanti, S.Si. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
8. Teman seperjuangan angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi selama penelitian dan rekan penelitian sekaligus saudara saya (Nur Ilma Usman) yang senantiasa menemani dari awal hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Akhir kata Penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Amin ya Rabbal Alamin

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Samata-Gowa, November 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Singkong (<i>Manihot Esculenta</i> Crantz).....	7
B. Tinjauan Asam Sianida (HCN).....	11
1. Sianida (CN)	11
2. Toksikologi Asam Sianida (HCN)	12
3. Mengurangi Kandungan Asam Sianida (HCN).....	13
C. Tinjauan Kalsium Hidroksida (Ca(OH) ₂).....	16
D. Spektrofotometer UV-Vis.....	18

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat.....21

B. Alat dan Bahan.....21

C. Prosedur Penelitian.....22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....26

B. Pembahasan.....28

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....38

B. Saran38

DAFTAR PUSTAKA.....39

LAMPIRAN42-68

BIOGRAFI



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1. Kandungan unsur gizi pada umbi singkong.....	9
Tabel 4.1. Analisis kadar air.....	26
Tabel 4.2. Hasil uji kualitatif asam sianida (HCN)	26
Tabel 4.3. Hasil penentuan kadar awal umbi dan daun singkong pahit.....	27
Tabel 4.4. Hasil penentuan waktu optimum perendaman pada umbi singkong.....	27
Tabel 4.5. Hasil penentuan waktu optimum perendaman pada daun singkong.....	27
Tabel 4.6. Hasil penentuan waktu optimum pengukusan pada umbi singkong.....	28
Tabel 4.7. Hasil penentuan waktu optimum pengukusan pada daun singkong.....	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Gambar singkong.....	7
Gambar 4.1. Reaksi antara ion sianida dan H ₂ O	30
Gambar 4.2. Reaksi pembentukan Natrium Pikrosianat	30
Gambar 4.3. Hidrolisis linamarin menjadi asam sianida	32
Gambar 4.4. Reaksi antara (HCN) dan (Ca(OH) ₂)	33
Gambar 4.5. Kurva penentuan waktu optimum perendaman pada umbi dan daun...33	33
Gambar 4.6. Kurva penentuan waktu optimum pengukusan pada umbi dan daun...36	36
Gambar 6.1. Hubungan antara absorbansi dan konsentrasi.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Bagan Kerja.....	42
Lampiran 2: Skema Kerja.....	43
Lampiran 3: Perhitungan Pembuatan Pereaksi.....	48
Lampiran 4: Perhitungan Pembuatan Standar.....	50
Lampiran 5: Perhitungan Analisis Kadar Air.....	51
Lampiran 6: Perhitungan Analisis Kuantitatif.....	54
Lampiran 7: Dokumentasi Tahap Pengambilan Sampel.....	62
Lampiran 8: Dokumentasi Pembuatan Kertas Pikrat.....	63
Lampiran 9: Dokumentasi Analisis Kualitatif.....	64
Lampiran 10: Dokumentasi Analisis Kuantitatif.....	66
Lampiran 11: Dokumentasi Kadar Air.....	68

ABSTRAK

Singkong atau ubi kayu (*Manihot Esculenta Crantz*) merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Tingginya kandungan karbohidrat pada singkong dapat menjadi salah satu alternatif bahan pangan. Selain memiliki nilai gizi, semua singkong juga mengandung asam sianida (HCN) yang merupakan senyawa beracun dengan tingkat yang beragam. Asam sianida dapat dikurangi melalui proses pengolahan seperti perendaman dengan kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dan pengukusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu optimum perendaman dan pengukusan pada umbi dan daun singkong. Analisis yang digunakan adalah secara kualitatif menggunakan metode kertas alkali pikrat dan secara kuantitatif secara spektrofotometer UV-Vis. Hasil yang diperoleh yaitu secara analisis kualitatif positif mengandung asam sianida (HCN) ditandai dengan warna merah bata pada kertas pikrat sedangkan analisis kuantitatif waktu optimum perendaman pada umbi adalah variasi 32 jam dan daun variasi 24 jam. Sedangkan waktu optimum pengukusan pada umbi adalah variasi 15 menit dan daun pada variasi 10 menit. Pada proses pengukusan belum mampu menurunkan kadar asam sianida (HCN).

Kata kunci: Asam Sianida (HCN), perendaman, pengukusan dan singkong

ABSTRACT

Cassava (*Manihot Esculenta Crantz*) is one of the biggest local carbohydrate supply in indonesia after the rice plant and the corn. The high carbohydrate contents of the cassava become one of the alternative of the food supplies. Beside of nutrition, all the kinds of cassava contain cyanide acid (HCN) which is a toxic compound in a different level. The content of the cyanide acid can be subtracted through the processing of the submerging hydroxide calcium Ca(OH)_2 and steaming. This research aims know the optimum time of the submerging and steaming at the tuber and the leaves to of the cassava. The analyses used in this research were the qualitative method using pikrat paper and the quantitive using spectofometer UV-Vis. The result of the qualitative assay showed the cassava was positively contained cyanide acid (HCN) which can be seen from the color of the pikrat paper which turned to red. While,the quantitaive analysis showed the optimum time of the submerging process toward the tuber was variation 32 hours and the optimum time for the leaves was variation 24 hours. While, the optimum time of the steaming process of the tuber was variation 15 minutes and the leaves was variation 10 mininutes. The process of the steaming cannot be able t lower the cyanide acid (HCN).

Keywords : cyanide acid (HCN), immersion, steam dan cassava

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam seperti flora maupun fauna. Berbagai sumber daya alam yang ada yaitu pangan yang merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang paling utama karena sebagai sumber energi untuk melakukan segala aktivitas dalam hidup. Salah satu sumber energi pangan adalah karbohidrat yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung dan umbi-umbian. Umbi-umbian suatu bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memegang peranan penting dalam makanan yang dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia salah satunya adalah singkong (*Manihot Esculenta Crantz*).

Singkong (*Manihot esculenta Crantz*) salah satu tanaman yang termasuk ke dalam famili *Euphorbiaceae*. Singkong merupakan bahan pangan sumber karbohidrat yang disukai masyarakat. Di Indonesia singkong dijadikan makanan pokok setelah padi dan jagung. Singkong banyak tumbuh dilingkungan masyarakat dan merupakan tanaman tropis yang bermanfaat digunakan sebagai sumber kalori yang murah dan memiliki beberapa kandungan gizi. Singkong memiliki dua jenis yaitu singkong manis dan singkong pahit (Purawisastra dan Heru, 2004: 41).

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah swt, sehingga apa yang telah diciptakan-Nya patut disyukuri nikmat yang diberikan-Nya dan dipelajari segala sesuatu yang ada dimuka bumi.

Allah berfirman dalam Q.S. Qaf/50: 9.

وَنَزَّلْنَا
السَّمَاءَ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ

Terjemahnya:

“Dan dari langit Kami turunkan dari langit air yang memberi berkah, lalu Kami tumbuhkan dengan (air) itu pepohonan yang rindang dan biji-biji tanaman yang dapat dipanen”(Kementrian Agama RI, 2016).

Ayat tersebut masih merupakan lanjutan dari pemaparan bukti-bukti kuasa Allah swt. Allah menyebutkan karunia-Nya kepada makhluk-makhluk-Nya dengan menurunkan air yang merupakan sumber kuasa-Nya adalah diturunkan-Nya sedikit demi sedikit dan sesuai dengan kebutuhan yang manfaatnya bagi penghuni bumi lalu Allah tumbuhkan aneka tumbuhan, bunga-bunga juga buah-buahan yang tumbuh di kebun-kebun dan biji-biji tanaman yang dituai dan juga Allah menumbuhkan pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang ke atas serta yang mempunyai mayang yang bersusun-susun karena banyaknya zat buah yang ada di dalamnya (Shihab, 2002: 286).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt telah menurunkan air kemudian telah ditumbuhkan-Nya pohon-pohon dan biji-bijian untuk dipanen sebagai bahan pangan. Bahan pangan yang termasuk golongan ini adalah umbi-umbian seperti singkong. Bahan pangan ini mengandung karbohidrat, lemak, protein dan vitamin. Singkong merupakan salah satu kelompok tanaman yang penting di Indonesia, sebab tumbuhan yang termasuk famili *Euphorbiaceae* memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber bahan pangan berkarbohidrat tinggi yang penting bagi pertumbuhan manusia.

Singkong sebagai salah satu bahan pangan yang biasa dikonsumsi masyarakat dan memiliki kandungan HCN. Asam sianida dalam singkong terikat dalam suatu

rangkaian yang dikenal dengan nama glukosida sianogenik, yang terdiri dari glukosa, aseton dan HCN. Sianogen pada dasarnya bersifat non toksik, tetapi proses hidrolisis oleh enzim yang terdapat dalam tanaman tersebut dapat menghasilkan sianida yang toksik. Sianogen linamarin dalam singkong pahit dihidrolisis oleh enzim linamarase dan membentuk sianida yang toksik (Riyani dan tien, 2013: 50). Racun yang berupa asam sianida pada singkong memiliki asam sianida dengan kadar rata-rata pada singkong manis 0,04 %, sedangkan singkong pahit 0,05% sampai >0,1%. Sehingga masyarakat hanya memilih singkong manis untuk dikonsumsi (Arisman, 2009: 153).

Singkong dengan kadar HCN yang tinggi tidak dapat dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat, karena dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Berdasarkan standar keamanan Indonesia, singkong dengan kadar asam sianida lebih dari 40 ppm termasuk singkong beracun dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi.

Menurut Agustini dkk., (2012) bahwa hasil penelitian diperoleh waktu optimum dengan perendaman dengan air adalah pada 48 jam sedangkan kadar asam sianida dalam umbi kayu adalah 110,68 ppm sedangkan dalam kulit ubi kayu adalah 629,15 ppm sehingga masih belum mampu menurunkan kadar asam sianida karena tingginya kadar sianida yang didapatkan. Sehingga dapat menggunakan berbagai proses pengolahan di antaranya merendamnya dengan kalsium hidroksida pada waktu tertentu dan proses pemanasan untuk mengurangi sianida yang terlarut dalam air dalam bentuk HCN. Pada proses tersebut mampu menurunkan kandungan asam sianida pada singkong. Namun dengan pengolahan yang tidak benar kemungkinan pada singkong masih mengandung asam sianida (HCN) sehingga dapat menimbulkan keracunan (Agustini, dkk., 2012: 9).

Mengurangi racun-racun pada singkong dapat dilakukan dengan cara perendaman pada kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dan cara pengukusan. Menurut Rosa,dkk (2010) tentang optimasi penurunan HCN pada umbi gadung dengan perendaman kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) bahwa hasil penelitian diperoleh terjadi penurunan kadar sianida hingga 15,720 ppm dari kondisi awal kadar sianida sebesar 60,31 ppm. Sehingga dapat menggunakan bahan yang berbeda yaitu singkong pahit dengan perendaman yang sama yaitu menggunakan kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) untuk menurunkan kadar asam sianida (HCN) pada singkong

Perendaman singkong dengan adanya penambahan basa yaitu air kapur ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) merupakan salah satu cara untuk mengurangi kandungan racun asam sianida yang terdapat dalam singkong. Air kapur ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) bersifat higroskopis atau menarik air dan dapat menaikkan pH serta merusak dinding sel sehingga mengalami plasmolisis atau pecahnya membran sel karena kekurangan air. Hal ini yang dapat menyebabkan glukosida sianogenik terdegradasi membentuk HCN yang dapat berikatan dengan Ca dan langsung larut. Sedangkan pada proses pengukusan dapat mengurangi asam sianida karena adanya proses penguapan. Menurut penelitian (Ardiyansari, 2012), bahwa jenis umbi-umbian dengan proses pemanasan yaitu dengan cara pengukusan mampu menurunkan kandungan asam sianida (HCN) sebesar 60%. Maka dari itu peneliti menggunakan proses pengukusan pada jenis umbi-umbian yaitu singkong pahit untuk mengurangi kandungan asam sianida (HCN) didalamnya dan seberapa besar tingkat penurunannya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mencoba melakukan penelitian untuk menentukan waktu optimum perendaman umbi dan daun singkong pahit dengan kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dan pengukusan terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN) sehingga pengujian dapat dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metode kertas pikrat maupun kuantitatif menggunakan alat instrumen yaitu Spektrofotometer UV-Vis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa waktu optimum perendaman umbi dan daun singkong pahit dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)_2) terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN)?
2. Berapa waktu optimum pengukusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan waktu optimum perendaman umbi dan daun singkong pahit dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)_2) terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN).
2. Untuk menentukan waktu optimum pengukusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya asam sianida yang terkandung dalam umbi maupun daun singkong apabila dikonsumsi tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu
2. Memberikan pemahaman kepada penulis terhadap pengolahan yang benar sehingga dapat mengurangi kadar sianida pada umbi dan daun singkong sehingga masyarakat bila mengkonsumsinya tidak mengalami keracunan

begitupun sebaliknya jika masyarakat mengolahnya dengan tidak benar dapat menyebabkan keracunan.

3. Memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Singkong (Manihot Esculenta Crantz)

Singkong (*Manihot Esculenta Crantz*) berasal dari benua Amerika, tepatnya Brasil dan Paraguay. Penyebarannya hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia. Singkong ditanam di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810 yang diperkenalkan oleh orang Portugis dari Brazil. Singkong merupakan tanaman yang penting bagi negara beriklim tropis seperti Nigeria, Brazil, Thailand, dan juga Indonesia. Keempat Negara tersebut merupakan negara penghasil singkong terbesar di dunia (Susilawati dan Putri, 2008: 2).



Gambar 2.1. *Singkong (Manihot Esculenta Crantz)*

Menurut Kurniawan (2010: 17), taksonomi tanaman singkong sebagai berikut:

- Kingdom : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Sub divisio : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Euphorbiales
Famili : Euphorbiaceae

Sub Famili : Manihotae
Genus : Manihot
Species : *Manihot esculenta* Crantz

Singkong merupakan jenis tanaman yang dapat hidup sepanjang tahun. Singkong mudah ditanam dan dibudidayakan, dapat ditanam di lahan yang kurang subur, resiko gagal panen 5% dan tidak memiliki banyak hama. Susunan daun singkong berurat menjari dengan 5-9 helai sedangkan umbi berdiameter rata-rata 5-10 cm lebih dan panjang 50-80 cm. Daging umbinya ada yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Bentuk umbi biasanya bulat memanjang, terdiri atas kulit luar tipis berwarna coklat, kulit dalam agak tebal berwarna keputih-pitihan dan daging berwarna putih atau kuning tergantung jenis yang mengandung sianida dengan kadar yang berbeda (Basawer, 2010: 6).

Singkong dapat dibagi dua berdasarkan umur panennya yakni singkong berumur pendek (genjah) dan singkong berumur panjang. Singkong berumur pendek berarti usia sejak mulai tanam sampai musim panen relatif lebih singkat yakni berumur antara 5-8 bulan. Sedangkan singkong yang berumur panjang dipanen pada umur 9-10 bulan (Nining, 2008: 18).

Singkong merupakan sumber bahan makanan ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung. Singkong tidak memiliki periode matang yang jelas, akibatnya periode panen dapat beragam sehingga dihasilkan singkong yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Tingkat produksi, sifat fisik dan kimia singkong akan bervariasi menurut tingkat kesuburan yang ditinjau dari lokasi penanaman singkong (Hendy, 2007: 5).

Menurut Arisman (2009: 153) kandungan unsur gizi pada umbi singkong sebagai berikut:

Tabel 2. 1. *Kandungan Unsur Gizi pada Umbi Singkong*

No.	Nama Unsur	Kadar Gizi/100 gram Bahan
1.	Energi (kal)	146
2.	Karbohidrat (g)	34,7
3.	Protein (g)	1,2
4.	Lemak (g)	0,3
5.	Mineral (g)	1,3
6.	Zat besi (mg)	0,0007
7.	Kalsium (mg)	0,003
8.	Fosfor (mg)	0,004
9.	Vitamin C (mg)	0,003
10.	Vitamin B (mg)	0,006
11.	Air (g)	62,5

Singkong merupakan sumber karbohidrat yang dapat ditemukan di wilayah tropis terhitung 8-10% kebutuhan kalori dipasok oleh singkong sehingga singkong sangat mudah beradaptasi. Pemanfaatan lain dari singkong bermanfaat sebagai sumber tepung bagi perusahaan tekstil, industri makanan dan fermentasi alkohol serta bahan baku untuk fermentasi tempe (Lingga, 1986: 98).

Singkong yang umum digunakan sebagai bahan makanan adalah umbi dan daun. Daun singkong bisa dibuat menjadi berbagai bahan olahan karena kandungan gizi daun singkong ternyata sangat tinggi. Dalam tiap 100 gram daun singkong mengandung 73 kal kalori, 6,8 gram protein, 1,2 gr lemak, 13 gr karbohidrat, 165 mg kalsium, 54 mg fosfor, 2 mg zat besi, 11 SI vitamin A, 0,12 mg vitamin B1, 275 mg

vitamin C, 77,2 gr air, dari bagian yang dapat dimakan. Namun salah satu kendala atau kerugian dalam singkong manis maupun singkong pahit yaitu terdapatnya kandungan racun yang dikenal dengan nama asam sianida atau HCN (Kurnia dan Fatmi, 2012 :117).

Singkong segar merupakan sumber karbohidrat dan serat makanan, namun hanya mengandung sedikit protein. Selain sebagai bahan makanan pokok, terdapat pula berbagai macam produk olahan singkong yang telah dimanfaatkan antara lain adalah tape singkong, kerupuk singkong, keripik singkong, kue, dan lain lain. Walaupun singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pada beberapa jenis singkong tertentu juga dapat menimbulkan keracunan, karena singkong mengandung senyawa yang berpotensi racun, yaitu linamarin dan lotaustralin, keduanya termasuk golongan glikosida sianogenik (Pratiwi, 2013: 10).

Manfaat singkong begitu banyak namun singkong dapat pula menimbulkan kerugian karena mengandung glikosida sianogenik yang beracun seperti lotaustralin dan linamarin. Berdasarkan masa tumbuhnya singkong dibagi menjadi dua kelompok yaitu sedikit mengandung sianida dan jenis yang banyak mengandung sianida (Arisman, 2009: 150-151).

Menurut Arisman (2009: 153), berdasarkan kadar HCN singkong dibedakan menjadi empat kelompok adalah sebagai berikut:

1. Singkong Manis

Singkong manis banyak dikonsumsi secara langsung atau digunakan untuk jajanan tradisional. Rasa manis singkong disebabkan oleh kadar asam sianida yang sangat rendah hanya sebesar 0,04%.

2. Singkong Pahit Agak Beracun

Singkong jenis ini memiliki kadar HCN 0,05%

3. Singkong Pahit Beracun

Singkong beracun memiliki kadar HCN antara 0,08-0,10%

4. Singkong Pahit Sangat Beracun

Singkong termasuk kategori sangat beracun apabila kadar HCN lebih dari 0,1%

B. Tinjauan Asam Sianida (HCN)

1. Sianida (CN)

Sianida umumnya sangat beracun, mengandung karbon, nitrogen tiga ikatan ($-C\equiv N$) disebut cyanogen. Senyawa menggambarkan kemampuan untuk membentuk pigmen berwarna biru. Hidrogen sianida (HCN) adalah gas tidak berwarna dengan relatif massa molekul $27,03 \text{ g mol}^{-1}$ adalah molekul kovalen mampu disosiasi dalam larutan air. Gas ini berkembang saat sianida diperlakukan dengan asam (Daniel, dkk., 2013: 707).

Sianida (CN) adalah kelompok senyawa yang mengandung gugus siano ($-C \equiv N$) yang terdapat di alam dalam bentuk yang berbeda. Sianida di alam dapat diklasifikasikan sebagai sianida bebas, sianida sederhana, kompleks sianida dan senyawa turunan sianida. Sianida bebas adalah penentu ketoksikan senyawa sianida yang dapat didefinisikan sebagai bentuk molekul (HCN) dan ion (CN^-) dari sianida yang dibebaskan melalui proses pelarutan dan disosiasi senyawa. Kedua spesies ini berada dalam kesetimbangan satu sama lain yang bergantung pada pH sehingga konsentrasi HCN dan CN^- dipengaruhi oleh pH. Pada pH dibawah 7, keseluruhan sianida berbentuk HCN sedangkan pada pH diatas 10,5, keseluruhan sianida berbentuk CN^- hal tersebut memiliki toksisitas (Pitoy, 2015: 2). Reaksi antara ion sianida dan air ditunjukkan oleh dalam reaksi di bawah ini.



2. Toksisitas Asam Sianida (HCN)

Toksis (racun) dari suatu zat pada dasarnya merupakan kemampuan zat yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian pada organisme hidup. Zat beracun alami yang terdapat pada bahan pangan nabati disebut toksitan nabati. Toksitan nabati pada tanaman berfungsi untuk membantu dan mengatur metabolisme serta melindungi tanaman terhadap serangan hama (Wahyuningsih dan Haslina, 2011:5).

Pelepasan Asam Sianida (HCN) tergantung dari adanya enzim glikosidase serta adanya air. Senyawa HCN mudah menguap pada proses perebusan, pengukusan dan proses memasak lainnya. Glikosida sianogenik merupakan senyawa yang terdapat dalam makanan nabati dan berpotensi terurai menjadi asam sianida (HCN) yang bersifat racun (toksik). Zat glikosida dinamakan linamarin. Linamarin oleh enzim β glikosidase kan diuraikan menjadi HCN, benzaldehid dan glukosa (Soetrisno dan Suryana, 2006: 4).

Asam sianida (HCN) terbentuk karena aktifitas enzim hidrolase pada glikosida sianogenik. Dosis HCN yang mematikan dapat timbul setelah manusia mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung glikosida sianogenik. Dosis yang mematikan berkisar antara 0,5-3,5 mg HCN per kg berat badan. Standar keamanan Indonesia, singkong dengan kadar sianida lebih dari 40 ppm termasuk singkong beracun dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi (Murdiana dan Sukati, 2001: 2).

Menurut Suciati (2012: 16), asam sianida (HCN) memiliki sifat fisika dan sifat kimia sebagai berikut:

1. Merupakan jenis racun yang sangat kuat sehingga bila dimakan dapat menyebabkan keracunan

2. Mudah menguap bila dipanaskan
3. Mudah larut dalam air, alkohol, aseton, dan klorofom
4. Mempunyai titik leleh 54-55°C
5. Massa atom relatif 27 sma
6. Mudah menguap bereaksi dengan natrium klorida (NaCl)
7. Sedikit larut dalam pelarut eter dan benzene
8. Mengandung karbon (C) 75 %, Hidrogen (H) 8,65 %, dan Oksigen (O) 14.4%

Mekanisme toksisitas asam sianida yaitu glikosida yang masuk ke dalam tubuh terhidrolisis dengan cepat sehingga ion CN^- nya lepas. Kemudian melalui sirkulasi beredar ke jaringan-jaringan tetapi bila sampai ke sel-sel saraf maka zat tersebut akan menghambat respirasi sel-sel tersebut sehingga mengganggu fungsi sel. Sianida dalam bentuk hidrogen sianida (HCN) dapat menyebabkan kematian yang sangat cepat jika dihirup dalam konsentrasi tertentu. Konsentrasi HCN yang fatal bagi manusia jika dihirup selama 10 menit adalah 546 ppm sehingga akan mengganggu kesehatan. Ambang batas minimal hidrogen sianida di udara adalah 2-10 ppm (Nengah, 2009: 41).

Beberapa gangguan tersebut diantaranya yaitu pada sistem pernapasan, jantung, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah berhubungan dengan paparan terhadap sianida pada manusia dalam konsentrasi tertentu telah terdeteksi. Selain itu, sistem saraf juga menjadi sasaran utama sianida. Paparan HCN secara lama dalam konsentrasi tinggi dapat menstimulasi sistem saraf pusat yang kemudian diikuti oleh depresi, kejang-kejang, lumpuh dan kematian. HCN dapat terserap cepat ke dalam tubuh dan terbawa hingga ke dalam plasma. Garam sianida dan larutan sianida memiliki tingkat ketoksikan yang lebih rendah dibandingkan HCN karena masuk ke

tubuh hanya melalui mulut. Namun demikian, ketoksikannya dapat dianggap sebanding dengan HCN karena mudah menghasilkan HCN (Valentina, 2009: 45).

3. Mengurangi Kandungan Asam Sianida (HCN)

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2006 tentang bahan tambahan pangan bahwa jumlah sianida yang diperbolehkan pada makanan yaitu 1 mg/kg. Artinya tiap kilogram berat badan orang hanya boleh mengonsumsi 1 mg sianida. Semakin tinggi kadar asam sianida (HCN) dalam umbi singkong, rasanya semakin pahit. (Kurnia dan Fatmi, 2012: 120).

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir kadar asam sianida yaitu proses perendaman dengan cara dilarutkan dalam air, ekstraksi pati dalam air, pencucian, perebusan, fermentasi, pemanasan, penggorengan, pengukusan dan pengeringan. Adanya pengolahan tersebut dapat mengurangi kadar HCN sehingga bila singkong dikonsumsi tidak akan membahayakan bagi tubuh. Pengolahan secara tradisional dapat mengurangi racun. Pada singkong, kulitnya dikupas sebelum diolah, direndam sebelum dimasak dan difermentasi selama beberapa hari (Rahmawati, 2014: 5). Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan kekuasaan Allah swt pada setiap ciptaan-Nya, mensyukuri segala nikmat yang diberikan-Nya dan makan-makanan yang halal. Halalan tayiban ditegaskan dalam surah an-Nahl ayat 114:

Allah berfirman dalam Q.S. An Nahl/16:114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”(Kementrian Agama RI, 2016).

Tafsir ayat tersebut, yaitu jika telah nyata dari ayat-ayat yang lalu betapa kuasa Allah dan betapa siksa-Nya dapat menimpa yang mengganti nikmat-Nya dengan kemusyrikan dan kekufuran, *maka hati-hatilah, jangan belaku seperti orang-orang musyrik mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengganti nikmat itu menjadi keburukan. Pilihlah, wahai orang-orang yang beriman, jalan kesyukuran dan makanlah sebagian dari apa yang direzekikan, yakni dianugerahkan oleh Allah kepada kamu antara lain yang telah disebut pada ayat-ayat yang lalu. Makanlah itu dalam keadaan halal lagi baik, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan dan syukurilah nikmat Allah agar kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.* Yang dimaksud dengan kata *makan* dalam ayat ini adalah segala *aktivitas manusia*. Pemilihan kata *makan*, disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan (Shihab, 2002, 9: 376-377).

Kajian ayat diatas menjelaskan bahwa makanlah yang halal lagi baik, karena tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Sehingga halalnya makanan ditinjau dari dari tiga hal, yaitu halal wujudnya/zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara pengolahannya. Allah telah menentukan berbagai jenis makanan yang dihalalkan.

Beberapa jenis makanan yang halal yaitu semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan dan semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Adapun ayat yang masih berkaitan dengan kehalalan yaitu surah Al-Baqarah

Selain makanan yang halal, kita juga diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang tayib. Pengertian istilah tayib di sini adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Di dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan kita untuk menyukuri nikmat Allah. Makanan yang tersebar di atas bumi ini dari jenis hewan dan tanaman yang semuanya merupakan nikmat Allah swt yang besar yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Satu cara mensyukuri nikmat Allah swt ini ialah dengan jalan mengucapkan kata syukur dengan membaca "Alhamdulillah" sewaktu memanfaatkannya menurut petunjuk Allah dan Rasul Nya, seperti memakannya atau memperjual belikannya.

Pemanasan dapat mengurangi kadar sianida (HCN) pada singkong dan menguapkan HCN yang terbentuk karena senyawa ini bersifat volatil. Pemanasan akan menyebabkan enzim β -glukosidase yang berada dalam umbi mengalami inaktif sehingga rantai enzimatik dapat putus. Jika reaksi itu putus pembentukan sianohidrin dari glikosida sianogenik dan reaksi pembentukan HCN dari sianohidrin bisa dihindari. Proses pemanasan mengurangi asam sianida (ardiansari, 2012: 20-21).


C. Tinjauan Kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$)

Kalsium hidroksida adalah senyawa kimia dengan rumus kimia $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dengan berat molekul 74,09 gram/mol. Kalsium hidroksida dapat berupa kristal tak berwarna atau bubuk putih. Kalsium hidroksida dihasilkan melalui reaksi kalsium oksida (CaO) dengan air. Senyawa ini juga dapat dihasilkan dalam bentuk endapan melalui pencampuran larutan kalsium klorida (CaCl_2) dengan larutan natrium hidroksida (NaOH). Larutan $\text{Ca}(\text{OH})_2$ disebut air kapur dan merupakan basa dengan kekuatan sedang. Larutan tersebut bereaksi dengan berbagai asam, dan bereaksi dengan banyak logam dengan adanya air. Larutan tersebut menjadi keruh bila

dilewatkan karbon dioksida, karena mengendapnya kalsium karbonat (Kurniawan, 2010: 37).

Mengurangi kadar HCN terjadi karena reaksi antara Hidrogen Sianida (HCN) dan Kalsium Hidroksida (Ca(OH)_2). Kalsium Hidroksida (Ca(OH)_2) dilarutkan dalam air terurai menjadi ion-ion Ca^{2+} dan $(\text{OH})^-$. Ion-ion tersebut bersifat seperti magnet. Ion Ca^{2+} menarik ion-ion yang bermuatan negatif dan Ion $(\text{OH})^-$ menarik ion-ion yang bermuatan positif. Sedangkan Hidrogen Sianida (HCN) dalam air terurai menjadi ion-ion H^+ dan CN^- . H^+ mengikat ion $(\text{OH})^-$ membentuk H_2O . Ion Ca^{2+} mengikat CN^- membentuk endapan putih kalsium sianida yang mudah larut dalam air (Suciati, 2012: 42).

Hidrogen sianida (HCN) adalah asam lemah yang banyak terdapat dalam tumbuhan misalnya pada kacang-kacangan atau umbi-umbian. Hidrogen sianida (HCN) merupakan asam yang mudah larut dalam air, sehingga dapat berkurang. Selain itu, senyawa sianida akan berkurang jika bereaksi dengan salah satu senyawa yang bersifat basa, misalnya adalah kalsium hidroksida (Ca(OH)_2). Hal ini akan mengakibatkan ion-ion CN^- yang ada pada struktur HCN akan berikatan dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)_2) yang sehingga membentuk suatu garam yang kompleks yaitu garam sianida (Nofita dan Agustina, 2016: 158). Berikut reaksi dari senyawa HCN bila direaksikan dengan Ca(OH)_2 :



Mengurangi kadar sianida bila semakin konsentrasi Ca(OH)_2 yang digunakan adalah konsentrasi rendah dengan proses perendaman waktu yang lama maka makin meningkat presentase penurunan kadar asam sianidanya. Namun apabila konsentrasi Ca(OH)_2 yang digunakan semakin tinggi dengan perendaman waktu yang lama maka

dapat menghambat proses penyerapan kadar sianida yang terdapat pada umbi. Kondisi kapur pada umumnya memiliki kemurnian $\pm 92\%$ sehingga masih ada zat-zat mineral lain yang menempel pada kapur. Selain itu, disebabkan karena air kapur memiliki kemampuan untuk mengubah tekstur umbi semakin keras sehingga sianida yang seharusnya terserap air kapur tidak dapat terserap atau sianida tertahan dalam umbi sehingga konsentrasi Ca(OH)_2 sangat berpengaruh nyata pada penurunan kadar sianida dari pada waktu perendaman (Djaafar, dkk., 2009: 196).

D. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang berdasarkan atas nilai absorbansi suatu zat terhadap radiasi sinar elektromagnetik. Jika cahaya UV-Vis disentuhkan pada senyawa atau sampel maka cahaya tersebut akan terserap oleh molekul dengan tingkat energi yang spesifik. Sinar yang diserap tersebut untuk menaikkan elektron ikatan ke tingkat energi eksitasi. Dengan kata lain, prinsip dari spektrofotometer yaitu apabila cahaya monokromatik melewati suatu media atau sampel maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian dipantulkan dan sebagian lagi akan dipancarkan (Sitorus, 2009: 9)

Spektrofotometri UV-Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur serapan yang dihasilkan dari interaksi kimia antara radiasi elektromagnetik dengan molekul atau atom dari suatu zat kimia pada daerah UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis adalah anggota teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrument spektrofotometer (Fatoni, 2010: 6)

Prinsip Spektrofotometer Ultra-violet dan Sinar Tampak berdasarkan penyerapan cahaya oleh suatu larutan, maka semua contoh yang akan diperiksa harus

diubah terlebih dahulu menjadi bentuk larutan. Untuk pemakaian Spektrofotometer Sinar Tampak larutan tersebut harus berwarna. Hal ini bisa dikerjakan dengan menambahkan pereaksi tertentu pada contoh yang diperiksa. Kemudian hasil pengukuran dari Spektrofotometer dimasukkan ke dalam rumus LAMBERT-BEER, maka akan didapatkan kadar zat yang dicari. Gabungan dari hukum Lambert-Beer menurunkan secara empiris hubungan antara intensitas cahaya yang ditransmisikan dengan tebalnya larutan dan hubungan antara intensitas tadi dengan konsentrasi zat (Rusli, 2009: 56).

Prinsip kerja alat pada bagian alat susunan Spektrofotometer Ultra-violet dan Sinar Tampak, suatu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator. Monokromator menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya tersebut menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk pengukuran suatu zat tertentu. Menunjukkan bahwa setiap gugus kromofor mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda. Dari monokromator tadi cahaya/energi radiasi diteruskan dan diserap oleh suatu larutan yang akan diperiksa di dalam kuvet. Kemudian jumlah cahaya yang diserap oleh larutan akan menghasilkan signal elektrik pada detektor, yang mana signal elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Besarnya signal elektrik yang dialirkan ke pencatat dapat dilihat sebagai angka. Metode Spektrofotometri Ultra-violet dan Sinar Tampak berdasarkan pada hukum LAMBERT-BEER. Hukum tersebut menyatakan bahwa jumlah radiasi cahaya Tampak, Ultra-violet dan cahaya-cahaya lain yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan (Triyati, 1985: 47).

Rumus :

$$A = \log (I_0/I_t) = \epsilon \cdot b \cdot c = a.b.c$$

Dimana :

A = Serapan

I_0 = Intensitas sinar yang datang

I_t = Intensitas sinar yang diteruskan

= Absorptivitas molekuler ($L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$) = $a \times BM$

a = Daya serap ($L \cdot g^{-1} \cdot cm^{-1}$)

b = Tebal larutan / kuvet (cm)

c = Konsentrasi zat (g/L, mg/mL) (Rusli, 2009: 17) .



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-September 2017 di Laboratorium Analitik dan Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

Alat yang di gunakan pada penelitian ini adalah Spektrofotometer UV-Vis Varian Carry 50 Conc, oven, tanur, lemari asam, timbangan digital, desikator, *hotplate*, labu takar 100 mL dan 50 mL, gelas kimia 500 ml dan 250 mL, 100 mL, gelas ukur 100 mL dan 50 mL, erlenmeyer 300 mL, 250 mL dan 100 mL, termometer 110°C, pipet skala 25 mL, pipet tetes 1 mL, 2 mL, alat pemotong (pisau), spatula, batang pengaduk, stopwatch, cawan porselin, lumpang dan alu, pinset dan gunting.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah asam pikrat ($C_6H_3(NO_2)_3$) 1%, asam tartrat ($C_4H_6O_6$) 10%, aluminium foil, aquades (H_2O), asam klorida (HCl) 1 N, kalium sianida (KCN), kalsium hidroksida ($Ca(OH)_2$) 10%, kertas whatman no.42, natrium karbonat (Na_2CO_3) 8%, kasa, kapas, plastik, benang dan sampel umbi dan daun singkong pahit.

C. Prosedur Penelitian

1. Pengambilan Sampel Umbi Singkong

Singkong yang digunakan adalah jenis singkong pahit. Pengambilan umbi singkong diambil dari lahan perkebunan warga Dusun Bilaya di Desa Pallantikan Kecamatan Patalassang dengan luas perkebunan kurang lebih 1 hektar. Umbi singkong diambil dengan cara dicabut lalu dipisahkan antara batang dan umbinya menggunakan alat pemotong. Kemudian umbi dimasukkan ke dalam kantong plastik dan siap dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

2. Pengambilan Sampel Daun Singkong

Singkong yang digunakan adalah jenis singkong pahit. Pengambilan daun singkong diambil dari lahan perkebunan warga di Dusun Bilaya Desa Pallantikan Kecamatan Patalassang dengan luas perkebunan kurang lebih 1 hektar. Selanjutnya daun singkong dipetik pada bagian daun muda. Kemudian daun dimasukkan ke dalam kantong plastik dan siap dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

3. Analisis Kadar Air

Analisis kadar air pada singkong pahit yaitu umbi dan daun dapat dilakukan dengan cara, cawan kosong yang akan digunakan dikeringkan dalam oven selama 15 menit pada suhu 105°C , kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang untuk mengetahui bobot kosong cawan. Selanjutnya masing-masing umbi dan daun yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram lalu dimasukkan kedalam cawan kemudian keringkan dalam oven selama 2 jam pada suhu 105°C . Cawan kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang kembali. Setelah ditimbang, cawan dikeringkan dalam oven kembali hingga diperoleh bobot konstan. Kemudian hitung presentase kadar air, pengerjaan dilakukan secara duplo (Sudarmaji, 1997).

4. Pembuatan Kertas Pikrat

Pembuatan kertas pikrat dapat dilakukan dengan cara kertas Whatman No.42 digunting dengan ukuran (1 × 6 cm) selanjutnya direndam dalam asam pikrat ($C_6H_3(NO_2)_3$) 1% kemudian dikeringkan selama 30 menit selanjutnya direndam kembali dalam larutan natrium karbonat (Na_2CO_3) 8% kemudian dikeringkan kembali (Nofia dan Agustini, 2016).

5. Analisis Kualitatif HCN dengan Metode Kertas Pikrat

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 20,000 gram, kemudian dimasukkan dalam erlenmeyer 250 mL selanjutnya ditambahkan 50 mL H_2O , kemudian ditambahkan 10 mL larutan tartrat 10 % lalu direndam selama 2 jam selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup lalu dipanaskan dalam penangas air 50 °C selama 30 menit, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi pada kertas pikrat. Apabila warna kuning pada kertas berubah menjadi kuning kecoklatan sampai coklat kemerah-merahan berarti dalam sampel terdapat asam sianida (HCN). Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit (Nofita dan Agustina, 2016).

6. Penentuan Kadar Awal Umbi dan Daun Singkong Pahit

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram kemudian dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer 250 mL. Selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup. Pada bagian atasnya dibungkus dengan plastik lalu dibiarkan selama 48 jam pada suhu kamar. Kemudian setelah 48 jam kertas pikrat tersebut diangkat lalu dimasukkan kedalam gelas kimia kemudian ditambahkan 25 mL H_2O selanjutnya direndam selama 30 menit. Kemudian kertas pikrat yang telah direndam diangkat lalu air rendaman tersebut diukur absorbansinya

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm. Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit, (Agustini, 2012).

7. Penentuan Waktu Perendaman Kalsium Hidroksida (Ca(OH)₂)

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram kemudian dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer 250 mL, lalu ditambahkan kalsium hidroksida (Ca(OH)₂) 10%. Kemudian digoyangkan perlahan agar tercampur merata. Selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup. Pada bagian atasnya dibungkus dengan plastik lalu dibiarkan selama (8, 16, 24, 32, 40 dan 48) jam pada suhu kamar kemudian kertas pikrat tersebut diangkat lalu dimasukkan kedalam gelas kimia kemudian ditambahkan 25 mL H₂O selanjutnya direndam selama 30 menit. Kemudian kertas pikrat yang telah direndam diangkat lalu air rendaman tersebut diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm. Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit, pengerjaan dilakukan secara duplo (Agustini, 2012).

8. Penentuan Waktu Optimum Pengukusan

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram kemudian dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer 250 mL. Selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup. Pada bagian atasnya dibungkus dengan plastik kemudian dikukus pada suhu 50-60°C selama (5, 10, 15, 20) menit. Kemudian kertas pikrat tersebut diangkat lalu dimasukkan kedalam gelas kimia kemudian ditambahkan 25 mL H₂O selanjutnya direndam selama 30 menit. Kemudian kertas pikrat yang telah direndam diangkat lalu air rendaman tersebut diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang

gelombang 540 nm. Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit, pengerjaan dilakukan secara duplo (Agustini, 2012).

9. Penentuan Kurva Kalibrasi Larutan Standar Sianida

a. Pembuatan larutan baku KCN konsentrasi 100 ppm

KCN ditimbang 0,2409 gram kedalam gelas kimia 100 mL, lalu dilarutkan dengan H₂O secukupnya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam labu takar 1000 mL lalu diencerkan dengan H₂O hingga tanda batas dan dihomogenkan.

b. Pembuatan deret standar 10,20,30,40,50 ppm

KCN konsentrasi 100 ppm dipipet berturut turut sebanyak 10 mL, 20 mL, 30 mL, 40 mL dan 50 mL. Lalu dimasukkan kedalam labu takar 100 mL lalu diencerkan dengan H₂O hingga tanda batas dan dihomogenkan. Masing masing deret ditambahkan 25 mL HCl 1 N kemudian dikerjakan sesuai perlakuan yang sama dengan sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Uji kadar air

Penentuan kadar air dapat diperoleh data pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Analisis Kadar Air

No	Sampel	Kadar air (%)
1.	Umbi singkong pahit	66,19%
2.	Daun singkong pahit	74,38%

2. Uji Kualitatif Asam Sianida (HCN)

Uji kualitatif asam sianida (HCN) menggunakan kertas alkali pikrat dengan menambahkan reagen tertentu untuk mengetahui terdapatnya senyawa asam sianida pada umbi dan daun singkong pahit. Identifikasi asam sianida memberikan hasil positif ditandai dengan kertas alkali pikrat berubah dari warna kuning menjadi merah bata. Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan bahwa umbi dan daun singkong pahit positif mengandung senyawa asam sianida (HCN).

Tabel 4.2. Hasil Uji Kualitatif Asam Sianida (HCN)

No.	Sampel	Hasil pengamatan	Kesimpulan
1.	Umbi singkong pahit	Merah bata	(+)
2.	Daun singkong pahit	Merah bata	(+)

3. Hasil penentuan kadar awal pada umbi dan daun singkong pahit

Kadar awal umbi dan daun singkong pahit terlihat pada Tabel 4.3 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil penentuan kadar awal umbi dan daun singkong pahit

No.	Sampel	% HCN
1.	Umbi Singkong Pahit	0,1351
2	Daun Singkong Pahit	0,1429

4. Hasil penentuan waktu optimum perendaman pada umbi dan daun singkong pahit dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)₂)

Waktu optimum perendaman dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)₂) pada umbi yaitu pada waktu 32 jam dan daun singkong pahit pada waktu 24 jam terlihat pada Tabel 4.4 dan pada Tabel 4.5 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil penentuan waktu optimum perendaman pada umbi singkong

No.	Waktu perendaman (jam)	Kadar HCN (%)	Penurunan HCN (%)
1	8	0,0404	70,09
2	16	0,0285	78,75
3	24	0,0275	79,64
4	32	0,0266	80,31
5	40	0,0315	76,68
6	48	0,035	74,40

Tabel 4.5. Hasil penentuan waktu optimum perendaman pada daun singkong

No.	Waktu perendaman (jam)	Kadar HCN (%)	Penurunan HCN (%)
1	8	0,0520	63,61
2	16	0,0337	76,41
3	24	0,0325	77,25
4	32	0,0358	74,94
5	40	0,0412	71,16
6	48	0,0466	67,38

5. Hasil penentuan waktu optimum pengukusan pada umbi dan daun singkong pahit

Waktu optimum pengukusan pada umbi pada waktu 15 menit dan daun singkong pahit pada waktu 10 menit ditunjukkan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil penentuan waktu optimum pengukusan (50-60⁰C) pada umbi singkong

No.	Waktu pengukusan (menit)	Kadar HCN (%)	Penurunan HCN (%)
1	5	0,1283	5,03
2	10	0,1137	15,84
3	15	0,0904	33,08
4	20	0,1116	17,39

Tabel 4.7. Hasil penentuan waktu optimum pengukusan (50-60⁰C) pada daun singkong

No.	Waktu pengukusan (menit)	Kadar HCN (%)	Penurunan HCN (%)
1	5	0,125	12,52
2	10	0,0608	57,45
3	15	0,0783	45,20
4	20	0,1125	21,27

B. Pembahasan

1. Analisis kadar air


Kadar air merupakan penentuan banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan, kadar air sangat berpengaruh pada kualitas suatu bahan. Uji kadar air pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam sampel daun dan umbi singkong pahit. Karena kadar air yang tinggi merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan kapang yang akan mengurangi senyawa yang terkandung di dalam umbi dan daun singkong pahit. Kadar air pada umbi dan daun yang disimpan akan mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Sebaiknya kandungan air yang rendah, sehingga daya simpannya pada kondisi normal. Penentuan kadar air dilakukan

dengan memanaskan dalam oven sampel pada suhu 105°C, umumnya suhu ini digunakan kadar air dengan waktu pemanasan selama 2 jam. Pada penentuan kadar air ini penimbangan dilakukan hingga mencapai bobot konstan.

Hasil analisis yang diperoleh dari penentuan kadar air ini yaitu pada umbi singkong sebanyak 66,19% dan daun singkong sebanyak 74,38% nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air dalam komposisi singkong segar. Menurut teori (Depkes RI, 1992), menyatakan bahwa umbi singkong dalam keadaan segar memiliki kadar air sebesar 60 % dan menurut teori (Depkes RI, 1981), menyatakan daun singkong memiliki kadar air sebesar 73,67%.

2. Hasil analisis kualitatif asam sianida (HCN) pada umbi dan daun singkong pahit


Uji kualitatif dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa asam sianida (HCN) pada umbi dan daun singkong pahit. Berdasarkan sampel yang diuji diantaranya adalah umbi dan daun singkong pahit. Umbi maupun daun singkong pahit dihaluskan bertujuan untuk mempercepat proses pencarian zat aktif atau memperluas permukaan yang terdapat pada daun dan umbi singkong pahit. Selanjutnya proses maserasi bertujuan untuk melakukan penyarian zat aktif dimana pelarut yang digunakan adalah air (H_2O). Pelarut akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah atau biasa disebut proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel dimana zat glikosida yang mengandung HCN ini akan larut dalam pelarut (H_2O). Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sianida mudah larut dalam pelarut H_2O . Reaksi yang terjadi sebagai berikut:



Asam tartrat bertujuan untuk menghasilkan uap HCN. Uap HCN yang dihasilkan disebabkan oleh hidrogen dari asam tartrat (H₂.C₄H₄O₆) beraksi dengan ion CN⁻ yang terlarut dalam air sehingga dihasilkanlah uap HCN. Reaksi yang terjadi sebagai berikut :



Asam pikrat merupakan asam kuat yang bertindak sebagai pendonor proton sehingga melepaskan H⁺ dan dinetralkan dengan natrium karbonat (Na₂CO₃) 8% sehingga ion karbonat dari natrium karbonat (Na₂CO₃) bereaksi dengan H⁺ dari gugus OH⁻ dari asam pikrat membentuk natrium pikrat (alkali pikrat). Kertas pikrat yang diperoleh dari hasil perendaman kertas whatman digunakan untuk menangkap uap HCN. Adanya uap HCN ditandai dengan berubahnya warna kertas pikrat dari kuning menjadi merah. Gambar 4.2 Reaksi yang terjadi secara keseluruhan adalah sebagai berikut:




Gambar 4.2. Reaksi pembentukan Natrium Pikrosulfat

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan sampel umbi dan daun singkong pahit positif mengandung asam sianida (HCN). Penyebab umbi dan daun singkong pahit mengandung HCN dikarenakan di dalam umbi dan daun singkong pahit mengeluarkan getah putih yang mengandung zat glikosida, dimana zat glikosida ini mengandung racun HCN (glikosida sianogenik). Suatu ikatan organik yang dapat menghasilkan racun biru atau HCN yang bersifat toksik yang apabila singkong mengalami perlukaan, pengirisan dan rusak akan dihidrolisa oleh enzim linase menjadi HCN. Zat glikosida merupakan Linamarin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nofita dan Agustina Retnaningsih (2016), bahwa hidrogen sianida dikeluarkan apabila dihancurkan, mengalami pengirisan atau rusak.

3. Hasil penentuan waktu optimum perendaman umbi dan daun singkong pahit dengan kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN)

Asam sianida merupakan senyawa yang terdapat pada singkong pahit. HCN pada singkong pahit memiliki kadar yang tinggi sehingga jarang dikonsumsi karena adanya asam sianida yang terkandung. Oleh karena itu perlu adanya pengolahan secara benar untuk mengurangi kadar asam sianida pada singkong yaitu dengan cara maserasi (perendaman) sampel menggunakan larutan kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dengan waktu perendaman yang tepat. Hal ini memungkinkan enzim linamarase menghidrolisis menjadi HCN. Gambar 4.3 menunjukkan konversi linamarin menjadi aseton sianohidrin dan glukosa dan aseton sianohidrin terurai membentuk aseton dan asam sianida. Reaksi yang terjadi sebagai berikut:




Gambar 4.3. Hidrolisis linamarin menjadi asam sianida

Waktu maserasi (perendaman) pada umbi dan daun singkong pahit menggunakan larutan kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dengan beberapa variasi waktu untuk mengetahui waktu optimum perendaman yang baik dan seberapa besar mengurangi kadar asam sianida pada singkong. Penghalusan umbi maupun daun singkong pahit bertujuan mempercepat proses pencarian zat aktif dan memperluas yang terdapat pada daun dan umbi singkong pahit. Perendaman bertujuan untuk melakukan pencarian zat aktif yang terdapat pada daun dan umbi singkong pahit dimana pelarut akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah atau biasa disebut proses difusi.

Salah satu metode untuk mengurangi kadar asam sianida yaitu dengan perendaman menggunakan $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Air rendaman menyebabkan jaringan umbi dan daun singkong akan melunak, sehingga semakin lunak jaringan umbi dan daun singkong akan semakin mempermudah proses pengeluaran linamarin dari dalam umbi maupun daun singkong. Hal ini, konsentrasi larutan di luar sel lebih kecil daripada di dalam sel sehingga air akan masuk ke dalam sel, air rendaman akan mengaktifkan enzim linamarase. Perendaman dengan larutan $\text{Ca}(\text{OH})_2$ yang bersifat basa bertujuan dapat mengurangi senyawa sianida. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa


ion-ion CN^- yang ada pada struktur HCN akan berikatan dengan Ca(OH)_2 sehingga membentuk suatu garam kompleks yaitu garam sianida. Reaksi yang terjadi sebagai berikut :



Gambar 4.4. Reaksi antara Hidrogen Sianida (HCN) dan Kalsium Hidroksida (Ca(OH)_2)

Berkurangnya kadar HCN terjadi karena reaksi antara Hidrogen Sianida (HCN) dan Kalsium Hidroksida (Ca(OH)_2). Ca(OH)_2 dilarutkan dalam air terurai menjadi ion-ion Ca^{2+} dan OH^- . Ion-ion tersebut bersifat seperti magnet. Ion Ca^{2+} menarik ion-ion yang bermuatan negatif dan Ion OH^- menarik ion-ion yang bermuatan positif. HCN dalam air terurai menjadi ion-ion H^+ dan CN^- . H^+ mengikat ion OH^- membentuk H_2O . Ion Ca^{2+} mengikat CN^- membentuk endapan putih kalsium sianida yang mudah larut dalam air (Suciati, 2012: 42).

Kertas pikrat digantung di dalam wadah yang berisi sampel umbi dan daun singkong bertujuan supaya uap HCN terperangkap ke dalam kertas pikrat, air cucuannya dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui nilai absorbansi dari setiap sampel daun dan umbi singkong pahit. Data yang diperoleh tersebut dilakukan perhitungan persen kadar asam sianida. Waktu perendaman sangat menentukan berkurangnya kadar asam sianida.



Gambar 4.5. Kurva Penentuan waktu optimum perendaman pada umbi dan daun

Waktu optimum perendaman pada umbi yaitu 32 jam dengan tingkat penurunan kadar HCN yang didapatkan 80,31%, sedangkan pada daun waktu optimum yang didapatkan dari data absorbansi adalah waktu 24 jam dengan tingkat penurunan kadar HCN yaitu 77,25% ditunjukkan pada Gambar 4.5. Sehingga pada daun maupun umbi ditentukan waktu optimum perendamannya untuk mengetahui waktu perendaman yang baik saat pelepasan asam sianida dan memungkinkan bahwa waktu optimum maka asam sianida sudah larut sebagian pada saat proses perendaman sehingga mampu menurunkan kadar HCN pada umbi maupun daun.

Berdasarkan hasil analisis sampel umbi dan daun singkong pahit yaitu diperoleh data bahwa untuk umbi diperoleh waktu optimum perendaman kalsium hidroksida (Ca(OH)_2) dengan durasi perendaman waktu 32 jam dengan kadar HCN 0,0266% sehingga terjadi penurunan kadar HCN sebesar 80,31% dan penurunan kadar HCN terendah pada waktu 8 jam yaitu 70,09%. sedangkan pada daun singkong pahit diperoleh waktu optimum perendaman Ca(OH)_2 yaitu 24 jam dengan kadar HCN 0,0325 % dan mengalami penurunan kadar HCN sebesar 77,25%. Hal ini membuktikan sampel umbi dan daun singkong pahit sudah sejalan dengan pernyataan Arisman, 2009, menyatakan bahwa kadar asam sianida pada singkong pahit sebesar 0,05%. Data yang diperoleh kadar HCN sampel umbi dan daun singkong pahit tidak melewati batas kadar asam sianida 0,05%. Menurut Rosa dkk., 2010, bahwa semakin lama perendaman maka semakin tinggi tingkat penurunan kadar asam sianida didalamnya. Dalam 1 hari sampai 4 hari mampu menurunkan kadar HCN 90% dan sampai hari kelima mampu menurunkan HCN sebesar 100% namun jika terlalu lama perendaman akan merusak struktur dan nilai kandungan gizi didalam bahan pangan. Semakin sedikitnya konsentrasi kalsium hidrogen yang digunakan maka akan menurunkan kadar sianida dan mengubah tekstur bahan pangan

menjadi lebih sedikit keras dan jika dibandingkan dengan konsentrasi yang besar dapat mengubah tekstur bahan pangan menjadi lebih keras sehingga sianida yang seharusnya terserap kalsium $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tidak dapat menyerap dan sianida tertahan dalam bahan pangan.


4. Hasil penentuan waktu optimum pengukusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan asam sianida (HCN)

Singkong pahit merupakan tanaman yang jarang dikonsumsi karena adanya kandungan yang berupa racun yaitu senyawa HCN. Oleh karena itu, adanya beberapa pengolahan sebelum dikonsumsi diantaranya adalah proses pemanasan dengan cara pengukusan. Proses pengukusan mampu mengurangi kadar HCN pada singkong pahit.

Bagian yang diteliti pada singkong pahit adalah umbi dan daunnya yang bertujuan untuk mengetahui kadar HCN. Umbi dan daun yang dihalus bertujuan untuk mempercepat proses penyarian zat aktif dan memperluas permukaan yang terdapat pada daun dan umbi singkong pahit. Pengukusan yang bertujuan agar uap sianida terperangkap di dalam kertas alkali pikrat yang sebelumnya kertas pikrat direndam dengan asam pikrat dan dinetralkan kembali dengan natrium karbonat sehingga menghasilkan kertas alkali pikrat.

Pengukusan dengan variasi waktu pengukusan merupakan proses pemanasan suatu bahan yang memanfaatkan uap air dengan tujuan untuk mengubah struktur, mengurangi kandungan racun suatu bahan. Terjadi proses pengukusan pada singkong pahit akan merusak aktivitas enzim linamarase sehingga perombakan HCN dari linamarin tidak terjadi. Kertas pikrat dicuci dengan akuades sehingga air cucuannya dibaca dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui nilai absorbansi dari setiap sampel daun dan umbi singkong pahit. Data yang diperoleh

tersebut dilakukan perhitungan persen kadar HCN. Waktu pengukusan sangat menentukan waktu yang baik dalam mengurangi kadar asam sianida.



Gambar 4.6. Kurva Penentuan waktu optimum pengukusan 50-60°C pada umbi dan daun

Gambar 4.6. menunjukkan waktu optimum pengukusan pada umbi yaitu 15 menit dengan tingkat penurunan kadar HCN didapatkan 33,08 % dan pada daun waktu optimum pengukusan yang didapatkan adalah 10 menit dengan penurunan kadar HCN 57,45%. Pada daun maupun umbi ditentukan waktu optimum pengukusannya untuk mengetahui waktu pengukusan yang baik saat menurunkan kadar HCN dan memungkinkan bahwa asam sianida sudah teruapkan sebagian karena adanya proses pemanasan yaitu pengukusan sehingga mengurangi kandungan asam sianida pada umbi maupun daun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada sampel umbi dan daun singkong pahit yaitu diperoleh data bahwa untuk umbi didapatkan waktu optimum pengukusan diperoleh pada waktu 15 menit dengan kadar HCN 0,0904% dan mengalami penurunan kadar HCN 33,08% dan pada waktu 5 menit terjadi penurunan kadar HCN terendah yaitu 5,03%. Pada daun singkong pahit diperoleh waktu optimum pengukusan diperoleh pada waktu 10 menit dengan kadar HCN 0,0608 % dengan tingkat penurunan kadar HCN 57,45 % dan pada waktu 5 menit terjadi penurunan

kadar HCN terendah 12,52%. Hal ini membuktikan sampel umbi dan daun singkong pahit tidak sejalan dengan pernyataan Arisman, 2009, menyatakan bahwa pada dasarnya kadar asam sianida pada singkong pahit sebesar 0,05%. Sehingga disimpulkan bahwa proses pengukusan belum mampu menurunkan asam sianida pada umbi dan daun singkong karena dari data yang diperoleh bahwa walaupun terjadi penurunan kadar HCN tapi masih melewati batas kadar asam sianida 0,05%. Menurut pernyataan Ardiyansari, 2012, menyatakan bahwa pemanasan dengan cara pengukusan untuk mengurangi kadar HCN sebesar 60%. Hal ini disebabkan pada proses pengukusan berlangsung sehingga memungkinkan belum teruapkan semua sampai dikertas pikrat sehingga masih tinggi kadar asam sianidanya. Faktor yang lain diduga adanya faktor lingkungan dan suhu dimana sangat berpengaruh pada proses pengukusan berlangsung. Menurut Murni, dkk, 2015, menyatakan lamanya waktu pengukusan akan semakin banyak menurunkan kandungan asam sianida (HCN) karena asam sianida mudah larut dalam air dan mudah menguap karena panas serta semakin banyak perombakan asam sianida (HCN).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Waktu optimum perendaman kalsium hidroksida (Ca(OH)_2) pada umbi dan daun singkong pahit terhadap kandungan asam sianida (HCN) yaitu perendaman pada umbi 32 jam dengan penurunan kadar asam sianida (HCN) sebesar 80,31% dan pada daun waktu optimum yaitu 24 jam dengan penurunan kadar asam sianida (HCN) yaitu 77,25%
2. Waktu optimum pengukusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap kandungan asam sianida (HCN) yaitu pengukusan pada umbi 15 menit dengan penurunan kadar asam sianida (HCN) 33,08% dan pada daun waktu optimum 10 menit dengan penurunan kadar asam sianida (HCN) 57,45%.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu sebaiknya menggunakan suhu yang tinggi pada proses pengukusan sekitar 85°C terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Agustini, Dewi Meliati, dkk. "Penentuan Waktu Optimum Pelelpan HCN dan kadar Sianida pada Ubi Kayu *Manihot esculenta* Crantz". *Aristoteles* 10, no. 1 (2012): h. 9 – 16.
- Ardiansari, Yasinta Marta. "Pengaruh Jenis Gadung dan Lama Perembusan Terhadap Kadar Sianida Gadung". *Skripsi* (2012): h. 1-80.
- Arisman. *Buku Ajar Ilmu Gizi Keracunan Makanan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Bosawer F.E. "Komposisi Kimia dan Karakteristik Fisik Pati Ubi Kayu (*Manihotesculenta*) Asal Distrik Masni Kabupaten Manokwari": *Skripsi*. Universitas Negeri Papua Manokwari, 2010.
- Daniel, Attah, dkk. "Production of Sodium Cyanide from Cassava Wastes" *Science and Technology* 2, no. 10 (2013): h. 707-709.
- Depkes RI. *UU RI No. 23 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI. 1992.
- Djaafar, Titiek F, dkk. "Pengaruh *Blanching* dan Waktu Perendaman dalam Larutan Kapur terhadap Kandungan Racun pada Umbi dan Ceriping Gadung" *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan* 28, no. 3 (2009): h.192-198.
- Fatoni ahmad. "Analisis Secara Kuanlitatif dan Kuantitatif Kadar Kafein dalam Kopi Bubuk Lokal yang Beredar Di Kota Palembang Menggunakan Spktrofotometri UV-Vis". *Skripsi*. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, 2010.
- Feliana, Firga. "Kandungan Gizi Dua Jenis Varietas Singkong Berdasarkan Umur Panen Di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong". *Jurnal e-Jiplol* 2, no. 3 (2014): h. 1-10).
- Hendy. "Formulasi Bubur Instan Berbasis Singkong (*Manihot esculenta* Crantz)Sebagai Panga Pokok Alternatif". *Skripsi*. Intitut Pertanian Bogor, 2007.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Kurnia, Nova dan Fatmi Marwatoen. "Penentuan kadar sianida daun singkong dengan variasi umur daun dan waktu pemetikan". *Ilmiah Pendidikan Kimia "Hydrogen"* 1, no. 2 (2012): h. 117-121.

- Kurniawan, Sandra. "Pengaruh Lama Fermentasi dan Konsentrasi $\text{Ca}(\text{OH})_2$ untuk Perendaman Terhadap Karakteristik Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) Varietas Singkong Pahit (Pandemir L-2)". *Skripsi* (2010): h. 1-69.
- Krisno, Budiyanto, Agus. *Dasar Dasar Ilmu Gizi*. Malang: UMM Press. 2001.
- Lies Suprpti. *Tepung Tapioka Pembuatan dan Pemanfaatannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Lingga, P. *Bertanam Umbi-umbian*. Jakarta: Swadaya: 1986.
- Murdiana, Ance dan Sukati Saidin. "Kadar Sianida dalam Sayuran dan Umbi-Umbian Di Daerah Gangguan Akibat Kurang Yodium". *Jurnal kimia* 8, no. 3 (2001): 1-6.
- Murni, dkk. "Kandungan Asam Sianida, Bahan Kering dan Bahan Organik Tepung Biji Karet Hasil Pengukusan". *Ilmu-Ilmu Perternakan* 18, no. 2 (2015): h. 56-65.
- Muchtadi, D. *Petunjuk Laboratorium*. Jakarta: Evaluasi Nilai Gizi Pangan. 1989.
- Nining, Pratiwi. "Uji Efek Antiulcer Perasan Umbi Singkong Pada Tikus Putih Jatan Glur wistar". *Skripsi* (2008): h. 1-85.
- Nurul, St. Chadijah, Kurnia Ramadani, 2017, Waktu dan Suhu Optimum Dalam Produksi Asam Oksalat Dari Limbah HVS dengan Metode Peleburan Alkali," *Jurnal Al-Kimia* (Online), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-kimia/article/view/284>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Nengah, Kencana Putra. "Efektivitas Berbagai Cara Pemasakan Terhadap Penurunan Kandungan Asam Sianida Berbagai Jenis Rebung Bambu". *Agroteknologi* 15, no. 2 (2009): h. 40-42.
- Nofita dan Agustina Retnaningsih. "Penetapan Kadar Asam Sianida pada Singkong (*Manihot esculenta* Crantz) dengan Variasi Waktu Perendaman secara Argentometri" *Analisis Farmasi* 1, no. 3 (2016): h. 157-162.
- Pitoy, M.M. "Sianida: Klasifikasi, Toksisitas, Degradasi, Analisis (Studi Pustaka)", *MIPA UNSRAT* 4, no. 1 (2015): h.1-4.
- Purawisastra, Suryana dan Heru Yuniati. "Penurunan Kadar Sianida Singkong Pahit pada Proses Fermentasi Cair Bakteri *Brevibacterium Lactofermentum* BL-IM76". *Pgm* 27 no. 1 (2004): h. 17-23.
- Puspitaningrum, Dian Wahyuningtyas. "Ekstraksi Emas dari Batuan Menggunakan Metode Sianida dan Amalgamasi dengan Penambahan Ketela Pohon". *Skripsi* (2013): h. 1-92.
- Pratiwi, Intan Dewi. "Pengaruh Substitusi Tepung Kulit Singkong Terhadap Kualitas Muffin". *Skripsi* (2013): h. 1-144.

- Rachmawati, R.F. “Penentuan Hidrosianida (HCN) Kualitatif dan Kuantitatif pada umbi-umbian dan Daun Talas”. *Jurnal Teknologi* 10, no. 2 (2014): h. 1-6.
- Riyani, Kapti dan Tien Setyaningtyas. “Fotodegradasi Sianida dalam Limbah Cair Tapioka”. *Molekul* 8, no. 1 (2013): h. 49-57.
- Rusli, Raisani. “Penetapan Kadar Boraks Pada Mie Basah Yang Beredar Di Pasar Ciputat dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis Menggunakan Pereaksi Kurkumin” *Skripsi* Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Rosa, dkk. “ Optimasi Penurunan HCN pada Umbi Gadung dengan Perendaman Air Kapur”. *Ilmu Pangan* 10, no. 5 (2010): h. 33-40.
- Suciati, Andi. “Pengaruh Lama Perendaman Dan Fermentasi Terhadap Kandungan HCN Pada Tempe Kacang Koro (*Canavalia ensiformis L*)” *Skripsi* Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Sudarmadji, S., B. Haryono, Suhardi. *Prosedur Analisa Untuk Bahan Makanan dan Pertanian*. Liberty: Yogyakarta, 1997.
- Susilawati, Nurdjanah. S, dan Putri, S. (2008). “Karakteristik Sifat Fisik Dan Kimia Ubi Kayu (*Manihot esculenta*) Berdasarkan Lokasi Penanaman Dan Umur Panen Berbeda”. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian* 13, no. 2 (2008): h. 1-12
- Sitorus Marham s. *Spektroskopi, Edukasi Struktur Molekul Organik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Soetrisno, Uken S dan Suriyana. “Pengaruh Pengukusan Terhadap Kandungan Asam Sianida dalam Beberapa Bahan Makanan”. *Jurnal lingkungan* 11, no. 2 (2006): h. 1-7.
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an/ M. Quraish Shihab*. Vol 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an/ M. Quraish Shihab*. Vol 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Triyati, Ety “ Spektrofotometer Ultra-Violet dan Sinar Tampak Serta Aplikasinya dalam Oseanologi”. *Jurnal Oseana* 10, no. 1 (1985): h. 23-47.
- Valentina, Oxy. “Analisis Nilai Tambah Ubi Kayu Sebagai Bahan Baku Keripik Singkong Di Kabupaten Karanganyar (Kasus Pada Kub Wanita Tani Makmur)”, *Skripsi* (2009): h. 1-79.
- Wahyuningsih, Sri Budi dan Haslina. “ Kajian Degradasi Asam Sianida Pada Berbagai Metode Prose Pembuatan Tepung Mokal”. *Jurnal pangan*. 29, no. 1 (2011): h. 1-8.

BIOGRAFI



Nama saya Nur Ilmi Usman, biasa disapa Ilmi. Saya lahir pada tanggal 30 Januari 1995, saya adalah anak kelima dari lima bersaudara. Saya merupakan buah hati dari pasangan suami istri Drs. Usman Tjokke, S.Ag dan Muliana Haleda. Saat saya berumur tujuh tahun, saya memulai pendidikan bangku Sekolah Dasar (SD) pertama pada tahun 2001, yaitu SDN 16 Pinrang. Saya menjalaninya selama enam tahun dan saya lulus pada tahun 2007. Kemudian saya lanjut MTS di Pesantren DDI Lil-Banat Pare-Pare, pada tahun 2007 dan saya lulus tahun 2010. Kemudian saya lanjut lagi di Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA Negeri 7 Pinrang, pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Seiring berjalannya waktu Alhamdulillah saat ini saya dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Tepatnya saya pilih jurusan KIMIA. Jurusan yang merupakan pilihan saya sendiri dan mudah-mudahan saya bisa lanjut ke jenjang yang lebih baik.