

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
DENGAN PERSALINAN PRETERM DI
RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI
TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Prodi Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
UMRA RESKI
NIM : 70400113008
M A K A S S A R


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 November 2016

Penulis



UMRA RESKI

NIM : 70400113008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Umra Reski
Nim : 70400113008
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Persalinan
Preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 10 November 2016

Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 0001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Persalinan Preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016”, yang disusun oleh Umra Reski, NIM: 70400113008, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 7 November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 7 November 2016
6 Safar 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb (.....)

Pembimbing : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb (.....)

Penguji I : Irmawati, S.ST (.....)

Penguji II : Dr. Wahyuddin, M.Ag (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ilahi rabbi Allah SWT. Allah SWT yang maha kuasa, maha pencipta alam semester beserta seluruh isinya dengan begitu sempurna. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berkat rahmat, hidayah, kekuatan dan kasih sayang-Nya lah sehingga Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care dengan Persalinan Preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar tahun 2016” ini dapat selesai dengan baik dan inshaa allah dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis.

Salam serta shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, yang senantiasa menjadi suri tauladan dan membawa ajaran yang begitu sempurna. Sang penyebar kebaikan di muka bumi ini dengan kesabaran, usaha dan ketaatan Beliau kepada Allah SWT. Sehingga Beliau bisa membawa umat Islam ke masa yang penuh dengan cahaya ini. Beliau yang tidak pernah meninggalkan umatnya bahkan sampai ajal menjemput Beliau.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

Selesainya Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan mendukung setiap langkah yang saya tempuh disetiap proses, mulai dari pertama hingga selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negera (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr.dr.H Andi Armyun Nurdin, M.Sc selaku dekan fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj.Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb selaku ketua jurusan prodi kebidanan yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Amd.Keb.
5. Ibu Firdayanti, S.Si.T., M.keb selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu Irmawati, S.ST selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Ag selaku penguji agama Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan masukan dan motivasi terutama di bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dengan sabar mengajarkan banyak hal, memperluas wawasan penulis, memperkenalkan dunia perkuliahan dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di jurusan kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini.
9. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sarana sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan rekomendasi penelitian kepada peneliti.
11. Kepala Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar yang telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
12. Untuk wanita periku Diniatul Munawwarah, Erni yang senantiasa menemani setiap langkah meskipun memiliki kesibukan super juga. Selalu memberikan semangat dan motivasi, selalu ada dibelakang untuk mendorongku disaat saya tertinggal dibelakang, yang selalu ada diatas untuk menarikku naik ketika saya terjatuh. Terima kasih.

13. Teman-teman seangkatan kebidanan 2013 yang telah banyak mengajarkan arti kebersamaan dan arti pertemanan.

Demikian yang sempat penulis ucapkan.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.



Samata, 29 oktober 2016

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan	11
1. Pengertian persalinan	11
2. Tujuan asuhan persalinan	12
3. Tanda-tanda mulainya persalinan	13
4. Tahap-tahap dalam proses persalinan	14
5. Faktor yang mempengaruhi persalinan	15
6. Mekanisme persalinan	19
B. Tinjauan Khusus Tentang Persalinan Preterm	21

1. Pengertian persalinan preterm	21
2. Klasifikasi persalinan preterm	21
3. Etiologi persalinan preterm.....	23
4. Diagnosis persalinan preterm.....	24
5. Komplikasi persalinan preterm.....	26
6. Dampak persalinan preterm.....	30
7. Penanganan persalinan preterm	33
C. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir Preterm	37
1. Pengertian bayi baru lahir preterm.....	37
2. Ciri-ciri bayi baru lahir preterm.....	37
3. Masalah-masalah pada bayi baru lahir preterm	40
4. Penanganan bayi baru lahir preterm	41
D. Tinjauan Islam Tentang Persalinan.....	42
E. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Persalinan Preterm	45
1. Pengertian manajemen kebidanan	45
2. Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan.....	46
BAB III : STUDI KASUS	
A. Kala I.....	56
B. Kala II	75
C. Kala III.....	86
D. Kala IV.....	92
E. Pendokumentasian dalam bentuk SOAP	99

BAB IV : PEMBAHASAN


A. Kala I.....	116
B. Kala II.....	126
C. Kala III.....	134
D. Kala IV.....	139

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA.....	147
----------------------------	------------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks di sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Prawirohardjo, 2014).

Persalinan preterm adalah persalinan yang berlangsung pada umur kehamilan 20-37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Badan kesehatan dunia (World Health Organization) menyatakan bahwa bayi preterm adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang. Himpunan Kedokteran Fetomaternal POGI di Semarang tahun 2005 menetapkan bahwa persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 22-37 minggu.

Angka kejadian persalinan preterm pada umumnya adalah sekitar 6-10 %. Hanya 1,5 % persalinan terjadi pada umur kehamilan kurang dari 32 minggu dan 0,5 % pada kehamilan kurang dari 28 minggu (Prawirohardjo, 2014).

Sampai saat ini mortalitas dan morbiditas neonatus pada bayi preterm masih sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan maturitas organ pada bayi baru lahir seperti paru, otak dan gastrointestinal. Di Negara berkembang sampai 80% dari kematian

neonatus adalah akibat pretermitas, dan pada bayi yang selamat 10% mengalami permasalahan dalam jangka panjang (Prawirohardjo, 2014).

Berdasarkan survey demografi kesehatan Indonesia, AKI di Indonesia meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan negara tetangga maka AKI di Indonesia masih tergolong tinggi, seperti Singapura 6/100.000 kelahiran hidup, Malaysia 39/100.000 kelahiran hidup, Thailand 44/100.000 kelahiran hidup dan Filipina 170/100.000 kelahiran hidup. AKB di Indonesia 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (Kemenkes RI, 2012).

Jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 sebanyak 133 orang atau 101,56 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 143 kematian atau 92,89 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2008 jumlah kematian ibu maternal mengalami penurunan menjadi 121 orang atau 85,17 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi pada tahun 2010 sebesar 854 bayi atau 5,8 per 1000 kelahiran hidup (Dinkes.ProvSulsel, 2011).

Adapun angka kematian ibu pada tahun 2009 mencapai 118 orang atau 78,84/100.000 kelahiran hidup, tahun 2010 menurun menjadi 114 orang atau 77,13% per 100.000 kelahiran hidup, dimana 64,03% disebabkan oleh komplikasi

persalinan. Angka Kematian Bayi pada tahun 2011 sebesar 868 bayi atau 5,90 per 1000 kelahiran hidup (Dinkes.ProvSulsel, 2012)

Pada tahun 2011 angka kematian ibu menjadi 97 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes.ProvSulsel, 2013).

Pada tahun 2013 Angka Kematian Ibu sebesar 115 orang atau 78,38 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2014 sebesar 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahiran hidup (DinKes ProvSulsel, 2015).

Di kota Makassar, Aki maternal pada tahun 2009 sebanyak 4 kasus kematian ibu dari 27.967 jumlah kelahiran hidup sehingga didapatkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 16 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dari tahun 2008 dimana tercatat 4 kasus kematian ibu dari 24.853 kelahiran hidup dengan AKI 16,1/100.000 kelahiran hidup (DinKes Kota Makassar, 2011).

AKI maternal pada tahun 2011 sebesar 11,4 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan jumlah kematian ibu sepanjang tahun 2010 sebanyak 3 kasus kematian ibu dari 25.830 jumlah kelahiran hidup sehingga didapatkan Angka Kematian Ibu sebesar 11,6 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi pada tahun 2011 terdapat 179 kasus kematian bayi dari jumlah kelahiran hidup 26.129, sehingga diperoleh AKB sebesar 6,9 per 1.000 kelahiran hidup (DinKes Kota Makassar, 2012).

Adapun AKI maternal pada tahun 2012 menurun dari tahun ke tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,32 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini didapatkan

dari hasil formulasi data yang dilaporkan serta hasil pencatatan unit-unit pelayanan kesehatan yang direkap dan dilaporkan oleh Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar dimana tercatat 2 kasus kematian ibu Maternal dari 24.034 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi pada tahun 2012 sebesar 6,78 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi sebesar 163 kematian bayi dari 24.034 jumlah kelahiran hidup (DinKes Kota Makassar, 2013).

Angka Kematian Ibu pada tahun 2013 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,27 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi pada tahun 2013 sebesar 6,71 per kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi sebesar 165 kematian bayi dari 24.576 jumlah kelahiran hidup. (DinKes Kota Makassar, 2014).

Data yang diperoleh dari Medical Record RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar pada bulan januari-desember 2015 tercatat jumlah persalinan preterm sebanyak 150 (35,2%) dari 426 persalinan (Medical Record RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, 2015).

Berdasarkan pengalaman peneliti di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, banyak ditemukan pasien yang datang dengan diagnosa persalinan preterm penyebab pasti dari persalinan preterm itu sendiri tidak jelas diketahui. Sama dengan pasien bersalin lainnya, pasien dengan persalinan preterm datang dengan keluhan yang sama, yang membedakan adalah usia kehamilan dan juga hasil dari pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan fisik dan USG.

Persalinan preterm biasanya dilakukan pervaginam, dengan persiapan alat-alat dan tim medis yang memadai mengingat komplikasi yang akan terjadi selama proses persalinan dan setelah bayi lahir.

Penyebab kematian neonatal diantaranya adalah asfiksia neonatorum 49-60%, infeksi 24-30%, prematuritas atau berat bayi lahir rendah 15-20%, trauma persalinan 2-7% dan cacat bawaan 1-3% (Manuaba, 2008).

Maturasi fungsi system organ merupakan syarat bagi bayi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan luar rahim. Bayi preterm fungsi system organnya belum matur sehingga kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu membutuhkan perhatian dan perawatan yang intensif untuk mengembangkan fungsi optimum bayi (Surasmi, 2009).

Dengan mengetahui tingkat resiko pada persalinan preterm, maka dibutuhkan program yang terarah dalam memberikan edukasi dan penanganan medik yang tepat pada proses persalinan preterm agar mendapat asuhan persalinan yang aman dan memuaskan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda :” Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi).

Untuk itu pada penelitian kali ini akan menggambarkan bagaimana manajemen yang tepat pada proses persalinan preterm sehingga dapat menekan meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas baik pada ibu dan bayi.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam pembahasan studi ini menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan intranatal pada kasus persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus persalinan preterm serta dilakukan manajemen asuhan kebidanan secara nyata sesuai standar dan wewenang bidan di RSKD ibu dan anak pertiwi.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengumpulan data dan analisis data dasar pada kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.
- b. Dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah aktual pada kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.
- c. Dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah potensial pada kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.
- d. Dilaksanakan pengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.

- e. Dilaksanakan rencana tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.
- g. Dilaksanakan evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.
- h. Dilaksanakan pendokumentasikan semua temuan dan tindakan dalam asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada kasus persalinan preterm di RSKD ibu dan anak pertiwi.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan pada kasus tersebut di atas adalah :

1. Merupakan bahan pembelajaran, sumber pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menangani persalinan preterm.
2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi petugas kesehatan, utamanya yang ada di dalam menangani kasus persalinan preterm.
4. Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang persalinan preterm.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Studi Pustaka

Penulis membaca dan mempelajari buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan kasus persalinan preterm.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, analisa dan perumusan diagnose/masalah actual dan potensial, perencanaan tindakan, evaluasi dan pendokumentasian.

Untuk memperoleh data dalam pengkajian, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga, bidan dan dokter yang berada di kamar bersalin yang berhubungan dengan kasus yang di hadapi pasien.

b. Observasi

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung.

c. Pemeriksaan fisik

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan sistematis agar didapatkan data yang akurat.

3. Studi dokumentasi

Penulis memperoleh informasi berdasarkan catatan medik klien, baik dari bidan, dokter maupun data penunjang lainnya.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan tenaga kesehatan, pembimbing dan institusi demi kelancaran penulisan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan yang digunakan dalam studi kasus ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Ruang lingkup pembahasan
- C. Tujuan penulisan
- D. Manfaat penulisan
- E. Metode penulisan
- F. Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang persalinan
 - 1. Pengertian persalinan
 - 2. Tujuan asuhan persalinan
 - 3. Tanda – tanda persalinan

4. Tahap – tahap dalam proses persalinan
 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
 6. Mekanisme persalinan
- B. Tinjauan khusus tentang persalinan preterm.
1. Pengertian persalinan preterm
 2. Klasifikasi persalinan preterm
 3. Etiologi persalinan preterm
 4. Diagnosis persalinan preterm
 5. Komplikasi persalinan preterm
 6. Dampak persalinan preterm
 7. Penanganan persalinan preterm
- C. Tinjauan umum tentang bayi baru lahir preterm
1. Pengetian bayi baru lahir preterm.
 2. Ciri-ciri bayi baru lahir preterm.
 3. Masalah-masalah pada bayi baru lahir preterm.
 4. Penanganan bayi baru lahir preterm.
- D. Tinjauan Islam tentang persalinan
- E. Proses manajemen asuhan kebidanan
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan
 2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan

1. Pengertian persalinan

Persalinan adalah proses untuk mendorong keluar (ekspulsi) hasil pembuahan yaitu (janin, ketuban dan placenta) dari dalam uterus lewat vagina ke dunia luar. Normalnya, proses ini berlangsung pada suatu saat ketika uterus tidak dapat tumbuh lebih besar lagi, ketika janin sudah cukup mature untuk dapat hidup di luar rahim tapi masih cukup kecil untuk dapat melalui jalan lahir (Tando, 2012).

Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa persalinan (labor) adalah rangkaian peristiwa mulai dari pertemuan sel sperma dan sel telur sampai dikeluarkannya produk konsepsi (janin, placenta, selaput ketuban dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri (Sumarah, dkk., 2011).

Persalinan merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu). Lahir dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Indrayani, 2013).

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks. Masa kehamilan di mulai dari konsepsi dan janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dalam kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Indrayani, 2013).

Persalinan normal adalah persalinan dengan presentasi janin belakang kepala yang berlangsung secara spontan dengan lama persalinan dalam batas normal, beresiko rendah sejak awal persalinan hingga partus dengan masa gestasi 37 - 42 minggu (World Health Organization).

2. Tujuan asuhan persalinan

Tujuan utama dalam asuhan persalinan ini adalah mengupayakan kelangsunga hidup serta mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui beberapa upaya yang terintegrasi yang lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga secara optimal.

Tujuan lain dari asuhan persalinan adalah :

- a. Untuk memastikan bahwa proses persalinan berjalan normal atau alamiah dengan intervensi minimal sehingga ibu dan bayi selamat dan sehat.

- b. Memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, sosial dan spiritual ibu.
- c. Memastikan tidak ada penyulit/komplikasi dalam persalinan.
- d. Memastikan ibu agar mendapat pengalaman melahirkan yang menyenangkan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran masa nifasnya.
- e. Memfasilitasi jalinan kasih sayang antara ibu, bayi dan keluarga.
- f. Mempersiapkan ibu dan keluarga dalam menghadapi perubahan peran terhadap kelahiran bayinya (Indrayani, 2013).

3. Tanda –tanda mulainya persalinan

a. His / kontraksi

His atau kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan menimbulkan ketidaknyamanan serta kadang-kadang nyeri merupakan tanda persalinan yang sebenarnya kalau his tersebut berlanjut terus dan semakin meningkat frekuensinya.

b. Bloody show

Bloody show diartikan sebagai terlihatnya mukus atau lendir yang mengandung bercak darah dan keluar dari vagina. Lendir tersebut berasal dari serviks dan selama kehamilan berfungsi sebagai sumbatan pelindung. Kemunculannya menunjukkan bahwa serviks sudah mulai berdilatasi.

c. Dilatasi serviks

Dilatasi yang terjadi secara bertahap merupakan indikator yang menunjukkan kemajuan persalinan tersebut disertai dengan kontraksi uterus. Dilatasi serviks diketahui atau dipastikan dengan pemeriksaan pervaginam.

d. Engagement presenting part

Presenting part (yang biasanya kepala janin) akan mengalami “engagement” atau “tertanam” kedalam panggul. Pada primigravida, peristiwa ini terjadi 3–4 minggu sebelum proses persalinan dimulai. Dinding abdomen pada multipara tidak begitu kencang sehingga engagement baru terjadi setelah proses persalinan dimulai (Kuswanti, 2014).

4. Tahap – tahap dalam proses persalinan

a. Persalinan kala I

Persalinan kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Proses ini berlangsung kurang lebih 18–24 jam, yang terbagi menjadi 2 fase yaitu fase laten (8 jam) dan fase aktif (7 jam). Keadaan tersebut dapat dijumpai baik pada primigravida maupun multipara, akan tetapi pada multipara fase laten dan fase aktif terjadi lebih pendek. Berdasarkan kurve fridman, di perhitungkan

pembukaan pada primigravida 1 cm/jam dan pembukaan pada multipara 2cm/jam.

b. Kala II (pengeluaran)

Dimulai dari pembukaan 10 cm sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multipara.

c. Kala III (pelepasan uri)

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya placenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan placenta dari dindingnya.

d. Kala IV

Dimulai dari saat lahirnya placenta sampai 2 jam pertama post partum. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi (Sumarah, dkk, 2011).

5. Faktor yang mempengaruhi persalinan

a. Faktor power

Power adalah tenaga atau kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi

diagfragma dan aksi dari ligamen, dengan kerjasama yang baik dan sempurna.

His (kontraksi Uterus)

His adalah kekuatan kontraksi uterus karena otot – otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, fundus dominan, terkoordinasi dan relaksasi.

Pembagian his dan sifat–sifatnya :

- 1) His pendahuluan: his tidak kuat, datangnya tidak teratur, menyebabkan keluarnya lendir darah atau bloody show.
- 2) His pembukaan (kala I): menyebabkan pembukaan serviks semakin kuat, teratur dan sakit.
- 3) His pengeluaran (kala II): untuk mengeluarkan janin, sangat kuat, teratur, simetris, terkoordinasi.
- 4) His pelepasan uri (kala III): kontraksi sedang untuk melepaskan dan melahirkan placenta.
- 5) His pengiring (kala IV) : kontraksi lemah, masih sedikit nyeri, terjadi pengecilan rahim dalam beberapa jam atau hari.

Dalam melakukan observasi pada ibu bersalin, hal – hal yang harus di perhatikan dari his adalah:

- 1) Frekuensi his: jumlah his dalam waktu tertentu, biasanya per menit atau per 10 menit.

- 2) Intensitas his: kekuatan his (adekuat atau lemah).
- 3) Durasi (lama his): lamanya setiap his berlangsung dan di tentukan dengan detik misalnya 50 menit.
- 4) Interval his: jarak antara his satu his berikutnya, misalnya his datang tiap 2 – 3 menit.

Tenaga mendedan

- 1) Setelah pembukaan lengkap dan ketuban pecah, tenaga yang mendorong anak keluar selain his, terutama disebabkan oleh kontraksi otot – otot dinding perut, yang mengakibatkan peninggian tekanan intraabdominal.
- 2) Tenaga ini serupa dengan tenaga mendedan waktu kita buang air besar, tapi jauh lebih kuat lagi.
- 3) Saat kepala sampai kedasar panggul, timbul refleks yang mengakibatkan ibu menutup glottisnya, mengontraksikan otot-otot perut dan menekan diafragmanya ke bawah.
- 4) Tenaga mendedan ini hanya dapat berhasil bila pembukaan sudah lengkap dan paling efektif sewaktu ada his.
- 5) Tanpa tenaga mendedan, anak tidak dapat lahir. Misalnya pada penderita yang lumpuh otot–otot perutnya, persalinan harus dibantu dengan forceps.
- 6) Tenaga mendedan ini juga melahirkan placenta setelah terlepas dan dinding rahim (Asrinah, dkk., 2010).

b. Faktor passenger

Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor janin, yang meliputi sikap janin, letak, presentasi, bagian terbawah, dan posisi janin.

1) Letak

Adalah bagaimana sumbu janin berada terhadap sumbu ibu.

2) Presentasi

Dipakai untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim, yang dijumpai ketika palpasi atau pemeriksaan dalam. Misalnya presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu, dan lain – lain.

3) Bagian terbawah janin :

Sama dengan presentasi, hanya lebih diperjelas istilahnya (Asrinah, dkk., 2010).

c. Faktor passage (jalan lahir)

Passage atau faktor jalan lahir dibagi menjadi: (a) bagian keras: tulang–tulang panggul (rangka panggul), (b) bagian lunak: otot–otot, jaringan–jaringan dan ligament–ligament (Asrinah, dkk., 2010).

d. Faktor psikologi ibu

Keadaan psikologi ibu memengaruhi proses persalinan. Ibu bersalin yang didampingi oleh suami dan orang–orang yang dicintainya

cenderung mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibandingkan dengan ibu bersalin yang tanpa didampingi suami atau orang-orang yang dicintainya. Ini menunjukkan bahwa dukungan mental sangat berdampak positif bagi keadaan psikis ibu, yang berpengaruh pada kelancaran proses persalinan (Asrinah, dkk., 2010).

e. Faktor penolong

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar proses persalinan dan mencegah kematian maternal neonatal. Dengan pengetahuan dan kompetensi yang baik kesalahan atau malpraktek dalam memberikan asuhan tidak terjadi (Asrinah, dkk., 2010).

6. Mekanisme persalinan

Mekanisme persalinan normal merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala melewati panggul.

Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang/oblig didalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Penurunan dimulai sebelum onset persalinan atau inpartu. Penurunan kepala terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kekuatan yang mendukung antara lain, tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong janin kontraksi otot abdomen.

Fleksi gerakan fleksi disebabkan karena janin terus didorong maju, tetapi kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai di bawah symphysis. Ekstensi merupakan gerakan dimana oksiput berhimpit langsung pada margo inferior symphysis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan atas, sehingga kepala menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya.

Putaran paksi luar di pengaruhi oleh faktor-faktor panggul, sama seperti pada putaran paksi dalam. Putaran paksi luar merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin, bagian belakang kepala berhadapan dengan tuber isciadikum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap ke salah satu paha ibu.

Ekspulsi setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai hypomochlion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah kedua bahu lahir disusul lahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir janin seutuhnya. Gerakan kelahiran bahu depan, bahu belakang dan badan seluruhnya (Kuswanti, dkk., 2014).

B. Tinjauan khusus tentang persalinan preterm

1. Pengertian persalinan preterm

- a. Persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu (antara 20 – 37 minggu) atau dengan berat janin kurang dari 2500 gram (Nugroho, 2011).
- b. Persalinan preterm adalah apabila janin di lahirkan dalam umur 28–38 minggu. Meskipun bayi tersebut belum genap bulannya, akan tetapi dalam keadaan yang baik serta pengawasan dan pemeliharaan yang sempurna bayi tersebut dapat hidup sendiri diluar kandungan ibunya, lebih-lebih jika sudah mencapai bulan ke Sembilan (Rahmawati, 2010).

Dari beberapa sumber diatas dapat di simpulkan bahwa :

Persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada umur kehamilan yang belum aterm (cukup bulan) yaitu 20-37 minggu. Dengan berat badan bayi lahir kuarang dari 2500 gram. Dan bayi dapat hidup di luar kandungan ibu meskipun dengan organ yang belum matang.

2. Klasifikasi persalinan preterm

- a. Menurut kejadiannya, persalinan preterm digolongkan menjadi :

- 1) Spontan

Sekitar 50% penyebab persalinan preterm tidak diketahui, oleh karena itu, digolongkan pada kelompok persalinan preterm spontan. Termasuk dalam golongan ini antara lain persalinan preterm akibat

kehamilan kembar, polihidramnion, atau persalinan preterm yang didasari oleh faktor psikososial dan gaya hidup.

2) Elektif

Hal – hal yang dapat menyebabkan persalinan preterm elektif adalah

a) Keadaan ibu yang dapat menyebabkan persalinan preterm elektif :

- (1) Preeclampsia berat dan eklampsia.
- (2) Perdarahan antepartum (placenta previa dan solusio placenta).
- (3) Penyakit jantung, paru dan ginjal yang berat.

b) Keadaan janin yang dapat menyebabkan persalinan preterm elektif :

- (1) Gawat janin (hipoksia atau gangguan jantung janin).
- (2) Infeksi intrauterine.
- (3) Pertumbuhan janin terhambat.

b. Menurut usia kehamilannya, maka klasifikasi persalinan preterm adalah :

- 1) Usia kehamilan 32-36 minggu di sebut persalinan preterm.
- 2) Usia kehamilan 28-32 minggu disebut persalinan sangat preterm.
- 3) Usia kehamilan antara 20-27 minggu disebut ekstrem preterm.

c. Menurut berat badan lahir, maka bayi preterm dibagi dalam kelompok :

- 1) Berat badan bayi 1500-2500 gram disebut bayi dengan berat badan lahir rendah.
- 2) Berat badan bayi 1000-1500 gram disebut bayi dengan berat badan sangat rendah.

3. Etiologi persalinan preterm

a. Janin dan placenta

- 1) Perdarahan trimester awal.
- 2) Perdarahan antepartum (placenta previa dan solusio placenta).
- 3) Ketuban pecah dini (KPD).
- 4) Pertumbuhan janin terhambat.
- 5) Cacat bawaan janin.
- 6) Kehamilan ganda/gemeli.
- 7) Polihidramnion.

b. Ibu

- 1) Penyakit berat pada ibu.
- 2) Diabetes militus.
- 3) Hipertensi/preeclampsia.
- 4) Infeksi saluran kemih.
- 5) Penyakit infeksi dengan demam.
- 6) Stress psikologik.
- 7) Kelainan bentuk uterus.
- 8) Riwayat persalinan preterm/abortus berulang.
- 9) Inkompetensi serviks (panjang serviks kurang dari 1 cm) (Prawirohardjo, 2014).

4. **Diagnosis persalinan preterm**

Sering terjadi kesulitan dalam menentukan diagnosis ancaman persalinan preterm. Tidak jarang kontraksi yang timbul pada kehamilan tidak benar benar merupakan ancaman proses persalinan.

Beberapa kriteria dapat dipakai sebagai diagnosis ancaman persalinan preterm yaitu:

- a. Kontraksi yang berulang sedikitnya setiap 7 – 8 menit sekali, atau 2 – 3 kali dalam waktu 10 menit.
- b. Adanya nyeri pada punggung bawah.
- c. Perdarahan bercak.
- d. Pemeriksaan serviks menunjukkan telah terjadi pembukan serviks sedikitnya 2 cm dan penipisan 50 – 80 %.
- e. Presentasi janin rendah.
- f. Selaput ketuban pecah dapat menjadi tanda awal terjadinya persalinan preterm.
- g. Terjadi pada usia kehamilan 22–37 minggu (Prawirohardjo, 2014).

Adapun yang di kutip dari referensi lainnya ada beberapa hal yang dapat di perhatikan untuk ditariknya sebuah diagnosa yaitu :

- a. Usia kehamilan <20 dan >37 minggu lengkap atau antara 140 dan 259 hari.
- b. Tinggi fundus uteri sesuai dengan usia gestasi.
- c. Tafsiran berat janin sesuai dengan usia gestasi.

- d. Kontraksi uterus (his) teratur, pastikan dengan pemeriksaan inspekulo adanya pembukaan dan servitis.
- e. Pemeriksaan dalam menunjukkan bahwa serviks telah mendatar 50–80%, atau sedikitnya 2 cm.
- f. Selaput ketuban sering kali telah pecah.
- g. Merasakan gejala seperti rasa kaku di perut menyerupai kaku menstruasi, rasa tekanan intrapelvik dan nyeri bagian belakang.
- h. Mengeluarkan lendir pervaginam, mungkin mengeluarkan darah (Nugroho, 2011).

Dari kedua sumber di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dapat di lihat untuk menentukan diagnose persalinan preterm yaitu:

- a. Umur kehamilan (>20-<37 minggu).
- b. Tinggi fundus uteri sesuai dengan usia gestasi.
- c. Tafsiran berat janin sesuai dengan usia gestasi.
- d. Tanda – tanda persalinan pada umumnya yaitu :
 - 1) Adanya kontraksi uterus (His) yang teratur.
 - 2) Sakit perut tembus ke belakang.
 - 3) Terdapat pengeluaran lendir dan darah.
 - 4) Terdapat pembukaan serviks dan penipisan serviks.
 - 5) Selaput ketuban pecah.

5. Komplikasi persalinan preterm

a. Distress maternal

Distress maternal (kelelahan ibu) harus dicegah karena memburuknya kondisi wanita akan mempengaruhi keadaan ibu dan janin yang belum lahir. Memperhatikan asuhan nutrisi pada ibu sejak awal persalinan dan segera mencari bantuan dokter jika persalinan tidak mengalami kemajuan.

b. Asfiksia

Asfiksia neonatorum merupakan keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat asam arang dari tubuhnya (Dewi, 2013).

Asfiksia terbagi atas 3 yakni:

1) Asfiksia berat (nilai APGAR 0-3)

- a) Frekuensi jantung kecil, yaitu < 40 kali per menit.
- b) Tidak ada usaha napas.
- c) Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada.
- d) Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan.
- e) Bayi tampak pucat bahkan tampak berwarna kelabu.

2) Asfiksia sedang (nilai APGAR 4-6)

- a) Frekuensi jantung menurun menjadi 60-80 kali per menit.

- b) Usaha napas lambat.
 - c) Tonus otot biasanya dalam keadaan baik.
 - d) Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan.
 - e) Bayi tampak sianosis.
- 3) Asfiksia ringan (nilai APGAR 7-10)
- a) Takipnea dengan napas lebih dari 60 kali per menit.
 - b) Bayi tampak sianosis.
 - c) Bayi merintih.
 - d) Adanya pernapasan cuping hidung.
 - e) Bayi kurang aktivitas (Dewi, 2013).

Asfiksia bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ibu, placenta, fetus dan neonatus (Rukiah, 2013).

1) Ibu

Apabila ibu mengalami hipoksia, maka janin juga akan mengalami hipoksia yang dapat berkelanjutan menjadi asfiksia dan komplikasi lain.

2) Placenta

Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi oleh luas dan kondisi placenta, misalnya solusio placenta, placenta previa dll.

3) Fetus

Kompresi umbilikus akan dapat menyebabkan terganggunya aliran darah dalam pembuluh darah umbilikus dan menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin.

4) Neonatus

Depresi pusat pernapasan pada bayi baru lahir dapat terjadi karena beberapa hal berikut :

- a) Pemakaian anestesi yang berlebihan pada ibu.
- b) Trauma yang terjadi selama persalinan.
- c) Kelainan congenital pada bayi.

Tindakan yang dapat dilaksanakan pada bayi asfiksia neonatorum adalah sebagai berikut:

- 1) Bersihkan jalan napas dengan pengisap lendir dan kasa steril.
- 2) Potong tali pusat dengan teknik aseptik dan antiseptik.
- 3) Segera keringkan badan bayi dengan handuk/kain bersih dan kering.
- 4) Nilai status pernapasan. Lakukan tindakan berikut jika ditemukan tanda-tanda asfiksia:
 - a) Segera baringkan dengan kepala bayi sedikit ekstensi dan penolong berada disisi kepala bayi.
 - b) Miringkan kepala bayi.

- c) Bersihkan mulut bayi dengan kasa yang dibalut pada jari telunjuk.
- d) Isap cairan dari mulut dan hidung.

5) Lanjutkan menilai status pernapasan.

Nilai status pernapasan apabila masih ada tanda asfiksia, caranya dengan menggosok punggung bayi (melakukan rangsangan taktil). Bila tdiak ada perubahan segera beri napas buatan (Dewi, 2013).

c. Gawat janin

Gawat janin terjadi bila janin tidak menerima O₂ cukup, sehingga mengalami hipoksia. Situasi ini dapat terjadi kronik (jangka waktu panjang) atau akut.

Tanda gawat janin, djj dalam proses persalinan bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu. Bila djj tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan tanda gawat janin (Saifuddin, 2010).

d. Perdarahan post partum

Perdarahan post partum adalah kehilangan darah melebihi 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 ml setelah persalinan abdominal (Walyani, 2015).

Diagnosis perdarahan post partum dapat ditegakkan bila setelah bayi dan placenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak,

bergumpal dan pada palpasi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek (Prawirohardjo, 2014).

6. Dampak persalinan preterm

a. Infeksi intrapartum

Infeksi adalah bahaya yang mengancam ibu dan janinnya pada proses persalinan, terutama bila disertai pecahnya ketuban. Bakteri didalam cairan amnion, menginvasi desidua serta pembuluh korion sehingga terjadi bacteremia dan sepsis pada ibu dan janin.

b. Hipotermia

Suhu normal bayi berkisar antara $36,5^{\circ}\text{C}$ – $37,5^{\circ}\text{C}$. gejala awal hipotermi apabila suhu $<36^{\circ}\text{C}$ atau kedua kaki dan tangan teraba dingin. Bila seluruh tubuh bayi teraba dingin maka bayi sudah mengalami hipotermi sedang suhu 32 – 36°C . di sebut hipotermi berat jika suhu tubuh 32°C . Disamping suatu gejala, hipotermi dapat merupakan suatu awal penyakit penyebab kematian. Hipotermi menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, yang mengakibatkan terjadinya metabolik anerobik meningkatkan kebutuhan oksigen, mengakibatkan hipoksia dan berlanjut dengan kematian (Prawirohardjo, 2010).

c. Kejang

Kejang pada neonatus bukanlah suatu penyakit, namun merupakan suatu gejala penting akan adanya penyakit lain. Penyebab utama kejang

adalah kelainan bawaan dari otak, sedangkan penyebab sekundernya adalah gangguan metabolik atau penyakit lain seperti infeksi.

Ada beberapa hal yang juga diduga sebagai penyebab kejang:

- 1) Ibu tidak imunisasi TT sehingga dapat menyebabkan infeksi.
 - 2) Perdarahan pada saat usia kehamilan kurang dari 28 minggu, sehingga menyebabkan hipoksia.
 - 3) Gawat janin pada masa kehamilan dan persalinan sehingga mengharuskan induksi. Kondisi ini dapat menyebabkan asfiksia.
 - 4) Persalinan dengan tindakan (vacuum ekstraksi, cunam dan fosep).
 - 5) Alat-alat yang digunakan pada saat menolong persalinan tidak steril sehingga dapat menyebabkan infeksi.
 - 6) Trauma pada janin selama kehamilan atau selama persalinan dapat menyebabkan perdarahan intracranial.
 - 7) Ibu yang menderita DM (Dewi, 2013).
- d. Bayi berat lahir rendah (BBLR).

Bayi berat lahir rendah ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR dibagi menjadi :

- 1) Bayi berat lahir rendah (BBLR), berat lahir 1500-2500 gram.
- 2) Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) berat lahir <1500 gram.
- 3) Bayi berat lahir ekstrem rendah (BBLER) berat lahir <1000 gram.

Penanganan bayi berat lahir rendah adalah sebagai berikut:

1) Mempertahankan suhu dengan ketat.

BBLR mudah mengalami hipotermi, oleh sebab itu suhu tubuhnya harus dipertahankan dengan sangat ketat.

2) Mencegah infeksi dengan ketat.

BBLR sangat rentan akan infeksi, perhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi termasuk cuci tangan sebelum memegang bayi.

3) Pengawasan nutrisi/ASI

Refleks menelan BBLR belum sempurna, oleh sebab itu pemberian nutrisi harus diperhatikan dengan cermat.

4) Penimbangan ketat.

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilaksanakan dengan ketat.

Kebutuhan cairan untuk bayi baru lahir 120-150 ml/kg/hari atau 100-200 cal/kg/hari. Pemberian dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan bayi untuk sesegera mungkin mencakup kebutuhan cairan/kalori (Prawirohardjo, 2010).

7. Penanganan persalinan preterm

a. Pemantauan Persalinan

Pemantaua persalinan perlu diperhatikan untuk memastikan kondisi ibu dan janin. Pemantauan persalinan meliputi: memantauan denyut jantung janin, pemantauan his dan kemajuan persalinan.

b. Kortikosteroid

Pemberian terapi kortikosteroid dimaksudkan untuk pematangan surfaktan paru janin, mencegah perdarahan intraventrikuler, yang akhirnya menurunkan kematian neonatus.

Obat yang diberikan adalah: deksametason atau betametason. Pemberian steroid ini tidak diulang karena resiko terjadinya pertumbuhan janin terhambat. Pemberian antibiotik bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi intrapartum, antibiotika hanya diberikan bilamana kehamilan mengandung resiko terjadinya infeksi seperti pada kasus ketuban pecah dini.

- 1) Betametason : 2×12 mg (IM) dengan jarak pemberian 24 jam.
- 2) Deksametason: 4×6 mg (IM) dengan jarak pemberian 12 jam.

c. Kelahiran

- 1) Kelahiran harus dilaksanakan secara hati-hati dan perlahan–lahan sesuai dengan APN.

- 2) Ketuban tidak boleh di pecahkan. Kantong ketuban berguna sebagai bantal bagi tengkorak preterm yang lunak dengan sutura-suturnya yang masih terpisah lebar.
 - 3) Episiotomy mengurangi tekanan pada kranium bayi.
 - 4) Forceps rendah dapat membantu dilatasi bagian lunak jalan lahir dan mengarahkan kepala bayi lewat perineum. Akan tetapi lebih baik jika kelahiran spontan jika keadaanya memungkinkan.
 - 5) Ekstraksi bokong tidak boleh dilaksanakan. Bahaya tambahan pada kelahiran preterm adalah bahwa bokong tidak dapat menghasilkan pelebaran jalan lahir yang cukup untuk menyediakan ruang bagi kepala bayi yang relative besar.
 - 6) Kelahiran presipitatus dan yang tidak di tolong berbahaya bagi bayi-bayi preterm.
 - 7) Seorang ahli neonatus harus hadir saat kelahiran. (Oxorn, 2010).
- d. Penanganan bayi baru lahir
- 1) Bebaskan jalan napas dilakukan dengan mengisap lendir menggunakan delee atau bola karet.
 - 2) Mengeringkan bayi.
 - 3) Mencegah kehilangan suhu.
 - 4) Mencegah infeksi (Wahyuni, 2012).

e. Resusitasi pada bayi.

Persiapan resusitasi

1) Persiapan keluarga

Sebelum menolong persalinan, bicarakan dulu pada keluarga mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada ibu dan bayi.

2) Persiapan tempat

Gunakan tempat yang hangat dan terang. tempat resusitasi hendaknya rata, bersih, keras dan kering. Kondisi rata diperlukan untuk mengatur posisi kepala bayi.

3) Persiapan alat

- a) 2 helai kain atau handuk.
- b) Bahan ganjal bahu.
- c) Delee atau bola karet.
- d) Tabung dan sungkup.
- e) Sarung tangan.

4) Persiapan diri

- (a) Memakai APD.
- (b) Lepaskan semua perhiasan dan mencuci tangan.
- (c) Gunakan sarung tangan.
- (d) Kotak alat resusitasi (Tando, 2013).

Tahapan-tahapan dalam melakukan resusitasi:

1) Rangsangan taktil

Dilakukan dengan menepuk-nepuk atau menyentil telapak kaki bayi atau menggosok-gosok punggung bayi.

2) Ventilasi tekanan positif (VTP)

VTP dilakukan dengan sungkup dan balon resusitasi atau dengan sungkup dan tabung. Kecepatan ventilasi 40-60 kali per menit.

a) Frekuensi jantung > 100

Dilakukan rangsangan taktil untuk merangsang frekuensi dan dalamnya pernapasan. VTP dihentikan.

b) Frekuensi jantung 60-100

Lanjutkan VTP.

c) Frekuensi jantung < 60

Lanjutkan VTP dan mulai kompresi dada.

d) Kompresi dada

Kompresi dilakukan di $1/3$ bagian bawah tulang dada dibawah garis khayal yang menghubungkan kedua puting susu bayi. Rasio kompresi dada dan VTP dalam 1 menit adalah 90 kompresi dada dan 30 VTP (rasio 3:1). Dengan demikian kompresi

dilakukan 3 kali dalam 1 ½ detik dan ½ detik untuk 1 kali ventilasi.

e) Memberikan obat-obatan

Pemberian obat-obatan dilakukan setelah usaha VTP dan kompresi dada tidak berhasil. Obat pertama yang diberikan adalah Epinefrin dosis 0,1-0,3 ml/kg (IV) (Drew, dkk., 2009).

C. Tinjauan umum tentang bayi baru lahir preterm

1. Pengertian bayi baru lahir preterm

- a. Bayi baru lahir preterm adalah bayi yang dilahirkan sebelum usia gestasi 37 minggu, tanpa memperhatikan berat badan (Reeder, dkk., 2012).
- b. Menyatakan bahwa bayi preterm adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang (WHO).

2. Ciri-ciri bayi preterm

Berikut ini adalah ciri-ciri bayi yang dilahirkan secara prematur yang harus diketahui:

a. Tertutup Lanugo

Kebanyakan bayi yang dilahirkan secara prematur, seluruh tubuhnya akan ditutupi dengan lanugo atau rambut halus. Lanugo itu bisa menutupi di bagian wajah dan juga tubuhnya. Pada bayi yang dilahirkan secara normal, lanugo itu bisa hilang dengan sendirinya. Pada bayi yang dilahirkan dengan

prematur, hilangnya lanugo tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bayi yang terlahir secara normal.

b. Refleksi Belum Sempurna

Bayi prematur akan memiliki ciri-ciri refleksnya belum sempurna, misalnya saja jika disentuh dan dipegang, bayi tersebut akan terlambat dalam merefleksinya. Yang belum sempurna yang lainnya adalah refleks hisapnya belum sempurna sehingga bayi akan kesulitan jika harus menyusui dari ibunya. Kebanyakan bayi yang lahir prematur, makanan dan minumannya akan dialirkan melalui selang infus.

c. Memiliki Kulit Tipis

Jaringan kulit pada bayi yang dilahirkan secara prematur belum terbentuk dengan sempurna sehingga kulit bayi prematur itu terlihat lebih tipis dibandingkan dengan kulit bayi yang dilahirkan dengan normal. Kulit yang tipis itu bisa membuat bayi yang dilahirkan secara prematur bisa terlihat pembuluh darah di jaringan kulitnya tersebut.

d. Telinga Elastis

Karena organ telinganya belum terbentuk dengan sempurna, bayi yang terlahir belum cukup umur bisa memiliki tulang telinga yang elastis. Tulang tersebut sangat elastis dan sangat lunak, jika pada umumnya daun telinga akan sedikit kaku jika dipegang. Tulang pada daun telinga bayi akan sangat elastis dan juga sangat lentur.

e. Pernafasan Belum Sempurna

Ciri ciri bayi lahir prematur atau belum cukup umur akan memiliki pernafasan yang belum sempurna, bayi itu akan masuk ke ruangan khusus dengan bantuan selang oksigen di hidungnya. Penyebabnya adalah organ paru-paru bayi belum matang dan belum sempurna sehingga bayi jika hidup di luar rahim dia membutuhkan bantuan alat pernafasan berupa oksigen.

f. Berat Badan Rendah

Bayi yang dilahirkan dengan belum cukup umur ciri-ciri yang bisa dilihat adalah bayi tersebut memiliki berat badan yang rendah. Berat badan yang rendah itu disebabkan oleh kurangnya umur bayi tersebut, jika bayi itu tidak prematur di dalam rahim dia masih bisa bertambah berat badannya dengan menyerap gizi ibu hamil yang dikonsumsi. Namun jika sudah dilahirkan dan belum cukup umur, bayi itu tidak akan bisa bertambah berat badannya kembali. Bayi yang lahir secara prematur memiliki berat badan kurang dari 2500 gram bahkan ada yang di bawah 2000 gram. Bayi itu pun akan terlihat lebih mungil dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan normal.

g. Suhu Tubuh Dingin

Saat bayi dilahirkan, suhu tubuh bayi akan terasa dingin dan suhu tubuhnya rendah. Oleh sebab itulah banyak bayi yang dilahirkan secara prematur harus dimasukkan ke dalam ruang inkubator yang ada penghangat tubuh bayinya.

h. Sesak Nafas

Jika bayi dilepas oksigennya, bayi tersebut akan mengalami sesak nafas dan juga gangguan pernafasan. Oleh karena itulah bayi tersebut sangat bergantung pada selang oksigen yang dialirkan ke pernafasannya.

3. Masalah-masalah pada bayi baru lahir preterm

a. Masalah kardiovaskular

Pada bayi baru lahir preterm duktus arteriosus yang berperan sebagai jalur darah antara arteri pulmonalis dan aorta masih terbuka. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah darah yang dialirkan ke sirkuit pulmonal, yang akhirnya menyebabkan edema pulmonal dan peningkatan upaya pernapasan dan konsumsi oksigen.

b. Masalah pernapasan

Bayi baru lahir preterm beresiko mengalami masalah pernapasan karena paru yang belum matur sampai usia gestasi 35 minggu.

c. Masalah gastrointestinal

Maturitas saluran GI tercapai pada usia gestasi 36-38 minggu. Oleh karena itu saluran GI pada bayi baru lahir aterm tidak sama dengan saluran GI bayi baru lahir preterm. Bayi baru lahir preterm mempunyai faktor-faktor berikut ini:

- 1) Tidak ada koordinasi antara mengisap dan menelan sampai usia gestasi 34-35 minggu.
- 2) Waktu pengosongan lambung lambat.
- 3) Penurunan absorbs lemak.
- 4) Pencernaan protein tidak komplit.

d. Masalah suhu

Bayi baru lahir preterm mengalami kesulitan dalam mengatur suhu tubuhnya (Reeder, dkk., 2012).

e. Rentan terhadap infeksi

Bayi preterm rentan terhadap infeksi karena system imun yang dimiliki oleh bayi preterm tidak sama dengan system imun yang dimiliki oleh bayi yang lahir aterm.

4. Penanganan bayi baru lahir preterm

- a. Keringkan secepatnya dengan handuk bersih.
- b. Mengganti kain yang basah dengan kain kering.
- c. Kepala bayi ditutup topi.

- d. Berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan .
- e. Berikan infuse dextrose 10% dan bikarbonas natricus 1,5% 4:1. Hari I 60 cc/kg/hari. Hari II 70 cc/kg/hari.
- f. Memperhatikan suhu tubuh yaitu dengan menempatkan bayi didalam inkubator.
- g. Memperhatikan pencegahan infeksi yaitu dengan memperhatikan teknik pencegahan infeksi salah satunya dengan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi.
- h. Pengawasan nutrisi/ASI pada bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhannya, berikan melalui sonde/tetesi ASI.
- i. Pengawasan berat badan dengan ketat karena berat badan berkaitan dengan status gizi/nutrisi bayii yang berhubungan dengan daya tahan bayi (Prawirohardjo, 2010).

D. Tinjauan Islam tentang persalinan

Hamil merupakan suatu masa yang dimulai dari bertemunya sel sperma dan ovum yang dipertemukan dalam sebuah tempat yang diciptakan oleh Allah SWT dengan begitu kokoh (rahim). Maha besar Allah yang telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Kehamilan adalah salah satu hal yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Jika Allah berkehendak maka terjadilah.

Hal ini dapat kita lihat dalam kisah Nabi Isa a.s, Ibu nabi Isa a.s Maryam mengandung nabi Isa dalam keadaan Ia tidak mempunyai seorang suami dan Ia bukan pula seorang pezina. Kebesaran Allah SWT. Juga dapat dilihat dalam kisah nabi Zakariah a.s beliau tidak kunjung mempunyai keturunan setelah 100 tahun usia pernikahannya dengan sang istri, dan istrinya pun adalah seorang yang

mandul. Dengan kebesaran Allah SWT. Beliau akhirnya mendapat keturunan. Dalam kisah tersebut diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kehamilan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya selain Allah SWT.

Proses penciptaan manusia telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS.As-Sajdah (32) : 7-9

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾
 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾
 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (Departemen Agama RI, 2010).

Kata sawwahu/menyempurnakannya mengisyaratkan proses lebih lanjut dari kejadian manusia setelah terbentuk organ-organnya. Ini serupa dengan ahsan taqwim. Disebut tiga proses pokok penciptaan: Dia yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu lalu menjadikan kamu seimbang. Tahap pertama pengisyaratkan pembentukan organ-organ tubuh secara umum, tahap kedua adalah tahap penghalusan dan penyempurnaan organ-organ itu, dan tahap

ketiga adalah tahapan peniupan ruh Ilahi, yang menjadikan manusia memiliki potensi untuk tampil seimbang (Shihab M. Quraish).

Proses persalinan telah digambarkan oleh Allah SWT dalam QS.Maryam (19) : 23.

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا

مَنْسِيًّا

Terjemahnya :

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan" (Departemen Agama RI, 2010).

Kata *al-makhadh* terambil dari kata *al-makhdh* yaitu gerakan yang sangat keras. Desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut, dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti *sakit yang mendahului kelahiran anak*. (Shihab M. Quraish, 2002).

Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang/oblig didalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Penurunan kepala terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kekuatan yang mendukung antara lain, tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong janin dan kontraksi otot abdomen (Kuswanti, dkk, 2014).

Berdasarkan uraian diatas tentang persalinan dalam pandangan islam dan teori kesehatan dapat disimpulkan bahwa, penurunan kepala janin menelusuri jalan lahir (rongga panggul) mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan oleh ibu. Rasa sakit tersebut disebabkan karena adanya tekanan cairan amnion, tekanan fundus uteri pada bokong janin dan kontraksi otot abdomen.

Kata *jidz'I an-nakhlah* adalah batang pohon kurma. Al-Biqa'i memahami keberadaan pohon kurma di tempat dan di waktu itu sebagai suatu keajaiban. Ini karena ulama tersebut menduga bahwa kelahiran nabi Isa as terjadi di musim dingin, sedangkan kurma hanya berbuah di musim panas, dan sangat sulit bertahan di musim dingin. Selanjutnya ulama tersebut menulis bahwa barangkali beliau sengaja diarahkan ke pohon kurma karena banyak keserasian antara pohon kurma dan proses kelahiran itu. Pohon kurma tidak dapat berbuah kecuali setelah melalui proses perkawinan, sedang di sini buahnya berjatuhan tanpa perkawinan dan hanya dengan gerakan yang dilakukan oleh maryam, persis sama dengan apa yang dialami oleh kelahiran anak maryam yang tanpa perkawinan itu. (Shihab M. Quraish, 2002).

E. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Persalinan preterm

1. Pengertian manajemen Kebidanan

- a. Menurut IBI (50 tahun IBI).manajemen kebidanan adalah pengkajian yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- b. Menurut Depkes RI. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilaksanakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat.
- c. Menurut Hellen Varney. Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasi pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien.

2. Langkah – langkah dalam manajemen kebidanan (Handajani, 2010).

- a. Langkah I : pengumpulan data dasar

Langkah pertama merupakan awal yang menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien.kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung.data dapat dikupkan dari berbagai sumber. Pasien adalah sumber informasi yang akurat, disebut juga sumber data primer. Adapun data yang didapat dari anggota keluarga atau tenaga kesehatan lain disebut juga sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu: 1)observasi 2)wawancara 3)pemeriksaan.

Pada kasus persalinan preterm didapat data subjektif kehamilan ibu <37 minggu. Usia kehamilan juga dapat ditentukan berdasarkan hari pertama haid terakhir, pergerakan janin pertama kali, dan tinggi fundus uteri pada pemeriksaan fisik. Selain itu pemeriksaan fisik dapat berupa penentuan tafsiran berat janin.

Pemeriksaan ultrasonografi merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ. Pada bayi baru lahir preterm didapatkan ciri-ciri seperti: berat badan <2500 gram, panjang badan <46 cm, lingkaran dada <30 cm, lingkaran kepala <33 cm, terdapat banyak lanugo, refleks lemah, pada bayi laki-laki scrotum belum turun, pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia minora, tangis lemah dan tonus otot lemah, kulit lebih tipis.

b. Langkah II : interpretasi data dasar

Pada langkah ini dilaksanakan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnose spesifik.

Langkah awal dari perumusan masalah/diagnosa kebidanan adalah pengelolaan/analisis data yaitu menggabungkan dan menghubungkan data satu dengan data lainnya sehingga tergambar fakta.

Diagnosa persalinan preterm dapat ditegakkan berdasarkan usia kehamilan. Usia kehamilan dapat diketahui berdasarkan hari pertama haid terakhir, pergerakan janin pertama kali, tinggi fundus uteri.

Kepastian usia kehamilan preterm serta taksiran berat janin, juga dapat di pastikan dengan pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Berdasarkan usia gestasi dan berat badan lahir kemungkinan yang dapat terjadi pada bayi menurut grafik Lubchenco yaitu: kecil untuk masa kehamilan (KMK), sesuai untuk masa kehamilan (SMK) dan besar untuk masa kehamilan (BMK).

c. Langkah III : mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial.

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilaksanakan pencegahan, sambil megamati klien bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah atau diagnosa potensial ini benar-benar terjadi.

Pada persalinan preterm masalah-masalah yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi intrapartum. Masalah ini dapat terjadi pada keadaan ketuban pecah dini. Masalah lain yang mungkin terjadi yaitu perdarahan

post partum, yang disebabkan dari beberapa hal salah satunya, setelah bayi dan placenta lahir terjadi perdarahan yang masih aktif.

Masalah-masalah yang mungkin terjadi pada bayi baru prematur yaitu: gawat janin berpotensi terjadi pada persalinan preterm, hal ini dapat disebabkan karena stress pada ibu yang berpengaruh terhadap janin dan mengakibatkan dij diluar batas normal.

Asfiksia rentan terjadi pada bayi preterm. Salah satu penyebabnya yaitu apabila ibu mengalami hipoksia selama proses persalinan dan juga mengingat organ-organ pada bayi preterm belum sepenuhnya matang. Terutama paru-paru yang belum bisa berfungsi dengan baik.

Bayi baru lahir preterm belum dapat menstabilkan suhu tubuhnya dengan sendirinya seperti bayi baru lahir normal lainnya. Sehingga rentan terjadi hipotermi.

Organ-organ yang belum matur pada bayi baru lahir preterm berpotensi mengakibatkan kelainan pada otak sehingga dapat menimbulkan kejang pada bayi baru lahir preterm.

Berat badan lahir rendah adalah salah satu hal yang sangat berpotensi terjadi pada bayi baru lahir preterm mengingat bahwa usia gestasi yang belum aterm, dan bayi yang seharusnya masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam rahim, karena beberapa faktor sudah harus terlahir dan hidup diluar rahim.

d. Langkah IV : kolaborasi atau tindakan segera.

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pada pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Dalam persalinan preterm diperlukan kolaborasi dengan dokter kandungan untuk antisipasi terjadinya komplikasi terhadap ibu yaitu dengan pemberian antibiotik untuk pencegahan terjadinya infeksi intrapartum, pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru dan penanganan perdarahan post partum berupa pemasangan infus dan transfusi darah dan pemberian obat oksitosik.

Selain kolaborasi dengan dokter kandungan dalam persalinan preterm juga perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter anak. Untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm. Penyediaan O₂, suction, infant warmer dan persiapan incubator serta obat-obat.

e. Langkah V: merencanakan asuhan yang komprehensif.

Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Suatu rencana asuhan harus sama-sama disetujui

oleh bidan maupun pasien agar efektif, karena pada akhirnya pasien yang akan menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu pada langkah ini diperlukan diskusi antara tenaga kesehatan dengan pasien mengenai semua rencana tindakan termasuk penegasan dan persetujuan.

Merencanakan pemantauan djj, nadi dan his tiap 30 menit. memastikan djj dalam batas normal (120-160 kali per menit). Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat.

Merencanakan pemberian kortikosteroid yang berjuan untuk pematangan paru pada janin. Dalam hal ini steroid yang dapat diberikan yaitu dexametason atau betametazon.

Merencanakan asuhan persalinan sesuai dengan APN. Dan dilaksanakan secara hati-hati karena kondisi bayi yang sepenuhnya matur.

Merencanakan penanganan baru lahir. Bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah hipotermi, mencegah infeksi.

Merencanakan pertolongan pertama terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir preterm. Penyediaan suction, O₂, infant warmer dan inkubator.

f. Langkah VI : melaksanakan perencanaan

Pada langkah enam ini rencana asuhan secara menyeluruh yang terurai dilangkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini

bisa dilaksanakan keseluruhan oleh bidan dan sebagian lagi oleh pasien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Memantau djj, nadi dan his tiap 30 menit. memastikan djj dalam batas normal (120-160 kali per menit). Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat.

Memberian kortikosteroid yang berjuan untuk pematangan paru pada janin. Dalam hal ini steroid yang dapat diberikan yaitu dexametason atau betametazon.

Melakukan asuhan persalinan sesuai dengan APN. Dan dilaksanakan secara hati-hati karena kondisi bayi yang sepenuhnya matur.

Melakukan penanganan baru lahir. Bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah hipotermi, mencegah infeksi.

Melakukan pertolongan pertama terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir preterm. Penyediaan suction, O₂, infant warmer dan inkubator.

g. Langkah VII : evaluasi

Pada langkah ini dilaksanakan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar sudah terpenuhi sesuai kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dikatakan efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut sudah efektif sedang sebagian belum efektif.

Manajemen kebidanan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan berikutnya.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan, pada ibu kemungkinan terjadi perdarahan post partum.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan, pada bayi kemungkinan terjadi asfiksia, hipotermi, kejang dan bayi berat lahir rendah. Dan memiliki ciri-ciri seperti berat badan <2500 gram, panjang badan <46 cm, lingkar dada <30 cm, lingkar kepala <33 cm, terdapat banyak lanugo, refleks lemah, pada bayi laki-laki scrotum belum turun, pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia minora, tangis lemah dan tonus otot lemah, kulit lebih tipis.

Pendokumentasian manajemen kebidanan (Mangkuji dkk, 2013).

Dokumentasi kebidanan adalah suatu system pencatatan atau pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan reproduksi dan semua kegiatan yang dilaksanakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan.

Dokumentasi SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir kita dan memeberikan asuhan yang menyeluruh.

SOAP (subjektif ,objektif ,assessment, planning).

1. Subjektif

- a. Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis.
- b. Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya).

2. Objektif

- a. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien.
- b. Hasil pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain.
- c. Informasi dari keluarga atau orang lain.

3. Assessment

- a. Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data subjektif dan objektif.
- b. Diagnosis / masalah.

c. Diagnosis / masalah potensial.

d. Antisipasi diagnosis/masalah potensial/tindakan segera.

4. Planning

Pendokumentasian tindakan implementasi dan evaluasi, meliputi :
asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostik/laboratorium, konseling dan
tindakan lanjut (follow up).



BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
DENGAN PERSALINAN PRETERM DI
RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI
TAHUN 2016

No. register : xxxxxx
Tgl MRS : 25 Maret 2016, pukul 18.00 wita.
Tgl pengkajian : 25 Maret 2016, pukul 18.00 wita.
Tgl partus : 26 Maret 2016, pukul 00.15 wita.
Pengkaji : umra reski

KALA I

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

1. Nama : Ny."R" / Tn. "S"
2. Umur : 22 tahun / 25 tahun
3. Nikah /lamanya : 1x / ± 1 tahun
4. Suku : Makassar /makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : Sma / Sma
7. Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
8. Alamat : jl.rajawali

B. Data Biologis atau Fisiologis

1. Keluhan utama : sakit perut tembus belakang di sertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 25 Maret 2016,pukul 14.00 wita.
2. Riwayat Keluhan Utama
 - a. Sifat nyeri hilang timbul
 - b. Lokasi nyeri dari perut menyebar kebelakang
 - c. Usaha klien mengatasi nyeri dengan mengelus-elus perutnya dan punggung.

C. Riwayat kesehatan yang lalu

1. Tidak ada riwayat alergi makanan dan obat.
2. Tidak ada ketergantungan obat,alcohol dan rokok.
3. Ibu tidak pernah menderita penyakit yang serius dan harus di operasi.

D. Riwayat kesehatan keluarga

1. Tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun.
2. Tidak ada riwayat DM,Hipertensi,jantung dan asma.

E. Riwayat reproduksi

1. Riwayat menstruasi

Menarche : 14 tahun

Siklus : 28-30 hari

Lama haid : 3-7 hari

Dismenorrhea : tidak ada

2. Riwayat kehamilan sekarang

- a. GI PO AO
- b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) : 20 agustus 2015
- c. Hari taksiran persalinan (HTP) : 27 mei 2016
- d. Antenatal care (ANC) 4x di puskesmas pertiwi.
- e. Imunisasi tetanus toksoid (TT)

TT I tgl 03-11-2015 di PKM Pertiwi.

TT II tgl 05-12-2015 di PKM Pertiwi.

3. Riwayat ginekologi

Tidak pernah mengalami suatu kelainan.

4. Riwayat kb

Ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

F. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Pola nutrisi, kebiasaan ibu makan 3 kali dalam sehari dengan porsi sedang, ibu mengatakan nafsu makan berkurang selama kehamilan. Minum 6-7 gelas sehari. Selama inpartu ibu makan 1 kali dan minum sesuai kebutuhan.
2. Pola eliminasi, kebiasaan bab 1 kali sehari bak 3-4 kali sehari. Selama inpartu belum pernah bab dan lebih sering bak.
3. Pola istirahat, kebiasaan ibu tidur siang 1-2 jam sehari dan tidur pada malam hari 6-8 jam. Selama inpartu ibu tidak pernah tidur.

G. Pemeriksaan fisik

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum ibu baik.
- b. Kesadaran composmentis.
- c. Tinggi badan : 153 cm.
- d. Berat badan sebelum hamil : 47 kg kenaikan :6 kg.

Berat badan sekarang : 53 kg.

- e. Lingkar lengan atas : 25 cm.

- f. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 84x/menit

Suhu : 36,5 ° C

Pernapasan : 22x/menit

Pemeriksaan khusus

- a. Kepala

Inspeksi : rambut bersih tidak ada ketombe.

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

- b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda
sklera putih.

- c. Mulut dan gigi

Inspeksi : bibir lembab, tidak ada caries pada gigi dan tidak
ada gigi yang tanggal.

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembengkakan pada leher.

Palpasi : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar limfe dan kelenjar tiroid.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, bentuk dan ukuran sama.

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan. Kolostrum +.

f. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra.

Palpasi : -Leopold I : 1/2 pusat px, 22 cm, bokong

-Leopold II : punggung kanan.

-Leopold III : kepala

-Leopold IV: BDP/4/5

Auskultasi : Djj terdengar kuat, jelas dan teratur dikuadran

kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit.

Lingkar perut : 86 cm

Tbj : $TFU \times LP : 22 \times 86 = 1892$ gram

His 3 kali dalam 10 menit durasi 25-30 menit.

g. Genitalia

Tidak ada varices, tidak ada edema, nampak pengeluaran lendir dan darah.

VT Tgl 25 Maret 2016, pukul 18.00 wita.

1) Vulva / vagina : tidak ada kelainan.

- 2) Portio : tebal
 - 3) Pembukaan : 4 cm
 - 4) Ketuban : utuh
 - 5) Presentasi : uuk lintang
 - 6) Penurunan : hodge I-II
 - 7) Molase : o
 - 8) Penumbungan : tidak ada
 - 9) Kesan panggul : normal
 - 10) Pelepasan : lendir dan darah
- h. Ekstremitas
- Inspeksi : simetris kiri dan kanan.
- Palpasi : tidak ada edema dan varices.
- Perkusi : refleks patella (+) kiri dan kanan.

H. Riwayat sosial ekonomi

1. Ini pernikahan ibu yang pertama dengan suaminya sekarang \pm 1 tahun.
2. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya.
3. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga.
4. Suami dan keluarga senang dengan kehamilan ini.

I. Data psikologi

1. Keluarga menunggu selama proses persalinan.
2. Ibu tidak pernah mempermasalahkan jenis kelamin anaknya.

J. Data spiritual

Ibu dan keluarga selalu berdoa semoga persalinannya berjalan dengan lancar sehingga ibu dan bayinya sehat dan selamat.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : GI PO AO, gestasi 30-32 minggu, situs memanjang, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, kala 1 fase aktif.

Masalah : kecemasan.

1. GI PO AO

DS :

- a. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran.
- b. Ibu merasakan pergerakan janinnya sejak usia 5 bulan sampai sekarang.

DO :

- a. Tonus otot tampak kencang, tampak linea nigra.
- b. Palpasi abdomen :
 - Leopold I : 1/2 pusat px, 22 cm, bokong.
 - Leopold II : punggung kanan
 - Leopold III : kepala
 - Leopold IV : BDP/4/5
- c. Auskultasi : Djj terdengar kuat, jelas dan teratur dikuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit.

Analisa dan interpretasi data

- a. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama, pada pemeriksaan abdomen tonus otot perut tegang karena adanya pembesaran perut.
- b. Tonus otot tegang tampak striae livide yaitu jaringan parut yang terbentuk karena pecahnya pembuluh darah perifer akibat peregangan abdomen selama kehamilan (Prawirohardjo, 2010).
- c. Berdasarkan pemeriksaan abdomen dengan cara palpasi ditemukan adanya bagian-bagian janin dan djj, hal ini menandakan ibu sedang hamil (Prawirohardjo, 2010).

2. Gestasi 30-32 minggu

DS :

- a. Ibu mengatakn haid terakhirnya tanggal 20 agustus 2015.
- b. Ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 7 bulan.

DO :

- a. Hari taksiran persalinan : tanggal 27 mei 2016.
- b. Lepold I : tinggi fundus uteri 1/2 pusat px, 22 cm teraba bokong.
- c. Tanggal pengakajian 25 maret 2016.

Analisa dan interpretasi data

- a. Dari hari pertama haid terakhir tanggal 20-8-2015 sampai tanggal pengkajian 25-3-2016 maka ibu amenorrhea selama 217 hari atau umur kehamilan ibu 31 minggu 1 hari (Manuaba, 2008).

b. Menurut rumus Mac.Donald : $\frac{\text{---}}{\text{---}} = \text{tuanya kehamilan} = \frac{\text{---}}{\text{---}} : 6,3$
bulan.

c. Dari hasil pemeriksaan Leopold I, didapatkan bahwa tfu $\frac{1}{2}$ pusat px, 22 cm. sesuai dengan usia gestasi ibu 31 minggu 1 hari (Prawirohardjo, 2010).

3. Situs memanjang

DS : ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat terutama di sebelah kiri perut ibu.

DO :

Palpasi

- a. Leopold I : tinggu fundus uteri $\frac{1}{2}$ pusat px, 22 cm, bokong
- b. Leopold II : punggung kanan
- c. Leopold III : kepala

Auskultasi : denyut jantung janin terdengar kuat jelas dan teratur di kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit.

Analisa dan interpretasi data :

Jika ukuran janin adalah ukuran bokong/kepala dan sesuai dengan sumbu panjang ibu maka janin dalam keadaan letak memanjang.

4. Intra uterin

DS : ibu mengatakan janinnya bergerak kuat.

Ibu mengatakan tidak pernah mengalami nyeri perut hebat selama hamil.

DO : ibu tidak merasa nyeri saat di palpasi.

Pada palpasi di dapatkan:

- a. Leopold I : $\frac{1}{2}$ pusat px, 22 cm, teraba bokong
- b. Leopold II : punggung kanan
- c. Leopold III: kepala
- d. Leopold IV: BDP/4/5

Analisa dan interpretasi data :

Pembesaran perut sesuai kehamilan, janin dapat diraba saat palpasi serta tidak ada nyeri perut yang hebat dan tidak ada nyeri tekan, menandakan kehamilan ibu intrauterine (Prawirohardjo, 2010).

5. Tunggal

DS : ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat terutama di sebelah kiri Perut ibu.

DO : palpasi :

- a. Leopold I : $\frac{1}{2}$ pusat px, 22 cm teraba bokong.
- b. Leopold II : punggung kanan
- c. Leopold III: kepala
- d. Leopold IV: BDP/4/5

Analisa dan interpretasi data

Pembesaran perut sesuai umur kehamilan, teraba satu bokong,satu punggung satu kepala dan terdengar satu jantung janin pada satu titik serta pergerakan janin pada salah satu sisi perut ibu menandakan janin tunggal.

6. Hidup

DS: ibu mengatakan janinnya kuat bergerak di bagian kiri perut ibu.

DO: djj terdengar kuat jelas dan teratur di kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit.

Analisa dan interpretasi data

Salah satu tanda pasti janin hidup adalah adanya pergerakan janin dan terdengarnya Djj (Manuaba, 2008).

7. Keadaan ibu dan janin baik.

DS :

- a. Ibu merasakan pergerakan janinnya sejak 5 bulan sampai sekarang
- b. Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat.

DO :

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran komposmentis
- c. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg.
 - 2) Nadi : 84x/menit.
 - 3) Suhu : 36,5°C.
 - 4) Pernapasan : 22x/menit.
- d. Denyut jantung janin terdengar kuat,jelas dan teratur di kuadran kanan bawah perut ibu denga frekuensi 138x/menit.
- e. VT molase 0

Analisa dan interpretasi data

- a. Denyut jantung janin dalam batas normal (120-160/menit), pergerakan jani yang dirasakan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan perut ibu yang sesuai dengan umur kehamilan menandakan janin dalam keadaan baik.
- b. Pada pemeriksaan VT, molase (penyusupan) ditemukan : 0 (tidak ada), hal ini menandakan bahwa tulang-tulang kepala janin terpisah sehingga bayi dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu (Prawirohardjo, 2011).

8. Inpartu kala 1 fase aktif

DS :

Ibu mengatakan sakit perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan darah.

DO :

- a. Kontraksi uterus baik, his 3 kali dalam 10 menit durasi 25-30 detik.

- b. VT pada tanggal 25 maret 2016, pukul 18.00 wita.

- 1) Pembukaan : 4 cm
- 2) Presentasi : uuk lintang
- 3) Penurunan : hodge I-II
- 4) Pelepasan : lendir dan darah

Analisa dan interpretasi data

- a. Perasaan sakit saat his mungkin di sebabkan oleh iskemia dalam korpus uteri terdapat banyak serabut syaraf, peristiwa ini meneruskan perasaan sakit melalui saraf sensorik di fleksus hipogastikus ke system saraf pusat.
- b. Lendir yang bersemu darah ini berasal dari lendir servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar.
- c. Tekanan pada ganglion servikale yang tumbuh di belakang serviks. Bila ganglion itu tertekan, kontraksi uterus dapat di bangkitkan . his yang sempurna akan membuka dinding korpus uteri yang terdiri atas otot menjadi lebih tebal dan pendek sedangkan di bagian bawah uterus dan serviks hanya mengandung jaringan kolagen akan pindah dann terbalik hingga menjadi tipis dan terbuka.
- d. Ibu dikatakan inpartu bilamana adanya rasa sakit karena his yang datang, keluarnya lendir bercampur darah, kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya, serta dalam pemeriksaan dalam didapatkan serviks mendatar dan pembukaannya telah ada.
- e. Dikatakan fase aktif jika dalam pemeriksaan dalam di dapatkan pembukaan 4-10 cm atau pembukaaan lengkap.

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya gawat janin.

Analisa dan interpretasi data

- a. Gawat janin terjadi jika janin tidak mendapatkan O₂ yang cukup sehingga terjadi hipoksia, tanda gawat janin adalah djf bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu, jika djf tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan tanda gawat janin (Prawirohardjo, 2010).

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada data yang menunjang.

LANGKAH V : INTERVENSI

Tujuan : kala I berlangsung normal his 5 kali dalam 10 menit durasi 50-55 detik.

Kriteria :

- a. Kontraksi uterus adekuat
- b. Fase aktif tidak lebih dari 12 jam.
- c. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri.
- d. Kondisi ibu dalam keadaan baik di tandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal :
 - 1) Tekanan darah : normal 90/70 – 120/90.
 - 2) Nadi : normal 78-84x/menit.
 - 3) Suhu : normal 36,5°C-37,5°C
 - 4) Pernapasan : normal 16-20x/menit.
- e. Denyut jantung janin dalam batas normal (120-160x/menit).

Rencana tindakan

1. Jelaskan penyebab nyeri.

Rasional : agar klien dapat mengetahui dan mengerti apa penyebab nyeri dan dapat beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan.

2. Anjurkan ibu untuk relaksasi dengan pengaturan napas terutama saat ada kontraksi.

Rasional : pada saat kontraksi akan terjadi ketegangan, ketegangan ini akan berkurang dengan pengaturan napas terutama pada pengeluaran napas melalui mulut bukan hidung.

3. Anjurkan kepada ibu untuk berbaring dengan posisi miring ke kiri.

Rasional : miring kiri dapat mencegah tertekanya vena cava inferior yang dapat mengakibatkan aliran darah terhambat sehingga berbaring ke kiri aliran darah dan oksigenasi ke janin lancar.

4. Beri hidrasi ibu dengan air putih.

Rasional : dengan pemberian hidrasi oral akan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga tidak terjadi dehidrasi dan kelelahan serta pemakaian cadangan kalori yang berlebihan.

5. Observasi denyut jantung janin, nadi dan kontraksi tiap 30 menit.

Rasional : untuk memantau keadaan ibu dan janin.

6. Observasi tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Rasional : untuk memantau keadaan ibu dan kemajuan persalinan.

7. Bersihkan vulva dengan kapas savlon sebelum melakukan pemeriksaan dalam untuk mencegah terjadinya infeksi.

Rasional : membersihkan vulva dengan kapas savlon sebelum melakukan pemeriksaan dalam untuk mencegah masuknya kuman ke jalan lahir yang dapat menyebabkan infeksi.

8. Anjurkan kepada untuk mengganti sarung jika sudah kotor.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi.

9. Berikan support pada ibu.

Rasional : memberi dukungan kepada ibu agar semangat dan optimis menghadapi persalinan.

10. Pemasangan infus RL.

Rasional : sebagai media untuk pemberian obat melalui intravena.

11. Berikan kortikosteroid.

Rasional : kortikosteroid digunakan untuk mematangkan paru janin.

12. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I pada partograf.

Rasional : pemantauan dengan partograf merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantu menilai kemajuan persalinan dan pembukaan, keadaan ibu dan janin serta memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencana asuhan selanjutnya.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 25-3-2016

1. Menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan oleh ibu yaitu karena tertekannya ujung-ujung saraf sewaktu uterus (corpus) berkontraksi dan tegangnya segmen bawah rahim.

2. Mengajarkan pada ibu cara relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi dengan cara menarik napas melalui hidung dan di keluarkan melalui mulut.
3. Menganjurkan pada ibu berbaring miring.
4. Memberikan hidrasi dengan air putih.
5. Mengobservasi djj, nadi dan his tiap 30 menit dan tekanan darah, suhu serta kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Jam 18.30 : djj 136x/menit, nadi 82x/menit, his 3 kali dalam 10 menit durasi 25-30 detik.

Jam 19.00 : djj 136x/menit, nadi 84x/menit, his 3 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 19.30 : djj 134x/menit, nadi 82x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 20.00 : djj 136x/menit, nadi 84x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 20.30 : djj 134x/menit, nadi 82x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 21.00 : djj 132x/menit, nadi 82x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 35-40 detik.

Jam 21.30 : djj 134x/menit, nadi 84x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik.

Jam 22.00 : djj 136x/menit, nadi 80x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 37°C.

6. Melakukan VT II pada jam 22.00 wita.

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : tipis
- c. Pembukaan : 8 cm
- d. Ketuban : utuh
- e. Presentasi : uuk kanan depan
- f. Penurunan : hodge III
- g. Molase : 0
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir dan darah

Melanjutkan pemantauan djj, nadi, dan kontraksi tiap 30 menit dan tekanan darah suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Jam 22.30 : djj 134x/menit, nadi 84x/menit, his 5 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik.

Jam 23.00 : djj 134x/menit, nadi 82x/menit, his 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik.

Jam 00.00 : djj 132x/menit, nadi 82x/menit, his 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 37°C.

Melakukan VT III pada jam 00.00 wita.

- a. Pembukaan : 10 cm
- b. Ketuban : jernih
- c. Presentasi : uuk depan

d. Penurunan : hodge IV

7. Menganjurkan ibu mengganti sarungnya yang kotor.
8. Melakukan pencatatan partograf.
9. Memberikan support pada ibu.
10. Melakukan pemasangan infus RL.
11. Memberikan kortikosteroid.

Hasil : dexamethason 1 amp/6 jam/IM (pematangan paru).

12. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I pada partograf.

Hasil : pemantauan dengan partograf merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantu menilai kemajuan persalinan dan pembukaan, keadaan ibu dan janin serta memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencana asuhan selanjutnya.

LANGKAH VII : EVALUASI

Evaluasi tanggal 25-3-2016

1. Kala I berlangsung normal ditandai dengan his adekuat 5× dalam 10 menit durasi 45-50 detik ibu dapat beradaptasi dengan nyerinya.
2. Tidak terjadi infeksi ditandai dengan tidak ada tanda-tanda infeksi.
3. Keadaan ibu dan janin baik, ditandai dengan denyut jantung janin terdengar jelas dengan frekuensi 134×/menit.
4. Ibu mengatakan ingin BAB dan ada tekanan pada anus.
5. Ibu mengatakan ada dorongan untuk meneran.
6. Ibu mengatakan sakitnya bertambah dan tembus kebelakang.
7. Tampak perineum menonjol, vulva dan anus membuka.

8. Tampak ibu ingin meneran.

KALA II

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS :

- a. Ibu mengatakan sakit semakin kuat.
- b. Ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran.
- c. Ibu mengatakan adanya tekanan pada anus dan rasa ingin BAB.
- d. Ibu mengatakan adanya pengeluaran air yang banyak dalam jalan lahir.

DO :

- a. His 5× dalam 10 menit durasi 45-50”.
- b. Perineum menonjol.
- c. Vulva dan anus membuka.
- d. Djj terdengar pada kuadran kanan bawah dengan frekuensi 134×/menit/
- e. VT tgl 26-3-2016 jam 00.00.

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : jernih

Presentasi : uuk depan

Penurunan : hodge IV

LANGKAH II : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual : perlangsungan kala II

DS :

- a. Ibu mengatakan sakit semakin kuat.
- b. Ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran.
- c. Ibu mengatakan adanya tekanan pada anus dan rasa ingin BAB.

DO:

- a. His 5× dalam 10 menit durasi 45-50”.
- b. Perineum menonjol.
- c. Vulva dan anus membuka.
- d. Djj terdengar pada kuadran kanan bawah dengan frekuensi 134×/menit/
- e. VT tgl 26-3-2016 jam 00.00.

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : jernih

Presentasi : uuk depan

Penurunan : hodge IV

Analisa dan interpresentasi data :

- a. Serviks uteri berdilatasi sehingga membentuk suatu saluran yang akan dilewati bayi sampai mencapai dasar panggul (dilatasi sempurna). Hal ini mengakibatkan tekanan hebat pada otot dasar panggul dan bagian terendah janin menekan fleksus syaraf yang mengakibatkan rasa nyeri yang bertambah (Manuaba, 2008).
- b. Dengan adanya his yang adekuat mengakibatkan segmen atas rahim (SAR) berkontraksi mendorong janin turun ke segmen bawah rahim (SBR), segmen bawah tertarik ke atas menjadi dilatasi relaksasi sehingga membuat suatu saluran jalan lahir (Prawirohardjo, 2010).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

1. Asfiksia neonatorum

DS: ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan.

DO: Hari pertama haid terakhir tanggal 20-8-2015.

Hari tafsiran persalinan tanggal 27-5-2016.

Analisa dan interpretasi data:

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi tidak bisa bernapas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O_2 dan semakin meningkatnya CO_2 yang menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan lanjut.

2. Hipotermi

DS: ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 7 bulan.

DO: suhu bayi baru lahir : $35,8^\circ C$.

Analisa dan interpretasi data :

Berat badan dibawah 2500 gram lebih mudah kehilangan panas melalui evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi karena bayi baru lahir tidak dapat mengatur temperature tubuhnya secara memadai dan dapat dengan cepat kedinginan. Jika kehilangan panas tidak segera diatasi maka dapat terjadi hipotermi.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Dilakukan kolaborasi dengan dokter anak untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm.

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II.

Diagnosa potensial : potensial terjadi asfiksia neonatorum.

Potensial terjadinya hipotermi.

Tujuan : kala II berlangsung normal.

Kriteria :

- a. Kala II berlangsung tidak lebih dari 1-2 jam.
- b. Bayi lahir dalam waktu 30,napas spontan dan segera menangis.
- c. Keadaan umum ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dala batas normal:
 - 1) Tekanan darah : (N:90/70-120/90 mmHg)
 - 2) Nadi : (N: 78-84×/menit)
 - 3) Suhu : (N: 36,5-37,5°C)
 - 4) Pernapasan : (N: 16-20×/menit)
- d. Jumlah darah tidak lebih dari 500 cc.

Intervensi tanggal 26-3-2016

1. Lihat tanda dan gejala kala II (dor-ran,tek-nus,per-jol,vul-ka).

Rasional : dapat mengetahui apakah sudah dapat memimpin persalinan.

2. Siapkan peralatan pertolongan termasuk oksitosin dan spoit.

Rasional : untuk mempersiapkan peralatan siap pakai dan tidak kerepotan bila pembukaan sudah lengkap.

3. Pakai celemek.

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah terjadinya infeksi silang dan tidak kerepotan bila pembukaan sudah lengkap.

4. Pastikan lengan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

5. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

6. Isi spuit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan.

Rasional : menyiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai.

7. Bersihkan vulva sampai ke perineum.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

8. Lakukan pemeriksaan dalam.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan.

9. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

10. Dengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi.

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin.

11. Beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.

Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan janinnya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan.

12. Minta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran.

Rasional : dapat membantu proses persalinan.

13. Pimpinlah ibu meneran saat ada his.

Rasional : memperlancar berlangsungnya proses persalinan.

14. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman.

Rasional : dapat membantu dalam proses persalinan.

15. Pasang handuk yang bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva dengan diameter 5-6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh janin.

16. Letakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu.

Rasional : sebagai alat untuk menyokong bayi.

17. Buka bak partus.

Rasional : menyiapkan alat dalam keadaan siap pakai.

18. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi (DTT).

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

19. Lakukan episiotomy.

Rasional : untuk memperluas jalan lahir dan mengurangi tekanan pada kepala bayi.

20. Pimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala.

Rasional : dengan menyokong perineum dapat mengurangi dan mencegah rupture perineum.

21. Periksa adanya lilitan tali pusat.

Rasional : lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin.

22. Tunggu kepala melakukan putaran paksi luar.

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi dalam.

23. Letakkan tangan secara biparetal tarik secara hati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior.

Rasional : membantu pengeluaran bahu agar tidak terjadi robekan perineum.

24. Lahirkan badan bayi dengan sanggah susur.

Rasional : dengan sanggah susur dapat mencegah rupture perineum dan trauma pada bayi.

25. Telusuri punggung, bokong dan tungkai bayi.

Rasional : mengendalikan pengeluaran bayi.

26. Jepit tali pusat.

Rasional : untuk menentukan batas tali pusat yang akan dipotong.

27. Potong tali pusat.

Rasional : dengan memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dan ibu dan membantu proses pernapasan dan system sirkulasi dan agar darah dari tali pusat tidak mengalir.

28. Siapkan suction, O₂, infarm warmer/inkubator.

Rasional : untuk memberikan pertolongan terhadap bayi jika terjadi asfiksia dan hipotermi.

29. Nilai ballard score bayi dan letakkan bayi didalam inkubator.

Rasional : untuk menilai gestasi bayi dan menjaga bayi agar tidak hipotermi.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 26-3-2016

1. Melihat tanda dan gejala kala II (dor-ran,tek-nus,per-jol,vul-ka).
2. Menyiapkan peralatan pertolongan persalinan.

<p>-Partus set handscone, klem kocher, ½ kocher, gunting tali pusat, gunting episiotomi, penjepit tali pusat, kateter, kasa.</p> <p>-heacting set Needle holder, pinset anatomi, jarum, cutgat, gunting benang, kasa.</p>	<p>-luar partus set Air DTT, kapas DTT, larutan clorin, tempat sampah, tensimeter, stetoskop, thermometer, delee, lenek, perlak.</p> <p>-obat Cairan infus, oksitosin, lidocain, salep mata, vit.k, HB₀, dexamethazon.</p>	<p>-alat pertolongan bayi baru lahir preterm O₂, suction, incubator.</p>
---	---	---

3. Memakai celemek.
4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan,cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir.
5. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi.
6. Mengisi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan.
7. Membersihkan vulva sampai ke perineum.

8. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 26-3-2016 pukul 00.00 wita.

Hasil :

a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

b. Portio : melesap

c. Pembukaan : 10 cm

d. Ketuban : (-) jernih

e. Presentasi : uuk depan

f. Penurunan : hodge IV

g. Molase : 0

h. Penumbungan : tidak ada

i. Kesan panggul : normal

j. Pelepasan : air ketuban

9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit.

10. Mendengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi.

11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.

12. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran.

13. Memimpin ibu meneran saat ada his.

14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman.

15. Memasang handuk yang bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva dengan diameter 5-6 cm.
16. Meletakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu.
17. Membuka bak partus.
18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi (DTT).
19. Melakukan episiotomy.
20. Memimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala.
21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat.
22. Menunggu kepala melakukan putaran paksi luar.
23. Meletakkan tangan secara biparetal tarik secara hati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior.
24. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur.
25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai di tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk dan jari tengah di antara 2 tungkai.

Hasil : bayi lahir spontan pukul 00.15 wita. JK : laki-laki , BB : 1500 gram, PB : 38 cm , pemeriksaan apgar score dilakukan oleh bidan Kurma.

Penilaian	Menit 1	Menit 5
Appearance Warna kulit	Tampak sianosis (1)	Tampak sianosis (1)
Pulse Denyut jantung	Frekuensi jantung <100 (1)	Frekuensi jantung >100 (2)
Grimace Refleks	Bereaksi terhadap rangsangan (1)	Merespom terhadap rangsangan (1)
Activity Tonus otot	Tonus otot lemah (1)	Tonus otot lemah (1)
Respiration	Usaha napas	Frekuensi napas >60

Pernapasan	lambat (1)	kali per menit (2)
Jumlah	5	7

26. Memotong tali pusat.
27. Meletakkan bayi di infarm warmer dan membebaskan jalan napas bayi.
28. Melakukan suction dan rangsangan taktil pada bayi.
29. Melakukan pemasangan O₂ terhadap bayi
30. Menilai skala ballard bayi dan menempatkan bayi didalam inkubator.

Hasil : postur/sikap 2, jendela pergelangan tangan 2, kelenturan lengan 2, sudut poplitea 2, tanda selampang 2, tumit ke telinga 2, kulit 1, lanugo 1, garis telapak kaki 2, mata/telinga 1, payudara 1, genitalia 0. Score 18, TUK 30-32 minggu.

LANGKAH VII : EVALUASI

Diagnosa : perlangsungan kala II.

Evaluasi tanggal 26-3-2016

1. Kala II berlangsung ± 15 menit.
2. Bayi lahir spontan tanggal 26-3-2016, pukul 00.15 wita, JK: laki-laki, BB : 1500 gram , PB : 38 cm , A/S : 5/7.
3. Kontraksi uterus baik : teraba keras dan bundar.
4. Tinggi fundus uteri yaitu setinggi pusat.
5. Ibu mengatakan nyeri perut.
6. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya.
7. Perdarahan ±100 cc.
8. Placenta belum terlepas.

KALA III**LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS :

- a. Ibu mengatakan nyeri perut.
- b. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya.

DO :

- a. Bayi lahir spontan tanggal 26-3-2016,pukul 00.15 wita, JK: laki-laki, BB : 1500 gram , PB : 38 cm , A/S : 5/7.
- b. Kontraksi uterus baik : teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
- d. Nampak semburan darah tiba-tiba.
- e. Tampak tali pusat didepan vulva.
- f. Placenta belum terlepas.

LANGKAH II : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : perlangungan kala III.

DS : ibu mengatakan nyeri perut.

DO :

- a. Bayi lahir spontan tanggal 26-3-2016,pukul 00.15 wita, JK: laki-laki, BB : 1500 gram , PB : 38 cm , A/S : 5/7.
- b. Kontraksi uterus baik : teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
- d. Tampak tali pusat di depan vulva.

Analisa dan interpretasi data

- a. Dalam waktu 5-10 menit seluruh placenta terlepas, terdorong ke dalam vagina dan akan lahir spontan (Mochtar, 2013).
- b. Lepasnya placenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda: uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena placenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang dan terjadi perdarahan/ adanya semburan darah secara tiba-tiba (Manuaba, 2010).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada indikasi untuk ditegakkannya diagnose/masalah potensial.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk di lakukannya tindakan segera/emergency.

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa actual : perlangsungan kala III.

Diagnosa potensial : -

Tujuan : kala III berlangsung normal.

Kriteria :

- a. Perdarahan tidak lebih dari 500 cc.
- b. Lamanya kala III \leq 30 menit.
- c. Placenta dan selaput lahir lengkap.

Intervensi

Tanggal 26-3-2016

31. Periksa fundus uteri .

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda .

32. Memberitahu ibu akan di suntik .

Rasional : agar ibu mengetahui tindakan yang akan di lakukan.

33. Menyuntik oksitosin 10 IU.

Rasional : akan membantu kontraksi uterus.

34. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva , jika tali pusat bertambah panjang.

Rasional : proses peregangannya tali pusat terkendali.

35. Letakkan tangan kiri di atas simfisis untuk menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.

Rasional : proses peregangannya tali pusat terkendali.

36. Regangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial.

Rasional : dengan begitu akan memudahkan placenta terlepas dari tempat implantasinya.

37. Jika tali pusat bertambah panjang tali pusat diregangkan ke atas dan ke bawah.

Rasional : dengan meregangkan ke atas dan ke bawah memudahkan placenta keluar sesuai kurva jalan lahir hingga tampak di vulva.

38. Setelah placenta tampak di depan vulva jemput placenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan placenta searah jarum jam.

Rasional : agar placenta dan selaput lahir lengkap.

39. Lakukan masase pada fundus uteri.

Rasional : masase akan merangsang kontraksi uterus.

40. Periksa apakah placenta dan selaput ketuban lahir lengkap.

Rasional : adanya sisa placenta dan selaput ketuban akan menyebabkan perdarahan.

41. Periksa adanya robekan jalan lahir.

Rasional : robekan jalan lahir akan menyebabkan perdarahan aktif.

42. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik.

Rasional : uterus yang berkontraksi dengan baik menandakan kala III berlangsung normal.

43. lakukan penimbangan, pengukuran pemberian salep mata dan vitamin K.

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi lahir normal atau tidak. Pemberian vitamin K untuk mencegah terjadinya perdarahan. Dan pemberian salep mata untuk mencegah terjadinya infeksi.

44. Memberikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam pemberian vitamin K.

Rasional : memberikan hepatitis.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI ISLAM NEGERI

Tanggal 26-3-2016

30. Memeriksa fundus uteri

31. Memberitahu ibu akan di suntik oksitosin .

32. Menyuntikan oksitosin 10 IU.

33. Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva , jika tali pusat bertambah panjang.

34. Meletakkan tangan kiri di atas simfisis untuk menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.

35. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial.

36. Jika tali pusat bertambah panjang tali pusat diregangkan ke atas dan ke bawah.

37. Setelah placenta tampak di depan vulva jemput placenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan placenta searah jarum jam.

Hasil : placenta lahir 00.30 wita.

38. Melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok-gosok fundus secara sirkuler.

39. Memeriksa apakah placenta dan selaput ketuban lahir lengkap.

Hasil : placenta , selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap.

40. Memeriksa adanya robekan jalan lahir.

Hasil : terdapat robekan tingkat II pada perineum dan telah dijahit dengan teknik jelujur.

41. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik.

Hasil : uterus berkontraksi dengan baik teraba keras dan bundar , tinggi fundus uteri teraba 1 jari di bawah pusat.

42. Melakukan penimbangan dan pengukuran bayi, memberikan vitamin K dan salep mata.

Hasil :

a. BBL : 1500 gram

b. PBL : 38 cm

c. LK : 27 cm

- d. LD : 26 cm
- e. LP : 23 cm
- f. LILA : 8 cm
- g. ANUS : (+)

43. Memberikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam pemberian vitamin K.

Hasil : injeksi hepatitis sudah di berikan.

LANGKAH VII : EVALUASI

Evaluasi tanggal 26-3-2016

1. Kala III berlangsung normal.
2. Perdarahan \pm 150 cc.
3. Placenta dan selaput lahir lengkap.
4. Kala III berlangsung \pm 15 menit.
5. Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan.
6. Kontraksi uterus baik , terasa keras dan bundar.
7. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat.
8. Tanda – tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80×/menit.
 - c. Suhu : 36,5°C.
 - d. Pernapasan : 20×/menit.

KALA IV**LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS : ibu mengatakan lelah setelah persalinan.

DO :

- a. Kala III berlangsung \pm 15 menit.
- b. Placenta lahir lengkap pukul 00.30 wita.
- c. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat.
- d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
- e. Perdarahan \pm 150 cc.
- f. Tanda – tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - 2) Nadi : 80×/menit
 - 3) Suhu : 36,5°C
 - 4) Pernapasan : 20×/menit

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : perlangsungan kala IV

DS : ibu mengatakan lelah setelah persalinan.

DO :

- a. Kala III berlangsung \pm 15 menit.
- b. Placenta lahir lengkap pukul 00.30 wita.
- c. Tanda – tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - 2) Nadi : 80×/menit

- 3) Suhu : 36,5°C
4) Pernapasan : 20×/menit

Analisa dan interpretasi data :

- a. Setelah placenta dan selaput ketuban lahir, itu menandakan bahwa telah masuk kala IV/ kala pengawasan selama 2 jam.
- b. Perdarahan yang terjadi saat kontraksi uterus baik, biasanya karena adanya robekan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan inspeksi pada vulva, vagina dan serviks dengan ciri warna darah yang merah segar dan pulpasif sesuai dengan denyut nadi (Prawirohardjo, 2010).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya perdarahan post partum.

Analisa dan interpretasi data

1. Perdarahan post partum adalah kehilangan darah lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 cc setelah persalinan abdominal (Walyani, 2015).
2. Diagnosis perdarahan post partum dapat ditegakkan bila setelah bayi dan placenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal dan pada palpasi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih (Prawirohardjo, 2014).

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk di lakukan tindakan segera.

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa : perlangsungan kala IV

Masalah aktual : kelelahan.

Tujuan : kala IV berlangsung normal.

Criteria :

- a. Tidak terjadi perdarahan.
- b. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat.
- d. Tanda –tanda vital dalam batas normal
 - 1) Tekanan darah : 90/60-130/90 mmHg
 - 2) Nadi : 60-80×/menit
 - 3) Suhu : 36,5-37,5°C
 - 4) Pernapasan : 16-24×/menit
- e. Pernapasan dan suhu bayi dalam batas normal.
 - 1) Pernapasan : 40-60×/menit
 - 2) Suhu : 36,5-37,5°C.

Intervensi tanggal 26-3-2016

44. Lakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri.

45. Lakukan pemantauan kontraksi uterus 3-5 menit dalam 10 menit pertama kemudian setiap 15 menit 1 jam berikutnya dan 30 menit pada satu jam berikutnya.

Rasional : kontraksi uterus yang baik menandakan kala IV berlangsung normal.

46. Ajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana cara masase uterus dan menilai kontraksi.

Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui bagaimana kontraksi uterus yang baik dan dapat melakukannya sendiri.

47. Evaluasi jumlah perdarahan.

Rasional : untuk mengantisipasi jumlah perdarahan.

48. Periksa tanda – tanda vital ibu.

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum ibu.

49. Nilai pernapasan dan suhu tubuh ibu.

Rasional : untuk menilai keadaan umum ibu.

50. Rendam alat dalam clorin 0,5% selama 10 menit.

Rasional : mencegah infeksi silang.

51. Buang bahan – bahan yang terkontaminasi.

Rasional : mencegah infeksi silang.

52. Bersihkan ibu dari sisa darah, lendir, dan ketuban dengan ait DTT.

Rasional : memberikan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi.

53. Pastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum.

Rasional : dengan makan dan minum akan mengembalikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinan sehingga stamina ibu tetap terjaga.

54. Dekontaminasi tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi.

Rasional : mencegah infeksi silang.

55. Bersihkan sarung tangan dan merendam dalam larutan clorin 0,5% secara terbalik.

Rasional : mencegah infeksi silang.

56. Cuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir.

Rasional : dengan mencuci tangan merupakan dekontaminasi agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri.

57. Melengkapi partograf.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 26-3-2016

45. Melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri.

Waktu	Tinggi fundus uteri
00.45	1 jrbpst
01.00	1 jrbpst
01.15	1 jrbpst
01.30	1 jrbpst
02.00	1 jrbpst
02.30	1 jrbpst

46. Melakukan pemantauan kontraksi uterus.

Waktu	Kontraksi	Kandung kemih
00.45	Baik	Kosong
01.00	Baik	Kosong
01.15	Baik	Kosong
01.30	Baik	Kosong

02.00	Baik	Kosong
02.30	Baik	Kosong

47. Mengajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana cara masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya sendiri.

48. Mengevaluasi jumlah perdarahan.

Waktu	Perdarahan
00.45	40 cc
01.00	30 cc
01.15	30 cc
01.30	20 cc
02.00	20 cc
02.30	10 cc

49. Memeriksa tanda – tanda vital ibu.

Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu
00.45	110/70 mmHg	84x/menit	36,5°C
01.00	110/70 mmHg	82x/menit	
01.15	110/70 mmHg	80x/menit	
01.30	110/70 mmHg	82x/menit	
02.00	110/70 mmHg	82x/menit	36,5°C
02.30	110/70 mmHg	82x/menit	

50. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi.

Hasil :

a. Pernapasan : 46×/menit.

b. Suhu : 35,8°C

51. merendam alat dalam clorin 0,5% selama 10 menit.

52. Membuang bahan – bahan yang terkontaminasi.

53. Membersihkan ibu dari sisa darah, lendir, dan ketuban dengan ait DTT.

54. Memastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum.

55. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi.

56. Membersihkan sarung tangan dan merendam dalam larutan clorin 0,5% secara terbalik.

57. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir.

58. Melengkapi partograf.

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 26-3-2016

1. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.

2. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat.

3. Jumlah perdarahan ± 150 cc.

4. Keadaan umum ibu baik ditandai dengan :

a. Tekanan darah : 110/70 mmHg

b. Nadi : 80×/menit

c. Suhu : 36,5°C

- d. Pernapasan : 20×/menit
5. Ibu sudah merasa nyaman.
6. Kesadaran composmentis.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
DENGAN PERSALINAN PRETERM DI RSKD
IBU DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR
TAHUN 2016**

No. register : 086431

Tgl MRS : 25 Maret 2016, pukul 17.50 wita.

Tgl pengkajian : 25 Maret 2016, pukul 17.55 wita.

Tgl partus : 26 Maret 2016, pukul 00.15 wita.

Pengkaji : umrah reski

KALA I
LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

1. Nama : Ny. "R" / Tn. "S"
2. Umur : 22 tahun / 25 tahun
3. Nikah / lamanya : 1x / ± 1 tahun
4. Suku : Makassar / makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : Sma / Sma
7. Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
8. Alamat : jl.rajawali

1. Ibu mengatakan nyeri perut tembus belakang di sertai pengeluaran lendir dan darah.
2. Ibu mengatakan nyeri perut sejak pukul 14.00 wita.

3. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama.
4. Ibu mengatakan haid terakhirnya tanggal 20 agustus 2015.
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan.
6. Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat terutama di sebelah kiri dan dirasakan sejak usia kehamilan 5 bulan.
7. Ibu mengatakan mendapatkan suntukan TT 2 kali di puskesmas.
8. Ibu melakukan kunjungan anc 4 kali di puskesmas pertiwi.
9. Ibu mengatakan tidak pernah menderita nyeri perut hebat selama hamil.
10. Ibu tidak pernah menderita penyakit hepatitis,hipertensi hiv-aids,tb,dm dll.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan umum

a. G1P0A0

b. HTP 27 mei 2016

c. Keadaan umum ibu baik.

d. Kesadaran composmentis.

e. Tinggi badan : 153 cm.

f. Berat badan sebelum hamil : 47 kg kenaikan : 6 kg.

Berat badan sekarang : 53 kg.

g. Lingkar lengan atas : 24,5 cm.

h. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 84x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 22x/menit

2. Pemeriksaan khusus

a. Kepala

Inspeksi : rambut bersih tidak ada ketombe.

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera Putih.

c. Mulut dan gigi

Inspeksi : bibir lembab, tidak ada caries pada gigi dan tidak ada Gigi yang tanggal.

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembengkakan pada leher.

Palpasi : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar limfe dan Dan kelenjar tiroid.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, bentuk dan ukuran sama.

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan. Kolostrum +.

f. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra.

Palpasi: -Leopold I : 1/2 pusat px, 22 cm, bokong

-Leopold II : punggung kanan.

-Leopold III : kepala

-Leopold IV: BDP/4/5

Lp : 86 cm

Tbj : $TFU \times LP = 22 \times 86 = 1892$ gram

Auskultasi : djj terdengar kuat, jelas dan teratur dikuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit.

His 3 kali dalam 10 menit durasi 25-30 menit.

g. Genitalia

inspeksi : tidak ada varices tampak pengeluaran lendir dan darah.

VT Tgl 25 Maret 2016, pukul 18.00 wita.

1) Vulva / vagina: tidak ada kelainan.

2) Portio : tebal

3) Pembukaan : 4 cm

4) Ketuban : utuh

5) Presentasi : uuk lintang

6) Penurunan : hodge I-II

7) Molase : 0

8) Penumbungan: tidak ada

9) Kesan panggul: normal

10) Pelepasan : lendir dan darah

h. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan.

Palpasi : tidak ada edema dan varices.

Perkusi : refleks patella (+) kiri dan kanan

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : GI PO AO, gestasi 30-32 minggu, situs memanjang, intra uterin, tunggal, keadaan ibu dan janin baik, kala 1 fase aktif.

PLANNING (P)

1. Menjelaskan kepada ibu tentang keadaannya.
2. Menganjurkan kepada ibu untuk BAK dan BAB.
3. Menganjurkan kepada ibu untuk menarik napas panjang saat kontraksi.
4. Menganjurkan kepada ibu untuk makan dan minum jika kontraksi sudah berkurang.
5. Memantau djj, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Jam 18.30 : djj 136x/menit, nadi 82x/menit, his 3 kali dalam 10 menit durasi 25-30 detik.

Jam 19.00 : djj 136x/menit, nadi 84x/menit, his 3 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 19.30 : djj 134x/menit, nadi 82x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 20.00 : djj 136x/menit, nadi 84x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 20.30 : djj 134x/menit, nadi 82x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik.

Jam 21.00 : djj 132x/menit, nadi 82x/menit, his 4 kali dalam 10 menit durasi 35-40 detik.

Jam 21.30 : djj 134x/menit, nadi 84x/menit, his 4 kali dalam 10 menit
durasi 40-45 detik.

Jam 22.00 : djj 136x/menit, nadi 80x/menit, his 4 kali dalam 10 menit
durasi 40-45 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 37°C.

6.Melakukan VT II pada jam 22.00 wita.

- a.Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b.Portio : tipis
- c.Pembukaan : 8 cm
- d.Ketuban : utuh
- e.Presentasi : uuk kanan depan
- f.Penurunan : hodge III
- g.Molase : 0
- h.Penumbungan : tidak ada
- i.Kesan panggul : normal
- j.Pelepasan : lendir dan darah

Melanjutkan pemantauan djj, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Jam 22.30 : djj 134x/menit, nadi 84x/menit, his 5 kali dalam 10 menit
durasi 40-45 detik.

Jam 23.00 : djj 134x/menit, nadi 82x/menit, his 5 kali dalam 10 menit
durasi 45-50 detik.

Jam 00.00 : djj 132x/menit, nadi 82x/menit, his 5 kali dalam 10 menit
durasi 45-50 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 37°C.

VT III pukul 00.00 wita.

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm
 - d. Ketuban : jernih
 - e. Presentasi : uuk depan
 - f. Penurunan : hodge IV
 - g. Molase : 0
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : air ketuban.
6. Memberikan support dan motivasi pada ibu.
 7. Menganjurkan ibu memilih posisi yang nyaman,tidur miring kesalah satu sisi.
 8. Melakukan pemasangan infus RL.
 9. Memberikan kortikosteroid.
 10. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf.

KALA II

DATA SUBJEKTIF (S)

- a. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat.
- b. Ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
- c. Ibu mengatakan adanya tekanan pada anus dan rasa ingin meneran.
- d. Ibu mengatakan adanya pelepasan air banyak.

DATA OBJEKTIF (O)

- a. His 5× dalam 10 menit durasi 45 – 50 detik.
- b. Perineum menonjol.
- c. Vulva dan anus membuka.
- d. Denyut jantung janin terdengar pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132×/menit.
- e. VT tanggal 26-3-2016 pukul 00.00 wita.
 - 1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - 2) Portio : melesap
 - 3) Pembukaan : 10 cm
 - 4) Ketuban : jernih
 - 5) Presentasi : uuk depan
 - 6) Penurunan : hodge IV
 - 7) Molase : 0
 - 8) Penumbungan : tidak ada
 - 9) Kesan panggul : normal
 - 10) Pelepasan : air ketuban

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : perlangungan kala II

Masalah potensial : potensial terjadi asfiksia neonatorum.

potensial terjadinya hipotermi

potensial terjadinya BBLR.

PLANNING (P)

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II (dor-ran, tek-nus, per-jol, vul-ka).
2. Menyiapkan peralatan pertolongan persalinan.

-Partus set handscone, klem kocher, ½ kocher, gunting tali pusat, gunting episiotomi, penjepit tali pusat, kateter, kasa.	-luar partus set Air DTT, kapas DTT, larutan clorin, tempat sampah, tensimeter, stetoskop, thermometer, delee, lenek, perlak.	-alat pertolongan bayi baru lahir preterm O ₂ , suction, incubator.
-heacting set Needle holder, pinset anatomi, jarum, cutgat, gunting benang, kasa.	-obat Cairan infus, oksitosin, lidocain, salep mata, vit.k, HB ₀ , dexamethazon.	

3. Memakai celemek.
4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir.
5. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi.
6. Mengisi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan.
7. Membersihkan vulva hingga perineum.
8. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 26-3-2016 pukul 00.00 wita
 - a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - b. Portio :melesap
 - c. Pembukaan :10 cm
 - d. Ketuban : jernih
 - e. Presentasi : uuk depan
 - f. Penurunan : hodge IV
 - g. Molase : 0
 - h. Penumbungan : tidak ada

- i. Kesan panggul :normal
 - j. Pelepasan :air ketuban
9. Mendekontaminasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit.
 10. Mendengarkan denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi.
 11. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.
 12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi yang baik untuk meneran.
 13. Pimpin ibu untuk meneran jika ada kontraksi.
 14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman.
 15. Memasang handuk yang bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm.
 16. Meletakkan duk yang di lipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu.
 17. Membuka bak partus.
 18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi.
 19. Melakukan episiotomy.
 20. Memimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala.
 21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat.
 22. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar.

23. Meletakkan tangan secara biparetal secara hati-hati gerakan tangan kearah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakkan ke atas atas untuk melahirkan bahu posterior.
24. Melahirkan kepala, leher dan bahu dengan sanggah susur.
25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung kearah bokong sampai di tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.

Hasil : bayi lahir spontan pukul 00.15 wita. JK : laki-laki , BB : 1500 gram, PB : 38 cm , pemeriksaan apgar score dilakukan oleh bidan Kurma.

Penilaian	Menit 1	Menit 5
Appearance Warna kulit	Tampak sianosis (1)	Tampak sianosis (1)
Pulse Denyut jantung	Frekuensi jantung <100 (1)	Frekuensi jantung >100 (2)
Grimace Refleks	Bereaksi terhadap rangsangan (1)	Merespom terhadap rangsangan (1)
Activity Tonus otot	Tonus otot lemah (1)	Tonus otot lemah (1)
Respiration Pernapasan	Usaha napas lambat (1)	Frekuensi napas >60 kali per menit (2)
Jumlah	5	7

26. Menjepit tali pusat.
27. Memotong tali pusat.
28. Menempatkan bayi di infarm warmer.
29. Melakukan suction dan rangsangan taktil pada bayi.
30. Melakukan pemasangan oksigen.

31. Menilai ballard score bayi menempatkan bayi di dalam inkubator.

Hasil : postur/sikap 2, jendela pergelangan tangan 2, kelenturan lengan 2, sudut poplitea 2, tanda selampang 2, tumit ke telinga 2, kulit 1, lanugo 1, garis telapak kaki 2, mata/telinga 1, payudara 1, genitalia 0. Score 18, TUK 30-32 minggu.

KALA III

DATA SUBJEKTIF (S)

- a. Ibu mengatakan nyeri perut.
- b. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya.

DATA OBJEKTIF (O)

- a. Bayi lahir spontan tanggal 26-3-2016 pukul 00.15 wita, JK : laki – laki, BB : 1500 gram, PB : 38 cm, A/S : 5/7.
- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri teraba 1 jari di bawah pusat.
- d. Perdarahan \pm 150 cc
- e. Placenta belum terlepas.
- f. Tampak tali pusat di depan vulva.

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : perlangsungan kala III.

Masalah potensial : -

PLANNING (P)

32. Memeriksa fundus uteri.
33. Memberitahu ibu akan di suntik.

34. Menyuntikkan oksitosin 10 IU.
35. Memindahkan klem hingga berjarak 5-6 cm dari depan vulva.
36. Meletakkan tangan kiri di tepi atas simfisis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.
37. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus kearah dorso cranial.
38. Meregangkan tali pusat kearah atas kemudian kearah bawah.
39. Menjemput placenta dengan kedua tangan jika placenta sudah tampak di depan vulva, lahirkan placenta dengan memutar searah jarum jam
Hasil : placenta lahir jam 00.30 wita.
40. Melakukan masase dengan gosokan fundus secara sirkuler.
41. Memeriksa apakah placenta dan selaput ketuban lahir lengkap.
Hasil : placenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap.
42. Memeriksa adanya robekan jalan lahir.
Hasil : terdapat robekan tingkat II pada perineum dan dijahit dengan teknik jelujur.
43. Memeriksa kontraksi uterus.
Hasil : kontraksi uterus baik,teraba keras dan bundar.
44. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir berikan salep mata dan vitamin K.
Hasil :
 - a. BBL : 1500 gram
 - b. PBL : 38 cm

- c. LK : 27 cm
- d. LD :26 cm
- e. LP :23 cm
- f. LILA :8 cm
- g. JK : laki - laki

45. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin k.

Hasil : hepatitis B telah di berikan.

KALA IV

DATA SUBJEKTIF (S)

Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Kala berlangsung \pm 15 menit.
2. Placenta lahir lengkap pukul 00.15 wita.
3. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat.
4. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
5. Perdarahan \pm 150 cc.
6. Ibu tampak kelelahan.
7. Tanda – tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80×/menit
 - c. Suhu : 36,5°C
 - d. Pernapasan : 20×/ menit

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : perlangungan kala IV

Masalah actual : kelelahan.

PLANNING (P)

46. Melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri.

Waktu	Tinggi fundus uteri
00.45	1 jrbpst
01.00	1 jrbpst
01.15	1 jrbpst
01.30	1 jrbpst
02.00	1 jrbpst
02.30	1 jrbpst

47. Melakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua.

Waktu	Kontraksi	Kandung kemih
00.45	Baik	Kosong
01.00	Baik	Kosong
01.15	Baik	Kosong
01.30	Baik	Kosong
02.00	Baik	Kosong
02.30	Baik	Kosong

48. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai kontraksi.

Hasil : ibu dan keluarga mengeti cara melakukan masase dan dapat menilai kontraksi uterus.

49. Mengevaluasi jumlah perdarahan.

Waktu	Perdarahan
00.45	40 cc
01.00	30 cc
01.15	30 cc
01.30	20 cc
02.00	20 cc
02.30	10 cc

50. Memeriksa tanda-tanda vital ibu.

Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu
00.45	110/70 mmHg	84x/menit	36,5°C
01.00	110/70 mmHg	82x/menit	
01.15	110/70 mmHg	80x/menit	
01.30	110/70 mmHg	82x/menit	
02.00	110/70 mmHg	82x/menit	36,5°C
02.30	110/70 mmHg	82x/menit	

51. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi.

Hasil :

a. Pernapasan : 46x/menit b. Suhu : 35,8°C

52. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit.
53. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi.
54. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuban dengan air DTT.
55. Memastikan ibu merasa nyaman, memberitahu keluarga untuk memberikan ibu makanan dan minuman.
56. Mendekontaminasikan tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi.
57. Membersihkan sarung tangan dan merendamnya dalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit.
58. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir.
59. Melengkapi partograf.

PEMANTAUAN PERSALINAN

- Tanggal : 26 Maret 2016
- Nama bidan :
- Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
- Alamat tempat persalinan :
- Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
- Alasan merujuk :
- Tempat rujukan :
- Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

- Partogram melewati garis waspada : Y T
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah Tsb :
- Hasilnya :

KALA II

- Episiotomi :
 Ya, Indikasi
 Tidak
- Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
- Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 Tidak
- Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

KALA III

- Lama kala III : ± 15 menit
- Pemberian Oksitosin 10 U im ?
 Ya, waktu : 1 menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan :
- Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan :
- Penanganan tali pusat terkendali ?
 Ya
 Tidak, alasan :

- Masase fundus uteri ?
 Ya
 Tidak, alasan :
- Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
- Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
- Laserasi :
 Ya, dimana :
- Tidak
- Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan :
- Atoni uteri :
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
- Tidak
- Jumlah perdarahan : ± 100 ml
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

- Berat badan : 1500 gram
- Panjang : 38 cm
- Jenis kelamin : L / P
- Penilaian bayi baru lahir : baik (ada penyuli)
- Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan / pusat biru / lemas / tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan :
- Cacat bawaan, sebutkan :
- Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
- Pemberian ASI
 Ya, waktu :jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan :
- Masalah lain,sebutkan :
- Hasilnya :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	S	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	00.45	110/70 mmHg	84x/i	36,5°C	1 Jrbps	Baik	Kosong	± 40 cc
	01.00	110/70 mmHg	82x/i		1 Jrbps	Baik	Kosong	± 30 cc
	01.15	110/70 mmHg	80x/i		1 Jrbps	Baik	Kosong	± 30 cc
	01.30	110/70 mmHg	82x/i		1 Jrbps	Baik	Kosong	± 20 cc
2	02.00	110/70 mmHg	82x/i	36,5°C	1 Jrbps	Baik	Kosong	± 20 cc
	02.30	110/70 mmHg	82x/i		1 Jrbps	Baik	Kosong	± 10 cc

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang kesesuaian dan kesenjangan antara teori hasil studi pada penerapan dan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan kasus persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar tanggal 25 Maret 2016. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang bertujuan agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teoritis untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini.

A. KALA I

a. Langkah I

Teori mengatakan bahwa langkah I dilakukan dengan cara pengumpulan data dasar untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap untuk membuat kesimpulan tentang normal kehamilan tersebut. Rencana yang rasional untuk memantau persalinan dapat ditegakkan berdasarkan kepentingan ibu dan janin. Jika tidak ditemukan kelainan ibu harus diyakini bahwa kehamilannya dalam keadaan normal.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 18.00 wita dengan keluhan sakit perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan

darah sejak pukul 14.00 wita sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, haid terakhir pada tanggal 20 agustus 2015, ibu mengatakan usia kehamilannya 7 bulan, pergerakan janinnya kuat terasa pada perut sebelah kiri. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali di puskesmas Pertiwi dan mendapat suntik TT sebanyak 2 kali, tidak pernah dan tidak sedang mengalami penyakit serius, tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarganya dan tidak pernah menggunakan KB.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa tanda-tanda persalinan meliputi terjadinya his persalinan yang belum terlalu kuat sehingga ibu/wanita masih dapat berjalan-jalan. Klinis dapat dinyatakan mulai terjadi partus jika timbul his dan wanita tersebut mengeluarkan lendir yang bersemu darah (bloody show). Lendir yang bersemu darah ini berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka atau mendatar, sedangkan darah berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada disekitar canalis servikalis tersebut pecah karena pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka (Sumarah dkk, 2011).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan leopold didapatkan Leopold I tfu $\frac{1}{2}$ pusat

px 22 cm teraba bokong, Leopold II puka, Leopold III kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 4/5. Keadaan janin baik ditandai dengan djj dalam batas normal, lingkar perut 86 cm, tafsiran berat janin 1892 gram, his 3 kali dalam 10 menit durasi 25-30 menit. Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 25 maret 2016 pukul 18.00 wita didapatkan vulva vagina tidak ada kelainan, portio tebal, pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi uuk lintang, penurunan hodge I-II, moulage 0, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah. Selanjutnya dilakukan observasi denyut jantung janin dan his tiap 30 menit dan observasi kemajuan persalinan tiap 4 jam pada kala I.

Tinggi fundus uteri, pemeriksaan TFU juga salah satu pendukung dari diagnosis persalinan preterm. Jika pembesaran uterus lebih kecil dari dugaan usia kehamilan normal, maka kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih muda dari taksiran. Pada kasus Ny "R" didapatkan TFU $\frac{1}{2}$ pusat px 22 cm.

Tafsiran berat janin, pemeriksaan TBJ dapat ditentukan dengan cara lingkar perut dikalikan dengan tinggi fundus uteri. pada persalinan preterm berat janin antara 1000-2500 gram (Tando, 2013). Pada kasus Ny "R" TBJ didapatkan 1892 gram.

Ultrasonografi, pemeriksaan USG merupakan suatu metode diagnostic dengan menggunakan gelombang ultrasonic untuk memperlajari

morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang ultrasonic yang dipantulkan oleh organ. Penentuan usia kehamilan dilakukan berdasarkan tabel data atau nomogram yang menggambarkan hubungan antara ukuran biometri janin dan usia kehamilan pada kehamilan normal (Prawirohardjo, 2014). Pada kasus Ny “R” tidak dilakukan pemeriksaan USG karena keadaan yang tidak memungkinkan.

b. Langkah II

Berdasarkan data subjektif dan data objektif pada kasus Ny “R” didapatkan diagnosis inpartu kala I fase aktif dengan persalinan preterm.

Sesuai dengan teori penetapan fase aktif berdasarkan pembukaan serviks, dimana fase laten dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap kurang dari 4 cm dan fase aktif dimulai sejak pembukaan serviks 4-10 cm dan pada umumnya frekuensi dan lama kontraksi uterus meningkat (Asri, 2012).

Persalinan preterm merupakan salah satu persalinan yang berisiko. Dimana usia kehamilan yang belum aterm menyebabkan resiko terhadap maturitas organ bayi. Adapun masalah-masalah yang dapat terjadi pada bayi baru lahir preterm antara lain masalah kardiovaskular, dimana pada bayi preterm duktus arteriosus belum tertutup yang akan mengakibatkan edema pulmonal, masalah pernapasan, masalah gastrointestinal, dan masalah suhu (Reeder dkk, 2012).

Berdasarkan teori bahwa kehamilan normal umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir (Prawirohardjo, 2014). Dikatakan preterm jika usia kehamilan >20 minggu dan <37 minggu (Nugroho, 2011). Pada kasus Ny “R” usia kehamilannya 31 minggu 1 hari.

Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan dengan pengukuran tinggi fundus uteri, normalnya pada persalinan aterm 37-40 minggu tinggi fundus uteri 2 jari dibawah processus xypoideus, jika pembesaran uterus tidak sesuai dengan umur kehamilan maka kemungkinan usia kehamilan lebih muda. Pada kasus Ny “R” didapatkan tinggi fundus uteri $\frac{1}{2}$ pusat px 22 cm, hal ini menunjukkan bahwa usia kehamilan belum aterm jika dilihat berdasarkan pengukuran tinggi fundus uteri.

c. Langkah III

Teori mengatakan masalah potensial yang dapat terjadi pada persalinan preterm yaitu gawat janin, gawat janin, gawat janin dapat terjadi bila janin tidak menerima O_2 yang cukup sehingga mengalami hipoksia. Tanda gawat janin dapat dilihat jika djj dalam proses persalinan bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu, namun jika djj tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan tanda gawat janin (Saifuddin, 2010).

Berdasarkan data dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny “R” tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin, hal ini ditandai dengan kembalinya djj dalam batas normal setelah kontraksi.

d. Langkah IV

Tindakan ini dilakukan jika ditemukan adanya diagnosa potensial atau masalah emergency sehingga membutuhkan tindakan segera atau tindakan kolaborasi.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi.

e. Langkah V

Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh dimana asuhan ini ditentukan oleh langkah sebelumnya. Jika terdapat diagnosa potensial maka dilakukan rencana asuhan sesuai dengan diagnosa.

Berdasarkan teori pengelolaan selama persalinan preterm yaitu pemantauan terhadap keadaan ibu dan kesejahteraan janin, pemantauan kontraksi, pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru, istirahat rebah dengan posisi miring ke kiri untuk peredaran darah ke uterus, pemberian cairan dan memperhatikan kebutuhan energi (Rukiyah, 2010).

Pada kasus Ny “R” rencana asuhan yang diterapkan antara lain pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru, pemantauan tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, pemantauan djj, nadi dan his tiap 30 menit dan

pemantauan kemajuan persalinan tiap 4 jam atau tiap 2 jam jika terdapat indikasi.

Dalam penanganan persalinan preterm yang perlu diperhatikan adalah pemantauan keadaan ibu yang meliputi tekanan darah dan suhu yang diukur setiap 4 jam, pemantauan keadaan janin dengan memantau denyut jantung janin, nadi dan kontraksi tiap 30 menit. Pemberian kortikosteroid diperlukan untuk pematangan paru pada bayi. Ibu disarankan untuk miring ke kiri untuk peredaran darah ke uterus. Selain itu juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi pada ibu.

Pemberian kortikosteroid pada persalinan preterm sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pemberian kortikosteroid bertujuan untuk pematangan paru pada janin yang dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian pada bayi baru lahir preterm (Yuniar, dkk, 2015).

f. Langkah VI

Rencana tindakan dibuat berdasarkan intervensi yang dibuat sebelumnya. Rencana tindakan yang dibuat sesuai dengan teori yaitu memberikan kortikosteroid, memantau tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, memantau djj, nadi dan his tiap 30 menit, serta memantau kemajuan persalinan tiap 4 jam atau tiap 2 jam jika terdapat indikasi.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan telah diberikan kortikosteroid, pemantauan djj, nadi dan his tiap

30 menit, dimulai dari pukul 18.00 wita, dilakukan pemeriksaan dalam pertama pada pukul 18.00 wita didapatkan pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi uuk lintang, penurunan hodge I-II, pelepasan lendir dan darah. Dilanjutkan pemantauan djj, nadi dan his pada pukul 18.30 sampai 22.00, melakukan VT II pada pukul 22.00 wita, didapatkan pembukaan 8 cm, ketuban utuh, presentasi uuk kanan depan, penurunan hodge III, pelepasan lendir dan darah. Pemantauan djj, nadi dan his dilanjutkan pada pukul 22.30 sampai 00.00 wita. Kembali dilakukan VT pada pukul 00.00 wita didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban jernih, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV, pelepasan air ketuban dan darah. Pada pukul 00.00 wita pembukaan sudah lengkap dan ibu siap untuk dilakukan pimpinan meneran.

Pada kasus Ny "R" pemantauan dilakukan sesuai dengan teori yaitu pemantauan tekanan darah dan suhu dilakukan tiap 4 jam, pemantauan his, djj dan nadi dilakukan tiap 30 menit. Pemeriksaan VT dilakukan setiap 4 jam atau 2 jam jika terdapat indikasi.

g. Langkah VII

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Berdsarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" didapatkan data inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan lengkap pada pukul 00.00 wita, ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran, perasaan ingin BAB, djj terdengar kuat, jelas dan teratur dengan frekuensi

132x/menit, his 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hasil evaluasi didapatkan bahwa pembukaan sudah lengkap pada pukul 00.00 wita, perlangsungan kala I berlangsung normal tidak mengalami gangguan atau penyulit.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapatkan dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 18.00 wita dengan keluhan sakit perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan darah sejak pukul 14.00 wita sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, haid terakhir pada tanggal 20 agustus 2015, ibu mengatakan usia kehamilannya 7 bulan, pergerakan janinnya kuat terasa pada perut sebelah kiri. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali di puskesmas Pertiwi dan mendapat suntik TT sebanyak 2 kali, tidak pernah dan tidak sedang mengalami penyakit serius, tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarganya dan tidak pernah menggunakan KB.

Data objektif yang meliputi data yang didapatkan dari pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas

kesehatan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I t_{fu} ½ pusat px 22 cm teraba bokong, Leopold II puka, Leopold III kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 4/5. Keadaan janin baik ditandai dengan djj dalam batas normal, lingkar perut 86 cm, tafsiran berat janin 1892 gram, his 3 kali dalam 10 menit durasi 25-30 menit. Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 25 maret 2016 pukul 18.00 wita didapatkan vulva vagina tidak ada kelainan, portio tebal, pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi uuk lintang, penurunan hodge I-II, moulage 0, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah.

Assesment yaitu hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” ditegakkan diagnosa G1 P0 A0, gestasi 30-32 minggu, situs memanjang, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, kala I fase aktif.

Planning menggambarkan pendokumentasian untuk rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” telah dilakukan intervensi dan implementasi sesuai dengan teori dengan hasil evaluasi inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan 10 cm pada pukul 00.00 wita, ibu mempunyai dorongan untuk meneran, terasa ingin BAB, dengan his

5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik, djj dalam batas normal, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

B. KALA II

a. Langkah I

Pengkajian adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan pasien. Dan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan melalui anamnesis.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “R” didapatkan data subjektif ibu merasakan ada dorongan yang kuat untuk meneran dan ibu merasa ingin BAB. Sedangkan data objektif yang didapatkan perineum menonjol, vulva, vagina dan anus membuka. Djj dalam batas normal, his 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, pemeriksaan dalam pada pukul 00.00 wita didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban jernih, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV, moulage 0.

Teori mengatakan tanda gejala kala II yaitu ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rectum dan atau vaginanya, perineum menonjol, vulva-vagina dan sfingter ani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah (Nurasiah dkk, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

b. Langkah II

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data dari hasil pengkajian yang sudah ada yang akhirnya ditegakkan diagnosa dalam ruang lingkup praktek kebidanan.

Berdasarkan teori perlangsungan kala II dapat ditegakkan jika didapatkan tanda gejala kala II yaitu ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan ada peningkatan tekanan pada rectum/vagina, perineum tampak menonjol, vulva vagina spinter ani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir dan darah (Asri, 2012).

Pada kasus Ny "R" didapatkan tanda gejala kala II yaitu ibu mengatakan sakit perut semakin kuat, ibu ingin BAB, perineum tampak menonjol, vulva vagina dan anus membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, djj dalam batas normal, pembukaan serviks lengkap. Berdasarkan tanda dan gejala dapat ditegakkan ibu sedang dalam perlangsungan kala II.

Diagnosis kala II dapat ditegakkan atas dasar hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina atau kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm.

c. Langkah III

Teori mengatakan bahwa masalah potensial yang dapat terjadi pada persalinan preterm yaitu asfiksia merupakan keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Hipotermia yaitu suhu bayi $<36,5^{\circ}\text{C}$ serta kaki dan tangan teraba dingin. Bayi berat lahir rendah yaitu berat badan pada bayi baru lahir kurang dari 2500 gram (Prawirohardjo, 2010).

Pada kasus Ny “R” didapatkan bayi mengalami asfiksia dengan apgar score 5/7, suhu $35,8^{\circ}\text{C}$, berat badan lahir 1500 gram.

Asfiksia adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir (Arief, 2009). Asfiksia sangat berpotensi terjadi pada bayi baru lahir preterm karena organ-organ pada bayi baru lahir preterm termasuk paru-paru belum matur, hal ini menyebabkan organ tersebut belum bisa bekerja dengan baik.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyebutkan bahwa timbulnya asfiksia pada bayi preterm dikarenakan belum matangnya tingkat kematangan sistem organ sehingga bayi belum dapat berinteraksi diluar rahim. Berdasarkan hasil analisis diperoleh responden yang melahirkan preterm sebagian besar 70,0% bayi yang dilahirkan mengalami asfiksia neonatorum hasil p-value uji statistik chi-square pada variable persalinan preterm adalah 0,022 yang berarti nilai

p-value < 0,05 ini menunjukkan bahwa adanya hubungan bermakna antara persalinan preterm dengan kejadian asfiksia (Tiyas dkk, 2015).

Hasil penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara umur kehamilan dengan kejadian asfiksia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ibu bersalin dengan umur kehamilan preterm bayinya mengalami asfiksia sebanyak 31 orang (Asmawahyunita, 2012).

Dalam penelitian lainnya menyebutkan bahwa umur kehamilan menunjukkan hubungan signifikan dengan asfiksia. Menurut umur kehamilan asfiksia terbanyak pada usia kehamilan 37-42 minggu berjumlah 162, sementara umur kehamilan <37 minggu sebanyak 56 (Gerungan dkk, 2014).

Hipotermi terjadi karena hanya sedikit lemak tubuh dan sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang (Proverawati, 2010). Hipotermi berpotensi terjadi pada bayi baru lahir preterm karena bayi yang lahir dalam keadaan belum cukup bulan/preterm mempunyai organ-organ yang belum matur dan belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa persalinan preterm mengakibatkan bayi mengalami suhu tubuh yang tidak stabil karena bayi preterm tidak dapat menghasilkan panas yang cukup dikarenakan kekurangan lemak tubuh (Tiyas dkk, 2015).

Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Bayi yang berada di bawah presentil 10 dinamakan ringan untuk masa kehamilan. Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram atau sama dengan 2500 gram disebut prematur (Proverawati, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ibu yang bersalin dengan umur kehamilan >37 minggu sebanyak 74. Penelitian ini mengungkapkan bahwa umur kehamilan preterm bukan menjadi faktor prioritas terjadinya BBLR, karena dalam penelitian ini juga mengungkapkan jumlah persalinan dengan umur kehamilan aterm lebih dominan melahirkan bayi berat lahir rendah (Aulia, 2009).

d. Langkah IV

Pada langkah ini dilakukan tindakan segera atau kolaborasi. Tindakan ini diambil berdasarkan indikasi yang ditemukan pada langkah sebelumnya.

Pada kasus Ny "R" dilakukan kolaborasi dengan dokter anak untuk melakukan resusitasi pada bayi baru lahir preterm yang mengalami asfiksia. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan membebaskan jalan napas, dilakukan suction untuk membersihkan jalan napas, dan diberikan oksigen untuk membantu pernapasan bayi. Dilakukan penanganan hipotermi dengan merawat bayi dalam inkubator dan selanjutnya bayi dirawat diruang khusus.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penanganan bayi preterm yaitu mengeringkan bayi, membebaskan jalan napas, memberikan oksigen, pemberian infus dextrose, mempertahankan suhu tubuh dengan ketat dengan dirawat dalam incubator dan pengawasan nutrisi/ASI bagi bayi baru lahir, diberikan dengan sonde atau ditetesi ASI sesuai dengan keutuhan bayi (Kurniawati, 2015).

Pada kasus Ny “R” bayi belum diberikan infus pada saat pengkajian di kamar bersalin.

e. Langkah V

Berdasarkan teori intervensi yang dilakukan terhadap persalinan preterm pada kala II yaitu, lihat tanda gejala kala II, siapkan alat pertolongan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan dibawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, lakukan episiotomy untuk mengurangi tekanan pada kepala bayi, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar, kemudian lanjut melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir jepit dan potong tali pusat, letakkan bayi dibawah infarm warmer untuk dilakukan

pertolongan pada bayi dan dilakukan penilaian ballard score oleh dokter anak.

Pada kasus Ny “R” intervensi sesuai dengan teori yang ada hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

f. Langkah VI

Implementasi dilakukan pada kasus Ny “R” sesuai dengan intervensi, berdasarkan data yang didapatkan pada kasus tersebut bahwa pembukaan lengkap pada pukul 00.00 wita, ketuban jernih, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV, moulage 0, pelepasan air ketuban dan darah.

Semua alat dan obat-obatan telah disiapkan dan pimpinan persalinan dilakukan pada pukul 00.00 wita, bayi lahir pada tanggal 26-3-2016 pukul 00.15 wita bayi lahir tidak segera menangis, pucat, ada usaha untuk bernapas dan gerakan hampir tidak ada. Bayi laki-laki dengan berat badan lahir 1500 gram, panjang badan 38 cm. Nilai ballard score 18 taksiran umur kehamilan 30-32 minggu.

g. Langkah VII

Pada kasus Ny “R” kala II berlangsung dengan normal yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 26-3-2016 pukul 00.15 wita tidak segera menangis, dengan berat badan lahir 1500 gram, panjang badan 38 cm, jenis kelamin laki-laki. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari subjektif yang mencakup data yang didapat dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan bahwa ibu merasa adanya dorongan yang kuat untuk meneran, sakit perut tembus belakang terasa semakin kuat, dan perasaan ingin BAB.

Data objektif mencakup data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, djj dalam batas normal, tampak perineum menonjol, vulva vagina dan anus membuka, pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada pukul 00.00 wita didapatkan pembukaan lengkap, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV.

Assessment merupakan hasil analisis data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi masalah/diagnosa, antisipasi masalah potensial dan perlunya tindakan segera. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan assessment perlangsungan kala II, diagnosa potensial yang didapatkan yaitu antisipasi terjadinya asfiksia, hipotermi dan bayi berat lahir rendah. Dan dilakukan kolaborasi dengan dokter anak untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm.

Planning meliputi tindakan asuhan atau implementasi dan evaluasi dari tindakan yang diberikan berdasarkan assessment yang ditegakkan.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” tindakan asuhan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada dan mendapatkan hasil evaluasi kala II berlangsung dengan normal yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 26-3-2016 pukul 00.15 wita tidak segera menangis dengan berat badan lahir 1500 gram, panjang badan 38 cm, jenis kelamin laki-laki, tinggi fundus uteri setinggi pusat.

C. KALA III

a. Langkah I

Berdasarkan teori yang didapatkan tanda-tanda terlepasnya placenta yaitu perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, sebelum bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh tinggi fundus biasanya dibawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan placenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau seperti buah pear atau alpukat dan fundus teraba di atas pusat. Tali pusat memanjang, tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva. Semburan darah mendadak dan singkat, apabila kumpulan darah (retroplacental pooling) dalam ruang diantara dinding uterus dan permukaan dalam placenta melebihi kapasitas tampungnya maka darah tersembur keluar dari tepi placenta yang terlepas (Walyani, 2015).

Pada kasus Ny “R” didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah, dari data objektif didapatkan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tali pusat bertambah panjang.

Ada beberapa prasat untuk mengetahui placenta terlepas yaitu: prasat kustner, prasat ini mengatakan bahwa untuk memastikan placenta terlepas maka dilakukan dengan cara meletakkan tangan disertai penekanan diatas simfisis, bila tali pusat tersebut masuk kembali (tali pusat memendek), berarti placenta belum terlepas dan jika panjang tali pusat masih sama berarti placenta belum terlepas dan jika panjang tali pusat masih sama berarti placenta sudah lepas.

Prasat strassman, mengatakan bahwa untuk mengetahui placenta terlepas dengan cara meregangkan atau menarik sedikit tali pusat dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri mengetok-ngetok fundus uteri dan merasakan apakah ada getaran yang ditimbulkan dari gerakan tangan kiri, jika terasa ada getaran berarti placenta sudah terlepas.

Prasat klien, untuk melakukan perasat ini, minta pasien untuk meneran, jika tali pusat tampak turun atau bertambah panjang berarti placenta telah lepas.

Prasat manuaba, prasat ini dilakukan dengan cara tangan kiri memegang uterus pada segmen bawah rahim, sedangkan tangan kanan

memegang dan mengencangkan tali pusat, kedua tangan ditarik berlawanan. Jika tarikan terasa ringan dan tali pusat memanjang berarti placenta telah lepas (Walyani, 2015).

b. Langkah II

Berdasarkan teori kala III dimulai segera setelah lahirnya bayi sampai lahirnya placenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “R” berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan ditegaskan diagnosis perlangsungan kala III.

c. Langkah III

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “R” tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegaskan. Dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkn bahwa proses pengeluaran placenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit.

d. Langkah IV

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “R” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera ataupun kolaborasi. Ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkkan menunjukka bahwa proses pengeluaran placenta dapat berlangsung normal.

e. Langkah V

Berdasarkan diagnosis pada kasus Ny “R” tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah dilakukan intervensi yang sesuai yaitu melakukan pemberian oksitosin, peregangan tali pusat dan masase uterus.

Pemberian oksitosin dilakukan dalam satu menit pertama setelah bayi lahir, namun sebelum pemberian oksitosin hal yang harus diperhatikan adalah memastikan tidak ada bayi lain didalam uterus. Setelah itu suntikka oksitosin secara IM pada sepertiga bagian atas paha bagian luar yang bertujuan untuk membantu pelepasan placenta dan mengurangi kehilangan darah.

f. Langkah VI

Pada Ny “R” dilakukan implementasi berdasarkan dengan teori yaitu melakukan pemberian oksitosin secara IM, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan placenta, dan selanjutnya setelah placenta lahir dilakukan masase uterus. Proses pelepasan dan pengeluaran placenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit, dimana placenta lahir 15 menit setelah bayi lahir yaitu jam 00.30 wita, placenta lahir lengkap dengan kotiledon dan selaput ketuban utuh, perdarahan kurang lebih 150 cc.

g. Langkah VII

Dari implementasi yang telah dilakukan pada kasus Ny “R” didapatkan hasil pemeriksaan keadaan ibu dalam keadaan normal ditandai

dengan uterus teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif, pendokumentasian hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesis, pada kasus Ny “R” didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.

Objektif yaitu dari hasil pemeriksaan fisik pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pada kasus Ny “R” didapatkan dari hasil pemeriksaan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

Assessment merupakan hasil analisis data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi diagnosa/masalah, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perlunya tindakan segera, pada kasus Ny “R” didapatkan assessment perlangsungan kala III.

Planning merupakan hasil dari tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Pada kasus Ny “R” telah dilakukan tindakan asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, placenta lahir lengkap

pada pukul 00.30 wita, kontraksi baik teraba keras dan bundar, TFU I jari dibawah pusat, dengan perdarahan kurang lebih 150 cc.

D. KALA IV

a. Langkah I

Pada kasus Ny “R” didapatkan data subjektif ibu lelah setelah persalinan dan data objektif kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, TFU 1 jari bawah pusat, placenta lahir lengkap, ttv dalam batas normal.

Berdasarkan teori pada kala IV hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kontraksi uterus baik, pemeriksaan serviks, vagina dan perineum hal ini berguna untuk mengetahui terjadinya laserasi (adanya robekan) yang dapat diketahui dari adanya perdarahan pascapersalinan. Tanda-tanda vital, keadaan ibu dan keadaan janin (Kuswanti, 2014).

b. Langkah II

Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan pada kasus Ny “R” maka diagnosis yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV, hal ini sesuai dengan teori bahwa placenta lahir lengkap jam 00.30 wita dan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

c. Langkah III

Pada kasus Ny “R” masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan post partum.

Menurut teori kala IV merupakan kala pengawasan selama 2 jam post partum, karena kala ini sangat rentan terjadi perdarahan post partum, perdarahan biasanya terjadi karena lemahnya tonus/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan setelah bayi dan placenta lahir, selain itu adanya ruptur dijalan lahir, dan tidak normalnya proses pembekuan darah juga salah satu penyebab perdarahan post partum.

d. Langkah IV

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau tindakan kolaborasi, hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala III berlangsung normal, kontraksi uterus baik, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

e. Langkah V

Pada kasus Ny "R" intervensi yang dilakukan pada kala ini yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua, serta mengukur suhu tubuh ibu, setelah pemantauan kala IV selesai, ibu dipindahkan ke ruangan nifas.

Teori mengatakan sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan, kematian itu disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan eklampsia. Oleh karena itu, pemantauan selama 2 jam pertama post partum sangat penting.

f. Langkah VI

Setelah intervensi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah implementasi sesuai dengan teori. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “R” implementasi yang dilakukan yaitu memantau tanda-tanda vital ibu selama 4 kali 15 menit yaitu mulai jam 00.45 wita sampai 01.30 wita didapatkan tekanan darah ibu dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih kosong serta perdarahan kurang lebih 20-40 cc, selanjutnya melakukan pemantauan 2 kali 30 menit yaitu pada jam 02.00 wita sampai 02.30 wita didapatkan tekanan darah dalam batas normal, kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong serta perdarahan kurang lebih 10-20 wita. Keadaan bayi baik dengan pernapasan serta suhu dalam batas normal, serta mendokumentasikan hasil pemantauan ke dalam partograf. Selanjutnya ibu dipindahkan keruangan nifas.

g. Langkah VII

Pada kasus Ny “R” didapatkan bahwa kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih

kosong, jumlah perdarahan kurang lebih 150 cc, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kala IV berlangsung normal dan tidak ada penyulit serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pasien dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui anamnesis. Berdasarkan kasus Ny “R” didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinan.

Objektif merupakan hasil dari pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan, didapatkan data kala III berlangsung normal berlangsung kurang lebih 15 menit, placenta lahir dengan kotiledon dan selaput ketuban utuh, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

Assessment hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis/masalah yang terjadi, antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan kasus Ny “R” maka assessment yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV.

Planning meliputi tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan implementasi

yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan studi kasus pada Ny “R” dengan persalinan preterm serta menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan intranatal maka dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “R” dengan persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Pada kasus Ny “R” didapatkan data dasar dengan usia kehamilan 30-32 minggu dan adanya pengeluaran lendir bercampur darah.
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnose/masalah actual pada Ny “R” dengan persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Ny “R” masuk dengan tanda dan gejala inpartu pada usia kehamilan 30-32 minggu.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa/masalah potensial pada Ny “R” dengan persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi. Diantisipasi terjadinya gawat janin, asfiksia, hipotermi, BBLR dan perdarahan post partum.
4. Telah dilakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “R” dengan persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Kolaborasi

dilakukan bersama dokter anak dengan tindakan pertolongan pertama dan perawatan bayi baru lahir preterm.

5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Intervensi dilakukan dengan pemantauan persalinan dengan partograf , pemberian obat kortikosteroid, perencanaan persalinan dengan hati-hati, pertolongan dan penanganan bayi baru lahir preterm.
6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Telah dilakukan sesuai dengan intervensi, bayi lahir pada pukul 00.15 wita dengan bbl:1500 gram, pbl:38 cm, as:5/7.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan persalinan preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Kondisi ibu baik, dan tidak terjadi perdarahan post partum.

Bayi mengalami asfiksia selama menit 7 dan mengalami hipotermi dengan suhu 35,8°C, berat badan bayi 1500 gram. Bayi telah mendapatkan perawatan oleh dokter anak dan bayi dirawat inkubator.

B. SARAN

Berdasarkan tingkat risiko yang dapat disebabkan oleh persalinan preterm maka penulis menyarankan:

1. Meningkatkan upaya pencegahan persalinan preterm dengan pelayanan antenatal care.
2. Mengenali sedini mungkin komplikasi-komplikasi pada kehamilan dan upaya menanganannya.
3. Melakukan pertolongan persalinan preterm dengan baik salah satunya dengan menjalin kerja sama yang baik dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA






- Arief dan Kristiyanasari. Neonatus & Asuhan Keperawatan Anak. Yogyakarta: Nuha Offset, 2009.
- Asmawahyunita, dkk. Hubungan Umur Kehamilan dengan Kejadian Asfiksia di RSI Sultan Hadlirin Jepara. Jurnal Kesehatan dan Budaya volume 3 No. 2. 2012.
- Asri H, Dwi dan Cristine Clervo P. Asuhan Persalinan Normal. Yogyakarta: Medical Book, 2012.
- Asrinah, dkk. Asuhan Kebidanan Masa Persalinan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Aulia Fika dan Asri Hidayat. Overview the Risk Factors of Low Birth Weight Baby in Panembahan Senopati Bantul District Hospital in 2009.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dewi, Vivian Nanny Lia. Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kesehatan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kesehatan 2011 Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kesehatan 2012 Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015.
- Drew, david, dkk. Resusitasi bayi baru lahir. Jakarta: EGC, 2009.
- Gerungan, Junita Caroline, dkk. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou manado. Jurnal Ilmiah Bidan volume 2 nomor 1. 2014.
- Handajani, Sutjiati Dwi. Manajemen Asuhan Kebidanan. Jakarta: EGC, 2010.
- Indrayani dan Moudy Emma Unaria Djami. Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: TIM, 2013.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011, 2012.
- Kuswanti, Ina dan Fitria Melina. Askeb II Persalinan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mangkuji, Betty, dkk. Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap. Jakarta: EGC, 2013.
- Manuaba, Chandranita, dkk. Gawat Darurat Obstetri Ginekologi Cetakan I. Jakarta: EGC, 2008.
- Manuaba, Chandranita, dkk. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB. Jakarta: EGC, 2010
- Mochtar, Rustam. Sinopsis Obstetri, Obstetri Fisiologi, Obstetri Patologi. Jakarta: EGC, 2013
- Nugroho, Taufan. Buku ajar Obstetri untuk mahasiswa Kebidanan. Yogyakarta: Nuha medika, 2011.
- Nurasiah, Ai, dkk. Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Oxorn, Harry dan William R. Forte. Ilmu Kebidanan: Patologi & Fisiologi persalinan. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2010.
- Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan. Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2010, 2011.
- Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan. Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2011, 2012.
- Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan. Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2012, 2013.
- Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan. Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun, 2014.
- Prawirohardjo, Sarwono. Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Prawirohardjo, Sarwono. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2010.

- Proverawati, Atikah dan Cahyo Ismawati. BBLR Berat Badan Lahir Rendah. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Rahmawati, Eni Nur. Ilmu Praktis kebidanan. Yogyakarta: Victory Inti Cipta, 2011.
- Reeder, dkk. "Keperawatan maternitas," dalam Maternity Nursing. Jakarta: EGC, 2012.
- Rukiah, Ai Yeyeh dan Lia yulianti. Asuhan Kebidanan 4 (patologi). Jakarta: TIM, 2013.
- Saifuddin, Abdul Bari. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2010.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Volume 8. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Volume 11. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sumarah, dkk. Perawatan Ibu Bersalin (Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin). Yogyakarta: Fitramaya, 2011.
- Surasmi, dkk. Perawatan Bayi Beresiko Tinggi. Jakarta: EGC, 2009.
- Tando, Naomy Marie. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: In Media, 2013.
- Tiyas Mulya Widiyaning dan Kuntoro. Faktor Resiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Kanjuruhan Malang. Jurnal Biometrika dan Kependudukan Vol. 4 No. 1 Juli 2015.
- Wahyuni, sari. Asuhan neonatus, bayi dan balita. Jakarta: EGC, 2012
- Walyani, Elisabeth Siwi dan Th. Endang Purwoastuti. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru lahir. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Yuniar, Yuyun, dkk. Kajian Pemberian Antenatal Kortikosteroid untuk Ibu Hamil yang Berisiko Melahirkan Bayi Prematur. 2015.


LEMBAR KEGIATAN KONSULTASI

Nama : Umra Reski
Nim : 70400113008
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan persalinan
Preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016.
Pembimbing : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.

No.	Hari/Tgl	Materi Konsultasi	Saran/Perbaikan	Paraf
1.	Jumat 05-02-2016	Konsul Judul	ACC Judul, lanjutkan konsul kasus	
2.	Kamis 26-05-2016	Konsul Kasus	ACC Kasus	
3.	Senin 20-06-2016	Konsul BAB I	Perbaikan penulisan, tambahan materi pada manajemen asuhan kebidanan	
4.	Selasa 21-06-2016	Konsul Bab I dan BAB II	Tambahan materi	
5.	Rabu 22-06-2016	Konsul BAB I dan BAB II	Perbaikan penulisan	

6.	Jumat 24-06-2016 Rabu 29-06-2016	Konsul Proposal Ujian Seminar Proposal	ACC Proposal Perbaikan proposal	
7.	Rabu 27-07-2016	Konsul perbaikan proposal	Daftar pustaka, asuhan kebidanan pada langkah II, III dan IV	
8.	Kamis 28-07-2016	Konsul perbaikan proposal	Perbaikan asuhan kebidanan langkah IV	
9.	Kamis 28-07-2016	Konsul perbaikan proposal	ACC perbaikan proposal	
10.	Kamis 15-09-2016	Konsul BAB III	Perbaikan Kala I dan Kala II.	
11.	Selasa 27-09-2016	Konsul BAB III	ACC BAB III, lanjut BAB IV.	
12.	Rabu 5-10-2016	Konsul BAB IV	Tambahan pembahasan, tambahan jurnal	
13.	Selasa 25-10-2016	Konsul BAB IV	Tambahan Jurnal, lanjut BAB V	

14.	Jumat 28-10-2016	Konsul BAB IV dan V	ACC BAB IV dan V	
15.	Senin 07-11-2016	Ujian KTI		
16.	Selasa 15-11-2016	Konsul Perbaikan KTI	Perbaikan parto, penulisan	
17.	Rabu 16-11-2016	Konsul Perbaikan KTI	Perbaikan penulisan	
18.	Senin 21-11-2016	Konsul Perbaikan KTI	Penulisan paragraph draft	
19.	Jumat 25-11-2016	Konsul Perbaikan KTI	ACC KTI	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864923. Makassar 90221
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400. Samata-Gowa 92113

WAKTU PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : Umra Reski
NIM : 70400113008
JUDUL : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Persalinan Preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016.

No	NAMA	JABATAN	HARI/ TANGGAL	WAKTU	TANDA TANGAN
1.	Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	Pembimbing	Senin 07-11-2016	14.00 Wita	
2.	Irmawati, S.ST	Penguji I	Senin 07-11-2016	14.00 Wita	
3	Dr. Wahyuddin, M.Ag	Penguji II	Senin 07-11-2016	14.00 wita	

Samata-Gowa, 10 November 2016
Pembimbing

Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
NIP. 19751113 200604 2 0001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax. (0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : FKIK/PP.00.9/2166/2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Kasus**

Makassar, 17 Maret 2016

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prop. Sul-Sel
di-
Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Semester VI (Enam) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :


Nama : Umra Resky
NIM : 70400113008
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ibu Dengan Persalinan Prematur di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan Kasus selama satu bulan dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam

An/ Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)

Nomor : FKIK/PP.00.9/205d/2016

Makassar, 29 Februari 2016

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Direktur RSKD Ibu dan Anak Pertiwi

di-

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Semester VI (Enam) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Umra Resky
NIM : 70400113008
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" Dengan Persalinan Prematur di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam
An/ Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 14 Telepon (0411) 316134 Fax. 312242
MAKASSAR 90113

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400 / 1238 / RSKDP / I / III / 2016

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : UMRA RESKY
NIM : 70400113008
Program Studi : DIII. KEBIDANAN
Kampus : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63

Telah melaksanakan Pengambilan Data Awal Pada Bulan Februari Sampai Maret 2016, *di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Prov. SulSel jalan Jendral Sudirman No. 14 Makassar, dengan judul "Manajemn Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" Dengan Persalinan Prematur di RSKDIA Pertiwi Makassar "*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Maret 2016

An. DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS
DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
KEPALA SUB.BAG.TATA USAHA

H. TURA. S.Si.M.kes

NIP : 19650123 198803 1 004





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : /Un.06/FKIK/PP.00.9/ 5178/2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 26 Juli 2016

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.

di-

Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Umra Reski

NIM : 70400113008

Program Studi : Kebidanan

Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Persalinan Preterm di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

Dosen Pembimbing : Firdayanti, S.SiT., M.Keb.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan



Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

NIP. 19640706 199103 1 003



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 0 6 4 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 10646/S.01P/P2T/08/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSKDIA Pertiwi Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 5176/Un.06/FKIK/PP.00.9/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **UMRA RESKI**
Nomor Pokok : 70400113008
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL DENGAN PERSALINAN PRETERM DI RSKD IIBU DAN ANAK PERTIWI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 s/d 29 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 Agustus 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu




A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 14 Telepon (0411) 316134 Fax. 312242
MAKASSAR 90113

INSTALASI DIKLAT

Nomor : 336 /RSKDP.1/ VIII /2016

Makassar, 05 Agustus 2016

Perihal : Pengambilan Data / Penelitian
Lampiran : -

Kepada
Yth. Ka Instalasi / Ka. Ruang
/NC
.....

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Mohon bantuannya untuk memberikan data/informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : Umra Reski

Nim : 70400113008

Program Studi : D III Kebidanan


Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan
Persalinan Preterm.

Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Wasalam,

Ka. Instalasi Diklat


dr. Hj. Susiawaty, Sp. OG, M. Kes
Nip : 19639121 199002 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
Jin. Jend. Sudirman Nomor 14 Telepon (0411) 316134 Fax. 312242
MAKASSAR 90113

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 2205 / RSKDP / I / VIII / 2016

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : UMRA RESKI
NIM : 70400113008
Program Studi : DIII. KEBIDANAN
Kampus : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63

Telah melaksanakan Penelitian Pada Bulan Agustus 2016, *di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Prov. SulSel jalan Jendral Sudirman No. 14 Makassar, dengan judul "Manajemn Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Persalinan Preterm di RSKDIA Pertiwi Makassar"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, Agustus 2016

An. DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS
DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
KEPALA SUB.BAG.TATA USAHA

H. TURA, S.Si.M.kes

NIP. : 19650123 198803 1 004



BIODATA PENELITI



A. Identitas Peneliti

Nama lengkap : Umra reski
NIM : 70400113008
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Coppo Taluma, 07 Oktober 1995
Agama : Islam
Alamat : BTN Asabri, Antang.
No. Hp : 085343531547
Email : umrareski@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SDN 164 Mamminasae, Bone, Sul-Sel.
2. Tahun 2007-2010 : SMPN 1 Lamuru, Bone, Sul-Sel.
3. Tahun 2010-2013 : SMAN 1 Lamuru, Bone, Sul-Sel
4. Tahun 2013-2016 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sul-Sel.