

**PENENTUAN KONSENTRASI OPTIMUM NATRIUM KLORIDA (NaCl)
DAN WAKTU OPTIMUM PEREBUSAN UMBI DAN DAUN SINGKONG
PAHIT (*Manihot Esculenta Crantz*) TERHADAP PENURUNAN
KADAR ASAM SIANIDA (HCN)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Sains Kimia Jurusan Kimia
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR ILMA USMAN
NIM: 60500113012

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ilma Usman

NIM : 60500113012

Tempat/Tgl, lahir : Pinrang/ 30 Januari 1995

Jurusan : Kimia

Alamat : Samata-Gowa

Judul : Penentuan Konsentrasi Optimum Natrium Klorida (NaCl) dan Waktu Optimum Perebusan Pada Umbi Dan Daun Singkong Pahit (*Manihot Esculenta* Crantz) Terhadap Penurunan Kadar Asam Sianida (HCN)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata-Gowa November 2017

Penyusun

Nur Ilma Usman
NIM: 60500113012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Penentuan Konsentrasi Optimum Natrium Klorida (NaCl) dan Waktu Optimum Perebusan Umbi dan Daun Singkong Pahit (*Manihot Esculenta Crantz*) Terhadap Penurunan Kadar Asam Sianida (HCN)"** yang disusun oleh **Nur Ilma Usman, NIM: 60500113012** mahasiswa jurusan kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 27 November 2017 bertepatan 8 Rabi'ul-Awwal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 27 November 2017
8 Rabi'ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M. HI	(.....)
Sekretaris	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Aan Parhani, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Firnanelty, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penentuan Konsentrasi Optimum Natrium Klorida (NaCl) dan Waktu Optimum Perebusan Pada Umbi dan Daun Singkong Pahit (*Manihot Esculenta Crantz*) Terhadap Penurunan Kadar Asam Sianida (HCN)”, dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban tertulis untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. Usman Tjokke, S.Ag dan Almarhuma ibunda Muliana Haleda terima kasih untuk nasehat, motivasi serta dukungan yang selalu membangkitkan semangat untuk ananda tercinta. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan menjaga mereka, terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Musafir Pababbari M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph. D. Selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus dosen penguji I

4. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si, dan Firnelty, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan bantuan serta saran selama proses pengajuan waktu dan memberikan bantuan serta saran selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan skripsi ini.
6. Bapak H. Asri Saleh, S.T.,M.Si dan Bapak Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Musyawirah Baharuddin, S.Pdi selaku Staf Jurusan Kimia dan para Laboran Jurusan Kimia, kak Awaluddin Ip, S. Si., M.Si. kak Ahmad Yani, S.Si. kak Andi Nurahma, S.Si. kak. Fitriia Aziz, S.Si., S.Pd. kak Nuraini, S.Si dan terkhusus kak Ismawanti, S.Si. terimah kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
11. Teman seperjuangan angkatan 2013 dan KKN yang selalu memberikan motivasi selama penelitian dan rekan penelitian sekaligus saudara saya (Nur Ilmi Usman) yang senantiasa menemani dari awal hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Akhir kata Penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Amin ya Rabbal Alamin

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Makassar, November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Singkong (<i>Manihot Esculenta</i> Crantz).....	7
B. Tinjauan Asam Sianida (HCN).....	11
C. Tinjauan Natrium Klorida (NaCl).....	16
D. Spektrofotometri UV-Vis.....	18
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	21
B. Alat Dan Bahan.....	21

C. Prosedur Kerja.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	2
A. Hasil Penelitian.....	26
B. Pembahasan.....	28
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	42-68
BIOGRAFI	



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Bagan Kerja.....	42
Lampiran 2: Skema Kerja.....	43
Lampiran 3: Perhitungan Pembuatan Pereaksi.....	48
Lampiran 4: Perhitungan Pembuatan Standar.....	50
Lampiran 5: Perhitungan Analisis Kadar Air	51
Lampiran 6: Perhitungan Analisis Kuantitatif.....	54
Lampiran 7: Dokumentasi Tahap Pengambilan Sampel.....	62
Lampiran 8: Dokumentasi Pembuatan Kertas Pikrat.....	63
Lampiran 9: Dokumentasi Analisis Kualitatif.....	64
Lampiran 10: Dokumentasi Analisis Kuantitatif.....	66
Lampiran 11: Dokumentasi Kadar Air.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Kandungan Unsur Gizi pada Umbi Singkong.....	9
Tabel 4.1. Analisis Kadar Air.....	26
Tabel 4.2. Hasil Uji Kualitatif Asam Sianida (HCN)	26
Tabel 4.3. Hasil Penentuan Kadar Awal HCN.....	27
Tabel 4.4 Hasil Penentuan Konsentrasi Optimum NaCl pada Umbi Singkong.....	27
Tabel 4.5. Hasil Penentuan Konsentrasi Optimum NaCl pada Daun Singkong.....	27
Tabel 4.6. Hasil Penentuan Waktu Optimum Perebusan pada Umbi singkong.....	28
Tabel 4.7. Hasil Penentuan Waktu Optimum Perebusan pada Daun Singkong.....	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Singkong (<i>Manihot Esculenta</i> Crantz).....	6
Gambar 4.1. Reaksi antara ion sianida dan H ₂ O.....	30
Gambar 4.2. Reaksi pembentukan Natrium Pikrosianat	33
Gambar 4.3. Hidrolisis linamarin menjadi asam sianida.....	34
Gambar 4.4. Reaksi antara HCN dan NaCl.....	35
Gambar 4.5. Kurva Penentuan konsentrasi optimum NaCl pada umbi dan daun	36
Gambar 4.6. Kurva Penentuan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun.....	38
Gambar 6.1. Hubungan Antara Absorbansi dan Konsentrasi Standar.....	56

ABSTRAK

Singkong atau ubi kayu (*Manihot Esculenta Crantz*) merupakan bahan pangan yang disukai masyarakat dengan berbagai macam olahannya dan dijadikan sebagai salah satu makanan pokok rakyat setelah beras, jagung dan sagu karena mengandung zat gizi seperti air, karbohidrat, protein dan mineral. Selain nilai gizi yang ada pada singkong terdapatnya racun yang dikenal hidrogen sianida atau HCN. Asam sianida dapat dikurangi kadarnya melalui proses pengolahan yang benar seperti perendaman dengan natrium klorida dan perebusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimum natrium klorida (NaCl) dan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun singkong terhadap penurunan kadar asam sianida. Analisis yang digunakan adalah secara kualitatif menggunakan metode kertas alkali pikrat dan secara kuantitatif dengan spektrofotometer UV-Vis. Hasil yang diperoleh yaitu secara analisis kualitatif positif mengandung asam sianida ditandai dengan warna merah bata pada kertas pikrat sedangkan analisis kuantitatif konsentrasi optimum natrium klorida pada umbi singkong pahit yaitu 8% dengan penurunan kadar asam sianida sebesar 80,90% dan konsentrasi optimum natrium klorida pada daun singkong pahit yaitu 8% dengan penurunan kadar asam sianida sebesar 79,63% sedangkan waktu optimum perebusan pada umbi singkong pahit yaitu 15 menit dengan penurunan kadar asam sianida 69,20% dan waktu optimum perebusan pada daun singkong pahit yaitu 15 menit dengan penurunan kadar asam sianida sebesar 65,64 %.

Kata kunci: Asam Sianida (HCN), perebusan, perendaman NaCl dan singkong

ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Cassava (*Manihot Esculenta* Crantz) is one of the food supplies which is familiar with the people. Cassava is one of the main food that can be processed in much variety after the rice, corn and sago palm. Cassava contains nutrients like water, carbohydrate, protein and mineral. Besides the nutrition, cassava also contains toxic which is known as cyanide hydrogen (HCN). Cyanide acid can be substrated through the process of submerging of chloride sodium and steaming. This research aims to know the optimum concentration of chloride sodium (NaCl) and the optimum time of the steaming of the tuber and leaves towards the low content of cyanide acid. The analysis used in this research was qualitative using alkali picric paper and quantitative using spectrophotometer UV-Vis. The findings showed that the quantitative analysis positively contained cyanide acid which can be seen from the picric paper that turned it to red color while, the optimum concentration of the quantitative analysis. Of the chloride sodium of the cassava was 8% with descending cyanide acid 80,90% and the optimum concentration of chloride sodium of the cassava leaves 8% in the descending cyanide acid 79,63%. While, the optimum time of the steaming of cassava tuber was 15 minutes with the descending of cyanide acid 69,20% and the optimum time of steaming of cassava leaves was 15 minutes with descending cyanide acid 65,64%.

Keywords: Cyanide acid (HCN), steaming, submerging NaCl and cassava

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang memiliki ragam tumbuhan hijau dan terkenal dengan hasil pertaniannya dari berbagai jenis bahan pangan. Salah satu bahan pangan yang memiliki sumber energi yaitu jenis umbi-umbian seperti singkong. Singkong merupakan bahan pangan yang sudah lama dikenal dan dibudidayakan oleh petani di wilayah Indonesia dan dijadikan sebagai komoditas pertanian yang memiliki manfaat dan berbagai macam fungsi.

Singkong (*Manihot esculenta* Crantz) dapat tumbuh diberbagai daerah tropis termasuk Indonesia. Banyak olahan pangan yang dapat dibuat dari singkong dan disukai oleh masyarakat. Indonesia singkong ada dua jenis varietas yaitu singkong manis dan singkong pahit yang dijadikan salah satu makanan pokok rakyat setelah beras, jagung dan sagu. Tanaman ini mengandung zat gizi seperti air, karbohidrat, protein dan mineral. Selain nilai gizi yang ada pada singkong manis maupun singkong pahit juga terdapat HCN (Purawisastra dan Heru, 2004: 41).

Racun yang ada pada singkong tidak terdapat dalam keadaan berdiri sendiri, melainkan terikat dalam suatu rangkaian yang disebut glukosida sianogenik, yang terdiri dari glukosa, aseton dan HCN. Asam sianida pada singkong memiliki kadar asam sianida dengan kadar rata-rata dalam singkong manis 0,04 %, sedangkan singkong pahit 0,05% bahkan >0,1%. Menurut FAO, singkong atau umbi-umbian dengan kadar HCN dibawah 0,05% masih aman untuk dikonsumsi manusia (Riyani dan tien, 2013: 50).

Asam sianida ini bila dikonsumsi pada jumlah besar akan mengakibatkan kepala pusing, mual, perut terasa perih, badan bergetar, pingsan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Telah dilaporkan beberapa keracunan dan kematian di beberapa negara termasuk Indonesia akibat mengonsumsi singkong. Singkong dengan kadar yang tinggi seperti singkong pahit dapat menjadi masalah bagi masyarakat yang mengkonsumsinya sehingga masyarakat menjadikan singkong pahit sebagai bahan makanan untuk pakan ternak atau dibuang saja. Padahal pada dasarnya singkong pahit dapat diturunkan kadar asam sianidanya dengan berbagai pengolahan yang benar yaitu salah satunya yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu proses pengolahan dengan cara perendaman larutan NaCl dan perebusan (Agustini, dkk., 2012: 9). Allah berfirman dalam QS. Abasa/80: 24.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤

Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya” (Kementerian Agama RI, 2016)

Dalam ayat ini diuraikan anugerah Allah kepada manusia dalam hidup ini yang berupa pangan, sekaligus mengisyaratkan bahwa itu merupakan dorongan untuk menyempurnakan tugas-tugasnya. Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan tugas-tugasnya secara sempurna, maka hendaklah manusia itu (melihat) ke makanannya memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan. Kata **يَنْظُرِ** (*yanzhur*) dapat berarti melihat dengan mata kepala bisa juga melihat dengan mata hati, yakni merenung/berfikir. Thahir Ibn Asyur memahami di sini dalam arti melihat dengan mata kepala karena ada

kata **إِلَى** (*ila/ke*) yang mengiringi kata tersebut. Tentu saja, melihat dengan pandangan mata harus dibarengi dengan upaya berfikir (Shihab, 2002: 84-85).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia harus memperhatikan makanannya. Manusia wajib meneliti asal-usul makanan yang diperoleh. Asal- usul yang dimaksud adalah dengan memperhatikan atau cara memperoleh makanan itu sendiri. Dari segi pandangan dan upaya berfikir bahwa tidak semua makanan baik untuk tubuh jika hal tersebut dikonsumsi. Sebagian makanan bahkan berbahaya bagi tubuh karena tidak menutup kemungkinan mengandung zat tertentu yang beracun. Zat beracun tersebut bisa saja ditemukan di makanan tersebut karena proses pengerjaan yang tidak benar. Salah satunya pada singkong. Singkong sangat populer dan salah satu tanaman yang memiliki kandungan gizi yang baik. Namun selain memiliki kadungan gizi juga terdapat zat glukosida sianogenik/ zat beracun di dalamnya. Jadi hal tersebut perlu diperhatikan sebelum dikonsumsi yaitu dengan memperhatikan proses pengolahan yang benar.

Pengolahan perendaman dengan proses penambahan garam dapur atau NaCl salah satu cara dalam mengurangi kadar asam sianida (HCN). Salah satu sifatnya, NaCl mampu melarutkan asam sianida. Selain itu sifat dari asam sianida yaitu mudah bereaksi dengan NaCl pada proses perendaman. Natrium klorida apabila bereaksi dengan asam sianida akan membentuk natrium sianida dan asam klorida. Sehingga molekul CN^- yang terikat dengan Na^+ akan ikut terbuang bersama air rendaman yang nantinya sangat berpengaruh dalam penurunan kadar HCN dalam singkong. Menurut penelitian Agustini dkk., (2012) bahwa hasil penelitian diperoleh waktu optimum dengan perendaman dengan air adalah selama 48 jam sedangkan kadar sianida dalam umbi kayu adalah 110,68 ppm sedangkan dalam kulit ubi kayu adalah 629,15 ppm sehingga masih belum mampu menurunkan kadar sianida karena tingginya kadar

sianida yang didapatkan. Maka dari itu peneliti menggunakan pengolahan yang berbeda yaitu menggunakan natrium klorida untuk menurunkan kadar asam sianida pada singkong. Selain itu penambahan NaCl jauh lebih baik dan lebih mudah diperoleh serta lebih ekonomis untuk digunakan oleh masyarakat umum dan tingkat penurunan yang diperoleh juga cukup tinggi.

Perebusan dapat mengurangi sifat sianogenik karena HCN mudah menguap dengan pemanasan dan larut dalam air. Pemanasan akan mempercepat proses penguapan, mempercepat dehidrasi dan pemecahan struktur sel, sehingga terjadi degradasi glikosida linamarin dalam singkong oleh enzim linamarase yang menghasilkan glukosa dan aseton sianohidrin kemudian melepaskan hidrogen sianida Yuningsih, (2009). Menurut penelitian Ardiyansari, (2012), bahwa jenis umbi-umbian dengan proses pemanasan yaitu dengan cara perebusan mampu menurunkan kadar asam sianida (HCN) sebesar 60-90%. Selain itu penelitian Karima, 2015 menggunakan proses pengolahan perebusan pada biji karet dapat menurunkan kadar asam sianida 98,26%. Maka dari itu peneliti menggunakan proses perebusan pada bagian daun dan umbi singkong pahit untuk mengurangi kadar asam sianida didalamnya dan seberapa besar tingkat penurunannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang penentuan konsentrasi optimum natrium klorida dan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN) dengan proses dianalisis secara kualitatif menggunakan metode alkalin pikrat dan kuantitatif menggunakan alat instrumen yaitu Spektrofotometer UV-Vis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa konsentrasi optimum NaCl pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN)?
2. Berapa waktu optimum perebusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan konsentrasi optimum NaCl pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN).
2. Untuk menentukan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida (HCN).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca bahwa salah satu racun alamiah jenis umbi-umbian yang mengandung asam sianida adalah singkong pahit baik bagian umbi maupun daunnya.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca tentang pengolahan yang benar dalam menurunkan kadar asam sianida yaitu salah satu caranya dengan penambahan garam dan dengan cara perebusan. Sehingga dapat meminimalkan terjadinya resiko keracunan akibat mengkonsumsi singkong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Singkong atau Ubi kayu (*Manihot Esculenta* Crantz)

Ketela pohon umumnya dikenal dengan nama singkong atau ubi kayu. Tanaman tersebut berasal dari benua Amerika tepatnya dari Brazil. Penyebarannya hampir seluruh dunia antara lain Afrika, Madagaskar, India dan Tiongkok. Tanaman tersebut masuk ke Indonesia pada tahun 1852 dan berkembang di negara-negara yang terkenal dengan wilayah pertaniannya (Purwono, 2009: 55).



Gambar 2.1. Singkong (*Manihot Esculenta* Crantz)

Singkong mempunyai banyak nama daerah yaitu ketela, keutila, ubi kayee (Aceh), ubi parancih (Minangkabau), ubi singkong (Jakarta), batata kayu (Manado), bistungkel (Ambon), huwi dangdeur, huwi jendral, kasapen, sampeu, ubi kayu (Sunda), bolet, kasawe, kaspas, kaspes, katela budin, katela jendral, katela kaspes, katela mantri, katela marikan, katela menyong, katela pounng, katela prasman, katela sabekong, katela sarmunah, katela tapah, katela cengkol, tela pohung (Jawa), blandong, manggala menyok, puhung, sabhrang balandha, sawe, sawi, tela balandha, tengsang (Madura), kesawi, ketela kayu, sabrang sawi (Bali), kasubi (Gorontalo), lame kayu (Makassar), lame aju (Bugis), kasibi (Ternate, Tidore) (Purwono, 2009: 57).

Menurut Kurniawan (2010: 17), Taksonomi tanaman singkong sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Sub divisio : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Euphorbiales
Famili : Euphorbiaceae
Sub Famili : Manihotae
Genus : Manihot
Species : *Manihot esculenta* Crantz

Menurut Puspitaningrum (2013: 16), Morfologi tanaman singkong adalah sebagai berikut:

1. Susunan daun berurat membentuk jari-jari dengan 5 sampai 9 helai
2. Batang tanaman ini berkayu mempunyai ruas-ruas dengan tinggi bisa mencapai lebih dari 3 meter. Saat masih muda biasanya warna batang tanaman yang toleran terhadap kekeringan ini bewarna hijau, sudah tua warnanya berubah menjadi keputih-putihan, kelabu atau hijau kelabu. Batang tanaman ini berlubang dan isinya dengan empulur bewarna putih, lunak dengan struktur yang menyerupai gabus.
3. Buah tanaman ini atau lebih tepatnya umbi, pada awalnya adalah akar yang menggelembung karena mempunyai kegunaan sebagai tempat penampung makanan cadangan, bentuk umbi biasanya bulat memanjang yang terdiri kulit luar tipis (bewarna coklat), kulit dalam yang agak tebal bewarna keputih

putihan dan dagingnya yang bewarna putih atau kekuning-kuningan tergantung dari varietas

Singkong berbentuk seperti silinder yang ujungnya mengecil dengan diameter rata-rata 2-5 cm dan panjang sekitar 20-30 cm. singkong biasanya diperdagangkan dalam bentuk masih berkulit. Umbinya mempunyai kulit terdiri dari 2 lapis yaitu kulit luar dan kulit dalam. Daging umbi berwarna putih atau kuning. Di bagian tengah daging umbi terdapat suatu jaringan yang tersusun atas serat. Antara kulit daging dengan umbi terdapat lapisan kambium. Singkong segar banyak mengandung air dan pati (Muchtadi dan Sugiyono, 1992: 38).

Singkong menghasilkan umbi setelah tanaman berumur 6 bulan. Setelah tanaman berumur 12 bulan dapat menghasilkan umbi basah sampai 30 ton. Komponen fisik ubi kayu terdiri dari kulit luar dan kulit dalam. Kemudian diikuti oleh daging ubi kayu yang terdiri dari lapisan kambium dan daging umbi. Warna daging umbi ubi kayu putih, kuning atau gading dan umbi tersebut ada yang manis dan pahit. Jenis tanaman ini kaya akan karbohidrat dan merupakan makanan utama di daerah di Indonesia (Purawisastra dan Heru, 2004: 17).

Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan pengganti beras/bahan baku industri pangan maupun industri non pangan. Tanaman umbi-umbian umumnya ditanam dilahan kering. Khususnya ubi kayu di budidayakan dalam skala luas. Di Indonesia luas panen ubi kayu pada tahun 1999 mencapai 1,34 juta hektar dan produksi ubi kayu sebesar 16,3 juta ton (Suismono, 1992: 27).

Singkong lebih baik dipanen pada saat kadar air mencapai 50-80 persen. Kadar air tersebut kurang menguntungkan, karena umbi yang didapat banyak mengandung air dan kadar patinya rendah. Pemanenan di bawah kadar air 50 persen

menghasilkan umbi yang keras karena umbi menjadi berkayu sehingga banyak mengandung serat (Muchtadi dan Sugiyono,1992: 39).

Waktu yang baik untuk memanen hasil ubi kayu sukar ditentukan dengan pasti. Faktor-faktor yang mempengaruhi saat panen adalah varietas, iklim, jarak tanam dan kesuburan tanah. Lebih lama ubi kayu itu ditinggalkan tumbuh, lebih membesar dan memanjang pertumbuhannya, yang berarti lebih besar hasilnya, tetapi pada suatu saat kadar patinya akan menurun. Pada umumnya pemanenan ubi kayu pada saat berumur 10-12 bulan (Sosrosoedirdjo dan Samad, 1990: 58)

Kandungan gizi yang terdapat dalam singkong sudah dikenal sejak dulu. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun memiliki protein yang sedikit. Umbi singkong mengandung glukosa sehingga singkong dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan baik basah maupun kering. Dan salah satunya telah dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain tape singkong, kue kerupuk singkong dan lain-lain. Sifat singkong yang mudah dan mampu berproduksi tinggi sekalipun ditanam di tanah kritis, singkong dapat berperan sebagai sumber bahan pangan yang murah dan mudah didapat terutama oleh penduduk pedesaan dan daerah pengunungan terpencil (Askurrahman, 2010: 11).

Daun singkong mempunyai susunan berurat menjari dengan jumlah 5-9 helai. Dan memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Tiap 100 gram pucuk ubi mengandung 73 kal kalori, 6,8 gram protein, 1,2 gram lemak, 13 gram karbohidrat. 165 mg kalsium, 54 mg fosfor, 2 mg zat besi, 0,12 mg vitamin B1, 275 mg vitamin C, 77,2 gram air (Kurnia dan Fatmi, 2012: 117).

Menurut Arisman (2009: 153), kandungan unsur gizi pada umbi singkong sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Kandungan Unsur Gizi pada Umbi Singkong

No.	Nama Unsur	Kadar Gizi/100 gram Bahan
1.	Energi (kal)	146
2.	Karbohidrat (g)	34,7
3.	Protein (g)	1,2
4.	Lemak (g)	0,3
5.	Mineral (g)	1,3
6.	Zat besi (mg)	0,0007
7.	Kalsium (mg)	0,003
8.	Fosfor (mg)	0,004
9.	Vitamin C (mg)	0,003
10.	Vitamin B (mg)	0,006
11.	Air (g)	62,5

Manfaat singkong begitu banyak namun singkong dapat pula menimbulkan kerugian karena mengandung glukosida sianogenik yang beracun seperti lotaustralin dan linamarin. Berdasarkan masa tumbuhnya singkong dibagi menjadi dua kelompok yaitu sedikit mengandung sianida dan jenis yang banyak mengandung sianida (Arisman, 2009: 154).

Menurut Arisman (2009: 153), berdasarkan kadar HCN dalam umbi, singkong dibedakan menjadi empat kelompok adalah sebagai berikut:

1. Singkong Manis

Singkong manis banyak dikonsumsi secara langsung atau digunakan untuk jajanan tradisional. Rasa manis singkong disebabkan oleh kadar asam sianida yang sangat rendah hanya sebesar 0,04%.

2. Singkong Pahit Agak Beracun

Singkong jenis ini memiliki kadar HCN antara 0,05%

3. Singkong Pahit Beracun

Singkong beracun memiliki kadar HCN antara 0,08-0,10%

4. Singkong Pahit Sangat Beracun

Singkong termasuk kategori sangat beracun apabila kadar HCN lebih dari 0,1%

B. Tinjauan Asam Sianida (HCN)

Singkong mengandung komponen racun potensial yang disebut *cyanogenic glycosides*, terutama linamarin dan sejumlah kecil lotaustralin (*ethyl linamarin*). Sianogen merupakan senyawa racun, karena senyawa tersebut melepaskan HCN dari hidrolisis *enzymatic*. HCN secara alami terdapat sebagai glikosida sinogenik. Glikosida sinogenik yang terdapat pada singkong disebut Linamarin dengan nama kimia glikosida aseton sianohidrin (Winarno, 2002:11).

Senyawa glikosida sinogenik pada ubi kayu adalah linamarin dan lotaustralin dengan perbandingan 93 % dan 7% terhadap total kandungan senyawa sianogenik (Askurrahman, 2010: 12). Asam Sianida dapat pula disebut dengan nama hidrogen sianida. Hidrogen sianida merupakan salah satu senyawa dari berbagai contoh

senyawa sianida lainnya. Sianida dihasilkan oleh beberapa bakteri, jamur dan ganggang. Contoh dari senyawa sianida lainnya adalah Sodium sianida (NaCN) dan Potasium Sianida (KCN). Sianida juga dapat ditemukan di sejumlah makanan dan secara alami terdapat di berbagai tumbuhan. Hidrogen sianida juga dapat disebut dengan formonitrile, sedangkan dalam bentuk cairan disebut dengan nama asam prussit dan asam hidrosianida (Muchtadi, 1989).

Menurut Suciati (2012: 16), asam sianida (HCN) memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Merupakan jenis racun yang sangat kuat sehingga bila dimakan dapat menyebabkan keracunan
2. Mudah menguap bila dipanaskan
3. Mudah larut dalam air, alkohol, aseton, dan klorofom
4. Mempunyai titik leleh 54-55°C
5. Massa atom relatif 27 sma
6. Mudah menguap bereaksi dengan natrium klorida (NaCl)
7. Sedikit larut dalam pelarut eter dan benzene
8. Mengandung karbon (C) 75 %, Hidrogen (H) 8,65 %, dan Oksigen (O) 14.4%

Konsentrasi yang melebihi batas tersebut merupakan racun yang berbahaya yang dapat terserap ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan atau absorpsi kulit, selanjutnya menyerang saluran pernapasan. Konsentrasi HCN sekitar 100- 200 ppm selama 30 – 80 menit dapat menyebabkan kematian dengan tanda-tanda sakit kepala, pusing, kehilangan keseimbangan, lemah dan mual. Reaksi detoksifikasi sianida dalam tubuh akan menghasilkan tiosianat (SCN). Karena itu, seseorang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung sianida akan mengalami peningkatan kadar tiosianat dalam tubuhnya. Padahal, tiosianat dalam tubuh mempunyai sifat

menurunkan jumlah yodium dalam tubuh. Kekurangan yodium dalam tubuh dapat menyebabkan kritinisme atau kekerdilan dan penyakit gondok (Kurniawan, 2010: 107).

Senyawa hidrogen sianida dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan kematian. Dosis yang mematikan yaitu sekitar 0,5 – 3,5 mg HCN/kg berat badan. Hidrogen sianida dikeluarkan bila komoditi tersebut dihancurkan, dikunyah, mengalami pengirisan atau rusak. Bila dicerna, hidrogen sianida sangat cepat terserap oleh alat pencernaan masuk ke dalam saluran darah (Winarno, 2002).

Linamarin merupakan glicosida yang kebanyakan terdapat dalam biji line, kacang-kacangan dan polong serta singkong. Enzim yang membebaskan HCN disini adalah Linase. Konsentrasi sianida dalam singkong segar menurun mulai dari bagian kulit ke daging umbi bagian dalam. Konsentrasi linamarin berbeda antar bagian umbi, antar umbi pada varietas yang sama. Singkong segar mengandung enzim linamarase yang menghidrolisa linamarin dan lotaustralin menjadi hidrosinitril dan glukosa. Ketika sel ubi kayu rusak, maka enzim dan substrat menjadi kontak dengan udara dan dibebaskan HCN (Suismono, 1992: 29).

Kadar HCN pada umbi selain ditentukan oleh varietas, juga dipengaruhi oleh keadaan tanah, iklim, umur, seta cara bertanam dan pemupukan (Murdiana dan Sukati, 2001: 33). Hidrolisis linamarin oleh enzim β glukosidase akan menghasilkan glukosa dan aseton sianohidrin, selanjutnya oleh enzim hidrosinitril liase, aseton sianohidrin akan terhidrolisis membebaskan HCN dan aseton (Feliana, 2014: 2).

Proses penghilangan (detoksifikasi) sianida dapat dipercepat oleh perendaman dalam air, penghancuran, pemotongan, pemanasan dan fermentasi. Dengan pemanasan, enzim yang bertanggungjawab pada pemecahan glikosida

sianogenik menjadi inaktif sehingga hidrogen sianida tidak dapat terbentuk (Winarno, 2002).

Asam sianida pada singkong terbentuk secara enzimatik dari dua prekursor (bakal racun) yaitu linamarin dan mertil linamarin. Bila umbi mengalami kerusakan mekanis (terpotong atau tergores) atau kehilangan integritas fisiologis seperti kerusakan pasca panen, kedua prekursor itu akan kontak dengan enzim linamarin dan oksigen dari udara yang merombaknya menjadi glukosa, aseton, dan asam sianida (Wahyuningsih dan Harlina, 2011:62). Jika kerusakan mekanis pada umbi tidak disertai perendaman dalam air, secara perlahan akan terbentuk HCN. Bila dibandingkan dengan kedua prekursornya, toksisitas HCN jauh lebih kuat. Selain itu, kedua senyawa prekursor tersebut bersifat sangat mudah larut dalam air dan tidak tahan pemanasan. Oleh karena itu, proses pencucian dalam air mengalir dan pemanasan yang cukup sangat ampuh untuk mencegah terbentuknya HCN yang beracun. Dengan demikian, sesungguhnya tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi produk pangan olahan singkong, asal diolah secara baik dan higienis (Karima, 2015: 40).

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2016).

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang

ada di dunia halal dimakan atau digunakan. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu yang diharamkan karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah dan haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Jadi tidak semua makanan yang halal otomatis baik karena dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Contoh adalah makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. yang diperintahkan oleh ayat diatas adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2002: 456-457).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan (menghalalkan) seluruh manusia agar memakan apa saja yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri yang tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Segala apa saja yang akan dikonsumsi sudahlah mendapatkan standar kelayakan dari Allah swt. Standar itu adalah Halal dan Baik. dan ayat yang berkaitan selanjutnya adalah QS. Al-Baqarah/2: 172.

Pengolahan ubi kayu pahit mendapatkan perlakuan pengeringan, perendaman sebelum dimasak atau fermentasi selama beberapa hari. Dengan perlakuan tersebut, linamarin banyak yang rusak dan kadar HCN turun hingga tinggal 10 sampai 40 mg/kg ubi kayu kupas. HCN mudah hilang dengan perebusan. Dengan pemanasan enzim pemecah linamarin menjadi inaktif sehingga HCN tidak terbentuk (Winarno, 2002). Perendaman singkong selama satu hari akan menurunkan kadar HCN sebesar 45 % dari kadar HCN singkong segar jika dilanjutkan sampai 4 hari kadar HCN turun 90 %, jika dilanjutkan sampai lima hari, kadar HCN akan hilang 100% tetapi ubinya akan busuk (Kurniawan, 2010).

Asam sianida mempunyai titik didih 26,5 C, sangat larut dalam air dan alkohol, tetapi tidak larut dalam ether dan khloroform. Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki asam sianida tersebut, maka langkah-langkah pengolahan untuk mengeliminasi HCN yang terikat pada senyawa glikosida pada prinsipnya adalah mengusahakan terjadinya hidrolisis yang membebaskan HCN dan selanjutnya menghilangkan HCN pada bahan (Ardiyansari, 2012: 38).

Langkah pertama dapat dihilangkan dengan cara pengirisan dan perendaman akan membantu masuknya air ke dalam sel-sel tempat senyawa racun berada, sehingga jaringan sel menjadi terbuka dan granula pati menjadi labil (Suyitno, 1990:92). Perendaman yang semakin lama juga mengakibatkan lunaknya struktur dalam bahan sehingga air lebih mudah masuk ke dalam struktur selnya sehingga sianida yang ada dalam sel akan keluar dan larut dalam air (Arianto, dkk, 2014:188). Semakin kecil ukuran partikel, presentase kenaikan kadar air semakin tinggi. Pada ukuran partikel yang lebih kecil jarak yang harus ditempuh oleh O₂ serta enzim untuk mencapai nutrient di bagian dalam partikel lebih pendek. Reaksi pemecahan lebih cepat terjadi dan lebih banyak media yang terpecahkan (Rahayuningsityas, 1995:23).

Perebusan adalah proses pemasakan dengan menggunakan suhu panas dan termasuk dalam kategori pemanasan basah karena menggunakan media air. Pemanasan dalam air merupakan cara pengolahan yang dapat menurunkan sifat sianogenik karena HCN dapat menguap dengan pemanasan dan HCN larut dengan adanya air. Melalui pemanasan enzim yang bertanggung jawab terhadap pemecahan linamarin menjadi inaktif dan hidrogen sianida tidak terbentuk. Umbi-umbian proses rebus atau diiris tipis lalu direbus mengurangi kadar sianida 60-90% sedangkan proses kukus atau diiris tipis lalu dikukus mengurangi sianidanya 30-60% (Ardiansari, 2012: 20).

Pemanasan dalam air mendidih bisa mengakibatkan enzim linamarase dan glukosidase tidak aktif dan pembentukan asam sianida pun menjadi terputus. Sehingga sianida tidak akan terbentuk karena enzim-enzim tersebut tidak aktif (Aman, 2010:16). Semakin lama singkong direbus maka semakin lama singkong berinteraksi dengan air panas. Air yang panas dengan mudah dapat melarutkan dan menguapkan HCN yang terkandung dalam singkong. Pemanasan dan air merupakan cara pengolahan yang dapat menurunkan sifat sianogenik karena HCN dapat menguap dengan pemanasan dan HCN juga luruh dengan adanya air. Sehingga lama waktu perebusan akan menyisakan residu sianida yang semakin rendah (Karima, 2015:42).

Pemanasan dapat mengurangi kadar sianida dan pemanasan memiliki difungsi dalam menginaktifkan enzim dan menguapkan HCN yang terbentuk karena senyawa ini sifat volatil. Pemanasan akan menyebabkan enzim β -glukosidase yang berada dalam umbi mengalami inaktif sehingga rantai enzimatik dapat diputus. Cara menurunkan kandungan asam sianida daun singkong dengan mengeringkan, melayukan atau menyimpan dalam waktu yang lama menjemur selama 72 jam kandungan sianida yang tersisa tinggal 12,8%, merendam daun singkong yang telah di iris-iris kemudian dicuci dengan air mengalir atau dengan cara merebusnya karena sifat asam sianida yang mudah larut dalam air, menambah waktu perebusan akan menurunkan kandungan sianida sampai 70 -80%, penambahan unsur sulfur seperti Cystine, methionine dan tiosulfat dapat mengurangi pengaruh racun sianida. Dengan bantuan enzim rhodanase sianida yang terbentuk akan dikeluarkan melalui urin (Askar, 1996: 23).

C. Natrium Klorida (NaCl)

Natrium klorida merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam pengolahan makanan dan bahan baku dalam berbagai industri kimia. Garam dapur (NaCl) adalah bahan berupa padatan putih, memiliki bentuk kristal kubus yang transparan, tidak dapat terbakar serta mempunyai titik leleh 801°C. Garam dapur merupakan senyawa yang tersusun dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Apabila unsur ini direaksikan, maka akan terbentuk NaCl dan H₂O. Hasil dari bahan bila disatukan akan membentuk suatu larutan yang disebut larutan garam.

Penurunan kadar asam sianida dapat dilakukan dengan proses pengolahan dengan cara perendaman NaCl. NaCl mampu melarutkan HCN, dimana salah satu sifat dari HCN mudah bereaksi dengan NaCl pada proses perendaman dengan reaksi sebagai berikut:



Natrium klorida apabila bereaksi dengan asam sianida akan membentuk natrium sianida dan asam klorida. Sehingga molekul CN yang terikat dengan Na akan ikut terbuang bersama air rendaman yang nantinya sangat berpengaruh dalam penurunan kadar HCN (Arianto, dkk, 2014: 190). Perendaman dengan NaCl dapat merombak atau menguraikan HCN dari ikatan glikosida sianogenik, sehingga HCN banyak yang larut dan terbawa oleh air. Pada saat perendaman juga terjadi proses difusi dan osmosis. Semakin lama proses perendaman dengan NaCl maka akan menurunkan kandungan HCN (Winarno,2002).

D. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang berdasarkan atas nilai absorbansi suatu zat terhadap radiasi sinar elektromagnetik. Jika cahaya UV-Vis disentuhkan pada suatu senyawa atau sampel, maka cahaya tersebut akan terserap oleh molekul dengan tingkat energi yang spesifik. Sinar yang diserap tersebut untuk menaikkan elektron ikatan ke tingkat energi eksitasi. Dengan kata lain, prinsip dari spektrofotometer yaitu apabila cahayanya monokromatik melewati suatu media atau sampel maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian dipantulkan dan sebagian lagi akan dipancarkan (Sitorus, 2009: 9)



Gambar 2.2. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri UV-Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur serapan yang dihasilkan dari interaksi kimia antara radiasi elektromagnetik dengan molekul atau atom dari suatu zat kimia pada daerah UV-Vis. Sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrument spektrofotometer (Fatoni, 2010: 6)

Prinsip kerja alat spektrofotometer UV-Vis yaitu suatu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator. Monokromator menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya tersebut menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk pengukuran suatu zat tertentu setiap gugus kromofor mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda. Monokromator cahaya/energi radiasi diteruskan dan diserap oleh suatu larutan yang akan diperiksa di dalam kuvet.

Jumlah cahaya yang diserap oleh larutan akan menghasilkan signal elektrik pada detektor, yang mana signal elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Besarnya signal elektrik yang dialirkan ke pencatat dapat dilihat sebagai angka (Triyati, 1985: 47).

Kegunaan Spektrofotometer UV-Vis dalam analisis kimia adalah untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kelemahan Spektrofotometer Ultra-violet dan Sinar Tampak dalam analisis kualitatif adalah kurang teliti. Hal tersebut disebabkan karena pita-pita absorpsi yang diperoleh melebar, dengan demikian kurang khusus atau terbatas pemakaiannya. Berdasarkan spektrum serapan Ultra-violet dan Sinar Tampak, dapat dipakai untuk mengetahui ada atau tidak adanya gugus fungsional tertentu dalam senyawa organik. Alat ini dapat juga dipergunakan untuk menentukan jumlah kecil senyawa berkadar rendah yang dapat mengabsorpsi dalam media non absorben (Rusli, 2009: 16).

Menurut Triyati (1985: 46), pemakaian Spektrofotometer Ultra-violet dan Sinar Tampak dalam analisis kuantitatif mempunyai beberapa keuntungan:

1. Dapat dipergunakan untuk banyak zat organik dan anorganik. Ada kalanya beberapa zat harus diubah dulu menjadi senyawa berwarna sebelum dianalisa.
2. Selektif. Pemilihan kondisi yang tepat dapat dicari panjang gelombang untuk zat yang dicari.
3. Mempunyai ketelitian yang tinggi, dengan kesalahan relatif sebesar 1% -3%, tetapi kesalahan ini dapat diperkecil lagi.
4. Dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Gabungan dari hukum Lambert-Beer menurunkan secara empiris hubungan antara intensitas cahaya yang ditransmisikan dengan tebalnya larutan dan hubungan antara intensitas tadi dengan konsentrasi zat.

Rumus :

$$A = \log (I_0/I_t) = \epsilon \cdot b \cdot c = a \cdot b \cdot c$$

Dimana :

A = Serapan

I_0 = Intensitas sinar yang datang

I_t = Intensitas sinar yang diteruskan

ϵ = Absorptivitas molekuler ($L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$) = a x BM

a = Daya serap ($L \cdot g^{-1} \cdot cm^{-1}$)

b = Tebal larutan / kuvet (cm)

c = Konsentrasi zat (g/L, mg/mL)

(Rusli, 2009: 17).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-September 2017 di Laboratorium Analitik dan Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

Alat yang di gunakan pada penelitian ini adalah Spektrofotometer UV-Vis Varian Carry 50 Conc, oven, tanur, lemari asam, timbangan digital, desikator, *hotplate*, labu takar 100 mL dan 50 mL, gelas kimia 500 ml dan 250 mL, 100 mL, gelas ukur 100 mL dan 50 mL, erlenmeyer 300 mL, 250 mL dan 100 mL, termometer 110°C, pipet skala 25 mL, pipet tetes 1 mL, 2 mL, alat pemotong (pisau), spatula, batang pengaduk, stopwatch, cawan porselin, lumpang dan alu, pinset dan gunting.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah asam pikrat ($C_6H_3(NO_2)_3$) 1%, asam tartrat ($C_4H_6O_6$) 10%, aluminium foil, aquades (H_2O), asam klorida (HCl) 1 N, kalium sianida (KCN), kertas whatman no.42, natrium klorida (NaCl), natrium karbonat (Na_2CO_3) 8%, kasa, kapas, plastik, benang dan sampel umbi dan daun singkong pahit.

C. Prosedur Penelitian

1. Pengambilan Sampel Umbi Singkong

Singkong yang digunakan adalah jenis singkong pahit. Pengambilan umbi singkong diambil dari lahan perkebunan warga di Dusun Bilaya Desa Pallantikan Kecamatan Patalassang dengan luas perkebunan kurang lebih 1 hektar. Umbi singkong diambil dengan cara dicabut lalu dipisahkan antara batang dan umbinya menggunakan alat pemotong. Kemudian umbi dimasukkan kedalam kantong plastik dan siap dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

2. Pengambilan Sampel Daun Singkong

Singkong yang digunakan adalah jenis singkong pahit. Pengambilan daun singkong diambil dari lahan perkebunan warga di Dusun Bilaya Desa Pallantikan Kecamatan Patalassang dengan luas perkebunan kurang lebih 1 hektar. Selanjutnya daun singkong dipetik pada bagian daun muda. Kemudian daun dimasukkan kedalam kantong plastik dan siap dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

3. Analisis Kadar Air

Analisis kadar air pada singkong pahit yaitu umbi dan daun dapat dilakukan dengan cara, cawan kosong yang akan digunakan dikeringkan dalam oven selama 15 menit pada suhu 105°C, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang untuk mengetahui bobot kosong cawan. Selanjutnya masing-masing umbi dan daun yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram lalu dimasukkan kedalam cawan kemudian dioven selama 2 jam pada suhu 105°C. Cawan kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang kembali. Setelah ditimbang, cawan di oven kembali hingga diperoleh bobot konstan. Kemudian hitung presentase kadar air, pengerjaan dilakukan secara duplo (Sudarmadji, 1997).

4. Pembuatan Kertas Pikrat

Pembuatan kertas pikrat dapat dilakukan dengan cara kertas Whatman No.42 digunting dengan ukuran (1×6 cm) selanjutnya direndam dalam asam pikrat ($C_6H_3(NO_2)_3$) 1% kemudian dikeringkan selama 30 menit selanjutnya direndam kembali dalam larutan natrium karbonat (Na_2CO_3) 8% kemudian dikeringkan kembali (Nofita dan Agustina, 2016).

5. Analisis Kualitatif HCN dengan Metode Kertas Pikrat

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 20,000 gram, kemudian dimasukkan dalam erlenmeyer 250 mL selanjutnya ditambahkan 50 mL H_2O , kemudian ditambahkan 10 mL larutan tartrat 10 % lalu direndam selama 2 jam selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup lalu dipanaskan dalam penangas air $50\text{ }^\circ\text{C}$ selama 30 menit. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi pada kertas pikrat. Apabila warna kuning pada kertas berubah menjadi merah bata berarti dalam sampel terdapat asam sianida (HCN). Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit (Nofita dan Agustina, 2016).

6. Penentuan Kadar Awal HCN pada Umbi dan Daun Singkong Pahit

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram kemudian dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer 250 mL, Selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup. Pada bagian atasnya dibungkus dengan plastik lalu dibiarkan selama 48 jam pada suhu kamar. Kemudian setelah 48 jam kertas pikrat tersebut diangkat lalu dimasukkan kedalam gelas kimia kemudian ditambahkan 25 mL H_2O selanjutnya direndam selama 30 menit. Kemudian kertas pikrat yang telah direndam diangkat lalu air rendaman tersebut diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm. Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit (Agustini, 2012).

7. Penentuan Konsentrasi Optimum NaCl

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram kemudian dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer 250 mL, lalu ditambahkan NaCl dengan variasi konsentrasi (2%, 4% , 6%, 8%, 10% dan 12% b/v). Kemudian digoyangkan perlahan agar tercampur merata. Selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup. Pada bagian atasnya dibungkus dengan plastik lalu dibiarkan selama 48 jam pada suhu kamar kemudian kertas pikrat tersebut diangkat lalu dimasukkan kedalam gelas kimia kemudian ditambahkan 25 mL H₂O selanjutnya direndam selama 30 menit. Kemudian kertas pikrat yang telah direndam diangkat lalu air rendaman tersebut diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm. Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit, pengerjaan dilakukan secara duplo (Agustini, 2012).

8. Penentuan Waktu Optimum Perebusan

Sampel umbi singkong pahit yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1,0000 gram kemudian dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer 250 mL, lalu ditambahkan 100 mL H₂O Selanjutnya digantungkan kertas pikrat kemudian ditutup. Pada bagian atasnya dibungkus dengan plastik kemudian direbus pada suhu 50-60°C selama (5, 10, 15, 20 menit). Kemudian kertas pikrat tersebut diangkat lalu dimasukkan kedalam gelas kimia kemudian ditambahkan 25 mL H₂O selanjutnya direndam selama 30 menit. Kemudian kertas pikrat yang telah direndam diangkat lalu air rendaman tersebut diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm. Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit, pengerjaan dilakukan secara duplo (Agustini, 2012).

9. Penentuan Kurva Kalibrasi Larutan Standar Asam Sianida

a. Pembuatan larutan baku KCN konsentrasi 100 ppm

KCN ditimbang 0,2409 gram kedalam gelas kimia 100 mL, lalu dilarutkan dengan H₂O secukupnya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam labu takar 1000 mL lalu diencerkan dengan H₂O hingga tanda batas dan dihomogenkan.

b. Pembuatan deret standar 10,20,30,40,50 ppm

KCN konsentrasi 100 ppm dipipet berturut turut sebanyak 10 mL, 20 mL, 30 mL, 40 mL dan 50 mL. Lalu dimasukkan kedalam labu takar 100 mL lalu diencerkan dengan H₂O hingga tanda batas dan dihomogenkan. Masing masing deret ditambahkan 25 mL HCl 1 N kemudian dikerjakan sesuai perlakuan yang sama dengan sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Kadar Air

Penentuan kadar air dapat diperoleh data pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Analisis Kadar Air

No.	Sampel	Kadar Air (%)
1.	Umbi Singkong Pahit	66,19%
2.	Daun Singkong Pahit	74,38%

2. Hasil Uji Kualitatif HCN dengan Metode Kertas Pikrat

Uji Kualitatif asam sianida dengan menggunakan metode kertas pikrat untuk mengetahui ada atau tidaknya asam sianida pada umbi dan daun singkong pahit yang ditandai hasil positif perubahan warna kertas pikrat berubah dari warna kuning menjadi merah bata. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji Kualitatif HCN

No.	Sampel	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
1.	Umbi Singkong Pahit	Merah Bata	(+) Positif
2.	Daun Singkong Pahit	Merah Bata	(+) Positif

3. Hasil Penentuan Kadar Awal Asam Sianida pada Umbi dan Daun Singkong Pahit

Penentuan kadar awal asam sianida dapat diperoleh data pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil Penentuan Kadar Awal HCN

No.	Sampel	Kadar HCN (%)
1.	Umbi Singkong Pahit	0,1351
2.	Daun Singkong Pahit	0,1429

4. Penentuan Konsentrasi Optimum NaCl

Penentuan konsentrasi optimum natrium klorida untuk menentukan konsentrasi optimum natrium klorida pada sampel umbi dan daun singkong pahit maka dilakukan pengukuran absorbansi pada berbagai variasi konsentrasi natrium klorida dapat diperoleh data pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Penentuan Konsentrasi Optimum NaCl pada Umbi Singkong Pahit

No.	Konsentrasi NaCl	Kadar Asam Sianida (%)	Penurunan Kadar Asam Sianida (%)
1.	2%	0,0387	71,35
2.	4%	0,0308	77,20
3.	6%	0,0295	78,16
4.	8%	0,0258	80,90
5.	10%	0,0325	75,94
6.	12%	0,0345	74,46

Tabel 4.5. Penentuan Konsentrasi Optimum NaCl pada Daun Singkong Pahit

No.	Konsentrasi NaCl	Kadar		Penurunan
		Asam Sianida (%)	Kadar Asam Sianida (%)	
1.	2%	0,1091		23,65
2.	4%	0,0725		49,26
3.	6%	0,0666		53,39
4.	8%	0,0291		79,63
5.	10%	0,0329		76,97
6.	12%	0,0462		67,66

5. Penentuan Waktu Optimum Perebusan

Penentuan waktu optimum perebusan untuk menentukan waktu optimum perebusan pada sampel umbi dan daun singkong pahit maka dilakukan pengukuran absorbansi pada berbagai variasi waktu perebusan dapat diperoleh data pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.6. Penentuan Waktu Optimum Perebusan (50-60°C) pada Umbi Singkong Pahit

No.	Waktu (Menit)	Kadar		Penurunan
		Asam Sianida (%)	Kadar Asam Sianida (%)	
1.	5	0,1258		6,8
2.	10	0,0929		31,23
3.	15	0,0416		69,20
4.	20	0,0891		34,04

Tabel 4.7. Penentuan Waktu Optimum Perebusan (50-60°C) pada Daun Singkong Pahit

No.	Waktu (Menit)	Kadar	Penurunan
		Asam Sianida (%)	Kadar Asam Sianida (%)
1	5	0,1291	9,65
2.	10	0,0883	38,20
3.	15	0,0491	65,64
4.	20	0,0754	47,23

B. Pembahasan

1. Hasil Uji Kadar Air

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan rasa bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Makin rendah kadar air, makin lambat pertumbuhan mikroorganisme sedangkan bahan pangan tersebut dapat tahan lama. Sebaliknya makin tinggi kadar air makin cepat mikroorganisme berkembang biak, sehingga proses pembusukan akan berlangsung lebih cepat.

Analisis kadar air pada sampel umbi dan daun singkong pahit bertujuan untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam suatu sampel. Analisis tersebut dilakukan dengan metode pengeringan pada suhu 105°C dengan pemanasan selama 2 jam. Prinsip metode ini adalah menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan

pemanasan. Kemudian menimbang bahan sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan.

Hasil Analisis kadar air yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan yaitu pada umbi singkong pahit 66,19% dan daun umbi singkong pahit sebesar 74,38%, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dari kadar air dalam komposisi umbi singkong 60% menurut (Direktorat Gizi Depkes RI, 1992) dan daun singkong 73,67 % menurut (Direktorat Gizi Depkes RI, 1981) Artinya, hasil yang peroleh tidak sesuai dengan teori. Hal tersebut disebabkan pada proses pengovenan dan udara sekitar.

2. Hasil Analisis Kualitatif Asam Sianida (HCN) pada Umbi dan Daun Singkong Pahit dengan Metode Kertas Pikrat

Pada penelitian ini dilakukan analisis kualitatif asam sianida pada singkong pahit yaitu umbi dan daunnya dengan metode kertas pikrat. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya asam sianida pada sampel tersebut. Prinsip pengujian ini adalah asam sianida larut dalam air, dalam suasana panas asam sianida akan menguap, lalu uap asam sianida akan bereaksi dengan pikrat membentuk warnah merah bata.

Pengujian kualitatif asam sianida pada singkong pahit dapat di lihat dari perubahan warna kertas pikrat dari warna kuning menjadi warna merah bata. Pengujian dilakukan dengan cara sampel dihaluskan. Penghalusan pada sampel tersebut bertujuan mempercepat proses pencarian zat aktif selama proses maserasi atau memperluas permukaan sampel supaya zat sianida yang terkandung di dalamnya dapat keluar. Maserasi sampel yang bertujuan untuk melakukan pencarian zat aktif yang terdapat dalam sampel tersebut. Dimana cairan penyari (pelarut) yang digunakan berupa aquadest (H_2O). Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di


dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah. Sehingga zat glukosida yang mengandung asam sianida akan larut dalam cairan penyari. Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut



Penggunaan asam tartrat pada proses maserasi bertujuan untuk menghasilkan uap asam sianida. Uap asam sianida yang dihasilkan disebabkan oleh hidrogen dari asam tartrat yang bereaksi dengan ion CN^- yang terlarut dalam air sehingga dihasilkan uap asam sianida. Reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut:



Asam pikrat merupakan asam kuat yang bertindak sebagai pendonor proton sehingga melepaskan H^+ kemudian setelah kering dibasahi dengan natrium karbonat dimana ion karbonat dari natrium karbonat (Na_2CO_3) bereaksi dengan H^+ dari gugus OH^- dari asam pikrat membentuk natrium pikrat (alkali pikrat). Perendaman kertas saring dengan asam pikrat selanjutnya dibasahi dengan natrium karbonat menyebabkan kertas saring menjadi kuning. Proses pembuatan kertas pikrat ini bertujuan supaya uap HCN terperangkap didalam kertas pikrat sehingga uap HCN yang dihasilkan dapat mengubah kertas saring yang semula berwarna kuning menjadi merah bata. Kemudian dilakukan pemanasan selama 30 menit. Pemanasan ini bertujuan untuk menguapkan HCN sehingga HCN yang telah menguap ketika dipanaskan bereaksi dengan asam pikrat. Setelah 30 menit pemanasan, dilakukan hasil pengamatan pada kertas pikrat dan dihasilkan perubahan pada kertas pikrat yaitu perubahan dari warna kuning menjadi merah bata. Sehingga Reaksi yang terjadi secara keseluruhan adalah sebagai berikut:




Gambar 4.1. Reaksi pembentukan Natrium Pikrosianat

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel umbi dan daun singkong pahit yang diuji, positif mengandung asam sianida yang ditandai perubahan kertas pikrat dari warna kuning menjadi merah bata. Positif mengandung asam sianida yaitu ketika umbi dan daun singkong pahit mengeluarkan getah putih yang mengandung zat glikosida, dimana zat glikosida ini mengandung racun HCN artinya suatu ikatan organik yang dapat menghasilkan racun biru atau HCN yang bersifat toksik yang apabila singkong mengalami perlukaan, pengirisan dan rusak akan dihidrolisa oleh enzim linase menjadi HCN. Zat glikosida ini diberi nama Linamarin. Hal ini sudah sejalan dengan pernyataan Nofita dan Agustina Retnaningsih, 2016 bahwa hidrogen sianida dikeluarkan apabila dihancurkan, mengalami pengirisan atau rusak.

3. Hasil Penentuan Konsentrasi Optimum Natrium Klorida (NaCl) pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan asam sianida (HCN)

Pada penelitian ini dilakukan penentuan konsentrasi optimum NaCl pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi optimum NaCl yang baik/yang digunakan dalam menurunkan kadar asam sianida dengan menggunakan variasi konsentrasi NaCl. Bagian yang diteliti adalah umbi dan daunnya. Singkong pahit baik umbi dan daunnya mengandung asam sianida dan memiliki kadar asam sianida tinggi dibanding singkong manis. Adapun proses pembentukan HCN pada singkong yaitu dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2. Reaksi Pembentukan Asam Sianida (HCN)

Adanya asam sianida pada singkong mengakibatkan keracunan sehingga jarang untuk dikonsumsi. Hal tersebut disebabkan dari perbedaan kadar masing-masing singkong, proses pengolahan yang tidak benar dan tingkat kekebalan tubuh itu sendiri. Adanya kadar asam sianida yang tinggi pada singkong pahit maka perlu dilakukan pengolahan yang benar dalam menurunkan kadar asam sianida pada singkong yaitu dilakukan pengolahan perendaman dengan penambahan NaCl. Penambahan NaCl mampu menurunkan kadar asam sianida yang ada dalam singkong baik umbi dan daunnya.


Penentuan konsentrasi optimum NaCl pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida yaitu diawali dengan cara sampel dihaluskan. Penghalusan pada sampel tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyarian zat aktif dan memperluas permukaan sampel supaya zat sianida yang terkandung didalamnya dapat keluar. Selanjutnya dilakukan perendaman dengan penambahan NaCl. Penambahan NaCl dilakukan dalam proses menurunkan kadar asam sianida karena NaCl mampu melarutkan HCN, dimana salah satu sifat dari HCN mudah bereaksi dengan NaCl pada proses perendaman Singkong, dengan reaksi sebagai berikut:



Gambar 4.3. Reaksi NaCl dengan HCN

Natrium klorida apabila bereaksi dengan asam sianida akan membentuk natrium sianida dan asam klorida. Sehingga molekul CN^- yang terikat dengan Na^+ akan ikut terbuang bersama air rendaman yang nantinya sangat berpengaruh dalam penurunan kadar HCN dalam singkong. Selain itu penambahan NaCl jauh lebih baik dan lebih mudah diperoleh serta lebih ekonomis untuk digunakan oleh masyarakat umum.

Proses selanjutnya menggantungkan kertas pikrat di dalam wadah yang berisi sampel umbi dan daun singkong bertujuan supaya uap HCN terperangkap kedalam kertas pikrat, kemudian dicuci dengan akuades sehingga air cucuannya dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm untuk mengetahui nilai absorbansi dari setiap sampel daun dan umbi singkong pahit. Dari data yang diperoleh tersebut dilakukan perhitungan persen penurunan kadar asam sianida.



Gambar 4.4. Kurva Penentuan Konsentrasi optimum NaCl pada umbi dan daun

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa konsentrasi optimum NaCl yaitu pada umbi 8% dengan tingkat penurunan kadar asam sianida sebesar 80,90% dan daun diperoleh pada konsentrasi 8% dengan tingkat penurunan kadar sebesar 79,63%. Hal ini diperoleh berdasarkan data dalam penentuan konsentrasi optimum NaCl.

Berdasarkan hasil analisis sampel umbi dan daun singkong pahit yaitu diperoleh data bahwa untuk umbi diperoleh konsentrasi optimum natrium klorida dengan konsentrasi 8% dengan kadar HCN 0,0258 % sehingga terjadi penurunan kadar HCN sebesar 80,90% dan penurunan kadar HCN terendah pada konsentrasi 5% yaitu 71,35% sedangkan pada daun singkong pahit diperoleh konsentrasi optimum natrium klorida pada konsentrasi 8% dengan kadar asam sianida sebesar 0,0291% dan mengalami penurunan kadar HCN sebesar 79,63%. Hal ini dapat dikatakan penambahan NaCl mampu menurunkan kadar asam sianida. Dimana Natrium klorida apabila bereaksi dengan asam sianida akan membentuk natrium sianida dan asam klorida. Sehingga molekul CN yang terikat dengan Na akan ikut terbuang bersama air rendaman yang nantinya sangat berpengaruh dalam penurunan kadar HCN dalam singkong. Hal tersebut sudah sesuai dengan pernyataan Aprilia,


2010 bahwa perendaman dengan NaCl dapat menurunkan kadar HCN sebesar 50-80% dan perendaman selama 48 jam dapat menurunkan kadar asam sianida 90% Agustini, 2012. Selain itu dilihat dari perolehan kadarnya dengan konsentrasi 8% yaitu tidak melewati dari 0,05% Arisman, 2009.

4. Hasil penentuan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap Penurunan Kadar asam sianida (HCN)

Pada penelitian ini dilakukan penentuan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida. Tujuannya untuk mengetahui waktu optimum yang baik yang digunakan dalam menurunkan kadar asam sianida dengan menggunakan variasi waktu perebusan. Proses perebusan terhadap singkong merupakan bagian dari pemanasan dengan menggunakan suhu panas dengan media air. Perebusan dapat mengurangi sifat sianogenik karena HCN mudah menguap dengan pemanasan dan larut dalam air. Pemanasan akan mempercepat proses penguapan, mempercepat dehidrasi dan pemecahan struktur sel, sehingga terjadi degradasi glikosida linamarin dalam singkong oleh enzim linamarase yang menghasilkan glukosa dan aseton sianohidrin kemudian melepaskan hidrogen sianida.

Pemanasan dalam air mendidih bisa mengakibatkan enzim linamarase dan glukosidase tidak aktif dan pembentukan asam sianida pun menjadi terputus. Sehingga sianida tidak akan terbentuk karena enzim-enzim tersebut tidak aktif (Aman, 2010:16). Semakin lama singkong direbus maka semakin lama singkong berinteraksi dengan air panas. Air yang panas dengan mudah dapat melarutkan dan menguapkan HCN yang terkandung dalam singkong. Pemanasan dan air merupakan cara pengolahan yang dapat menurunkan sifat sianogenik karena HCN dapat menguap dengan pemanasan dan HCN juga luruh dengan adanya air. Sehingga lama waktu perebusan akan menyisakan residu sianida yang semakin rendah (Karima,

2015:42). Dan bagian yang diteliti adalah umbi dan daunnya. Setelah dilakukan pengolahan perebusan maka dapat dilihat persen penurunan kadar asam sianida pada gambar 4.5 sebagai berikut:



Gambar 4.5. Kurva Penentuan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa waktu optimum perebusan yaitu pada umbi selama 15 menit dengan tingkat penurunan kadar asam sianida sebesar 69,20% dan daun diperoleh pada 15 menit dengan tingkat penurunan kadar sebesar 65,64%. Sehingga pada daun maupun umbi ditentukan waktu optimum perebusannya untuk mengetahui waktu perebusan yang baik saat menurunkan kadar asam sianida dan memungkinkan bahwa asam sianida sudah teruapkan sebagian karena adanya proses pemanasan yaitu perebusan sehingga mengurangi kadar asam sianida pada umbi maupun daun.

Berdasarkan hasil analisis sampel umbi dan daun singkong pahit yaitu diperoleh data bahwa untuk umbi diperoleh waktu optimum perebusan pada waktu 15 menit dengan kadar HCN 0,0416 % sehingga terjadi penurunan kadar HCN sebesar 69,20% dan penurunan kadar HCN terendah pada waktu 5 menit yaitu 6,8% sedangkan pada daun singkong pahit diperoleh waktu optimum perebusan pada

waktu 15 menit dengan kadar asam sianida sebesar 0,0491% dan mengalami penurunan kadar HCN sebesar 65,64%. Hasil penelitian dapat dikatakan semakin lama perebusan maka kadar asam sianida akan menurun sehingga presentasi/penurunan kadar asam sianida akan tinggi. Sehingga proses perebusan dapat menurunkan kadar asam sianida. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pembayun, 2007 bahwa pemanasan memiliki difungsi, menginaktifkan enzim dan menguapkan HCN yang terbentuk karena senyawa ini sifatnya volatil. Pemanasan akan menyebabkan enzim b-glukosidase yang berada dalam umbi mengalami inaktif sehingga rantai enzimatik dapat diputus. Dalam pernyataan Ardiyansari, 2012 bahwa proses pemanasan dengan cara perebusan dapat menurunkan kadar HCN sebesar 60-90% dan menambah waktu perebusan akan menurunkan kadar asam sianida sampai 70 -80% Askar, 1996. Selain itu dilihat dari perolehan kadarnya selama 15 menit yaitu tidak melewati dari 0,05% Arisman, 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsentrasi optimum natrium klorida pada umbi singkong pahit yaitu 8% dengan penurunan kadar asam sianida sebesar 80,90% dan konsentrasi optimum natrium klorida pada daun singkong pahit yaitu 8% dengan penurunan kadar asam sianida sebesar 79,63%
2. Waktu optimum perebusan pada umbi singkong pahit yaitu 15 menit dengan penurunan kadar asam sianida 69,20% dan waktu optimum perebusan pada daun singkong pahit yaitu 15 menit dengan penurunan kadar asam sianida 65,64 %

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji organoleptik agar dapat diketahui warna, rasa, bau dari hasil perendaman maupun perebusan.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengolahan singkong seperti proses penjemuran dan penggorengan untuk mengetahui tingkat penurunan kadar asam sianida didalam singkong.

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an Karim

- Agustini, Dewi Meliati. "Penentuan Waktu Optimum Pelepasan HCN dan Kadar Sianida pada Ubi Kayu (*Manihot esculenta* Crantz)". *Aristoteles* 10, no. 1 (2012): h. 9-10.
- Aman, L.O. "Efektifitas Penjemuran dan Perendaman dalam Air Tawar untuk Menurunkan Kandungan Toksik HCN Ubi Hutan (*Dioscorea hispida* Dennst)". *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA. Universitas Negeri Gorontalo, 2010.
- Ardiyansari, Yasinta Marta. "Pengaruh Jenis Gadung dan lama Perebusan Terhadap Kadar Sianida Gadung". *Skripsi*. fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, 2012.
- Arianto dkk. "Analisis Kandungan Asam Sianida (HCN) pada Kacang Koro Pedang dengan Menggunakan Lama Perendaman NaCl yang Berbeda". *Galung Tropika* 2, no.2 (2014): 186-181
- Arisman. *Buku Ajar Ilmu Gizi Keracunan Makanan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Askar. "Daun Singkong Dan Pemanfaatannya Terutama Sebagai Pakan Tambahan". Balai Penelitian Ternak *WARTOZOA* 5, no. 19 (1996): h. 21-25.
- Askurrahman. "Isolasi dan Karakterisasi Linamarase Hasil Isolasi dai Umbi Singkong (*Manihot Esculenta* Crantz)". *Argointek*, 4. no. 2 (2010): h. 11-15.
- Depkes RI. *UU RI No. 23 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI. 1992.
- Depkes RI. *UU RI No. 23 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI. 1981.
- Fatoni ahmad. "Analisis Secara Kuanlitatif dan Kuantitatif Kadar Kafein dalam Kopi Bubuk Lokal yang Beredar Di Kota Palembang Menggunakan Spketrofotometri UV-Vis". *Skripsi*. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, 2010.
- Feliana, Firga. "Kandungan Gizi Dua Jenis Varietas Singkong Berdasarkan Umur Panen Di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong". *e-Jiplol* 2, no. 3 (2014): h. 1-10.
- Karima. "Pengaruh Perendaman dan Perebusan terhadap Kadar HCN pada Biji Karet". *Riset Industri Hasil Hutan* 7, no,1 (2015): h. 39-44.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016
- Kurnia, Nova dan Fatmi Marwatoen. "Penentuan Kadar Sianida Daun Singkong dengan Variasi Umur dan Waktu Pemetikan". *Ilmiah Pendidikan Kimia* 1, no. 2 (2012): h. 117-121.
- Kurniawan, Sandra, "Pengaruh Lama Fermentasi Dan Konsentrasi $\text{Ca}(\text{OH})_2$ Untuk Perendaman Terhadap Karakteristik Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) Varietas Singkong Pahit(Pandemir L-2)". *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Muchtadi, Sugiyono. *Aspek Biokimia dan Gizi dalam Kemasan Pangan*. PAU Pangan dan Gizi. Yogyakarta: UGM, 1989.
- Nofita dan Agustina Retnaningsih. "Penetapan Kadar Asam Sianida pada Singkong (*Manihot esculenta* Crantz) dengan Variasi Waktu Perendaman secara Argentometri" *Analisis Farmasi* 1, no. 3 (2016): h. 157-162.
- Nurul, St. Chadijah, Kurnia Ramadani, 2017, Waktu dan Suhu Optimum Dalam Produksi Asam Oksalat Dari Limbah HVS dengan Metode Peleburan Alkali," *Jurnal Al-Kimia* (Online), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-kimia/article/view/284>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pambayun Rindit. *Kiat Sukses Teknologi Pengolahan Umbi Gadung*. Yogyakarta: Ardana Media, 2008.
- Purwono. *Budidaya 8 Jenis Tanaman Unggul*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2009.
- Purawisastra, Suryana dan Heru Yuniati. "Penurunan Kadar Sianida Singkong Pahit pada Proses Fermentasi Cair Bakteri *Brevibacterium Lactofermentum* BL-IM76". *Pgm* 27 no. 1 (2004): h. 17- 23.
- Puspitaningrum, Dian Wahyuningtyas. "Ekstraksi Emas Dari Batuan Menggunakan Metode Sianidasi Dan Amalgamasi Dengan Penambahan Ketela Pohon". *Skripsi*. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, 2013.
- Rahayuningsih, R. W, *Pengaruh Ukuran Partikel Beras terhadap pertumbuhan Sporulasi jamur Kecap (*Aspergillus Oryzae* dan *A. soyae*)*. Skripsi Fakultas Teknologi Pertanian UGM, 1995.
- Riyani, Kapti dan Tien Setyaningtyas. "Fotodegradasi Sianida dalam Limbah Cair Tapioka". *Molekul* 8, no. 1 (2013): h. 49-57.
- Rusli, Raisani. "Penetapan Kadar Boraks Pada Mie Basah Yang Beredar Di Pasar Ciputat dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis Menggunakan Pereaksi Kurkumin" *Skripsi* Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.


- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/ M. Quraish Shihab. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/ M. Quraish Shihab. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sitorus Marham s. *Spektroskopi, Edukasi Struktur Molekul Organik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Suciati, Andi. "Pengaruh Lama Perendaman Dan Fermentasi Terhadap Kandungan HCN Pada Tempe Kacang Koro (*Canavalia ensiformis L*)" *Skripsi Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar*, 2012.
- Sudarmadji, S., B. Haryono, Suhardi.. *Prosedur Analisa Untuk Bahan Makanan dan Pertanian*. Liberty: Yogyakarta, 1997
- Suismono dan Darmadjadi. "Teknologi Pembuatan Tepung dan pati Umbi-umbian Untuk Menunjang Ketahanan Pangan". *Jurnal pangan*. 4, no.1 (1992):h. 27-39.
- Sosrosoedardjo, R. S. dan Bahrain Samad. *Bercocok Tanam Ubi Kayu*. Yasaguna. :Jakarta, 1983.
- Triyati, Etty, " Spektrofotometer Ultra-Violet dan Sinar Tampak Serta Aplikasinya dalam Oseanologi". *Oseana* 10, no. 1 (1985): h. 23-47.
- Yuningsih. *Kandungan dan Stabilitas Sianida dalam Tanaman picng (Pangium edule Reinw) serta Pemanfaatannya*. Balai Besar Penelitian Veterinter, 2008.
- Wahyuningsih, Sri Budi dan Haslina. " Kajian Degradasi Asam Sianida Pada Berbagai Metode Prose Pembuatan Tepung Mokal". *Jurnal pangan*. 29, no. 1 (2011): h. 1-8.
- Wahjuningsih, S. B. Pengaruh Lama Fermentasi dan Cara Pengeringan erhadap Mutu Gari yang Dihasilkan. *Skripsi Fakultas Teknologi Pertanian IPB Bogor*. 1990.
- Winarno, F. G. 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. PT Gramedia. Jakarta

Lampiran 1. Skema Penelitian




Lampiran 2. Skema Kerja

1. Pengambilan Sampel Umbi Singkong



2. Pengambilan Sampel Daun Singkong



3. Pembuatan Kertas Pikrat

Kertas Whatman No. 42

- Digunting (1×6 cm)
- Direndam dalam larutan asam pikrat 1%
- Dikeringkan
- Direndam kembali dalam Na_2CO_3 8%
- Dikeringkan kembali

Hasil

4. Analisis Kualitatif Asam Sianida (HCN) dengan Metode Kertas Alkali Pikrat

Umbi singkong pahit

- Dihaluskan
- Ditimbang 20 gram
- Dimasukkan dalam erlenmyer 250 mL
- Ditambahkan 50 mL H_2O
- Ditambahkan 10 mL larutan tartrat 10 %
- Direndam selama 2 jam
- Digantungkan kertas alkali pikrat
- Dipanaskan dalam penangas air 50°C selama 30 menit
- Diamati perubahan warna pada kertas alkali pikrat.
- Apabila warna kuning pada kertas berubah menjadi kuning menjadi merah bata berarti dalam sampel terdapat asam sianida (HCN).
- Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit

Hasil

5. Penentuan Konsentrasi Optimum NaCl

Umbi singkong pahit

- Dihaluskan
- Ditimbang 1,0000 gram
- Dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- Ditambahkan NaCl dengan variasi konsentrasi (2% b/v, 4% b/v, 6% b/v, 8% b/v, 10% b/v dan 12% b/v)
- Digantungkan Kertas Pikrat
- Ditutup dengan plastik
- Direndam selama 48 jam
- Kertas pikrat diangkat ke dalam gelas kimia
- Ditambahkan 25 mL H₂O
- Direndam selama 30 menit
- Kertas pikrat diangkat
- Air rendaman diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm
- Dilakukan Prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit, pengerjaan dilakukan secara duplo

Hasil

6. Penentuan Waktu Optimum Perebusan

Umbi singkong pahit

Dihaluskan

Ditimbang 1,0000 gram

Dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL

Ditambahkan 100 mL H₂O

Digantungkan kertas pikrat

Direbus pada suhu 50-60°C selama(5,10,15,20 menit)

Kertas Pikrat diangkat kedalam gelas kimia

Ditambahkan 25 mL H₂O

Direndam selama 30 menit

Kertas pikrat diangkat

Air rendaman diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm

Dilakukan Prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit,
pengerjaan dilakukan secara duplo

Hasil

8. Karakteristik Bahan Baku

a. Kadar Air

Cawan Porselin

- Dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C selama 15 menit
- Didinginkan dalam desikator 30 menit
- Ditimbang

Umbi singkong pahit

- Ditimbang 1 gram
- Dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C selama 2 jam
- Didinginkan dalam desikator selama 30 menit
- Dihitung kadar air
- Dilakukan prosedur diatas untuk sampel daun singkong pahit, pengerjaan dilakukan secara duplo

Hasil

Lampiran 3. Perhitungan Pembuatan Pereaksi

1. Asam pikrat ($C_6H_3(NO_2)_3$) 1% dalam 1000 mL

Diketahui : Konsentrasi ($C_6H_3(NO_2)_3$) = 1%

Volume = 1000 mL

Ditanyakan : Massa (gr) untuk membuat ($C_6H_3(NO_2)_3$) 1%?

Penyelesaian:

$$\%b/v = \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL zat pelarut}} \times 100\%$$

$$1\% = \frac{X}{1000 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$X = 10 \text{ gram}$$

2. Natrium karbonat (Na_2CO_3) 8% dalam 100 mL

Diketahui : Konsentrasi (Na_2CO_3) = 8%

Volume = 100 mL

Ditanyakan : Massa (gr) untuk membuat (Na_2CO_3) 8%.....?

Penyelesaian:

$$\%b/v = \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL zat pelarut}} \times 100\%$$

$$8\% = \frac{X}{100 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$X = 8 \text{ gram}$$

3. Asam tartrat (C₄H₆O₆) 10% dalam 50 mL

Diketahui : Konsentrasi (C₄H₆O₆) = 10%
Volume = 50 mL

Ditanyakan : Massa (gr) untuk membuat (C₄H₆O₆) 10%.....?

Penyelesaian:

$$\%b/v = \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL zat pelarut}} \times 100\%$$

$$10\% = \frac{X}{50 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$X = 5 \text{ gram}$$

4. Asam Klorida (HCl) 1 N dalam 500 mL

Mr HCl : 36,5 gr/mol

Volume : 500 mL

N : 1 N

% : 37%

BJ : 1,19 gr/mL

Valensi : $\text{HCl} \longrightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^- = 1$

$$N = \frac{37\% \cdot \text{BJ} \cdot 1000}{\text{BST} \left(\frac{\text{ekv}}{\text{Valensi}} \right)}$$

$$= \frac{0,37 \cdot 1,19 \frac{\text{gr}}{\text{mL}} \cdot 1000 \text{ mL/L}}{36,5 \frac{\text{gr}}{\text{mol}} / 1}$$

$$= 12,06 \text{ mol/L}$$

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$500 \text{ mL} \cdot 1 \text{ mol/L} = V_2 \cdot 12,06 \text{ mol/L}$$

$$V_2 = 41,45 \text{ mL}$$

Lampiran 4. Perhitungan Pembuatan Standar

a. Pembuatan larutan induk 100 ppm (mg/L) dalam 1 L

$$\begin{aligned} \text{mg} &= \frac{\text{ppm} \cdot V \cdot \text{Mr KCN}}{\text{Ar HCN}} \\ &= \frac{100 \text{ mg/L} \cdot 1 \text{ L} \cdot 65,10685 \text{ gr/mol}}{27,01864 \text{ gr/mol}} \\ &= 240,97 \text{ mg} \\ &= 0,2409 \text{ gram} \end{aligned}$$

b. Pembuatan deret standar

No.	Konsentrasi (ppm)	Volume (ml)
1	10	10
2	20	20
3	30	30
4	40	40
5	50	50

1. Perhitungan untuk konsentrasi 10 ppm sebanyak 100 mL

$$V_1 \cdot C_1 = V_2 \cdot C_2$$

$$V_1 \cdot 100 \text{ ppm} = 100 \text{ ml} \cdot 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{100 \text{ ml} \cdot 10 \text{ ppm}}{100 \text{ ppm}}$$

$$= 10 \text{ ml}$$

Catatan: Untuk perhitungan konsentrasi 20,30,40,50 ppm ditentukan menggunakan cara yang sama diatas

Lampiran 5. Perhitungan Analisis Kadar Air

1. Analisis kadar air

a. Umbi singkong pahit

Bobot cawan kosong I (simplo) : 73,3459 gram

Bobot sampel (B) : 1,0002 gram

Bobot cawan I + Bobot sampel awal (B1) : 74,3461 gram

Bobot sampel akhir (B2) : 73,6864 gram

$$\begin{aligned}\% \text{ kadar air (I)} &= \frac{B1-B2}{B} \times 100 \% \\ &= \frac{74,3461 \text{ gram} - 73,6864 \text{ gram}}{1,0002 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= \frac{0,6597}{1,0002} \times 100 \% \\ &= 65,95 \%\end{aligned}$$

Bobot cawan kosong II (Duplo) : 73,6315 gram

Bobot sampel (B) : 1,0005 gram

Bobot cawan I + Bobot sampel awal (B1) : 74,632 gram

Bobot sampel akhir (B2) : 73,9669 gram

$$\begin{aligned}\% \text{ kadar air (II)} &= \frac{B1-B2}{B} \times 100 \% \\ &= \frac{74,632 \text{ gram} - 73,9669 \text{ gram}}{1,0005 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= \frac{0,6651}{1,0005} \times 100 \% \\ &= 66,47 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ kadar air total} &= \frac{\% \text{ kadar air I} + \% \text{ kadar air II}}{2} \\
 &= \frac{65,95\% + 66,47\%}{2} \\
 &= \frac{132,39}{2} \\
 &= 66,19 \%
 \end{aligned}$$

b. Daun singkong pahit

Bobot cawan kosong I (simplo)	: 74,0095 gram
Bobot sampel (B)	: 1,0007 gram
Bobot cawan I + Bobot sampel awal (B1)	: 75,0102 gram
Bobot sampel akhir (B2)	: 74,2726 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ kadar air (I)} &= \frac{B1 - B2}{B} \times 100 \% \\
 &= \frac{74,0102 \text{ gram} - 74,2726 \text{ gram}}{1,0007 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= \frac{0,7376}{1,0007} \times 100 \% \\
 &= \frac{73,76}{1,0007} \\
 &= 73,70 \%
 \end{aligned}$$

Bobot cawan kosong II (Duplo)	: 91,5422 gram
Bobot sampel (B)	: 1,0001 gram
Bobot cawan I + Bobot sampel awal (B1)	: 92,5423 gram
Bobot sampel akhir (B2)	: 91,7915 gram

$$\% \text{ kadar air (II)} = \frac{B1 - B2}{B} \times 100 \%$$

$$= \frac{92,5423 \text{ gram} - 91,7915 \text{ gram}}{1,0001 \text{ gram}} \times 100 \%$$

$$= \frac{0,7508}{1,0001} \times 100 \%$$

$$= 75,07 \%$$

$$\% \text{ kadar air total} = \frac{\% \text{ kadar air I} + \% \text{ kadar air II}}{2}$$


$$= \frac{73,70\% + 75,07\%}{2}$$

$$= \frac{148,77}{2}$$

$$= 74,38 \%$$

Lampiran 6. Perhitungan Analisis Kuantitatif

a. Standar Asam Sianida



Gambar 6.1 Hubungan antara Absorbansi dan Konsentrasi Standar

Tabel perhitungan R^2

No	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	$x \cdot y$
1	10	0,0071	100	0,00005041	0,071
2	20	0,0138	400	0,00019044	0,276
3	30	0,0187	900	0,00034969	0,561
4	40	0,0265	1600	0,00070225	1,06
5	50	0,0321	2500	0,00103041	1,605
N= 5	$\Sigma x = 150$ $\bar{x} = 30$	$\Sigma y = 0,0982$ $\bar{y} = 0,01964$	$\Sigma x^2 = 5500$	$\Sigma y^2 = 0,0023232$	$\Sigma xy = 3,573$

a. Perhitungan nilai b

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{(5 \times 3,573) - (150 \times 0,0982)}{(5 \times 5000) - (150)^2}$$

$$= \frac{(17,865) - (14,73)}{(27500) - (22500)}$$

$$= \frac{3,135}{5000}$$

$$b = 0,000627$$

b. Perhitungan nilai a

$$y = a + bx$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$= 0,01964 - 0,000627 (30)$$

$$= 0,01964 - 0,01881$$

$$= 0,00083$$

c. Perhitungan nilai R^2

$$R^2 = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{\sqrt{((n \cdot \Sigma X^2) - (\Sigma x)^2)((n \cdot \Sigma y^2) - (\Sigma y)^2)}}$$

$$= \frac{(5 \times 3,573) - (150 \times 0,0982)}{\sqrt{((5 \times 5500) - (150)^2)((5 \times 0,0023232) - (0,0982)^2)}}$$

$$= \frac{17,865 - 14,375}{\sqrt{(27500 - 22500)(0,011616 - 0,00964)}}$$

$$= \frac{3,135}{\sqrt{5000 \times 0,001976}}$$

$$= \frac{3,135}{\sqrt{9,88}}$$

$$= \frac{3,135}{3,143}$$

$$= 0,997$$

a. Analisis kadar Asam Sianida

1. Penentuan konsentrasi optimum NaCl pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida

No.	Sampel	Konsentrasi NaCl	Absorbansi		Absorbansi rata-rata	Kadar asam sianida (%)	Penurunan kadar asam sianida (%)
			Simplo	Duplo			
1	Umbi singkong pahit	2%	0,0095	0,0107	0,0101	0,0387	71,35
		4%	0,0076	0,0089	0,0082	0,0308	77,20
		6%	0,0073	0,0085	0,0079	0,0295	78,16
		8%	0,0067	0,0074	0,0070	0,0258	80,90
		10%	0,0079	0,0093	0,0086	0,0325	75,94
		12%	0,0086	0,0087	0,0091	0,0345	74,46
2	Daun singkong pahit	2%	0,0268	0,0272	0,0270	0,1091	23,65
		4%	0,0183	0,0181	0,0182	0,0725	49,26
		6%	0,0162	0,0174	0,0168	0,0666	53,39
		8%	0,0076	0,0080	0,0078	0,0291	79,63
		10%	0,0086	0,0088	0,0087	0,0329	76,97
		12%	0,0116	0,0122	0,0119	0,0462	67,66

2. Penentuan waktu optimum perebusan pada umbi dan daun singkong pahit terhadap penurunan kadar asam sianida

No.	Sampel	Waktu perebusan (menit)	Absorbansi		Absorbansi rata-rata	Kadar asam sianida (%)	Penurunan kadar asam sianida (%)
			Simplo	Duplo			
1	Umbi singkong pahit	5	0,0304	0,0316	0,0310	0,1258	6,8
		10	0,0229	0,0233	0,0231	0,0929	31,23
		15	0,0105	0,0111	0,0108	0,0416	69,20
		20	0,0204	0,0240	0,0222	0,0891	34,04
2	Daun singkong pahit	5	0,0310	0,0328	0,0318	0,1291	9,65
		10	0,0218	0,0222	0,0220	0,0883	38,20
		15	0,0120	0,0132	0,0126	0,0491	65,64
		20	0,0180	0,0193	0,0189	0,0754	47,23

1. Kadar awal umbi Singkong Pahit

$$y = 0,0006x + 0,0008$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,0333 - 0,0008}{0,0006}$$

$$x = 54,16 \text{ ppm}$$

$$x = 54,16 \text{ mg/L}$$

$$\text{Kadar HCN} = \frac{\text{konsentrasi} \times \text{volume}}{\text{berat sampel}}$$

$$= \frac{54,16 \text{ mg/L} \times 0,025 \text{ L}}{1 \text{ gram}}$$

$$= 1,3515 \text{ mg/g}$$

$$\% \text{ HCN} = \frac{1,3515 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$= 0,1351 \%$$

$$\text{HCN (ppm)} = \text{HCN (\%)} \times 1000$$

$$= 0,1351 \times 1000$$

$$= 135,5$$

2. Kadar awal umbi Singkong Pahit

$$y = 0,0006x + 0,0008$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,0351 - 0,0008}{0,0006}$$

$$x = 57,16 \text{ ppm}$$

$$x = 57,16 \text{ mg/L}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar HCN} &= \frac{\text{konsentrasi} \times \text{volume}}{\text{berat sampel}} \\ &= \frac{57,16 \text{ mg/L} \times 0,025 \text{ L}}{1 \text{ gram}} \\ &= 1,429 \text{ mg/g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ HCN} &= \frac{1,429 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \times 100\% \\ &= 0,1429 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HCN (ppm)} &= \text{HCN (\%)} \times 1000 \\ &= 0,1429 \times 1000 \\ &= 142,9 \end{aligned}$$

3. Konsentrasi NaCl 2% pada Umbi Singkong Pahit

$$y = 0,0006x + 0,0008$$

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{0,0101 - 0,0008}{0,0006}$$

$$x = 15,5 \text{ ppm}$$

$$x = 15,5 \text{ mg/l}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar HCN} &= \frac{\text{konsentrasi} \times \text{volume}}{\text{berat sampel}} \\ &= \frac{15,5 \text{ mg/L} \times 0,025 \text{ L}}{1 \text{ gram}} \\ &= 0,3875 \text{ mg/g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ HCN} &= \frac{0,3875 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \times 100\% \\ &= 0,03875 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HCN (ppm)} &= \text{HCN (\%)} \times 1000 \\ &= 0,0404 \times 1000 \\ &= 38,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Penurunan} &= \frac{0,1351 - 0,03875}{0,1351} \times 100\% \\ &= 71,35\% \end{aligned}$$

Catatan: Untuk perhitungan konsentrasi NaCl 4%, 6%, 8%, 10% dan 12% ditentukan menggunakan cara yang sama diatas

4. Konsentrasi NaCl 2% pada Daun Singkong Pahit

$$y = 0,0006x + 0,0008$$

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{0,0270 - 0,0008}{0,0006}$$

$$x = 43,66 \text{ ppm}$$

$$x = 43,66 \text{ mg/l}$$

$$\text{Kadar HCN} = \frac{\text{konsentrasi} \times \text{volume}}{\text{berat sampel}}$$

$$= \frac{43,66 \text{ mg/L} \times 0,025 \text{ L}}{1 \text{ gram}}$$

$$= 1,0915 \text{ mg/g}$$

$$\% \text{ HCN} = \frac{1,0915 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$= 0,10915 \%$$

$$\text{HCN (ppm)} = \text{HCN (\%)} \times 1000$$

$$= 0,10915 \times 1000$$

$$= 109,15$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Penurunan} &= \frac{0,1429 - 0,01915}{0,1429} \times 100\% \\ &= 23,65\% \end{aligned}$$

Catatan: Untuk perhitungan konsentrasi NaCl 4%, 6%, 8%, 10% dan 12% ditentukan menggunakan cara yang sama diatas

5. Perebusan 5 menit pada Umbi Singkong Pahit

$$y = 0,0006x + 0,0008$$

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{0,0310 - 0,0008}{0,0006}$$

$$x = 50,33 \text{ ppm}$$

$$x = 50,33 \text{ mg/L}$$

$$\text{Kadar HCN} = \frac{\text{konsentrasi} \times \text{volume}}{\text{berat sampel}}$$

$$= \frac{50,33 \text{ mg/L} \times 0,025 \text{ L}}{1 \text{ gram}}$$

$$= 1,258 \text{ mg/g}$$

$$\% \text{ HCN} = \frac{1,258 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$= 0,1258 \%$$

$$\text{HCN (ppm)} = \text{HCN (\%)} \times 1000$$

$$= 0,1258 \times 1000$$

$$= 125,8$$

$$\% \text{ Penurunan} = \frac{0,1351 - 0,1258}{0,1351} \times 100\%$$

$$= 6,8\%$$

Catatan: Untuk perhitungan perebusan 10,15 dan 20 menit ditentukan menggunakan cara yang sama diatas

6. Perebusan 5 menit pada Daun Singkong Pahit

$$y = 0,0006x + 0,0008$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,0318 - 0,0008}{0,0006}$$

$$x = 51,66 \text{ ppm}$$

$$x = 51,66 \text{ mg/L}$$

$$\text{Kadar HCN} = \frac{\text{konsentrasi} \times \text{volume}}{\text{berat sampel}}$$

$$= \frac{51,66 \text{ mg/L} \times 0,025 \text{ L}}{1 \text{ gram}}$$

$$= 1,2915 \text{ mg/g}$$

$$\% \text{ HCN} = \frac{1,2915 \text{ mg}}{1000 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$= 0,12915 \%$$

$$\text{HCN (ppm)} = \text{HCN (\%)} \times 1000$$

$$= 0,12915 \times 1000$$

$$= 129,15$$

$$\% \text{ Penurunan} = \frac{0,1429 - 0,12915}{0,1429} \times 100\%$$

$$= 9,65\%$$

Catatan: Untuk perhitungan perebusan 10,15 dan 20 menit ditentukan menggunakan cara yang sama diatas

Lampiran 7: Dokumentasi Tahap Pengambilan Sampel



Lahan Perkebunan Singkong Pahit



Sampel Umbi singkong pahit



Sampel daun singkong pahit



Dipotong-dipotong



Dihaluskan



Dihaluskan

Lampiran 8 : Dokumentasi Pembuatan Kertas Alkalin Pikrat



Penambahan larutan asam pikrat
(direndam selama 30 menit)



Dikeringkan selama 30 menit



Penambahan Natrium Karbonat



Dikeringkan selama 30 menit

Lampiran 9: Dokumentasi Analisis Kualitatif Asam Sianida (HCN)

a. Sampel Umbi



Umbi dihaluskan



Dimasukan kedalam erlenmeyer



Ditambahkan H₂O



Ditambahkan larutan tartrat dan Digantungkan Kertas Alkalin Pikrat



Dipanaskan suhu 50°C



Terjadi perubahan warna

b. Sampel Daun



Daun dihaluskan



Dimasukan kedalam erlenmeyer



Ditambahkan H₂O



Ditambahkan larutan tartrat
dan Digantungkan Kertas Alkalin Pikrat



Dipanaskan Suhu 50°C



Terjadi perubahan warna

Lampiran 10: Dokumentasi Analisis Kuantitatif

a. Analisis kadar HCN dengan Perendaman NaCl



Sampel daun dan umbi dihaluskan



Dimasukan kedalam erlenmeyer



Diitambahkan NaCl 2,4,6,8,10,12%



Digantungkan Kertas alkalin pikrat



Proses perendaman selama 48 jam



Kertas alkalin pikrat ditambahkan H₂O



Kertas alkalin pikrat diangkat dan analisis UV-Vis

b. Analisis kadar HCN dengan perebusan



Sampel umbi dan daun dihaluskan



Digantungkan kertas alkalin pikrat dan diirebus selama 5,10,15,20 menit



Kertas alkalin pikrat dipisahkan



Kertas alkalin pikrat ditambahkan H₂O



Kertas alkalin pikrat diangkat dan analisis UV-Vis

Lampiran 11: Analisis Kadar Air

a. Analisis Kadar Air



Sampel Umbi dan Daun



Cawan kosong ditimbang



Sampel ditimbang



Dipanaskan dalam oven



Didinginkan dalam desikator



Ditimbang sampai bobot konstan

