

**ANALISIS KADAR LOGAM KADMIUM (Cd) YANG TERSDORPSI PADA  
RUMPUT LAUT MERAH (Euchema Cottonii) DI KABUPATEN TAKALAR  
DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETER SERAPAN ATOM (SSA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan  
Kimia Pada Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar**

**Oleh**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ASIH SUKMAWATI BETAWI**

**60500107017**

**ALAUDDIN**  
**M A K A S S A R**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**

**2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2011

Penulis,

**ASIH SUKMAWATI BETAWI**  
**NIM : 60500107017**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wrh. Wbr.

Tertulis puji dan syukur kepada Allah SWT dari penulis atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Logam Kadmium (Cd) Yang Teradsorpsi Pada Rumput Laut Merah (*Euchema Cottonii*) Di Kabupaten Takalar Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun semua dapat terlewati dengan baik atas bimbingan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya apabila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Telah banyak cerita yang mengiringi langkah penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, namun berkat kesabaran dan dukungan serta motivasi dari segenap keluarga dan orang-orang terdekat maka Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka

penyelesaian studi. Oleh karena itu, patutlah penulis mengucapkan banyak terima kasih teristimewa dan tercinta kepada kedua orang tua, Ayahanda **Nasrun Muhammad Betawi** dan Ibunda **Halimah Likur** yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membiayai dan memberikan semangat serta selalu mendoakan setiap langkah dalam proses pencarian ilmu demi masa depan yang lebih baik kepada penulis hingga sekarang. Tak ada yang dapat ananda berikan melainkan hanya do'a dan patuh terhadap keduanya. Pada kesempatan ini, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu **Dra. Melati Masri, M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Asriani Ilyas, S.Si, M.Si** selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk berharga dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Ibu **Dra. St. Chadijah, M.Si** dan Ibu **Maswati Baharuddin S.Si, M.Si** dan Bapak **Prof. Dr. H. Abd. Karim hafid, S.Pt., M.P** selaku tim penguji dalam pelaksanaan Seminar Draf, Seminar Hasil dan Ujian Meja, terima kasih atas segala masukannya.
3. Ibu **Maswati Baharuddin, S.Si, M.Si** dan ibu **H. Asri Saleh, ST.,M.si** selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Seluruh Dosen, Staf Jurusan dan Laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan yang tak ternilai harganya.
5. Saudara, keluarga dan teman-teman saya (Fadilah, Dewi, Nurul dan adik saya Iful) atas segala bantuan tenaga, ilmu, dukungan moril mulai dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
6. Teman-teman KKN yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan selama penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
7. Teman-teman pondokan Spada atas segala bantuannya, dukungan moril mulai dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
8. Saudara seperjuangan **Haspiani, Reski Amalia, Ratnawati Syuaib, Anita Puspita, Ety Rindani** dan temana-teman mahasiswa Kimia "07" atas segala dukungan, canda tawa dan kebersamaannya dalam mengarungi lika-liku perkuliahan.
9. Terkhusus untuk **Anna Handayani, S.Si** yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama melakukan penelitian ini.
10. Untuk masyarakat Sanrobone yang bersedia memberikan rumput lautnya sebagai bahan dalam penelitian ini.
11. Terakhir penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang juga banyak membantu dalam penelitian ini yang tidak sempat disebutkan namanya.

Dengan keterbatasan kemampuan penulis maka senantiasa penulis mengharapkan saran yang membangun sehingga penulis dapat berkarya lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.

Makassar, Desember 2011

Penulis

**ASIH SUKMAWATI BETAWI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-8</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9-42</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Rumput Laut .....	9
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Euchema Cottonii</i> .....	14
C. Logam Kadmium (Cd) .....	20
D. Pencemaran Pesisir dan Laut .....	28
E. Adsorpsi .....	32
F. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) .....	34

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43-49</b>
	A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	43
	B. Alat dan Bahan .....	43
	C. Prosedur kerja .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50-66</b>
	A. Hasil Penelitian .....	50
	B. Pembahasan .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>68-70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>76</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rumput laut <i>Euchema Cottonii</i> (Rumput Laut Merah) .....	15
2. Komponen Spektrofotometer Serapan Atom .....	39
3. Alat Atomic Absorbant Spectrofotometer Varian .....	42
4. Sistem Biogeokimia sirkulasi logam dalam kehidupan biologi air laut dan air tawar .....	58



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Kadar rata-rata kadmium (Cd) pada air laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar .....	50
2. Kadar rata-rata kadmium (Cd) pada rumput laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar .....	51
3. Nilai rata-rata suhu, kekeruhan, pH dan salinitas di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar .....	52
4. Nilai rata-rata parameter, kadar rata-rata Cd pada air laut dan kadar rata-rata Cd pada rumput laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
1. Analisis Kadar Logam Kadmium (Cd) Pada Air Laut .....	71
2. Analisis Kadar Logam Kadmium (Cd) Pada Rumpun Laut Merah .....	72
3. Cara Pembuatan Larutan Induk Cd <sup>2+</sup> .....	73
4. Hasil Perhitungan Pembuatan Larutan Standar .....	74
5. Data Absorbansi Larutan Standar Cd <sup>2+</sup> .....	75
6. Grafik Parameter perairan di Desa Sandrobone Kecamatan Sandrobone Kabupaten Takalar .....	76
7. Hasil Perhitungan Kadar Rata-Rata Cd Pada Air Laut di Desa Sandrobone Kecamatan Sandrobone Kabupaten Takalar .....	77
8. Hasil Perhitungan Kadar Rata-Rata Cd Pada Rumpun Laut di Desa Sandrobone Kecamatan Sandrobone Kabupaten .....	78
9. Grafik Parameter perairan di Desa Sandrobone Kecamatan Sandrobone Kabupaten Takalar .....	79
10. Lokasi Pengambilan Sampel .....	81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Asih Sukmawati Betawi

NIM : 60500107017

Judul Skripsi : “Analisis Logam Kadmium (Cd) Yang Teradsorpsi Pada Rumput Laut Merah (*Euchema Cottonii*) Di Kabupaten Takalar Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)”

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi cadmium (Cd) pada rumput laut merah (*Euchema Cottonii*) dengan metode spektrofotometri serapan atom (SSA). Parameter lain yang diukur adalah air lautnya dengan metode yang sama. Preparasi awal sampel dilakukan dengan air laut menggunakan asam nitrat pekat sebanyak 5 ml dan diuapkan, kemudian diencerkan dengan volume 100 ml. Untuk analisis rumput laut dilakukan dengan pencucian rumput laut, dikeringkan, diabukan, kemudian ditambah asam nitrat pekat lalu diuapkan. Sampel yang kering dilarutkan dengan HCl 1 N dan diencerkan pada 100 ml. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi cadmium (Cd) untuk air laut pada Dusun Papanambea dan Dusun Je'ne rata-rata sebesar 0,07 ppm, sedangkan pada Dusun Parappa rata-rata sebesar 0,75 ppm. Dari hasil ini telah melewati standar peraturan PP RI No. 20/1990 yaitu 0,01 ppm. Sedangkan pada rumput laut yaitu pada Dusun Papanambea rata-rata sebesar 0,31 ppm, pada Dusun Je'ne rata-rata sebesar 0,33 ppm dan pada Dusun Parappa rata-rata sebesar 0,275 ppm. Hasil ini telah melewati Standar Nasional Indonesia No. 01-3548-1994 sebesar 0,2 ppm.

**Kata Kunci** : *Rumput Laut Merah, Spektrofotometri Serapan Atom, Kadmium (Cd).*

## ABSTRACT

Name : Asih Sukmawati Betawi

NIM : 60500107017

Title Of Skripsi : “Analysis Metal Cadmium ( Cd) Which Adsorptions At Grass Red Sea ( Euchema Cottonii) In Province of Takalar With Method of Spektrofotometri Absorption Atom ( SSA)”

---

This research aim to to know cadmium concentration ( Cd) at red sea grass ( Euchema Cottonii) with method of spektrofotometri atom absorption ( SSA). Other Parameter the measured is its sea water with same method. Preparasi early sampel done with sea water use condensed nitrate acid counted 5 ml and evaporated, later;then thinned with volume 100 ml. For the analysis of sea grass done with wash of sea grass, dried, ash, islater;then added condensed nitrate acid then evaporated. Sampel which is dry to be dissolved with HCL 1 N and thinned at 100 ml. Result of this research indicate that cadmium concentration ( Cd) for water go out to sea at Orchard of Papanambea and Orchard of Je'Ne mean equal to 0,07 ppm, while Orchard of Parappa mean equal to 0,75 ppm. Of this result have passed standard regulation of PP RI No. 20 / 1990 that is 0,01 ppm. While at grass go out to sea that is at Orchard of Papanambea mean equal to 0,31 ppm, at Orchard of Je'Ne mean equal to 0,33 ppm and at Orchard of Parappa mean equal to 0,275 ppm. This result have passed Standard National Indonesia of No. 01-3548-1994 equal to 0,2 ppm.

Keyword : *Grass Red Sea, Spektrofotometri Absorption Atom, Cadmium ( Cd)*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Indonesia telah dikenal luas sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu  $\pm 80.791,42$  Km. Di dalam lautan terdapat bermacam-macam makhluk hidup baik berupa tumbuhan air maupun hewan air. Salah satu makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut adalah alga. Pembangunan yang pesat dibidang ekonomi disatu sisi akan meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi di sisi lain akan berakibat pada penurunan kesehatan akibat adanya pencemaran yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Hal ini karena kurangnya atau tidak memadainya fasilitas atau peralatan untuk menangani dan mengelola limbah tersebut. <sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan sektor industri pada beberapa daerah telah terjadi berbagai kasus pencemaran terhadap sumber-sumber air, lebih jauh dari itu bahan pencemar air yang seringkali menjadi masalah terhadap masyarakat dan lingkungan adalah terdapatnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Perkembangan teknologi industri memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan organisme, sisa-sisa bahan buangan dari

---

<sup>1</sup>Ella, "Bioakumulasi Ion Logam Kadmium (II) Oleh Rumput Laut *Euchema Cottoni* Di Lingkungan Air Laut". <http://webcache.googleusercontent.com/search>. (23 Mei 20110).

industri berteknologi tinggi tersebut mengandung ion logam berat yang akan diadsorpsi oleh organisme perairan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang lima (5) tahun terakhir menjadi sentra produksi rumput laut terutama jenis *Kappaphycus alvarezii* atau *Eucheuma cottonii*. Pemanfaatan ruang pesisir termasuk untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar perlu pengaturan ruang sehingga dapat menekan konflik yang mungkin terjadi di masa mendatang. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan data spasial yang menggambarkan kondisi penggunaan lahan pesisir untuk budidaya rumput laut, sehingga menjadi petunjuk penggunaan lahan lain dan memudahkan penentu kebijakan dalam mengambil langkah-langkah strategi dalam pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Takalar.<sup>3</sup>

Pencemaran dikatakan terjadi jika air laut berubah kualitasnya dan akhirnya berubah fungsi karena perubahan tersebut menyebabkan keadaan negatif manusia dan lingkungan. Dengan kata lain, pencemaran laut tidak hanya merusak habitat organisme laut serta proses biologi dan fisiologinya saja, tetapi secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kesehatan manusia oleh karena manusia mengakumulasi bahan-bahan pencemar melalui kontak langsung dengan perairan yang telah tercemar atau melalui

---

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Mudin Paena, “Penentuan Luas dan Distribusi Spasial Budidaya Rumput Laut di Perairan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis”, [http://www.rcaprpb.com/UserFiles/File/Pros%20FITTA%201/Mudian%20P\\_PENENTUAN%20LUAS.pdf](http://www.rcaprpb.com/UserFiles/File/Pros%20FITTA%201/Mudian%20P_PENENTUAN%20LUAS.pdf) (28-12-2010).

konsumsi bahan pangan laut yang sebelumnya telah mengandung bahan pencemar. Salah satu pencemaran pada badan air adalah masuknya ion logam berat. Peningkatan kadar logam berat di dalam perairan akan diikuti oleh peningkatan kadar zat tersebut dalam organisme air seperti kerang, rumput laut dan biota laut lainnya. Pemanfaatan organisme ini sebagai bahan makanan akan membahayakan kesehatan manusia<sup>4</sup>

Dalam dasawarsa terakhir, kandungan logam berat di perairan mendapat perhatian yang cukup besar bagi para ahli toksikologi. Beberapa logam berat seperti Cu, Fe, dan Zn merupakan komponen penting untuk pertumbuhan organisme, tetapi dalam jumlah besar dapat menjadi racun bagi pertumbuhannya. Jenis logam berat lainnya seperti Cd, Hg, dan Pb belum diketahui manfaatnya bagi pertumbuhan organisme, bahkan keberadaan logam tersebut dapat menggantikan logam berat yang dibutuhkan oleh organisme. Interaksi logam berat dengan bahan organik yang terkandung di perairan atau proses metilasi oleh biota akan mempengaruhi tingkat keracunan logam berat tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pencemaran yang disebabkan oleh ulah manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum (30) ayat (41) sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*. (Cet I; Jakarta: PT. Pradnya Paramita.2007) h.10.

<sup>5</sup>Haryoto, "*Kinetika Bioakumulasi Logam Berat Kadmium Oleh Fitoplankton Chlorella sp Lingkungan Perairan Laut*" [http://eprints.ums.ac.id/1331/1/2.\\_HARYOTO.pdf](http://eprints.ums.ac.id/1331/1/2._HARYOTO.pdf). (10-01-2011).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

*Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>6</sup>*

Kadmium merupakan salah satu logam berat yang dapat mencemari lingkungan. Kadmium dalam air berasal dari pembuangan industri dan limbah pertambangan. Logam ini sering digunakan sebagai pigmen pada keramik, dalam penyepuhan listrik, pada pembuatan alloy, dan baterai alkali. Kadmium bersifat toksik bagi makhluk hidup. Keracunan kadmium dapat bersifat akut dan kronis. Efek keracunan yang dapat ditimbulkannya berupa penyakit paru-paru, kanker, hati, tekanan darah tinggi, gangguan pada sistem ginjal dan kelenjar pencernaan serta mengakibatkan kerapuhan pada tulang.<sup>7</sup>

Mengingat tingginya faktor resiko yang ditimbulkan pencemaran logam-logam toksik, maka upaya pengambilan ion logam toksik dari lingkungan perairan yang telah tercemar perlu terus diupayakan. Berbagai metode seperti penukar ion, penyerapan dengan karbon aktif dan pengendapan secara elektrolisis telah dilakukan untuk menyerap bahan pencemar beracun dari limbah, tetapi cara ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam pengoperasiannya. Penggunaan bahan biomaterial sebagai penyerap ion logam berat merupakan alternatif yang memberikan harapan. Sejumlah biomaterial seperti lumut, daun

---

<sup>6</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,2006). h.501

<sup>7</sup>Ella, *Op. Cit.*

teh, sekam padi, sabut kelapa sawit, limbah udang, mikroalga, cendawan, begitu juga dari bahan non biomaterial seperti perlit, tanah gambut, lumpur aktif dan lain-lain telah digunakan sebagai bahan penyerap logam-logam berat dalam air limbah.<sup>8</sup>

Pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan ion logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati (biomassa). Beberapa makroalga merupakan indikator yang baik dan efisien untuk mengetahui terjadinya pencemaran logam berat. Organisme ini dapat mengakumulasi pencemar, terdapat dalam jumlah banyak, dan korelasi antara kandungan bahan pencemar dalam air dan dalam tubuh organisme dapat ditunjukkan. Rumput laut menawarkan keuntungan untuk biosorpsi karena memiliki struktur yang makroskopis sehingga dapat digunakan sebagai biosorben.<sup>9</sup>

Dari berbagai penelitian di ketahui bahwa berbagai spesies alga terutama dari golongan alga hijau (Chlorophyta), alga coklat (Phaeophyta), dan alga merah (Rhodophyta) baik dalam keadaan hidup (sel hidup) maupun dalam bentuk sel mati (biomassa) dapat mengadsorpsi ion-ion logam. Gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam seperti yang telah dibuktikan oleh Davis, dkk., (2000) menggunakan *Sargassum* dan Figueira dkk., (2000) yang menggunakan biomassa *Durvillaea*, *Laminaria*, *Ecklonia* sebagai biosorben ion logam berat. Ladeiro, dkk., (2006)

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>*Ibid*

menggunakan makroalga *Cystoseira baccata* dan *Saragassum* sebagai biosorben untuk Cd(II) dengan studi kinetika dan kesetimbangan menunjukkan bahwa *Cystoseira baccata* mampu melakukan pengambilan logam dengan cepat, studi kinetika dan kesetimbangan menunjukkan logam yang diserap sekitar 0.9 mmol/g (101 mg/g untuk kadmium(II)).<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan informasi tentang potensi *Eucheuma cottonii* sebagai biosorben serta tentang bagaimana interaksi logam kadmium pada *Eucheuma cottonii*, karena jenis alga tersebut banyak tumbuh di perairan sulawesi selatan dan pertumbuhannya cukup cepat, sehingga kemungkinan terserapnya logam berat lebih besar. Dengan demikian rumput laut *Eucheuma cottonii* diharapkan dapat dijadikan biosorben.<sup>11</sup>

Penggunaan rumput laut sebagai biosorben telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Suhdi (2004) melakukan penelitian menggunakan rumput laut jenis *sargasum* sebagai biosorben terhadap logam Cr dengan kapasitas adsorpsi 35 mg/g. Indriani dan Akira (1998) menggunakan rumput coklat sebagai biosorben, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi rumput laut coklat terhadap logam berat sangat dipengaruhi oleh pH.<sup>12</sup>

Mengingat resiko yang dapat ditimbulkan oleh logam berat, pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>N.P. Diantariani, “Proses Biosorpsi dan Desorpsi Ion Cr (VI) pada Biosorben Rumput Laut *Eucheuma spinosum*”, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/j-kim-vol2-no1-diantariani.pdf>, (28-12-2010).

mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati (biomassa). Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam. Berkaitan dengan uraian di atas, akan dilakukan penelitian tentang pemanfaatan rumput laut *Euchema Cottonii* untuk penyerapan ion  $Cd^{2+}$ . Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas pencemaran logam berat di perairan.<sup>13</sup>

### **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Berapa kadar logam kadmium (Cd) pada air laut di Desa Sanrobone Kabupaten Takalar?
2. Berapa kadar logam kadmium (Cd) yang teradsorpsi pada alga merah *Euchema Cottonii* di laut Desa Sanrobone Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menentukan kadar logam kadmium (Cd) pada air laut di Desa Sanrobone Kabupaten Takalar dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).

---

<sup>13</sup>Yusuf, Peki. "Pemanfaatan Rumput Laut Merah (*Euchema cottonii*) Sebagai Adsorben Ion Timbal (II) Dalam Perairan". <http://httpwwwgodamagaputra.blogspot.com/2010/04/pemanfaatan-rumput-laut-euchema.html>. (12-03 2011).

2. Untuk menentukan kadar logam kadmium (Cd) yang teradsorpsi pada alga merah *Euchema Cottonii* di laut Desa Sanrobone Kabupaten Takalar dengan menggunakan SSA.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa rumput laut merupakan tanaman yang mudah menyerap logam berat, salah satunya yaitu logam kadmium (Cd) yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
2. Memberikan informasi kepada dunia industri bahwa rumput laut merupakan tanaman yang mudah menyerap logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Rumput Laut**

Rumput laut (*seaweed*) dalam bahasa ilmiah dikenal dengan istilah alga. Berdasarkan pigmen yang dikandung alga dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu Rhodopyceae (alga merah), Phaeopyceae (alga coklat), Chlorophyceae (alga hijau) dan Cyanophyceae (alga hijau biru). Rumput laut bermanfaat untuk makanan, obat dan bahan baku industri. *Euchema cottoni* (alga merah) memiliki kandungan agar yang biasanya digunakan dalam pembuatan makanan, farmasi dan industri. Saragassum (alga coklat) menghasilkan alginat. Alginat banyak digunakan untuk kosmetik, industri tekstil, menurunkan kolesterol, pengobatan anti kanker dan sebagainya.<sup>14</sup>

Rumput laut mengandung gizi yang penting untuk manusia. Komponen utama gizi rumput laut terdiri dari karbohidrat, protein, sedikit lemak dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Beberapa jenis rumput laut juga dilaporkan mengandung vitamin (A, B1, B2, B6, B12, C) dan mineral (kalsium, kalium, fosfor, natrium, zat besi dan iodium). Karbohidrat yang terdapat pada rumput laut merupakan *vegetable gum*, yaitu karbohidrat yang banyak mengandung selulosa dan hemiselulosa

---

<sup>14</sup>Dewi Rusmiati, “Uji Aktivitas Antibakteri Etanol Rumput Laut”, [http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/akt\\_anbakteri\\_ekstrak\\_rumput\\_laut.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/akt_anbakteri_ekstrak_rumput_laut.pdf). (20-01-2011)

sehingga tidak dapat dicerna seluruhnya oleh enzim di dalam tubuh. Dengan demikian, rumput laut dapat menjadi makanan diet yang mengandung sedikit kalori karena berkadar serat tinggi, serta bermanfaat pula untuk mencegah penyakit sembelit, wasir, kanker usus besar dan kegemukan.<sup>15</sup>

Rumput laut termasuk dalam jenis ganggang coklat dan ganggang merah. Alga coklat hidup di daerah yang dingin sedangkan alga merah hidup di daerah tropis. Alga hijau dan alga biru hidup dan berkembang di air tawar. Namun jenis ini kurang mempunyai arti sebagai bahan makanan. Sebaliknya alga coklat dan alga merah cukup penting sebagai bahan pangan dan non pangan. Alga mempunyai bentuk yang beragam seperti benang atau tumbuhan tinggi. Ciri utamanya, tidak mempunyai akar, batang, daun dan dinding selnya dilapisi lendir. Pertumbuhan rumput laut sangat tergantung pada sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis.<sup>16</sup>

Rumput laut memerlukan tempat menempel untuk kelangsungan hidupnya walaupun sebenarnya rumput laut tidak memiliki akar namun memiliki bagian yang menyerupai akar dan mempunyai fungsi untuk melekat, biasanya rumput laut menempel pada karang mati atau cangkang moluska, dapat juga menempel pada pasir atau lumpur. Rumput laut juga memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Tidak

---

<sup>15</sup>M.Ghufran H. Kordi K, *Budidaya Daya Biota Akuatik*. (Yogyakarta: Andi.2010) h.64.

<sup>16</sup>Taurino, Poncomulyo, dkk. *Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut*. (Jakarta : Buku Pertanian. 1993) h. 6.

seperti tumbuhan pada umumnya mendapatkan unsur hara dari tanah, rumput laut mendapat zat hara dari air disekelilingnya.<sup>17</sup>

Perairan Indonesia berpotensi besar untuk budidaya rumput laut dengan tehnik pengolahan yang mudah, penanganan yang sederhana dengan modal kecil sehingga di Indonesia berkembang industri pengolahan rumput laut. Rumput laut atau yang biasa disebut dengan *seaweed* merupakan tanaman makroalga yang hidup di laut yang tidak memiliki akar, batang dan daun sejati dan pada umumnya hidup di dasar perairan. Rumput laut juga sering disebut sebagai alga atau ganggang pada daerah-daerah tertentu di Indonesia. Fungsi dari akar, batang dan daun yang tidak dimiliki oleh rumput laut tersebut digantikan dengan thallus. Karena tidak memiliki akar, batang dan daun seperti umumnya pada tanaman lain, maka rumput laut digolongkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah (*Thallophyta*). Bagian-bagian rumput laut secara umum terdiri dari *holdfast* yaitu bagian dasar dari rumput laut yang berfungsi untuk menempel pada substrat dan thallus yaitu bentuk-bentuk pertumbuhan rumput laut yang menyerupai percabangan. Rumput laut memperoleh atau menyerap makanannya melalui sel-sel yang terdapat pada thallusnya. Nutrisi terbawa oleh arus air yang menerpa rumput laut akan diserap sehingga rumput laut bisa tumbuh dan berkembangbiak. Perkembangbiakan rumput laut melalui dua cara yaitu generatif dan vegetatif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Yusuf, Peki. "Pemanfaatan Rumput Laut Merah (*Euchema cottonii*) Sebagai Adsorben Ion Timbal (II) Dalam Perairan". <http://httpwwwgodamagaputra.blogspot.com/2010/04/pemanfaatan-rumput-laut-euchema.html>. (12-03 2011).

Alga merah merupakan kelompok alga yang jenis-jenisnya memiliki berbagai bentuk dan variasi warna. Salah satu indikasi dari alga merah adalah terjadi perubahan warna dari warna aslinya menjadi ungu atau merah apabila alga tersebut terkena panas atau sinar matahari secara langsung. Alga merah merupakan golongan alga yang mengandung karagenan dan agar yang bermanfaat untuk industri kosmetik dan makanan. Salah satu contoh rumput laut jenis alga merah yang bernilai ekonomis dan terdapat di perairan laut Indonesia adalah *Eucheuma cottoni*. Ciri-ciri umum alga merah adalah :

- a. Bentuk thalli ada yang silindris (*Gelidium latifolium*), pipih (*Gracillaria folifera*) dan lembaran (*Dictyopteris sp.*)
- b. Warna thalli bervariasi ada yang merah (*Dictyopteris sp*), pirang (*Eucheuma spinosum*), coklat (*Acanthophora muscoides*) dan hijau (*Gracillaria gigas*).
- c. Sistem percabangan thalli ada yang sederhana, kompleks dan juga ada yang berselang-seling.
- d. Mengandung pigmen fotosintetik berupa karotin, xantofil, fikobilin, dan r-fikoeritrin penyebab warna merah dan klorofil a dan d.<sup>19</sup>

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut antara lain adalah: suhu, cahaya, salinitas, kekeruhan, arus dan pH perairan.

---

<sup>19</sup>*Ibid*

a. Suhu

Suhu perairan mempengaruhi laju fotosintesis. Nilai suhu perairan yang optimal untuk laju fotosintesis berbeda pada setiap jenis. Secara prinsip suhu yang tinggi dapat menyebabkan protein mengalami denaturasi, serta dapat merusak enzim dan membran sel yang bersifat labil terhadap suhu yang tinggi. Pada suhu yang rendah, protein dan lemak membran dapat mengalami kerusakan sebagai akibat terbentuknya kristal di dalam sel. Terkait dengan itu, maka suhu sangat mempengaruhi beberapa hal yang terkait dengan kehidupan rumput laut, seperti kehilangan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, fotosintesis dan respirasi. Kisaran suhu perairan yang baik untuk rumput laut *Eucheuma* adalah 27 – 30°C.

b. Arus

Arus merupakan gerakan mengalir suatu masa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan densitas air laut dan pasang surut yang bergelombang panjang dari laut terbuka. Arus mempunyai peranan penting dalam penyebaran unsur hara di laut. Arus ini sangat berperan dalam perolehan makanan bagi alga laut karena arus dapat membawa nutrien yang dibutuhkannya. Salah satu syarat untuk menentukan lokasi *Eucheuma* adalah adanya arus dengan kecepatan 0,33 - 0,66 m/detik.

c. Salinitas

Di alam rumput laut *Eucheuma* tumbuh berkembang dengan baik pada salinitas yang tinggi. Penurunan salinitas akibat masuknya air tawar dari sungai dapat menyebabkan

pertumbuhan rumput laut *Eucheuma* sp menurun. Salinitas yang cocok untuk pertumbuhan rumput laut berkisar 31-35 ppt. Menurut Dawes (1981), kisaran salinitas yang baik bagi pertumbuhan *Eucheuma* adalah 30-35 ppt. Soegiarto *et al.* (1978) menyatakan kisaran salinitas yang baik untuk *Eucheuma* sp adalah 32 - 35 ppt.

d. pH

Keasaman atau derajat pH merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan alga laut, sama halnya dengan faktor-faktor lainnya. Kisaran pH maksimum untuk kehidupan organisme laut adalah 6,5 - 8,5.<sup>20</sup>

e. Kekeruhan

Kekeruhan adalah suatu ukuran biasan cahaya di dalam air yang disebabkan oleh adanya partikel koloid dan suspensi dari suatu polutan yang terkandung dalam air. Kekeruhan dalam perairan untuk budidaya rumput laut adalah 0 gram/liter, hal ini sangat baik untuk tanaman melakukan fotosintesis karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan mutu tanaman. Tetapi menurut Boyd dan Lichtkoppler (1982) bahwa kondisi kekeruhan yang optimal bagi tanaman rumput laut adalah kurang dari 40 *Nephelometric Turbidity Unit* (NTU).<sup>21</sup>

**B. Tinjauan Umum Tentang *Euchema Cottoni***

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Alfianingsih Alam. “Kualitas Keraginan Rumput Laut Jenis *Euchema Spinopsum* Di Perairan Desa Punaga Kabupaten Takalar”.  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21396/5/Chapter%20I.pdf>. (23 Oktober 2011).

*Eucheuma cottonii* merupakan salah satu jenis rumput laut merah (*Rhodophyceae*) dan berubah nama menjadi *Kappaphycus alvarezii* karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini secara taksonomi disebut *Kappaphycus alvarezii*. Nama daerah '*cottonii*' umumnya lebih dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional. Klasifikasi *Eucheuma cottonii* adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Rhodophyta

Kelas : Rhodophyceae

Ordo : Gigartinales

Famili : Solieriaceae

Genus : *Eucheuma*

Species : *Eucheuma alvarezii* Doty.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>Khairul Anam, "Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta", <http://khairulanam.files.wordpress.com/2010/08/pemanfaatan-rumput-laut> (20-12-2010).



**Gambar 1. Rumput Laut *Eucheuma Cottonii* (Alga Merah)**

Ciri fisik *Eucheuma cottonii* adalah mempunyai thallus silindris, permukaan licin, cartilogeneus. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Kejadian ini merupakan suatu proses adaptasi kromatik yaitu penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan. Penampakan thalli bervariasi mulai dari bentuk sederhana sampai kompleks. Duri-duri pada thallus runcing memanjang, agak jarang-jarang dan tidak bersusun melingkari thallus. Percabangan ke berbagai arah dengan batang-batang utama keluar saling berdekatan ke daerah basal (pangkal). Tumbuh melekat ke substrat dengan alat perekat berupa cakram. Cabang-cabang

pertama dan kedua tumbuh dengan membentuk rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari.<sup>23</sup>

### **1. Pemilihan Lokasi Untuk Penanaman Rumpun Laut**

Pemilihan lokasi untuk budidaya rumput laut merupakan salah satu persyaratan penting dalam keberhasilan budidaya. Lokasi yang dianggap cocok untuk budidaya rumput laut jenis *Euchema cottonii* sebagai berikut :

- a. Lokasi terlindung dari pengaruh angin dan gelombang yang besar
- b. Pergerakan arus cukup baik dengan kecepatan arus 20-40 cm/det.
- c. Salinitas berkisar 28 - 34%, dengan nilai optimum 33%.
- d. Suhu air berkisar 24 - 29°C dengan fluktuasi harian maksimal 4°C.
- e. pH air 7 – 9 dengan kisaran optimum 7,3 – 8,2.
- f. Air bersih dan bebas dari pencemaran serta tidak banyak dipengaruhi air tawar.
- g. Kedalaman air pada surut terendah paling kurang 30 – 60 cm.
- h. Dasar perairan berupa pasir bercampur pecahan-pecahan karang
- i. Lokasi mudah dijangkau serta mudah mendapatkan bahan-bahan untuk keperluan budidaya.
- j. Tersedia tenaga kerja yang cukup dan dekat dengan pemasaran hasil.<sup>24</sup>

### **2. Rumput Laut sebagai Adsorben Logam Berat**

---

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>Syahrin. *Petunjuk Teknis Budidaya Rumput Laut*. (Makassar: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Selatan. 2004). h. 2.

Pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati (biomassa). Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam. Gugus fungsi tersebut terutama adalah gugus karboksil, hidroksil, sulfidril, amino, imidazol, sulfat, dan sulfonat yang terdapat didalam dinding sel dalam sitoplasma. Rumput laut menawarkan keuntungan untuk biosorpsi karena memiliki struktur yang makroskopis sehingga dapat digunakan sebagai biosorben. Dari berbagai penelitian diketahui bahwa berbagai spesies alga terutama dari golongan alga hijau (*Chlorophyta*), alga coklat (*Phaeophyta*), dan alga merah (*Rhodophyta*) baik dalam keadaan hidup (sel hidup) maupun dalam bentuk sel mati (biomassa) dan biomassa terimmobilisasi telah mendapat perhatian untuk mengadsorpsi ion logam. Alga dalam keadaan hidup dimanfaatkan sebagai bioindikator tingkat pencemaran logam berat di lingkungan aquatik (perairan) sedangkan alga dalam bentuk biomassa dan biomassa terimmobilisasi dimanfaatkan sebagai biosorben (material biologi penyerap logam berat) dalam pengolahan air limbah. Makroalga merupakan indikator yang paling tepat dan efisien untuk pencemaran logam berat, karena mikroorganisme ini dapat mengakumulasi pencemar, terdapat dalam jumlah banyak dan korelasi antara kandungan bahan pencemar dalam air dan dalam tubuh organisme dapat

ditunjukkan.

Keuntungan pemanfaatan alga sebagai bioindikator dan biosorben adalah:

1. Alga mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam mengadsorpsi logam berat karena di dalam alga terdapat gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan dengan ion logam.
2. Bahan bakunya mudah didapat dan tersedia dalam jumlah banyak
3. Biaya operasional yang rendah
4. Tidak perlu nutrisi tambahan <sup>25</sup>

Alga dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator logam berat karena dalam proses pertumbuhannya, alga membutuhkan sebagian jenis logam sebagai nutrient alami, sedangkan ketersediaan logam di lingkungan sangat bervariasi. Suatu lingkungan yang memiliki tingkat kandungan logam berat yang melebihi jumlah yang diperlukan, dapat mengakibatkan pertumbuhan alga terhambat, sehingga dalam keadaan ini eksistensi logam dalam lingkungan adalah polutan bagi alga. Syarat utama suatu alga sebagai bioindikator adalah harus memiliki daya tahan tinggi terhadap toksisitas akut maupun toksisitas kronis. Selain memiliki daya tahan yang tinggi terhadap toksisitas logam berat, persyaratan lain untuk pemanfaatan alga sebagai bioindikator adalah :

1. Alga yang dipilih mempunyai hubungan geografis dengan lokasi yaitu berasal dari lokasi setempat, hidup di lokasi tersebut, dan diketahui radius aktivitasnya.

---

<sup>25</sup>Yusuf Peki. *Op. Cit.*

2. Alga itu terdapat dimana-mana, supaya dapat dibandingkan terhadap alga yang berasal dari lokasi lain.
3. Komposisi makanannya diketahui.
4. Populasinya stabil.
5. Pengumpulan alga mudah dilakukan.
6. Relatif mudah dikenali di alam.
7. Masa hidupnya cukup lama, sehingga keberadaannya memungkinkan

Kemampuan alga dalam menyerap ion-ion logam sangat dibatasi oleh beberapa kelemahan seperti ukurannya yang sangat kecil, berat jenisnya yang rendah dan mudah rusak karena degradasi oleh mikroorganisme lain. Untuk mengatasi kelemahan tersebut berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan mengimmobilisasi biomasnya. Immobilisasi biomassa dapat dilakukan dengan menggunakan (1) Matrik polimer seperti polietilena glikol, akrilat, (2) oksida (oxides) seperti alumina, silika, (3) campuran oksida (mixed oxides) seperti Kristal alumina silikat, asam polihetero, dan (4) Karbon.<sup>26</sup>

### **C. Logam Kadmium (Cd)**

Bahan kimia ditemukan oleh seorang ahli berasal dari Jerman bernama Friedrich Stromeyer pada tahun 1817. Diberi nama kadmium diambil dari kata kadmos, pendiri kota Thebes di Yunani. Kimia ini memiliki nomor atom 48, masuk golongan II-B, memiliki titik

---

<sup>26</sup>Eri Bachtiar, “*Penelusuran Sumber Daya Hayati Laut (Alga) Sebagai Biotarget Industri*”, <http://persijap.fileave.com/maskur/alga-laut-sebagai-biotarget-industri.pdf>, (17-01-2011).

didih 765°C dan titik cair 320,9°C. Kadmium merupakan logam yang sangat penting dan banyak kegunaannya, khususnya untuk *electroplating* (pelapis elektrik) serta galvanisasi karena kadmium (Cd) memiliki keistimewaan non korosif. Zat ini adalah logam berwarna putih, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan.<sup>27</sup>

Sumber pencemaran Cd antara lain berasal dari industry elektroplating dan galvanisasi dalam pembuatan plastik, warna cat (kuning), baterai nikel-kadmium, batu bara dan bahan bakar fosil lainnya mengandung kadmium ke dalam lingkungan. Setiap batang rokok mengandung 1-2 mg kadmium. Walaupun absorpsi cadmium melalui paru 10%, mengisap 1 bungkus rokok perhari berarti mengandung 1 mg kadmium per tahun.<sup>28</sup>

Pemanfaatan Cd dan persenyawaanya meliputi :

1. Senyawa CdS yang banyak digunakan sebagai zat warna.
2. Senyawa Cd sulfat (CdSO<sub>4</sub>) yang digunakan dalam industri baterai yang berfungsi sebagai pembuatan sel wseton karena memiliki potensial voltase stabil, yaitu 1,0186 volt.
3. Senyawa Cd-bromida (CdBr)<sub>2</sub> dan Cd-iodida (Cd-I<sub>2</sub>) yang digunakan untuk fotografi.
4. Senyawa dietil-Cd {(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Cd} yang digunakan untuk pembuatan tetraetil-Pb.

---

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Yusuf. "Pencemaran Lingkungan".  
[http://digilib.ubaya.ac.id/skripsi/farmasi/F\\_582\\_1910127/F\\_582\\_Bab%20II.pdf](http://digilib.ubaya.ac.id/skripsi/farmasi/F_582_1910127/F_582_Bab%20II.pdf). (15-03-2011).

5. Senyawa Cd-stearat untuk perindustrian manufaktur polyvinilklorida (PVC) sebagai bahan untuk stabilizer. Cd dalam konsentrasi rendah banyak digunakan dalam industri pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, pengolahan minuman serta industri tekstil.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan beraneka ragamnya penggunaan logam Cd, maka pelepasan Cd dari limbah industri ditambah Cd yang berasal dari alam akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang meluas mengingat Cd merupakan substansi yang persisten di dalam lingkungan. Cd bisa berada di atmosfer, tanah dan perairan.<sup>30</sup>

Kadmium di atmosfer berasal dari penambangan atau pengolahan bahan tambang, peleburan, galvanisasi, pabrik pewarna, pabrik baterai dan electroplating. Kadmium di tanah berasal dari endapan atmosfer, debu, air limbah tambang, pupuk limbah lumpur, pupuk fosfat dan pestisida sedangkan Cd di perairan berasal dari endapan atmosfer, debu, air, limbah tambang, air prosesing limbah dan limbah cair industri.<sup>31</sup>

Kadmium sebagai polutan yang sangat berbahaya bagi lingkungan telah diketahui sejak pertengahan tahun 1970-an dan kasus semakin meningkat dengan perkembangan ilmu kimia di akhir abad 20-an. Sampai sekarang diketahui bahwa Cd merupakan logam berat yang paling banyak menimbulkan keracunan dan sebagai pencetus karsinogen pada makhluk hidup. Kadmium dan bentuk garamnya banyak digunakan pada beberapa jenis

---

<sup>29</sup>Mukhtasor. *Pencemaran Pesisir dan Laut*. (Cet I; Jakarta: PT. Pradnya Paramita.2007) h. 64.

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

pabrik untuk proses produksinya. Industri pelapisan logam adalah pabrik yang paling banyak menggunakan kadmium murni sebagai pelapis, begitu juga pabrik yang membuat Ni-Cd baterai. Bentuk garam Cd banyak digunakan dalam proses, gelas dan campuran perak, produksi foto elektrik, foto-konduktor, dan fosforus. Cd asetat banyak digunakan pada proses industri porselen dan keramik. Keberadaan kadmium di lingkungan berhubungan erat dengan hadirnya logam Pb dan Zn. Dalam industri pertambangan Pb dan Zn, proses pemurniannya akan selalu memperoleh hasil samping kadmium yang terbuang ke lingkungan. Di perairan sebagai polutan logam berat merupakan racun kuat dan bersifat kronis bagi mamalia, ikan dan kemungkinan organisme lainnya.<sup>32</sup>

Di perairan teluk *Spencer* Australia ditemukan konsentrasi kadmium dalam rumput laut dan epibiota yang hidup disekitarnya didapatkan kandungan logam ini cukup tinggi. Kadmium di perairan itu ternyata berasal dari buangan limbah industri peleburan timbal. Epibiota yang kebanyakan jenis alga mengakumulasi Cd dari kadmium yang terlarut didalam air. Konsentrasi Cd yang tertinggi dalam sedimen ternyata bukan hanya yang berada pada lokasi dekat curahan limbah, tetapi juga ditemukan pada lumpur sekitar dimana tumbuh rumput laut jenis *Zostera mucronata*, Cd yang berlimpah di sekitar rumput laut tersebut barangkali diakibatkan oleh arus air laut yang kuat. Dari hasil kajian itu,

---

<sup>32</sup>*Ibid*

ternyata di ekosistem teluk tersebut rumput laut merupakan biota yang pertama menyerap kadmium di lingkungan perairan, kemudian terdistribusi ke biota yang lain.<sup>33</sup>

Metode yang bisa digunakan untuk membersihkan atau mengurangi pencemaran adalah dengan tanaman yang disebut fitoremediasi. Tanaman dianggap sebagai hiperakumulator Cd apabila mampu menyerap unsur Cd sebesar 100 ppm. Terdapat 400 jenis tanaman hiperakumulator. Bukan hanya mampu membersihkan logam, nonlogam, metalloid tetapi juga senyawa organik. Berdasarkan logam yang diperlukan untuk pertumbuhannya, dikenal beberapa jenis tanaman yaitu *serpentine* (memerlukan tanah yang kaya unsur Ni, Cr, Mn, Mg, Co), *seleniferous* (memerlukan tanah yang kaya unsur Se), *uraniferous* (memerlukan tanah yang kaya unsur uranium) dan *calamine* (memerlukan tanah yang kaya unsur Zn dan Cd). Berdasarkan jenis logam yang bisa diakumulasi, dikenal 3 jenis golongan tanaman, yaitu akumulator Cu/Co, akumulator Zn/Cd/Pb dan akumulator Ni.<sup>34</sup>

Proses bioremoval ion logam berat umumnya terdiri dari dua mekanisme yang melibatkan proses *active uptake* dan *passive uptake*. Pada saat ion logam tersebar di permukaan sel, ion akan mengikat bagian permukaan sel berdasarkan kemampuan daya afinitas kimia yang dimilikinya. Jenis mikroorganisme yang mampu melakukan proses bioremoval terhadap logam Cd secara *passive uptake* adalah alga *Ecklonia radiata*, fungi *Phellinus badius* dan *Pinus radiata*. Sementara itu proses bioremoval terhadap logam Cd

---

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>*Ibid*

terhadap *active uptake* adalah yeast *Saccharomyces cerevisie* dan bakteri *Citobacter sp.* Penyerapan Cd pada pH 4,5 sebesar 87 mg Cd/g untuk *Saragassum vulgare*, 80 mg Cd/g untuk *Saragassum fluitans* dan 74 mg Cd/g untuk *Saragassum filipendula*. Jenis alga yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengabsorpsi logam Cd sehingga bisa digunakan sebagai bioindikator pencemaran adalah *Chaetocorus sp*, *Euchema sp*, *Cladophora glomerata*, *Euchema isiforme*, *Saragassum sp.*<sup>35</sup>

Logam Cd mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam. Hanya ada satu jenis mineral kadmium yaitu *greenockite* (CdS) yang selalu ditemukan bersamaan dengan mineral *spalerite* (ZnS). Mineral *greenockite* sangat jarang ditemukan di alam, sehingga dalam eksploitasi logam kadmium, biasanya merupakan hasil sampingan dari peristiwa peleburan dan *refining* bijih-bijih seng (Zn). Pada konsentrat bijih seng terdapat 0,2-0,3% logam kadmium (Cd). Artinya seng (Zn) menjadi sumber utama dari logam Cd.<sup>36</sup>

### **1. Logam Cd Dalam Lingkungan**

Logam kadmium dan bentuk-bentuk persenyawaannya dapat masuk ke lingkungan, terutama sekali merupakan efek samping dari aktivitas yang dilakukan manusia. Dapat dikatakan bahwa semua industri yang melibatkan Cd dalam proses operasional industrinya menjadi sumber pencemaran Cd. Selain itu Cd juga berasal dari pembakaran sampah rumah tangga dan pembakaran bahan bakar fosil karena secara alami bahan bakar mengandung Cd, penggunaan pupuk fosfat buatan. Dalam strata lingkungan, Cd dan persenyawaannya

---

<sup>35</sup>Wahyu Widowati, dkk. *Efek Toksik Logam*. (Yogyakarta; Andi. 2008), h. 71.

<sup>36</sup>Palar. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. (Cet II; Jakarta: PT. Rineke Cipta. 2004)h. 118.

ditemukan dalam banyak lapisan. Secara sederhana dapat diketahui bahwa kandungan kadmium akan dapat dijumpai di daerah-daerah penimbunan sampah dan aliran hujan, selain dalam air buangan.<sup>37</sup>

Logam Cd juga akan mengalami proses biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Logam ini masuk ke dalam tubuh bersama makanan yang dikonsumsi, tetapi makanan tersebut telah terkontaminasi oleh logam Cd dan persenyawaannya. Dalam tubuh biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan dengan adanya proses *biomagnifikasi* di badan perairan. Di samping itu, tingkatan biota dalam system rantai makanan turut menentukan jumlah Cd yang terakumulasi. Di mana pada biota yang lebih tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi Cd yang lebih banyak, sedangkan pada biota top level merupakan tempat akumulasi paling besar. Bila jumlah Cd yang masuk tersebut telah melebihi nilai ambang batas maka biota dari suatu level atau strata tersebut akan mengalami kematian dan bahkan kemusnahan keadaan inilah yang menjadi penyebab kehancuran suatu tatanan sistem lingkungan (ekosistem), karena salah satu mata rantainya telah hilang.<sup>38</sup>

## **2. Keracunan Oleh Cd**

Keracunan yang disebabkan oleh Cd bisa bersifat akut dan kronis. Keracunan akut Cd sering terjadi pada pekerja di industri yang berkaitan dengan Cd. Peristiwa itu bisa

---

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>*Ibid*

terjadi karena para pekerja terpapar uap logam Cd atau CdO. Gejala-gejala keracunan akut Cd adalah timbulnya rasa sakit dan panas di dada. Akan tetapi, gejala keracunan tidak langsung muncul saat penderita terpapar uap Cd atau CdO. Keracunan akut muncul setelah 4-10 jam sejak penderita terpapar oleh Cd. Keracunan Cd bisa menimbulkan penyakit paru-paru akut. Keracunan akut yang disebabkan oleh uap Cd atau CdO dapat menimbulkan kematian bila konsentrasinya sebesar 2.500 – 2.900 mg/m<sup>3</sup>. Sementara itu para pekerja yang menggunakan solder dengan kandungan Cd 24% akan berusia pendek dan kematian akan segera terjadi bila konsentrasi uap solder secara keseluruhan sebesar 1 mg/m<sup>3</sup>.<sup>39</sup>

Logam berat Cd memiliki kemampuan untuk mengikat gugus S (sulfur) dan COOH dari molekul protein (asam amino dan amida). Logam berat ini juga memiliki kemampuan untuk menggantikan keberadaan logam-logam lain yang terdapat dalam metalloprotein. Sebagai contoh, untuk logam yang ada dalam suatu protein, logam Cu dapat digantikan oleh Cd sehingga peran Cu dalam pembentukan ikatan-ikatan kovalen antar molekul protein terganggu. Logam berat Cd memiliki afinitas yang tinggi terhadap unsur S yang menyebabkan Cd menyerang ikatan belerang dalam enzim, menyebabkan efektivitas kerja enzim berkurang. Gugus karboksilat (-COOH) dan amina (-NH<sub>2</sub>) juga dapat bereaksi dengan logam Cd. Logam Cd terikat pada sel-sel membrane yang menghambat proses transformasi melalui dinding-dinding sel. Metabolisme Cd berhubungan dengan metabolisme Zn, yaitu sama-sama membentuk ikatan dengan metallothionin, demikian pula

---

<sup>39</sup>Wahyu Widowati, dkk. *Op. Cit.* h. 71.

logam Cd memiliki sifat kimia yang mirip dengan Zn. Setelah toksikan Cd memasuki darah, toksikan didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Peningkatan toksikan dalam jaringan bisa menyebabkan lebih tingginya kadar toksikan dalam jaringan tersebut.<sup>40</sup>

Limbah yang banyak mengandung unsur Cd umumnya berasal dari limbah industri *electro-plating*, kendaraan, pigmen, peleburan logam, baterai dan pestisida. Kandungan Cd di laut terbuka dilaporkan berkisar 0,01-0,05 mg/l, sementara di pantai berkisar 0,05-1,0 mg/l. Pada perairan yang tercemar mencapai 10 mg/l. Faktor konsentrasi dari air laut ke plankton di laut umumnya berkisar antara 100-1000. Fitoplankton di air yang tidak tercemar mengandung Cd 300-1000 ng/g berat kering, sementara pada perairan yang tercemar dilaporkan mencapai 220.000 ng/g. Mengonsumsi ikan yang tercemar Cd dapat menyebabkan kerusakan hati.<sup>41</sup>

#### **D. Pencemaran Pesisir dan Laut**

Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain itu air laut juga sebagai tempat penerimaan polutan (bahan cemar) yang jatuh dari atmosfer. Limbah tersebut yang mengandung polutan kemudian masuk ke dalam ekosistem perairan pantai dan laut. Sebagian larut dalam air, sebagian tenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen, dan

---

<sup>40</sup>Rizald, Max Rompas, *Toksikologi Kelautan*. (Jakarta Pusat: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia. 2010), h. 71

<sup>41</sup>Mukhtasor. *Op. Cit.*

sebagian masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut (termasuk fitoplankton, ikan, udang, cumi-cumi, kerang, rumput laut dan lain-lain).<sup>42</sup>

Pencemaran logam berat terhadap lingkungan terjadi karena adanya proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut dalam kegiatan manusia, dan secara sengaja maupun tidak sengaja membuang berbagai limbah yang mengandung logam berat ke lingkungan. Daya toksisitas logam berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung pada spesies, lokasi, umur (fase siklus hidup), daya tahan (*detoksikasi*) dan kemampuan individu untuk menghindarkan diri dari pengaruh polusi. Toksisitas pada spesies biota dibedakan menurut kriteria sebagai berikut : biota air, biota darat, dan biota laboratorium. Sedangkan toksisitas menurut lokasi dibagi menurut kondisi tempat mereka hidup, yaitu daerah pencemaran berat, sedang, dan daerah nonpolusi. Umur biota juga sangat berpengaruh terhadap daya toksisitas logam, dalam hal ini yang umurnya muda lebih peka. Daya tahan makhluk hidup terhadap toksisitas logam juga bergantung pada daya detoksikasi individu yang bersangkutan, dan faktor kesehatan sangat mempengaruhi.<sup>43</sup>

Untuk terjadinya pencemaran harus ada proses masuknya polutan, baik berupa zat, makhluk hidup atau energi yang menjadi pencemar. Secara garis besar, ada dua moda atau cara bahan pencemar masuk ke lingkungan yaitu secara alami, misalnya karena gunung meletus atau gelombang tsunami yang membawa polutan ikutan ataupun melalui kegiatan manusia (*anthropogenic*), misalnya kecelakaan kapal tanker yang menyebabkan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Palar. Loc. Cit.*

pencemaran minyak tumpah ke laut, atau pembuangan bahan hasil pengerukan pelabuhan yang menyebabkan kekeruhan air laut. Sebagian besar pencemar *anthropogenic* terjadi di dalam atau dekat daerah pemukiman atau kota atau di area industri. Pada kondisi seperti ini bahan-bahan pencemar (polutan) lebih banyak terkonsentrasi di area yang memungkinkan tingkat intensitas interaksi yang relatif tinggi antara polutan dengan manusia. Sebagian polutan menyebabkan kontaminasi pada area dimana polutan tersebut dihasilkan, sebagian lain terbawa oleh transportasi angin atau aliran air dan terdistribusi sampai area yang jauh.

44

Seperti pada kasus cemaran logam berat pada suatu lingkungan laut. Unsur-unsur logam berat ini dapat masuk ke dalam tubuh organisme laut dengan tiga (3) mekanisme yaitu melalui rantai makanan, insang dan difusi melalui permukaan kulit. Sebagian besar logam berat masuk ke dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, dan hanya sedikit yang diambil langsung dari air. Fitoplankton yang merupakan awal dari rantai makanan akan dimangsa oleh zooplankton dan zooplankton akan dimangsa oleh ikan-ikan besar dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya pemangsa yang berukuran lebih besar seperti ikan cucut pedang atau ikan tuna akan mengandung kadar logam berat yang lebih tinggi. Tetapi kandungan logam yang tertinggi umumnya ditemukan pada invertebrata jenis *filter feeder*, seperti kerang-kerangan dan tiram. Akumulasi ini terjadi karena logam berat dalam tubuh organisme cenderung membentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik yang terdapat

---

<sup>44</sup>*Ibid*

dalam tubuh organisme. Dan selanjutnya akan terfikasi dan tidak diekskresikan oleh organisme tersebut. Tingkat bioakumulasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kenaikan suhu, penurunan pH dan salinitas perairan.<sup>45</sup>

Dilihat dari segi substansi limbah sebagai suatu kesatuan (as a whole), sumber-sumber limbah yang mencemari pesisir dan laut dapat digolongkan menjadi:

- a. Limbah rumah tangga
- b. Limbah lumpur
- c. Limbah industri
- d. Limbah padat
- e. Limbah kapal
- f. Limbah pertanian
- g. Pestisida
- h. Buangan dari pengerukan
- i. Limbah eksplorasi dan produksi minyak
- j. Tumpahan minyak
- k. Limbah radioaktif
- l. Limbah panas
- m. Sedimen dari daratn melalui air hujan
- n. Cat *antifouling* (pencegah binatang penempel) dari kapal

---

<sup>45</sup>*Ibid*

o. Tailing

p. Limbah perikanan<sup>46</sup>

pada limbah industri seringkali terdapat bahan pencemar yang sangat membahayakan seperti logam berat. Di lingkungan perairan laut, logam-logam tersebut dapat diserap oleh biota laut (ikan, udang dan moluska) melalui permukaan tubuh (kutikula), insang dan saluran pencernaan. Dalam tubuh biota laut logam berat akan tertimbun di dalam jaringannya terutama hati dan ginjal. Hal ini terjadi karena sifat logam berat yang tidak dapat terurai dan mudah diabsorpsi oleh biota laut sehingga terakumulasi dalam tubuh.<sup>47</sup>

Berdasarkan FAO/WHO, nilai ambang batas kadar logam kadmium yang diperbolehkan dalam tubuh hewan laut yang dapat dikonsumsi manusia yakni 0,1 ppm. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia No. 01-3548-1994 tentang batas maksimum cemaran logam pada makanan yang diperbolehkan untuk logam kadmium adalah sebesar 0,2 (ppm). Apabila kadmium yang terkandung dalam makanan dikonsumsi terus menerus maka akan terakumulasi di berbagai jaringan tubuh dan dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan konsumen. Dampak tersebut berupa kerapuhan tulang dan resiko fraktur, kerusakan sistem reproduksi dan respirasi, anemia serta hipertensi.<sup>48</sup>

#### **E. Adsorpsi**

---

<sup>46</sup>*Ibid*

<sup>47</sup>*Palar. Loc. Cit.*

<sup>48</sup>*Ibid*

Adsorpsi adalah peristiwa terkonsentrasinya suatu zat pada permukaan zat lain. Zat yang menyerap disebut adsorben sedangkan zat yang diserap seperti molekul, atom atau ion disebut adsorbat. Terjadinya proses adsorpsi melibatkan gaya-gaya intermolekul seperti, gaya elektrostatis, gaya London serta antraksi ion-ion yang terdapat pada adsorben maupun adsorbat, sehingga proses adsorpsi akan melibatkan perubahan energi.<sup>49</sup>

Alberty dan Silbey (1992), menyatakan bahwa adsorpsi secara umum dapat didefinisikan sebagai akumulasi sejumlah molekul (senyawa, ion maupun atom) yang terjadi pada batas antara dua fasa. Adsorpsi dapat terjadi antara dua fasa seperti antara fasa cair-padat, fasa gas-padat, dan fasa gas-cair. Berdasarkan besarnya interaksi antara adsorben dan adsorbat, maka adsorpsi dapat dibedakan menjadi adsorpsi kimiawi dan adsorpsi fisikawi. Adsorpsi kimia melibatkan pembentukan ikatan kimia, meskipun pada umumnya tidak ada perbedaan yang sangat jelas antara kedua jenis adsorpsi ini kecuali perubahan entalpinya dimana perubahan entalpi kimia lebih besar dari pada adsorpsi fisika yaitu berkisar 40 sampai 200 kJ/mol. Adsorpsi kimia bergantung pada energi aktivasi (energi minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya adsorpsi). Besarnya energi adsorpsi menyebabkan adsorbat sangat sukar untuk dilepaskan dari permukaan adsorben, sedangkan banyaknya molekul yang teradsorpsi merupakan fungsi tekanan, konsentrasi dan suhu. Adsorpsi fisikawi merupakan proses yang sangat reversible, dengan waktu kesetimbangan yang tercapai segera setelah adsorbat bersentuhan dengan adsorben, di samping itu terjadi

---

<sup>49</sup>Yusuf Pekei. *Op. Cit.*

adsorpsi berlangsung dalam beberapa lapisan monomolekuler yang membutuhkan kondisi tekanan dan temperatur tertentu.<sup>50</sup>

Proses adsorpsi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. pH

pH mempunyai pengaruh besar dalam proses adsorpsi karena pH mampu mempengaruhi terjadinya interaksi ion logam dengan gugus aktif adsorben.

b. Konsentrasi logam

Konsentrasi logam sangat berpengaruh terhadap penyerapan logam oleh adsorben. Pada permukaan penyerap, dalam hal ini biomassa terimobilisasi terdapat sejumlah sisi aktif yang proporsional dengan luas permukaan penyerap. Jadi dengan memperbesar konsentrasi larutan serapan logam akan meningkat secara linier hingga konsentrasi tertentu. Silika gel, stirena, divinilbenzena, dan polisulfon akan bekerja baik dengan konsentrasi logam sebesar 5 ppm.

c. Waktu Kontak

Waktu kontak antara adsorbat dengan adsorben selama proses adsorpsi berlangsung dipertahankan konstan.

d. Tumbukan Antar Partikel

Proses adsorpsi tergantung pada banyaknya tumbukan yang terjadi antara partikel-partikel adsorbat dan adsorben. Tumbukan antar partikel ini dapat dipercepat dengan adanya kenaikan suhu.

---

<sup>50</sup>*Ibid*

e. Karakteristik dari adsorben

Ukuran partikel dan luas permukaan adsorben akan mempengaruhi proses adsorpsi. Semakin kecil ukuran partikel akan semakin cepat proses adsorpsi yang terjadi dan semakin besar luas permukaan adsorben maka penyerapan yang terjadi semakin merata.<sup>51</sup>

**F. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)**

SSA adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan (absorpsi) radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Sekitar 67 unsur telah dapat ditentukan dengan cara SSA. Banyak penentuan unsur-unsur logam yang sebelumnya dilakukan dengan metoda polarografi, kemudian dengan metoda spektrofotometri UV-VIS, sekarang banyak diganti dengan metoda SSA.<sup>52</sup>

SSA digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam dalam jumlah renik karena mempunyai kepekaan tinggi. Cara analisis dengan alat ini akan didapatkan kadar total unsur dalam cuplikan. Untuk analisis suatu logam tentu dapat dilakukan dengan campuran unsur-unsur lain tanpa dilakukan pemisahan terlebih dahulu.<sup>53</sup>

**1. Prinsip Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)**

---

<sup>51</sup>Lies Triani. “Desorpsi Ion Logam Tembaga (II) dari Biomassa *Chlorella sp* Yang Terimobilisasi dalam Silika Gel”. <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH8039.dir/doc.pdf> (17-01-2011).

<sup>52</sup>Anonim. “Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)”, 14 Maret 2010. <http://chicamayonnaise.blogspot.com/2010/03/spektrofotometri-serapan-atom-aas.html> (17 Maret 2011).

<sup>53</sup>Lies Triani. *Loc. Cit.*

Teknik Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) didasarkan pada penyerapan energi oleh elektron valensi dari atom keadaan dasar, yang akibatnya menaikkan elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi atau keadaan tereksitasi. Energi yang diserap disebut energi eksitasi. Dalam proses absorpsi, atom berubah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, ini yang dikenal dengan istilah transisi elektronik. Atom yang berbeda membutuhkan energi eksitasi berbeda pula dan dalam Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) tingkat energi yang diperlukan adalah daerah UV-Vis yang panjang gelombangnya antara 200-600 nm. Energi yang dibutuhkan ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya nyala atau pemanasan dengan arus listrik. Pada Spektrofotometri Serapan Atom (SSA), energi yang dibutuhkan adalah radiasi yang berasal dari sumber cahaya buatan, memancarkan radiasi panjang gelombang atom yang dianalisis sehingga dapat diserap. Jumlah total radiasi yang diserap oleh atom tergantung pada berapa banyak atom yang menyerap radiasi tersebut.<sup>54</sup>

Pada Spektrofotometri Serapan Atom (SSA), larutan yang dianalisis diaspirasikan ke dalam spektrometer membentuk disperse aerosol, lalu masuk ke dalam nyala dimana sampel akan terdisosiasi menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Radiasi dari lampu pada panjang gelombang yang dapat menganalisis atom dalam sampel, dilewatkan ke dalam nyala dimana radiasi tersebut akan diserap sebagian energinya oleh atom analit. Radiasi

---

<sup>54</sup>Alfian Noor, *Kimia Analisis Unsur Runut* (Ed. Kedua; Makassar: Yayasan Mitra Sains Indonesia, 2002), h. 123.

yang terserap dapat diukur berdasarkan selisih antara dan sesudah penyerapan dan tentunya seimbang dengan konsentrasi analit.

Bahan bakar yang digunakan pada SSA adalah propana, butana, hidrogen dan asetilen, sedangkan oksidatornya adalah udara, oksigen, N<sub>2</sub>O dan asetilen. Logam-logam yang mudah diuapkan seperti Cu, Pb, Zn, Cd umumnya ditentukan pada suhu rendah sedangkan untuk logam-logam yang tak mudah diatomisasi diperlukan suhu tinggi. Suhu tinggi dapat dicapai dengan menggunakan suatu oksidator dengan gas pembakar, sedangkan untuk atomisasi unsur alkali yang membentuk refraktori harus menggunakan campuran asetilen udara.<sup>55</sup>

Ditinjau dari hubungan antara konsentrasi dan absorbansi, maka hukum *Lambert-Beer* dapat digunakan jika sumbernya adalah monokromatis. Berikut persamaan hukum *Lambert*

$$A = a \cdot b \cdot C$$

Dimana,

A = Absorban

a = absortivitas

b = panjang sinar yang melauai sampel

C = konsentrasi

---

<sup>55</sup>Khopkar. *Konsep Dasar Kimia Analitik* (Jakarta: UI-Press, 2007), h. 275 – 276.

Pada SSA, panjang gelombang garis absorpsi resonansi identik dengan garis-garis emisi disebabkan keserasian transisinya. Untuk bekerja pada panjang gelombang ini diperlukan suatu monokromator celah yang menghasilkan lebar puncak sekitar 0,002-0,005 nm. Pada teknik spektrofotometri serapan atom (SSA), diperlukan sumber radiasi yang mengemisikan sinar pada panjang gelombang yang tepat pada proses absorpsinya. Dengan cara ini efek pelebaran puncak dapat dihindarkan.<sup>56</sup>

## 2. Komponen Alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)

Komponen dasar suatu alat Spektrofotometri Serapan Atom adalah :

a. Sumber sinar ( lampu katoda berongga)

Berguna memancarkan sinar dengan panjang gelombang yang tepat sama dengan panjang gelombang logam yang dianalisis.

b. Nyala api (flame)

Untuk mengubah unsur logam yang di analisis menjadi atom-atom netral yang masih berada dalam tingkat encer dasar. Proses ini disebut pengatoman atau atomisasi.

c. Monokromator

Untuk meneruskan panjang gelombang emisi dari lampu katoda berongga yang diadsorpsi paling kuat oleh atom di dalam nyala api (panjang gelombang maksimum)

---

<sup>56</sup> *Ibid*

dan menahan garis-garis emisi lain dari lampu katoda berongga yang tidak digunakan dalam analisis.

d. Detektor

Untuk mengamati atau mendeteksi datangnya berkas sinar dari sistem monokromator dan mengubah energi sinar yang masuk menjadi energi listrik yang sebanding.

e. Amplifier

Untuk menggerakkan sistem elektronik digital atau menggerakkan pada rekorder.

f. Recorder

Sebagai alat pencat

g. Spray chamber (ruang penyemprot/pengabut)

Untuk membuat campuran yang homogen dari gas oksigen plus bahan bakar plus aerosol yang mengandung larutan contoh, yaitu sebelum campuran ini menjadi burnernya.


h. Nebulizer (ruang pengabut)

Untuk mengubah larutan yang diisap melalui pipa kapiler menjadi aerosol (kabut atau butiran-butiran cairan halus).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Salila, Musri. Spektrofotometri Serapan Atom.  
<http://Tinangkung.blogspot.com/2010/04/spektrofotometri-serapan-atom>. 17 Januari 2011.

Alat spektrofotometer serapan atom terdiri dari rangkaian dalam diagram skematik berikut:



Gambar 2. Komponen Spektrofotometer Serapan Atom<sup>58</sup>

Keterangan : 1. Sumber sinar

2. Pemilah (*Chopper*)

3. Nyala

4. Monokromator

5. Detektor

6. Amplifier

7. Rekorder

Berbagai faktor dapat mempengaruhi pancaran nyala suatu unsur tertentu dan menyebabkan gangguan pada penetapan konsentrasi unsur.

1. Gangguan akibat pembentukan senyawa refraktori.

Gangguan ini dapat diakibatkan oleh reaksi antara analit dengan senyawa kimia, biasanya anion yang ada dalam larutan sampel sehingga terbentuk senyawa yang tahan

---

<sup>58</sup>Vina Azis, "Analisis Kandungan Sn, Zn dan Pb dalam Susu Kental Manis Kemasan Kaleng Secara Spektrofotometer Serapan Atom", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kimia dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007), h. 20-21.

panas (refractory). Sebagai contoh fosfat akan bereaksi dengan kalsium dalam nyala menghasilkan pirofosfat ( $\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ). Hal ini menyebabkan absorpsi ataupun emisi atom kalsium dalam nyala menjadi berkurang. Gangguan ini dapat diatasi dengan menambahkan stronsium klorida atau lanthanum nitrat ke dalam larutan. Kedua logam ini mudah bereaksi dengan fosfat dibanding dengan kalsium sehingga reaksi antara kalsium dengan fosfat dapat dicegah atau diminimalkan. Gangguan ini dapat juga dihindari dengan menambahkan EDTA berlebih. EDTA akan membentuk kompleks kelat dengan kalsium, sehingga pembentukan senyawa refraktori dengan fosfat dapat dihindarkan. Selanjutnya kompleks Ca-EDTA akan terdisosiasi dalam nyala menjadi atom netral Ca yang menyerap sinar. Gangguan yang lebih serius terjadi apabila unsur-unsur seperti: Al, Ti, Mo, V dan lain-lain bereaksi dengan O dan OH dalam nyala menghasilkan logam oksida dan hidroksida yang tahan panas. Gangguan ini hanya dapat diatasi dengan menaikkan temperatur nyala, sehingga nyala yang umum digunakan dalam kasus semacam ini adalah nitrous oksida-asetilen.

## 2. Gangguan ionisasi

Gangguan ionisasi ini biasa terjadi pada unsur-unsur alkali tanah dan beberapa unsur yang lain. Karena unsur-unsur tersebut mudah terionisasi dalam nyala. Dalam analisis dengan AAS yang diukur adalah emisi dan serapan atom yang tak terionisasi. Oleh sebab itu dengan adanya atom-atom yang terionisasi dalam nyala akan mengakibatkan sinyal yang ditangkap detektor menjadi berkurang. Namun demikian gangguan ini bukan

gangguan yang sifatnya serius, karena hanya sensitivitas dan linearitasnya saja yang terganggu. Gangguan ini dapat diatasi dengan menambahkan unsur-unsur yang mudah terionisasi ke dalam sampel sehingga akan menahan proses ionisasi dari unsur yang dianalisis.

### 3. Gangguan fisik alat

Gangguan fisik adalah semua parameter yang dapat mempengaruhi kecepatan sampel sampai ke nyala dan sempurnanya atomisasi. Parameter tersebut adalah kecepatan alir gas, berubahnya viskositas sampel akibat temperatur nyala. Gangguan ini biasanya dikompensasi dengan lebih sering membuat kalibrasi atau standarisasi.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini digunakan AAS Varian 240. AAS Varian 240 adalah AAS yang dalam operasinya antara nyala api dan tungku grafit terjadi secara simultan. AAS Varian 240 memberikan operasi simultan dari dua atomizers yang dipasang secara permanen dari satu komputer pusat, sehingga menghasilkan operasi yang lebih fleksibel. AAS Varian 240 memiliki keunggulan dari tipe lain dan alat ini mampu mengerjakan lebih dari satu sampel dan semua hasil analisisnya dapat diperoleh dengan cepat yakni hanya dalam waktu 2 menit.

---

<sup>59</sup>Nina Titarsole. *Spektrofotometri Serapan Atom*. 20 Mei 2009. <http://Vittitarsole.blogspot.com/2009/05/spektrofotometri-serapan-atom.html>. 17 Januari 2011.

SSA varian 240 dikendalikan oleh perangkat lunak yang memberikan instrumen cepat, operasi mudah dan pengembangan metode sederhana untuk pengguna pemula dan ahli.<sup>60</sup>



Gambar 3. Alat Atomic Absorbant Spectrofotometer Varian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A R A S S A R

**BAB III**

---

<sup>60</sup>Anonim, *Varian Atomic Absorption Spectrofotometers*, [http://www.labcompare.com/144 Atomic Absorption Spectrophotometer Spectrometers-AAS/1000-AA-Duo-AAS Simultaneous-Flame-Graphite-Furnace-Atomic-Absorption-Spectrometer](http://www.labcompare.com/144-Atomic-Absorption-Spectrophotometer-Spectrometers-AAS/1000-AA-Duo-AAS-Simultaneous-Flame-Graphite-Furnace-Atomic-Absorption-Spectrometer) (23 Februari 2011)

## **METODE PENELITIAN**

### ***A. Waktu dan Tempat penelitian***

Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu dimulai pada bulan September 2011 sampai bulan November 2011. Sampel diambil langsung di desa Sanrobone Kabupaten Takalar dan penelitiannya dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik, Fakultas Sains dan Teknologi lantai dasar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### ***B. Alat dan Bahan***

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

#### **1. Alat**

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), turbidimeter, salinometer, pH meter, penangas listrik, alat gelas yang umum digunakan di laboratorium, neraca analitik, furnase, oven, corong, cawan porselin, pipet skala, bulp, batang pengaduk, mortar dan lumping, spatula, wadah untuk sampel air laut dan wadah untuk sampel rumput laut.

#### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut jenis *Euchema cottonii*, larutan induk  $\text{Cd}^{2+}$  1000 ppm,  $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ , aquabides, HCl 1 N,  $\text{HNO}_3$  65% , aluminium foil, air laut, kertas saring dan tissue.

### ***C. Prosedur Kerja***

#### **1. Penentuan Lokasi**

Penentuan titik lokasi dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan dari lokasi penelitian secara keseluruhan berdasarkan karakteristik wilayah perairan yang mewakili. titik lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan sejajar garis pantai. Pengambilan data akan dilakukan di tiga titik lokasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. titik lokasi I yaitu pada Dusun Papanambea, titik lokasi II yaitu pada Dusun Je'ne dan pada titik lokasi III yaitu berada pada Dusun Parappa. Pengambilan sampel dilakukan dengan tiga kali ulangan dan sampel yang diambil adalah yang siap panen.

#### **2. Sampling**

##### **a. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan dengan tiga (3) titik yang berbeda yaitu pada titik lokasi I yaitu pada Dusun Papanambea dengan jarak dari tepi pantai yaitu 25 meter dengan kedalaman 80 cm, titik lokasi II yaitu pada Dusun Je'ne dengan jarak dari tepi pantai yaitu 25 meter dengan kedalaman 70 cm dan pada titik lokasi III yaitu berada Dusun Parappa dengan jarak dari tepi pantai yaitu 25 meter dengan kedalaman 120 cm. Jarak antara Dusun Je'ne ke Dusun Papanambea adalah 200 meter dan jarak antara

Dusun Papanambea ke Dusun Parappa adalah 280 meter. Pengambilan sampel dilakukan dengan satu (1) kali pengambilan pada tiga (3) titik lokasi ini.

b. Cara Pengambilan

Pengambilan sampel alga *Euchema Cottonii* dan air laut, diambil langsung pada air laut dengan menggunakan keranjang untuk sampel alga *Euchema Cottonii* dan untuk air laut menggunakan botol aqua. Botol aqua dibersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan air laut yang akan diambil. Kemudian botol aqua dimasukkan ke dalam air laut secara perlahan-lahan dan hindarkan terjadinya turbulensi di dalam botol aqua. Titik pengambilan air laut sama dengan titik pengambilan alga *Euchema Cottonii*.

c. Waktu Pengambilan

Waktu pengambilan sampel dilakukan pada jam yang berbeda-beda yaitu pada titik lokasi pertama yang berada pada bagian tengah pada jam 12.00, pada titik lokasi kedua yang berada pada pojok kiri pada jam 13.00 dan pada titik lokasi yang ketiga pada pukul 14.00. Hal ini dilakukan karena pada pukul 12.00-14.00 air laut sudah mulai surut.

**3. Prosedur Penelitian**

Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

a. Pembuatan Larutan Induk  $\text{Cd}^{2+}$  1000 ppm

Larutan induk  $\text{Cd}^{2+}$  1000 ppm dibuat dengan cara melarutkan 0,5258 gram  $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$  dalam labu takar 1000 mL, kemudian ditambahkan aquabidest sampai tanda batas.

b. Pembuatan Larutan Standar Kadmium (Cd) 100 ppm

Larutan standar Cd 1000 ppm dipipet 10 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan dengan aquabides kemudian diencerkan sampai tanda batas.

c. Pembuatan Deret Standar Cd 100 ppm dari 1000 ppm

Membuat deret standar dari 2, 4, 6, 8 dan 10 ppm, dibuat dengan cara memipet 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml dan 10 ml ke dalam labu takar 100 ml kemudian ditambahkan dengan aquabides pada tiap labu takar tersebut kemudian diencerkan sampai tanda batas. Selanjutnya diuji dengan AAS untuk menganalisa logam Cd dalam air laut.

d. Tempat Pengambilan Sampel

1. Tempat pengambilan sampel ini yaitu di Desa Sanrobone, Kabupaten Takalar. Alga yang akan dianalisis adalah alga merah jenis *Euchema Cottoni*.
2. Mengambil rumput laut basah sebanyak 2 kg yang ditanam pada Dusun Papanambea, pada Dusun Je'ne dan pada Dusun Parappa serta air laut sebanyak 1 liter untuk dianalisis kadar logamnya. Air laut yang diambil adalah air laut tempat pengambilan sampel.

3. Menganalisis terlebih dahulu kadar logam berat Cd yang terkandung pada sampel air laut sebelum menganalisis lainnya.
- e. Menganalisis kadar logam berat yang terkandung pada air laut yang diambil pada ketiga titik lokasi tersebut, dengan cara:
1. Sampel (air laut) sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia
  2. kemudian ditambahkan dengan asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) pekat sebanyak 5 ml
  3. Campuran diaduk hingga homogen, setelah itu dipanaskan menggunakan penangas listrik sampai 20 ml.
  4. Larutan hasil destruksi ini kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diimpitkan dengan aquabides sampai tanda batas. Selanjutnya diuji dengan AAS untuk menganalisa logam Cd dalam air laut.
  5. Perlakuan ini dilakukan secara duplo pada masing-masing air laut yang diambil pada 3 titik lokasi.
- f. Menganalisis kadar logam berat yang terkandung pada alga yang diambil pada 3 titik lokasi dengan cara:
1. Sampel dibersihkan dari material pengotor dengan menggunakan aquabidest kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu  $140^\circ\text{C}$  selama 2 jam.
  2. Sampel yang sudah kering ini kemudian dihancurkan menjadi serbuk dan dihomogenisasi dengan mortar lalu disimpan dalam kantong plastik sampai analisis dilakukan.

3. Sampel yang kering ini ditimbang sebanyak 5 gram dalam cawan porselin bersih, lalu diabukan dalam furnace pada suhu  $400^{\circ}\text{C}$  selama 20 jam (sampai menjadi abu).
4. Setelah menjadi abu kemudian abu ini ditambah dengan 2 ml larutan asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) pekat dalam beker gelas dan dipanaskan dengan menggunakan hot plate sampai hamper kering.
5. Sampel didinginkan pada suhu kamar.
6. Sampel yang telah kering ditambahkan HCl 1 N sedikit demi sedikit hingga sampel dapat larut sempurna.
7. Larutan sampel disaring dengan menggunakan kertas saring whatman 42 dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dengan menggunakan corong.
8. Cawan petri dicuci sebanyak 3 kali dengan aquabidest kemudian filtratnya dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml.
9. Diencerkan dengan aquabidest hingga tanda batas. Larutan yang diperoleh yaitu larutan jernih kekuningan dan siap dianalisis dengan menggunakan SSA.
10. Langkah diatas diulang sebanyak dua (2) kali. Demikian juga untuk titik lokasi yang ke 2 dan ke 3.

#### **4. Pengukuran Parameter**

Parameter yang diukur adalah suhu, pH, salinitas dan kekeruhan. Metode pengukuran parameter adalah sebagai berikut :

a. Suhu

Suhu diukur dengan menggunakan termometer dan dilakukan langsung di lapangan pada setiap titik lokasi. Sampel air dimasukkan dalam wadah yang telah disediakan selanjutnya mencelupkan termometer dan kemudian mencatat skala suhu yang terbaca.

b. Kekeruhan

Pengukuran kekeruhan dilakukan dengan menggunakan turbidimeter. Sampel air diambil pada kolom perairan kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk diukur di laboratorium.

c. pH

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Sampel air diambil pada kolom perairan kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk diukur di laboratorium.

d. Salinitas

Salinitas diukur dengan menggunakan *salinometer* dan dilakukan langsung di lapangan pada setiap titik lokasi. Sampel air diambil kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan selanjutnya mencelupkan *salinometer*. Setelah itu mencatat nilai salinitas yang terlihat pada *salinometer*.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Analisis Logam Cd Pada Air Laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar**

Hasil pengukuran pada serapan air laut untuk analisis logam Cd di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dengan metode spektrofotometri serapan atom dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Kadar rata-rata Cd pada air laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Sampel	Kosentrasi Logam Kadmium (ppm)								Rata – Rata
	Air Laut Dusun Papanambea		Rata-Rata	Air Laut Dusun Je'ne		Rata – Rata	Air Laut Dusun Parappa		
	1	2		1	2		1	2	
Air Laut	0,07	0,07	0,07	0,05	0,09	0,07	0,11	0,04	0,075

Pada tabel 1 memperlihatkan besarnya kadar Cd pada air laut yang ada di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Dari hasil ini dapat dilihat

besarnya kadar Cd pada air laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar sudah melewati standar yang ditetapkan PP RI No. 20/1990 yaitu 0,01 ppm.

## 2. Analisis Logam Cd Pada Rumput Laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

Hasil pengukuran serapan pada rumput laut untuk analisis logam Cd di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dengan metode spektrofotometri serapan atom dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Kadar rata-rata Cd pada rumput laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

Sampel	Kosentrasi Logam Kadmium (ppm)								Rata – Rata
	Rumput Laut Dusun Papanambea		Rata-Rata	Rumput Laut Dusun Je'ne		Rata – Rata	Rumput Laut Dusun Parappa		
	1	2		1	2		1	2	
Rumput Laut	0,30	0,32	0,31	0,32	0,34	0,33	0,28	0,27	0,275

Pada tabel 2 memperlihatkan besarnya kadar Cd pada rumput laut yang ada di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa besarnya kadar Cd pada rumput laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar telah melewati standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional

Indonesia No. 01-3548-1994 tentang batas maksimum cemaran logam pada rumput laut yang diperbolehkan untuk logam kadmium adalah sebesar 0,2 ppm.

### 3. Parameter Perairan di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

Hasil pengukuran parameter pada air laut di Desa sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Parameter yang diukur adalah suhu, kekeruhan, pH dan salinitas. Hasil pengukuran dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Nilai rata-rata suhu, kekeruhan, pH dan salinitas di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

Parameter	Dusun Papanambea	Dusun Je'ne	Dusun Parappa
Suhu (°C)	31	33	31
Kekeruhan (NTU)	9,28	9,87	4,28
pH	6,70	6,67	6,76
Salinitas (‰)	30	30	30

### 4. Parameter Pada Air Laut, Kadar Cd Pada Air Laut dan Kadar Cd Pada Rumput Laut di Desa sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Hasil pengukuran parameter pada air laut, kadar Cd pada air laut dan kadar Cd pada rumput laut dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Nilai rata-rata parameter, kadar rata-rata Cd pada air laut dan kadar rata-rata Cd pada rumput laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

Parameter	Dusun Papanambea	Dusun Je'ne	Dusun Parappa
Suhu (°C)	31	33	31
Kekeruhan (NTU)	9,28	9,87	4,28
pH	6,70	6,67	6,76
Salinitas (‰)	30	30	30
Air Laut	0,07	0,07	0,075
Rumput Laut	0,31	0,33	0,275

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Kandungan Logam Cd Pada Air Laut

Pencemaran laut adalah menurunnya kualitas air laut karena aktivitas manusia baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja memasukkan zat-zat pencemar dalam jumlah tertentu ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) sehingga menimbulkan akibat

yang negatif bagi sumber daya hayati dan nabati di laut, kesehatan manusia, aktivitas manusia di laut dan terhadap kelangsungan hidup dari sumber daya hidup di laut.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini proses destruksi menggunakan asam nitrat, hal ini dikarenakan dalam keadaan panas asam ini merupakan oksidator kuat yang dapat melarutkan hampir semua logam dan dapat mencegah pengendapan unsur. Dengan pemanasan hingga mendidih, proses destruksi akan lebih cepat berlangsung. Pemanasan dilakukan hingga larutan kira-kira tinggal 10 mL.<sup>62</sup>

Kadar Cd pada air laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yaitu pada air laut yang berada pada Dusun Papanambea sebesar 0,07, Dusun Je'ne sebesar 0,07 dan Dusun Parappa sebesar 0,075. Hasil ini telah melewati ambang batas yang telah ditetapkan oleh PP RI No. 20/1990 yaitu 0,01 ppm. Hal ini disebabkan karena laut yang memang kurang baik dan kegiatan pemeliharaan yang tidak seksama membuat kualitas air laut menjadi tercemar dan buruk sehingga berdampak pada kualitas hewan yang ada di laut termasuk rumput laut. Selain itu menurut peneliti sebelumnya menyatakan bahwa air laut di Takalar memang sudah tercemar logam Cd.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Rizald, Max Rompas, *Toksikologi Kelautan*. (Jakarta Pusat: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia. 2010),

<sup>62</sup>Rum Hastuti, "*Efek Destruksi Terhadap Penentuan Kadar Cu(II) Dalam Air Sumur, Air Laut Dan Air Limbah Pelapisan Krom Menggunakan AAS*". <http://www.google.co.id>. Efek Destruksi Terhadap Penentuan Kadar Cu(II) Dalam Air Sumur Air Laut Dan Air Limbah Pelapisan Krom Menggunakan AAS. (23-10-2011).

<sup>63</sup>Tim Laboratorium Uji BBAP Takalar. "*Monitoring Kualitas Ikan Dan Lingkungan Kawasan Budidaya*. (Departemen Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Balai Budidaya Air Payau Takalar", 2008). <http://www.Slideshare.net>. (23 Oktober 2011).

Apabila air laut yang digunakan untuk budidaya rumput laut telah mengandung logam Cd diatas ambang batas maka akan menyebabkan kurang produktifnya laut tersebut karena laju pertumbuhan rumput laut tidak optimal.<sup>64</sup> Akibat dari laju pertumbuhan rumput laut yang tidak optimal ini yaitu percabangannya kurang banyak, terdapat bercak dan terjadi perubahan warna. Sedangkan pada lingkungan yang tidak tercemar maka rumput lautnya bercabang banyak dan rimbun, tidak terdapat bercak, tidak terkelupas, warna spesifik cerah, umur 25 – 35 hari, berat bibit 50 – 100 gram per rumpun. Hal ini terjadi karena rumput laut sebagai pengadsorpsi logam-logam berat yang ada disekitarnya, terkhususnya yaitu logam Cd karena Cd di air akan masuk dan terakumulasi di thallusnya sehingga mengakibatkan proses metabolismenya tidak berfungsi.<sup>65</sup>

## 2. Analisis Kandungan Logam Cd Pada Rumput Laut

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh adanya bahan pencemar yang mengandung logam berat membahayakan bagi hidup dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur logam berat yang masuk ke organisme laut dengan tiga cara yaitu melalui rantai makanan, insang dan difusi permukaan kulit.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Tarzan Purnomo dan Muchyidin, “*Analisis Kandungan Timbal Pada Ikan Bandeng di Tambak Kecamatan Gresik*”. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya 14, no. 1 Juli (2007): h.68

<sup>65</sup>Team AGP. “**Budidaya Rumput Laut dengan Metode Lepas Dasar Sebagai Pekerjaan Sambilan Nelayan yang Menguntungkan**”. <http://www.arthagrahapeduli.org/index.php?> Abudi-daya-rumput-laut. (23 Oktober 2011).

<sup>66</sup>Hadija. “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Darah (Anadara Granosa) di Teluk Kendari Sulawesi Tenggara”. (Jurusan Biologi FMIPA, 2008). Diakses 12 Desember 2010

Berbeda dengan Zn dan Cu, logam Cd merupakan logam non esensial yang keberadaannya dalam tubuh makhluk hidup dapat dikatakan tidak diharapkan, keberadaan logam Cd dalam tubuh seringkali menggantikan logam esensial dalam aktivitas kerja enzim dan bersifat menghambat kerja enzim.<sup>67</sup> Logam Cd adalah logam berwarna putih perak, lunak, lentur, tahan terhadap tekanan, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi dan menghasilkan kadium oksida bila dipanaskan. Kadmium umumnya terdapat dalam kombinasi dengan klor (Cd klorida) atau belerang (Cd sulfid). Kadmium dapat membentuk ion  $Cd^{2+}$  yang bersifat tidak stabil. Cd memiliki nomor atom 48, berat atom 112,4 g/mol, titik leleh  $321^{\circ}C$  dan titik didih  $767^{\circ}C$ . Adapun nilai rata-rata kadar Cd yang dianalisis pada rumput laut yang ada pada laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yaitu pada Dusun Papanambea sebesar 0,31 ppm, pada Dusun Je'ne sebesar 0,33 ppm dan pada Dusun Parappa sebesar 0,275 ppm. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa kadar Cd pada rumput laut pada laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar telah melewati batas standar yang diperbolehkan oleh FAO/WHO, nilai ambang batas kadar logam Cd yang diperbolehkan dalam tubuh hewan laut dan tumbuhan laut yang dapat dikonsumsi manusia yakni 0,1 ppm. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia No. 01-3548-1994 tentang batas maksimum cemaran logam pada makanan yang diperbolehkan untuk logam kadmium adalah sebesar 0,2 (ppm). Apabila kadmium yang terkandung dalam makanan dikonsumsi terus menerus maka akan terakumulasi di berbagai

---

<sup>67</sup>Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. (Cet II; Jakarta: PT. Rineke Cipta. 2004), h.53

jaringan tubuh dan dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan konsumen. Dampak tersebut berupa kerapuhan tulang dan resiko fraktur, kerusakan sistem reproduksi dan respirasi, anemia serta hipertensi.<sup>68</sup>


Kadar Cd pada rumput laut yang ada di desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar pada air laut di Dusun Papanambea, Dusun Je'ne dan Dusun Parappa telah melewati batas standar menurut peraturan direktorat jenderal pengawas obat dan makanan (POM) No. 037/25/B/Sk VII/1989 sebesar 0,2 ppm. Hal ini disebabkan karena pada air laut di lautan lepas kontaminasi logam biasanya terjadi secara langsung dari atmosfer atau karena tumpahan minyak dari kapal tanker yang melewatinya. Sedangkan di daerah sekitar pantai kontaminasi logam berasal dari mulut sungai yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan banyaknya aktifitas masyarakat yang berada di pinggiran pantai.<sup>69</sup> Akibat adanya logam berat dalam perairan dapat mengakibatkan kerusakan pada biota laut bila secara terus menerus biota laut ini mengakumulasi logam berat tersebut, terkhususnya pada rumput laut apabila kadar logam cadmium (Cd) melewati ambang batas maka akan menghambat pertumbuhan alga dan akhirnya alga bias rusak pada masa panen.<sup>70</sup> Masuknya logam dalam air laut dapat dilihat dari sirkulasi logam dalam kehidupan biologi air laut dan air tawar di bawah ini.

---

<sup>68</sup>*Ibid*

<sup>69</sup>Darmono. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. (Jakarta: UI- Press. 1995), h. 18

<sup>70</sup>Eri Bachtiar. Eri Bachtiar, "Penelusuran Sumber Daya Hayati Laut (Alga) Sebagai Biotarget Industri", <http://persijap.fileave.com/maskur/alga-laut-sebagai-biotarget-industri.pdf>, (17-01-2011).



Gambar 3. Sistem Biogeokimia sirkulasi logam dalam kehidupan biologi air laut dan air tawar.<sup>71</sup>


Logam Cd diabsorpsi oleh rumput laut dari lingkungan air atau pakan yakni fitoplankton dan tumbuhan renik yang sudah terakumulasi kadmium dan akan terikat dengan protein yaitu metalotionin (MT) banyak mengandung gugus sulfhidril (SH) dan dapat mengikat 11% Cd dan seng (Zn), dimana Cd terikat dengan gugus sulfhidril (SH) dalam enzim karboksil sisteinil, histidil dan hidroksil dari protein dan purin. Kemungkinan besar pengaruh toksisitas Cd disebabkan oleh interaksi antara Cd dan protein tersebut sehingga memunculkan hambatan terhadap aktivitas kerja enzim.<sup>72</sup>

Biota laut mempunyai stabilitas, stereokimia dan rentan terhadap pengaruh negatif logam berat.  $Pb^{2+}$ ,  $Cd^{2+}$  dan  $Hg^{2+}$  penghambat kegiatan enzim dan metabolisme. Logam

<sup>71</sup>Darmono. *Op. Cit.* h. 29

<sup>72</sup>Wahyu Widowati, dkk. *Efek Toksik Logam.* (Yogyakarta; Andi. 2008). h. 75.

berat tersebut mengikat gugus sulfur terkandung dalam enzim. Struktur enzim tersebut sebagai berikut:



Ion logam berat menempati posisi disebelah kanan dan keluar dari metaloenzim menghambat kegiatan normal enzim.  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Cd}^{2+}$  dan  $\text{Hg}^{2+}$  memiliki kemampuan mensubstitusi kofaktor enzim  $\text{Zn}^{2+}$  (metaloenzim).  $\text{Cd}^{2+}$  mengganggu sistem enzim amilase, carbonik anhidrase, adenosine tripospatase, alkohol dehidrogenase dan karboxypeptidase. Gangguan sistem enzim dalam organ tubuh biota laut menyebabkan metabolisme. Hal ini menyebabkan morfologi abnormal (polimorfisme).<sup>73</sup>

Kandungan logam Cd sekitar 0,312 ppm pada rumput laut di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar ini telah melewati ambang batas yang diperbolehkan menurut peraturan direktorat jenderal pengawas obat dan makanan (POM) No. 037/25/B/Sk VII/1989 sebesar 0,2 ppm. Oleh karena itu rumput laut ini sudah kurang bagus dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>74</sup> Kandungan Logam Cd lebih banyak pada rumput laut dibandingkan air laut, hal ini disebabkan karena sifat rumput laut yang dapat menyerap

<sup>73</sup>Anonim. "Hidrodinamika Muara Sungai". [http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51519/2011eha\\_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=5](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51519/2011eha_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=5). (7 Desember 2011).

<sup>74</sup>Anonim. "Dampak Pencemaran Pantai Dan Laut Terhadap Kesehatan Manusia". 3 Desember 2007. <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=47749>. (23 Oktober 2011).

logam berat. Di samping kegunaannya untuk bahan baku berbagai produk, rumput laut juga dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas perairan. Di tambak, rumput laut sering digunakan untuk mengatasi limbah organik karena limbah organik digunakan rumput laut sebagai nutrisi.<sup>75</sup>

### **3. Parameter Perairan di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar**

#### **a. Suhu**

Suhu merupakan salah satu parameter untuk mempelajari transportasi dan penyebaran polutan yang masuk ke lingkungan laut. Misalnya, suhu air di permukaan laut mempengaruhi sifat tumpahan minyak dan juga pengendaliannya. Suhu yang rendah akan mengakibatkan viskositas minyak naik, kecepatan penguapan fraksi ringan turun dan fraksi berat berkecenderungan membeku. Selain itu pada suhu rendah, pembersihan tumpahan minyak dengan pembakaran akan sulit dilakukan, jumlah zat dipakai sebagai *dispersant* akan bertambah banyak dan penyebaran atau dispersi minyak akan semakin sulit terjadi.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Tuti Hartati. "Kandungan Logam Berat Pada Udang, Tuna dan Rumput Laut Di Beberapa Lokasi Di Indonesia". 26 Juli 2008. <http://www.google.co.id/kab.takalar>. (23 Oktober 2011).

<sup>76</sup>Mukhtasor. *Pencemaran Pesisir dan Laut*. (Cet I; Jakarta: PT. Pradnya Paramita.2007). h. 24

Rumput laut hidup dan tumbuh pada perairan dengan kisaran suhu air antara 20–28<sup>0</sup>C, namun masih ditemukan tumbuh pada suhu 31<sup>0</sup>C (Direktorat Jenderal Perikanan, 1990).<sup>77</sup>

Dari hasil pengukuran suhu pada setiap perairan di Dusun Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, suhu di Dusun Papanambea dan Dusun Parappa adalah 31<sup>0</sup>C, sedangkan pada Dusun Je'ne suhunya adalah 33<sup>0</sup>C. Suhu perairan sangat penting untuk proses fotosintesis rumput laut. Suhu air yang tinggi yang terjadi pada ketiga Dusun ini akibat waktu pengambilan sampel pada siang hari, maka suhu menjadi naik karena pada waktu siang hari perairan semakin panas dan adanya penyerapan cahaya oleh air akan menyebabkan terjadinya lapisan air yang mempunyai suhu yang berbeda-beda sehingga suhu dari ketiga Dusun ini berbeda. Dan pada saat pengambilan sampel lokasinya berada paling dekat dengan daratan sehingga terjadi transfer panas dari daratan pantai keperairan, serta memiliki kedalaman yang paling rendah sehingga sinar matahari dapat masuk mencapai dasar dan memanaskan perairan. Semakin menurun suhu pada suatu perairan maka semakin besar toksisitas kadar logam. Hal ini berarti toksisitas logam berat Cd pada rumput laut ini bukan saja dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemaran Cd tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan.

b. Kekерuhan

---

<sup>77</sup>Alfianingsih. *Op. Cit*

Kekeruhan adalah suatu ukuran biasan cahaya di dalam air yang disebabkan oleh adanya partikel koloid dan suspensi dari suatu polutan yang terkandung dalam air. Kekeruhan yang tinggi didapat di Dusun Je'ne dan Dusun Papanambea. Kekeruhan ini sendiri diakibatkan oleh adanya partikel-partikel kecil dan koloid tersebut tidak lain adalah tanah liat, sisa tanaman, ganggang dan sebagainya. Kekeruhan dalam perairan untuk budidaya rumput laut adalah 0 gram/liter, hal ini sangat baik untuk tanaman melakukan fotosintesis karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan mutu tanaman. Tetapi menurut Boyd dan Lichtkoppler (1982), kondisi kekeruhan yang optimal bagi tanaman rumput laut adalah kurang dari 40 NTU.<sup>78</sup>

Hasil pengukuran kekeruhan perairan di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, nilai kekeruhan yang tertinggi terdapat pada Dusun Je'ne dengan nilai 9,87 NTU dan Dusun Papanambea dengan nilai 9,28 NTU, sedangkan untuk nilai kekeruhan yang terendah terdapat pada Dusun Parappa dengan nilai 4,28 NTU. Kekeruhan pada Dusun Papanambea dan Dusun Je'ne lebih tinggi diakibatkan karena adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus), maupun bahan organik dan anorganik berupa plankton dan mikro organisme lain, padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam air, sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen secara fotosintesis dan kekeruhan air juga

---

<sup>78</sup>Alfianingsih Alam. "Kualitas Keragaman Rumput Laut Jenis *Euchema Spinopsum* Di Perairan Desa Punaga Kabupaten Takalar". <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21396/5/Chapter%20I.pdf>. (23 Oktober 2011).

semakin meningkat. Sedangkan pada Dusun Parappa lebih kecil karena kurangnya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus)<sup>79</sup>. Tingkat kekeruhan air di perairan mempengaruhi tingkat kedalaman pencahayaan matahari, semakin keruh suatu badan air maka semakin menghambat sinar matahari masuk ke dalam air.<sup>80</sup> Hal ini berarti bila pada suatu perairan tingkat kekeruhannya semakin tinggi maka akan menghambat pertumbuhan rumput laut karena adanya logam. Semakin besar tingkat kekeruhannya maka semakin tinggi juga kadar logamnya. Menurut Bubicz *et al.* (1982), kandungan logam berat dalam air dan sedimen berhubungan positif dengan kandungan total padatan tersuspensi dalam air laut. Hal ini terjadi karena partikel, koloid dan karbon organik dalam air mengikat ion logam berat dalam air. Logam berat yang terkandung dalam partikel sangat labil karena mudah terlepas ke dalam air laut dan diakumulasi oleh sel jaringan tubuh biota. Logam berat yang terakumulasi dalam air laut dapat terbiotransformasi dan terbiomagnifikasi melalui rantai makanan mangsa memangsa (*predator-prey*). Logam berat yang terakumulasi dalam padatan tersuspensi terlepas ke dalam air laut karena kegiatan mikroba, arus dan gelombang laut.<sup>81</sup>

c. pH

---

<sup>79</sup>Anonim. "Kekeruhan Air". 19 Maret 2011. <http://lelykesehatan.wordpress.com/2011/03/19/kekeruhan-air/>. (07 Desember 2011).

<sup>80</sup>Anonim. "Kekeruhan". <http://www.google.co.id/url?sa/kekeruhan/NTU/Laut/Tinggi/rendah.or.id>. (07 Desember 2011).

<sup>81</sup>Anonim. *Op. Cit*

Keasaman atau derajat pH merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan alga laut, sama halnya dengan faktor-faktor lainnya. Aslan (2005) menyatakan bahwa kisaran pH maksimum untuk kehidupan organisme laut adalah 6,5 - 8,5.<sup>82</sup>

Komposisi elemen-elemen dan senyawa-senyawa yang terlarut tersebut menyebabkan air laut mempunyai pH (derajat keasaman) pada umumnya antara 7,5 sampai 8,4 dengan rata-rata pH sebesar 7,8. Perubahan dari asam ke basa dari air laut akan mempengaruhi pada pertumbuhan, aktivitas biologi dan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Seperti misalnya agar proses fotosintesis bias terjadi, maka karbondioksida harus ada. Perubahan pH akan membuat perubahan jumlah karbondioksida yang ada dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah fotosintesis yang dilakukan. Contoh lain misalnya, apabila air laut berubah menjadi bersifat lebih asam, maka akan menyebabkan kalsium karbonat, yang merupakan bentuk cangkang dari kebanyakan organism laut akan terlarut.<sup>83</sup>

Selain berpengaruh pada pertumbuhan, aktivitas biologi dan pada reaksi kimia yang terjadi di lingkungan laut, perubahan pH juga dapat mempengaruhi toksisitas (daya racun) logam berat yang mencemari lingkungan laut. Menurut Hutagalung (1991), penurunan pH akan menyebabkan toksisitas logam berat menjadi semakin besar. Sebagai contoh, toksisitas nikel-sianida (NICN) berubah seribu kali lebih toksik

---

<sup>82</sup>Alfianingsih. *Op. Cit*

<sup>83</sup>Mukhtasor. *Op. Cit.* h. 20

apabila pH turun sebanyak 1,5 satuan. Penurunan pH pada perairan laut, juga dapat menyebabkan tingkat bioakumulasi polutan pada organisme semakin besar.<sup>84</sup> Hasil pengukuran pH perairan di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, nilai rata-rata pH yang terdapat pada Dusun Je'ne yaitu 6,67, pada dusun Papanambea dengan nilai 6,70 dan pada Dusun Parappa dengan nilai 6,76. Dari hasil ini terlihat jelas bahwa pada Dusun Je'ne dengan kadar logam Cd yang tertinggi yaitu 0,33 ppm, pH yang dihasilkan juga lebih kecil yaitu 6,67. Hal ini berarti toksisitas logam berat Cd pada rumput laut ini bukan saja dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemaran Cd tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan.

#### d. Salinitas

Di alam rumput laut *Eucheuma* sp tumbuh berkembang dengan baik pada salinitas yang tinggi. Penurunan salinitas akibat masuknya air tawar dari sungai dapat menyebabkan pertumbuhan rumput laut *Eucheuma* sp menurun. Sadhori (1989) menyatakan bahwa salinitas yang cocok untuk pertumbuhan rumput laut berkisar 31-35 ppt. Menurut Dawes (1981), kisaran salinitas yang baik bagi pertumbuhan *Eucheuma* sp adalah 30-35 ppt. Soegiarto *et al.* (1978) menyatakan kisaran salinitas yang baik untuk *Eucheuma* sp adalah 32 - 35 ppt.<sup>85</sup>

Dewasa ini, penentuan salinitas banyak dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu dengan menentukan konduktivitas listrik air laut. Nilai salinitas perairan laut dapat

---

<sup>84</sup>*Ibid*

<sup>85</sup>Alfianingsih. *Op. Cit*

mempengaruhi factor konsentrasi logam berat yang mencemari lingkungan laut (Hutagalung, 1991). Faktor konsentrasi didefinisikan sebagai perbandingan antara kadar logam berat dalam tubuh organism dan dalam perairan. Lebih lanjut dikatakan bahwa penurunan salinitas pada perairan dapat menyebabkan tingkat bioakumulasi logam berat pada organisme menjadi semakin besar.<sup>86</sup>

Hasil pengukuran salinitas perairan di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Nilai salinitas yang terdapat pada Dusun Je'ne, Dusun Papanambea dan Dusun Parappa adalah 30 ‰. Nilai rata-rata salinitas pada ketiga Dusun ini yaitu 30 (‰) yang dimana dekat dari daratan sehingga dipengaruhi oleh kegiatan dari darat. Dari hasil ini terlihat jelas bahwa pada ketiga Dusun ini memiliki nilai salinitas yang sama yaitu 30 ‰. Nilai salinitas ini baik untuk pertumbuhan rumput laut, karena salinitas yang terdapat pada ketiga Dusun ini tidak terlalu besar. Tetapi apabila salinitasnya menurun maka dapat membahayakan tingkat bioakumulasi logam berat pada organisme menjadi semakin besar. Hal ini berarti toksisitas logam berat Cd pada rumput laut ini bukan saja dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemaran Cd tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan.

---

<sup>86</sup>Mukhtasor. *Op. Cit.* h. 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**BAB V**

**PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan :

1. Kadar Cd pada air laut yaitu rata-rata 0,07 ppm. Hal ini sudah melewati ambang batas yang ditetapkan yaitu 0,01 ppm.
2. Kadar Cd pada rumput laut merah (*Euchema Cottonii*) di laut Kabupaten Takalar rata-rata 0,305 ppm, hal ini telah melewati ambang batas yang ditetapkan yaitu 0,2 ppm.

### **B. Saran**

Saran saya dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada masyarakat agar berhati-hati mengkonsumsi rumput laut segar
2. Kepada industri untuk menghilangkan kadar kadmium (Cd) dalam rumput laut dengan beberapa perlakuan.



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, Alfianingsih. Kualitas Keragaman Rumput Laut Jenis *Euchema Spinosum* Di Perairan Desa Punaga Kabupaten Takalar. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21396/5/Chapter%20I.pdf>. (23 Oktober 2011).
- Anam, Khairul. *Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta*, <http://khairulanam.files.wordpress.com/2010/08/pemanfaatan-rumput-laut> (20-12-2010).
- Anonim. “Hidrodinamika Muara Sungai”. [http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51519/2011eha\\_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=5](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51519/2011eha_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=5). (7 Desember 2011).
- Anonim. “Kekeruhan”. <http://www.google.co.id/url?sa=kekeruhan/NTU/Laut/Tinggi/rendah.or.id>. (07 Desember 2011).
- Anonim. “Kekeruhan Air”. 19 Maret 2011. <http://lelykesehatan.wordpress.com/2011/03/19/kekeruhan-air/>. (07 Desember 2011).
- Anonim, “Rumput Laut *Euchema Cottonii*”, 30 November 2010. <http://ganggaulaut.blogspot.com/2010/11/rumput-laut-eucheuma-cottonii.html>. (17 Maret 2011).
- Anonim. “*Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*”, 14 Maret 2010. <http://chicamayonnaise.blogspot.com/2010/03/spektrofotometri-serapan-atom-aas.html> (17 Maret 2011).
- Anonim. *Varian Atomic Absorpsi Spektrofotometer*. <http://www.labcompare.com/144-Atomic-Absorpsi-Spectrophotometer-AAS/1000-AA-Duo-AAS-Simultaneous-Flame-Graphite-Furnace-Atomic-Absorpsi-Spectrometer>.
- Azis, Vina. *Analisis Kandungan Sn, Zn dan Pb Dalam Susu Kental Manis Kemasan Kaleng Secara Spektrofotometer Serapan Atom*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kimia dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2007
- Bachtiar, Eri. *Penelusuran Sumber Daya Hayati Laut (Alga) Sebagai Biotarget Industri*, <http://persijap.fileave.com/maskur/alga-laut-sebagai-biotarget-industri.pdf>, (17-01-2011).

- Darmono. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: UI- Press, 1995.
- Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,2006).
- Diantariani,N.P. *Proses Biosorpsi dan Desorpsi Ion Cr (VI) pada Biosorben Rumput Laut Eucheuma spinosum*, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/j-kim-vol2-no1-diantariani.pdf>, (28-12-2010).
- Ella, “*Bioakumulasi Ion Logam Kadmium (II) Oleh Rumput Laut Eucheuma Cottoni Di Lingkungan Air Laut*”. <http://webcache.googleusercontent.com/search>. (23 Mei 2011).
- Kordi K, M.Ghufran H. *Budidaya Daya Biota Akuatik*. Yogyakarta: Andi.2010.
- Haryoto, *Kinetika Bioakumulasi Logam Berat Kadmium Oleh Fitoplankton Chlorella sp Lingkungan Perairan Laut*. (10-01-2011).
- Khopkar. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI- Press, 2007.
- Noor, Alfian. *Kimia Analisis Unsur Runtut*. Edisi Kedua, Makassar: Yayasan Mitra Sains Indonesia, 2002.
- Max Rompas, Rizald. *Toksikologi Kelautan*, Jakarta Pusat: Sekertariat Dewan Kelautan Indonesia. 2010.
- Mukhtasor, M. Eng. *Pencemaran Pesisir dan Laut*. Cet I; Jakarta: PT. Pradnya Paramita.2007.
- Mudin Paena, *Penentuan Luas dan Distribusi Spasial Budidaya Rumput Laut di Perairan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Memanfaatkan Sistem InformasiGeografis*, [http://www.rcaprb.com/UserFiles/File/Pros%20FITA%201/Mudian%20P\\_PENENTUAN%20LUAS.pdf](http://www.rcaprb.com/UserFiles/File/Pros%20FITA%201/Mudian%20P_PENENTUAN%20LUAS.pdf) (28-12-2010).
- Palar. *Pencemaran dan Toksikologi LOGam Berat*. (Cet II; Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004)
- Pekei, Yusuf. “*Pemanfaatan Rumput Laut Merah (Eucheuma cottonii) Sebagai Adsorben Ion Timbal (II) Dalam Perairan*”. <http://httpwwwgodamagaputra.blogspot.com/2010/04/pemanfaatan-rumput-laut-eucheuma.html>. (12-03 2011).
- Poncomulyo, Taurino, dkk. *Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut*. (Jakarta : Buku Pertanian. 1993).

- Rusmiati, Dewi. “*Uji Aktivitas Antibakteri Etanol Rumput Laut*”, [http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/akt\\_anbakteri\\_ekstrak\\_rumput\\_laut.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/akt_anbakteri_ekstrak_rumput_laut.pdf). (20-01-2011).
- Salila, Musri. *Spektrofotometri Serapan Atom*. <http://Tinangkung.Blogspot.com/2010/04/spektrofotometri-serapan-atom>. (17 Januari 2011).
- Syahrun, Ir. *Petunjuk Teknis Budidaya Rumput Laut*. (Makassar: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Selatan. 2004)
- Triani, Lies. Desorpsi Ion Logam Tembaga (II) dari Biomassa Chlorella sp Yang Terimobilisasi dalam Silika Gel. <http://digilib.unnes.ac.id/gsd1/collect/skripsi/archives/HASH8039.dir/doc.pdf> (17-01-2011).
- Wahyu, Widowati, dkk, *Efek Toksik Logam*, (Yogyakarta: Andi. 2008).





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R