

**KEMAMPUAN TUMBUH ISOLAT BAKTERI ASAM LAKTAT ASAL
SALURAN PENCERNAAN BROILER UMUR TIGA HARI PADA
BERBAGI UJI PROBIOTIK**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Peternakan (S.Pt) pada Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ARFIANDI AGUS
NIM. 60700111018
M A K A S S A R

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfiandi Agus
NIM : 60700111018
Tempat/Tgl Lahir : Maros, 18 September 1992
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Batangase lingkungan Tete Batu No 56 Kec. Mandai
Kab. Maros
Judul : Kemampuan tumbuh isolat Bakteri Asam Laktat asal
saluran pencernaan Broiler umur tiga hari pada berbagai
Uji Probiotik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2016

Penyusun


ARFIANDI AGUS
NIM: 60700111018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Kemampuan Tumbuh Isolat Bakteri Asam Laktat Asal Saluran Pencernaan Broiler Umur Tiga Hari Pada Berbagai Uji Probiotik” yang disusun oleh **Arfiandi Agus**, NIM: 60700111018, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan, Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, 9 Desember 2016
9 Rabi'ul-awwal 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Ir. Andi suarda, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Rusny, S.Pt., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Taufik, S.Pt., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi Saudara **ARFIANDI AGUS**, NIM : 60700111018, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Pada Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Setelah Meneliti Dan Mengoreksi Secara Seksama Skripsi Yang Berjudul, **“Kemampuan tumbuh Isolat Bakteri Asam Laktat asal saluran pencernaan Broiler umur tiga hari pada berbagai Uji Probiotik”**, Memandang Bahwa Skripsi Tersebut Telah Memenuhi Syarat-Syarat Ilmiah dan memperoleh gelar Sarjana dalam peternakan jurusan ilmu peternakan. Demikian Persetujuan Ini Diberikan Untuk Proses Lebih Lanjut.

Makassar, Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P
Nip. 19750909009121001


Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P
Nip.

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Ir. Muh. Basir Parly, M.Si
Nip. 195907121986031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul “**Kemampuan Tumbuh Isolat Bakteri Asam Laktat Asal Saluran Pencernaan Broiler Umur Tiga Hari pada Berbagai Uji Probiotik**” yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Peternakan (S.Pt) pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw., beserta sahabat-sahabatnya dan pengikut setianya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang tiada batasnya untuk kedua orang tua penulis (**H. Agus Yahri dan Hj. St. Harminah**) yang selalu mendoakan setiap saat dan memberikan bantuan materi serta dorongan moril disetiap detik kehidupan, semoga setiap kesabaran dan pengorbanan beliau diberikan pahala dan balasan dari Allah swt. Amin. Terima kasih pula untuk kakak penulis **Zulviani Agus S.T** serta keluarga-keluarga sanak saudara penulis.

Selama penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, doa serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Ag.**, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan segenap jajarannya.
3. Bapak **Dr. Ir. Muh. Basir Parly, M.Si.**, sebagai Ketua Akademik Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Ibu **Astati, S.Pt., M.Si.**, sebagai Seketaris Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** dan Ibu **Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.**, sebagai dosen pembimbing, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih untuk bapak **Dr. Muh. Taufik, S.Pt** selaku penguji I yang telah memberikan membimbing dan saran pada saat penelitian dikala penulis melakukan penelitian di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)

Gowa, 2016 Terima kasih pula karena sudah memberikan motivasi yang sangat bermanfaat.

7. Ibu **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.** selaku dosen penguji II, yang telah banyak memberikan kritikan dan saran kepada penulis.
8. Bapak **Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.**, selaku penguji III yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan, atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
10. Kak **Andi Arfiana S.E** sebagai staf Jurusan Ilmu Peternakan yang telah banyak membantu dalam hal pengurusan persuratan, pengimputan nilai dll.
11. Teman-teman Jurusan Ilmu Peternakan, khususnya **Adik Diniarsi Rasak S.Pt., Andi Darul Aqsa S.Pt., Indah Fatmah Supardi S.Pt., Sri Wahyuni S.pt, Hardiansyah S.Pt, Rosmina S.Pt, Mifta Fitri S.Pt., Magfirah Baharuddin S.Pt.**, dan calon sarjana **Muh Ikbal Manggellai, Nur Afiat Agus, Dedi Fardiansyah, Muhammad Bustanil, Muh. Asbar Samsa, Firdaus, Indra Setiawan** sebagai teman seperjuangan terbaik dalam keseharian penulis.
12. Teman–teman Jurusan Ilmu Peternakan khususnya angkatan 2011. Terima kasih atas motivasi dan keceriaan selama penulis kuliah.
13. Ucapan terima kasih juga untuk kakak-kakak senior angkatan 2006-2010 dan adik-adik junior saya angkatan 2012-2016 di Jurusan Ilmu Peternakan.

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini dapat imbalan dari Allah swt. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Desember 2016

Penulis


ARFIANDI AGUS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kajian Pustaka (PenelitianTerdahulu).....	4
F. Defenisi Operasional.....	5
G. Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Islam Tentang Ternak Unggas	7
B. Mikroorganisme pada Saluran Pencernaan Unggas.....	10
C. Sistem Pencernaan Broiler	13

D. Bakteri Asam Laktat	16
E. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat.....	23
F. Probiotik.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	30
B. Alat dan Bahan.....	30
C. Prosedur Kerja.....	30
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil	38
B. Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56

DAFTAR TABEL

NO.

1. Pertumbuhan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap nilai Keasamaan(pH)38
2. Ketahanan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Garam Empedu40
3. Pertumbuhan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Suhu ($^{\circ}\text{C}$).....41



DAFTAR GAMBAR

NO.

1. Pertumbuhan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap nilai Keasamaan(pH)39
2. Ketahanan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Garam Empedu40
3. Pertumbuhan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Suhu ($^{\circ}\text{C}$).....42



ABSTRAK

Nama : ARFIANDI AGUS
NIM : 60700111018
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Kemampuan Tumbuh Isolat Bakteri Asam Laktat Asal Saluran Pencernaan Broiler umur tiga hari pada berbagai Uji Probiotik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tumbuh Isolat Bakteri Asam Laktat Asal (BAL) asal saluran pencernaan broiler umur tiga hari pada berbagai uji probiotik (pH, Garam Empedu dan suhu yang berbeda) telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri probiotik tumbuh pada pH, kadar garam empedu dan suhu yang berbeda isolat mikrobial asal saluran pencernaan broiler yang dipelihara selama tiga hari dan mengalami perlakuan pakan dan tidak diberi pakan, Diperoleh 4 (empat) isolat yang menunjukkan karakteristik probiotik yang berbentuk *Coccus* (bulat) yaitu isolat A, dan D, yang diperkirakan tergolong genus *Enterococcus* sp. dan yang berbentuk basil (batang) yaitu isolat B dan C di perkirakan tergolong genus *Lactobacillus* sp. Kemampuan daya tumbuh BAL terhadap ketahanan pH terlihat bahwa isolat B, C,D mampu tumbuh pada medium yang memiliki derajat keasaman pH 3 pH 4 dan pH 5 Medium yang memiliki derajat keasaman pH 3 tidak menunjukkan adanya pertumbuhan pada isolat A, tetapi pada kondisi keasaman pH 4 dan pH 5 menunjukkan adanya pertumbuhan koloni. Isolat A, B,C dan D dapat tumbuh pada garam empedu 1% dan 5%, Tetapi keseluruhan isolat lebih optimal tumbuh pada medium yang mengandung dengan konsentrasi 5% dibandingkan dengan konsentrasi 1%. Pada pengujian suhu 30⁰C tidak terdapat pertumbuhan pada isolat A dan D sedangkan pada suhu 37⁰C, dan 41⁰C terdapat pertumbuhan dan terjadi endapan pada dasar tabung, ditandai bahwa pada suhu 37⁰C dan 41⁰C terdapat pertumbuhan mikroba, Adanya endapan pada pengujian suhu dapat dijadikan sebagai pendugaan isolat bakteri tumbuh.

Kata Kunci : Broiler, Bakteri Asam Laktat (BAL), Probiotik, pH, Garam Empedu, Suhu

ABSTRACT

Name : ARFIANDI AGUS
NIM : 60700111018
Subject : Animal Science
Title : Growing Ability of Lactic Acid Bacteria Isolates Origin
Gastrointestinal Broiler age of three days in various Test
Probiotics

This study aims to determine the ability to grow Isolates Lactic Acid Bacteria Origin (BAL) from channel broiler age of three days in various test probiotics (pH, salts Bile and different temperatures) have been conducted in order to determine the Traffic probiotic bacteria grown on pH, salinity bile and temperature of different isolates of microbial origin digestive tract of broilers reared for three days and the treated feed and not given food, obtained four (4) isolates showing the characteristics of probiotics in the form *Coccus* (round) that isolates A and D, which are expected belong to the genus *Entrecoccus* sp. and shaped bacilli (rod) that isolates B and C in the estimate belong to the genus *Lactobacillus* sp. The ability to grow the BAL resilience pH seen that isolates B, C, D are able to grow on a medium which has a degree of acidity of pH 3 pH 4 and pH 5 The medium which has the degree of acidity of pH 3 did not show any growth in isolates A, but on the condition of acid pH 4 and pH 5 showed colony growth. Isolates A, B, C and D can be grown on bile salts 1% and 5%, but overall more optimal isolates grown on a medium containing a concentration of 5% compared with a 1% concentration. In testing the temperature of 30⁰C there is no growth in isolates A and D, while at a temperature of 37⁰C, and 41⁰C are growth and precipitates at the bottom of the tube, indicated that at a temperature of 37⁰C and 41⁰C are microbial growth, presence of precipitate at test temperature can be used as a prediction of bacterial isolates grow.

Keywords: Broiler, Lactic Acid Bacteria (LAB), Probiotics, pH, bile salts, Temperature



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, suhu optimum $\pm 40^{\circ}\text{C}$, pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif dan oksidase positif, dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida. Dalam saluran pencernaan tumbuh normal dalam jalur intestin suatu bakteri asam laktat yang memberikan efek positif yang penting terhadap kesehatan tubuh, yaitu melalui kemampuannya menekan pertumbuhan bakteri patogen intestin penyebab diare, serta menstimulasi sistem kekebalan tubuh (imun) (Rahayu dan Margino, 1997).

Berbagai senyawa hasil metabolismenya seperti asam laktat, hidrogen peroksida (H_2O_2), bakteriosin yang bersifat antimikroba dan berbagai enzim yang dimilikinya seperti laktase (membantu mengatasi intoleransi terhadap laktosa) serta *bile salt hydrolase* (membantu menurunkan kolesterol) serta adanya aktivitas antikarsinogenik dan stimulasi imun sistem (Nagao, F., M. Nakayama, T. Muto and K. Okumura 2000; Usman, Hosono 1999 dan Matar, 2001)

Syarat probiotik adalah tidak patogen, toleran terhadap asam dan garam empedu, mempunyai kemampuan bertahan pada proses pengawetan dan dapat

bertahan pada penyimpanannya serta memiliki kemampuan memberi efek kesehatan yang sudah terbukti *Lactobacillus* sebagai probiotik alternatif penurun kolesterol memiliki kemampuan bertahan terhadap garam empedu, kondisi asam, mampu menghambat bakteri pathogen, tahan terhadap antibiotik dan dapat mengikat kolesterol dengan menempel pada epitel dinding saluran pencernaan (Hood dan Zottola, 1998).

Bakteri probiotik merupakan mikroorganisme non patogen, yang jika di konsumsi memberikan pengaruh positif terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya, Senyawa-senyawa racun yang dihasilkan dari metabolisme protein dan lemak, serta hasil pemecahan enzim tertentu menjadi semakin berkurang bila bakteri probiotik mulai menjalankan peranannya dalam meningkatkan kesehatan. (Schrezenmeir dan de Vrese, 2001)

Probiotik dapat memproduksi bakteriosin untuk melawan patogen yang bersifat selektif hanya terhadap beberapa strain patogen. Probiotik juga memproduksi asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida, laktoperoksidase, lipopolisakarida, dan beberapa antimikrobia lainnya. Probiotik juga menghasilkan sejumlah nutrisi penting dalam sistem imun dan metabolisme inang, seperti vitamin B (Asam Pantotenat), pyridoksin, niasin, asam folat, kobalamin, dan biotin serta antioksidan penting seperti vitamin K (Adams, 2009).

Probiotik merupakan salah satu alternatif pakan tambahan pada ternak yang sehat dan aman bagi lingkungan. Selain itu mikroba prebiotik mampu memproduksi substansi berguna, dapat menurunkan populasi mikroba patogen, meningkatkan kesehatan dan daya imunitas ternak (Ziemer dan Gibson, 1998).

Aspek keamanan dan fungsional menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi mikroba probiotik. Aspek keamanan seperti: menyehatkan saluran pencernaan, bersifat non patogen, dan tahan terhadap antibiotik. Aspek fungsional seperti kemampuan hidup dan tahan dalam saluran pencernaan, dapat diaplikasikan pada dunia industri, dan tidak menimbulkan aroma yang menyimpang pada makanan (Saarela Dkk, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dilakukan penelitian tentang. “Kemampuan tumbuh Isolat Bakteri Asam laktat Asal Saluran Pencernaan Broiler umur tiga hari pada berbagai Uji Probiotik (pH, Garam Empedu dan suhu)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah terdapat pengaruh uji probiotik (pH, Garam Empedu dan suhu) pada pertumbuhan bakteri isolat?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan tumbuh isolat Bakteri Asam Laktat (BAL) asal saluran pencernaan broiler umur tiga hari pada berbagai uji probiotik. (pH, Garam Empedu dan suhu)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu, dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa tentang kemampuan tumbuh Isolat BAL asal saluran pencernaan broiler umur tiga hari pada berbagai uji probiotik (pH, Garam Empedu dan Suhu).

E. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

1. Kadir (2016) telah meneliti tentang “Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat (BAL) Kandidat Probiotik Asal Saluran Pencernaan Doc Broiler terhadap Berbagai Kondisi Asam Lambung”, Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan Bakteri Asam Laktat terhadap berbagai kondisi asam lambung saluran pencernaan DOC Broiler. Mikrobia kandidat probiotik diisolasi dari saluran pencernaan DOC Broiler yang baru menetas dan belum mendapatkan tambahan pakan maupun antibiotik. Metode penelitian yaitu mengamati pertumbuhan Bakteri Asam Laktat terhadap berbagai kondisi asam lambung dengan menggunakan medium MRSB-HCl dan MRSB-KOH dengan masing-masing 1 ose bakteri (ose bulat) yang diinkubasi 1x24 jam dengan derajat keasaman 1-6 (pH) dimana data yang diperoleh dari hasil pengamatan (positif atau negatif) yang ditunjukkan pada indikator uji yang telah dilakukan. Hasil penelitian didapatkan bahwa Bakteri Asam Laktat dapat tumbuh pada pH 4, pH 5 dan pH 6 yang terlihat dengan adanya endapan dan medium yang keruh sedangkan untuk pH 1-3 tidak terlihat adanya pertumbuhan dengan medium yang masih tetap jernih. Berdasarkan hal tersebut isolat bakteri asam laktat dapat dimanfaatkan sebagai probiotik.
2. Sukiman (2016) telah meneliti tentang “Kemampuan Daya Tumbuh Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Saluran Pencernaan DOC Broiler Pada Kadar Garam Empedu dan Suhu yang Berbeda”, Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan BAL terhadap berbagai

kondisi asam lambung saluran pencernaan DOC Broiler. Mikrobial kandidat probiotik diisolasi dari saluran pencernaan DOC broiler yang baru menetas dan belum mendapatkan tambahan pakan maupun antibiotik. Metode penelitian yaitu mengamati pertumbuhan Bakteri Asam Laktat terhadap berbagai kondisi asam lambung dengan menggunakan medium MRSB-HCl dan MRSB-KOH dengan masing-masing 1 ose bakteri (ose bulat) yang diinkubasi 1x24 jam dengan derajat keasaman 1-6 (pH) dimana data yang diperoleh dari hasil pengamatan (positif atau negatif) yang ditunjukkan pada indikator uji yang telah dilakukan. Hasil penelitian didapatkan bahwa BAL dapat tumbuh pada pH 4, pH 5 dan pH6 yang terlihat dengan adanya endapan dan medium yang keruh sedangkan untuk pH 1-3 tidak terlihat adanya pertumbuhan dengan medium yang masih tetap jernih. Berdasarkan hal tersebut isolat bakteri asam laktat dapat dimanfaatkan sebagai probiotik.

F. Definisi Operasional

1. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan.
2. Garam empedu adalah zat yang disekresikan oleh hati yang berfungsi sebagai pengemulsi lemak.
3. Suhu optimum adalah suhu terbaik bagi mikroba dalam melakukan seluruh fungsi hidup / metabolisme.

4. Bakteri asam laktat (BAL) merupakan spesies bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk asam laktat dari metabolisme karbohidrat dan tumbuh pada pH lingkungan yang rendah bakteri
5. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang bermula dari lambung hingga anus. Pada usus terdiri dari dua bagian yaitu usus kecil dan usus besar (kolon).

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi pertumbuhan bakteri asam laktat terhadap uji probiotik asal saluran pencernaan broiler umur tiga hari terhadap berbagai kondisi asam lambung dengan menggunakan MRSB-HCl garam empedu 1% dan 5% serta untuk mengetahui pertumbuhan pada pH 3, pH 4 dan pH 5 yang ditunjukkan dengan media yang keruh dan adanya endapan pada indikator uji yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Islam Tentang Ternak Unggas

Ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam Al Quran. Bahkan beberapa nama hewan ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam Al Quran. Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah swt memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, dan kerbau) yang mampu mengubah rumput (hijauan) menjadi daging dan susu serta ternak non ruminansia (kuda dan unggas) yang mampu mengubah rumput menjadi daging dan berbagai macam aneka hiasan yang terbuat dari bulu unggas atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia. Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya sub sektor ini mendapat perhatian kaum muslimin, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan produk peternakan (Ashshiddiq, 1971).

Sebagaimana firman Allah swt yang telah dijelaskan dalam Qs 5 : An-Nahl ayat 5 :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

Terjemahnya :

”Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan” (Ashshiddiq, 2002).

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa setelah menguraikan tentang manusia, ayat ini berbicara tentang binatang ternak yang penciptaannya dan

keanekaragamannya tidak kurang menakjubkan dari manusia. Di sisi lain, binatang mempunyai persamaan dengan manusia dalam jenisnya. Bukankah manusia adalah binatang yang berpikir bukankah ada diantara yang memiliki kemiripan, bahkan persamaan dari segi fisik dengan manusia. Dalam hal diatas, Allah swt berfirman, sebagaimana halnya penciptaan manusia dari sperma/mani, binatang ternak pun telah diciptakan-Nya demikian. Binatang itu dia ciptakan untuk kamu guna kamu manfaatkan, padanya ada bulu dan kulit yang dapat kamu buat pakaian yang menghangatkan dan juga berbagai manfaat lain dan sebagiannya kamu dapat makan. (M. Quraish Shihab, 2002).

Allah swt menciptakan hewan ternak diperuntukkan pada manusia, dengan diciptakannya hewan ternak maka manusia bisa mengambil segala potensi yang ada pada seekor ternak tersebut, keanekaragaman hewan ternak yang ada dipermukaan bumi ini adalah salah satu karunia Allah swt untuk keseimbangan, keserasian, keharmonisan dan ketertiban. Alam kehidupan bagi orang yang berpikir. Banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran dari penciptaan seekor ternak. (M. Quraish Shihab, 2002).

Ternak mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia terutama pada kebutuhan pangan berasal dari produk hewani yang pokok yaitu daging, susu, dan kulit. Jika kita perhatikan maka yang tersirat dalam Qs Al-Nahl ayat 5 tersebut dapat di lihat pentingnya hewan ternak bagi manusia. Betapa tidak, produk utama ternak yaitu susu, daging, dan telur merupakan bahan pangan hewani yang bergizi tinggi yang dibutuhkan manusia. Hewan ternak yang dimaksud adalah golongan hewan ruminansia dan nonruminansia termasuk unggas.

Islam sendiri memandang pemanfaatan mikroorganisme bagi kehidupan manusia sebagai sesuatu hal yang perlu untuk dikembangkan, sebagaimana firman Allah swt dalam Qs Ar-Ra'd/13:17 yang berbunyi:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Allah swt telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah swt membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah swt membuat perumpamaan-perumpamaan. (Kementerian Agama RI, 2011).

Dalam uraian ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah swt telah menciptakan sesuatu yang diinginkan dan apapun yang Allah swt kehendaki atas makhluk-makhluknya ia ciptakan dan dapat menjadikannya bermakna dari masing-masing penciptaanya. Begitu juga dalam proses pengisolasian ini terjadilah makhluk mikroorganisme yang tidak kasat mata (Hifizah, 2012).

Dapat kita ketahui bahwa Allah swt telah menciptakan berbagai makhluk hidup yang beraneka ragam dari benda yang bisa dilihat oleh mata secara langsung ataupun benda-benda kecil seperti halnya mikroorganisme. Salah satu contoh mikroorganisme yaitu kelompok mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah s.wt yang begitu besar untuk menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki. Semua yang telah diciptakan-Nya tiada yang sia-sia

karena semua ada manfaatnya tergantung manusia bagaimana mengolahnya. Namun, sejauh ini manusia telah menerapkan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan apa yang telah Allah swt berikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa semua makhluk yang diciptakan-Nya tiada yang sia-sia (Hifizah, 2012).

B. Mikroorganismepada Saluran Pencernaan Unggas

Saluran pencernaan ternak merupakan tempat persembunyian (tempat hidup) mikroflora yang segera terbentuk setelah dilahirkan. Mikroflora indigenous dewasa akan menjadi *barrier* (pembawa) koloni mikroorganismepathogen seperti *Salmonella* dan *Escherichia coli* mikroflora yang menyokong kesehatan hewan terdiri dari berbagai macam spesies mikroorganismeperti *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* dan *Bacteroides* yang sebagian besar merupakan mikroorganismeyang predominan. Semua mikroba tersebut 90%-nya tergolong flora. Kelompok lainnya adalah *Enterobacteriaceae*, *Enterococcus*, dan *Clostridium*. Dalam kesehatan hewan, rasio jumlah mikroorganismepada kelompok bakteri tersebut adalah penting. Digestin mikroba terjadi di tembolok dan bagian bawah ileum sampai sekum terdapat banyak mikroorganismep (*Lactobacilli*) berguna untuk memecah karbohidrat, protein dan gula yang lolos oleh enzim. Ceca mempunyai populasi bakteri yang terbesar dan bertindak sebagai kamar fermentasi. Hasil utama pada fermentasi adalah asam lemak volatile, terutama asam asetat, asam propionate, CO₂, dan methane dan beberapa vitamin yang diserap oleh ceca (Hifizah, 2012).

Diketahui bahwa mikroflora saluran pencernaan hewan dapat saling berpengaruh, misalnya oleh ingesti mikroorganisme lainnya. Hasil perlakuan tersebut dapat merubah jumlah keberadaan mikroorganisme, menghasilkan lingkungan yang cocok bagi kolonisasi mikroba, yang pada akhirnya berpotensi bagi berkembangnya mikroorganisme patogen. Diantara mikroba patogen *Salmonella* dan *Campylobacter* diperkirakan merupakan masalah serius pada unggas. Populasi mikroorganisme yang ada didalam saluran pencernaan ada dua macam, yaitu bakteri yang berkoloni di dalam saluran pencernaan itu sendiri (*autochonus*) dan bakteri yang berasal dari luar tubuh ternak dan hidup di dalam saluran pencernaan (*allochonus*). Kelompok bakteri yang kedua ini biasanya ditambahkan ke dalam ransum atau air minum ternak sebagai imbuhan pakan (*Feed Additive*). Ahli makanan ternak (Nutrisionis) memberikan istilah pada mikroba yang dijadikan imbuhan pakan tersebut sebagai probiotik. Beberapa data hasil penelitian menunjukkan, bahwa bakteri probiotik yang ditambahkan ke dalam ransum atau air minum ternak dapat mencegah infeksi dan kolonisasi patogen di dalam saluran pencernaan unggas (Hifizah, 2012).

Kelompok bakteri yang dominan pada usus ayam adalah bakteri gram positif, Proteobakteri, dan Chtophagal/Flexibacter/Bakteroides. Pada bagian ileum dan sekum banyak dihuni oleh bakteri gram positif seperti *Lactobacillus*, *Clostrodia*, *Bacillus*, dan *Streptococci*. Jumlah bakteri *Bacillus* pada sekum (1,45%) dan ileum (0,67%). Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya umur ayam broiler, jumlah *Bacillus* juga meningkat pada sekum, yaitu pada umur 14

hari (2,70%), 21 hari (4,04%) dan 28 hari (1,75%), dan umur 49 (4,04%) (Hifizah, 2012).

Disamping itu nilai pH menyebabkan populasi mikroba di dalam setiap bagian saluran pencernaan menjadi spesifik. Nilai pH pada saluran pencernaan unggas pada setiap bagian, adalah: tembolok (4.5), proventrikulus (4.4), gizzard (2.6), duodenum (5.7-6.0), jejunum (5.8), ileum (6.3), kolon (6.3), ceca (5.7), dan empedu (5.9). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan turunnya nilai pH pada saluran pencernaan adalah fermentasi pakan. Misalnya pada daerah tembolok, pakan yang dikonsumsi oleh unggas berada beberapa saat di organ tersebut, sebagai dari pakan ini akan mengalami fermentasi oleh *Lactobacillus* tipe *Lactobacillus salivarius* dan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan pH tembolok menjadi turun (Hifizah, 2012).

Adanya gerakan peristaltik pada saluran pencernaan yang membawa pakan secara tidak langsung melalui lumen sampai pada bagian pertengahan saluran pencernaan, menjadi salah satu penyebab yang dapat mencegah mikroba menempel pada epitel usus. Namun, demikian beberapa mikroba yang lain dapat melekat (*adherence*) pada epitel saluran pencernaan, sedangkan yang lainnya dikeluarkan dari usus oleh cairan musim. Diantara bakteri Gram negatif yang dapat tumbuh dan melekat pada epitel tembolok, lamina propria, dan permukaan villi usus adalah *E.coli*. Perubahan morfologi pada usus, yaitu vili yang menjadi lebih pendek dan *crypts* lebih dalam dapat disebabkan oleh toksin yang dihasilkan mikroba patogen yang ada pada saluran pencernaan ternak unggas (Hifizah, 2012).

C. Sistem Pencernaan Broiler

Proses utama dari pencernaan adalah secara mekanik, enzimatik, ataupun mikroba. Proses mekanik terdiri dari penelanan makanan ke dalam mulut dan gerakan *peristaltic* alat pencernaan karena kontraksi otot usus. Pencernaan secara enzimatik atau kimiawi dilakukan oleh enzim yang dihasilkan sel-sel kelenjar dari bagian alat saluran pencernaan, berupa getah-getah pencernaan. Disamping itu enzim dapat pula dihasilkan oleh mikroba usus yang dapat berasal dari ransum (Parrakasi, 1983).

Menurut Abun (2008) saluran-saluran pencernaan pada ayam broiler terdiri dari :

a. Mulut dan Esofagus

Mulut ayam umum disebut dengan paruh. Fungsi utamanya adalah untuk memegang, menyobek, memecah makanan atau memangsanya. Mulut ayam tidak memiliki bibir dan gigi. Peranan bibir dan gigi pada ayam digantikan oleh rahang yang menanduk dan membentuk dan membentuk paruh. Lidahnya runcing dan keras seperti ujung panah dengan arah ke depan. Bentuk seperti kail pada bagian belakang lidah yang berfungsi untuk mendorong pakan menuju esofagus sewaktu lidah digerakkan ke depan dan ke belakang. Kelenjar ludah mengeluarkan cairan yang melicinkan pakan menuju esofagus dan diteruskan ke tembolok.

b. Tembolok

Tembolok adalah organ yang berbentuk kantung dan merupakan daerah pelebaran dari esofagus. Proses pencernaan di dalam tembolok sangat kecil terjadi. Fungsi utama dari tembolok adalah sebagai organ penyimpanan pakan. Pakan yang berupa serat kasar dan biji-bijian tinggal di dalam tembolok selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengasaman.

c. Perut Kelenjar

Perut kelenjar atau proventrikulus merupakan pelebaran dan penebalan dari ujung akhir esofagus. Asam hidroklorit dan enzim pepsin yang dihasilkan dinding perut kelenjar berfungsi untuk membantu proses pencernaan protein. Sewaktu makanan melewatinya, sel kelenjar secara mekanis akan berkerut dan menyebabkan keluarnya cairan kelenjar perut. Pencernaan pakan di dalam perut kelenjar hanya kecil peranannya, karena makanan hanya tinggal di dalam organ ini dalam waktu relatif pendek.

d. Empedal

Empedal terdiri atas serabut otot yang padat dan kuat. Bentuknya bulat telur dengan dua lubang saluran di ujung-ujungnya. Di bagian depan berhubungan dengan perut kelenjar dan bagian yang lain dengan usus halus. Fungsi utama empedal adalah menggiling dan meremas pakan keras. Perototan empedal melakukan gerakan meremas kurang lebih empat kali satu menit. Di dalam empedal ini dapat dihasilkan asam hidroklorit. Proses mencerna makanan secara normal dapat dibantu oleh adanya kerikil yang biasa diambil dan ditelan melalui mulut. Ukuran empedal dipengaruhi oleh aktifitasnya.

Apabila unggas secara rutin diberi pakan yang sudah siap tergiling maka empedal akan menjadi lisut.

e. Usus halus

Usus terdiri atas saluran makanan yang dimulai dari duodenum, yaitu usus halus bagian depan dan berakhir di rektum atau usus besar di bagian paling belakang. Pencernaan dan penyerapan pakan utamanya terjadi di usus halus. Selaput lendir usus halus memiliki jonjot yang lembut dan menonjol seperti jari. Fungsinya selain sebagai penggerak aliran pakan dalam usus juga untuk menaikkan permukaan penyerapan sari makanan.

f. Usus Besar

Pada perkembangan usus bagian bawah dan rektum terdapat dua bentukan cabang usus yang buntu sehingga disebut usus buntu atau sekum. Usus ini biasanya berukuran panjang 10-15 cm dan terisi calon tinja. Usus besar paling belakang adalah rektum yang pendek dan berakhir di kloaka.

g. Kloaka

Kloaka merupakan suatu tabung yang berhubungan dengan saluran pencernaan, saluran kencing dan reproduksi yang membuka keluar menuju anus. Organ ini bertaut dengan bursa fabrius pada sisi atas berdekatan dengan tepi luarnya. Air kencing yang sebagian besar adalah endapan asam urat dikeluarkan melalui kloaka bersama tinja dengan bentuk seperti pasta putih.

Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang bermula dari lambung hingga anus. Pada usus terdiri dari dua bagian yaitu usus kecil dan usus besar (kolon). Pada usus kecil terbagi lagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum,

sedangkan usus besar terbagi menjadi cecum, kolon, dan rektum. Secara makroskopis, usus halus dibagi menjadi duodenum, jejunum dan ileum yang kontinyu satu sama lain dan pada dasarnya mempunyai struktur histologis hampir sama (Winarno, 2005).

D. Bakteri Asam Laktat

Pada mulanya, bakteri asam laktat terdiri dari 4 genus yaitu *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus* dan *Streptococcus*. Namun demikian, beberapa genus baru masuk kedalam kelompok bakteri asam laktat menurut revisi taksonomik terakhir. Genus *Streptococcus* mencakup *Enterococcus*, *Lactococcus*, *Streptococcus* dan *Vagococcus* (Suroño, 2004).

Usus besar atau colon memiliki lebih dari 99% bakteri yang tinggal di dalamnya dan lebih dari 99% berupa bakteri anaerob mutlak diantaranya adalah *Clostridium*, *Bacterioides*, *Bifidobacterium* dan lain-lain. Hanya kurang dari 1% berupa bakteri fakultatif anaerob seperti *E.coli*, *Enterobacter* dan bakteri patogen lainnya (Suroño, 2004).

Usus pada ternak unggas ibarat sebuah tabung reaksi yang berisi beragam bakteri dan berbagai nutrisi yang disuplai melalui makanan yang dikonsumsi. Dalam saluran pencernaan ayam, mikroba terdapat hampir di sepanjang usus. Mikroorganisme utama yang terdapat dalam tembolok, usus halus dan *ceca* adalah golongan bakteri *Lactobacilli* yang khusus menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Sehingga pH dalam tembolok ayam yang baik antara pH 4–5 akibatnya organisme yang tidak tahan asam tidak dapat berkembang secara normal (Sjofjan, 2003).

Sebagian besar BAL dapat tumbuh sama baiknya di lingkungan yang memiliki dan tidak memiliki O^2 (tidak sensitif terhadap O^2), sehingga termasuk anaerob aerotoleran. Bakteri yang tergolong dalam BAL memiliki beberapa karakteristik tertentu yang meliputi: tidak memiliki porfirin dan sitokrom, katalase negatif, tidak melakukan fosforilasi transpor elektron, dan hanya mendapatkan energi dari fosforilasi substrat. Hampir semua BAL hanya memperoleh energi dari metabolisme gula sehingga habitat pertumbuhannya hanya terbatas pada lingkungan yang menyediakan cukup gula atau bisa disebut dengan lingkungan yang kaya nutrisi. Kemampuan mereka untuk mengasamkan senyawa (biosintesis) juga terbatas dan kebutuhan nutrisi kompleks BAL meliputi asam amino, vitamin, purin, dan pirimidin (Rahayu, 1997).

Karakterisasi BAL yang dapat digolongkan ke dalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki efek antagonis terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Mac Farland dan Cummings 1998; Begley et al., 2005, dalam Vélez, 2007).

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan kelompok bakteri Gram-positif yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat (BAL) hidup di saluran pencernaan ternak. Keberadaan bakteri probiotik tersebut masih sangat kurang khususnya di usus halus, sehingga penyerapan sari makanan menjadi kurang maksimal. Jadi untuk menambahkan jumlah bakteri probiotik seperti BAL pada usus biasanya bakteri probiotik tersebut diisolasi dari usus

ternak itu sendiri agar didapatkan bakteri probiotik yang benar-benar cocok dan sesuai dengan sistem pencernaan ternak tersebut, namun tidak semua jenis bakteri usus merupakan bakteri probiotik BAL (Simanjuntak, 2008).

Menurut Simanjuntak (2008), menyatakan bahwa bakteri asam laktat dapat dibedakan atas 2 kelompok berdasarkan hasil fermentasinya, yaitu:

1. Bakteri homofermentatif: glukosa difermentasi menghasilkan asam laktat sebagai satu-satunya produk. Contoh: *Streptococcus*, *Pediococcus*, dan beberapa *Lactobacillus*.
2. Bakteri heterofermentatif : glukosa difermentasikan selain menghasilkan asam laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya yaitu etanol, asam asetat, dan CO₂. Contoh : *Leuconostoc* dan beberapa spesies *Lactobacillus*.

Bakteri asam laktat memiliki karakteristik berbentuk batang atau kokus, gram positif, katalase negatif, tidak membentuk spora, tidak bergerak, tidak mempunyai sitokrom, anaerobik, membutuhkan nutrisi yang kompleks seperti asam-asam amino, vitamin (B1, B6, B12) dan biotin (Simanjuntak, 2008).

Menurut Simanjuntak (2008), menyatakan bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Bakteri Asam Laktat adalah sebagai berikut:

a. Lama Fermentasi

Mikroorganisme diinokulasi pada media, pertumbuhan yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, volume dan berat sel. Ketika ukurannya telah mencapai kira-kira dua kali dari besar sel normal, sel tersebut membelah dan menghasilkan dua sel. Sel-sel tersebut kemudian tumbuh dan membelah diri menghasilkan empat sel. Selama kondisi memungkinkan, pertumbuhan dan

pembelahan sel berlangsung terus sampai sejumlah besar populasi sel terbentuk. Waktu antara masing-masing pembelahan sel berbeda-beda tergantung dari spesies dan kondisi lingkungannya, tetapi untuk kebanyakan bakteri waktu ini berkisar antara 10–60 menit. Tipe pertumbuhan yang cepat ini disebut pertumbuhan logaritmis atau eksponensial karena bila log jumlah sel digambarkan terhadap waktu dalam grafik akan menunjukkan garis lurus.

b. pH (keasaman)

Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan bakteri dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Pada keadaan ini mikroba proteolitik dan lipolitik dapat berkembang biak.

c. Suhu

Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan maksimal, minimal dan optimal yaitu suhu yang memberikan pertumbuhan terbaik dan perbanyakan diri tercepat. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan suhu pertumbuhan yang diperlukannya yaitu golongan psikrofil, tumbuh pada suhu dingin dengan suhu optimal 10–20°C, golongan mesofil tumbuh pada suhu sedang dengan suhu optimal 20–45°C dan golongan termofil tumbuh pada suhu tinggi dengan suhu optimal 50–60°C. Bakteri bervariasi dalam hal suhu optimum untuk pertumbuhan dan pembentukan asam. Kebanyakan bakteri dalam kultur laktat mempunyai suhu optimum 30°C, tetapi beberapa kultur dapat membentuk asam dengan kecepatan yang sama pada suhu 37°C maupun 30°C

d. Oksigen

Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganismenya. Bakteri diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu aerob obligat (tumbuh jika persediaan oksigen banyak), aerob fakultatif (tumbuh jika oksigen cukup, juga dapat tumbuh secara anaerob), anaerob obligat (tumbuh jika tidak ada oksigen) dan anaerob fakultatif (tumbuh jika tidak ada oksigen juga dapat tumbuh secara aerob).

Beberapa strain bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai agensia probiotik adalah *Lactobacillus acidophilus*, *L. reuteri* dan *L. casei* demikian pula strain dari beberapa persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan strain bakteri asam laktat sebagai agensia probiotik adalah bahwa strain tersebut merupakan mikroflora alami jalur pencernaan manusia, tumbuh dan tetap hidup pada makanan sebelum dikonsumsi, tetap hidup walaupun melewati jalur pencernaan, memiliki resistensi terhadap asam lambung, beberapa antibiotik, terhadap lisosim; dapat tumbuh pada intestin dan memiliki kemampuan menempel pada sel epitel intestin manusia, memberi efek yang menguntungkan pada usus, memproduksi asam dalam jumlah besar dan cepat, mampu menghasilkan komponen antimikrobia lain di samping asam (bakteriosin, hidrogen peroksida, diasetil dan reuterin) yang efektif menghambat bakteri lain yang tidak dikehendaki, khususnya bakteri patogen (Rahayu dan Margino, 1997)

Isolasi mikrobial ada dua cara, yaitu cara goresan (*streak plate method*) dan cara tuang (*pour plate method*). Metode goresan cawan dilakukan dengan menyebarkan setitik biakan pada permukaan agar di cawan dan digoreskan sejajar.

Metode tuang dengan melakukan pengenceran berturut-turut diletakkan pada cawan petri steril dan dicampurkan dengan medium agar cair yang dingin lalu dibiarkan memadat. Koloni yang berkembang tertanam di dalam agar tersebut (Rahayu dan Margino, 1997).

Menurut (Rahayu dan Margino, 1997), menyatakan bahwa jenis-jenis bakteri asam laktat antara lain sebagai berikut:

1. *Streptococcus thermophilus*, *Streptococcus lactis* dan *Streptococcus cremoris*.

Semuanya ini adalah bakteri Gram positif, berbentuk bulat (coccus) yang terdapat sebagai rantai dan semuanya mempunyai nilai ekonomis penting dalam industri susu.

2. *Pediococcus cerevisae* bakteri ini adalah Gram positif berbentuk bulat, khususnya terdapat berpasangan atau berempat (*tetrads*). Walaupun jenis ini tercatat sebagai perusak bir dan anggur, bakteri ini berperan penting dalam fermentasi daging dan sayuran.

3. *Leuconostoc mesenteroides* dan *Leuconostoc dextranicum*. Bakteri ini adalah Gram positif berbentuk bulat yang terdapat secara berpasangan atau rantai pendek. Bakteri-bakteri ini berperan dalam perusakan larutan gula dengan produksi pertumbuhan dekstran berlendir. Walaupun demikian, bakteri-bakteri ini merupakan jenis yang penting dalam 18 permulaan fermentasi sayuran dan juga ditemukan dalam sari buah, anggur, dan bahan pangan lainnya.

4. *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus delbrueckii*. Organisme-organisme ini adalah bakteri berbentuk batang, gram positif dan sering berbentuk pasangan

dan rantai dari sel-selnya. Jenis ini umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dari pada jenis-jenis *Pediococcus* atau *Streptococcus* dan oleh karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada sayuran. Pada hewan ternak lain seperti sapi bali dapat ditemukan bakteri asam laktat seperti *Lactobacillus lactis* dan *Lactobacillus brevis*.

Penyimpanan isolat mikrobial dimaksudkan supaya mikrobial tidak mengalami mutasi dan kehilangan sifat-sifat unggul. Cara yang digunakan untuk menyimpan isolat menurut (Fardiaz, 1993)

E. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat

Proses fermentasi sangat dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan bakteri asam laktat. Oleh karena itu, perlu dibuat kondisi yang ideal bagi pertumbuhan bakteri tersebut. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat antara lain adalah suhu, nilai pH, kadar garam, dan karbohidrat. Suhu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sel dan juga pembentukan produk oleh mikroba. Hal ini berhubungan dengan jenis mikroba yang dominan selama fermentasi (Fardiaz, 1988).

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan bakteri adalah nilai pH. Bakteri memerlukan suatu pH optimum untuk tumbuh optimal. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri ini berkaitan dengan aktivitas enzim. Enzim dibutuhkan oleh bakteri untuk mengkatalis reaksi-reaksi yang berhubungan dengan pertumbuhan bakteri. Apabila pH dalam suatu medium/lingkungan tidak optimal, maka akan mengganggu kerja dari enzim-enzim tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu sendiri.

Kebutuhan garam untuk pertumbuhan optimum mikroorganisme bervariasi, tergantung dari sifat dinding sel dan tekanan osmotik internalnya (Fardiaz, 1988). Karbohidrat merupakan sumber energi bagi bakteri asam laktat. Penambahan karbohidrat akan membuat lingkungan yang baik bagi pertumbuhan bakteri tersebut selama fermentasi, karbohidrat akan diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang sederhana seperti asam laktat, asam asetat, asam propionat, dan *etil alcohol*. Senyawa-senyawa ini yang menyebabkan rasa asam pada produk dan dapat berfungsi sebagai pengawet (Rahayu dkk, 1992).

Berbagai rintangan yang harus dihadapi mikroba dalam saluran pencernaan dari mulut sampai anus. Pada perjalanannya melintasi berbagai sistem pencernaan khususnya yang dijumpai diantaranya enzim lisosom pada air liur, asam lambung, garam empedu dan senyawa metabolit oleh BAL terutama asam laktat. Pada usus besar hampir tidak ditemukan lagi hambatan yang cukup berarti kecuali terjadinya kompetisi terhadap nutrisi. Bakteri probiotik harus mampu bertahan menghadapi rintangan-rintangan tersebut, agar mencapai usus dalam keadaan hidup dalam jumlah yang cukup memadai untuk berkembangbiak dalam menyeimbangkan mikrobiota usus (Suroño, 2004).

Usus pada ternak unggas ibarat sebuah tabung reaksi yang berisi beragam bakteri dan berbagai nutrisi yang disuplai melalui makanan yang dikonsumsi. Dalam saluran pencernaan ayam, mikroba terdapat hampir di sepanjang usus. Mikroorganisme utama yang terdapat dalam tembolok, usus halus dan ceca adalah golongan bakteri *Lactobacilli* yang khusus menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Sehingga pH dalam tembolok ayam yang baik antara pH 4 – 5 akibatnya

organisme yang tidak tahan asam tidak dapat berkembang secara normal (Sjofjan, 2003).

F. Probiotik

Probiotik dapat digolongkan menjadi dua yakni golongan bakteri dan golongan cendawan. Menurut Mujiasih (2001) mikroorganisme yang sering digunakan sebagai probiotik dari kedua kelompok ini adalah *Aspergillus niger*, *A.oryzae*, *Bacillus coagulans*, *B.lentis*, *B.pumilus*, *B.brevis*, *B.alvei*, *B.circulans*, *Bifidobacterium adolescentis*, *B.animalis*, *B.bifidum*, *B.infantis*, *B.longum*, *B.thermophilus*, *Bacteroides amylophilus*, *B.ruminicola*, *Lactobacillus acidophilus*, *L.brevis*, *Streptococcus oremoris*, *S.faecium*, *S.lactis*, *S.thermophilus*, *Leiconostoc mesenteroides*, *Pediococcus acidolacticii*, *Propionibacterium shemani* dan *Saccharomyces cerevisiae*.

Probiotik atau “*Probiotics*” berasal dari bahasa Yunani yang artinya “untuk hidup” (*pro* = untuk dan *biotic* = hidup). Istilah lain dari probiotik yang sering ditemukan adalah “*Direct-fed microbials*”, “*Life microorganism*”, “*Life culture*”. Istilah dan pengertian probiotik saat ini telah banyak dikemukakan para ahli. Jadi istilah probiotik ini, benar-benar bertolak belakang dari istilah “*antibiotics*”. Istilah kata probiotik pertama kali dipopulerkan oleh Lilley dan Stillwell (1965). Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi oleh inang akan memberikan pengaruh yang menguntungkan baginya dengan memperbaiki lingkungan mikrobiota yang ada dalam system pencernaan (Fuller, 1997).

Bakteri probiotik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik berasal dari *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium*. Dua golongan bakteri ini mampu memperpanjang masa simpan produk dan secara alami melindungi usus manusia (Tensiska, 2008).

Probiotik mikroba yang menguntungkan adalah mikroba yang dapat memperbaiki mikroekologi usus yang berdampak positif terhadap kesehatan inang. Timbul pertanyaan, apakah mungkin mengembangkan probiotik atau prebiotik untuk ternak. Dalam rumen ternak ruminansia, dijumpai berbagai jenis mikroba yang membantu pencernaan. Dengan lain kata, ternak secara alami telah memanfaatkan bantuan mikroba dalam pencernaannya, dan oleh karenanya mereka telah menggunakan probiotik (Tensiska, 2008).

Probiotik dalam penerapannya sebagai produk bioteknologi terdiri atas tiga jenis produk yaitu, probiotik yang mengandung kultur bakteri, kultur khamir, dan kultur molds (kapang) serta kombinasinya. Di dalam bidang peternakan, arti probiotik cukup penting karena saat ini manusia percaya bahwa makanan berlemak tinggi seperti dalam produk ternak banyak mengandung kolesterol. Probiotik yang terdapat dalam saluran pencernaan mampu menetralkan toksin yang dihasilkan bakteri patogen, menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan mencegah kolonisasinya di dinding usus halus, mempengaruhi aktivitas enzim di

usus halus, asimilasi kolesterol dan meningkatkan pertumbuhan serta *performance* ternak (Fuller, 1997).

Probiotik dapat mengubah pergerakan pada populasi mikroba di dalam usus halus ayam, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan usus, memperbaiki mikroflora pada sekum, serta meningkatkan penyerapan zat makanan (Mountzouris et al., 2010). Probiotik dapat memperbaiki saluran pencernaan dan meningkatkan kecernaan pakan, yaitu dengan cara menekan bakteri patogen dalam saluran pencernaan sehingga mendukung perkembangan bakteri yang menguntungkan yang membantu penyerapan zat-zat makanan (Kompiang et al., 2002).

Menurut Winarsih (2005), menyatakan bahwa Institut Teknologi Pertanian Bogor mulai mengembangkan probiotik untuk unggas (ayam). Untuk memperoleh kandidat probiotik, dilakukan isolasi mikroba dari ayam ras yang mendapat pakan komersial yang kemungkinan besar mengandung AGP dan ayam kampung yang kemungkinan besar tidak memperoleh AGP. Mikroba dari dalam usus ayam dipilih dengan harapan mikroba tersebut merupakan mikroba *indigenous*, sehingga berpeluang dapat tumbuh dan berkembang dalam usus ayam. Dari isolat yang diperoleh, perhatian difokuskan pada *Bacillus* sp. Karena bakteri tersebut memiliki beberapa sifat :

1. Bersifat aerob fakultatif, sehingga diharapkan mampu hidup dan berkembang dalam usus ternak dan untuk memproduksinya memerlukan peralatan yang sederhana.

2. Berspora sehingga penyimpanannya lebih sederhana dan tetap *viable* pada saat proses pembuatan pakan.
3. Menghasilkan enzim pencernaan seperti *protease* dan *amilase* yang dapat membantu pencernaan, serta memproduksi asam-asam lemak rantai pendek yang mempunyai sifat antimikroba.

Aspek keamanan dan fungsional menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi mikroba probiotik. Aspek keamanan seperti : menyehatkan saluran pencernaan, bersifat non patogen, dan tahan terhadap antibiotik. Aspek fungsional seperti kemampuan hidup dan tahan dalam saluran pencernaan, dapat di aplikasikan pada dunia industri dan tidak menimbulkan aroma yang menyimpang pada makanan. Pengukuran jumlah sel adalah pengukuran dalam jumlah sel per unit volume biakan dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung (*total direct count*) dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah total sel bakteri, baik yang hidup maupun yang mati. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan kamar penghitung khusus (*Petroff Hauser*) yang prinsip dasarnya seperti hemositometer dan sel hitung dibawah perbesaran mikroskop atau dengan menggunakan *Electronic particle analyzer*, yaitu alat penghitung yang dapat mengukur distribusi jumlah sel bakteri dalam suspense Sedangkan cara tidak langsung (*indirect viable count*), cara ini digunakan untuk menghitung sel yang hidup. Populasi bakteri yang akan dihitung diencerkan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan nontoksis. Kemudian, dilakukan penamaan sampel pada cawan petri. Koloni yang tumbuh dihitung dan dianggap satu koloni berasal dari satu induk sel bakteri. Koloni bakteri yang dihitung adalah

dipilih dari cawan petri yang tidak terlalu sedikit, biasanya dipilih antara kisaran 30 -300 koloni (Winarsih, 2005).

Suhu menentukan aktivitas enzim yang terlibat dalam aktivitas kimia. Peningkatan temperatur sebesar 10°C dapat meningkatkan aktivitas enzim sebesar dua kali lipat. Pada temperatur yang sangat tinggi akan terjadi denaturasi protein yang tidak dapat balik (*irreversible*), sedangkan pada temperatur yang sangat rendah aktivitas enzim akan berhenti. Pada temperatur pertumbuhan optimal akan terjadi kecepatan pertumbuhan optimal dan dihasilkan jumlah sel yang maksimal (Winarsih, 2005).

Tidak semua bakteri bisa digunakan sebagai probiotik. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya punya aktivitas antimikroba dan antikarsinogenik, mampu berkoloni dalam saluran pencernaan serta mampu meningkatkan penyerapan usus. Beberapa jenis probiotik yang sering digunakan adalah *Bifidobacterium brevis*, *B. infantis*, *B. longu*, *Lactobacillus acidophilus*, *L. bulgaricus*, *L. plantarum*, *L. rhamnosus*, *L. casei*, dan *Streptococcus thermophilus*. Di pasaran probiotik ini dijual dalam bentuk susu dan *foodsupplement* (Winarsih, 2005).

Probiotik juga bisa menghasilkan bakteriosin yang telah diketahui manfaatnya untuk melawan patogen yang bersifat spesifik terhadap beberapa strain patogen. Bakteri probiotik di isolasi dari organ pencernaan (Yulfizar, 2013).

Secara umum bakteri probiotik hidup didalam saluran pencernaan dan bermutualisme dengan tubuh inangnya, hidup pada pH 2-4, tidak mengakibatkan

hal yang negatif pada tubuh, tidak patogen, umumnya tidak membentuk spora, *saccharolytic*, umumnya anaerob, tidak mengganggu ekosistem tubuh, hidup dan tumbuh didalam usus (Fuller, 1989).

Asam laktat merupakan senyawa metabolit utama pada fermentasi oleh bakteri asam laktat yang akan menurunkan pH pada sekitar saluran usus menjadi 4–5, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan *E.coli* yang membutuhkan pH optimum 6-7. Sejumlah asam volatil yang dihasilkan selama fermentasi juga memberikan efek antimikroba dalam kondisi redoks potensial yang rendah. Asam asetat dan asam propionat yang dihasilkan melalui fermentasi heterofermentatif, akan berinteraksi dengan sel membran dan mengakibatkan asidifikasi intraseluler dan denaturasi protein, sehingga sangat efektif sebagai antimikroba (Suroño, 2004).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2016 di Laboratorium Kesehatan Hewan (Keswan), Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Erlenmeyer, inkubator, neraca analitik, pipet tetes, tabung reaksi, jarum ose, mikroskop, gelas objek, corong, batang pengaduk, lemari pendingin, rak tabung reaksi, autoklaf.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat bakteri asam laktat asal saluran Pencernaan Broiler yang telah mengalami perlakuan pemberian pakan, air suling, alkohol 96%, medium selektif MRSB (*Man Ragosa Sharpe Broth*), HCL 0,1 N Garam Empedu, dengan konsentrasi 1% dan 5%, kapas, *paper disk*, kertas lakmus, dan aluminium foil.

C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Medium MRSB (*Man Ragosa Sharpe Broth*)

Medium

Sebanyak 13 gram medium MRSB dilarutkan ke dalam 250 mL aquades. Kemudian dipanaskan sambil diaduk sampai homogen.

Lalu mulut masing-masing Erlenmeyer ditutup dengan menggunakan aluminium foil lalu disterilkan dalam autoklaf dengan suhu 121°C selama 15 menit. Selanjutnya larutan dibagi ke dalam 12 buah tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 mL.

2. Sterilisasi Alat dan Medium

- a. Alat-alat gelas berupa tabung reaksi, cawan petri, gelas objek dan pipet tetes disterilkan dengan sterilisasi panas kering (udara panas) pada oven. Sterilisasi dilakukan pada temperatur 170°C - 180°C selama 1-2 jam .
- b. Jarum ose disterilkan dengan sterilisasi panas kering dalam nyala api bunsen sampai merah membara .
- c. Medium dan alat non-gelas yang digunakan terlebih dahulu disterilkan dengan sterilisasi panas basah yaitu dengan menggunakan autoklaf. Sterilisasi ini dilakukan selama 15 menit dalam temperatur 120°C dan tekanan 2 atm.

3. Pengambilan Sampel


Sampel yang digunakan adalah Broiler strain 707 yang di peroleh dari peternakan ayam pedaging. Pengambilan saluran pencernaan Broiler dilakukan setelah perlakuan yakni pemberian pakan non antibiotik selama 3 (tiga) hari dan Tanpa pemberian pakan non antibiotik selama 3 (tiga) hari. Sampel saluran pencernaan yang telah diambil lalu di timbang dan di tambahkan aquades sebanyak 81 ml

4. Uji Probiotik

a. Ketahanan Terhadap Nilai Keasaman (pH)

Ketahanan isolat mikroba terhadap asam lambung pada saluran pencernaan yang ber pH rendah yaitu sekitar 3, 4, 5, dilakukan dengan menambahkan HCl 0,1 N pada medium MRSB. Isolat bakteri diambil dari stok sebanyak 1 ose (ose bulat). Kemudian di inokulasikan pada medium MRSB-HCl dan diinkubasi selama 2-3x24 jam dengan temperatur 37°C.

Hasil positif ditandai dengan terjadinya pertumbuhan bakteri pada medium yang memiliki keasaman rendah (pH 3, pH 4, dan pH 5). Hasil negatif jika tidak terjadi pertumbuhan mikroba pada medium.




Gambar 1 Skema Kerja Uji pertumbuhan *BAL* terhadap Ketahanan terhadap Nilai Keasaman (pH)

b. Uji Ketahanan Terhadap Garam Empedu

Ketahanan isolat mikroba terhadap garam empedu digunakan untuk mengkaji kemampuan isolat bertahan pada saluran pencernaan yang terdapat garam empedu pada permukaan atas usus. Metode ini dilakukan dengan menambahkan Garam Empedu dengan konsentrasi 1 % dan 5 % pada medium MRSB. Selanjutnya isolat bakteri diambil dari stok sebanyak 1 ose kemudian diinokulasikan pada medium MRSB–garam empedu. Diinkubasi selama 1-3x24 jam dengan temperatur 37°C.


Ketahanan terhadap garam empedu ditentukan berdasarkan ada tidaknya pertumbuhan bakteri pada medium. Hasil positif jika ditandai dengan adanya endapan pada dasar tabung dan adanya perubahan media menjadi lebih keruh dibandingkan sebelum diinkubasi.



Gambar 2 Skema Kerja Uji Ketahanan terhadap Garam Empedu

c. Uji Ketahanan Suhu($^{\circ}\text{C}$)

Isolat bakteri diambil dari stok sebanyak 1 ose kemudian diinokulasikan pada medium MRSB. Selanjutnya medium yang telah berisi isolat diinkubasi pada temperatur 31°C , 37°C , dan 41°C selama 2×24 jam. Kemudian diamati apakah terjadi pertumbuhan bakteri pada medium. Hasil positif jika terjadi pertumbuhan bakteri pada kisaran temperatur tersebut.



Gambar 3 Skema kerja uji ketahanan Suhu $^{\circ}\text{C}$

D. *Analisa Data*

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif antara lain dengan melihat hasil dari Uji Probiotik (pH, Garam Empedu, dan suhu) isolat bakteri asam laktat asal saluran pencernaan broiler. Isolasi bakteri dimana seluruh data diperoleh dari seluruh pengamatan (positif atau negatif) yang ditunjukkan pada beberapa indikator uji yang telah dilakukan yakni, pengumpulan data dan pengamatan secara langsung dan dengan cara dokumentasi untuk dijadikan bukti hasil penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Pengujian Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Kadar Keasaman (pH)

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan uji isolat bakteri terhadap kadar keasaman di peroleh pH 3, pH 4, dan pH 5 menunjukkan bahwa isolat A tahan terhadap pH 4 dan pH 5 tetapi tidak mampu tumbuh pada pH 3. sedangkan isolat B, C dan D yang mampu tumbuh terhadap pH 3, pH 4 dan pH 5.

Hasil dari pengujian tersebut dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut:


Tabel 1. Pertumbuhan Isolat Bakteri Asam Laktat Terhadap Nilai Keasaman (pH)

Ph	Tumbuh							
	A		B		C		D	
	24 JAM	48 JAM	24 JAM	48 JAM	24 JAM	48 JAM	24 JAM	48 JAM
3	-	-	++	++	++	++	+	+
4	+	+	+	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+	+	+	+

Sumber : *Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa, 2016*

Ket :

- - (kuning bening/tidak ada pertumbuhan)
- + (kuning sedikit keruh/ada sedikit pertumbuhan)
- ++ (keruh dan cukup banyak endapan/sedang pertumbuhan)
- +++ (sangat keruh dan banyak endapan/sangat banyak pertumbuhan)



A

B

Sumber : *Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa, 2016*

Gambar 1 Hasil Pengamatan Uji terhadap Kadar Keasaman (pH)

(A) MRSB dengan pH 3, 4 dan 5

(B) MRSB dengan pH 3 (tidak mengalami pertumbuhan)

2. Pengujian Isolat BAL terhadap Garam Empedu

Pada uji ketahanan terhadap garam empedu sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 2, menunjukkan keempat isolat A, B, C dan D mampu bertahan dan tumbuh pada medium yang mengandung garam empedu dengan konsentrasi 1% dan 5%. Tetapi keseluruhan isolat lebih optimal tumbuh pada medium yang mengandung dengan konsentrasi 5% dibandingkan dengan konsentrasi 1%.

Hasil inokulasi isolat bakteri asam laktat pada media MRSB dengan penambahan garam empedu sebanyak 1% dan 5% menunjukkan bahwa isolat A, B, C dan D menunjukkan pertumbuhan pada media tersebut.

Tabel 2. Ketahanan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Garam Empedu

Garam empedu	TUMBUH							
	A		B		C		D	
	24 JAM	48 JAM						
1%	+	++	++	++	++	++	++	++
5%	+	++	++	++	+++	+++	++	++

Sumber : *Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa, 2016*

Ket :



Sumber: *Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa, 2016*

Gambar 2. Hasil Pengamatan Uji terhadap Garam Empedu

3. Pengujian Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Suhu (°C)

Uji ketahanan suhu terhadap isolat A, B, C dan D menunjukkan laju pertumbuhan yang berbeda pada tiap variasi suhu, sebagaimana yang terlihat pada tabel 3 dan gambar 3. Hasil inokulasi isolat bakteri asam laktat pada media MRSB dengan pengujian terhadap suhu 30°C, 37°C dan 41°C menunjukkan bahwa isolat A dan D tidak dapat tumbuh pada suhu 30°C tetapi menunjukkan pertumbuhan pada suhu 37°C dan 41°C. Hal tersebut berbeda pada isolat B dan C yang mana isolat tersebut menunjukkan pertumbuhan pada suhu 30°C, 37°C dan 41°C.

Hasil dari pengujian tersebut dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3 Pertumbuhan Isolat Bakteri Asam Laktat terhadap Suhu(°C)

Suhu°C	Tumbuh							
	A		B		C		D	
	24 JAM	48 JAM	24 JAM	48 JAM	24 JAM	48 JAM	24 JAM	48 JAM
30	-	-	+	+	+	+	-	-
37	++	++	++	++	++	++	++	++
41	++	++	++	++	+++	+++	++	++

Sumber : *Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa, 2016*

Ket :

- - (kuning bening/tidak ada pertumbuhan)
- + (kuning sedikit keruh/sedikit pertumbuhan)
- ++ (keruh, dan sedang pertumbuhan/cukup banyak endapan)
- +++ (sangat keruh dan banyak endapan/banyak pertumbuhan)



Suhu 30°C

Suhu 37°C

Suhu 41°C

Sumber : *Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa, 2016*

Gambar 3. Hasil Pengamatan Uji terhadap Suhu °C

B . Pembahasan

Pengujian Isolat BAL (Bakteri Asam Laktat) yang dilakukan menggunakan media MRSB (*Man Ragosa Sharpe Broth*) pada berbagai uji probiotik (pH, Garam Empedu dan suhu). Terdapat empat isolat (A, B, C dan D) yang di uji pada berbagai uji Probiotik. isolat A berasal dari saluran pencernaan broiler yang di berikan pakan isolat B,C dan D. Berasal dari saluran pencernaan broiler yang tidak diberikan pakan selama tiga hari. Isolat isolat A dan D di perkirakan Bakteri Asam Laktat (BAL) jenis *Enterococcus* sp sedangkan isolat B dan C di duga *Lactobacillus* sp.

1. Pengujian Isolat BAL terhadap Nilai Keasaman (pH)

Berdasarkan Uji probiotik terhadap ketahanan asam (pH) dilakukan dengan menggunakan medium MRSB yang ditambahkan HCl 0,1 N untuk mendapatkan pH3, pH4 dan pH5. Pengujian dilakukan dengan menumbuhkan isolat tersebut pada media yang telah di buat selama 24 jam dan 48 jam di dalam inkubator bersuhu 37°C. Hasil dari pengujian tersebut dapat di lihat bahwa pada 24 jam dan 48 jam isolat A tidak menunjukkan pertumbuhan pada pH 3 yang dapat di lihat dari media tanam kuning bening (tidak ada pertumbuhan), tetapi mampu menunjukkan pertumbuhan pada pH 4 dan pH 5. Sedangkan isolat B, C dan D menunjukkan pertumbuhan pada 24 jam dan 48 jam.

Faktor yang mempengaruhi bakteri tidak tumbuh pada pH 1-3 adalah perbedaan habitat asal starter. Saluran pencernaan broiler yang diisolasi adalah saluran pencernaan usus broiler yang di berikan pakan dan broiler tidak mendapatkan perlakuan pemberian pakan maupun antibiotik. Broiler yang digunakan baru berumur tiga hari.

Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri ini berkaitan dengan aktivitas enzim. Enzim dibutuhkan oleh bakteri untuk mengkatalis reaksi-reaksi yang berhubungan dengan pertumbuhan bakteri. Apabila pH dalam suatu medium/lingkungan tidak optimal, maka akan mengganggu kerja dari enzim-enzim tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu sendiri (Osmanagaoglu dkk, 2010)

Uji probiotik terhadap ketahanan pH dilakukan dengan menggunakan medium MRSB yang ditambah HCl 0,1 N untuk mendapatkan pH 2,5-3 (sesuai

pH lambung). Berdasarkan hasil pengujian isolat bakteri probiotik mampu tumbuh pada pH 2,5-3. Hal ini membuktikan isolat BAL tersebut mampu untuk melewati asam lambung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bakteri probiotik. pH medium biakan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, untuk pertumbuhan bakteri juga terdapat rentang pH dan pH optimal. Meskipun medium pada awalnya dikondisikan dengan pH yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, tetapi secara bertahap pertumbuhan akan dibatasi oleh produk metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut (Djide dan Wahyudi, 2008).

2. Pengujian Isolat Bakteri Asam Laktat Terhadap Garam Empedu

Pengujian Isolat bakteri asam laktat terhadap garam empedu dilakukan dengan menumbuhkan isolat tersebut pada medium MRSB yang ditambahkan garam empedu sebanyak 1% dan 5% kemudian ditumbuhkan pada suhu 37°C di dalam inkubator selama 24 jam dan 48 jam. Berdasarkan hasil pengujian isolat bakteri pada media dengan kandungan garam empedu 1% dan 5% dapat dilihat bahwa isolat A, B, C dan D menunjukkan pertumbuhan baik pada 24 jam maupun 48 jam. Tetapi keseluruhan isolat lebih optimal tumbuh pada medium yang mengandung dengan konsentrasi 5% dibandingkan dengan konsentrasi 1%.

Salah satu syarat mikroba dapat digunakan sebagai agensi probiotik adalah mampu bertahan pada konsentrasi garam empedu paling tidak 3%. Hal ini disebabkan bahwa kondisi dalam saluran pencernaan mengandung garam empedu rata-rata 3% (Sivram dan Vishwanath, 2012).

Garam empedu memiliki sifat sebagai senyawa aktif permukaan sehingga dapat menembus dan bereaksi dengan sisi membran sitoplasma yang selanjutnya

menyebabkan perubahan dan kerusakan struktur membran. Keragaman struktur asam lemak pada membran sel bakteri menyebabkan perbedaan permeabilitas dan diduga akan mempengaruhi ketahanan bakteri terhadap garam empedu (Kusumawati, et al., 2003). Dalam menguji potensi bakteri asam laktat sebagai bakteri probiotik, bakteri asam laktat tidak hanya harus tahan terhadap pH rendah, akan tetapi juga harus tahan terhadap garam empedu. ketahanan terhadap derajat keasaman dan garam empedu merupakan ciri yang penting bagi bakteri asam laktat sebab menentukan aktivitasnya dalam saluran pencernaan, terutama di saluran usus bagian atas tempat empedu disekresikan. Kemampuan kultur probiotik meningkatkan kolonisasi laktobasili pada bagian atas usus dapat mengendalikan pertumbuhan patogen usus yang memasuki sistem pencernaan (Russel, 1992).

Mikroba kandidat probiotik harus mampu bertahan terhadap kondisi ekstrim saluran pencernaan mulai dari mulut hingga mencapai usus dan selanjutnya hidup berkoloni di permukaan usus. Tahapan pertama yang akan dilalui adalah kondisi keasaman lambung dan sekresi garam empedu pada usus, oleh karena itu dilakukan uji ketahanan garam empedu pada konsentrasi 1% dan 5% dan dilakukan pula pengujian pada suhu 15°C, 30°C, 37°C, dan 41°C menyebutkan persyaratan bakteri asam laktat (BAL) yang dapat digunakan sebagai agensia probiotik, selain harus merupakan penghuni tetap jalur pencernaan, bakteri ini harus memiliki sifat toleran terhadap suhu dan empedu (Fuller, 1989).

Kondisi saluran pencernaan erat kaitannya dengan pH yang berbeda beda. Salah satu faktor yang menonjol dalam menentukan kadar pH dalam saluran pencernaan adalah keasaman asam lambung. Kondisi keasaman lambung berfungsi sebagai pintu gerbang pertama untuk melakukan seleksi mikroba sebelum masuk ke usus (Khan dan Wiyana, 2011).

3. Pengujian Isolat Bakteri Asam Laktat Terhadap Suhu (°C)

Pengujian Isolat bakteri asam laktat terhadap suhu dilakukan dengan menumbuhkan isolat tersebut pada media MRSB pada suhu 30°C, 37°C dan 41°C. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, pada 24 jam dan kedua isolat A dan D menunjukkan kuning bening/tidak ada pertumbuhan pada suhu inkubasi 30°C akan tetapi pada suhu 37°C dan 41°C kedua isolat tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan. Hasil pengujian berbeda di dapatkan pada isolat B dan C yang mana kedua isolat tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan di suhu 30°C, 37°C dan 41°C baik di 24 jam maupun 48 jam. Hal ini sesuai dengan penjelasan Surono (2004) yang menyatakan bahwa suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri asam laktat beragam pada setiap strain. Berdasarkan suhu optimum pertumbuhannya, bakteri asam laktat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu mesofilik (suhu optimum pertumbuhannya 25°C dan suhu maksimumnya 37°C–40°C) dan termofilik (suhu optimum pertumbuhannya 37°C–45°C dan suhu maksimumnya 45°C – 52°C

Suhu memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap fase adaptasi pertumbuhan mikroorganisme. Ketika suhu mendekati suhu minimum, tidak hanya mengurangi kecepatan pertumbuhan tetapi juga memperpanjang fase

adaptasi. Hal ini sangat penting dalam proses penyimpanan pada suhu dingin. (Garbutt 1997).

penggunaan suhu rendah untuk isolat didasarkan atas fakta bahwa aktivitas mikroorganisme dapat diperlambat dan/atau dihentikan pada suhu di atas suhu beku dan biasanya berhenti pada suhu di bawah titik beku. Hal ini disebabkan karena semua reaksi metabolisme mikroorganisme dikatalisasi oleh enzim dan tingkat reaksi katalisasi enzim tergantung pada suhu sedangkan pada suhu 30⁰C, 37⁰C, dan 41⁰C terdapat pertumbuhan mikroba atau endapan pada dasar tabung. (Jay, 2000) Jika mikroba disimpan di bawah suhu minimum, maka sel-sel mikroorganisme akan tumbuh lambat dan jika disimpan di atas suhu maksimum, maka sel-sel mikroorganime akan mati dengan cepat (Ray, 2001).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semua isolat Bakteri asam laktat (BAL) (A, B, C dan D) dapat tumbuh pada derajat keasaman pH 3, pH 4 dan pH 5, persentase garam empedu (1% dan 5%) dan berbagai kondisi Suhu (30°C, 37°C dan 41°C) jenis isolat dapat berbeda-beda karena perbedaan habitat asal starter. Untuk pH 3 isolat A tidak terdapat pertumbuhan ditandai dengan medium tidak mengalami perubahan (jernih) hal yang sama pada suhu rendah 30°C

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Bakteri Asam Laktat yang diperoleh dari usus broiler dapat dimanfaatkan sebagai kandidat probiotik

DAFTAR PUSTAKA


- Abun. 2008. *Hubungan Mikroflora dengan Metabolisme dalam Saluran Pencernaan Unggas dan Monogastrik*. Universitas Padjadjaran : Jatinangor Bandung.
- Adams, C. 2009. *Probiotics - Protection Against Infection: Using Nature's Tiny Warriors To Stem Infection*. Available at: <http://probiotic.org/lactobacillus-rhamnosus.htm>. (Diakses tanggal 26 November 2015) jam 10:21
- Anastiawan, 2014. *Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Probiotik yang Berasal dari Usus Itik Pedaging Anas Domesticus*. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ashshiddiq, 1971. *et all, eds. Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Yayasan Pelanggaran Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Begley, M., C. Hill, and C. G. M. Gahan. 2005. *Bile Salt Hydrolase Activity in Probiotics*. Appl. Environ. Microbiol. 72 (3):1729-1738.
- Cole, D.J.A. 1991. *The Role of The Nutritionist in Designing Feed for The Future in Feed Industry*. T.P. Lyons (ed). *Proceeding of Altech*
- Djide, M. N., dan Wahyudin E. 2008. *Isolasi Bakteri Asam Laktat dari Air Susu Ibu, dan Potensinya dalam Menurunkan Kadar Kolesterol secara In Vitro*. Majalah Farmasi dan Farmakologi.
- Fardiaz, S. 1988. *Penuntun Praktek Mikrobiologi Pangan*. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Teknologi Pertanian. IPB Press. Bogor.
- Fardiaz, S. 1993. *Analisis Mikrobiologi Pangan Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Fuller, R. 1989. *A Review Probiotic in Man and Animals*. *Journal of Applied Bacteriology*.
- Fuller R. 1997. *Application and Practical Aspects*. Probiotik 2. Chapman & Hall.
- Garbutt J. 1997. *Essentials of Food Microbiology*. London: Arnold


- Gunawan. 2003. *Uji Kemampuan Probiosis Isolat Lactobacillus Strain Lokal dan Analisis Asam Organik yang dihasilkan dalam Menurunkan Kadar Kolesterol*. [Skripsi]. Purwokerto: Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman.Purwokerto,Banyumas.
- Hasbi Ashshiddiq, 1971. *et all, eds. Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Yayasan Pelanggaran Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Hifizah. 2012. *Mikrobiologi Ternak*: UIN Press Makassar.
- Heni Mutmainnah dkk,2014. *Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Probiotik dari Saluran Pencernaan Ayam Kampong Gallus Domesticus* Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Makassar
- Hood, S.K. and E.A. Zottola. 1998. *Effect of Low pH on The Ability ofLactobacillus Acidophilus to Survey and Adherence to Human Intestinal Cells*. Journal of Food Science
- Hosono,A. 2002. *Present Statust of Fermented Milk Product and Their Impacton Human Health. Symposium on Biotecnology of Probiotik for Human Health*. Jakarta: BPPT
- Jay JM. 2000. *Modern Food Microbiology*. Ed ke-6. Maryland: Aspen Publisher, Inc.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Mizam Bunaya Kreatif.
- Kusumawati, N; Bettysri, L J; Siswa S; Ratihdewanti dan Hariadi. 2003. *Seleksi Bakteri Asam Laktat Indigenou sebagai Galur Probiotik dengan Kemampuan Menurunkan Kolesterol*. Journal Mikrobiologi Indonesia.
- Khan, M. S. dan Wiyana, A., 2011, *Karakteristik Ketahanan Bakteri Asam Laktat Indigeneous Kefir Sebagai Kandidat Bakteri Probiotik pada Kondisi Saluran Pencernaan In Vitro* , Institit Pertanian Bogor, Bogor.
- Nagao, F., M. Nakayama, T. Muto and K. Okumura. 2000. *Effects of Afermented Milk Drink Containing Lactobacillus Casei Strain Shirota on Theimmune System in Healthy Human Subjects*. Bioscience Biotechnologyand Biochemistry.
- Kompiang, I. P. 2002. *Pengaruh ragi: Saccharomyces cerevisiae dan ragi laut sebagai pakan imbuhan probiotik terhadap kinerja unggas*. *JITV* 7: 18-21.
- Saxelin, M. 1997. *Lactobacillus GG-a Human Probiotic Strain with Through Clinical Documentation*. *Food Rev Int*. Vol. 13: 293-313/


- Matar, C. 2001. Immunomodulating Effects of Milks Fermented by *Lactobacillus Helveticus* and Its Non-Proteolitics Varian. *Journal of Dairy Research*
- Mountzouris K.C. P. Tsitrsikos, I. Palamidi, A. Arvaniti, M. Mohnl, G. Schatzmayr and K. Fegeros. 2010. Effect of probiotic inclusion levels in broiler nutrition on growth performance, nutrient digestibility, plasma immunoglobulins, and cecal microflora composition. *Poult. Sci.* 89:58-67.
- Parrakasi, A. 1983. *Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik*. Angkasa, Bandung.
- Prado, Dkk. 2008. *Trends in non-dairy probiotic beverages*. Food Res.
- Pratiwi, S. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ray B. 2001. *Fundamental Food Microbiology*. Ed-2. New York: CRC Press
- Rahayu, E.S. dan Margino. 1997. *Bakteri Asam Laktat: Isolasi dan Identifikasi. Materi Workshop. Seminar Makalah Tugas Akhir*. PAU Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Rahayu W, Ma'oen S, Suliantari dan Fardiaz S. 1992. *Teknologi Fermentasi Produk Perikanan. Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor*.
- Russel, J. B., 1992, Another Explanation for The Toxicity of Fermentation Acid at Low pH : Anion Accumulation versus Uncoupling, *J. Appl. Bacteriol* 73 : 363 – 370.
- Saarela, M., G. Mogensen, R. Fondén, J. Mättö, and T. Mattila-Sandholm. 2000. Probiotic bacteria: safety, functional and technological properties. *J. Biotechnol*
- Shihab. 2002. *Tafsir Al – Mishbah*. Jakarta: Lantera Hati. Ir. Nurdin Mappa, MM dan Dahlan Lama Bawa, S.ag, M.ag. 2013. *Kajian Holistik Tentang Ternak (Holistic Study of Animal)*. Makassar : LSQ Makassar.
- Schrezenmeir, J. and M. de Vrese. 2001. Probiotics, Prebiotics and Symbiotics- Approaching a Definition. *American Journal of Clinical Nutrition*.
- Simanjuntak. 2008. *Bakteri Asam Laktat Mampu Mengikat Toksin*. Nirwana Abadi. Jakarta.
- Sivram PL, dan Vishwanath. 2012. *Probiotik bacteria: safety, functional and technological properties*. *J. Biotechnol.* 84(3): 197-215

- Sjofjan, O. 2003. *Kajian Probiotik AB (Aspergillus sp dan Bacillus spp) sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasi Efeknya terhadap Mikroflora Usus serta Penampilan Produksi Ayam Petelur*. Disertasi Program Pasca Sarjana. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Surono, I.S. 2004. *Probiotik Susu Fermentasi dan Kesehatan*. Tri Cipta Karya. Jakarta.
- Tensiska. 2008, *Probiotik dan Prebiotik sebagai Pangan Fungsional*. Universitas Padjadjaran. Jatinangor. Bandung.
- Titin Yulinery dkk. 2006. *Uji Fisiologis Probiotik Lactobacillus sp. Mar 8 yang Telah Dienkapsulasi dengan Menggunakan Spray Dryer untuk Menurunkan Kolesterol* Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor.
- Usman dan Hosono A. 1999. Bile Tolerance, Taurocholate Deconjugation, And Binding Of Cholesterol By Lactobacillus Gasseri Strains. *J. Dairy Sci.*
- Winarno. 2005. *Flora Usus: Menjaga Kesehatan dan Kebugaran*. Department of Food Science and Technology. <http://www.republika.co.id/detail>.
- Winarsih, W. 2005. *Pengaruh Probiotik dalam Pengendalian Salmonellosis Subklinis pada Ayam: Gambaran Patologis dan Performan*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor .
- Vélez, M. Perea. 2007. Identification and Characterization of Starter Lactic Acid Bacteria and Probiotics from Columbian Dairy Products. *Journal of Applied Microbiology*; ISSN; 1364-5072
- Yulfizar, C. 2013. *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Probiotik pada Rastrelliger sp. Universitas Syiah Kuala. Indonesia rosenbergii (de Man)*. Aquac. Res.,
- Ziemer, C.J and Gibson, G.R. 1998. *A overview of Proboitic, Prebiotic and Symbiotic in the functional food concept*. Prospectives and Future Strategies. *International dairy Journal*

LAMPIRAN PENELITIAN







RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Arfiandi Agus. Lahir di Maros pada tanggal 18 September 1992. Penulis akrab disapa “Fian” adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri H. Agus Yahri dan Hj. Harminah. Penulis memulai pendidikan awal di SD No 03 Kec turikale Kab. Maros tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Ke SMP DISAMAKAN ANGKASA tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Ke SMU DISAMAKAN ANGKASA Maros tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi.