

**UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN FRAKSI EKSTRAK ETIL
ASETAT KULIT BATANG KEMIRI (*Aleurites moluccana* L.
Willd) TERHADAP SEL KANKER HELA.**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Wahyu Lyana Ningsih S
70100113039

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

**UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN FRAKSI EKSTRAK ETIL
ASETAT KULIT BATANG KEMIRI (*Aleurites moluccana* L Willd
TERHADAP SEL KANKER HELA.**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Wahyu Lyana Ningsih S
70100113039

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Lyana Ningsih S
NIM : 70100113039
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 08 Oktober 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Pakjenekeang NO 16C
Judul : UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN EKSTRAK
FRAKSI ETIL ASETAT KULIT BATANG KEMIRI
(*Aleurites Moluccana* L.Willd) TERHADAP SEL
KANKER

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil penelitian sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 18 Agustus 2017

Penyusun,



WAHYU LYANA NINGSIH
NIM. 70100113039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Penghambatan Fraksi Etil Asetat Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L.Willd) Terhadap Sel Kanker Hela” yang disusun oleh **Wahyu Lyana Ningsih, NIM: 70100113039**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jum’at, 18 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **25 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Haniah, Lc. M.A	(.....)

 Dekan,


Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 00

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan utama dan paling utama ke hadirat Allah subhānahu wata'āla atas rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang telah menyingkap dan menggulung kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi, dan menjadi suri tauladan bagi jiwa jiwa yang suci.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Penghambatan Fraksi Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Kemiri *Aleurites Moluccana* (L.) Willd. Terhadap Sel Kanker Hela” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak nikmat dari Sang Khalik melalui dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, terkasih, tersayang, Ayahanda H. Soepardi dan ibunda Hj. Syamsinar dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, doa yang tulus, dan pengorbanan lainnya yang jika diluapkan dalam tulisan ini tidak akan cukup untuk menggambarkan semuanya sehingga tidak dapat terbalaskan dengan seluruh pembendaharaan apa pun di dunia ini.

Saudaraku Wahyu Lyadi Purnama yang memberikan motivasi dan semangat, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan restu dan do'anya saya ucapkan banyak kasih dari hati yang terdalam. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M. Kes., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu Haeria, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
5. Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan ibu Afrisusnawati Rauf, S. Si., M. Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
6. Ibu Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
7. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,

8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
9. Kepada mbak Suprihatin, SE.,MBA selaku tekhnisi laboratorium parasitologi fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalankan penelitian.
10. Kepada Zakiah Anugerah Hamzah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan solusi dari tiap hambatan.
11. Kepada Andi Tri Resti Fauziah Sahib dan Nikmawati yang telah mengorbankan waktunya untuk membantu penulis dalam hal kecil hingga yang besar.
12. Kepada Musfirah Burhan yang menjadi tim untuk tanaman kulit batang kemiri
13. Kepada Faradhiba Amriani dan Andiny mulya yang menjadi tim antikanker saat meneliti
14. Kepada Muhammad Faris Hidayat, sebagai mentor untuk memberikan beberapa saran dalam menyusun skripsi ini.
15. Teman teman dekat penulis selama kuliah yang tidak pernah lupa memberikan semangat (Nikmawati, Nur Annisa Maulidya, Rizky Fauziah, Baso Arwan, Andi Isma Nursyamsu, Nur Azizah, Rezky mauliyanti, Andi Arnisa Wulan rukmana, Nur Amalia Shahib, Rifqa Choirunnisa, Husniar, Syafirah Tizawani dan Tria Wulan Purnamei)
16. Teman teman Atf SpeXsolid selalu ada dan menyemangati penulis selama melakukan penelitian di Yogyakarta (Fadhilah Auliyah Uswah Basman, Farannisa Ramil Putri, Nur syahri Ramadhani, Ummy Kalsum, Ika Pratiwi, Andi Ikhwanul Ummah, Andi Nurazizah Fajri, Yulianita danti sukardi, dan Gatik).

17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Far13ion) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, Kalian Luar Biasa

18. Kakanda Ahmad Firdaus Basri untuk support dan doa yang melangit, semoga Allah memberkahi tiap langkahmu.

19. Kepada kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar serta pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah subhānahu wata'āla. Aamiin.

Wassalam.

Gowa, 18 Agustus 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Penulis
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1. Definisi Operasional.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Uraian Tanaman Kulit Kayu Kemiri.....	12
B. Siklus Sel.....	15
C. Apoptosis.....	16
D. Kanker.....	18
E. Penyebaran Kanker.....	20
F. Kanker Serviks.....	21
G. Ekstraksi.....	23
H. Kultur Sel.....	26
I. Sel Hela.....	32
J. Toksisitas.....	33
K. Uji Antipoliperatif.....	36

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	46
	A. Jenis Penelitian.....	46
	B. Lokasi Penelitian dan Waktu	46
	C. Lokasi Penelitian	46
	D. Waktu Pelaksanaan	46
	E. Pendekatan Penelitian	46
	F. Populasi	46
	G. Sampel.....	46
	H. Alat dan Bahan.....	47
	1. Alat	47
	2. Bahan	47
	I. Prosedur Kerja.....	48
	1. Penyiapan Sampel.....	48
	2. Ekstraksi Sampel	48
	3. Fraksinasi.....	49
	4. Penyiapan Larutan Uji	49
	5. Uji Aktivitas Penghambaan Sel kanker Leher Rahim	50
	J. Analisis Data	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Hasil Penelitian	52
	B. Pembahasan.....	55
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Implikasi.....	65
KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persen Rendamen	52
Tabel 2.	Hasil Fraksi Ekstrak Etil Asetat	52
Tabel 3.	Uji Sitotoksik Fraksi A	53
Tabel 4.	Uji Sitotoksik Fraksi B	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Siklus sel	16
Gambar. 2 Struktur poliferasi menggunakan MTT	37
Gambar. 3 Kurva Fraksi A	54
Gambar. 4 Kurva Fraksi B	55
Gambar. 5 Sampel Penelitian.....	76
Gambar. 6 Proses Penimbangan Sampel.....	76
Gambar. 7 Proses Ekstraksi	76
Gambar. 8 Hasil Fraksi	77
Gambar. 9 Penampakan Sel	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Alur Penelitian	72
Lampiran. 2 Gambar Penelitian	76
Lampiran. 3 Penimbangan dan Perhitungan Pengenceran	78
Lampiran. 4 Perhitungan % Inhibisi	79
Lampiran. 5 Grafik dan Perhitungan IC_{50}	80



ABSTRAK

Nama : Wahyu Lyana Ningsih
NIM : 70100113039
Judul : UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN FRAKSI EKSTRAK ETIL
ASETAT KULIT BATANG KEMIRI *Aleurites moluccana* (L.) Willd.
TERHADAP SEL KANKER HELA

Telah dilakukan penelitian Uji aktivitas penghambatan fraksi ekstrak etil asetat kulit batang Kemiri *Aleurites Moluccana* (L.) Willd, terhadap Sel Kanker Hela. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas penghambatan kulit batang kemiri terhadap sel kanker Hela dengan menggunakan metode uji 3-[4,5-dimetilthiazol-2yl]-2,5- difeniltetrazolinum bromide (MTT)

Penelitian ini dimulai dari maserasi secara bertingkat menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol 70% sehingga mendapatkan masing masing ekstrak dari tiap pelarut dan dilanjutkan fraksinasi menggunakan ekstrak etil asetat dengan berat 8,93 gram hingga diperoleh hasil Fraksi etil asetat A sebesar 308,1 gram, dan Fraksi etil asetat B 205,6 gram. Uji sitotoksik terhadap sel kanker Hela dengan metode MTT menghasilkan IC_{50} untuk Fraksi A sebesar 1,58 $\mu\text{g/mL}$ dan Fraksi etil asetat B 4677,35 $\mu\text{g/mL}$.

Kata kunci : *Aleurites moluccana* L.Willd, sel kanker serviks HeLa, uji MTT.

ABSTRACT

Nama : Wahyu Lyana Ningsih
NIM : 70100113039
Tittle : ACTIVITY TEST INHIBITORY OF ETHYL ACETATE FRACTION OF BARK PECAN STEM *Aleurites moluccana* (L.) Willd TO CANCER CELL OF HELA

The experiment has been conducted to test the inhibition activity of fraction of ethyl acetate skin extract of Bark (*Aleurites Moluccana* L. Willd), against Hela Cancer Cell. This study aims to determine the inhibition activity of bark of hazelnut stem against Hela cancer cell using the test method of 3- [4,5-dimethylthiazol-2yl] - 2,5- diphenyltetrazolinum bromide (MTT)

The study was started by maceration using n-hexane, ethyl acetate and ethanol 70% solvent to obtain each extract from each solvent and continued fractionation using ethyl acetate extract weighing 8,93 gram to obtain the result of ethyl acetate fraction A of 308 , 1 gram, and 205.6 gram ethyl acetate fraction. The cytotoxic test of Hela cancer cell with MTT method resulted in IC50 for Fraction A of 1.58 $\mu\text{g} / \text{mL}$ and ethyl acetate fraction B 4677,35 $\mu\text{g} / \text{mL}$.

Key words : *Aleurites moluccana* L.Willd, cervix cancer cell HeLa, MTT assay.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kanker merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan dunia hingga saat ini. Menurut data *World Health Organization* (WHO), setiap tahun jumlah penderita kanker di dunia berjumlah 625 juta orang dan dalam waktu 10 tahun diperkirakan 9 juta orang akan meninggal setiap tahun akibat kanker, dua pertiga dari penderita kanker di dunia berada di negara berkembang (Sugiyarto, 2013 : 1).

Penyakit kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh tidak normal (tumbuh sangat cepat dan tidak terkendali), menginfiltrasi/ merembes, dan menekan jaringan tubuh sehingga mempengaruhi organ tubuh (Akmal, dkk., 2010: 187). Kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks adalah sejenis kanker yang 99,7% disebabkan oleh human papilloma virus (HPV) onkogenik, yang menyerang leher rahim (Canavan, 2000).

Untuk wilayah ASEAN, insidens kanker serviks di Singapore sebesar 25,0 pada ras Cina; 17,8 pada ras Melayu; dan Thailand sebesar 23,7 per 100.000 penduduk. Insidens dan angka kematian kanker serviks menurun selama beberapa dekade terakhir di AS. Hal ini karena skrining Pap menjadi lebih populer dan lesi serviks pre-invasif lebih sering dideteksi daripada kanker invasif. Diperkirakan terdapat 3.700 kematian akibat kanker serviks pada 2006. Di Indonesia diperkirakan ditemukan 40 ribu kasus baru kanker mulut rahim setiap tahunnya. Menurut data kanker berbasis patologi di 13 pusat laboratorium patologi, kanker serviks merupakan penyakit kanker yang memiliki jumlah penderita terbanyak di Indonesia, yaitu lebih kurang 36%. Dari data 17 rumah sakit di Jakarta 1977, kanker serviks menduduki urutan pertama, yaitu 432 kasus di antara 918 kanker pada perempuan.

Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, frekuensi kanker serviks sebesar 76,2% di antara kanker ginekologi. Terbanyak pasien datang pada stadium lanjut, yaitu stadium IIB-IVB, sebanyak 66,4%. Kasus dengan stadium IIIB, yaitu stadium dengan gangguan fungsi ginjal, sebanyak 37,3% atau lebih dari sepertiga kasus (Rasjidi I, 2010).

Kanker leher rahim adalah tumor ganas/karsinoma yang tumbuh di dalam leher rahim/serviks, yaitu suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang telah berumur, tetapi bukti statistik menunjukkan bahwa kanker leher rahim dapat juga menyerang wanita yang berumur antara 20 sampai 30 tahun (Anonim, 2007). Sembilan puluh persen dari kanker serviks berasal dari sel skuamosa (pada jaringan epitel) yang melapisi serviks sedangkan 10% berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju ke dalam rahim (Sugiyarto, 2013).

Sampai saat ini, kanker mulut rahim masih merupakan masalah kesehatan perempuan di Indonesia sehubungan dengan angka kejadian dan angka kematiannya yang tinggi. Keterlambatan diagnosis pada stadium lanjut, keadaan umum yang lemah, status sosial ekonomi yang rendah, keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, jenis histopatologi, dan derajat pendidikan ikut serta dalam menentukan prognosis penderita. Kanker mulut rahim adalah kanker terbanyak kelima pada wanita di seluruh dunia. Penyakit ini banyak terdapat pada wanita Amerika Latin, Afrika, dan negara-negara berkembang lainnya di Asia, termasuk Indonesia. Pada wanita-wanita Suriname keturunan Jawa, terdapat insidensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan etnis lainnya. Kanker mulut rahim di negara-negara maju menempati urutan keempat setelah kanker payudara,

kolorektum, dan endometrium. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang menempati urutan pertama. Di negara Amerika Serikat, kanker mulut rahim memiliki Age Specific Incidence Rate (ASR) yang khas, kurang lebih 20 kasus per 100.000 penduduk wanita per tahun (Rasjidi I, 2009).

Kultur sel HeLa atau HeLa cell line merupakan continuous cell line yang diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim (cervix) seorang wanita penderita kanker leher rahim bernama Henrietta Lacks yang meninggal akibat kanker pada tahun 1951 (Anonim, 2006). Kultur sel ini memiliki sifat semi melekat (Anonim, 2000). Dan digunakan sebagai model sel kanker dan untuk mempelajari sinyal transduksi seluler (Anonim, 2006).

Berbagai cara penyembuhan telah dilakukan untuk melawan kanker seperti pembedahan, penyinaran, kemoterapi, dan imunoterapi namun demikian masing-masing cara mempunyai kelemahan sendiri sehingga pengobatan kanker belum memuaskan hingga saat ini. Penggunaan kemoterapi antikanker belum memberikan hasil optimal karena obat tersebut bekerja tidak spesifik. Masalah lain dalam kemoterapi adalah timbulnya sel kanker yang resisten terhadap antikanker tersebut yang membuat antikanker tidak sensitif lagi (Yuliawati, dkk. 2004).

Menurut Handoko, Kemoterapi merupakan salah satu langkah penyembuhan dalam kanker tetapi memiliki efek samping yang tidak menyenangkan, penyembuhan yang kurang tuntas bahkan terjadi resistensi obat. Alternatif pengobatan kanker dapat dilakukan dengan memanfaatkan senyawa yang terkandung dalam bahan alam. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai alternatif pengobatan kanker serviks yang efektif dan efisien berbasis bahan alam (Handoko, dkk, 2011 : 222).

Salah satu dari bahan alam yang mempunyai aktivitas sebagai agen kemoprevensi kanker adalah kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) Berdasarkan penelitian sebelumnya ekstrak fraksi etil asetat kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) dengan uji metode BSLT (*Brine Shrimp lethality Test*) memiliki efek toksik terhadap *Artemia salina* Leach dengan nilai LC₅₀ sebesar 17,02 µg/ml dan memiliki potensi sebagai antikanker.

Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk mengambil bahan alam sebagai salah satu alternative pengobatan yang relative murah, dengan tujuan penderita lebih mudah untuk mengatasi penyakit yang diidap.

Allah SWT telah mengabarkan melalui firman-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara/26: 7-8 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan dimuka bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan ALLAH, dan kebanyakan mereka tidak beriman” (Departemen Agama RI 2004, 7).

Dalam ayat ini menjelaskan bagaimana manusia untuk mengetahui pemanfaatan segala penciptaan dimuka bumi ini. Berbagai macam tumbuhan telah diciptakan dan memiliki berbagai khasiat untuk digunakan dalam dunia kesehatan hal ini juga memicu manusia agar manusia itu sendiri berfikir dan menjadi pembeda dari setiap makhluk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aktivitas fraksi ekstrak etil asetat kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) terhadap sel kanker HeLa ?
2. Berapa nilai IC_{50} dari fraksi ekstrak etil asetat kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) terhadap sel kanker HeLa?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

a. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut sehingga bahan yang terlarut akan berpisah dengan bahan yang tidak terlarut, dalam penelitian ini proses ekstraksi dilakukan di laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

b. Ekstrak

Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi tanaman kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L.Willd)

c. Ekstrak Etil Asetat

Ekstrak Etil Asetat adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi tanaman obat dengan menggunakan pelarut etil asetat. Tanaman Obat yang digunakan dalam proses ini yaitu Kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L.Willd).

d. Fraksinasi

Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolaran, Dalam penelitian ini proses fraksinasi dilakukan di Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

e. Fraksi

Fraksi Adalah hasil pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolaran. Sehingga fraksi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah fraksi etil asetat kulit batang kemiri yang (*Aleurites moluccana* L.Willd) telah terpisah.

f. Uji Aktivitas

Uji Aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu bahan atau sampel dalam memberikan efek, dalam penelitian ini uji aktivitas yang diuji dari tanaman kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L.Willd)

g. Kanker

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan mekanisme tidak normal dan tidak terkontrol pada pengaturan kelangsungan hidup, proliferasi dan diferensiasi sel, jika penyebaran kanker tidak terkontrol maka dapat menyebabkan kematian.

h. Kanker Leher Rahim (Sel Kanker Hela)

Kanker leher rahim atau serviks adalah penyakit yang disebabkan oleh proses keganasan yang terjadi pada serviks atau mulut rahim. Penyebab kanker leher rahim belum diketahui secara pasti, namun diduga sekitar 95% disebabkan oleh Human Papilloma Virus. Dalam penelitian ini sel HeLa adalah sel yang dikembangkan dan dibudidayakan Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

i. Kulit batang kemiri

Kulit batang kemiri adalah salah satu bagian dari tanaman kemiri yang diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti tannin, yang diduga memiliki aktivitas antikanker

j. Uji MTT

Uji proliferasi dapat dilakukan dengan menggunakan MTT yang diabsorpsi ke dalam sel hidup dan dipecah melalui reaksi reduksi oleh enzim reduktase menjadi formazan yang berwarna ungu, selanjutnya diukur dengan spektrofotometri menggunakan ELISA Plate Reader (*Enzyme Linked Immunosorbent Assay*).

k. IC₅₀ (*Inhibitory Concentration 50*)

Didefinisikan besarnya konsentrasi inhibitor yang dapat menghambat enzim sebesar 50%.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah uji sitotoksik dari fraksi ekstrak kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.).

D. Kajian Pustaka

1. Ari Sri, Fahrauk, dan Dessy Ratnasari (2015), Potensi anti kanker dengan uji toksisitas metode BRINE SHRIMP TEST LETAL (BSLT) terhadap ekstrak etanol dan fraksi dari kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi anti kanker melalui pengujian toksisitas ekstrak etanol kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) Willd. Dengan metode BSLT menggunakan hewan uji larva udang *Artemia salina*. Pengukuran toksisitas dinyatakan dengan nilai LC₅₀. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan teknik maserasi menggunakan pelarut etanol. Hasil

pengujian toksisitas ditunjukkan dengan nilai LC_{50} dari ekstrak etanol, fraksi etil asetat, fraksi n-heksan, dan fraksi air. Nilai toksisitas yang paling kuat hingga paling lemah adalah fraksi etil asetat, fraksi n-heksan, ekstrak etanol, fraksi air secara berturut-turut adalah 17,10 ppm; 35,74 ppm; 39,29 ppm; dan 378,532 ppm. Intensitas nilai LC_{50} hasil pengujian BSLT dari fraksi etil asetat, fraksi n-heksan, ekstrak etanol dan fraksi air berturut-turut adalah sangat toksik, sangat toksik, sangat toksik, dan toksik. Hasil Kromotografi Lapis Tipis (KLT) menggunakan penampak bercak spesifik menunjukkan dugaan golongan flavanoid pada ekstrak etanol dan fraksi etil asetat pada kulit batang kemiri.

Jadi pada jurnal penelitian ini yang menggunakan metode Bhrine Shrimp Letal Test diperoleh nilai toksik paling kuat pada kulit batang kemiri adalah fraksi etil asetat dengan LC_{50} sebesar 17,102 $\mu\text{g/mL}$ dan senyawa yang diduga memiliki aktivitas toksik pada fraksi etil asetat kulit batang kemiri adalah flavanoid.

2. Yonas Sinseng (2016), Uji aktivitas Antioksidan dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-Pikrilhidrazil) dan penetapan kadar fenolik total fraksi etil asetat ekstrak etanol daun benalu (*Scurulla atropurpurea* (Bl.) Dans) dari pohon kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd), tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar aktivitas antioksidan dari fraksi etil asetat ekstrak etanol daun benalu (*Scurulla atropurpurea* (Bl.) Dans) dari pohon kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) dengan menggunakan metode DPPH dan menetapkan kadar fenoliknya menggunakan metode Folin-Ciocalteu. Hasil uji aktivitas antioksidan dinyatakan dengan IC_{50} , yaitu konsentrasi fraksi etil asetat ekstrak etanol daun benalu kemiri menghasilkan penangkapan 50%

radikal DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi etil asetat ekstrak etanol daun benalu mempunyai kandungan fenolik total sebesar $44,3 \pm 0,77$ mg ekivalen asam glat per g. Fraksi etil asetat ekstrak etanol dan nilai IC_{50} sebesar $13,71 \pm 0,12$ $\mu\text{g/mL}$. Nilai IC_{50} tersebut termasuk dalam golongan aktivitas antioksidan sangat kuat.

3. Azidi Irwan, Noer Komari, Rusdiana Rusdiana (2007). Uji Aktivitas Ekstrak Saponin Fraksi N-Butanol Dari Kulit Batang Kemiri (*Aleurites Moluccana* Willd) Pada Larva Nyamuk *Aedes Aegypti* menyatakan bahwa kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) adalah salah satu tanaman yang menghasilkan metabolit sekunder. Percobaan skrining fitokimia menunjukkan bahwa kulit batang kemiri mengandung saponin dalam jumlah sedang. Saponin dapat digunakan sebagai larvasida karena dapat bersifat racun bagi hewan berdarah dingin. Oleh karena itu saponin dapat digunakan sebagai pemusnah serangga. Kulit batang kemiri diekstrak dengan menggunakan metanol dan kemudian dipartisi dengan menggunakan campuran air : butanol (1:1).

Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* melalui perlakuan dengan konsentrasi ekstrak kemiri yang berbeda-beda. Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 0 ppm (sebagai kontrol); 10; 100; dan 1000 ppm. Berdasarkan observasi selama 14 hari, ditemukan bahwa persentase mortalitas larva untuk masing-masing konsentrasi berturut-turut adalah sebesar 0%, 40,0%, 43,44% dan 50%. Karena persentase mortalitas LC_{50} terjadi pada konsentrasi 937,74 ppm dari ekstrak saponin fraksi n-butanol, dapat disimpulkan bahwa ekstrak saponin fraksi n-butanol mempunyai aktifitas dalam mengontrol perkembangan larva nyamuk *Aedes aegypti*.

4. Gali Muhtasib (2001), dalam penelitiannya yang berjudul Penghambatan Tannin melalui induksi fokus kriptus menyimpang dan tumor kolon dengan 1,2-dimetilhidrazin pada tikus, telah menunjukkan bahwa tanin alami memiliki aktivitas promosi antitumor pada kulit tikus. Dalam penelitian ini, kami mempelajari kemampuan tanin yang dapat dihidrolisis, gallotannin (GT), dan tanin kental yang diekstraksi dari kulit red alder (RA) untuk menghambat 1,2,3% dimethylhydrazine (DMH) -termasuk colonia aberrant crypt foci (ACF) Dan tumor pada tikus. Selain itu, kami menentukan kemampuan GT untuk menghambat proliferasi dan menginduksi apoptosis pada sel kanker usus besar manusia (T-84). Tikus diberi tanin dengan suntikan intraperitoneal, dalam air minum sebelum diobati dengan DMH selama 24 minggu. Sebagai alternatif, tikus diberi tanin dengan injeksi intraperitoneal atau gavage hanya 2 minggu sebelum pemberian DMH, kemudian pemberian tanin dihentikan dan tikus diobati dengan DMH selama 24 minggu. Keanekaragaman, ukuran, dan distribusi ACF dan tumor secara signifikan dihambat oleh GT dan RA dalam rejimen pengobatan di atas. Perawatan yang paling efektif termasuk GT oleh gavage, ekstrak kulit pisang RA dengan injeksi intraperitoneal, dan tanin yang dilarutkan dalam air minum. Tingkat penghambatan ACF dan tumor bersifat independen gender. Dalam percobaan kultur sel, perlakuan GT selama tiga hari menghambat pertumbuhan sel T-84, dengan konsentrasi yang menghasilkan penghambatan setengah maksimal diperkirakan 20 mikrogram/ml. Perlakuan tersebut tidak bersifat sitotoksik terhadap sel pada kisaran 1-40 mikrogram/ml. Menariknya, pada 10 mikrogram/ml, GT menginduksi apoptosis pada sel T-84 yang ditentukan oleh teknik pewarnaan DNA Hoechst. Secara kolektif, temuan ini

mendukung peran potensial tanin sebagai agen kemopreventif melawan kanker usus besar

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui aktivitas fraksi ekstrak etil asetat kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) Willd, terhadap penghambatan sel kanker HeLa (kanker leher rahim).
- b. Mengetahui nilai IC_{50} dari fraksi ekstrak etil asetat kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) Willd, terhadap penghambatan sel kanker HeLa.

2. Manfaat penelitian

- a. Memberikan data ilmiah mengenai aktivitas fraksi ekstrak etil asetat kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) Willd, terhadap penghambatan sel kanker HeLa (kanker leher rahim) sebagai salah satu alternatif pengobatan.
- b. Memberikan informasi tentang alternatif pengobatan kanker yang relatif murah dari tanaman kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) Willd.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Uraian Tanaman Kulit kayu kemiri*

1. Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Bangsa	: Euphorbiales
Suku	: Euphorbiaceae
Marga	: Aleurites
Jenis	: <i>Aleurites moluccana</i> L. Willd (Ramadon, F. 2014).

2. Nama Daerah

Pelleng, Ampiri (Bugis), buwa kare, kembiri, kemili, kemiling, kereh, madang ijo, tanoan (Sumatera); kamere, kemiri, komere, midi, miri, muncang, pidekan (Jawa); keminting, kemiri (Kalimantan); berau, bontalo dudulaa, boyau, lana, saketa, wiau (Sulawesi); kemiri, kemwiri, kumiri, mi, nena, nyenga (Maluku); tenu (Nusa Tenggara); anoi (Papua) (Martawijaya dkk. 1989).

3. Morfologi

Tanaman Kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd) tergolong pohon berukuran sedang dengan tajuk lebar yang dapat mencapai ketinggian hingga 20 m dan diameter setinggi dada hingga 90 cm. Pada tempat terbuka, jenis ini umumnya hanya

dapat mencapai ketinggian pohon 10–15 m. Umumnya bentuk cabang pohon kemiri adalah berliku, tidak teratur, membentang lebar dan menggantung pada cabang bagian samping. Pada lembah yang sempit, pohon kemiri biasanya memiliki sedikit percabangan dan tumbuh menjulang tinggi. Kulit batangnya berwarna abu-abu coklat dan bertekstur agak halus dengan garis-garis vertikal yang indah. Daunnya mudah dikenali dari bentuknya yang khas, umumnya terdiri dari 3–5 helai daun dari pangkal, berselang-seling dan pinggir daun bergelombang. Panjang satu helai daun sekitar 10–20 cm dengan dua kelenjar di bagian perpotongan antara pangkal dan tangkai yang mengeluarkan getah manis. Daun pohon yang muda biasanya sederhana dan berbentuk seperti delta atau oval. Bagian atas permukaan daun yang masih muda berwarna putih mengilap seperti perak, yang kemudian akan berubah warna menjadi hijau tua seiring dengan bertambahnya umur pohon. Permukaan daun bagian bawah berbulu halus dan mengilap seperti karat (Elevitch dan Manner 2006).

Bunga kemiri memiliki kelamin ganda, dimana bunga jantan dan betina berada pada pohon yang sama. Bunga kemiri berwarna putih kehijauan, harum dan tersusun dalam sejumlah gugusan sepanjang 10–15 cm, dimana terdapat banyak bunga jantan kecil mengelilingi bunga betina. Mahkota bunga berwarna putih dengan lima kelopak bunga berwarna putih kusam (krem), berbentuk lonjong dengan panjang 1,3 cm. Buah kemiri berwarna hijau sampai kecoklatan, berbentuk oval sampai bulat dengan panjang 5–6 cm dan lebar 5–7 cm. Satu buah kemiri umumnya berisi 2–3 biji, tetapi pada buah jantan kemungkinan hanya ditemukan satu biji. Biji kemiri dapat dimakan jika dipanggang terlebih dahulu. Kulit biji kemiri umumnya

kasar, hitam, keras dan berbentuk bulat panjang sekitar 2,5–3,5 cm (Elevitch dan Manner 2006).

4. Kandungan Kimia

Daging biji, daun dan akar *Aleurites moluccana* mengandung saponin, Falavanoida, dan polifenol, disamping itu daging bijinya mengandung minyak lemak, pada korteksnya mengandung tannin (CCRC. 2012).

Senyawa tannin merupakan senyawa yang termasuk golongan senyawa flavanoid, karena dilihat dari strukturnya yang memiliki 2 cincin aromatic yang diikat oleh tiga atom karbon. Kedudukan gugus hidroksil fenol bebas pada inti flavanoid dapat ditentukan dengan menambahkan pereaksi geser kedalam larutan cuplikan dan mengamati pergeseran puncak serapan yang terjadi (hayati, dkk.2010).

Senyawa flavonoid dapat menghambat proliferasi melalui inhibisi proses oksidatif yang dapat menyebabkan inisiasi kanker. Mekanisme ini diperantari penurunan enzim xantin oksidase, siklooksigenase (COX) dan lipooksigenase (LOX) yang diperlukan dalam proses prooksidasi sehingga menunda siklus sel. Aktivitas antikanker juga ditunjukkan flavonoid melalui induksi apoptosis. Flavonoid menghambat ekspresi enzim topoisomerase I dan topoisomerase II yang berperan dalam katalisis pemutaran dan relaksasi DNA. Inhibitor enzim topoisomerase akan menstabilkan kompleks topoisomerase dan menyebabkan DNA terpotong dan mengalami kerusakan. Kerusakan DNA dapat menyebabkan terekspresinya protein proapoptosis seperti Bax dan Bak dan menurunkan ekspresi protein-protein antiapoptosis yaitu Bcl-2 dan Bcl-XL. Dengan demikian pertumbuhan sel kanker

terhambat. Sebagian besar flavonoid telah terbukti mampu menghambat proliferasi pada berbagai sel kanker pada manusia namun bersifat tidak toksik pada sel normal manusia (Ren et al., 2003).

5. Kegunaan

Hampir semua bagian dari tanaman kemiri dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, pohon kemiri juga memiliki sifat beracun sehingga perlu kewaspadaan bila ingin menggunakan bagian-bagian pohon lainnya untuk tujuan pengobatan atau konsumsi (Damayanti, 2008).


Kulit batang kemiri dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional untuk sakit kepala, diare, tumor, asma, penyakit kulit, dan hypocholesterolema. Bahkan di negeri Jepang produk kulit ini digunakan untuk penyembuhan penyakit tumor dan kanker (Damayanti, 2008).

Biji kemiri digunakan untuk obat sembelit. Sedangkan menurut penelitian menunjukkan bahwa daun kemiri mengandung antioksidan sterol, flavonoid, dan triterpen yang berguna sebagai anti inflamasi dan antipiretik (obat penurun panas) (Damayanti, 2008).

B. Siklus sel

Proliferasi sel normal berlangsung melalui suatu siklus sel yang terdiri dari 4 fase yang ditentukan oleh waktu sintesis DNA, yaitu fase G1, fase S, fase G2 dan fase M. Setelah mitosis, sel memasuki fase G1, yaitu fase sel sangat aktif tetapi tidak mensintesis DNA, atau memasuki fase G0 untuk istirahat. Pada fase G0/G1 kandungan DNA sel adalah diploid (2N). Siklus sel kemudian berlanjut ke fase S

saat terjadi sintesis DNA dan kandungan DNA berubah menjadi $4N$. Fase selanjutnya adalah fase G_2 sebelum memasuki fase M di mana sel membelah diri menjadi 2 sel diploid. Waktu yang diperlukan untuk satu siklus bergantung pada jenis sel dan perbedaan waktu itu terutama di fase G_1 , bila perlu siklus sel berhenti pada fase ini (G_1 arrest) atau pada interfase G_1/S (Romadhan, 2013;787).



Gambar 1. Siklus sel (Lapenna and Giordano, 2009)

C. Apoptosis

Apoptosis adalah kematian sel yang telah terprogram. Pada perkembangannya di dalam embrio praktis setiap sel menerima secara genetis suatu program khas, yang mematakannya sesuai jumlah pembelahan tertentu (prinsip —*you are born to die!*). Begitu pula bila cara berfungsinya terganggu hebat seperti halnya pada sel-sel kanker, yang demikian akan mati pada waktunya. Akibat apoptosis, sel kehilangan cairannya mengkerat dan pecah dalam bentuk gelembung-gelembung kecil, yang akan diserap oleh sel-sel sekitarnya. Kalsium berperan penting pada proses ini.

Berbeda dengan *necrosis-sel*, pada apoptosis tidak timbul reaksi peradangan (Tjay, 2007: 209).

Apoptosis memiliki peranan penting dalam fenomena biologis, proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kekacauan, sebagaimana terlalu sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol (kanker). Beberapa contoh penyakit yang ditimbulkan karena apoptosis yang tidak sempurna antara lain: a. Penyakit autoimun disebabkan karena sel T/B yang autoreaktif terus menerus. b. Neurodegeneration, seperti pada penyakit Alzheimer dan Parkinson, akibat dari apoptosis prematur yang berlebihan pada neuron di otak. Neuron yang tersisa tidak mempunyai kemampuan untuk meregenerasi sel yang hilang. c. Stroke iskemik, aliran darah ke bagian-bagian tertentu dari otak dibatasi sehingga dapat menyebabkan kematian sel saraf melalui peningkatan apoptosis. d. Kanker, sel tumor kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan apoptosis sehingga proliferasi sel meningkat (Ramadhon F, 2014).

Mekanisme apoptosis sangat kompleks dan rumit. Secara garis besarnya apoptosis dibagi menjadi 4 tahap, yaitu : 1. Adanya signal kematian (penginduksi apoptosis). 2. Tahap integrasi atau pengaturan (transduksi signal, induksi gen apoptosis yang berhubungan, dll) 3. Tahap pelaksanaan apoptosis (degradasi DNA, pembongkaran sel, dll) 4. Fagositosis (Ramadhon F, 2014).

D. Kanker

Kanker merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan modifikasi sel secara besar – besaran yang mengakibatkan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan jumlah distribusinya dalam tubuh (University of Bath, UK, 2013 : 20).

Kusumadewi (2011 : 6) menyebutkan bahwa kanker terjadi melalui beberapa tingkat yaitu:

1. fase inisiasi: DNA dirusak akibat radiasi atau zat karsinogen (radikal bebas). Zat-zat inisiator ini mengganggu proses reparasi normal, sehingga terjadi mutasi DNA dengan kelainan pada kromosomnya. Kerusakan DNA diturunkan kepada anak-anak sel dan seterusnya.
2. fase promosi: zat karsinogen tambahan (co-carcinogens) diperlukan sebagai promotor untuk mencetuskan proliferasi sel. Dengan demikian, sel-sel rusak menjadi ganas.
3. fase progresi: gen-gen pertumbuhan yang diaktivasi oleh kerusakan DNA mengakibatkan mitosis dipercepat dan pertumbuhan liar dari sel-sel ganas

Perkembangan sel-sel kanker akibat kerusakan DNA umumnya disebabkan oleh faktor eksternal (bahan kimia, virus, asap rokok, radiasi, paparan sinar matahari yang terlalu banyak dan infeksi) dan faktor internal (metabolisme mutasi yang diturunkan, hormon, dan kondisi kekebalan tubuh). DNA yang rusak atau berubah, akan memproduksi mutasi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembelahan sel normal, sel-sel yang seharusnya mati tetap hidup dan sel-sel baru terbentuk meskipun

tubuh tidak membutuhkannya. Penyebab kerusakan DNA, meskipun belum dapat dijelaskan dengan tepat, dapat dikaitkan dengan aktivasi telomerase yang ditemukan oleh Carol W. Greider dan Elizabeth Blackburn pada tahun 1984 yang diberikan hadiah nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran tahun 2009. Untuk sel-sel normal, telomer, yang terdapat di ujung kromosom, akan diperpendek setelah tiap siklus replikasi yang mengakibatkan kematian terprogram (apoptosis) sel. Sedangkan untuk sel-sel kanker, adanya telomerase yang merupakan enzim yang menambah pengulangan urutan DNA pada ujung 3' dari untai DNA di daerah telomer, telomer akan diperpanjang dan tidak akan diperpendek setelah replikasi sel. Akibatnya, sel-sel kanker akan menjadi abadi (Blackburn, 2005). Selanjutnya, sel-sel tambahan dapat membentuk suatu massa dari pertumbuhan jaringan abnormal di sekitar pembuluh darah yang disebut tumor. Diantara tumor, tumor jinak bukanlah kanker, kebanyakan dapat dihilangkan dan dalam banyak kasus tidak muncul kembali. Sel-sel dalam tumor jinak tidak menyebar ke bagian lain dari tubuh. Tetapi tumor ganas adalah kanker, dimana sel-selnya dapat menyerang jaringan sekitar dan menyebar ke bagian lain dari tubuh. Proses penyebaran sel kanker dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain melalui aliran darah atau sistem getah bening dimana mereka mulai tumbuh dan menggantikan jaringan normal disebut metastatis (Klein, 2008).

E. Penyebaran Kanker

1. Melalui pembuluh limfa

Merupakan cara penyebaran kanker yang terbanyak. Disebut sebagai penyebaran secara limfogen. Sel kanker dengan mudah menginvasi pembuluh limfa melalui celah-celah jaringan. Kelompok sel-sel membentuk embolus dalam aliran limfa yang kemudian akan tersangkut ke limfonodi regional terdekat. Perkembangan selanjutnya dapat menyebabkan penyumbatan.

2. Melalui pembuluh darah

Disebut juga penyebaran secara hematogen. Sel-sel kanker mudah menembus dinding pembuluh vena yang berdinding tipis. Sebagai embolus, sel-sel ini akan diangkut melalui aliran darah vena, kemudian dapat tersangkut di organ paru, hati atau organ yang lain membentuk anak sebar.

Dinding pembuluh darah arteri yang tebal sukar ditembus oleh sel-sel kanker sehingga jarang ditemui penyebaran melalui arteri. Hanya pada kanker paru atau anak sebar di paru-paru yang dapat menyebar melalui arteri. Sel kanker sebagai embolus masuk ke dalam jantung bagian kiri kemudian masuk ke pembuluh-pembuluh arteri dan tersangkut pada organ tubuh yang menerima banyak darah arteri, misalnya ginjal, kelenjar endokrin terutama anak ginjal, dan sumsum tulang.

3. Penyebaran perkontinuatum

Terjadi pada sel-sel kanker yang terletak dalam rongga-rongga serosa seperti perut, rongga pleura dan rongga pericardium. Sel kanker dapat masuk ke dalam

rongga-rongga ini sehingga memungkinkanpenempelan langsung pada sisi yang bervariasi (Govan. 2009: 185-190).

F. Kanker serviks

Kanker leher rahim adalah tumor ganas/karsinoma yang tumbuh di dalam leher rahim/serviks, yaitu suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang telah berumur, tetapi bukti statistik menunjukkan bahwa kanker leher rahim dapat juga menyerang wanita yang berumur antara 20 sampai 30 tahun (Anonim, 2007). Sembilan puluh persen dari kanker serviks berasal dari sel skuamosa (pada jaringan epitel) yang melapisi serviks sedangkan 10% berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju ke dalam rahim (Sugiyarto, 2013 : 13).

Pada keadaan kanker, sel selaput lendir serviks mengadakan proliferasi (membelah dan tumbuh). Mulanya sel-sel membentuk susunan seperti bentuk kelenjar. Dengan permukaan seperti karet busa (spongioform) dan kaya akan pembuluh darah (Kusumadewi, 2011 :8).

Sel-sel yang abnormal dari kanker serviks dapat dideteksi dengan suatu test yang disebut *pap smear test*. *Pap Smear test* merupakan metode pemeriksaan sel-sel yang diambil dari serviks dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari sel tersebut. Awal penemuan metode *Pap Smear* pada tahun 1928 penggunaannya dengan cara mencuci serviks dengan menggunakan asam asetat kemudian tanpa penggunaan alat pembesaran dilihat

bercak putih pada permukaan serviks mengindikasikan bahwa tumor itu telah berkembang dengan cepat yang berpotensi akan menjadi kanker tetapi bercak putih tidak akan selalu diartikan sebagai tanda adanya kanker (Webster Molly dan Kumar, 2014 : 277).

Kanker serviks disebabkan oleh infeksi *Human Papiloma Virus* (HPV) terutama tipe 16, 18, 31, 35, 45, 51, 52, 56 dan 58. HPV adalah virus DNA yang menimbulkan proliferasi pada permukaan epidermal dan mukosa. Berdasarkan penelitian Sjamsuddin (2001), disimpulkan bahwa terdapat 3 golongan tipe HPV dalam hubungannya dengan kanker serviks, yaitu : 1) HPV resiko rendah, yaitu HPV tipe 6 dan 11, 46 yang jarang ditemukan pada karsinoma invasif ; 2) HPV resiko sedang, yaitu HPV 33, 35, 40, 43, 51, 56, dan 58 ; 3) HPV resiko tinggi, yaitu HPV tipe 16, 18, 31. Ketiga jenis HPV ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal, namun hanya tipe 2 dan 3 yang menyebabkan kanker (Yamato *et al.*, 2006).

Kanker serviks dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor risikonya. Adapun faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker serviks diantaranya adalah berganti-ganti mitra seks, melakukan hubungan seks pertama saat usia di bawah 15 tahun, merokok dan kurang terpenuhinya nutrisi seperti buah dan sayur yang banyak mengandung antioksidan. Selain itu, penderita yang terinfeksi HIV sering dihubungkan dengan meningkatnya resiko terjadinya karsinoma serviks invasive karena adanya perubahan sistem imun (Kusumadewi, 2011 : 9).

G. Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi (penyarian) adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disari, mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain (Harborne, 1987: 7).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Dirjen POM, 1979: 9).

Faktor biologi yang mempengaruhi mutu ekstrak meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Identitas jenis (spesies): Jenis tumbuhan dari sudut keragaman hayati dapat dikonfirmasi sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi jenis (spesies).
- b. Lokasi tumbuhan asal: Lokasi berarti faktor eksternal yaitu lingkungan (tanah dan atmosfer) dimana tumbuhan berinteraksi berupa energi (cuaca, temperatur, cahaya), dan materi (air, senyawa organik, dan anorganik).
- c. Periode pemanenan hasil tumbuhan.
- d. Penyimpanan bahan tumbuhan.
- e. Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan.

Selain kelima faktor tersebut untuk bahan tumbuhan dari hasil budaya ada lagi faktor GAP (*Good Agriculture Practice*) sedangkan untuk bahan dari tumbuhan

liar (*wild crop*) ada faktor kondisi proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangan.

Sedangkan faktor kimia baik untuk bahan dari tumbuhan liar maupun dari tumbuhan obat hasil budidaya meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Faktor internal meliputi jenis senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif dan kadar total rata-rata senyawa aktif.
- b. Faktor eksternal meliputi metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasan, dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan, kandungan logam berat, kandungan pestisida (Dirjen POM, 1979: 18).

2. Tujuan dan mekanisme ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel, mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen POM, 2000 dan Harborne 1987: 6-8).

3. Metode ekstraksi

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, dan secara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Dirjen POM, 2000: 82).

Ada beberapa metode ekstraksi yang digunakan yaitu :

a. Cara dingin (Depkes RI, 2000: 82-84)

1. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama, dan seterusnya.

2. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstrak dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

b. Cara panas

1. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

2. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu 40-50°C.

3. Infus

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 15 menit.

4. Dekok

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit.

5. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995: 570).

H. Kultur sel

Kultur sel merupakan teknik yang biasa digunakan untuk perkembangbiakan sel yang berasal dari cell line di luar tubuh (In Vitro). Sedangkan kultur jaringan merupakan kultur tiga dimensi dari jaringan utuh atau sama seperti halnya in vivo (Mahardika, 2004). Kultur sel ditempatkan dalam wadah khusus yang steril (Flask), kebutuhan akan O₂ 95% harus dijaga dan menginkubasikannya pada inkubator sel yang mengandung kadar CO₂ 5% . Umumnya cell line tumbuh pada pH 7,4 sehingga

kestabilannya harus dijaga dengan menambahkan buffer ke dalam medium kultur. Sel turunan disimpan pada temperatur -120 sampai -180°C agar sel tersebut tidak berproliferasi (Mahardika, 2004).

Kultur sel adalah kultur sel-sel yang berasal dari organ atau jaringan yang telah diuraikan secara mekanis dan atau secara enzimatis menjadi suspensi sel. Suspensi sel tersebut kemudian dibiakkan menjadi satu lapisan jaringan (monolayer) di atas permukaan yang keras (botol, tabung dan cawan) atau menjadi suspensi sel dalam media penumbuh. Monolayer tersebut dapat diperbanyak lagi, disebut subkultur atau pasase. Apabila dipasase terus menerus maka dihasilkan sel lestari (cell line). Sel lestari memiliki beberapa sifat yaitu:

- a. Terjadi peningkatan jumlah sel
- b. Sel-sel tersebut memiliki daya tumbuh yang tinggi
- c. Sel-sel tersebut seragam
- d. Biasanya sel-sel tersebut mengalami perubahan fenotipe atau transformasi (Malole, 1990).

Persediaan sel manusia dan hewan yang akan dibiakkan dalam kultur, disimpan beku dalam nitrogen cair. Selama proses penyimpanan ini digunakan larutan dimetil sulfoksida (DMSO) sebagai agen krioprotekton bersama medium untuk mengawetkan sel pada suhu dibawah -70°C . DMSO juga memiliki kemampuan untuk berpenetrasi ke dalam sel dan membekukan cairan sel tanpa menyebabkan terbentuknya Kristal.

Subkultur bertujuan untuk memperbanyak kultur sel, selain itu juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel karena labu kultur yang telah penuh dengan sel akan menghambat pertumbuhan sel itu sendiri. Pengaruh lingkungan kultur meliputi :

1. Kondisi alamis substrat yang terdiri dari :

a. Substrat. Kebanyakan sel yang dikultur invitro tumbuh sebagai kultur selapis pada substrat buatan. Labu ukur kultur jaringan (tissue kultur flask) terbuat dari plastik polistiren yang telah diolah dengan radiasi sinar gamma, dengan zat kimia atau dengan pengisi muatan listrik untuk menghasilkan permukaan yang bermuatan sehingga mudah terbasahi.

b. pH. Kebanyakan sel turunan akan tumbuh pada pH 7,4 walaupun pH optimum untuk pertumbuhan sel bervariasi antara beberapa jenis sel.

c. Dapar (buffer). Dapar ditambahkan kedalam medium untuk mempertahankan pH. Dapar natrium bikarbonat paling sering digunakan karena toksisitasnya rendah, murah dan memberikan nutrisi bagi kultur sel.

2. Komposisi medium

Komposisi medium sangat beragam, mulai dari asam amino esensial, vitamin dan garam sampai dengan senyawa yang kompleks. Medium memiliki peran penting dalam proses kultivasi. Susunan dan kadar nutrisi dalam harus seimbang agar pertumbuhan mikroorganisme optimum. Hal tersebut harus diperhatikan karena banya senyawa-senyawa yang menjadi penghambat jika kadarnya terlalu tinggi

(Mulyanti. 2009: 14). Kelebihan nutrisi, terutama sumber karbon akan menghambat produksi metabolit sekunder (Abraham. 2004: 54).

3. Penyusun fase lag gas (dalam inkubator)

Meliputi oksigen dan karbondioksida.

4. Suhu inkubasi

Suhu yang biasa digunakan untuk kebanyakan sel turunan adalah 37°C, yang dekat dengan suhu tubuh manusia. Suhu kultivai merupakan faktor fisik yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Sintesis dan sekresi metabolit sekunder juga sangat dipengaruhi oleh suhu kultivasi. Semua proses pertumbuhan dipengaruhi oleh reaksi kimia dan suhu mempengaruhi laju reaksi kimia tersebut. Enzim akan mengalami denaturasi pada suhu terlalu tinggi dan menjadi tidak aktif pada suhu yang terlalu rendah (Aryantha *dkk*, 2004: 13).

Media untuk pertumbuhan sel kanker:

a. MEM

MEM, juga disebut Media DMEM adalah media kultur sel yang dikembangkan oleh Harry Eagle yang dapat digunakan untuk menjaga sel-sel dalam kultur jaringan. Ini hanya berisi 12 jenis asam non-esensial amino, glutamin, 8 vitamin dan beberapa garam anorganik dasar.

b. DMEM (*Dulbecco's modified media Eagle*).

Sebuah variasi dari MEM, yang disebut sebagai *Dulbecco's modified media Eagle* (DMEM) mengandung sekitar empat kali lebih banyak dari vitamin dan asam amino hadir dalam MEM dan 2-4 kali lebih banyak glukosa. Selain itu, mengandung

zat besi dan fenol merah. DMEM terbagi berdasarkan kadar glukosa yakni, Jenis tinggi glukosa (4500g/ L glukosa) dan jenis rendah glukosa (1000g/L glukosa). DMEM dengan glukosa tinggi cocok untuk beberapa sel tumor dengan kecepatan pertumbuhan yang lebih cepat dan sulit, karena itu bermanfaat untuk mempertahankan dan tumbuh di satu tempat.

c. IMDM

Medium ini dimodifikasi oleh Iscove dari media dasar DMEM mengandung 42 bahan, mengandung bahan tambahan termasuk selenium, asam amino dan vitamin. Selain itu, media yang unik ini tidak memiliki besi, namun kalium nitrat yang menggantikan nitrat besi. Hal ini juga cocok untuk berkembang biak kultur sel sulit, kultur sel low-density, termasuk seleksi sel hybrid setelah fusi sel, pemilihannya berdasarkan pada perubahan sel setelah transfeksi DNA.

d. RPMI1640 (*Roswell Park Memorial Institute Medium*).

Roswell Park Memorial Institute Medium, sering disebut sebagai RPMI, adalah bentuk media yang digunakan dalam kultur sel dan kultur jaringan. Rumus awal cocok untuk pertumbuhan suspensi sel, terutama untuk sel-sel limfoid. Media ini mengandung banyak fosfat dan diformulasikan untuk digunakan dalam 5% atmosfer karbon dioksida. RPMI1640, yang paling matang ditingkat media untuk sebagian besar jenis sel, termasuk sel-sel tumor, sel-sel normal, sel kultur primer, sel bagian. RPMI1640 adalah salah satu media yang paling umum digunakan.

e. 199/109 media

199 media dikembangkan oleh Morgan dan rekan-rekan kerjanya pada tahun 1950 dan merupakan salah satu medium kultur yang paling awal. Pada awalnya dikembangkan sebagai formulasi media yang benar-benar ditetapkan untuk kultur sel embrio ayam. 199 media memiliki lebih dari 60 komponen dan mengandung hampir semua asam amino, vitamin, hormon pertumbuhan, turunan asam nukleat, dll 109 media adalah tingkat dasar berdasarkan 199 media dan lebih baik dirumuskan untuk kultur sel dalam lingkungan sel bebas serum.

f. HamF10 / HamF12

Media HamF10 merupakan media klasik yang dirancang oleh Ham untuk mendukung pertumbuhan tikus dan sel-sel diploid manusia pada tahun 1962.

HamF12, sebagai produk yang ditingkatkan telah digunakan untuk pertumbuhan hepatosit tikus primer dan sel epitel prostat tikus. Sebuah uji toksisitas klonal menggunakan sel CHO juga telah dilaporkan dengan Ham F12 sebagai media pilihan. Ham F12 juga tersedia dengan 25 mM buffer HEPES yang menyediakan penyangga yang lebih efektif dalam kisaran pH optimum 7,2-7,4.

g. McCoy's 5A

Pada tahun 1959, McCoy dan rekan-rekan kerjanya melaporkan kebutuhan asam amino untuk budidaya in vitro Novikoff sel Hepatoma. Studi ini dilakukan dengan menggunakan Basal Medium 5A, dan kemudian dimodifikasi untuk membuat media baru yang dikenal sebagai *McCoy's 5A Medium*. Media ini telah digunakan untuk mendukung pertumbuhan budaya utama berasal yang dari kelenjar

adrenal, sumsum tulang (normal), paru-paru, ginjal tikus, omentum, kulit, limpa dan jaringan lainnya. Ini adalah media untuk tujuan umum jalur sel primer dan mapan. Semua media ini sudah dikomersialkan dan satu media memiliki bentuk yang berbeda, seperti bubuk atau cair, paket besar atau kantong pack. Bentuk cair dibagi 10x larutan pekat, 2x terkonsentrasi solusi dan solusi kerja.

Beberapa media tidak memiliki fenol merah dan beberapa tidak memiliki ion kalsium dan magnesium. Pengguna dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan percobaan.

I. Sel HeLa

Cell line (sel lestari) HeLa diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim (serviks) manusia. Sel ini diisolasi tahun 1951 dari rahim wanita penderita kanker leher rahim bernama Henrietta Lacks yang berusia 31 tahun. HeLa *cell line* tumbuh sebagai sel yang semi melekat (ATTC, 2011). HeLa cell line dapat digunakan untuk tes antitumor, transformasi, uji tumorigenesis, biologi sel dan invasi bakteri. Sel ini secara morfologi merupakan sel epitelial yang sudah dimasuki oleh *Human Papilloma Virus* (HPV) tipe 18. Sel ini bersifat immortal dan sangat agresif sehingga mudah untuk dikultivasi tetapi sel ini mudah menginvasi kultur sel lain (Doyle dan Griffiths, 2000).

Sel HeLa adalah sel kanker leher rahim akibat infeksi *Human Papilloma virus* (HPV 18) sehingga mempunyai sifat yang berbeda dengan sel leher rahim normal. Sel kanker leher rahim yang diinfeksi HPV diketahui mengekspresikan 2 onkogen, yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan E7 terbukti dapat menyebabkan sifat

imortal pada kultur primer keratinosit manusia, namun sel yang imortal ini tidak bersifat tumorigenik hingga suatu proses genetik terjadi. Jadi, viral onkogen tersebut tidak secara langsung menginduksi pembentukan tumor, tetapi menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya dapat menyebabkan sifat kanker (Goodwin dan DiMaio, 2000).

Protein E6 dan E7 dari HPV memodulasi protein seluler yang mengatur daur sel. Protein E6 berikatan dengan tumor suppressor protein p53 dan mempercepat degradasi p53 yang diperantarai ubiquitin. Protein E6 juga menstimulasi aktivitas enzim telomerase. Sedangkan protein E7 dapat mengikat bentuk aktif, terhipofosforilasi dari p105Rb dan anggota lain dari famili Rb. Ikatan ini menyebabkan destabilisasi Rb dan pecahnya kompleks Rb/E2F yang berperan menekan transkripsi gen yang diperlukan untuk cell cycle progression (DeFilippis, et al., 2003).

Sebagian besar sel kanker leher rahim, termasuk sel HeLa, mempunyai gen p53 dan p105Rb dalam bentuk wild type. Jadi, gen pengatur pertumbuhan yang aktif dalam sel normal ini juga terdapat dalam sel kanker leher rahim. Namun, aktivitasnya dihambat oleh ekspresi protein E6 dan E7 dari HPV (Goodwin dan DiMaio, 2000).

J. Toksisitas

Toksisitas merupakan istilah relatif yang biasa dipergunakan dalam membandingkan suatu zat kimia lebih toksik dari zat kimia lainnya. Perbandingan antara zat kimia seperti itu sangat tidak informatif, kecuali jika pernyataan itu

melibatkan informasi tentang mekanisme biologi yang sedang dipermasalahkan dan juga dalam kondisi bagaimana zat kimia tersebut berbahaya. Karena itu, pendekatan toksikologi adalah dari segi tentang berbagai efek zat kimia atas berbagai sistem biologi dengan penekanan pada sistem mekanisme efek berbahaya zat kimia itu dan kondisi dimana efek berbahaya itu terjadi. Kematian merupakan salah satu diantara beberapa kriteria toksisitas. Salah satu caranya ialah menggunakan senyawa dengan dosis maksimal, kemudian kematian hewan uji dicatat. Angka kematian hewan dihitung sebagai harga median *Lethal Dose* (LD_{50}) atau median *Lethal Concentration* (LC_{50}) (Said, 2014).

Toksisitas diukur dengan mengamati kematian pada hewan coba. Kematian merupakan salah satu diantara beberapa kriteria toksisitas. Salah satu caranya ialah menggunakan senyawa dengan dosis maksimal, kemudian kematian hewan uji dicatat. Dengan adanya kenyataan bahwa beberapa zat kimia akan menimbulkan kematian dalam dosis mikrogram, maka zat kimia seperti itu biasanya dianggap sebagai sangat toksik (beracun) zat kimia yang lain mungkin relatif kurang berbahaya setelah diberikan dengan dosis yang melebihi beberapa gram karena mungkin banyak kisaran kadar atau dosis berbagai zat kimia yang menghasilkan bahaya, maka telah dirumuskan penggolongan toksisitas atas dasar jumlah besarnya zat kimia yang diperlukan untuk menimbulkan bahaya.

Suatu contoh penggolongan tersebut yaitu (Loomis, 1978):

1. Luar biasa toksik (1 mg/Kg atau kurang)
2. Sangat toksik (1-59 mg/Kg)

3. Cukup (50-500 mg/Kg)
4. Sedikit (0,5-5 mg/Kg)
5. Praktis tidak toksik (5-15 mg/Kg)
6. Relatif kurang berbahaya (lebih dari 15 g/Kg)

Penggolongan ini hanya berlaku untuk harga LD₅₀ pada hewan percobaan untuk harga LC₅₀ hanya dibedakan menjadi (Meyer *et al.*, 1982):

1. Toksik (LC₅₀ < 1000 µg/ml)
2. Tidak toksik (LC₅₀ > 1000 µg/ml)

Meyer, *et al.*, (1982) menyatakan bahwa senyawa uji dikatakan toksik jika harga LC₅₀ lebih kecil dari 1000 µg/mL. Penentuan potensi bioaktif dilakukan dengan membandingkan nilai LC₅₀ masing-masing ekstrak dengan ketentuan Mc Laughin (1991):

1. LC₅₀ < 30 ppm ekstrak berpotensi sebagai antikanker (sitotoksik)
2. LC₅₀ 30-200 ppm ekstrak berpotensi sebagai anti mikroba
3. LC₅₀ 200-1000 ppm ekstrak berpotensi sebagai pestisida

Kuatnya aktivitas antikanker, dinyatakan sebagai berikut:

1. IC₅₀ 5 µg/mL = sangat aktif;
2. IC₅₀ 5-10 µg/mL = aktif;
3. IC₅₀ 11-30 µg/mL = sedang; dan
4. IC₅₀ >30 µg/mL = tidak aktif (Cho, 1998).

K. Uji Antipoliferatif

Kemampuan sel untuk bertahan hidup dapat diartikan tidak hilangnya kemampuan metabolik atau *proliferasi* dan dapat diukur dari bertambahnya jumlah sel, meningkatnya jumlah protein atau DNA yang disintesis. Kemampuan sel untuk bertahan hidup inilah yang menjadi dasar uji antikanker (Freshney, 1987). Aktivitas antipoliferatif terhadap terhadap suatu sel dan harga IC_{50} ditetapkan melalui uji sitotoksik dan pengamatan kinetika poliferasi dengan metode MTT (Utami, Dwi. 2007).


Uji antipoliferatif merupakan salah satu metode untuk mengetahui pertumbuhan sel diukur dari persamaan regresi linear yang dibuat dari *slope* sehingga menggambarkan kinetika poliferasi sel. Uji ini didasarkan pada uji toksisitas. Jumlah sel yang bertahan hidup pada uji sitotoksitas ditetapkan dengan beberapa cara yang didasarkan pada parameter kerusakan membran meliputi perhitungan sel yang mengambil (*uptake*) atau tidak mengambil bahan pewarna seperti biru triptan (Freshney, 1987).

Sejumlah metode telah dikembangkan dalam studi viabilitas dan proliferasi dari populasi sel. Metode modern yang paling baik telah dikembangkan pada suatu mikroplat (*96-well plates*). Miniaturisasi ini memungkinkan banyak sampel yang dapat dianalisis dengan cepat dan simultan. Bentuk mikroplat juga mengurangi jumlah medium kultur dan sel yang dibutuhkan dengan baik. Pengujian secara kolorimetri memungkinkan sampel diukur secara langsung dalam mikroplat dengan menggunakan alat ELISA (Doyle and Griffiths, 2000).

Metode kuantifikasi sel yang banyak digunakan dalam penelitian antiproliferatif adalah metode *haemocytometer* dan metode MTT.

Haemocytometer merupakan perangkat gelas bersama *coverslip* tipis, terbagi dalam sembilan area dengan empat area pojok sebagai area menghitung jumlah sel. Ketebalan *chamber* adalah 0,1 mm dengan kapasitas 10 μl cairan berisi sel dalam area 0,9 mm^3 . Beberapa hal perlu diperhatikan saat menghitung sel dengan *haemocytometer* adalah sel harus tersuspensi rata dan jumlah sel yang minimum yang dihitung adalah seratus. Sel yang melekat perlu ditripsinasi untuk mensuspensikan sel dalam larutan. *Trian blue* biasa digunakan untuk membedakan sel hidup dan sel mati. Sel hidup tidak terwarnai, bulat dan relatif kecil dibandingkan dengan sel mati. Sedangkan sel mati membengkak dan berwarna biru (Doyle dan Griffiths, 2000).

Uji Antipoliperatif dapat dilakukan juga dengan menggunakan MTT yang diabsorpsi ke dalam sel hidup dan dipecah melalui reaksi reduksi oleh enzim reduktase menjadi formazan yang berwarna ungu, selanjutnya diukur dengan spektrofotometri menggunakan ELISA Plate Reader (*Enzyme Linked Immunosorbernt Assay*) (Freshney, 2000).



Gambar 2. Struktur poliferasi menggunakan MTT

MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] merupakan cairan kuning garam tetrazolium yang larut air yang digunakan untuk menguji kelangsungan hidup sel dan besarnya skala penyaringan mycotoxin. Pengujian ini dipercaya dapat mengukur kemampuan absorpsi dan metabolisme dalam MTT terhadap sel yang diujikan (Mosmann, 1983). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kelarutan dari garam ini dapat masuk ke dalam sel melalui endositosis dan direduksi terutama di mitokondria atau lisosom/ bagian dari lisosom, kemudian diubah menjadi formazan ungu yang tidak larut air melalui mitokondria dan enzim sitosolik, seperti reduksi NADH dan oksidasi flavin. Selanjutnya, kuantitas dari pembentukan formazan dapat digunakan untuk menggambarkan potensial reduksi dari sel dan kemampuan bertahan hidupnya (Liu *et al.*, 1997a; Liu and Schubert, 1997; Molinari *et al.*, 2005); bagaimanapun efek biologis dari MTT terhadap sel masih susah untuk dipahami (Lu Lanhai *et al.*, 2012 : 636).

Pada umumnya, kristal formazan MTT dilarutkan kedalam dimethyl sulfoxide (DMSO) dan dapat diukur dengan menggunakan ELISA *reader* pada panjang gelombang 570 nm. Pengujian MTT juga digunakan untuk mengukur proliferasi sel bagaimanapun hasilnya, baik itu positif atau negatif tidak boleh dilewatkan dan hasilnya harus dilaporkan (Rollino *et al.* (1995). Meskipun pengujian MTT secara luas digunakan untuk mengukur kelangsungan hidup sel dan proliferasi

sel, efek yang merugikan terhadap sel dari reduksi MTT masih sangat membutuhkan untuk investigasi yang lebih lengkap (Lu Lanhai et al., 2012 : 636).

Metode MTT dipilih karena telah terbukti lebih sensitive, cepat dan akurat dibandingkan dengan metode perhitungan langsung (Doyle and Griffiths, 2000). Metode MTT juga memiliki kekurangan yaitu sampel yang berwarna dapat memberikan absorbansi sehingga absorbansi yang terbaca tidak hanya warna ungu yang sebanding dengan jumlah sel hidup tetapi juga warna dari sampel (Listyowati, dkk : 3).

Flora atau segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah atau di suatu masa, yang mana merupakan sebutan untuk seluruh jenis tanaman dan tumbuhan. Sebagai padanan dari kata flora, dalam al-Qur'an di gunakan kata "nabaats" dan "haarts" yang berarti tumbuhan dan tanaman. Saat ini berbagai macam nama tumbuhan yang kita ketahui, nama tumbuh-tumbuhan tersebut sebenarnya telah Allah subhānahu wata'āla. ajarkan kepada manusia, dan manusia pertama yang diajarkan oleh Allah subhānahu wata'āla, tentang nama-nama tumbuhan adalah Nabiullah Adam as.

Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional.

Dengan demikian pula Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-An'am/ 6: 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مُمْتَثِبِهَا وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Depertemen Agama RI, 2010: 140).

Ayat ini merupakan bukti kemahakuasaan Allah subhānahu wata'āla Ayat ini mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya dia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah subhānahu wata'āla. Maha Esa dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan.

Pada ayat ini mengurai kumpulan hal-hal yang disebut sebelumnya, bermula dengan menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah subhānahu wata'āla, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya,

yakni akibat turunnya air itu, *segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya*, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, *tanaman yang menghijau, butir yang saling bertumpuk*, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih. (Shihab, 2002: 573-574).

Komentar beliau tentang ayat ini, kitab al-Muntakhab fi at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan, pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah (Shihab, 2002, 3: 574).

Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya (Shihab, 2002, 3: 574-575). Bagian akhir ayat ini disebutkan: perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Perintah ini mendorong perkembangan Ilmu Tumbuh-

tumbuhan (Botani) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya (Shihab, 2002, 3: 575).

Kitab Tafsir Ibnu Katsir di dalamnya, dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tuntunan Allah subhānahu wata'āla untuk mencapai kesadaran tauhid dan iman. Allah subhānahu wata'āla menyatakan: Dialah (Allah subhānahu wata'āla) yang menurunkan hujan, dan Dia pula yang mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dia pula yang mewarnainya hijau dan lain-lainnya, lalu Dia pula yang menyusun butir-butir buahnya yang tersusun rapi. Juga Dia pula yang mengeluarkan mayang pohon kurma sehingga tersusun buahnya yang mudah dipetik, Dia pula yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan dalam kebun anggur, zaitun dan delima dan lain-lainnya baik yang serupa bentuk, warna atau cita rasanya atau yang jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, warnanya, bentuknya atau rasanya. Kemudian Allah subhānahu wata'āla menyuruh untuk mengamati buah sejak ia mulai berbuah hingga saat masak dan diketamnya untuk dirasakan nikmat, rahmat dan hikmat Tuhan yang menjadikan semua itu untuk kepentingan manusia (Katsir, 2004, 3: 305).

Tafsiran-tafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah subhānahu wata'āla. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah subhānahu wata'āla tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-

tumbuhan. Salah satunya dengan meneliti manfaat tumbuh-tumbuhan dalam meningkatkan kesehatan manusia, sehingga hal itu menimbulkan rasa syukur dan semakin yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah subhānahu wata'āla.

Selain itu, Allah subhānahu wata'āla juga berfirman dalam QS Asy-Syu'arā'/26: 80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”.

Berdasarkan kitab Tafsir al-Mishbah (2002), dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut, kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula Yang menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih (Shihab, 2002, 9: 256).

Perlu dicatat juga bahwa penyembuhan, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Hal ini banyak dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wasallam* yang memerintahkan untuk berobat (Shihab, 2002, 9: 259).

Berdasarkan kitab Tafsir Ibnu Katsir, menceritakan dialog antara Ibrahim dan ayahnya. Ibrahim berkata: “Aku menyembah Tuhan yang menciptakan aku dan yang menunjukkan jalan bagiku, yang memberi makan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan penyakitku dan juga mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali di hari kiamat dan Tuhan yang aku harapkan dengan sangat mengampuni kesalahan-kesalahanmu kelak di hari kiamat (Katsir, 2006, 6: 59).

Ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah subhānahu wata'āla. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika kita diserang oleh suatu penyakit, maka dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Allah subhānahu wata'āla. menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di bumi tak lain untuk kebaikan bagi manusia karena banyak tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman termasuk Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L.Wiild) ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan Islam.

Terkait dengan istilah di atas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada hadist Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai berikut:

Dari Jabir bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. bersabda:

كُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahnya :

”Setiap penyakit ada obatnya, Apabila didapat obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah azza wa jalla” (HR. Muslim, hadis no. 4084).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah subhānahu wata'āla ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah subhānahu wata'āla yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah subhānahu wata'āla menghendaki agar

pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Bersumber dari beberapa ayat dan hadist diatas dapat kita ketahui bersama bahwa Allah subhānahu wata'āla telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab Allah subhānahu wata'āla yang mengetahui manusia dan apa yang ada di langit dan di bumi secara mendetail, sehingga dengan ayat dan hadist ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk uji toksisitas senyawa dari bahan alam untuk mencari obat baru secara *in vitro*.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Framasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2017.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah eksperimental dalam bentuk quasi eksperimental.

D. Populasi

Populasi pada penelitian ini menggunakan tanaman kemiri *Aleurites moluccana* (L.) yang diambil di Kabupaten Bone

E. Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan kulit batang kemiri, yang diujikan pada sel Hela.

F. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah Inkubator CO₂ 5% ®(Hera cell), *Laminar air flow* (LAF) ®(Clean Beach) digunakan sebagai tempat pengerjaan yang jauh dari jangkauan kontaminan, mikropipet® (Gilson) 20 µl, 200µl dan 1000 µl untuk mengambil atau menidahkan sel maupun sampel treatment, *haemocytometer*® (Neubauer) sebagai alat untuk menghitung jumlah sel, tabung falcon 15 ml dan 50 ml, mikroskop inverted® (Axiovert 25), *ELISA plate reader*® (Bio-Rad) yang digunakan sebagai alat membaca absorbansi, mikroplate 96-well sebagai wadah sampel yang berisikan sel, tube sentrifuse, tabung eppendorf, vortex® (VM-300), kamera digital, dan serta alat praktikum penunjang yang lain.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) alkohol 70%, etil asetat, n-hexan, Sel HeLa, medium DMEM komplet, *foetal bovine serum* (FBS) 10%, fungizon 0,5%, Hapes (*N-2-hydroxyethylpiperazine-2-ethanesulfonic acid*), Natrium bikarbonat (NaHCO₃), Aquadest, MTT [(3-(4,5-dimetil tiazol 2-yl)-2,5-difenil tetrazolium bromida)], PBS (*Phosphate Buffer Saline*), penisilin-streptomisin (Penstrep) 2%, Sodium Dodecyl Sulphate (SDS), dimetil sulfoksida (DMSO), trypsin EDTA 0,5%, silika gel.

E. Prosedur Kerja

1. Penyiapan sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.), Sulawesi Selatan. diambil dari batang utama dikelupas dengan cara berselang-seling sebelum mencapai jaringan kambiumnya.

b. Pengolahan Sampel

Sampel kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) yang telah diambil dan dibersihkan dari kotoran serta dikeringkan tanpa menggunakan cahaya matahari, kemudian dirajang dan sampel siap diekstraksi.

2. Ekstraksi Sampel (Maserasi Bertingkat)

Sampel kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) yang telah dirajang ditimbang sebanyak 500 gram, dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian dituang cairan penyari n-heksan ke dalam wadah maserasi yang telah berisi sampel kulit batang kemiri kering hingga terendam, ditutup dan dibiarkan selama 1x24 jam terlindung dari cahaya. Setelah 1 x 24 jam, disaring ke dalam wadah penampung dan ampas yang diperoleh selanjutnya dimaserasi kembali dengan penyari n-heksan yang baru. Maserasi ini dilakukan sebanyak 3 kali penyarian. Ampas n-heksan yang diperoleh diangin-anginkan hingga kering dengan tujuan untuk menguapkan pelarut n-heksan yang ada. Ampas kering yang diperoleh dimasukkan kembali ke dalam wadah maserasi yang baru dan ditambahkan pelarut etil asetat hingga terendam untuk memperoleh ekstrak yang lebih polar dari ekstrak n-heksan dan dibiarkan selama 1x24 jam terlindung dari cahaya, dilakukan hal yang sama dengan perlakuan pada pelarut sebelumnya, hingga diperoleh filtrat n-heksan dan etil asetat. Hasil dari

penyarian yang diperoleh kemudian dikeringkan dengan menggunakan desikator vakum.

3. Fraksinasi

Ekstrak teraktif kemudian di fraksinasi dengan menggunakan kromatografi cair vakum. kromatografi disiapkan dengan membuat bubuk silica yang dimasukkan ke dalam kolom kromatografi secara perlahan-lahan, ekstrak digerus dan dihomogenkan dengan silica gel untuk peradsorpsi kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan, kemudian dimampatkan. Dimasukkan kertas saring dan dimasukkan perbandingan eluen dimulai dari heksan:etil 12:2, 2:2, 6:2, 3:2, 2:3, 2:6, 2:9, 2:12, 3:1, 2:1, 1:1, etil asetat 60 ml, etil asetat : methanol 9:2, 6:2, 3:2, dan methanol 60 ml. Dituang melalui dinding kolim dan pompa vakum dijalankan sehingga eluen turun dan melulusi komponen kimia. Cairan yang keluar ditampung sebagai fraksi dan dipisahkan di mangkok berdasarkan konsentrasi eluen dan diuapkan, dilanjutkan dengan penotolan di lempeng dan dibaca dibawah lampu UV 254 nm.

Fraksi yang mempunyai kemiripan bercak dijadikan satu, kemudian diangin-anginkan hingga menjadi 2 fraksi kental yaitu fraksi a dan b untuk diujikan ke sel HeLa.

4. Penyiapan larutan uji

Fraksi polar kulit batang kemiri ditimbang sebanyak 5 mg dan dilarutkan menggunakan pelarut DMSO sebanyak 100 μ L, dan dibuat larutan stok dengan konsentrasi 50000 ppm. Larutan uji dibuat dengan konsentrasi 200; 120; 80; 40; dan 20, dari larutan stok.

5. Uji Aktivitas Penghambatan Sel Kanker Leher Rahim (sel HeLa)

1. Penyiapan bahan

- a. Pembuatan media tumbuh DMEM (*Dulbecco's Modified Media Eagle*) yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakkan sel. Ditimbang 2 gram Hepes dan Natrium Bikarbonat 3,7 gram, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 1 L, dilarutkan dengan aquadest hingga 1 L kemudian dihomogenkan.
- b. Pembuatan larutan MTT (*[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide]*) digunakan agar dapat membedakan sel yang masih hidup atau mati. Ditimbang 5 gram serbuk MTT, dimasukkan dalam *conical tube* dan dilarutkan dengan PBS hingga 10 mL, kemudian divortex hingga homogen.

2. Pemanenan dan tanam sel

Pemanenan sel ini dilakukan sebagai langkah selanjutnya untuk sel yang siap uji pada sampel yang disiapkan. Sel HeLa ditumbuhkan dalam media DMEM yang mengandung 10% Fetal Bovine Serum (FBS), penisilin streptomisin (Penstrep) 2%, fungizon 0,5%, dan 87,5% *Phosphate Buffer Saline* (PBS) dan diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37°C dengan aliran 5% CO₂.

Sel konfluen dilepas dari *plate tissue culture* dengan teknik tripsinasi, yaitu sel dicuci dengan PBS, ditambahkan tripsin 0,025% 1 mL dan didiamkan 5-10 menit dalam inkubator, kemudian diamati sel yang lepas di bawah mikroskop. Sel yang lepas dipindahkan ke dalam tabung 15 mL, ditambahkan 2 mL media komplet (FBS 10%, fungizon 0,5%, penstrep 2%, dan media stok 87,5%) dan 8 mL PBS. Disentrifugasi 1500 rpm selama 10 menit. Dibuang supernatannya dan pellet ditambahkan dengan media komplet 1 mL, 10 µL dimasukkan ke dalam bilik hitung.

Dihitung jumlah sel dan dibuat pengenceran 10.000 sel dalam 100 μ L dalam 10 mL media komplit. Suspensi sel dalam media komplit DMEM sebanyak 100 μ L dimasukkan pada microplate 96 sumuran.

3. Treatment

Pada tahap ini sel siap direaksikan dengan sampel untuk melihat aktivitas sampel dalam menghambat sel. Setelah itu ditambahkan larutan uji setiap fraksi dengan konsentrasi 200; 120; 80; 40; 20; dan 10 ppm dari larutan masing-masing sebanyak 100 μ L dengan 4 replikasi. Selanjutnya media komplit DMEM sebanyak 100 μ L ditambahkan pada 6 sumuran yang lain yang berisi sebagai kontrol sel dan 6 sumuran dibiarkan kosong sebagai blanko lalu diinkubasi pada 37°C dalam inkubator CO₂ 5% selama 24 jam.

4. Uji MTT

Uji MTT ini dilakukan sebagai penanda sel yang masih hidup atau mati, sel yang menyerap MTT yang ditandai dengan morfologi sel berbentuk Kristal menandakan bahwa sel masih hidup.

Pada masing-masing sumuran, ditambahkan 100 μ L larutan MTT. Sel diinkubasi kembali selama 4 jam dalam inkubator CO₂ 5%, 37°C. Reaksi MTT dihentikan dengan menambahkan SDS 100 μ L, diinkubasi dalam ruang gelap selama semalam. Serapan dibaca dengan *microplate ELISA reader* pada panjang gelombang 595 nm.

Perhitungan persen penghambatan (inhibisi) sel menggunakan metode MTT menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(\text{sel treatment} - \text{kontrol blank})}{(\text{Kontrol sel} - \text{kontrol Blank})} \times 100\%$$

5. Analisis Data

Data diolah dengan menggunakan analisis persen inhibisi untuk mendapatkan nilai IC_{50} sampel. Nilai IC_{50} menunjukkan persentase kematian sel pada kultur sebanyak 50%.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini diambil sampel kulit batang kemiri sebanyak 500 g diekstraksi dengan menggunakan beberapa pelarut sehingga didapatkan persen rendamen yang tertera dibawah ini.

1. Ekstraksi Sampel

Tabel 1. Persen rendamen Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang kemiri (*Aleurites moluccana L. Willd*).

No.	Ekstrak	Bobot (gram)
1.	Ekstrak N-Hexan kulit batang kemiri	10,74 gram
2.	Ekstrak Etil Asetat kulit batang kemiri	8,93 gram
3.	Ekstrak Etanol Kulit Batang Kemiri	30,28 gram
4.	% Rendamen N-Hexan kulit batang kemiri	1,074%
5.	% Rendamen Etil Asetat kulit batang kemiri	0,893 %
6.	% Rendamen Etanol Kulit Batang Kemiri	3,028 %

2. Hasil Fraksinasi


Tabel 2. Hasil Fraksi Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang kemiri (*Aleurites moluccana L. Willd*).obot fraksi

No.	Fraksi	Berat (gram)
1.	Fraksi A	308.1
2.	Fraksi B	205,6

3. Uji Sitotoksik

Tabel 3. Uji Sitotoksik Fraksi A

Konsentrasi	Absorbansi	% Inhibisi	Log konsentrasi	Nilai probit	Persamaan Regresi	IC ₅₀
200	0.58	98.142	2	7.05	$y = 0.8342x + 4.9423$	1,58 μg/mL
120	0.55525	92.937	2.079	6.48		
80	0.54725	91.254	1.903	6.34		
40	0.53025	87.679	1.602	6.18		
20	0.51775	85.050	1.301	6.04		
10	0.489	79.004	1	5.81		




Gambar 3. Kurva fraksi A

Tabel 4. Uji sitotoksik Fraksi B

Konsentrasi	Absorbansi	% Inhibisi	Log konsentrasi	Nilai probit	Persamaan Regresi	IC ₅₀
200	0.30675	40.676	2	4.77	$y = 0.2332x + 4.1441$	4677,35 μg/mL
120	0.27525	34.051	2.079	4.59		
80	0.26725	32.369	1.903	4.53		

40	0.2555	29.898	1.602	4.48		
20	0.2515	29.057	1.301	4.45		
10	0.24775	28.268	1	4.42		



Gambar 4. Kurva Fraksi B

B. Pembahasan

Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang telah berumur, tetapi bukti statistik menunjukkan bahwa kanker serviks dapat juga menyerang wanita yang berumur antara 20-30 tahun.

Selain kanker payudara, kanker serviks merupakan salah satu dari 2 jenis kanker yang banyak membunuh kaum perempuan di Indonesia. Menurut penelitian World Health Organization (WHO), di seluruh dunia terdapat 490.000 kasus kanker serviks dan mengakibatkan 240.000 kematian tiap tahunnya, 80% dari angka itu

terjadi di Asia. Berdasarkan penelitian, sebesar 25,6% dari 10 jenis kanker pada perempuan adalah kanker serviks, sedangkan 73% dari 3.874 pasien kanker yang ada merupakan kanker pada kelamin perempuan. Seluruh dunia, setiap 1 menit terdapat 1 kasus baru dan setiap 2 menit terdapat 1 kematian. Kejadian kanker serviks dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosio demografi yang meliputi usia, status sosial ekonomi, dan faktor aktivitas seksual yang meliputi usia pertama kali melakukan hubungan seks, pasangan seks yang berganti-ganti, paritas, kurang menjaga kebersihan genital, merokok, riwayat penyakit kelamin, dan trauma kronis pada serviks (De jong W: 2004).

Salah satu tanaman yang diduga berpotensi sebagai anti kanker adalah kulit batang kemiri, dari hasil penelitian sebelumnya yaitu kajian pendahuluan potensi anti kanker dengan uji toksisitas metode BSLT terhadap ekstrak etanol dan fraksi-fraksi dari kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* L. Willd oleh Ari Sri Windyaswari dkk, didapatkan hasil fraksi etil asetat dengan nilai LC_{50} 17,102 yang menunjukkan aktivitas sangat toksik, dalam hal ini peneliti tertarik untuk menjadikan bahan penelitian lanjutan dengan tujuan meminimalisirkan penggunaan obat anti kanker sintetik dan kemoterapi yang banyak digunakan sebagai alternatif utama yang dikenal dengan biaya yang sangat mahal.

Kultur sel merupakan teknik yang secara luas digunakan pada studi metabolisme manusia dan fisiologi manusia yang tidak mudah dilakukan secara in vivo. Sel dapat diisolasi dari jaringan, lalu membiakkan kultur sel selama sehari-hari sampai berminggu minggu. Sel dapat diperoleh dari jaringan normal (contohnya,

jaringan kulit) jika prosedur klinis dan pertimbangan etis memungkinkan. Sel dapat juga diperoleh dari jaringan yang sakit (contohnya, sel tumor hati) yang diambil selama operasi sebagai bagian dari terapi untuk pasien. Kultur sel biasanya dilakukan dalam bentuk suspensi sel yang diambil dari jaringan asli (baik secara enzimatik, mekanik, atau disosiasi kimia), kultur primer, atau cell line dan dilakukan di bawah kondisi laboratorium yang steril dan lingkungan yang terkendali melibatkan suhu, gas, dan tekanan. Hal ini harus menyesuaikan lingkungan *in vivo* dari sel tersebut sehingga sel mampu bertahan hidup dan terjadi proliferasi secara terkendali (Mistry RR, dkk. 2012: 806).

Salah satu keuntungan utama dari kultur sel adalah dapat dilakukannya manipulasi fisikokimia (seperti suhu, pH, tekanan osmotik, kadar O₂ dan CO₂), serta manipulasi lingkungan fisiologis (seperti hormon dan konsentrasi nutrisi) dimana sel berkembang biak (Nema R. 2012).

HeLa *cell line* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *cell line* koleksi dari Fakultas Kedokteran bagian parasitologi Universitas Gadjah Mada. HeLa *cell line* merupakan sel yang membentuk lapisan dan tumbuh melekat pada dinding tabung atau cawan (monolayer). HeLa *cell line* merupakan hasil kultur sel yang diisolasi dari serviks wanita penderita kanker serviks berkulit hitam dengan usia 31 tahun. Sel ini terinfeksi *Human Papilloma Virus 18* (HPV-18) (ATTC, 2011).

Kultur sel ini memiliki sifat semi melekat (Anonim, 2006a) dan digunakan sebagai model sel kanker dan untuk mempelajari sinyal transduksi seluler (Anonim,

2006b). Sel HeLa ini cukup aman dan merupakan sel manusia yang umum digunakan untuk kepentingan kultur sel (LabWork, 2000).

Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam media kultur. Media yang digunakan adalah DMEM. Komposisi dari media terdiri nutrisi yang dibutuhkan sel yang mengandung *Fetal Bovine Serum* (FBS) sebagai protein pembawa hormon untuk menstimulasi pertumbuhan sel, faktor yang membantu terjadinya pelengketan sel, penstrep sebagai anti bakteri, fungizon sebagai anti jamur, dan *Phosphate Buffer Saline* (PBS) dan diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37°C dengan aliran 5% CO₂ sebagai tempat pertumbuhan normal sel.

Sampel diambil dari batang utama, dikupas dengan cara berselang-seling sebelum mencapai kambiumnya. Sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana L. Willd*) yang telah diambil dibersihkan dari kotoran dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan hingga sampel kandungan air yang dimiliki lebih rendah dari sebelumnya, untuk memperoleh hasil yang lebih kering, sampel disimpan di lemari pengering yang terdapat di laboratorium fitokimia jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar setelah itu dirajang untuk memperbesar luas permukaan sampel dengan cairan penyari dan sampel siap diekstraksi

Pada tahap ekstraksi peneliti menggunakan metode maserasi bertingkat, karena metode ini lebih efektif dalam penarikan senyawa dan memungkinkan banyak senyawa yang terekstraksi tanpa menggunakan pemanasan, dibanding menggunakan metode lain. Diawali dengan maserasi pertama menggunakan pelarut n-heksan untuk memisahkan senyawa non polarnya, dimana n-heksan dapat melarutkan senyawa non

polar. Maserasi kedua dilanjutkan dengan penggunaan pelarut etil asetat untuk memperoleh ekstrak yang lebih polar dari ekstrak n-heksan dan dilanjutkan maserasi ketiga dengan penggunaan pelarut etanol 96% untuk memperoleh senyawa yang lebih polar dari etil asetat. Tiap perlakuan Maserasi dilakukan sebanyak 3 kali rendamen untuk memperoleh ekstrak yang lebih maksimal.

Ekstrak etil asetat yang diperoleh sebanyak 8,93 gram kemudian difraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum karena metode tersebut dapat mempermudah proses pemisahan senyawa, memiliki aliran fase gerak yang lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya dimana penarikan senyawanya dibantu dengan alat pompa vakum, hingga diperoleh dua macam fraksi aktif sesuai dengan tingkat penampakan noda, yaitu fraksi A dengan berat 308,1 gram dan Fraksi B 205,6 gram.

Pada penyiapan larutan uji, fraksi polar kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana L.Willd*) dilarutkan menggunakan pelarut DMSO. Penggunaan pelarut DMSO dengan konsentrasi dibawah 1% tidak memiliki efek sitotoksik yang signifikan terhadap sel kanker HeLa (Puji,2011). Hal tersebut untuk memastikan bahwa tidak adanya aktifitas sitotoksik pelarut DMSO terhadap sel heLa, tetapi karena disebabkan perlakuan dengan sampel fraksi uji. Larutan uji dibuat dengan konsentrasi 20; 40; 80; 120; dan 200 dari larutan stok. Dalam membuat seri konsentrasi sampel untuk pengujian perlu diperhatikan kelipatan konsentrasi agar hasil regresi yang diperoleh yang baik yang sesuai dengan standar. Pemilihan

konsentrasi juga berdasarkan penelitian sebelumnya dimana digunakan konsentrasi 20 sampai 200 $\mu\text{g/mL}$ dengan nilai LC_{50} 17,102 $\mu\text{g/ml}$.

Dilakukan pemanenan sel, yaitu sel HeLa ditumbuhkan dalam media DMEM. Komposisi dari media terdiri nutrisi yang dibutuhkan sel yang mengandung *Fetal Bovine Serum* (FBS) sebagai protein pembawa hormon untuk menstimulasi pertumbuhan sel, faktor yang membantu terjadinya pelengketan sel, penstrep sebagai anti bakteri, fungizon sebagai anti jamur, dan *Phosphate Buffer Saline* (PBS) dan diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37°C dengan aliran 5% CO_2 sebagai tempat pertumbuhan normal sel.

Sel konfluen dilepas dari *plate tissue culture* dicuci dengan PBS untuk menghilangkan media penumbuh yang sebelumnya ada dalam *plate* karena salah satu kandungannya yaitu FBS dapat menghentikan kerja tripsin, ditambahkan tripsin untuk melepaskan sel yang melekat pada *plate* karena sel HeLa merupakan sel yang melekat pada *plate* dan diinkubasi untuk memaksimalkan kerja tripsin. Sel yang lepas ditambahkan media komplet (FBS 10%, fungizon 0,5%, penstrep 2%, dan media stok 87,5%) untuk memberikan nutrisi bagi sel dan menghindarkan dari kontaminan dan PBS untuk meminimalkan media yang digunakan. Disentrifugasi untuk memisahkan supernatan dari peletnya serta menghentikan kerja tripsin. Selanjutnya dimasukkan ke dalam bilik hitung (*haemocytometer*) untuk mengetahui jumlah sel yang ada dalam 1 mL. Kepadatan sel dihitung dengan haemocytometer karena pelaksanaannya cepat, mudah, dan tidak membutuhkan banyak alat

(Freshney, 2000). Suspensi sel dalam media komplet DMEM dan masukkan pada microplate 96 sumuran untuk ditumbuhkan dan diberikan perlakuan.

Larutan uji setiap fraksi dengan berbagai konsentrasi yang telah dibuat ditambahkan kedalam sumuran yang berisi sel HeLa masing-masing 4 replikasi untuk memperoleh hasil yang lebih meyakinkan. Kontrol sel digunakan untuk mengetahui besarnya absorbansi yang dihasilkan jika kehidupan sel 100% (Listyowati,dkk : 4) dan kontrol blanko (kontrol MTT) yang akan dilihat perbandingan absorbansinya. Lalu diinkubasi pada 37°C dalam inkubator CO₂ 5% selama 24 jam untuk mengetahui efek senyawa terhadap penghambatan pembelahan sel HeLa.

Ditambahkan larutan MTT, dimana MTT akan diabsorpsi ke dalam sel hidup dan dipecah melalui reaksi reduksi oleh enzim reduktase dalam rantai respirasi mitokondria menjadi formazan. Banyaknya garam formazan yang terbentuk menggambarkan banyaknya sel yang hidup karena garam formazan terbentuk hanya oleh enzim mitokondria yang berkaitan dengan proses pernapasan sel. Sehingga sel yang mati tidak ikut terhitung karena tidak terjadi proses pernapasan (Ritmaleni, *et.al.*, 2011). Sel Hela yang masih hidup terlihat seperti bentuk daun memanjang yang bergerombol serta melekat pada dasar sumuran. Sedangkan sel Hela yang mati akan berbentuk bulatan-bulatan tidak beraturan serta mengapung pada media. Setelah perlakuan dengan metode MTT akan terlihat kristal formazan yang menunjukkan sel Hela yang masih hidup (Ritmaleni, *et.al.*, 2011).

Sel diinkubasi kembali untuk memaksimalkan kerja MTT. Reaksi MTT dihentikan dengan menambahkan SDS untuk memecah kristal formazan yang terbentuk dan memberikan warna ungu, diinkubasi dalam ruang gelap selama semalam untuk memaksimalkan aksi reagen stopper dan mencegah oksidasi MTT dengan adanya cahaya. Serapan dibaca dengan *microplate ELISA reader* pada panjang gelombang 595 nm.

Pada metode MTT, persentase kematian sel merupakan selisih absorbansi kontrol dengan absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol dikalikan 100%. Data diolah dengan menggunakan analisis Probit untuk mendapatkan nilai IC_{50} sampel. Nilai IC_{50} menunjukkan persentase kematian sel pada kultur sebanyak 50%.

Pada data grafik fraksi ekstrak A dari kulit batang kemiri menunjukkan bahwa konsentrasi berbanding lurus dengan persen inhibisi sedangkan pada fraksi ekstrak B dari kulit batang kemiri menunjukkan persen inhibisi yang diperoleh tidak berbanding lurus dengan konsentrasi sel hal ini dikarenakan kemungkinan besar adanya kontaminan pada sampel yang digunakan, sehingga mempengaruhi nilai IC_{50} yang dihasilkan

. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan metode analisis diperoleh nilai IC_{50} dari fraksi A sebanyak 1,58 $\mu\text{g/mL}$ dan fraksi B sebanyak 4677,35 $\mu\text{g/mL}$. Sedangkan menurut Cho 1998, suatu senyawa disebut sebagai antikanker yaitu nilai $IC_{50} < 30 \mu\text{g/mL}$. Selain itu senyawa dikatakan memiliki aktivitas sitotoksik potensial jika memiliki nilai IC_{50} kurang dari 100 $\mu\text{g/ml}$ (Prayong, Barusrux, dan Weerapreeyakul, 2008), dan dari data yang diperoleh

menunjukkan bahwa fraksi A memiliki potensi sebagai antikanker. Namun fraksi B tidak memiliki potensi sebagai anti kanker hal ini dapat dilihat dari hasil IC_{50} yang diperoleh.

Kemampuan sitotoksisitas yang tidak poten pada sel HeLa dapat disebabkan oleh kandungan fraksi ekstrak B Kulit batang kemiri memang tidak memiliki efek sebagai antikanker terhadap sel HeLa tetapi spesifik terhadap sel kanker tertentu, namun dapat juga diakibatkan karena kesalahan pada saat pengerjaan yang dapat berupa kontaminan, sehingga pada saat pembacaan absorbansi memberikan hasil yang tinggi akibat adanya kontaminan berupa bakteri yang menyerap MTT dan membentuk formazan yang memberikan warna ungu ketika ditambahkan reagen stopper. Hal lain disebabkan karena fraksi uji masih mengandung beberapa senyawa. Adanya zat balast yang terkandung dalam fraksi uji dapat mengganggu aktivitas sitotoksik fraksi uji (Susilowati,dkk : 5) dan hal lain berhubungan dengan kemampuan senyawa sebagai antioksidan sedangkan pemicu kanker pada Hela disebabkan oleh *Human Papiloma Virus* (HPV) tipe 18 (ATTC, 2011).

Akan tetapi Menurut Harini,dkk dalam kamus penyakit dan tumbuhan obat Indonesia kulit batang kemiri mengandung tannin, dan diperkuat oleh Cancer Chemoprevention research center kandungan kimia pada batang kemiri adalah tannin. Berdasarkan strukturnya Tannin terbagi menjadi dua yaitu gallotanin dan ellagitanin. Ellagitanin diketahui memiliki nilai tersendiri bagi manusia, khususnya dalam dunia kesehatan. Aktivitas biologis dan farmakologi yang telah diketahui antara lain, penghambatan karsinogenesis, anti-tumor, antivirus, anti-oksidasi

(peroksidasi lipida, lipoksigenase, oksidasi xanthin, dan oksidasi monoamin), anti hipertensi (Okuda *et al.*, 1992; Taylor, 2003),

Aktifitas anti-kanker suatu tanin terjadi melalui mekanisme penghambatan kerja enzim sel, pencegahan proses mutagenesis yang dapat menimbulkan kanker, dan pengaktifan makrofag sel kanker.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Fraksi ekstrak etil asetat A dari kulit batang kemiri, memiliki aktivitas penghambatan terhadap sel Hela sedangkan pada fraksi ekstrak etil asetat B, dari fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L.Willd) tidak memiliki aktivitas penghambatan terhadap sel HeLa
2. Nilai IC_{50} dari fraksi A dan Fraksi B adalah 1,58 $\mu\text{g/mL}$ dan 4677,35 $\mu\text{g/mL}$, terhadap sel kanker HeLa.

B. Implikasi

Untuk mengetahui potensi sitotoksik fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* L.Willd) lebih lanjut dapat dilakukan pengujian dengan metode uji antikanker yang lain ataupun menggunakan jenis sel kanker lainnya.

KEPUSTAKAAN

- Abraham, S. *Isolation and skrining antibacterial activity of fungi from sponges Axinella carter Ridley & Dendy obtained from merine water of Pramuka Island in Seribu Island, Jakarta*. Jakarta. 2004.
- Anonim. *Informasi Obat Nasional Indonesia, Direk Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, hal 47, Depkes RI: Indonesia*. 2000
- Anonim. *Hela is also The German Name for Hel, Poland and The Cruiser SMS Hela, Wikipedia the Free Encyclopedia, Wikimedia Foundation, <http://en.wikipedia.org/wiki/HeLa>, diakses tanggal 20 Januari 2006*.
- Anonim. ATCC Cell Biology, available from [http://www.atcc.org/common/catalog/numSearch/numResults.cfm?atcc Num=HTB-22](http://www.atcc.org/common/catalog/numSearch/numResults.cfm?atcc%20Num=HTB-22), cited in 25 June 2007.
- ATCC. *HeLa Cell*. Diambil dari: <http://www.atcc.org> diakses pada tanggal 24 februari 2015.
- Aryantha, I.N.P., Widyanti, S. & Yuanita. *Ekplorasi fungi Deuteromycetes (Aspergillus sp. Dan Penicillium sp.) Penghasil senyawa anti kolesterol lovastatin*. Bandung : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. 2004.
- Blackburn, E.H. Telomeres and Telomerase: Their Mechanisms of Action and The Effects of Altering Their Functions. *FEBS Lett.* 579: 859-862. 2005.
- Canavan TP, Doshi NR, Cervical cancer. *Am Fam physican*. Fulltext, PMID 10735343. 61;1369-76.2000.
- CCRC. *Kemiri (Aleurites moluccana l.willd.* Yogyakarta: Cancer Chemoprevention research center : fakultas farmasi UGM. 2012.
- CCRC. *Prosedur tetap uji sitotoksik metode MTT*. Yogyakarta: Cancer Chemoprevention research center : fakultas farmasi UGM. 2012.
- Cho, S.J, *et al. Novel Cytotoxic Polyprenila-terd Xanthones From Garcinia gaundichaudii (Guttiferae). Tetrahedron*: 10915-10924. 1998.
- Damayanti, Dewi. *Buku Pintar Tanaman Obat: 431 jenis Tanaman Penggempur Penyakit*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2008.
- DeFillippis, R.A., Goodwin, E.C., Wu, L., DiMaio, D, *Endogenous Human Papillomavirus E6 and E7 Proteins Differentially Regulate Proliferation*,

Senescence, and Apoptosis in Hela Cervical Carcinoma Cells, Journal of Virology, Vol.77, no.2, 1551-1563.2003

De Jong W. Kanker, apakah itu? pengobatan, harapan hidup, dan dukungan keluarga. Jakarta: Arcan, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit JART, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit JART, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit JART, 2010.

Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi 3*". Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979.

Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*". Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000.

Dirjen POM. *Sediaan Galenika*". Jakarta : Departemen Kesehatan RI. 1986.

Doyle, A. Dan Griffiths, JB. *Cell and Tissue Culture for Medical Research*. New York : John Wiley and Sons Ltd. 2000.

Elevitch, C.R. dan Manner, H.I. *Traditional tree initiative: species profiles for Pacific Islands agroforestry*. <http://www.agroforestry.net/tti/Aleurites-kukui.pdf> [8 Desember 2010].

Freshney, R.I. *Animal Cell Culture. Practical Approach second edition*. Oxford New York : Oxford university press. 1987.

Freshney, R.I. *"Culture of Animal Cells : A manual Basic of Technique"*. New York : Wiley – Liss Inc. 2000.

Govan, AD.T, et all. *Pathology Illustrated*. Curchil : Livingstone. 2009.

Goodwin, E.C., DiMaio, D., *Repression of human papillomavirus oncogenes in Hela cervical carcinoma cells causes the orderly reactivation of dormant tumor suppressor pathways*, *Biochemistry*, Vol.97, no.23. Labwork Study Guide and Lecture Notes, Henrietta Lacks, www.micro.msb.le.ac.uk/Labwork/Lack1.htm. 2000.

- Handoko, dkk. *Aktivitas sitotoksik ekstrak etanolik rimpang temu kunci (Boesenbergia Pandurata) terhadap sel kanker Hela dan sel kanker kolon*. WiDr. Yogyakarta : Majalah Kesehatan PharmaMedika vol.3 No.1. 2011.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia*”. Bandung : Penerbit ITB. 1987.
- Harborne, J. B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, Edisi kedua, diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. Bandung: Penerbit ITB, 2006.
- Irwan, Azidi. Dkk. *Uji Aktivitas Ekstrak Saponin Fraksi N-Butanol Dari Kulit Batang Kemiri (Aleurites Moluccana Willd) Pada Larva Nyamuk Aedes Aegypti*. Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat 2 Alumni Prog. Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: Kalimantan Selatan. 2007.
- Karadeniz F et al. *Antioxidant activity of selected fruits and vegetables grown in Turkey*. Turkish Journal of Agricultural and Forest 89: 297–303. 2005.
- Klein, C.A. Cancer: The Metastasis Cascade. *Science*. 321: 1785-1787. 2008.
- Kusumadewi, Silfia Windy. *Uji efek antiproliferatif senyawa eugenol terhadap kultur sel kanker serviks (Hela Cell Line)*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2011.
- Labwork Study Guide and Lecture Notes, 2000, Henrietta Lacks, www.micro.msb.le.ac.uk/Labwork/Lack1.htm.
- Lapenna S, dan Giordano A. “*Cell Cycle Kinases as Therapeutic Targets for Cancer*”. Volume VII, hal. 547-566. 2009.
- Listyowati, dkk. *Efek sitotoksik dan pemacuan apoptosis fraksi Petroleum eter ekstrak etanol daun tapak liman (Elephantopus scaber Linn) terhadap sel Helal*. Yogyakarta : Fakultas farmasi Universitas Ahmad Dahlan. 2013.
- Loomis TA. —*Essential of toxicology. 3rd ed*”. Philadelphia: Lea & Febiger. 1987.
- Lu Lanhai et,al. *Exocytosis of MTT Formazan Could exacerbate cell injury*. China: Elsevier. 2012.
- Mahardika, A.W. “*Kursus Singkat Kultur Sel*”. Yogyakarta : Laboratorium Ilmu Hayati UGM. 2004.

- Malole, M. B. M. “*Kultur Sel dan Jaringan Hewan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Bioteknologi. Institut Pertanian Bogor. 1990.
- Martawijaya, A., Kartasujana, I., Mandang, Y.I., Prawira, S.A. dan Kadir, K. *Atlas Kayu Indonesia Jilid II*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor; Indonesia. 1989.
- Meyer, B.N, Ferrigni, N. R. Ferrigni, J. E Putnam, L. B. Jascobsen, D. E. Nicholas, and J.L Mc Laughlin. *Brine Shrimp : A Convenient Bioassay for Active Plant Constituents*”. J. Of Med. Plant Research Planta Med, USA. 1982.
- Mitry RR, Hughes RD (eds.). Introduction to Cell Culture. Human Cell Culture Protocols, Methods in Molecular Biology. 2012; 806.
- MRSNY, R. —*Cancer cell biology*l. UK : University of Bath : Woodhead Publishing. 2013.
- Muhtasib, Gal dkk. *Plant Tannins Inhibit The Induction Of Aberrant Crypt Foci And Colonic Tumors By 1,2-Dimethylhydrazine In Mice*. 2001.
- Nema R, Khare S. *An Animal Cell Culture Advance Technology For Modern Research Advances in Bioscience and Biotechnology*. 219-226. 2012.
- Okuda, T., T. Yoshida, and T. Hatano. Pharmacologically Active Tannins Isolated from Medicinal Plants. In Hemingway, R.W. and P.E. Laks (ed.). *Plant Polyphenols: Synthesis, Properties, and Significance*. New York: Plenum Press. 1992.
- Puji, et al. *Uji Sitotoksitas Dan Efek Ekstrak Spons Laut Aaptos suberitoides Terhadap Sel Kanker Serviks (HeLa) Secara In Vitro*. 2011.
- Prayong P, Barusrux S, dan Weerapreeyakul N. *Cytotoxic activity screening of some indigenous Thai plants, Fitoterapia*, 79 (7-8), 598–601. 2008.
- Ramadhan, Fauzan A. *Tanaman Kemiri (Aleurites moluccana)*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada. 2014.
- Rasjidi I. *Panduan Penatalaksanaan Kanker Ginekologi: Berdasarkan Evidence Base*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2007.
- Rasjidi, Imam. *Deteksi Dini & Pencegahan Kanker pada Wanita*. Jakarta : CV Sagung Seto 2009.
- Rasjidi, Imam. “*Epidemiologi Kanker pada Wanita*”. Jakarta: CV Agung Seto. 2010.

- Ren W, Qlao, Z Wang, H Zhu L, and Zhang L. *Flavonoid: Promising Anticancer Agents*. Medicinal Research Reviews, 23 : 519-534. 2003.
- Ritmaleni, et al. “*Sintesis dan uji sitotoksitas senyawa LR-2 pada sel kanker payudara T47D*”. Majalah Farmasi Indonesia, 2011.
- Rollino, C. et al. *False positive results with MTT assay*. *Journal of Immunological Methods*. 1995.
- Romadhan Yusuf Alam. *Gangguan siklus sel & mutasi gen pada kanker payudara*. Surakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. 2013.
- Said, Anugrah yuniarti. “*Uji toksisitas ekstrak klika anak dara (Croton oblongus Burm F) dengan metode Brine Shrimp lethality test*”. Makassar: Uin Alauddin Makassar. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 10. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sjamsuddin. *Pencegahan dan deteksi dini kanker serviks*. Cermin Dunia Kedokteran. 133 (9): 8-13. 2001.
- Sugiyarto, Wahyu. *Uji sitotoksitas fraksi Butanol kulit batang srikaya (Annona squamosa L) terhadap sel Helal*. Jakarta: Universitas 17 agustus 1945. 2013.
- Susilowati, dkk. *Uji sitotoksitas fraksi n – Heksana ekstrak etanol Herba alfalfa (Medicago sativa L) pada sel T47D dan sel HeLa serta identifikasi kandungan senyawa kimianya*. Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Semarang.
- Taylor. *Herbal Secrets of The Rainforest 2nd edition*. Austin: Sage Press, Inc. 2003.
- Tjay, Tan Hoan dan Raharja Kirana, *Obat-obat Penting*, Elex Media Komputindo, Jakarta. 2007.
- Utami, Dwi Aryanti Nur’. *Toleransi Saccharomyces Cerevisiae Terekayasa Terhadap Stres Hiperosmosis Pada Media Berkonsentrasi Gula Tinggi Untuk Produksi Bioetanol*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor. 2016.
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*”, Diterjemahkan oleh Soendani N. S., UGM Press, Yogyakarta, 1995.
- Webster Molly and Kumar Vikram Sheel. — *Picturing Cervical Cancer*.l. Technology Corner : The clinical chemist. 2014.

WHO. *Comprehensive Cervical Cancer Control*. Jenewa; 2006.

Windyaswari, Ari Sri, dkk. *Kajian Pendahuluan Potensi Anti Kanker Dengan Uji Toksisitas Metode Brine Shrimp Lethality Test (Bslt) Terhadap Ekstrak Etanol Dan Fraksi-Fraksi Dari Kulit Batang Kemiri Aleurites Moluccana (L.) Willd.* Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Jenderal Achmad Yani. 2015.


Yamato et.al. *Induction of Cell Death In Human Papilloma Virus 18 – Positive Cervical Cancer Cell by E6 si RNA*. *Cancer Gene Therapy*, 13 . 2006.

Yuliawati, Sri, dkk. *Uji sitotoksik In vitro ekstrak methanol buah Makassar (Brucea javanica L.) dan ubi kayu (Iponea batatas L) terhadap sel hela.* Universitas Diponegoro. 2004.


Zhanqiu, Yang and Hai Rong Xiong. *Culture conditions and types of growth media for mammalian cells. Chapter 1.* licensee inTech. 2012.

Lampiran 1. Alur Penelitian


SKEMA KERJA




a. Penyiapan Sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana L. Willd.*).




b. Pembuatan Larutan Uji



c. Uji MTT



Lampiran 2. Gambar penelitian**Gambar. 5 Sampel penelitian**


Keterangan:

- A. Batang kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd).
- B. Kulit batang kemiri

**Gambar. 6 Proses Penimbangan sampel****Gambar. 7 Proses ekstraksi**

Keterangan:


- A. Proses penyaringan hasil ekstraksi
- B. Hasil ekstraksi



Gambar. 8 Hasil Fraksi

Keterangan:

- A. Fraksi A
- B. Fraksi B



Gambar. 9 Penampakan sel

Keterangan:

- A. Sel Mati
- B. Sel Hidup

Lampiran 3. Penimbangan dan Perhitungan Pengenceran

A. Penimbangan Ekstrak Kulit Batang Kemiri

1. % Rendamen N-Hexan kulit batang kemiri = $\frac{10,74 \text{ gram}}{1000 \text{ gram}} \times 100\%$ = 1,074%
2. % Rendamen Etil Asetat kulit batang kemiri = $\frac{8,93 \text{ gram}}{1000 \text{ gram}} \times 100\%$ = 0,893 %
3. % Rendamen Etanol Kulit Batang Kemiri = $\frac{30,28 \text{ gram}}{1000 \text{ gram}} \times 100\%$ = 3,028 %

B. Perhitungan Pengenceran Fraksi Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* L.willd).

1. Fraksi etil asetat

Stok = 5 mg dalam 100 μ l

$$\frac{5000 \mu\text{g}}{0,1 \text{ ml}} = 50.000 \mu\text{g/ml}$$

Pengenceran [200]

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$50.000 \mu\text{g/ml} \times V_1 = 200 \mu\text{g/ml} \times 0,5 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{100 \mu\text{g}}{50.000 \mu\text{g/ml}}$$

$$= 0,002 \text{ ml}$$

$$= 4 \mu\text{l}$$

2. Fraksi Etil Asetat

Stok = 5 mg dalam 100 μ l

$$\frac{5000 \mu\text{g}}{0,1 \text{ ml}} = 50.000 \mu\text{g/ml}$$

Pengenceran [120]

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$50.000 \mu\text{g/ml} \times V_1 = 120 \mu\text{g/ml} \times 0,5 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{60 \mu\text{g}}{50.000 \mu\text{g/ml}}$$

$$= 0,0012 \text{ ml}$$

$$= 1,2 \mu\text{l}$$

Lampiran 4. Perhitungan % Inhibisi

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{(\text{sel treatment} - \text{kontrol blank})}{(\text{Kontrol sel} - \text{kontrol Blank})} \times 100\%$$

Sel HeLa

Fraksi A

Perhitungan % inhibisi

[200]

$$\% \text{inhibisi} = \frac{(\text{sel treatment} - \text{kontrol blank})}{(\text{Kontrol sel} - \text{kontrol Blank})} \times 100\%$$

$$= \frac{(0,58 - 0,113333333)}{(0,58888333 - 0,113333333)} \times 100\%$$

$$= 98,142 \%$$

Lampiran 5. Grafik dan Perhitungan IC₅₀

Sel HeLa

a. Fraksi Etil Asetat A

$$y = ax + b$$

$$5 = 0,8342x + 4,9423$$

$$5 - 4,9423 = 0,8342x$$

$$0,0577 = 0,8342x$$

$$x = \frac{0,0577}{0,8342}$$

$$x = 0,0692 \mu\text{g/ml}$$

$$\text{antilog } x = 1,58 \mu\text{g/ml}$$

2. Fraksi Etil Asetat B

$$y = ax + b$$

$$5 = 0,2332x + 4,1441$$

$$0,5 - 4,1441 = 0,2332x$$

$$0,8559 = 0,2332x$$

$$x = \frac{0,8559}{0,2332}$$

$$x = 3,67 \mu\text{g/ml}$$

$$\text{antilog } x = 4677,35 \mu\text{g/ml}$$

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



WAHYU LYANA NINGSIH S, dilahirkan di Ujung Pandang pada 08 oktober 1995, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri H. Soepardi dan Hj Syamsinar. Pendidikan formal yang telah dilalui yaitu menamatkan pendidikan sekolah TK Asiyah Bustanul Athfal pada tahun 2001, dan Tamat pada sekolah dasarnya di SDN Sudirman 1 pada tahun 2007. Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah menengah pertama dan Sekolah Meenegah Atas di PPP Ummul Mukminin 2007-2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R