

**FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIK GEL ANTI JERAWAT DARI
EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH PISANG AMBON MUDA (*Musa
paradisiaca* var. *Sapientum*) DENGAN BERBAGAI VARIAN BASIS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

REZTI ARIANTI J.
NIM. 70100113047

ALAUDDIN
MAKASSAR
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Gel Anti Jerawat Dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* Var. *Sapientum*) Dengan Berbagai Varian Basis”, yang disusun oleh **Rezti Arianti J, NIM : 70100113047**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 06 Desember 2017 M** yang bertepatan dengan **18 Rabiul Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 06 Desember 2017 M
18 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani., S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi., S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Andi Tenriugi., S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Penguji II	: Dr. Muh. Shuhufi. S.Ag., M.Ag.	(.....)

Dekan,



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 195502031983121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezi Arianti J.
Nim : 70100113047
Tempat, Tanggal Lahir : Baubau, 01 Januari 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Dirgantara No 11 E, Makassar
Judul : Formulasi Dan Uji Stabilitas Gel Anti Jerawat Dari
Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda
(*Musa paradisiaca* Var. *Sapientum*) Dengan
Berbagai Varian Basis

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2017

Penyusun,

REZTI ARIANTI J.

70100113047

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Gel Anti Jerawat Dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) Dengan Berbagai Variasi Basis.” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Hj. Siti Hadijah serta kakak saya Kiky Rezki Wati J, S.Kom, adik-adik saya Zulfikar J dan Sarah Aprilia J, yang telah memberikan seluruh kasih sayang, pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak Prof. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A.,Ph.D, selaku Wakil Rektor III, Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D, selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
5. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
6. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan Ibu Andi Tenriugi, S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
7. Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
8. Bapak Dr. Muh. Shuhufi. S.Ag., M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,

9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
10. Sahabat-sahabat penulis Eva Restika, Nurfadillah Absa, Faradhiba Amriani, Iffah Kholifah, Reski Auliya. Terimakasih karena selalu ada untuk penulis selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan Farmasi Angkatan 2013 (FAR13ION) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini, terkhusus para pejuang Season 2 : Inna, Rifqa, Amirah, Wulan R, Nurwinda, Linda, Ika Pertiwi, Sonia, Abdillah, Musfandi, Arditya, Fitrahmillah, Lisa, Isma, Nure, Pipit, Riska, Dea, Lia, Fahri, Bobi, Arman, Ayu Andari, kalian inspirasiku.
12. Saudara Andi Walinono, Tria Wulan, Haerul, Bagus, Musyarrafah, Ibnu, Munawarah, Fahrul, Henro, yang telah memberikan semangat dan telah meluangkan waktunya dalam membantu penyusunan skripsi ini.
13. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalam.

Gowa, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Uraian Tanaman Pisang Ambon	8
B. Jerawat	9
C. Uraian Mikroba Uji.....	16
D. Kulit	19
E. Sediaan Gel	23
F. Komposisi Sediaan	27
G. Uji Stabilitas Gel	30

H. Ekstraksi	34
I. Metode Pengujian Antimikroba.....	36
J. Tinjauan Islam	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Instrumen Penelitian	41
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	59
KEPUSTAKAAN	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.	Rancangan Formula Sediaan Gel.....	43
2.	Rendamen Ekstrak Hasil Maserasi	48
3.	Hasil Pengamatan Organoleptis Formula Gel.....	48
4.	Hasil Pengukuran Nilai pH Formula Gel.....	49
5.	Hasil Pengamatan Homogenitas Formula Gel	49
6.	Hasil Pengamatan Uji Daya Sebar Gel	50
7.	Hasil Pengukurann Viskositas Formula Gel	50
8.	Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Formula Gel	50
9.	Hasil Replikasi Pengukuran Formula Gel.....	71
10.	Hasil Replikasi Pengujian Aktivitas Antibakteri Formula Gel	72
11.	Analisis Statistik <i>Paired sampel t-test</i>	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1.	Struktur Kulit	20
2.	Pisang Ambon	64
3.	Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda.....	73
4.	Sediaan Gel Ekstrak Kulit Pisang Ambon Muda.....	74
5.	Sediaan Gel Ekstrak Kulit Pisang Ambon Muda Sebelum penyimpanan	75
6.	Sediaan Gel Ekstrak Kulit Pisang Ambon Muda Setelah penyimpanan	76
7.	Pengujian Homogenitas Sediaan Gel Sebelum Penyimpanan	77
8.	Pengujian Homogenitas Sediaan Gel Setelah Penyimpanan	79
9.	Pengujian pH Sediaan Gel Sebelum Penyimpanan	81
10.	Pengujian pH Sediaan Gel Setelah Penyimpanan	83
11.	Pengujian Viskositas Sediaan Gel Sebelum Penyimpanan	85
12.	Pengujian Viskositas Sediaan Gel Setelah Penyimpanan	86
15.	Pengujian Daya Sebar Sediaan Gel Sebelum Penyimpanan	88
16.	Pengujian Daya Sebar Sediaan Gel Setelah Penyimpanan	90
17.	Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Sebelum Penyimpanan	92
18.	Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Setelah Penyimpanan	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Gambar Pisang Ambon	64
2. Skema Kerja Ekstraksi Kulit Buah Pisang Ambon Muda	65
3. Skema Kerja Pembuatan Gel	66
4. Skema Kerja Uji Stabilitas Gel	67
5. Hasil Perhitungan	68
6. Hasil Replikasi Pengukuran Sediaan Gel	71
7. Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda	73
8. Gambar Hasil Pengamatan	74
9. Pengujian Homogenitas Sediaan Gel	77
10. Pengujian pH Sediaan Gel	81
11. Pengujian Viskositas Sediaan Gel	85
12. Pengujian Daya Sebar Sediaan Gel	88
13. Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel	92
14. Hasil Analisis Statistik	94
15. Riwayat Hidup	95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Rezti Arianti J.
Nim : 70100113047
Judul : Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Gel Anti Jerawat Dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Dengan Berbagai Varian Basis

Telah dilakukan penelitian tentang Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel dari Ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) dengan variasi jenis basis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis basis terhadap stabilitas fisik sediaan gel. Formulasi gel menggunakan variasi jenis basis yaitu F1 (NaCMC), F2 (HPMC 4000), dan F3 (Karbopol 940). Uji karakterisasi ditentukan berdasarkan pengamatan organoleptik meliputi warna, bau, dan bentuk, pemeriksaan pH, pemeriksaan homogenitas, pengujian daya sebar, penentuan viskositas, dan pengujian aktivitas gel terhadap bakteri penyebab jerawat (*Propionibacterium acne*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formula F1 stabil pada parameter pengujian homogenitas dan daya sebar ditunjukkan dengan nilai ($p > 0,05$), tetapi tidak stabil pada parameter pengujian pH dan viskositas ($p < 0,05$). Sedangkan pada formula F2 dan F3 stabil pada parameter pengujian homogenitas, viskositas, dan daya sebar, ditunjukkan dengan nilai ($p > 0,05$), tetapi tidak stabil pada pengujian pH ($p < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua formula tidak stabil secara fisik.

Kata Kunci : Kulit Pisang Ambon Muda, Gel, NaCMC, HPMC 4000, Karbopol 940.

ABSTRACT

Name : Rezti Arianti J.
NIM : 70100113047
Title : **Formulation And Physical Stability Test Anti Acne Gel From Ethanol Extract of Unripe Fruit Ambon Banana (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) With Variation of Base Type.**

A research on the formulation and physical stability test anti acne gel from ethanol extract of unripe fruit ambon banana (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) with variation of base type. This study aims to determine the effect of base types on the physical stability of gel preparations. The gel formulation uses a variety of base types namely F1 (NaCMC), F2 (HPMC 4000), and F3 (Karbopol 940). The characterization test is determined based on organoleptic observations including color, odor, and shape, pH examination, homogeneity examination, spreading test, viscosity determination, and gel activity testing against acne-causing bacteria (*Propionibacterium acne*, *Staphylococcus aureus*, and *Staphylococcus epidermidis*). The results of this study indicate that the formula F1 is stable on homogeneity and spreading test parameters with $p > 0,05$ but unstable on pH and viscosity test parameters ($p < 0.05$). While the formula F2 and F3 is stable on homogeneity, viscosity, and spreading test parameters with $p > 0,05$, but unstable on pH ($p < 0,05$) test. so it can be concluded that all formulas are not physically stable.

Keywords: Unripe fruit ambon banana, gel, NaCMC, HPMC 4000, Karbopol 940.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang lebih pesat. Begitu pula dengan gaya hidup manusia yang sekarang ini semakin serba instan. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab berbagai masalah kesehatan. Kemajuan teknologi dalam menangani masalah kesehatan memang telah banyak berkembang seperti obat-obatan, tetapi efek samping yang akan ditimbulkan juga beragam dan harga obat-obatan yang cenderung semakin mahal. Kesehatan itu sendiri, dapat diperoleh dengan mengatur pola hidup sehat dan mencegah atau mengobati penyakit dengan obat-obatan berbahan dasar alam yang tidak membutuhkan biaya mahal.

Jerawat merupakan penyakit kulit yang biasanya diderita para remaja atau pada masa pubertas yang umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik, hormonal, makanan, dan infeksi bakteri. Salah satu bakteri penyebab jerawat adalah bakteri gram positif yaitu *Staphylococcus aureus*. Bakteri ini biasa ditemukan pada saluran nafas, permukaan kulit, dan jaringan kulit bagian dalam dari bisul bernanah, serta infeksi luka (Jawetz dkk, 2001). Pengobatan jerawat di klinik kulit biasanya menggunakan antibiotik yang umumnya memiliki efek samping iritasi sebagai anti jerawat, selain itu penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan resistensi dan kerusakan organ (Wasitaatmadja, 1997). Oleh karena itu dicari alternatif lain mengobati jerawat yaitu dengan menggunakan bahan-bahan dari alam guna

meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada pengobatan jerawat dengan antibiotik.

Tanaman obat saat ini telah banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bidang teknologi yang sedang dikembangkan yaitu pemanfaatan tanaman obat sebagai sediaan obat. Tanaman obat yang terdapat di Indonesia sangat beragam. Salah satu tanaman obat Indonesia yang secara empiris dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan memiliki khasiat antibakteri adalah *Musa paradisiaca* var. *sapientum* atau yang lebih dikenal dengan nama pisang ambon. Tanaman ini sudah dikenal sejak lama dan dibudidayakan serta memiliki berbagai manfaat, seperti buahnya dapat dimakan, daunnya digunakan untuk keperluan rumah tangga, serta batangnya biasa digunakan oleh masyarakat di Indonesia sebagai obat luka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fagbemi, dkk (2009) dan Imam (2011) bahwa ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) memiliki aktivitas antibakteri, yaitu mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dengan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) berkisar pada 2-512 mg/mL dan Konsentrasi Bakterisida Minimum (KBM) berkisar pada 32-512 mg/mL. Kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri disebabkan karena adanya senyawa aktif yang terkandung di dalam kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) diantaranya yaitu tanin, flavanoid, saponin, glikosida, terpenoid, dan alkaloid.

Sediaan obat jerawat yang ada di pasaran beraneka ragam. Ada yang berupa krim, masker, tablet, dan lebih banyak lagi. Pada dasarnya pengobatan herbal merupakan pengobatan yang menggunakan bahan alami dengan cara tradisional. Penggunaan secara tradisional ini sangatlah tidak praktis, dikarenakan pengolahannya yang lama, bahannya juga tidak akan tahan lama dan cepat rusak. Pengolahan secara alami serta dikemas secara menarik akan menjadi solusi bagi orang yang menginginkan pengobatan dengan cara herbal dan praktis.

Bentuk sediaan gel lebih baik digunakan pada pengobatan jerawat dari pada bentuk sediaan krim karena sediaan gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan keparahan jerawat (Sasantiet al., 2012). Gel dipilih karena tidak mengandung minyak sehingga tidak akan memperburuk jerawat, bening, mudah mengering membentuk lapisan film yang mudah dicuci, juga bentuk sediaan gel cocok untuk terapi topical pada jerawat terutama penderita dengan tipe kulit berminyak (Voigt, 1994).

Sediaan gel secara topikal dapat meningkatkan efektivitas dan kenyamanan dalam penggunaannya, antara lain mampu menyampaikan bahan obat dengan baik, dan menyebabkan jerawat cepat kering karena sifat gel yang mudah menguap, keuntungan lain sediaan gel antara lain mudah merata apabila dioleskan pada kulit, memberikan sensasi dingin, menyejukkan, melembabkan, tidak menimbulkan bekas di kulit, dan mudah berpenetrasi pada kulit (Yulia dkk., 2012).

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk membuat sediaan gel antijerawat dari ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var.sapientum), dengan membandingkan jenis basis manakah yang memiliki stabilitas paling baik dalam formula sediaan gel anti jerawat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah basis Karbopol 940, HPMC, dan NaCMC dapat digunakan dalam formulasi gel anti jerawat ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var.sapientum) ?
2. Basis manakah yang memiliki stabilitas paling baik diantara ketiga formula sediaan gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var.sapientum) ?
3. Apakah gel yang dihasilkan dari ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. sapientum) efektif terhadap bakteri penyebab jerawat ?

C. Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Formulasi farmasi adalah proses proses menggabungkan bersama komponen yang berbeda berupa zat aktif dan zat tambahan untuk menghasilkan senyawa medis yaitu obat medis.

b. Uji stabilitas yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat atau kosmetik untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya mulai dari pertama kali dibuat hingga batas spesifikasi yang telah

ditetapkan selama periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas dan kemurnian produk tersebut.

c. Gel anti jerawat adalah suatu produk farmasi berupa sediaan setengah padat yang terdiri dari campuran koloidal antara 2 zat berbeda fase yaitu padat dan cair, baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling terserap oleh cairan, yang dimaksudkan untuk mengatasi jerawat.

d. Ekstrak kulit buah mentah pisang ambon adalah sediaan ekstrak kering, kental atau cair dari kulit buah mentah pisang ambon yang diperoleh dengan cara menyari simplisia kulit buah mentah pisang ambon menggunakan pelarut etanol 70% hingga mencapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman.

e. Basis gel adalah bahan tambahan berupa substansi hidrokoloid yaitu polimer larut air yang mampu membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan sehingga dapat memberikan konsistensi tiksotropi pada gel.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup formulasi dan pengujian stabilitas ekstrak etanol kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) meliputi uji stabilitas fisik dalam bentuk sediaan kosmetik khususnya sediaan gel anti jerawat.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari

penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Fagbemi, dkk (2009), dalam jurnal *Evaluation Of The Antimicrobial Properties Of Unripe Banana (Musa sapientum L.), Lemon Grass (Cymbopogon citratus S.) and Turmeric (Curcuma longa L.) On Pathogens*, melaporkan bahwa ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) menunjukkan aktivitas yang baik terhadap *Staphylococcus aureus* dengan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) berkisar pada 2-512 mg/mL dan Konsentrasi Bakterisida Minimum (KBM) berkisar pada 32-512 mg/mL.
2. Imam dan Saleha (2011), dalam jurnal *Musa paradisiaca L. and Musa sapientum L. : A Phytochemical and Pharmacological Review*, melaporkan bahwa ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) memiliki aktivitas antimikroba terhadap *Staphylococcus aureus*, dengan nilai *inhibition concentration* (IC₅₀) yaitu sebesar 143,5 µg/mL.
3. Normayunita, dkk (2015), dalam jurnal *Aktivitas Antibakteri Fraksi Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (Musa paradisiaca var. Sapientum) Terhadap Staphylococcus aureus*. Melaporkan bahwa ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus*, dimana berdasarkan uji menunjukkan bahwa aktivitas paling tinggi dari empat fraksi dengan

konsentrasi 30, 60, dan 90 µg/mL terdapat pada fraksi dengan konsentrasi 90 µg/mL.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah jenis basis Karbopol 940, HPMC, dan NaCMC, dapat digunakan dalam formulasi sediaan gel anti jerawat dari ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*).
- b. Untuk mengetahui jenis basis yang paling baik dalam formula sediaan gel anti jerawat dari ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*).
- c. Untuk mendapatkan suatu sediaan gel anti jerawat yang efektif terhadap bakteri penyebab jerawat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat yaitu untuk memanfaatkan kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) sebagai suatu sediaan kosmetik.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Pisang Ambon

1. Klasifikasi

Klasifikasi tanaman pisang menurut Tjitrosoepomo (1994) adalah sebagai berikut:

Regnum	: Plantae
Filum	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Ordo	: Zingiberales
Genus	: Musa
Spesies	: <i>Musa paradisiaca</i>
Varietas	: <i>Sapientum</i>

2. Nama Daerah

Gedang (Jawa), panti (Sumatra), harias (Kalimantan), biu (Nusa Tenggara), loka (Bugis), pisang ambon (Sulawesi tenggara), fudir (Maluku), nando (Irian), unti (Makassar) (Dalimartha, 2003).

3. Morfologi

Tanaman pisang tumbuh di daerah tropik karena menyukai iklim panas dan memerlukan matahari penuh. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah dengan ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, kemudian mati. Tinggi antara 2-9 meter, berakar serabut dengan batang bawah tanah (bonggol) yang pendek. Dari mata tunas yang ada bonggol inilah bias tumbuh tanaman baru. Pisang mempunyai batang

semu yang sebenarnya tersusun atas tumpukan pelepah daun yang tumbuh dari batang bawah tanah sehingga mencapai ketebalan 20-50 cm (Dalimartha, 2003).

Tanaman pisang merupakan tumbuhan berbatang basah yang besar, biasanya mempunyai batang yang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun. Tangkai daun jelas beralur pada sisi atasnya, helaian daun lebar, bangun jorong (oval memanjang), dengan ibu tulang yang nyata dan tulang-tulang cabang yang menyirip dan kecil-kecil. Bunga dalam suatu bunga majemuk dengan daun-daun pelindung yang besar dan berwarna merah. Masing-masing Bunga mempunyai tenda bunga yang mempunyai mahkota atau jelas mempunyai kelopak dan mahkota yang biasanya berlekatan. Benang sari 6 yang 5 fertil yang satu staminoidal. Bakal buah tenggelam, beruang 3 dengan 1 bakal biji dalam tiap ruang. Tangkai puti berbelah 3-6. Bauhnya buah buni atau buah kendaga (Lakitan, 1993).

4. Khasiat

Kulit buah pisang ambon *Musa paradisiaca* var. *sapientum* memiliki khasiat sebagai agen pencegah pertumbuhan dan perkembangan sel kanker tanpa mengganggu sel normal (NAM Andini, dan I Wandart, 2014). Memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri spesies *Staphylococcus* dan *Pseudomonas* (Imam dan Akter, 2011). Kulit pisang muda dapat menyembuhkan berbagai penyakit infeksi, diantaranya diare oleh *Escherichia coli* (Minerva dan Permatasari, 2015). Kulit buah pisang genus ini juga memiliki aktivitas antioksidan (Pane Elfira Rosa, 2013). Menurut data empiris kulit buah pisang dapat mengatasi jerawat.

B. Jerawat

1. Definisi Jerawat

Jerawat adalah penyakit kulit akibat peradangan manahun dari folikel polisebasea yang ditandai adanya erupsi komedo, papul, pustule, nodus dan kista.

Adanya bahan komedogenik dalam beberapa kosmetik mungkin ada hubungannya dengan timbulnya jerawat tingkat ringan pada wanita umur 20-40 tahun. Jenis-jenis bakteri yang sering berperan dalam pembentukan jerawat adalah *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus epidermidis* atau *Pityrosporum ovale*, *Staphylococcus aureus* dan *P. orbiculare*. Kadang-kadang acne menyebabkan rasa gatal yang mengganggu atau rasa sakit kecuali bila terjadi pustul atau nodus yang besar (Wasitaatmadja, 1997). Jika dibiarkan saja kebanyakan jerawat yang meradang bisa hilang berangsur-angsur pada usia awal dua puluh tahun pada pria, sedang pada wanita terjadi lebih lambat. Isi komedo adalah sebum yang kental dan padat. Isi kista biasanya pus darah. Isi papul adalah masa yang padat dan pustul berisi pus (Corwin, 2000).

2. Patogenesis

Patogenesis acne meliputi empat faktor, yaitu hiperproliferasi epidermis folikular sehingga terjadi sumbatan folikel, produksi sebum berlebihan, inflamasi, dan aktivitas *Propionibacterium acnes* (*P. acnes*) (Zaeglein, 2008). Androgen berperan penting pada patogenesis acne tersebut (Kurokawa, 2009). Acne mulai terjadi saat adrenarke, yaitu saat kelenjar adrenal aktif menghasilkan dehidroepiandrosteron sulfat, prekursor testosteron (Zouboulis, 2005). Penderita acne memiliki kadar androgen serum dan kadar sebum lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal, meskipun kadar androgen serum penderita acne masih dalam batas normal (Zaeglein, 2008). Androgen akan meningkatkan ukuran kelenjar sebaceous dan merangsang produksi sebum, selain itu juga merangsang proliferasi keratinosit pada duktus seboglandularis dan akroinfundibulum (Kurokawa, 2009). Hiperproliferasi epidermis folikular juga diduga akibat penurunan asam linoleat kulit dan peningkatan aktivitas interleukin 1 alfa (Harper, 2004). Epitel folikel rambut bagian atas, yaitu infundibulum, menjadi hiperkeratotik dan kohesi keratinosit

bertambah, sehingga terjadi sumbatan pada muara folikel rambut (Zaenglein, 2008). Selanjutnya di dalam folikel rambut tersebut terjadi akumulasi keratin, sebum, dan bakteri, dan menyebabkan dilatasi folikel rambut bagian atas, membentuk mikrokomedo. Mikrokomedo yang berisi keratin, sebum, dan bakteri, akan membesar dan ruptur. Selanjutnya, isi mikrokomedo yang keluar akan menimbulkan respons inflamasi. Akan tetapi, terdapat bukti bahwa inflamasi dermis telah terjadi mendahului pembentukan komedo (Zaenglein, 2008).

Faktor keempat terjadinya acne adalah *P. acnes*, bakteri positif gram dan anaerob yang merupakan flora normal kelenjar pilosebacea. Remaja dengan acne memiliki konsentrasi *P. acnes* lebih tinggi dibandingkan remaja tanpa acne, tetapi tidak terdapat korelasi antara jumlah *P. acnes* dengan berat acne.¹ Peranan *P. acnes* pada patogenesis acne adalah memecah trigliserida, salah satu komponen sebum, menjadi asam lemak bebas sehingga terjadi kolonisasi *P. acnes* yang memicu inflamasi. Selain itu, antibodi terhadap antigen dinding sel *P. acnes* meningkatkan respons inflamasi melalui aktivasi komplemen.^{1,7} Enzim 5-alfa reduktase, enzim yang mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron (DHT), memiliki aktivitas tinggi pada kulit yang mudah berjerawat, misalnya pada wajah, dada, dan punggung. Pada hiperandrogenisme, selain jerawat, sering disertai oleh seborea, alopecia, hirsutisme, gangguan haid dan disfungsi ovulasi dengan infertilitas dan sindrom metabolik, gangguan psikologis, dan virilisasi. Penyebab utama hiperandrogenisme adalah sindrom polikistik ovarium (*polycystic ovarian syndrome*, PCOS). Sebagian penderita PCOS, yaitu sebanyak 70%, juga menderita acne. Meskipun demikian, sebagian besar acne pada perempuan dewasa tidak berkaitan dengan gangguan endokrin. Penyebab utama acne pada kelompok ini adalah perubahan respons reseptor androgen kulit terhadap perubahan hormon fisiologis siklus haid. Sebagian

besar perempuan mengalami peningkatan jumlah acne pada masa premenstrual atau sebelum haid (Addor, 2010).

3. Etiologi

Penyebab pasti timbulnya akne belum diketahui dengan jelas. Menurut Zaenglein (2008). Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya akne vulgaris antara lain :

1) Bakteria

Mikroba yang terlibat pada terbentuknya akne adalah *Corynebakterium acnes*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus* dan *Pityrosporum ovale*.

2) Genetik

Akne vulgaris mungkin merupakan penyakit genetik akibat adanya peningkatan kepekaan unit pilosebacea terhadap kadar androgen yang normal.

3) Ras

Kemungkinan ras berperan dalam timbulnya akne vulgaris diajukan karena adanya ras - ras tertentu seperti oriental (Jepang, Cina, Korea) yang lebih jarang dibandingkan dengan ras *caucasian* (Eropa, Amerika) dan orang kulit hitam pun lebih jarang terkena daripada orang kulit putih.

4) Hormon

Peningkatan kadar hormon androgen, anabolik, kortikosteroid, gonadotropin serta ACTH mungkin menjadi faktor penting pada kegiatan kelenjar sebacea. Kelenjar sebacea sangat sensitif terhadap hormon androgen yang menyebabkan kelenjar sebacea bertambah besar dan produksi sebum meningkat. Hormon estrogen dapat mencegah terjadinya akne karena bekerja berlawanan dengan hormon androgen. Hormon progesteron dalam jumlah fisiologik tidak mempunyai efektivitas terhadap aktivitas kelenjar sebacea, akan tetapi terkadang progesteron dapat

menyebabkan akne sebelum menstruasi. Pada wanita, 60-70% menjadi lebih parah beberapa hari sebelum menstruasi dan menetap sampai seminggu menstruasi.

5) Diet

Jenis makanan yang sering dihubungkan dengan timbulnya akne adalah makanan yang tinggi lemak (kacang, daging berlemak, susu, es krim), makanan tinggi karbohidrat (sirup manis), makanan yang beryodida tinggi (makanan asal laut) dan pedas. Pola makanan yang tinggi lemak jenuh dan tinggi glukosa susu dapat meningkatkan konsentrasi *insulin-like growth factor* (IGF-I) yang dapat merangsang produksi hormon androgen yang meningkatkan produksi jerawat.

6) Psikis

Stres psikis dapat menyebabkan sekresi ACTH yang akan meningkatkan produksi androgen. Naiknya hormone androgen inilah yang menyebabkan kelenjar sebacea bertambah besar dan produksi sebum bertambah.

7) Iklim

Pada daerah yang mempunyai empat musim biasanya akne akan bertambah hebat pada musim dingin dan sebaliknya membaik pada musim panas. Hal ini disebabkan karena sinar ultraviolet (UV) yang mempunyai efek membunuh bakteri dapat menembus epidermis bagian bawah dan dermis bagian atas yang berpengaruh pada bakteri yang berada dibagian dalam kelenjar sebacea.

8) Kosmetika

Pemakaian bahan-bahan kosmetika tertentu, secara terus menerus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan suatu bentuk akne ringan yang terutama terdiri dari komedo tertutup dan beberapa lesi papulopustula pada pipi dan dagu. Bahan yang sering menyebabkan akne bisa terdapat pada berbagai krem wajah seperti bedak dasar (foundation), pelembab (moisturiser), tabir surya (sunscreen) dan krem malam.

9) Trauma Kulit Berulang

Menggosok dengan cairan pembersih wajah, scrub atau penggunaan pakaian ketat misalnya tali bra, helm, kerah ketat dapat memperburuk jerawat.

10) Merokok

Rokok dapat mempengaruhi kondisi kulit seseorang sehingga menimbulkan acne yang dikenal dengan “smoking acne”. Berdasarkan penelitian sekitar 42% perokok menderita akne vulgaris. Partisipasi non-perokok yang memiliki akne vulgaris tidak meradang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti sering terkena uap atau terus menerus terpapar asap rokok.

4. Gejala dan Tanda

Penderita biasanya mengeluh adanya erupsi kulit pada tempat-tempat predileksi, yaitu dimuka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas, dan lengan bagian atas. Dapat disertai rasa gatal. Erupsi kulit berupa komedo, papul, pustul, nodus, atau kista. Komedo lazim dikenal sebagai kepala hitam (komedo terbuka) dan kepala putih (komedo tertutup). Isi komedo ialah sebum yang kental atau padat. Isi kista biasanya pus dan darah. Selain itu bias terlihat nodulus, infiltrasi granulomasta dalam peradangan karena asam lemak atau piokokus, jaringan parut dan keloid (Strauss, 1991).

1) Komedo

Komedo adalah tanda awal dari akne. Sering muncul 1-2 tahun sebelum pubertas. Komedogenic adalah proses deskuamasi korneosit folikel dalam duktus folikel sebacea mengakibatkan terbentuknya mikrokomedo (mikroskopik komedo) yang merupakan inti dari patogenesis akne. Mikrokomedo berkembang menjadi lesi non inflamasi yaitu komedo terbuka dan komedo tertutup atau dapat juga berkembang menjadi lesi inflamasi

a) Komedo terbuka

Disebut juga *blackhead* secara klinis dijumpai lesi berwarna hitam berdiameter 0,1-3 mm, biasanya berkembang waktu beberapa minggu. Puncak komedo berwarna hitam disebabkan permukaan lemaknya mengalami oksidasi dan akibat pengaruh melamin.

b) Komedo tertutup

Disebut juga *whitehead* secara klinis dijumpai lesinya kecil dan jelas berdiameter 0,1-3 mm, komedo jenis ini disebabkan oleh sel sel kulit mati dan kelenjar minyak yang berlebihan pada kulit. Secara berkala pada kulit terjadi penumpukan sel-sel kulit mati, minyak dipermukaan kulit kemudian menutup sel-sel kulit dan terjadilah sumbatan.

2) Jerawat Biasa

Jerawat jenis ini mudah dikenal, tonjolan kecil berwarna pink atau kemerahan. Terjadi karena terinfeksi dengan bakteri. Bakteri ini terdapat dipermukaan kulit, dapat juga dari *waslap*, kuas *make up*, jari tangan juga telepon. *Stres*, hormon dan udara lembab dapat memperbesar kemungkinan infeksi jerawat karena kulit memproduksi minyak yang merupakan perkembangbiakannya bakteri berkumpul pada salah satu bagian muka.

a) Papula

Penonjolan padat diatas permukaan kulit akibat reaksi radang, terbatas tegas dan berukuran diameter <5 mm. Papul superfisial sembuh dalam 5-10 hari dengan sedikit jaringan parut tetapi dapat terjadi hiperpigmentasi pasca inflamasi terutama remaja dengan kulit yang berwarna gelap. Papul yang lebih dalam penyembuhannya memerlukan waktu yang lebih lama dan dapat meninggalkan jaringan parut.

b) Pustula

Pustul akne vulgaris merupakan papul dengan puncak berupa pus. Letak pustula bisa dalam ataupun superfisial. Pustula lebih jarang dijumpai dibandingkan papula dan pustula yang dalam sering dijumpai pada *acne vulgaris* yang parah.

c) Nodul

Nodul pada *acne vulgaris* merupakan lesi radang dengan diameter 1 cm atau lebih, disertai dengan nyeri.

3) *Cystic Acne*/jerawat Kista (jerawat batu)

Acne yang besar dengan tonjolan-tonjolan yang meradang hebat, berkumpul diseluruh muka. Penonjolan diatas permukaan kulit berupa kantong yang berisi cairan serosa atau setengah padat atau padat. Kista jarang terjadi, bila terbentuk berdiameter bisa mencapai beberapa sentimeter. Jika diaspirasi dengan jarum besar akan didapati material kental berupa krem berwarna kuning. Lesi dapat menyatu menyebabkan terbentuknya sinus, terjadi nekrosis dan peradangan granulomatous. Keadaan ini sering disebut akne konglobata. Penderita ini biasanya juga memiliki keluarga dekat yang juga menderita akne yang serupa (Zaenglein, 2008).

C. Uraian Mikroba Uji

1. *Propionibacterium acne*

a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Actinobacteria
Kelas	: Actinobacteridae
Bangsa	: Actinomycetales
Famili	: Propionibacteriaceae
Genus	: Propionibacterium

Spesies : *Propionibacterium acne* (Jawetz *et. al*, 2005)

b. Sifat dan Morfologi

Propionibacterium acnes termasuk bakteri gram positif yang paling umum tidak berspora, tangkai anaerob, ditemukan dalam spesimen-spesimen klinis *Propionibacterium acnes* pada umumnya tumbuh sebagai anaerob obligat, berbentuk gada atau lancip dengan pewarnaan yang tidak rata dan bermanik-manik dan kadang-kadang berbentuk *coccus* atau bulat (Galuh, 2009).

Spesies *Propionibacterium acnes* adalah anggota flora normal yang terdapat pada kulit dan menyebabkan penyakit kulit ketika mereka menginfeksi kulit. Hasil metabolinya termasuk asam propionat, dimana genusnya diturunkan. Pada metode pewarnaan gram, mereka sangat pleomorfik, berbentuk kurva batang atau titik dan terkadang berbentuk bulat. *Acne vulgaris* turut berperan dalam terbentuknya jerawat. Karena bagian dari flora normal pada kulit, terkadang mengkon *Propionibacterium acnes* taminasi darah ataupun kultur cairan *cerebrospinal* yang didapat dengan menembus kulit. Oleh karena itu, penting untuk membedakan kultur yang terkontaminasi dari yang positif dan mengindikasikan adanya infeksi (Jawetz *et. al*, 2001). Dibandingkan dengan penggunaan bahan sintetik.

2. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales
 Suku : Staphylococcaceae
 Marga : Staphylococcus

Spesies : *Staphylococcus aureus* (Syahrurachman, 1994)

b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif anggota famili *Micrococcaceae* berbentuk bulat, bergerombol, seperti susunan buah anggur koloni berwarna abu-abu hingga kuning tua, koagulase positif dan sifatnya sebagai bakteri komensal dalam tubuh manusia yang jumlahnya berimbang dengan flora normal lain. *Staphylococcus aureus* pada manusia di antaranya ditemukan pada hidung, kulit, tenggorokan, dan lain-lain (Syahrurachman, 1994). Bakteri ini dapat menyebabkan bermacam-macam infeksi, seperti pneumonia, meningitis, empiema, endokarditis, jerawat, pioderma, atau impetigo (Brook, 2005).

3. *Staphylococcus epidermidis*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales
 Suku : Staphylococcaceae
 Marga : Staphylococcus
 Spesies : *Staphylococcus epidermidis* (Syahrurachman, 1994)

b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri yang sering ditemukan sebagai flora normal pada kulit dan selaput lendir manusia. *Staphylococcus epidermidis* merupakan salah satu bakteri gram positif berbentuk bulat, biasanya tersusun dalam rangkaian tidak beraturan, seperti anggur dan bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini merupakan penyebab infeksi kulit ringan yang disertai abses (Syahrurachman, 1994).

Bakteri ini juga berperan dalam pelepasan asam oleat, hasil hidrolisisnya oleh lipase yang diduga berpengaruh terhadap perkembangan jerawat (Saising *et al.*, 2008).

D. Kulit

Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, selain peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan infeksi dari luar. Kulit merupakan kelenjar holokrin yang besar (Tranggono, 2007).

a. Fungsi kulit secara umum (Galuh, 2009) :

1) Fungsi proteksi

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

2) Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak.

3) Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan ammonia.

4) Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan Krause. Rabaan diperankan oleh taktil meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badan *vates paccini*.

5) Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot kontraksi) pembuluh darah kulit.


6) Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi syaraf.

7) Fungsi kreatinasi

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu keratinosit, sel Langerhans dan melanosit.

b. Anatomi fisiologi kulit



Gambar 1. Struktur kulit (Morton, 2005)

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan yaitu :

- 1) Lapisan epidermis atau kutikula (Tranggono, 2007) :

Bagian-bagian epidermis dapat dilihat dengan mikroskop yaitu terdiri dari:

- a) Stratum korneum (Lapisan tanduk), selnya tipis, datar seperti sisik dan terus menerus dilepaskan.
- b) Stratum lucidum (Lapisan jernih), selnya mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intnya.
- c) Stratum granulosum (Lapisan berbutir-butir), selapis sel yang jelas tampak berisi dan juga granulosum.
- d) Stratum spinosum (apisan malphigi), yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel yang satu dengan yang lainnya di dalam lapisan ini, sehingga sel seakan-akan buerduri.
- e) Stratum germinativum (Lapisan basal), yaitu sel yang terus menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini disusun dengan teratur, berderet dengan rapat dan membentuk lapisan pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang duduk di atas papiladermis.

2) Lapisan dermis

Korium atau dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastic. Pada permukaan dermis tersusun papil-papil kecil yang berisi rantingranting pembuluh darah kapiler. Ujung akhir syaraf sensorik yaitu putting peraba yang terletak di dalam dermis.

3) Lapisan subkutis

Lapisan subkutis terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel membentuk kelompok yang satu dengan yang lainnya oleh trabecular fibrosa.

c. Absorpsi perkutan

Kulit karena impermeabilitasnya dapat dilewati oleh sejumlah senyawa kimia dalam jumlah sedikit. Bila suatu system obat digunakan secara topikal, maka obat akan keluar dari pembawanya dan berdifusi ke permukaan jaringan kulit. Obat dapat berdifusi ke jaringan kulit melalui daerah kantung rambut, melalui kelenjar keringat atau di antara kelenjar keringat dan kantung rambut.

Ada 4 jenis kulit wajah, yakni kulit kering, berminyak, normal dan kombinasi:

a. Kulit kering

Pada jenis kulit kering, kelenjar sebacea dan keringat hanya dalam jumlah sedikit. Jenis kulit kering mempunyai ciri-ciri penampakan kulit terlihat kusam.

b. Kulit berminyak

Pada jenis kulit berminya, kelenjar sebacea dan keringat terdapat dalam jumlah banyak. Jenis kulit berminyak mempunyai ciri kulit wajah mudah berjerawat

c. Kulit normal

Pada jenis kulit normal, jumlah sebacea dan keringat terlalu banyak karena tersebar secara merata. Ciri-ciri kulit normal yaitu kulit tampak lembut, cerah dan jarang mengalami masalah.

d. Kulit kombinasi

Pada jenis kulit kombinasi, penyebaran kelenjar sebacea dan keringat tidak merata. Jenis kulit kombinasi mempunyai ciri kulit dahi, hidung dan dagu tampak mengkilap, berjerawat, tetapi kulit dibagian pipi tampak lembut (Tranggono, 2007).

E. Sediaan Gel

1. Definisi Gel

Gel didefinisikan sebagai sistem setengah padat yang terdiri dari suatu disperse yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan (Ansel, 1989).

Idealnya pemilihan bahan pembentukan gel (*gelling agent*) pada sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan *gelling agent* dalam gel perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka pada derajat microbial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan microbial (Liebierman, 1996).

Sifat/Karakteristik Gel (Lachman, 2007):

- a. Zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi dan kosmetik ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lain.
- b. Pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan tapi dapat rusak segera ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan tube, atau selama penggunaan topikal.
- c. Karakteristik gel harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan.
- d. Penggunaan bahan pembentuk gel yang konsentrasinya sangat tinggi atau BM besar dapat menghasilkan gel yang sulit untuk dikeluarkan atau digunakan.
- e. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Contoh polimer

seperti MC, HPMC dapat terlarut hanya pada air yang dingin yang akan membentuk larutan yang kental dan pada peningkatan suhu larutan tersebut akan membentuk gel.

f. Fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut thermogelation.

Gel memiliki sifat yang khas :

a. Dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan yang menyebabkan terjadinya penambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi diantara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Pengembangan gel kurang sempurna jika terjadi ikatan silang antara polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang.

b. Sineresis, yaitu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjebak akan keluar dan akan berada di atas permukaan gel. Pada saat pembentukan gel terjadi tekanan yang elastis sehingga terbentuk massa gel yang tegar. Mekanisme terjadinya kontraksi berhubungan dengan fase relaksasi akibat adanya tekanan elastis pada saat terbentuknya gel. Adanya perubahan pada ketegaran sel akan mengakibatkan karakter antar matriks berubah, sehingga memungkinkan cairan bergerak menuju permukaan, sineresis dapat terjadi pada hydrogel maupun organogel.

c. Bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan atau deformasi dan mempunyai aliran viskoelastik. Struktur gel dapat bermacam-macam tergantung dari komponen pembentuk gel (Lieberman, 1997).

2. Basis Gel

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan gel hidrofilik (Ansel, 1989).

a. Basis gel hidrofobik

Basis hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus (Ansel, 1989).

Basis gel hidrofobik antara lain petrolatum, *mineral oil*/gel polyethilen, plastibase, aluminium stearat, carbowax.

b. Basis Gel Hidrofilik

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik, system koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 1989). Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voigt, 1995).

Gel dapat membengkak, absorpsi cairan dalam suatu peningkatan volume. Ini dapat dilihat sebagai tahap awal disolusi. *Solvent* berpenetrasi ke dalam matriks gel dengan demikian interaksi gel dengan bahan pelarut (Lieberman, 1996).

Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. Pertama, harus mampu meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua melindungi dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan gliserol, sorbitol, etilenglikol dan propilenglikol dalam konsentrasi 10-20% (Voigt, 1995).

Disebabkan oleh tingginya kandungan air, sediaan ini dapat mengalami kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari dengan penambahan

bahan pengawet. Untuk upaya stabilisasi dari segi microbial disamping penggunaan bahan-bahan pengawet seperti dalam balsam, khususnya untuk basis ini sangat cocok pemakaian metil dan propilparaben yang umumnya disatukan dalam bentuk larutan pengawet. Upaya lain yang diperlukan adalah perlindungan terhadap penguapan, untuk menghindari mengeringnya. Oleh karena itu untuk menyimpannya lebih baik menggunakan *tube*. Pengisian ke dalam botol, meskipun telah tertutup baik tetap tidak menjamin perlindungan yang memuaskan (Voigt, 1995).

Keuntungan gel hidrofilik antara lain : daya sebar pada kulit baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologi kulit khususnya *respirasio sensibilis* oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Ansel, 1989).

Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel-gel farmasetik meliputi gom alam *tragacanth*, *pectin*, *carrageen*, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintesis dan semi sintesis seperti metilselulosa, hidrosimetilselulosa, karboksimetilselulosa, dan karbopol yang merupakan polimer vinil sintesis dengan gugus karboksil yang terionisasi. Gel dibuat dengan proses peleburan, atau diperlukan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat mengembang dari gel (Lachman, 1994).

a. Gom alam

Gom yang digunakan sebagai pembentuk gel dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengancara disperse sederhana dalam air (missal tragakan) atau melalui cara interaksi kimia (missal natrium alginat dan kalsium). Secara keseluruhannya, keberadaan gel disebabkan karena ikatan sambung silang yang mengikat molekul

polisakarida sesamanya, sedangkan sisanya tersolvasi. Beberapa gom alam yang digunakan sebagai pembentuk gel antara lain : alginat, karagen, tragakan, pectin, gom xantan, dan gelatin (Agoes & Darijanto, 1993).

b. Carbomer

Carbomer membentuk gel pada konsentrasi 0,5%. Dalam media air, yang diperdagangkan dalam bentuk asam, pertama-tama didispersikan terlebih dahulu. Sesudah udara terperangkap keluar sempurna, gel akan terbentuk dengan cara netralisasi dengan basa yang sesuai. Pemasukan muatan negative sepanjang rantai polimer menyebabkan kumparan lepas dan berekspansi (Agoes & Darijanto, 1993).

c. Turunan selulosa

Turunan selulosa mudah terurai karena reaksi enzimatik dan karena itu harus terlindung dari kontak dengan enzim. Sterilisasi dari system dalam air atau penambahan pengawet merupakan cara yang lazim untuk mencegah penurunan viskositas yang disebabkan karena terjadi depolimerisasi akibat pengaruh enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Turunan selulosa yang dapat digunakan untuk membentuk gel adalah metilselulosa, NaCMC, hidroksietil selulosa dan hidroksiprol selulosa (larut dalam cairan polar organik) (Agoes & Darijanto, 1993).

F. Komposisi sediaan

a. Basis gel

1) Karbopol 940

Karbopol adalah polimer asam akrilat yang berupa hasil silang dengan salah satu *allyl* eter dari pentaeritriol. Karbopol digunakan dalam sediaan cair dan semisolid sebagai *rheology modifiers*, termasuk krim, gel, lotion, dan salep yang digunakan untuk sediaan mata, rektal, topikal, dan vaginal. Karbopol berwarna putih,

halus seperti benang, asam dan higroskopik yang sedikit berbau. Konsentrasi karbopol sebagai bahan pembentuk gel 0,5% - 2,0% (Rowe, 2009).

Karbool 940 memiliki viskositas antara 40.000 – 60.000 (cP) digunakan sebagai bahan pengental yang baik, viskositasnya tinggi, menghasilkan gel yang bening (Lachman, 1989).

Karbopol yang paling baik digunakan sebagai pembentuk gel adalah karbopol 934 dan 940. Mereka memiliki viskositas yang paling baik. Karbopol 934 dapat memberikan hydrogel yang transparan. Sementara karbopol 940 menghasilkan sistem hidroalkohol yang lebih transparan (Voigt, 1995).

2) Natrium Karboksi Metil Selulosa

Natrium Karboksi Metil Selulosa (NaCMC) merupakan jenis pengikat golongan selulosa, umumnya digunakan pada sediaan oral dan topikal sebagai peningkat viskositas. NaCMC juga dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet dan penstabil emulsi. Konsentrasi tinggi biasanya 3-6% digunakan sebagai pembawa pasta dan gel. Pemerian NaCMC yaitu berupa serbuk atau granul, putih sampai krem, higroskopik, mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal, tidak larut dalam etanol, dalam eter dan dalam pelarut organik lain (Kibbe, 2000).

Natrium karboksimetilselulosa (NaCMC) merupakan garam natrium dari asam selulosa glikol dan dengan demikian berkarakter ionik. NaCMC bisa larut baik dalam air dingin maupun air panas. Larutan dalam airnya stabil terhadap suhu dan tetap stabil dalam waktu lama pada suhu 100°C, tanpa mengalami koagulasi (Voigt, 1994).

3) Hidroksi Propil Metil Selulosa

Hidroksi propil metil selulosa (HPMC K4M) merupakan turunan dari metilselulosa yang memiliki ciri-ciri serbuk atau butiran putih, tidak memiliki bau dan rasa. Sangat

sukar larut dalam eter, etanol atau aseton. Dapat mudah larut dalam air panas dan akan segera menggumpal dan membentuk koloid. Konsentrasi sebagai gelling agent dalam sediaan topikal yaitu 2-10% (Rogers, 2009).

HPMC K4M digunakan sebagai agen pengemulsi, agen pensuspensi, dan sebagai agen penstabil pada sediaan topikal seperti gel dan salep. Sebagai koloid pelindung yaitu dapat mencegah tetesan air dan partikel dari penggabungan atau aglomerasi, sehingga menghambat pembentukan sedimen (Rowe, 2009).

b. Bahan tambahan

1) Gliserin

Gliserin digunakan pada formulasi sediaan topikal dan kosmetik, yang umumnya sebagai humektan dan emolien. Gliserin juga digunakan pada sediaan gel yang encer maupun tidak. Gliserin mempunyai rumus molekul $C_3H_8O_3$ dengan berat molekul 92,09, konsentrasi gliserin sebagai humektan adalah sekitar 30% (Rowe, 2009).

Gliserin digunakan dalam oral, optalmik, dan parenteral. Juga digunakan dalam kosmetik dan tambahan makanan. Pada sediaan farmasi berfungsi sebagai humektan serta sebagai pelembut pada sediaan obat kulit serta menjaga kelembaban kulit dalam periode waktu tertentu (Kibbe, 2000). Sebagai penahan lembab dapat digunakan gliserol, sorbitol, etilenglikol, dan 1,2-propilenglikol dalam konsentrasi 10-20% (Voigt, 1995).

2) Trietanolamin

Gel umumnya merupakan suatu sediaan semipadat yang jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut. Karbomer 940 akan mengembang jika didispersikan dalam air dengan adanya zat-zat alkali seperti

trietanolamin atau diisopropinolamin untuk membentuk sediaan semi padat (Lachman, 2007).

Senyawa ini tidak berwarna atau kuning pucat, kental dan sedikit berasa ammonia, trietanolamin (TEA) mempunyai rumus molekul $C_6H_{15}O_3$ dengan berat molekul yaitu 149,19. Umumnya digunakan pada formulasi sediaan topikal sebagai bahan pemberi basa (Rowe, 2009).

3) Metil paraben

Seperti yang telah diketahui bahwa gel memiliki kandungan air yang banyak. Sehingga dibutuhkan penambahan pengawet untuk mencegah terjadinya kontaminasi pembusukan bacterial. Pengawet yang paling tepat adalah penggunaan metil paraben 0,075% dan propil paraben 0,025% (Voigt, 1995).

Rumus molekulnya $C_8H_8O_3$ dengan berat molekul 152,15, serbuk Kristal tidak berwarna, hamper atau tidak berbau dan rasa agak membakar. Metil paraben digunakan sebagai pengawet antimikroba pada sediaan kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetika. Biasa digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan paraben lainnya. Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet pada sediaan topikal 0,02% - 0,3% (Rowe, 2009).

G. Uji Stabilitas Gel

Uji stabilitas dimaksudkan untuk menjamin kualitas produk yang akan diluluskan dan beredar dipasaran. Dengan uji stabilitas dapat diketahui pengaruh factor lingkungan seperti suhu dan kelembaban terhadap parameter-parameter stabilitas produk seperti kadar zat aktif, pH, berat jenis dan net volume, sehingga dapat ditetapkan tanggal kadaluarsa yang sebenarnya berdasarkan durasinya (Gennaro, 1990).

Stabilitas produk-wadah termasuk semua interaksi yang mungkin terjadi antara produk dari wadah misalnya absorpsi konstituen wadah oleh produk, korosi atau efek buruk lain dari wadah produk dan sifat barier wadah (Djajadisastra, 2009). Jenis stabilitas yang umum dikenal adalah stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi dan toksikologi.

1. Stabilitas kimia adalah kemampuan suatu sediaan untuk mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam bahasa spesifikasi.
2. Stabilitas fisika adalah kemampuan suatu sediaan untuk mempertahankan pemerian, rasa, keseragaman, kelarutan dan sifat fisika lainnya.
3. Stabilitas mikrobiologi adalah sterilisasi atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan.
4. Stabilitas terapi adalah kemampuan suatu sediaan untuk menghasilkan efek terapi yang tidak berubah selama waktu simpan (*shelf life*) sediaan.
5. Stabilitas toksikologi adalah mengacu pada tidak terjadinya peningkatan toksisitas yang bermakna selama waktu simpan (Djajadisastra, 2009)

Tujuan pemeriksaankestabilan obat adalah untuk menjamin bahwa setiap bahan obat yang didistribusikan tetap memnuhi persyaratan yang ditetapkan meskipun sudah cukup lama dalam penyimpanan. Pemeriksaan kestabilan digunakan sebagai dasar penentuan batas kadaluarsa dan car-cara penyimpanan yang perlu dicantumkan dalam label. Ketidakstabilan formulasi dapat dilihat dari perubahan penampilan fisik, warna, rasa, dan tekstur dari formulasi tersebut (Lachman, 1994).

Uji stabilitas dibagi 2 yaitu :

- a. Uji stabilitas jangka pendek (dipercepat)

Uji stabilitas jangka pendek dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim $40^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$. Interval pengujian dilakukan pada bulan ke tiga dan keenam.

Pemeriksaan stabilitas fisik sediaan gel dilakukan dengan metode *stress condition* yakni menyimpan sediaan pada periode waktu (24 jam persiklus) tertentu dengan perbedaan suhu yang ekstrim (5°C dan 35°C). Pengujian dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan 10 siklus. Sediaan diuji terhadap terjadinya perubahan organoleptis, viskositas, pH, homogenitas, dan daya sebar pada akhir 10 siklus.

b. Uji stabilitas jangka panjang

Uji stabilitas jangka panjang dilakukan sampai pada waktu kadaluarsa produk seperti tertera pada kemasan.

Pengujian dilakukan setiap 3 bulan sekali, pada tahun kedua, pada tahun ketiga dan seterusnya, pengujian dilakukan setahun sekali. Untuk uji stabilitas jangka panjang, sampel disimpan pada kondisi: ruangan dengan suhu $30^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$ untuk menyimpan produk-produk dan iklim penyimpanan pada suhu sejuk ruangan untuk uji stabilitas dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

- 1) Suhu ruangan $40^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$
- 2) Suhu ruangan $30^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 75\% \pm 5\%$
- 3) Suhu ruangan $20^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } 40\% \pm 5\%$
- 4) Suhu ruangan $40^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ dan $\text{Rh } \leq 35\%$

Salah satu cara mempercepat evaluasi kestabilan adalah dengan penyimpanan selama beberapa periode waktu pada suhu yang lebih tinggi dari normal (Gennaro, 1990).

Adapun beberapa pengujian stabilitas fisik gel meliputi :

a. Pengujian organoleptik

Pengamatan dilihat secara langsung bentuk, warna, dan bau dari gel yang dibuat. Gel biasanya jernih dengan konsistensi setengah padat (Ansel, 1989).

b. Pengujian Homogenitas

Pengujian homogenitas dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar (Ditjen POM, 1985).

c. Viskositas

Pengujian viskositas ini dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana viskositas tersebut menyatakan besar tahanan suatu viskositas untuk mengalir, semakin tinggi viskositas maka semakin besar pula tahanannya (Martin, 1971). Pengukuran viskositas dilakukan terhadap sediaan gel dengan menggunakan viskometer *Brookfield*. Hal ini dilakukan dengan cara mencelupkan spindle ke dalam sediaan gel kemudian dilihat viskositasnya (Voigt, 1995).

d. Pengujian pH

Penentuan pH sediaan dilakukan dengan menggunakan stik pH universal yang dicelupkan ke dalam sampel gel yang telah diencerkan. Setelah tercelup dengan sempurna, pH universal tersebut dilihat perubahan warnanya dan dicocokkan dengan standar pH universal. pH universal gel harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5 – 6,5 (Tranggono, 2007).

e. Pengujian daya sebar

Sebanyak 0,5 gram sampel gel diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm, kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar gel diukur. Setelah itu ditambahkan 125 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Daya sebar 5-7 cm menunjukkan

konsistensi semisolid yang sangat nyaman dalam penggunaan (Garg *et al.*, 2002) (Astuti *et al.*, 2010).

H. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Ditjen POM, 1995). Sementara ekstraksi adalah suatu proses penyarian senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam atau berasal dari dalam sel dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat.

Pada prinsipnya, ekstraksi adalah melarutkan dan menarik senyawa dengan menggunakan pelarut yang tepat. Ada tiga tahapan proses pada waktu ekstraksi yaitu :

1. Penetrasi pelarut ke dalam sel tanaman dan pengembangan sel
2. Disolusi pelarut ke dalam sel tanaman dan pengembangan sel
3. Difusi bahan yang terekstrasi ke luar sel

Proses di atas diharapkan terjadinya kesetimbangan antara pelarut dan pelarut. Kecepatan untuk mencapai kesetimbangan umumnya tergantung pada suhu, pH, ukuran partikel dan gerakan partikel. Prinsip yang utama adalah yang berkaitan dengan kelarutan, yaitu senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar akan mudah larut dalam pelarut nonpolar.

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi :

- a. cara dingin

1) Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature ruangan (kamar).

2) Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (*exhaustive extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperature ruangan. Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Proses perkolasi terdiri dari tahapan pengembang bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

b. Cara panas

1) Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatu titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relative konstan dengan adanya pendingin balik.

2) *Soxhlet* adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relative konstan dengan adanya pendingin balik.

3) Digesti adalah maserasi kinetic (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperature ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada temperature 40-50°C.

4) Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperature terukur 96-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5) Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperature sampai titik didih air, yakni 30 menit pada suhu 90-100°C.

I. Metode Pengujian Antimikroba

1. Metode Difusi

a. Metode *Disc Diffusion*

Metode *disc diffusion* (tes Kirby dan Bauer) untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar (Pratiwi, 2008).

b. *E-Test*

Metode *E-test* digunakan untuk mengestimasi MIC (*minimum inhibitory concentration*) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Pratiwi, 2008).

c. *Ditch-Plate Technique*

Pada uji ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba (Pratiwi, 2008).

d. *Cup-Plate Technique*

Metode ini serupa dengan metode *disc diffusion*, dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji (Pratiwi, 2008).

e. *Gradient-Plate Technique*

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media agar dicairkan dengan larutan uji

ditambahkan. Campuran kemudian dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya di atasnya (Pratiwi, 2008).

2. Metode Dilusi

a. Metode Dilusi Cair

Metode dilusi cair/*broth dilution test (serial dilution)* mengukur MIC (*minimum inhibitory concentration* atau kadar bunuh minimum, KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi diteapkan sebagai KBM (Pratiwi, 2008).

b. Metode Dilusi Padat

Metode dilusi padat/*solid dilution test* serupa dengan metode dilusi cair, namun menggunakan media padat (*solid*). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Pratiwi, 2008).

J. Tinjauan Islam

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan

hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis dapat bermanfaat bagi kesehatan.

Pengobatan dengan mencari saripati tumbuh-tumbuhan yang ada sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuhan yang diciptakan Allah swt. Hingga saat ini banyak pengobatan herbal dan mencari tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utama pembuatan obat-obatan.

Allah swt berfirman dalam Q.S Asy Syu'ara' (26) : 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2009).

Dalam tafsir Al-Misbah (Shihab, 2002) kata *ila* pada ayat ini mengandung makna *batas akhir* yang berarti memperluas arah pandangan hingga batas akhir atau dengan kata lain, ayat ini mengarahkan manusia untuk memperluas pandangannya terhadap keajaiban yang terhampar dimuka bumi ini termasuk di dalamnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kata *karim* dalam ayat ini antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik pada setiap objek yang disifatinya, dalam hal ini yang dimaksud yaitu tumbuhan yang baik adalah yang subur dan bermanfaat.

Kemudian dalam QS Al – An’Aam (6) : 99, Allah swt berfirman :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا خَرَجَ مِنْهُ حَبًّا مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Kementerian Agama RI, 2009).

Ayat ini merupakan salah satu bukti dari kemahakuasaan Allah swt yang menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang *telah menurunkan air*, dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari *langit, lalu Kami* yakin Allah, *mengeluarkan*, yakni menumbuhkan *disebabkan olehnya*, yakni akibat turunnya air itu segala macam *tumbuh-tumbuhan*, maka *Kami keluarkan darinya*, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, *tanaman yang menghijau* (Shihab, 2002).

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab *al-Muntakhab fi at-Tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan.

Pada akhir ayat ini disebutkan: *perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya*. Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan (Botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya. Ayat ini ditutup dengan *liqaumin yu'minuun/bagi kaum yang beriman*, ia ditutup demikian sebagai isyarat

bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman (Shihab, 2002).

Dari ayat – ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan segala sesuatu dimuka bumi ini dengan tidak sia-sia. Semuanya memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Allah swt telah memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Seperti halnya tanaman pisang ambon muda yang menjadi tokoh utama dalam penelitian ini. Dalam surah Al-An'am ayat 99 di atas, Allah swt telah memerintahkan kita untuk memperhatikan segala sesuatu yang ada di bumi termasuk di dalamnya yaitu fase yang terjadi pada tumbuhan hingga tumbuhan tersebut menghasilkan buah, dan kita diperintahkan pula untuk memperhatikan buah tersebut hingga mencapai fase kematangan yang dimana semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah swt. Dalam penelitian ini bahan yang digunakan yaitu berupa kulit buah pisang ambon muda. Kulit pisang yang selama ini hanya dijadikan limbah oleh sebagian besar masyarakat ternyata memiliki beberapa macam keuntungan bagi manusia diantaranya mampu membunuh beberapa bakteri penyebab jerawat. Oleh sebab itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang pembuatan obat anti jerawat menggunakan kulit buah pisang ambon muda yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimentatif.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Farmasetik, laboratorium Kimia Analisis Farmasi, laboratorium Fitokimia, dan laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini berupa eksperimentatif yang dimaksudkan untuk mengetahui stabilitas sediaan gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) sebagai obat jerawat dengan menggunakan variasi pembentuk gel.

C. *Populasi dan Sampel*

Pada penelitian ini digunakan populasi dan sampel yaitu herba pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) yang diambil dari Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Herba yang digunakan adalah kulit buah pisang ambon muda.

D. *Instrument Penelitian*

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anak timbangan (*new prontial*[®]), cawan petri (*Iwaki pyrex*[®]), *Climatic chamber* (*E-Scientific Lab*[®]), desikator, gegep, gelas kimia (*Pyrex*[®]), gelas ukur (*Pyrex*[®]), inkubator (*Memmert*[®]),

Laminar Air Flow (Esco[®]), lumpang dan alu, *magnetic stirrer*, mangkok kaca, objek glass (*Slides[®]*), oven (*Memmert[®]*), penggaris (*Butterfly[®]*), pH meter (*ATC*), pinset, *rotary evaporator (Heidolph)*, tabung reaksi (*Pyrex[®]*), timbangan analitik (*Pesica[®]*), toples kaca, *viscometer Brookfield (DV-E Viscometer)*.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan yaitu aquadest, etanol 70%, kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*), medium NA, metil paraben, NaCMC, HPMC 4000, karbopol 940, TEA, gliserol.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Sampel

1. Pengolahan sampel

Sampel kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) sebanyak 20 kg diambil dalam kondisi yang masih segar dan mentah (tangkai putih masih menempel atau masih terdapat pada ujung buah). Kemudian buah mentah pisang ambon dicuci bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu kulit buah mentah pisang ambon dipisahkan dari isinya. Kulit buah pisang selanjutnya dirajang, dan dikeringkan dengan cara di masukkan ke dalam lemari pengering. Setelah kering siap untuk diekstraksi.

2. Ekstraksi sampel

Ekstraksi kulit buah pisang ambon muda menggunakan metode maserasi. Kulit buah pisang ambon mentah sebanyak 500 gram dimaserasi menggunakan pelarut etanol 70% sebanyak 3,5 liter. Ekstraksi dilakukan selama 3 x 24 jam, dimana tiap 1 x 24 jam dilakukan pengadukan. Kemudian disaring, setelah itu dipekatkan menggunakan *vacum rotary evaporator* pada suhu pemanasan 70°C sampai pelarut tidak menguap lagi dan diperoleh ekstrak kental etanol 70%.

Selanjutnya, ekstrak dibebaskan dengan cara, ekstrak kental etanol kulit buah mentah pisang ambon ditetesi dengan air sebanyak tiga tetes kemudian diuapkan di atas penangas air. Apabila kering berarti sudah bebas etanol (Zeiger, 1997).

3. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan sabun, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam dan alat plastik yang tidak tahan pemanasan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit, sedangkan jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar

4. Formula gel

a. Rancangan formula

Rancangan formula sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rancangan formula sediaan gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*).

Nama Bahan	Kegunaan	Konsentrasi		
		Formula I	Formula II	Formula III
Ekstrak kulit pisang	Zat aktif	3,2 %	3,2 %	3,2 %
NaCMC	Basis gel	3 %	-	-
HPMC 4000	Basis gel	-	2%	-
Karbopol 940	Basis gel	-	-	0,5 %
TEA	Pengalkali	-	1%	1 %
Metil Paraben	Pengawet	0,075 %	0,075 %	0,075 %

Gliserin	Pelembap	30 %	30 %	30 %
Air suling	Pelarut	ad 100 %	ad 100%	ad 100 %

b. Pembuatan sediaan gel

1. Pembuatan gel dengan basis karbopol 940

Gel dibuat dengan cara bahan ditimbang sesuai dengan tabel 1. Karbopol dikembangkan dengan air suling suhu 70°C, kemudian diaduk. Basis gel didiamkan hingga mengembang selama 24 jam. Kemudian ditambahkan TEA. Dilarutkan metil paraben dengan air panas suhu 90°C lalu masukkan ke dalam basis gel. Ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) dicampur dengan gliserin sampai homogen. Dimasukkan basis karbopol ke dalam larutan ekstrak sedikit demi sedikit, dihomogenkan. Ditambahkan sisa air suling sambil digerus hingga terbentuk gel homogen.

2. Pembuatan gel dengan basis NaCMC

Gel dibuat dengan cara bahan ditimbang sesuai dengan tabel 1. NaCMC dikembangkan dengan menggunakan air panas suhu 70°C di dalam lumping hingga terbentuk campuran yang homogen. Metil paraben dilarutkan dengan air panas suhu 90°C, kemudian dimasukkan ke dalam campuran NaCMC. Ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*) dicampur dengan gliserin sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam basis NaCMC sedikit demi sedikit diaduk hingga homogen. Ke dalam campuran tersebut, ditambahkan sisa air suling sambil digerus hingga terbentuk gel yang homogen.

3. Pembuatan gel dengan basis HPMC

Gel dibuat dengan cara bahan ditimbang sesuai dengan tabel 1. HPMC 4000 dikembangkan dengan air panas suhu 70°C kemudian diaduk dan dibiarkan selama 24 jam. Kemudian ditambahkan TEA. Dilarutkan metil paraben dengan air panas suhu 90°C, lalu dimasukkan ke dalam campuran HPMC. Ekstrak etanol kulit pisang

ambon dicampur dengan gliserin sampai tercampur rata. Kemudian dimasukkan ke dalam basis HPMC 4000. Ke dalam campuran tersebut, ditambahkan air sampai volume yang dikehendaki sambil digerus dengan menggunakan lumpang dan alu sampai terbentuk gel yang jernih.

b. Analisis Data

1. Uji stabilitas fisik sediaan gel

Pemeriksaan stabilitas fisik sediaan gel dilakukan dengan metode *stress condition* yakni menyimpan sediaan pada periode waktu (24 jam persiklus) tertentu dengan perbedaan suhu yang ekstrim (5°C dan 35°C). Pengujian dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan 10 siklus. Sediaan diuji terhadap terjadinya perubahan organoleptis, viskositas, pH, homogenitas, dan daya sebar pada akhir 10 siklus (Mursyid, 2012).

2. Uji karakteristik sediaan gel meliputi :

1) Uji organoleptik

Pengamatan organoleptik dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk, warna dan bau dari sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*).

2) pH

Pengukuran pH dilakukan dengan mencelupkan pH meter ke dalam sediaan gel yang telah dibuat.

3) Uji homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan cara sediaan gel dioleskan pada sekeping kaca. Kemudian ditutup dengan keping kaca lainnya, lalu diamati homogenitasnya. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar.

4) Uji daya sebar

Sebanyak 0,5 gram sampel gel diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm, kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar gel diukur. Setelah itu ditambahkan 125 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Daya sebar 5-7 cm menunjukkan konsistensi semisolid yang sangat nyaman dalam penggunaan

5) Uji viskositas

Pengukuran viskositas dilakukan terhadap sediaan gel dengan menggunakan viskometer *Brookfield* pada kecepatan 50 rpm dan menggunakan spindle nomor 05. Hal ini dilakukan dengan cara mencelupkan spindle ke dalam sediaan gel kemudian dilihat viskositasnya (Voigt, 1995).

3. Pengujian Daya Hambat Sediaan Gel Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)

Medium NA steril sebanyak 10 ml dicampur dengan 1 ml suspensi bakteri uji yang telah disiapkan. Setelah itu dituang secara aseptik ke dalam cawan petri dan dibiarkan hingga membeku. Dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme, setelah itu diberi formula gel yang telah dibuat tadi. Kemudian diinkubasikan pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam, lalu diukur diameter hambatnya.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang telah diperoleh dari setiap pengujian dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat dan membandingkan stabilitas fisik yang baik dari gel basis karbopol 940, HPMC, dan NaCMC pada sediaan gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) serta mengetahui aktivitas antibakterinya terhadap pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus epidermidis*,

dan *Staphylococcus aureus* menggunakan uji statistik *Paired T-Test* pada aplikasi SPSS versi 23.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Kulit Buah Mentah Pisang Ambon

Hasil ekstraksi Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) sebanyak 500 gram dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Rendamen ekstrak yang diperoleh dari maserasi

Sampel	Berat Sampel	Berat Ekstrak	%Rendamen
Kulit Buah Pisang Ambon Muda (<i>Musa paradisiaca</i> var <i>sapientum</i>)	500 gram	57,53 gram	11,51%

2. Hasil Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel

Uji stabilitas fisik sediaan gel terdiri dari pengamatan organoleptik yang meliputi warna, bau, dan bentuk, pemeriksaan pH, pemeriksaan homogenitas, pengujian daya sebar, serta penentuan viskositas. Dilakukan pada tiga formula gel dengan jenis basis yang berbeda, namun menggunakan ekstrak dengan konsentrasi yang sama yaitu sebesar 3,2 %. Formula F1 merupakan sediaan gel menggunakan basis NaCMC dengan konsentrasi 3%. Formula F2 merupakan sediaan gel menggunakan basis HPMC 4000 dengan konsentrasi 2%. Sedangkan formula F3 merupakan sediaan gel menggunakan basis Karbopol 940 dengan konsentrasi 0,5%.

a. Hasil Pengamatan Organoleptik

Tabel 3. Hasil Pengamatan Organoleptik Formula Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)

Formula Gel	Pengamatan					
	Sebelum Penyimpanan			Setelah Penyimpanan		
	Warna	Bau	Bentuk	Warna	Bau	Bentuk
F1	Coklat	Khas Ekstrak	Semi padat	Coklat	Khas Ekstrak	Semi padat
F2	Coklat	Khas Ekstrak	Semi padat	Coklat	Khas Ekstrak	Semi padat
F3	Coklat tua	Khas Ekstrak	Cair	Coklat tua	Khas Ekstrak	Cair

Ket :

F1 : Gel dengan basis NaCMC

F2 : Gel dengan basis HPMC

F3 : Gel dengan basis Karbopol

b. Hasil Pengukuran Nilai pH

Tabel 4. Hasil Pengukuran Nilai pH Formula Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).

Formula Gel	Pengukuran pH		Keterangan (nilai stabilitas ditunjukkan pada Tabel 11.)
	Sebelum Penyimpanan	Setelah Penyimpanan	
F1	6,65	6,26	Tidak stabil
F2	7,88	7,37	Tidak stabil
F3	8,20	8,03	Tidak stabil

c. Hasil Pengamatan Homogenitas

Tabel 5. Hasil Pengamatan Homogenitas Formula Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).

Formula Gel	Pengamatan	
	Sebelum Penyimpanan	Setelah Penyimpanan

F1	Homogen	Homogen
F2	Homogen	Homogen
F3	Homogen	Homogen

d. Hasil Pengujian Daya Sebar

Tabel 6. Hasil Pengujian Daya Sebar Formula Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).

Formula Gel	Daya Sebar (mm)		Keterangan (nilai stabilitas ditunjukkan pada Tabel 11.)
	Sebelum Penyimpanan	Setelah Penyimpanan	
F1	33,33	35,67	Tidak stabil
F2	49,33	52,67	Stabil
F3	82,33	86	Tidak stabil

e. Hasil Pengukuran Viskositas

Tabel 7. Hasil Pengukuran Viskositas Formula Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).

Formula Gel	Viskositas (cP)		Keterangan (nilai stabilitas ditunjukkan pada Tabel 11.)
	Sebelum Penyimpanan	Setelah Penyimpanan	
F1	6557,33	6085	Tidak stabil
F2	4237	4085	Stabil
F3	3570	3390,67	Stabil

3. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel

Tabel 8. Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)

Formula Gel	Bakteri Uji	Daya Hambat Bakteri (mm)	
		Sebelum penyimpanan	Setelah penyimpanan
I	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	12,33	11,33
	<i>Propionibacterium acne</i>	15	14,67
	<i>Staphylococcus aureus</i>	13,33	12,67
II	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	15	14,33
	<i>Propionibacterium acne</i>	16	15,67
	<i>Staphylococcus aureus</i>	13,67	12,67
III	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	15	13,67
	<i>Propionibacterium acne</i>	12,67	12,33
	<i>Staphylococcus aureus</i>	11,67	10,67

B. Pembahasan

Kulit pisang merupakan sumber yang kaya akan zat pati (3%), protein (6-9%), lemak (3.8-11%), serat (43.2-47.9%), *polyunsaturated fatty acid*, asam linoleat, asam α -linoleat, pektin, dan asam amino esensial seperti *leucine*, *valine phenylalanine*, dan *threonine* (Mohapatra dkk, 2010). Kulit pisang yang belum matang mengandung glikosida, flavanoid (*leucocyanidin*), tannin, saponin, dan steroid. Akan tetapi, pada kulit pisang yang sudah matang, kulit pisang tidak mengandung flavanoid dan tannin (Akpuaka dan Ezem, 2011).

Dalam penelitian ini digunakan sampel kulit buah pisang ambon yang diperoleh di Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Kulit buah pisang ambon yang diambil yaitu kulit buah yang masih muda (tangkai putik masih menempel atau masih terdapat pada ujung buah).

Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi, dimana sebanyak 500 gram simplisia kulit buah pisang ambon muda dilarutkan dengan 3,5 liter pelarut etanol 70% guna menyari dan menarik senyawa kimia yang terkandung dalam sampel. Etanol 70% lebih dipilih dibandingkan dengan etanol 96 karena menurut Arifianti (2014) bahwa etanol 70% paling sesuai untuk bahan baku yang berupa batang, kulit, akar atau bagian berkayu dari tanaman. Etanol juga memiliki sifat yang dapat melarutkan seluruh bahan aktif yang terkandung dalam bahan alami, baik bahan aktif yang bersifat polar, semi polar, dan non polar (Tiwari dkk, 2011). Maserasi dilakukan selama 3 x 24 jam untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Maserat yang diperoleh dari proses maserasi kemudian dipekatkan menggunakan alat *vaccum rotary evaporator* hingga diperoleh ekstrak kental. Setelah itu sampel dibebaskan etanol dengan cara ditetesi dengan beberapa tetes aquadest lalu diuapkan di atas penangas air. Berdasarkan Tabel 2. Hasil ekstraksi kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) diperoleh ekstrak kental sebanyak 57,53 gram dengan persen rendamen sebesar 11,51%. Rendamen merupakan perbandingan jumlah (kuantitas) ekstrak dari hasil ekstraksi suatu tumbuhan, dimana satuan yang digunakan adalah persen (%). Menurut Armando (2009), semakin tinggi nilai rendamen menunjukkan bahwa semakin besar hasil ekstrak yang diperoleh.

Setelah diperoleh ekstrak kental kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*), selanjutnya masuk pada tahap pembuatan gel. Pertama-tama dibuat basis gel HPMC 4000, NaCMC, dan Karbopol 940. Untuk basis HPMC 4000 dan Karbopol 940 dibuat dengan cara ditimbang masing-masing sesuai perhitungan yang tercantum pada tabel.1. kemudian didispersikan ke dalam aquadest pada suhu 70°C sebanyak 20 x berat masing-masing basis, setelah itu didiamkan selama 1 x 24 jam. Sedangkan untuk basis NaCMC harus dibuat segar dalam hal ini

tidak perlu didiamkan selama 24 jam. Setelah semua basis gel sudah jadi, untuk basis HPMC 4000 dan Karbopol 940 ditambahkan TEA tetes demi tetes sesuai dengan perhitungan. Ditambahkan metil paraben yang telah dilarutkan dengan air panas sambil digerus sampai terbentuk massa gel. Kemudian dicampur ekstrak dengan gliserin sampai homogen, lalu dimasukkan ke dalam lumpang yang berisi basis sambil terus digerus hingga homogen. Terakhir, ditambahkan aquadest hingga mencapai bobot yang dibutuhkan.

Proses pembuatan sediaan yang ditujukan sebagai obat jerawat dari ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) ini telah dipilih sebagai sediaan dalam bentuk gel.

Pada prinsipnya bahan pembawa dalam sediaan farmasi disyaratkan untuk tidak mempengaruhi efek bahan aktif, tetapi tidak dipungkiri bahwa pembawa dapat memberi pengaruh pada difusi bahan aktif dari pembawa menuju sisi aksi, serta stabilitas bahan yang tinggi dalam pembawa, yang secara terpisah atau bersamaan dapat menyebabkan sediaan lambat atau tidak memberikan efek.

Begitupun dalam stabilitas fisik sediaan gel sangat tergantung pada jenis dan konsentrasi pembawa (*gelling agent*) yang digunakan. Kemampuan bahan pembentuk gel ini dalam menangkap cairan sangat tergantung dari konsentrasi dan jenis pembawa yang digunakan. Oleh karena itu penentuan formula gel ekstrak tanaman ini dilakukan dengan pengujian stabilitas fisik sediaan gel dengan berbagai jenis basis.

Kestabilan suatu zat merupakan faktor yang harus diperhatikan. Sediaan gel biasanya diproduksi dalam jumlah besar dan memerlukan waktu yang lama dalam penggunaannya. Dengan melakukan stabilitas fisik sediaan maka dapat diketahui

pengaruh lingkungan terhadap parameter-parameter stabilitas fisik sediaan seperti pengamatan organoleptik, viskositas, daya sebar, homogenitas, dan pH.

Pemeriksaan stabilitas fisik sediaan yang dilakukan dengan metode *stress condition* yakni penyimpanan sediaan pada periode waktu (12 jam per siklus) selama 10 siklus dengan penyimpanan yang ekstrim (5°C dan 35°C). Sediaan diuji terhadap terjadinya perubahan organoleptik, pH, homogenitas, daya sebar dan viskositas serta pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat yakni *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidis*. Tujuannya adalah untuk mengetahui kestabilan fisik dari gel yang dipengaruhi perbedaan suhu yang ekstrim pada periode waktu penyimpanan

Setelah diformulasikan menjadi sediaan gel kemudian dilakukan evaluasi yakni pengamatan berupa karakterisasi sediaan (uji organoleptik pemeriksaan pH, pemeriksaan homogenitas, uji daya sebar dan viskositas). Hasil pengamatan sediaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hasil pengamatan organoleptik pada gel jerawat ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) menunjukkan bentuk, warna dan bau yang tidak berbeda sebelum dan setelah diberikan kondisi penyimpanan dipercepat. Dengan variasi jenis basis gel tidak menunjukkan perubahan bentuk, warna dan bau baik sebelum maupun setelah penyimpanan dipercepat. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi reaksi kimia antara bahan yang satu dengan bahan yang lain dalam formulasi sediaan gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*), atau sediaan dikatakan stabil baik sebelum maupun setelah penyimpanan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Kamus Kimia bahwa reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi, dimana selama proses tersebut terdapat perubahan-perubahan

yang dapat diamati seperti perubahan warna, pembentukan endapan, terbentuknya gas, hingga terjadi perubahan suhu (Pudjaatmaka, 2002).

Hasil pemeriksaan homogenitas sediaan gel pada semua formula baik kondisi sebelum maupun setelah penyimpanan menunjukkan sifat yang homogen dan stabil. Pengujian homogenitas dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar (Dirjen POM, 1985).

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana nilai viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi nilai viskositas maka makin besar daya tahan untuk mengalir. Pengukuran viskositas gel dilakukan menggunakan *Viscometer Brookfield* (DV-E Viscometer) dengan menggunakan spindle 5 pada kecepatan 50 rpm. Hasil pengukuran menunjukkan nilai viskositas sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pengujian stabilitas dilakukan dengan merubah suhu lingkungan sediaan gel. Adanya perubahan suhu yang terjadi pada saat pengujian stabilitas menyebabkan masuknya uap air dari luar akibat pengaruh perubahan suhu yang dilakukan selama pengujian stabilitas sehingga dapat menurunkan nilai viskositas sediaan (Wathoni, 2013). Analisis statistik dilakukan dengan membandingkan nilai viskositas sediaan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat untuk mengetahui adanya perbedaan bermakna antara nilai viskositas sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat. Analisis statistik yang dipilih adalah *paired t-test* menggunakan program SPSS. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa untuk formula F2 dan F3 memiliki data signifikan dari viskositas ($p > 0.05$) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara formula sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat. Sedangkan pada formula F1

memiliki data signifikan dari viskositas ($p < 0.05$) yang berarti bahwa terdapat perbedaan nyata antara formula sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat.

Pada pengujian pH, nilai pH sediaan gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) sebelum penyimpanan dipercepat yaitu untuk formula F1 = 6,26 ; F2 = 7,88 ; F3 = 8,20 , dan setelah penyimpanan dipercepat terjadi perubahan nilai pH yaitu untuk formula F1 = 6,65 ; F2 = 7,37 ; F3 = 8,036. Hasil analisis statistik yang telah dilakukan yakni menggunakan metode *paired t-test* pada aplikasi SPSS dengan membandingkan nilai pH sediaan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat menunjukkan bahwa data signifikan dari nilai pH ($p < 0.05$) menyatakan bahwa terdapat perbedaan nyata antara formula sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan gel dianggap tidak stabil pada parameter ini Akan tetapi nilai pH sediaan gel ini masih bisa untuk digunakan. Dalam buku *Handbook Of Cosmetic Skin Care* Edisi kedua dijelaskan bahwa kulit memiliki mantel asam yang berfungsi sebagai perlindungan pertama pada kulit, dimana mantel asam ini memiliki pH berkisar 4 – 6,5. Pada kulit normal dan sehat masih memiliki mekanisme pertahanan terhadap pH tinggi yaitu sekitar 9 – 10 (pH di atas 10 dapat menyebabkan iritasi pada kulit) atau dengan kata lain masih dapat diterima oleh kulit, dimana pH kulit akan kembali normal pada rentan waktu 30 menit sampai 2 jam setelah pemakaian (Shai dkk, 2009).

Pengujian daya sebar dilakukan dengan cara, sampel gel sebanyak 1 gram diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm, kaca lainnya diletakkan dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar diukur. Setelah itu ditambahkan 125 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Menurut Garg,Alka (2002), diameter daya sebar dengan nilai ≤ 50 mm masuk dalam kategori *semistiff cream* atau memiliki viskositas yang rendah, sedangkan jika nilai

diameter daya sebar >50 mm tetapi <70 mm maka masuk dalam kategori *semifluid cream*. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai daya sebar yang baik untuk sediaan gel yaitu dengan diameter 50 mm – 70 mm. Hasil daya sebar yang diperoleh sebelum penyimpanan untuk formula F1 = 33,33 mm ; F2 = 49,33 mm ; F3 = 82,33 mm. sedangkan hasil daya sebar setelah penyimpanan yaitu F1 = 35,67 mm ; F2 = 52,67 mm ; F3 = 86. Dalam literatur lain dikatakan bahwa untuk mengetahui nilai daya sebar, maka diameter yang didapatkan dihitung menggunakan rumus : $S_i = d^2 \times \pi/4$, dimana S_i menunjukkan nilai diameter daya sebar (mm^2) dan d menunjukkan nilai diameter rata-rata (mm) (DePaula et al. 1998). Hasil daya sebar yang diperoleh menggunakan rumus di atas yaitu sebagai berikut. Nilai daya sebar sebelum penyimpanan yaitu F1 = 873,443 mm^2 ; F2 = 1911,736 mm^2 ; F3 = 5232,561 mm^2 , sedangkan nilai daya sebar setelah penyimpanan yaitu F1 = 1000,875 mm^2 ; F2 = 2178,637 mm^2 ; F3 = 5807,953 mm^2 . Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa formula F1 dan F3 tidak memenuhi kriteria daya sebar yang baik, sedangkan formula F2 memenuhi kriteria daya sebar yang baik setelah penyimpanan yaitu sebesar 52,67 mm. Analisis statistik juga dilakukan dengan membandingkan daya sebar sediaan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat untuk mengetahui adanya perbedaan bermakna antara daya sebar sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat. Analisis statistik yang dipilih adalah *paired t-test* menggunakan program SPSS. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data signifikan dari uji daya sebar ($p > 0,05$) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara formula sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat.

Hasil pengujian aktivitas antibakteri dari gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) yaitu menunjukkan aktivitas antibakteri dengan kategori sedang pada semua bakteri penyebab jerawat yakni

Propionibacterium acne, *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*, seperti yang telah tercantum pada tabel 8. baik sebelum maupun setelah penyimpanan dipercepat. Menurut Abdel dkk (2011) bahwa aktivitas antibakteri berdasarkan diameter zona hambat yang terbentuk (mm) dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu: N.A (*no activity*) ≤ 4 mm ; + (lemah) 5 – 10 mm ; ++ (sedang) 10 – 16 mm ; dan +++ (kuat) ≥ 17 mm. Analisis statistik dilakukan dengan membandingkan aktivitas antibakteri sediaan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat untuk mengetahui adanya perbedaan bermakna antara aktivitas antibakteri sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat. Analisis statistik yang dipilih adalah *paired t-test* menggunakan program SPSS. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data signifikan dari uji daya sebar ($p > 0,05$) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara formula sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas, menunjukkan bahwa formula F1 tidak stabil dilihat dari nilai signifikan semua parameter. Pada formula F2 dinyatakan tidak stabil karena nilai signifikan pH sediaan tidak stabil dalam penyimpanan, namun memenuhi karakteristik persyaratan sediaan gel dan masih aman untuk digunakan. Sedangkan pada formula F3 juga dinyatakan tidak stabil pada penyimpanan dilihat dari nilai signifikan semua parameter.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sediaan gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Semua basis tidak dapat digunakan dalam formulasi sediaan gel anti jerawat ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) karena tidak stabil dalam penyimpanan.
2. Basis HPMC 4000 (F2) memenuhi persyaratan karakteristik sediaan gel anti jerawat tetapi tidak memenuhi parameter pengujian stabilitas sediaan.
3. Gel ekstrak kulit buah pisang ambon muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) efektif terhadap bakteri *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*.

B. Implikasi Penelitian

Disarankan untuk melakukan formulasi dan pengujian stabilitas fisik menggunakan jenis basis gel yang berbeda.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Al Karim

Abdel, M. Sahwa, dkk, 2011. *Antibacterial Activity of Some Wild Medicinal Plants Collected From Western Mediterranean coast, Egypt : Natural Alternatives for Infectios Disease Treatment*. Mubarak City. Alexandria University.

Addor, F.A.S., Schalka, S., 2010. *Acne in Adult Women: Epidemiological, Diagnostic and Therapeutic Aspects*. *An Bras Dermatol*; 85: 789-95.

Agoes, G. & Darijanto, S.T., 1993, *Teknologi Farmasi Likuida Dan Semi Solida*. 112, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu Hayati ITB, Bandung.

Akpuaka, M.U dan Ezem S.N. 2011. *Preliminary Phytochemical Screening of Some Nigerian Dermatological Plants*. *Journal of Basic Physical. Reaserch*.

Al- Jauzi, Ibnul Qayyim. 2005. *Terapi Penyakit Hati*. Jakarta: Qisthi Press.

Alisi C. S, dkk., 2008. *Inhibition Of Dehydrogenase Activity In Pathogenic Bacteria Isolated By Aqueous Extracts Of Musa paradisiaca (var Sapientum)*. *African Journal of Biotechnology* Vol. 7(12), 1821-1825.

Angela F.T., Lasmida., 2012. *Aktivitas Antioksidan dan Stablitas Fisik Gel Anti Aging yang Mengandung Ekstrak Air Kentang Kuning (Solanum tuberosum L.)*. Jakarta : Skripsi Universitas Indonesia.

Ansel, H.C., 1989, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, diterjemahkan oleh Farida Ibrahim, Asmanizar, Iis Aisyah, Edisi keempat. Jakarta : UI Press.

Armando, Rochim. 2009. *Memproduksi 15 Jenis Minyak Atsiri Berkualitas*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman. *Fiqih Pengobatan Islami*. Solo: Darul Wathon Iin Nasyr, 2008.

AstutiI, Y.D. Hartanti, dan A. Aminiati. 2010. *Peningkatan Aktivitas Antijamur Candidia albicans Salep Minyak Atsiri Daun Sirih (Piper bettle LINN.) melalui Pembentukan Kompleks Inklusi dengan β -siklodekstrin*. *Majalah Obat Tradisional*, 15:94 –99.

Brooks GF, Carroll KC, Butel JS. Morse SA. 2007. *Medical Microbiology*. London: MC Grow – Hill Medical.

- Corwin, J., Elisabeth., 2000. *Handbook Of Patofisiologi Edisi III*. Lippin Cop William dan Wilkins.
- Dalimartha, S. 2003. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 3*. Cetakan I. Puspa Swara: Jakarta
- De Paula et.al. 1998. *Development of Ointment Formulation Prepared with Achyrocline Satureioides Spray-Dried Extract*. Drug Dev. Ind Pharm.
- Ditjen POM, 1985. *Formularium Kosmetika Indonesia*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Ditjen POM, 1995. *Farmakope Indonesia Edisi ke IV*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Djajadisastra, K.,Mun'im, A.,Desi,N.P. 2009. *Formulasi Gel Topikal dari Ekstrak Nerii folium Dalam Sediaan Antijerawat*. Jurnal Farmasi Indonesia 4 (4): 210-216.
- Fagbemi, Josephine Ferdinand, Ugoji, Ester, Adenipekun and Adelowotan, Omotoyin. 2009. *Evaluation Of The Antimicrobial Properties Of Unripe Banana (Musa sapientum L.), Lemon grass (Cymbopogon citratus S.) On Pathogens*. Africans Journal of Biotechnologi Vol. 8 (7), pp. 1176-1182.
- Galuh, Putri. Y. 2009. *Formulasi Gel Obat Jerawat Minyak Atsiri Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia, Swingle)*. Muhammadiyah: Surakarta.
- Gennaro AR Lund, Walter. 1990. *Remington Pharmaceutical Sciences, eighteenth Edition*. Mack Publishing Compan: Easton Pennsylvania.
- Garg, A., Aggarwal, D., Garg and Sigla, A.K. 2002. *Spreading of Semisolid Formulation; An Update*. Pharmaceutical Tecnology. Pp 84-102.
- Harper JC. 2004. *An Update On the Pathogenesis And Management Of Acne Vulgaris*. J Am Acad Dermatol 51 (1) : 36-8.
- Jawetz, E., Melnick, JL., Adelberg and A., 2001. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika.
- Imam, Mohammad Zafar dan Saleha Akter. 2011. *Musa paradisisaca L. and Musa sapientum L. : A Phytochemical and Pharmacological Review*. Department of Pharmacy Stamford University Bangladesh (05) : 14-20.

- Januwardani, N. F. 2010. *Formulasi Sediaan Gel Estrak lidah Buaya(Aloe vera L.) dengan Gelling Agent Karbopol 934 dan Uji Efek Penyembuhan Luka Bakar*. Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Kementerian Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Fitrah Rabbani: Bandung.
- Kurokawa I, Danby FW, Ju Q, Wang X, Xiang LF, Chen WC, Nagy I, et al., 2009. *New Developments In Our Understanding Of Acne Pathogenesis And Treatment*. Experimental Dermatology.
- Kibbe, Arthur. H. 2000. *Handbook Of Pharmaceutical Excipients 3th Edition*. University Of Pharmacy : Pennsylvany.
- Lachman, L., H.A. Lieberman, J.L. Kaning. 1989. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Jakarta: UI Press.
- Lachman, L., H.A. Lieberman & J.L. Kaning. 2007. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi Ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Lakitan, B. 1993. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Grafindo Persada Jakarta.
- Lieberman, H, A., Ringer, M. M., and Banker, G. S., 1996, *Pharmaceutical Dosage Form, Second edition*. 308, 400, 408, Marcel Decker Inc, New York.
- Morton, Patricia Gonce, 2005. *Panduan Pemeriksaan Kesehatan Dengan Dokumentasi Soapie Edisi kedua*. Jakarta: EGC.
- Muhadi & Muadzlin. 2009. *Semua Penyakit Pasti Ada Obatnya, Menyembuhkan Penyakit Ala Rasulullah*. Jakarta: Mutiara Medika.
- Muhsin Khan, Muhammad. 1994. *Summarized Shahih Al-Bukhari Arabic-English*. Riyadh-Saudi Arabia: Maktaba Dar-us-Salam.
- Mursyid, A. Mumtihanah. 2012. *Evaluasi Stabilitas Fisik dan Profil Difusi Sediaan Gel (Minyak Zaitun)*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Normayunita, Sri, Syaiful Anam, dan Akhmad Khuamidi., 2015. *Aktivitas Antibakteri Fraksi Ekstrak Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (Musa paradisiaca var sapientum) Terhadap Staphylococcus aureus*. Online Journal of Natural Science Vol (4) : 300-309. FMIPA Universitas Tadulako, Palu.
- Pratiwi T. Sylvia. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.


- Pudjaatmaka, A. Hadyana. 2002. *Kamus Kimia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rowe, Raymond C, Paul J Sheskey, dan Marian E Quinn. 2009. *Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition*. Chicago: Pharmaceutical Press.
- Rogers, T.L ., 2009, HPMC, In: Rowe, R.C., Sheskey, P.J. & Quinn, M.E. (Eds.) *Handbook of Pharmaceutical Excipient , Sixth edition*, 326-329, Pharmaceutical Press and American Pharmasist Association, London.
- Shai, Avi dkk. 2009. *Handbook of Cosmetic Skincare Second Edition*. London. Informa Healthcare.
- Sasanti, T.J., Wibowo, MS., Fidrianny, I. dan Caroline, S. 2012. *Formulasi gel ekstrak air teh hijau dan penentuan aktivitas antibakterinya terhadap propionic bacterium acnes*. School of Pharmacy ITB, Gedung LabTek VII, Bandung.
- Syahrurahman. 1994. *Buku Ajar Mikrobiologi Revisi Ajar*. Jakarta: Binarupan Aksara.
- Tjitrosoepomo G. 1993. *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*. Gajah Mada University Press. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Tranggono, I. R. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wasitaatmadja, S.M. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Winarno, F.G. 1997. *Kimia Pangan dan Gizi*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Voigt, R. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi Edisi V*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Zaenglein AL, Graber EM, Thiboutot DM, Strauss JS. *Acne vulgaris and acneiform eruption*. In: Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K, Freedberg IM, Austen K, eds. *Dermatology in general medicine*. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2008:690-703
- Zouboulis CC, Eady A, Philpott M, Goldsmith LA, Orfanos C, Cunliff e WC, Rosenfi eld R. *What is the pathogenesis of acne*. *Experimental Dermatology*. 2005; 14: 143-52.

Lampiran 1. Gambar Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).




Gambar 2. Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)


Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*).



Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *Sapientum*).



Lampiran 4. Skema Kerja Uji Stabilitas Gel Anti Jerawat Ekstrak Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *Sapientum*).



Lampiran 5. Hasil Perhitungan

1. Rendamen Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{Bobot rendamen (gram)}} \times 100 \\ &= \frac{57,53 \text{ gram}}{500 \text{ gram}} \times 100 \\ &= 11,51 \% \end{aligned}$$

2. Perhitungan daya sebar sediaan gel sebelum penyimpanan

a. F1a $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (32 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 803,84 \text{ mm}^2$$

F1b $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (35 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 961,625 \text{ mm}^2$$

F1c $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (33 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 854,865 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata} &= \frac{803,84 \text{ mm}^2 + 961,625 \text{ mm}^2 + 854,865 \text{ mm}^2}{3} \\ &= 873,443 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

b. F2a $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (48 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 1808,64 \text{ mm}^2$$

F2b $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (49 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 1884,785 \text{ mm}^2$$

F2c $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (51 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 2041,785 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata} &= \frac{1808,64 \text{ mm}^2 + 1884,785 \text{ mm}^2 + 2041,785 \text{ mm}^2}{3} \\ &= 1911,736 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

c. F3a $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (81 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 5150,385 \text{ mm}^2$

F3b $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (84 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 5538,96 \text{ mm}^2$

F3c $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (82 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 5278,34 \text{ mm}^2$

Rata-rata $= \frac{5150,385 \text{ mm}^2 + 5538,96 \text{ mm}^2 + 5278,34 \text{ mm}^2}{3}$
 $= 5232,561 \text{ mm}^2$

3. Perhitungan daya sebar gel setelah penyimpanan

a. F1a $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (38 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 1133,54 \text{ mm}^2$

F1b $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (35 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 961,625 \text{ mm}^2$

F1c $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (34 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 907,46 \text{ mm}^2$

Rata-rata $= \frac{1133,54 \text{ mm}^2 + 961,625 \text{ mm}^2 + 907,46 \text{ mm}^2}{3}$
 $= 1000,875 \text{ mm}^2$

b. F2a $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (51 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 2041,785 \text{ mm}^2$

F2b $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$
 $S_1 = (54 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 2289,06 \text{ mm}^2$

F2c $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (53 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 2205,065 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata} &= \frac{2041,785 \text{ mm}^2 + 2289,06 \text{ mm}^2 + 2205,065 \text{ mm}^2}{3} \\ &= 2178,637 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

c. F3a $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (86 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 5805,86 \text{ mm}^2$$

F3b $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (88 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 6079,04 \text{ mm}^2$$

F3c $S_1 = d^2 \frac{\pi}{4}$

$$S_1 = (84 \text{ mm})^2 \times \frac{3,14}{4} = 5538,96 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata} &= \frac{5805,86 \text{ mm}^2 + 6079,04 \text{ mm}^2 + 5538,96 \text{ mm}^2}{3} \\ &= 5807,953 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Lampiran 6. Hasil Replikasi Pengukuran Sediaan Gel

Tabel 9. Hasil Replikasi Pengukuran Formulasi Gel Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)

Formula	Nilai pH		Daya Sebar (mm)		Viskositas (cP)	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
F1a	6.27	6.65	32	38	7420	6832
F1b	6.23	6.66	35	35	6032	5720
F1c	6.30	6.65	33	34	6220	5704
F2a	7.89	7.43	48	51	4307	4082
F2b	7.88	7.34	49	54	4230	4093
F2c	7.89	7.34	51	53	4176	3713
F3a	8.20	8.01	81	86	3692	3424
F3b	8.20	8.03	84	88	3646	3372
F3c	8.24	8.07	82	84	3372	3376

Tabel 10. Hasil Replikasi Pengukuran Aktivitas Daya Hambat Gel Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) terhadap bakteri penyebab jerawat.

Formula	Daya Hambat Bakteri (mm)					
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>		<i>Propionibacterium acne</i>		<i>Staphylococcus aureus</i>	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
F1a	12	12	15	15	13	15
F1b	12	10	14	14	12	12
F1c	13	12	16	15	15	11
F2a	14	14	17	16	14	13
F2b	15	14	16	18	14	12
F2c	16	15	15	16	13	13
F3a	15	14	13	13	11	10
F3b	15	14	13	12	12	12
F3c	15	13	12	12	12	10

Lampiran 7. Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)



(a)



(b)

Gambar 3. Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)

Ket :

(a) proses Rotavapor,

(b) ekstrak kental kulit buah muda pisang ambon.

Lampiran 8. Gambar Hasil Pengamatan

Gambar 4. Sediaan Gel Dari Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)

- Ket :
- F1 : Sediaan gel dengan basis NaCMC .
 - F2 : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000.
 - F3 : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940.

Gambar 5. Sediaan Gel Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan



F1



F2




F3

Ket : F1 : Sediaan gel dengan basis NaCMC .

F2 : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000.

F3 : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940.


Gambar 6. Sediaan Gel Pada Kondisi Setelah Penyimpanan



- Ket :
- F1 : Sediaan gel dengan basis NaCMC .
 - F2 : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000.
 - F3 : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940.

Lampiran 9. Pengujian Homogenitas Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)

Gambar 7. Pengujian Homogenitas Sediaan Sebelum penyimpanan



Ket :

F1a : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F1b : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F1c : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F2a : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F2b : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F2c : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)


F3a : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F3b : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F3c : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)



Gambar 8. Pengujian Homogenitas Sediaan Setelah penyimpanan



Ket :

F1a : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F1b : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F1c : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F2a : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F2b : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F2c : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F3a : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)


F3b : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)

F3c : Tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar (homogen)



**Lampiran 10. Pengujian pH Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Mentah Pisang
Ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)**

Gambar 9. Pengujian pH Sediaan Sebelum penyimpanan



Ket :

F1a : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 1

F1b : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 2

F1c : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 3

F2a : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 1

F2b : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 2

F2c : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 3

F3a : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 1

F3b : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 2

F3c : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 3



Gambar 8. Pengujian pH Sediaan Setelah penyimpanan



F1a



F1b



F1c



F2a



F2b



F2c



F3a



F3b



F3c

Ket :

F1a : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 1

F1b : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 2

F1c : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 3

F2a : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 1

F2b : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 2

F2c : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 3

F3a : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 1

F3b : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 2

F3c : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 3



Lampiran 11. Pengujian Viskositas Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)

Gambar 11. Pengujian Viskositas Sediaan Sebelum penyimpanan



F1a



F1b



F1c




F2a



F2b



F2c



F3a



F3b



F3c

Ket :

F1a : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 1

F1b : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 2

F1c : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 3

F2a : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 1

F2b : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 2

F2c : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 3



F3a : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 1

F3b : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 2

F3c : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 3

Gambar 12. Pengujian Viskositas Sediaan Setelah penyimpanan



**F2a****F2b****F2c****F3a****F3b****F3c**

Ket :

F1a : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 1

F1b : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 2

F1c : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 3

F2a : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 1

F2b : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 2

F2c : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 3


F3a : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 1

F3b : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 2

F3c : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 3

**Lampiran 12. Pengujian Daya Sebar Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Pisang
Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*)**

Gambar 13. Pengujian Daya Sebar Sediaan Sebelum Penyimpanan



Ket :

F1a : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 1

F1b : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 2

F1c : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 3

F2a : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 1

F2b : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 2

F2c : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 3


F3a : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 1

F3b : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 2

F3c : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 3



Gambar 14. Pengujian Daya Sebar Sediaan Setelah Penyimpanan



F1a



F1b



F1c



F2a



F2b



F2c



F3a



F3b



F3c

Ket :

F1a : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 1

F1b : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 2

F1c : Sediaan gel dengan basis NaCMC pada pengukuran 3

F2a : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 1

F2b : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 2

F2c : Sediaan gel dengan basis HPMC 4000 pada pengukuran 3

F3a : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 1


F3b : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 2

F3c : Sediaan gel dengan basis Karbopol 940 pada pengukuran 3



Lampiran 13. Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

Gambar 15. Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Sebelum Penyimpanan



Propionibacterium acne

Staphylococcus epidermidis


Staphylococcus aureus

Ket :

- 1 : Zona hambat gel ekstrak gel ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) dengan basis karbopol 940
- 2 : Zona hambat gel ekstrak gel ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) dengan basis NaCMC
- 3 : Zona hambat gel ekstrak gel ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) dengan basis HPMC 4000
- 4 : Zona hambat kontrol

ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar 16. Pengujian Aktivitas Antibakteri Sediaan Setelah Penyimpanan



Propionibacterium acne

*Staphylococcus
epidermidis*

Staphylococcus aureus

Ket :

- 1 : Zona hambat gel ekstrak gel ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) dengan basis karbopol 940
- 2 : Zona hambat gel ekstrak gel ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) dengan basis NaCMC
- 3 : Zona hambat gel ekstrak gel ekstrak kulit buah mentah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) dengan basis HPMC 4000
- 4 : Zona hambat kontrol

Lampiran 14. Hasil Analisis dengan Metode *Paired-Sample T Test*

Tabel 11. Analisis *Paired-Sample T Test*

Formula gel	Nilai Sig					
	pH	Viskositas	Daya sebar	Daya hambat bakteri		
				<i>s. aureus</i>	<i>p.acne</i>	<i>s. edpidermidis</i>
F1	0.04	0.029	0.336	0.724	0.423	0.225
F2	0.03	0.106	0.063	0.225	0.529	0.184
F3	0.01	0.190	0.053	0.225	0.423	0.057

Ket :

Nilai sig ($p > 0,05$) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan (Stabil).

Nilai sig ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (Tidak Stabil).

RIWAYAT HIDUP



Penulis dari skripsi yang berjudul “Formulasi dan Uji Stabilitas Gel Anti Jerawat dari Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Ambon Muda (*Musa paradisiaca* var *sapientum*) Dengan Berbagai Variasi Basis” bernama Rezti Arianti J, dilahirkan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara pada tanggal 01 Januari 1996. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Jamaluddin Nuntung dan Ibu Hj. Siti Hadija. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari TK Limbo Wolio, SD Negeri 4 Katobengke, SMP Negeri 4 Baubau, dan SMA Negeri 2 Baubau.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Aktivitas penulis selama menjadi mahasiswi adalah sebagai mahasiswi aktif dan pernah bergabung di HMJ Farmasi UINAM periode 2015-2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR