

**MODEL MATEMATIKA KESTABILAN PEMANENAN IKAN SECARA
MUSIMAN DAN PEMANENAN SECARA PROPORSIONAL**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Proposal
Penelitian Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

SUSI SUSANTI
NIM : 60600112062

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Maret 2018

Penyusun,



Susi Susanti
NIM : 60600112062

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Model Matematika Kestabilan Pemanenan Ikan secara Musiman dan Secara Proposional”, yang disusun oleh Saudari **Susi Susanti**, Nim: **60600112062** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **22 Februari 2018 M**, bertepatan dengan **06 Jumadil Akhir 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 22 Februari 2018 M
06 Jumadil Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dan Allah SWT berfirman, “Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu”.

(Qs.Al-Mu’min:60)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila telah selesai (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam ibadah)”.

(Qs. Al Insyirah : 6-7)

~~Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :~~

Karya ini kupersembahkan kepada Rabb-ku, Allah swt.

*Rabb pemberi semangat dan pemberi harapan dibalik keputusasaan

*Persembahan kecil untuk Bapak dan Ibuku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan demi suksesanku.

*Beserta keluarga besarku yang menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan tugas akhir ini..

*Sahabat – sahabatku *Gadis Rempong* yang selalu memberi bantuan dan motivasinya.

*Almamater UIN Alauddin Makassar

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *alhamdulillah* *alhamdulillah*. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul “**Model Matematika kestabilan pemanenan ikan secara musiman dan pemanenan secara proporsional**” dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama do'a dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orang tua tercinta, kakak-kakak tersayang serta sahabat rempong yang selalu setia memberikan bantuan dan semangat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si.**, Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, serta **Bapak Muh. Irwan, S.Si., M.Si.**, Pembimbing II,

atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Irwan S.Si, Ketua jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan, atas segala bantuannya kepada penulis.
3. Tim Penguji Bapak Irwan S.Si, Penguji I, Bapak Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si., Penguji II dan Bapak Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed., penguji III atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Teman–teman Kurva pada khususnya yang sama–sama berjuang mulai dari awal perkuliahan hingga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman dan pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin

Makassar, Maret 2018

Penulis,

Susi Susanti
NIM. 60600112062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SIMBOL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat	8
E. Batasan Masalah.....	8
F. Sistematika penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Persamaan Diferensial.....	11
B. Model Pertumbuhan Populasi	12
C. Model Umum Pemanenan.....	16
D. Model Usaha Pemanenan	17
E. Pemanenan Konstan	18
F. Pemanenan Proporsional	18
G. Pemanenan Musiman	20
H. Titik Tetap	21
I. Stabilitas	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25

B. Waktu Penelitian.....	25
C. Prosedur Penelitian.....	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	27
B. Pembahasan.....	46


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Simulasi kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan..... ..	32
Gambar 2. Usaha Pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan..... ..	38
Gambar 3. Grafik fungsi periodik pemanenan..... ..	43
Gambar 4. Simulasi kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan..... ..	44



DAFTAR SIMBOL

$\frac{dx}{dt}$	Tingkat populasi ikan
x	populasi ikan
R	Laju pertumbuhan alamiah
K	Daya dukung lingkungan
U	Usaha pemanenan
λ	Laju pemanenan konstan yang berubah setiap tahun
α	laju kematian populasi ikan
β	laju kelahiran populasi ikan
q	kemampuan tangkap ikan
$\lambda(t)$	fungsi periodik pemanenan dengan periode satu tahun
θ	Proporsi ikan yang terawat

ABSTRAK

Nama : Susi Susanti

NIM : 60600112062

Judul : Model Matematika Kestabilan Pemanenan Ikan secara Musiman dan Pemanenan secara proporsional

Pemanenan adalah suatu kegiatan yang umum dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti pemanenan ikan. Penelitian ini membahas beberapa metode pemanenan yang dapat dilakukan yaitu pemanenan konstan, proporsional dan musiman. Model pemanenan masing-masing akan dicari nilai kestabilannya. Adapun model pemanenan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Model pemanenan konstan

$$\frac{dx}{dt} = Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - (1 - \theta)x - qUx$$

Model Pemanenan Proporsional

$$\frac{dx}{dt} = \frac{Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - (1 - \theta)x - \lambda q \alpha x}{(1 - \lambda q x \beta)}$$

Model Pemanenan Musiman

$$\frac{dx}{dt} = \frac{Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - (1 - \theta)x - \lambda(t) q \alpha x}{(1 - \lambda(t) q x \beta)}$$

Model tersebut menghasikan dua titik tetap yang menggambarkan stabil dan tidak stabil. Dari hasil simulasi pemanenan konstan dan musiman berdasarkan parameter kemampuan tangkap ikan diperoleh nilai yaitu real positif dan negatif yang menunjukkan kestabilan titik tetap tersebut stabil saat nilai parameter kemampuan tangkap ikan kurang dari satu sehingga populasi ikan tidak akan punah dan selalu ada.

Kata Kunci: *Model pertumbuhan populasi, Model pemanenan, titik tetap, titik Kestabilan*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang hidup di daerah dekat laut atau pantai, sebagian besar mata pencahariannya adalah mencari ikan dan mata pencahariannya tergantung di laut, beda dengan masyarakat yang hidup didaerah persawahan yang mata pencahariannya tergantung dari bertani. Dengan perbandingan ini kita bisa lihat perkembangan masyarakat dilihat dari kesejahteraan dari tiap-tiap daerah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah An-Nahl (16:14) yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”.¹

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam Tafsir Jalalayn sesungguhnya Dialah yang menundukkan lautan dia telah membuatnya jinak sehingga dapat

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.(Jakarta: Perwakilan bagian percetakan dan penerbitan kementerian agama, 2002) .Hal.195

dinaiki dan diselami agar kalian dapat memakan daging yang segar yaitu ikan (dan kalian mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kalian pakai) yaitu berupa mutiara dan marjan (dan kamu melihat) menyaksikan perahu-perahu dapat melaju diatas air artinya dapat membela ombak melaju kedepan atau ke belakang hanya ditiup oleh satu arah angin (dan supaya kalian mencari) lafal ini di athafkan kepada lafal *lita'kulu*, artinya supaya kalian mencari keuntungan karunia Allah SWT dan supaya kalian bersyukur kepada Allah atas karunia itu.²


Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT banyak memberikan nikmat kepada manusia lewat adanya laut. Allah SWT menunjukkan laut untuk manusia bertujuan agar manusia bisa mengambil manfaat dari laut. Di dalam laut banyak sekali manfaat yang bisa di ambil yaitu banyak terkandung bahan makanan seperti ikan dan sebagainya, perhiasan dan tempat berlayar. Ayat juga ini menjelaskan Allah SWT menyediakan laut sebagai sarana transportasi sehingga bahtera atau berlayar yang dapat mengarungi lautan untuk berlayar berpindah dari daratan yang satu menuju daratan yang lain. Ayat ini menjelaskan betapa besar kekuasaan Allah SWT sehingga bahtera dapat berlayar di lautan, membawa barang-barang dagangan dan bahan makanan, kemudian berapapun beratnya bahtera tersebut, ia tidak tenggelam sedangkan air laut yang dilaluinya sedemikian lunak. Ayat juga ini menjelaskan bahwa Allah SWT meletakkan banyak perhiasan dilautan, yang semua itu hanya diciptakan untuk manusia. Seperti permata, marjan, emas dan mutiara. Ayat ini memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa

² Ahmad Al-Maragi Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. (Semarang:CV TOHA PUTRA, 1987) Hal.200

bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada umat manusia.

Maksud ayat di atas yaitu pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan tentang beberapa hal mewujudkan kedaulatan pangan, pemenuhan kedaulatan sandang, optimalisasi laut sebagai jalur dan sarana transportasi, potensi kedaulatan energi dan syukur dalam dimensi sosial. Nikmat adanya laut dan pengaruh berbagai kehidupan manusia, berbeda dengan hewan-hewan yang didarat yang memerlukan biaya dan usaha keras, nikmat yang terdapat dalam laut dapat diambil tanpa biaya pengembangbiakkan. Laut mengembangbiakkan berbagai ikan dan menyerahkan kepada manusia secara gratis. Barang-barang berharga dan hiasan untuk manusia dikeluarkan dari dalam laut. Semua ini karena pengaturan dan kekuasaan Allah SWT sementara manusia dituntut oleh Allah SWT untuk memanfaatkan segala nikmat yang ada dengan baik dan benar serta tidak lupa mensyukurinya.

Allah SWT juga telah menjelaskan tentang perlunya memperhatikan kejadian alam dalam Qur'an surah yunus (10:101) yang berbunyi:



Terjemahnya:

Katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.³

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah SWT menghimbau hambanya agar memperhatikan merenungkan tanda-tanda wujudnya berupa apa yang diciptakan dilangit berupa bintang-bintang, planet-planet yang bergerak maupun yang tidak, matahari dan bulan, adanya malam yang gelap dan siang yang terang yang silih berganti sehingga menjadikan siang kadangkala lebih panjang atau pendek dari malam atau sebaliknya, adanya langit yang tinggi yang menurunkan hujan sehingga menghidupkan tanah yang sudah kering, menyuburkan ladang-ladang yang membuahkan berbagai buah-buahan, kembang-kembang dan padi-padian yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Allah SWT juga menciptakan makhluk-makhluk yang bernyawa yang beraneka ragam bentuk, warna dan sifat-sifatnya, yang hidup di darat, di laut, melata dan berkaki dan sebagainya. Kita juga dianjurkan untuk selalu mensyukuri dan memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dan memberi peringatan bagi orang-orang tidak beriman.⁴

Ayat diatas juga menjelaskan segala hal yang ada di bumi ini hadir untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Terutama dalam hal menunjukkan tanda-

³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.(Jakarta: Perwakilan bagian percetakan dan penerbitan kementrian agama, 2002).Hal.221

⁴ H.Salim Bahresy.*Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jild 4.Hal 259.*

tanda keberadaan Allah SWT. Sehingga orang-orang yang tidak beriman akan sadar dan mengambil hikmahnya. Disamping itu segala yang ada di dunia ini harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Hikmah Q.S Surah Yunus ayat 101 yaitu menambah keimanan kepada Allah SWT dan bertambah yakin bahwa Allah SWT maha kuasa menciptakan alam semesta ini, dan dia pula yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di bumi.

Pemanenan adalah salah satu kegiatan yang umum dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti pemanenan sumber daya kelautan. Dalam manajemen perikanan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemanenan ikan yaitu pemanenan secara musiman dan pemanenan proporsional. Pemanenan Musiman adalah hasil panen yang dilakukan setiap kali dalam satu musim sedangkan pemanenan proporsional adalah tingkatan hasil panen dengan menentukan jumlah hasil banyak sedikitnya yang didapatkan.

Dari kedua model pemanenan ini peneliti akan mencari nilai kestabilan antara pemanenan musiman dan pemanenan proporsional. Kestabilan pemanenan adalah perbandingan sama banyak atau sedikitnya suatu penghasilan pada suatu musim panen. Adapun kelebihan pemanenan musiman adalah keuntungan yang diperoleh pada saat panen dengan jumlah banyaknya yang terjadi dalam satu musim, sedangkan kekurangan pemanenan musiman adalah berkurangnya penghasilan yang didapat dalam waktu satu musim, sehingga perbandingan ini dapat diketahui dengan pemanenan proporsional. Inilah kelebihan dari model pemanenan proporsional yaitu untuk mengetahui tingkat atau jumlah hasil panen yang di hasilkan.

Pemanenan dapat dimodelkan dengan menggunakan model persamaan diferensial, model persamaan diferensial dapat digunakan untuk memperoleh berbagai model pemanenan. Dengan melakukan analisis terhadap model pemanenan dapat dilihat dinamika populasi dan pengaruh peubah kontrol (usaha pemanenan) terhadap nilai kestabilan dan dinamika populasinya.

Model matematika yang berupa suatu persamaan atau pertidaksamaan. Persamaan atau pertidaksamaan yang terjadi mungkin lebih melibatkan satu variabel bebas atau lebih. Jika variabel-variabel yang ditinjau bersifat diskrit maka model yang dihasilkan adalah suatu model diskrit yang berupa suatu persamaan diferensial. Jika variabel-variabel yang ditinjau bersifat kontinu maka model yang dihasilkan merupakan model kontinu dapat berupa suatu persamaan diferensial.⁵

Ilmu matematika merupakan salah satu jembatan atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Salah satu ilmu matematika yang dapat membantu mendeskripsikan fenomena-fenomena di kehidupan nyata dalam bentuk fungsi atau persamaan adalah model matematika. Dengan memodelkan kejadian sehari-hari, diharapkan dapat memprediksi nilai dari variabel untuk masa yang akan datang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Lestari, pada penelitiannya menjelaskan pemanenan-pemanenan yang dapat diterapkan dalam manajemen perikanan dan pengaruh dari usaha pemanenan terhadap dinamika

⁵ Prof.Dr.Syamsuddin Toaha,M.Sc,*Pemodelan Matematika Dalam Dinamika Populasi*.2013.Hal.7

populasinya. Sebagai contoh penerapannya dibahas pemanenan optimal yang memberikan keuntungan maksimum dan berkelanjutan. Pembahasan pemanenan optimal hanya dibatasi untuk pemanenan yang dilakukan secara konstan dan proporsional.⁶

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemanenan-pemanenan yang dapat diterapkan dalam pemodelan matematika dengan judul *“Model Matematika kestabilan pemanenan ikan secara musiman dan pemanenan secara proporsional”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kestabilan titik tetap dari Model Pemanenan ikan secara Konstan, Proporsional dan Musiman?
2. Bagaimana pengaruh parameter kemampuan tangkap ikan dan parameter usaha tak konstan terhadap populasi ikan.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Model kestabilan titik tetap dari Pemanenan ikan secara Konstan, Proporsional dan Musiman.
2. Untuk mengetahui pengaruh parameter kemampuan tangkap ikan dan parameter usaha tak konstan terhadap populasi ikan.

⁶ Dian Lestari, *Model Pemanenan dalam manajemen perikanan*.(Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor,2009).

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah informasi dan wawasan tentang model matematika persamaan diferensial.

2. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Menambah penbendaharaan skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan umum.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan model matematika kestabilan pemanenan ikan secara musiman dan pemanenan secara proporsional.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, serta agar pembahasan tidak meluas maka penelitian dibatasi dengan model Pemanenan Konstan, Pemanenan Proporsional dan Pemanenan Musiman.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini tersusun secara sistematis maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang isi keseluruhan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yaitu membahas apa saja yang ingin dimunculkan dalam pembahasan, tujuan penelitian memaparkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, manfaat penulisan memaparkan yang ingin dicapai oleh peneliti, batasan masalah memaparkan tentang bagaimana masalah yang di rumuskan dibatas penggunaannya agar tidak terlalu luas lingkup pembahasannya dan sistematika penulisan membahas tentang apa saja yang dibahas pada masing-masing bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang teori-teori yang berhubungan tentang skripsi ini seperti persamaan diferensial, klasifikasi persamaan diferensial, orde (tingkat) dan derajat persamaan diferensial, model pertumbuhan populasi, pemanenan konstan, pemanenan proporsional, pemanenan musiman, titik tetap, dan kestabilan titik ekuilibrium.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bagian ini merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, dan prosedur penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dan pembahasan yang tentang tiga kasus yaitu pemanenan konstan, pemanenan proporsional, dan pemanenan musiman.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persamaan Diferensial

Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui, dan atau persamaan itu mungkin juga melibatkan fungsi itu sendiri dan konstanta. Dari turunan yang membentuk dalam persamaan diferensial akan menentukan jenis dan klasifikasi persamaan diferensial itu sendiri. Berikut ini adalah contoh persamaan diferensial, yaitu :

$$1. y' + y = 0$$

$$2. \frac{x}{1+x^2} dx + \frac{3y}{2+3y^2} dy = 0$$

$$3. y''' + 4y = 0$$

$$4. (D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$$

$$5. y'' + 4y' + 8y = x \sin 2y$$

$$6. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$7. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

Dari berbagai contoh-contoh di atas, terlihat bahwa terdapat persamaan diferensial yang melibatkan turunan biasa, dan ada yang memuat unsur turunan parsial. Berdasarkan pada hal tersebut, klasifikasi persamaan diferensial dapat

dikelompokkan berdasarkan variabel yang terlibat, jenis fungsi turunannya, koefisien persamaan, jenis kesamaannya.¹

Persamaan diferensial dibagi dalam dua kelas yaitu Persamaan diferensial biasa (*ordinary differential equations*), disingkat PDB, adalah suatu persamaan diferensial yang melibatkan hanya satu variabel bebas. Jika diambil $y(x)$ sebagai suatu fungsi variabel, dengan x dinamakan variabel bebas dan y dinamakan variabel tak bebas, dan Persamaan diferensial parsial, disingkat PDP, adalah suatu persamaan diferensial yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas, satu variabel bebas, dan memuat turunan parsial.²

B. Model Pertumbuhan Populasi

Secara umum laju pertumbuhan populasi per individu, $\frac{1}{x} \frac{dx}{dt}$, tidak selalu konstan. Laju pertumbuhan setiap individu mungkin bergantung kepada ukuran populasi. Dengan itu laju pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai

$$\frac{1}{x} \frac{dx}{dt} = R(x) \text{ atau } \frac{dx}{dt} = xR(x). \quad (2.1)$$

Untuk mengetahui hubungan antara $R(x)$ dengan ukuran populasi x , kita asumsikan ukuran populasi cukup besar dan dengan itu $R(x)$ dipandang sebagai suatu fungsi yang kontinu terhadap x . Ketika ukuran populasi masih kecil maka laju pertumbuhan akan cepat naik. Setelah sampai pada ukuran populasi tertentu, laju pertumbuhan tidak dapat lagi bertambah. Pada saat ukuran populasi sudah

¹ Sri Sulasteri, Persaman Diferensial Biasa, Alauddin University Press, 2014, h.4-5

² Didit Budi Nugroho, *Persamaan Diferensial dan aplikasinya*, graha ilmu Yogyakarta, 2011. h.1-2

mulai besar maka laju pertumbuhan menurun dengan membesarnya ukuran populasi. Sampai suatu ukuran populasi tertentu, laju pertumbuhan populasi bernilai nol dan selanjutnya mungkin negatif.³

Misalkan dalam populasi ikan ada x individu, dan daya dukung lingkungan K dimasukkan kedalam model, maka lingkungan masih dapat mendukung $K - x$ individu. Jadi masih ada bagian lingkungan yang masih bias di isi sebesar $\frac{K-x}{K}$. Bagian inilah yang sebanding dengan pertumbuhan populasi, sehingga model pertumbuhan populasi menjadi

$$\frac{dx}{dt} = Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) \quad (2.2)$$

Dimana,

x =Populasi ikan

R = Laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan.

Contoh 2.3:

Diberikan persamaan diferensial

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{R}{K} \left(X^2 - KX + \frac{Kh}{R} \right),$$

³ Prof.Dr.Syamsuddin Toaha,M.Sc,Pemodelan Matematika Dalam Dinamika Populasi.2013.hal 87-89.

Dengan R laju pertumbuhan, K daya dukung lingkungan, dan h laju pemanenan.

Untuk $R = 1, K = 10, h = \frac{9}{10}$ dan $X(0) = X_0$, tentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut.

Jawab:

Persamaan diferensialnya dapat ditulis menjadi

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{10}(X^2 - 10X + 9) = -\frac{1}{10}(X - 1)(X - 9).$$

Diperoleh

$$\frac{1}{(X - 1)(X - 9)} dX = -\frac{1}{10} dt.$$

Dengan melakukan sedikit proses aljabar sehingga diperoleh

$$-\frac{1}{10} dt = \frac{1}{(X - 9)} - \frac{1}{(X - 1)}$$

$$= \frac{(X - 1) - (X - 9)}{(X - 9)(X - 1)}$$

$$= \frac{8}{(X - 9)(X - 1)}$$

$$-\frac{1}{10} dt = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{(X - 9)} - \frac{1}{(X - 1)} \right) dX$$

Dengan mengintegalkan kedua ruas sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{1}{8} \left(\frac{1}{(X-9)} - \frac{1}{(X-1)} \right) dx = \int -\frac{1}{10} dt \\
&= \frac{1}{8} \int \frac{1}{(X-9)} dx - \int \frac{1}{(X-1)} dx = \int -\frac{1}{10} dt \\
&= \frac{1}{8} (\ln|X-9| - \ln|X-1|) = -\frac{1}{10}t + c
\end{aligned}$$

Menggunakan sifat logaritma natural diperoleh

$$\frac{1}{8} \ln \left| \frac{X-9}{X-1} \right| = -\frac{1}{10}t + c.$$

Jika $b = e^{8c}$ untuk suatu konstanta c , maka

$$\begin{aligned}
\ln \left| \frac{X-9}{X-1} \right| &= -\frac{4t}{5} + 8C \\
\left| \frac{X-9}{X-1} \right| &= e^{\frac{4t}{5} + 8C} = e^{-\frac{4t}{5}} \cdot e^{8C}
\end{aligned}$$

$$\left| \frac{X-9}{X-1} \right| = b e^{-\frac{4t}{5}}.$$

Substitusikan kondisi awal $X(0) = x_0$ sehingga

$$b = \left| \frac{x_0 - 9}{x_0 - 1} \right|,$$

dan solusi eksplisitnya yaitu

$$\left| \frac{X-9}{X-1} \right| = b \cdot e^{-4t/5}$$

$$(X - 9) = Xbe^{-4t/5} - be^{-4t/5}$$

$$X - Xbe^{-4t/5} = 9 - be^{-4t/5}$$

$$X(1 - be^{-4t/5}) = 9 - be^{-4t/5}$$

$$X(t) = \frac{9 - be^{-4t/5}}{1 - be^{-4t/5}}$$

2.1 Model Umum Pemanenan

Model umum pertumbuhan populasi (2.2) menunjukkan bahwa model perikanan tersebut belum mengalami eksploitasi atau faktor penangkapan belum dimasukkan kedalam model. Dalam usaha penangkapan ikan di butuhkan berbagai sarana sebagai faktor masukan atau input yang biasa disebut sebagai usaha pemanenan.

Hubungan antara tingkat pertumbuhan alamiah dengan usaha pemanenan merupakan dinamika populasi persediaan ikan. Laju persediaan ikan (dx/dt) ditentukan oleh kemampuan tangkap ikan (q). Hasil pemanenan dapat dituliskan sebagai (h) yang merupakan fungsi produksi yang di asumsikan menggambarkan dua kuantitas, yaitu ukuran kemampuan tangkap ikan ($0 \leq q \leq 1$) dan tingkat usaha pemanenan ($0 \leq U \leq 1$) sehingga model umum pemanenan yaitu

$$\frac{dx}{dt} = Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - qxU \quad (2.3)$$

Dimana,

R = laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

x = populasi ikan.

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan

q = kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan

U = Usaha pemanenan terhadap populasi ikan.

2.2 Model Usaha pemanenan

Usaha pemanenan adalah usaha penangkapan ikan membutuhkan berbagai sarana sebagai faktor masukan atau input yang biasa. Dengan mengamsumsikan usaha pemanenan tak konstan sehingga model usaha pemanenan yaitu

$$U = \alpha - \beta \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \quad (2.4)$$

Dimana,

x = Populasi ikan terhadap populasi ikan

α = Pertemuan antara dua individu terhadap populasi ikan

β = usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan

U = Usaha pemanenan terhadap populasi ikan

$\frac{dx}{dt}$ = Laju pertumbuhan persediaan ikan terhadap populasi ikan.

2.3 Pemanenan Konstan

Pemanenan konstan adalah Pemanenan dengan hasil panen yang tetap setiap tahunnya. Dengan mengamsumsikan usaha pemanenan (U) dan kemampuan tangkap ikan yang dijaga tetap konstan sehingga model pemanenan konstan yaitu

$$\frac{dx}{dt} = Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - qUx \quad (2.5)$$

Dimana ,

R = laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

x = populasi ikan.

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan

q = kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan

U = Usaha pemanenan terhadap populasi ikan

2.4 Pemanenan Proporsional

Pemanenan proporsional yaitu pemanenan dengan hasil panen yang meningkat secara proporsional setiap tahunnya. Diasumsikan usaha pemanenan tak konstan. Diasumsikan dengan usaha pemanenan tak konstan⁴

$$\begin{aligned}
 \frac{dx}{dt} &= Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda qx \left(a - \beta \frac{1}{x} \frac{dx}{dt}\right) \\
 &= Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda q \alpha x + \lambda q \beta x \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \\
 &= Rx - \frac{Rx^2}{K} - \lambda q \alpha x + \lambda q \beta x \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \\
 (1 - \lambda q \beta) \frac{dx}{dt} &= Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda q \alpha x \\
 \frac{dx}{dt} &= \frac{Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda q \alpha x}{(1 - \lambda q \beta)}
 \end{aligned} \tag{2.6}$$

dengan $\lambda q \beta \neq 1$.

Dimana,

λ = Laju pemanenan konstan yang berubah setiap tahun terhadap populasi ikan

α = Laju pertemuan dua individu terhadap populasi ikan

⁴ Dian Lestari, *Model Pemanenan dalam manajemen perikanan*. (Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2009).

β = Usaha pemanenan tak konstan populasi ikan

q = kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan

x = populasi ikan.

R = laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan.

2.5 Pemanenan Musiman

Pemanenan Musiman adalah pemanenan dengan hasil panen yang berubah setiap tahunnya, ada saat hasil panennya meningkat dan ada saat hasil panennya menurun. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh musim yang dirumuskan dengan fungsi periodik ($\lambda(t)$). Selanjutnya diasumsikan usaha pemanenan tak konstan, Adapun model pemanenan musiman yaitu

$$\frac{dx}{dt} = Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda(t)qx \left(a - \beta \frac{1}{x} \frac{dx}{dt}\right)$$

$$= Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda(t)qax + \lambda q \beta x \frac{1}{x} \frac{dx}{dt}$$

$$= Rx - \frac{Rx^2}{K} - \lambda(t)qax + \lambda q \beta$$

$$(1 - \lambda q \beta) \frac{dx}{dt} = Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda(t)qax$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \lambda(t)q\alpha x}{(1 - \lambda(t)qx\beta)} \quad (2.7)$$

dengan $\lambda(t)q\beta \neq 1$.

Dimana,

$\lambda(t)$ = fungsi periodik pemanenan dengan periode satu tahun terhadap populasi ikan

α = Laju pertemuan dua individu terhadap populasi ikan

β = Usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan

q = kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan

x = populasi ikan.

t = Waktu

R = laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan

2.4 Titik Tetap (ekuilibrium)

Misalkan suatu persamaan diferensial dinyatakan sebagai berikut.

$$\frac{dx}{dt} = y = f(x) \quad (2.8)$$

Titik ekuilibrium merupakan titik gerak dari vektor keadaan konstan. Atau dengan kata lain, titik ekuilibrium merupakan solusi yang tetap konstan walaupun waktu berganti. Maka titik ekuilibrium dari persamaan (2.8) didapat jika $\frac{dx}{dt} = 0$.

Contoh 2.4:

Misal $f(x) = x^2 - x - 6$, maka untuk mencari titik ekuilibriumnya adalah dengan cara $f(x) = 0$ sehingga diperoleh

$$f(x) = x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

Sehingga diperoleh titik ekuilibriumnya yaitu $x = 3$ dan $x = -2$.

2.5 Stabilitas

Titik ekuilibrium dikatakan stabil jika untuk sebarang syarat awal yang cukup dekat dengan titik ekuilibrium maka trayektori (kurva yang memotong tegak lurus kurva-kurva tersebut) dari penyelesaian tetap dekat dengan penyelesaian di titik ekuilibriumnya. Kestabilan suatu titik ekuilibrium dapat diperiksa dari akar karakteristik atau nilai eigen dengan menyelesaikan $|\lambda I - A| = 0$ dimana A merupakan matriks dari sistem persamaan diferensial yang linear dan berukuran $n \times n$. Sebagai contoh, tinjau contoh berikut.

Sistem linear

$$x_1 + 3x_2 = \lambda x_1$$

$$4x_1 + 2x_2 = \lambda x_2$$

Bisa ditulis dalam bentuk matriks sebagai

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Didapat $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$, dan $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Sehingga $\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 3 \\ 4 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$

Maka $|\lambda I - A| = 0$

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 3 \\ 4 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) - (4)(3) = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0$$

$$(\lambda + 2)(\lambda - 5) = 0$$

Sehingga nilai eigen dari A adalah $\lambda = -2$ dan $\lambda = 5$

Sifat stabilitas titik equilibrium berdasarkan tanda bagian real dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Stabil

Titik seimbang dikatakan stabil jika dan hanya jika akar karakteristiknya (nilai eigen) adalah real negatif atau mempunyai bagian real tak positif

2. Stabil Asimtotik

Titik *equilibrium* dikatakan stabil asimtotik jika hanya jika akar karakteristik (nilai eigen) adalah real dan negatif atau mempunyai bagian real negatif. Asimtotik terbagi menjadi dua yaitu asimtotik lokal dan asimtotik global. Kestabilan asimtotik lokal merupakan kestabilan dari sistem linear atau kestabilan dari linearisasi sistem tak linear. Kestabilan lokal pada titik *equilibrium* ditentukan oleh tanda bagian real dari akar-akar karakteristik sistem dari matriks Jacobian yang dihitung di sekitar titik *equilibrium*. Sedangkan titik *equilibrium* dikatakan stabil asimtotik global jika sebarang nilai awal yang

diberikan, maka setiap solusi pada sistem persamaan diferensial dengan sampai tak terhingga menuju titik *equilibrium*.

3. Tidak stabil

Titik setimbang dikatakan stabil jika hanya jika (nilai eigen) adalah real dan positif atau mempunyai paling sedikit satu nilai eigen dengan bagian real positif.⁵



⁵ Intan Juliah, “*Analisis Kestabilan Titik Keseimbangan Model Matematika Proses Transmisi Virus Dengue Di Dalam Tubuh Manusia Dengan Terapi Obat Herbal*”, Skripsi (Semarang: Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kajian pustaka yang bertujuan mengumpulkan beberapa literatur seperti buku-buku, data dari internet dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari tahun 2017.

C. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah untuk menyelesaikan model matematika kestabilan pemanenan ikan secara musiman dan proporsional adalah sebagai berikut:

1. Membuat asumsi model pemanenan ikan secara konstan, proporsional dan musiman. Asumsi ini secara esensial mencerminkan bagaimana peneliti berfikir sehingga model yang buat harus berjalan.
2. Memodifikasi model matematika pemanenan ikan secara konstan, proporsional dan musiman.
3. Menentukan titik tetap dan kestabilan titik tetap dari model matematika pemanenan ikan secara konstan, proporsional dan musiman.
4. Melakukan simulasi terhadap model matematika pemanenan ikan secara konstan, proporsional dan musiman dengan menggunakan aplikasi maple. Untuk melihat kestabilan titik tetap dan pengaruh perubahan parameter

kemampuan tangkap ikan dan parameter usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4.1 Asumsi

Pada bagian ini akan di bahas tentang Model matematika kestabilan pemanenan ikan secara konstan. Sebelum melakukan pemodelan, pertama-tama akan di buat beberapa asumsi terhadap kondisi ikan sebelum di lakukan pemanenan yaitu

1. Hanya satu jenis ikan yang dipelihara
2. Tidak terjadi interaksi mangsa pemangsa.

4.2 Memodifikasi Model

4.2.1 Pemanenan konstan

Pada penelitian ini penulis akan memodifikasi Model pemanenan konstan yang terdapat pada sub bab (2.5) dengan menambahkan parameter proporsi ikan yang terawat sebanyak (θ) maka populasi ikan yang berkurang karena tidak terawat sebanyak ($1 - \theta$) maka Model (2.5) menjadi

$$\frac{dx}{dt} = Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - (1 - \theta)x - qUx \quad (4.1)$$

$$= Rx - \frac{Rx^2}{K} - (1 - \theta)x - qUx \quad (4.2)$$

$$= R - \frac{2R}{K}x - (1 - \theta) - qU \quad (4.3)$$

Dimana,

R = laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

x = populasi ikan.

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan

q = kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan

U = Usaha pemanenan terhadap populasi ikan

θ = Proporsi ikan yang terawat terhadap populasi ikan.

Berdasarkan asumsi pada Model (4.1) hanya satu jenis ikan yang dipelihara sehingga fungsi yang digunakan hanya satu yaitu laju persediaan ikan dalam persatuan waktu $\left(\frac{dx}{dt}\right)$, kemudian tidak terjadi interaksi mangsa pemangsa, pada Model (4.1) hanya terdapat satu populasi ikan sehingga tidak terjadi mangsa pemangsa. Adanya laju pertumbuhan alamiah populasi ikan (Rx), adanya laju perkapita populasi ikan yang berkurang akibat keterbatasan daya dukung lingkungan untuk setiap bertambahnya populasi ikan $\left(1 - \frac{x}{K}\right)$, adanya proporsi ikan yang berkurang karena tidak terawat $(1 - \theta)$ sehingga mengakibatkan pertumbuhan populasi ikan berkurang. Kemudian adanya kemampuan tangkap ikan (q) dan usaha pemanenan (U) yang dilakukan sehingga pertumbuhan populasi ikan meningkat dan tidak terjadi kepunahan.

4.2.2 Penentuan Titik tetap

Untuk menentukan titik tetap dari Model pemanenan konstan yang diberikan oleh Persamaan (4.2) maka harus memenuhi syarat $\frac{dx}{dt} = 0$, sehingga diperoleh

$$Rx - \frac{Rx^2}{K} - (1 - \theta)x - qUx = 0 \quad (4.4)$$

$$x \left(R - \frac{Rx}{K} - (1 - \theta) - qU \right) = 0 \quad (4.5)$$

$$x \left(R - (1 - \theta) - qU - \frac{Rx}{K} \right) = 0 \quad (4.6)$$

$$x = \frac{0}{R - (1 - \theta) - qU - \frac{Rx}{K}}$$

$$x = 0$$

Karena populasi ikan bertambah maka diperoleh x yang lain dari Persamaan (4.6) sehingga diperoleh

$$\left(R - (1 - \theta) - qU - \frac{R}{K}x \right) = 0$$

$$R - (1 - \theta) - qU = \frac{R}{K}x$$

$$\frac{K}{R}(R - (1 - \theta) - qU) = x$$

$$K \left(\frac{R - (1 - \theta) - qU}{R} \right) = x$$

$$K \left(1 - \frac{(1 - \theta) + qU}{R} \right) = x$$

Jadi titik tetap dari model pemanenan konstan yaitu

$$x_1 = 0 \tag{4.7}$$

$$x_2 = K \left(1 - \frac{(1 - \theta) + qU}{R} \right) \tag{4.8}$$

4.2.3 Kestabilan titik tetap

Agar titik kestabilan dari pemanenan konstan tetap stabil maka harus memenuhi syarat $\frac{dx}{dt} < 0$. Dengan mensubstitusi $x_1 = 0$ ke Persamaan (4.3) maka diperoleh

$$R - \frac{2R}{K}(0) - (1 - \theta) - qU < 0$$

$$R - (0) - (1 - \theta) - qU < 0$$

$$R - (1 - \theta) - qU < 0$$

$$R < 0 + (1 - \theta) + qU$$

$$R < (1 - \theta) + qU \tag{4.9}$$


Selanjutnya dengan mensubstitusi $x_2 = K \left(1 - \frac{(1 - \theta) - qU}{R} \right)$ ke Persamaan (4.3) maka diperoleh

$$\begin{aligned}
R - \frac{2R}{K} \left(K \left(1 - \frac{(1-\theta) + qU}{R} \right) \right) - (1-\theta) - qU &< 0 \\
R - 2R \left(1 - \frac{(1-\theta) + qU}{R} \right) - (1-\theta) - qU &< 0 \\
R \left(1 - \left(2 - \frac{2(1-\theta) + 2qU}{R} \right) \right) - (1-\theta) - qU &< 0 \\
R \left(-1 - \frac{2(1-\theta) + 2qU}{R} \right) &< (1-\theta) + qU \\
R &< \left(\frac{(1-\theta) + qU}{\left(-1 - \frac{2(1-\theta) + 2qU}{R} \right)} \right). \tag{4.10}
\end{aligned}$$

4.2.4 Simulasi Pemanenan Konstan

Berikut ini adalah simulasi Model pencarian kestabilan titik tetap untuk pemanenan konstan. Dengan memisalkan nilai parameter yaitu $K = 1,0$; $R = 0,3$; $U = 1,15$; $\theta = 0,9$; dan $q = 0,10$; $0,20$; $0,36$; $0,42$.

Grafik dibawah adalah grafik pemanenan konstan .Pada grafik ini peneliti melakukan simulasi terhadap perubahan kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan dengan memisalkan nilai parameter.



Gambar 4.1. Grafik Perubahan kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan.

Berdasarkan grafik peneliti mencari titik kestabilan dari populasi ikan dengan memisalkan nilai parameter. Pada grafik di atas peneliti melakukan simulasi perubahan kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan, kemampuan tangkap ikan yang di simbolkan q . Berdasarkan gambar $q_1 = 0,10$ dengan warna hitam, $q_2 = 0,20$ dengan warna ungu, $q_3 = 0,36$ dengan warna hijau dan $q_4 = 0,42$ dengan warna biru.

Berdasarkan grafik perubahan kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan diperoleh hasil yaitu untuk $q = 0,10$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [0,283333333]$. Dapat dilihat bahwa untuk nilai parameter tersebut, grafik populasi ikan akan stabil di titik $x = [0,283333333]$ yang artinya ikan

tidak akan punah. Untuk $q = 0,20$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [-0,1000000000]$. Berdasarkan grafik populasi ikan akan stabil dititik $[0]$. Dapat dilihat pada grafik populasi ikan diatas pada saat $t = 100$ ikan hampir punah.. untuk $q = 0,36$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [-0,07133333333]$, berdasarkan grafik populasi ikan akan stabil dititik $[0]$. Dapat dilihat pada grafik populasi ikan diatas pada saat $t = 40$ ikan hampir punah. Untuk $q = 0,42$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [-0,9433333333]$. berdasarkan grafik populasi ikan akan stabil dititik $[0]$. Dapat dilihat pada grafik populasi ikan diatas pada saat $t = 20$ populasi ikan lebih cepat menuju kepunahan.

Kemampuan tangkap ikan pada pemanenan konstan sangat mempengaruhi pertumbuhan populasi ikan semakin tinggi nilai parameter kemampuan tangkap ikan semakin cepat ikan punah karena kemampuan tangkap ikan mempengaruhi positif terhadap banyaknya populasi ikan yang dipanen.

4.2.5 Pemanenan Proporsional

Pada bagian ini akan di bahas tentang model pemanenan proporsional. Sebelum melakukan pemodelan, pertama-tama akan di buat beberapa asumsi terhadap kondisi ikan sebelum di lakukan pemanenan yaitu

1. Hanya satu jenis ikan yang dipelihara
2. Tidak terjadi interaksi mangsa pemangsa
3. Kematian ikan terjadi secara alami.

Pada penelitian ini penulis akan memodifikasi Model (2.6) dengan menambahkan parameter proporsi ikan yang terawat sebanyak (θ) maka populasi ikan yang berkurang karena tidak terawat sebanyak ($1 - \theta$) maka Model (2.6) menjadi

$$\frac{dx}{dt} = \frac{Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - (1 - \theta)x - \lambda q \alpha x}{(1 - \lambda q \beta)} \quad (4.11)$$

$$= \frac{Rx - \frac{Rx^2}{K} - (1 - \theta)x - \lambda q \alpha x}{1 - \lambda q \beta} \quad (4.12)$$

$$= \frac{R - \frac{2R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda q \alpha}{1 - \lambda q \beta} \quad (4.13)$$

Dimana,

λ = Laju pemanenan konstan yang berubah setiap tahun terhadap populasi ikan

α = laju kematian terhadap populasi ikan

β = Usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan

q = kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan

x = populasi ikan.

R = laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan

θ = Proporsi ikan yang terawat terhadap populasi ikan.

Berdasarkan asumsi pada model (4.11) hanya satu jenis ikan yang dipelihara sehingga fungsi yang digunakan hanya satu yaitu laju persediaan ikan dalam persatuan waktu $\left(\frac{dx}{dt}\right)$, kemudian tidak terjadi interaksi mangsa pemangsa, pada model (4.11) hanya terdapat satu populasi ikan sehingga tidak terjadi mangsa pemangsa, kematian populasi ikan terjadi secara alami (α) yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Adanya laju pertumbuhan alamiah populasi ikan (Rx), adanya laju perkapita populasi ikan yang berkurang akibat keterbatasan daya dukung lingkungan untuk setiap bertambahnya populasi ikan $\left(1 - \frac{x}{K}\right)$, adanya proporsi ikan yang berkurang karena tidak terawat $(1 - \theta)$ sehingga mengakibatkan pertumbuhan populasi ikan berkurang. Kemudian adanya kemampuan tangkap ikan (q) yang mempengaruhi pertumbuhan populasi ikan, adanya Usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan (β) dan Laju pemanenan konstan yang berubah setiap tahun terhadap populasi ikan (λ).

4.2.6 Penentuan titik tetap

Untuk menentukan titik tetap dari Model pemanenan proporsional yang diberikan pada persamaan (4.12) maka harus memenuhi syarat $\frac{dx}{dt} = 0$, sehingga diperoleh

$$Rx - \frac{Rx^2}{K} - (1 - \theta)x - \lambda q \alpha x = 0$$

$$x \left(R - \frac{R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda q \alpha \right) = 0$$

$$x = 0 \text{ atau } \left(R - \frac{R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda q \alpha \right) = 0$$

$$(R - (1 - \theta) - \lambda q \alpha) = \frac{R}{K}x$$

$$\frac{K}{R}(R - (1 - \theta) - \lambda q \alpha) = x$$

Jadi titik tetap dari pemanenan proporsional yaitu

$$x_1 = 0 \tag{4.14}$$

$$x_2 = K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda q \alpha}{R} \right) \tag{4.15}$$

4.2.7 Kestabilan titik tetap

Agar titik kestabilan dari pemanenan proporsional stabil maka harus memenuhi syarat $\frac{dx}{dt} < 0$. Dengan mensubstitusi $x_1 = 0$ ke Persamaan (4.13) maka diperoleh

$$\frac{R - \frac{2R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda q \alpha}{1 - \lambda q \beta} < 0$$

$$\frac{R - \frac{2R}{K}(0) - (1 - \theta) - \lambda q \alpha}{1 - \lambda q \beta} < 0$$

$$\frac{R - (1 - \theta) - \lambda q \alpha}{1 - \lambda q \beta} < 0 \tag{4.16}$$

Selanjutnya dengan mensubstitusi $x_2 = K \left(\frac{R-(1-\theta)-\lambda q\alpha}{R} \right)$ ke Persamaan


(4.13) maka diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{R - \frac{2R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda q\alpha}{1 - \lambda q\beta} &< 0 \\ \frac{R - \frac{2R}{K} K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda q\alpha}{R} \right) - (1 - \theta) - \lambda q\alpha}{1 - \lambda q\beta} &< 0 \\ \frac{R - 2(R - 1 + \theta - \lambda q\alpha - (1 - \theta) - \lambda q\alpha)}{1 - \lambda q\beta} &< 0 \\ \frac{(R - 2R) + (2 - 1) + (-2\theta + \theta) + (2\lambda q\alpha - \lambda q\alpha)}{1 - \lambda q\beta} &< 0 \\ \frac{-R + 1 + (-\theta) + \lambda q\alpha}{1 - \lambda q\beta} &< 0 \end{aligned} \tag{4.17}$$

4.2.8 Simulasi Pemanenan Proporsional

Berikut ini adalah simulasi Model pencarian kestabilan titik tetap untuk pemanenan proporsional. Dengan memisalkan nilai parameter yaitu $K = 1,0$; $R = 0,5$; $\theta = 0,9$; $\alpha = 0,3$; $\lambda = 0,5$; $q = 0,8$; dan $\beta = 1,0$; $0,5$; $0,3$.

Grafik dibawah adalah grafik pemanenan proporsional .Pada grafik ini peneliti melakukan simulasi terhadap perubahan laju kelahiran ikan terhadap populasi ikan dengan memisalkan nilai parameter.



Gambar 4.2. Grafik Usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan.

Berdasarkan grafik peneliti mencari titik kestabilan dari populasi ikan dengan memisalkan nilai parameter. Pada grafik di atas peneliti melakukan simulasi usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan, usaha pemanenan tak konstan yang di simbolkan β . Berdasarkan gambar $\beta = 1$ dengan warna biru, $\beta = 0,5$ dengan warna ungu dan $\beta = 0,3$ dengan warna hijau.

Berdasarkan grafik di atas untuk usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan diperoleh hasil yaitu Untuk $\beta = 1,0; 0,5; 0,3$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [0,5600000000]$. Pada kasus ini populasi ikan stabil di titik tetap $[0,5600000000]$ Dapat dilihat pada grafik bahwa perubahan nilai usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan tidak berpengaruh signifikan

terhadap populasi ikan dan populasi ikan akan terus ada dan tidak punah, baik pada saat nilai populasinya 0,8 atau 0,4.

4.2.9 Pemanenan Musiman

Pada bagian ini akan di bahas tentang Model pemanenan proporsional. Sebelum melakukan pemodelan, pertama-tama akan di buat beberapa asumsi terhadap kondisi ikan sebelum di lakukan pemanenan yaitu

1. Hanya satu jenis ikan yang dipelihara
2. Tidak terjadi interaksi mangsa pemangsa
3. Kematian ikan terjadi secara alami.

Pada penelitian ini penulis akan memodifikasi Model (2.7) dengan menambahkan parameter proporsi ikan yang terawat sebanyak (θ) maka populasi ikan yang berkurang karena tidak terawat sebanyak ($1 - \theta$) maka Model (2.7) menjadi

$$\frac{dx}{dt} = \frac{Rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - (1 - \theta)x - \lambda(t)q\alpha x}{(1 - \lambda(t)qx\beta)} \quad (4.18)$$

$$= \frac{Rx - \frac{Rx^2}{K} - (1 - \theta)x - \lambda(t)q\alpha x}{1 - \lambda(t)q\beta} \quad (4.19)$$

$$= \frac{R - \frac{2R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} \quad (4.20)$$

Dimana,

$\lambda(t)$ = fungsi periodik pemanenan dengan periode satu tahun terhadap populasi ikan

α = laju kematian terhadap populasi ikan

β = Usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan

q = kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan

x = populasi ikan.

t = Waktu

R = laju pertumbuhan alamiah terhadap populasi ikan

K = Daya dukung lingkungan terhadap populasi ikan

θ = Proporsi ikan yang terawat terhadap populasi ikan.

Berdasarkan asumsi pada Model (4.18) hanya satu jenis ikan yang dipelihara sehingga fungsi yang digunakan hanya satu yaitu laju persediaan ikan dalam persatuan waktu $\left(\frac{dx}{dt}\right)$, kemudian tidak terjadi interaksi mangsa pemangsa, pada Model (4.18) hanya terdapat satu populasi ikan sehingga tidak terjadi mangsa pemangsa, kematian populasi ikan terjadi secara alami (α) yang mempengaruhi pertumbuhan populasi ikan. Adanya laju pertumbuhan alamiah populasi ikan (Rx), adanya laju perkapita populasi ikan yang berkurang akibat

keterbatasan daya dukung lingkungan untuk setiap bertambahnya populasi ikan $\left(1 - \frac{x}{K}\right)$, adanya proporsi ikan yang berkurang karena tidak terawat $(1 - \theta)$ sehingga mengakibatkan pertumbuhan populasi ikan berkurang. Kemudian adanya kemampuan tangkap ikan (q) yang mempengaruhi pertumbuhan populasi ikan, kematian terjadi secara alami (α). Adanya Usaha pemanenan tak konstan terhadap populasi ikan (β) dan fungsi periodik pemanenan dengan periode satu tahun terhadap populasi ikan ($\lambda(t)$).

4.2.10 Penentuan titik tetap

Untuk menentukan titik tetap dari Model pemanenan musiman yang diberikan pada persamaan (4.19) maka harus memenuhi syarat $\frac{dx}{dt} = 0$, sehingga diperoleh

$$Rx - \frac{Rx^2}{K} - (1 - \theta)x - \lambda(t)q\alpha x = 0$$

$$x \left(R - \frac{R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha \right) = 0$$

$$x = 0 \text{ atau } \left(R - \frac{R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha \right) = 0$$

$$(R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha) = \frac{R}{K}x$$

$$\frac{K}{R}(R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha) = x$$

Jadi titik tetap untuk pemanenan musiman yaitu

$$x_1 = 0 \quad (4.21)$$

$$x_2 = K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{R} \right) \quad (4.22)$$

4.2.11 Kestabilan titik tetap

Agar titik kestabilan dari pemanenan musiman stabil maka harus memenuhi syarat $\frac{dx}{dt} < 0$. Dengan mensubstitusi $x_1 = 0$ ke Persamaan (4.20) maka diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{R - \frac{2R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} &< 0 \\ \frac{R - \frac{2R}{K}(0) - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} &< 0 \\ \frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} &< 0 \end{aligned} \quad (2.23)$$

Selanjutnya dengan mensubstitusi $x_2 = K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{R} \right)$ ke Persamaan (4.20) maka diperoleh


$$\begin{aligned} \frac{R - \frac{2R}{K}x - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} &< 0 \\ \frac{R - \frac{2R}{K}K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{R} \right) - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} &< 0 \\ \frac{R - 2(R - 1 + \theta - \lambda(t)q\alpha) - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} &< 0 \end{aligned}$$

$$\frac{(R - 2R) + (2 - 1) + (-2\theta + \theta) + (2\lambda(t)q\alpha - \lambda(t)q\alpha)}{1 - \lambda q\beta}$$

$$\frac{-R + 1 + (-\theta) + \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} < 0 \quad (2.24)$$


4.2.12 Simulasi Pemanenan Musiman

Pada simulasi pemanenan musiman peneliti telah menetapkan nilai parameter yaitu $K = 1,0$; $R = 0,4$; $\theta = 0,9$; $\beta = 1,0$ dan $q = 0,1$; $0,3$; $0,9$; dengan fungsi pemanenan. Perhatikan grafik fungsi periodik pemanenan ($\lambda(t)$), pada kasus ini pemanenan ikan mengikuti fungsi periodik $\lambda(t) = \left(\frac{1+\sin(2\pi t)}{4}, t = 0,1.\right)$ dimana nilai terendah $\lambda(t) = 0$ dan nilai tertinggi $\lambda(t) = 0.5$. dimaksudkan bahwa dalam periode setahun ada jeda untuk tidak memanen dan ada batas maksimum proporsi populasi ikan yang dapat dipanen.



Gambar 4.3. Grafik fungsi periodik pemanenan.

Pada simulasi ini peneliti akan mencari pengaruh nilai q terhadap populasi ikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar 4.4. Grafik perubahan kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan.

Berdasarkan grafik peneliti mencari titik kestabilan dari populasi ikan dengan memisalkan nilai parameter. Pada grafik di atas peneliti melakukan simulasi perubahan kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan, kemampuan tangkap ikan yang di simbolkan q . Berdasarkan gambar $q_1 = 0,1$ dengan warna biru, $q_2 = 0,3$ dengan warna ungu dan $q_3 = 0,9$ dengan warna hijau.

Berdasarkan syarat kestabilan dari pemanena musiman $x_1 = 0$ dan

$$x_2 = K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{R} \right).$$

Ada 2 kriteria kestabilan untuk titik tetap $x_1 = 0$

Ada 2 kriteria kestabilan untuk titik tetap $x_2 = K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{R} \right)$

$$1. (-R + 1 + (-\theta) + \lambda(t)q\alpha) < 0 \ \& \ (1 - \lambda(t)q\beta) > 0$$

$$2. (-R + 1 + (-\theta) + \lambda(t)q\alpha) > 0 \ \& \ (1 - \lambda(t)q\beta) < 0$$

Dengan mensubstitusi nilai parameter ke syarat kestabilan di atas maka diperoleh

$$1. \text{ Untuk } K = 1,0; R = 0,4; \theta = 0,9; \beta = 1,0 \text{ dan } q = 0,1;$$

$$(R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha) > 0 \quad \& \quad (1 - \lambda(t)q\beta) > 0$$

$$(0,4) - (1 - 0,9) - (0,5)(0,1)(1) \quad | \quad 1 - (0,5)(0,1)(1)$$

$$0,25 > 0 \quad | \quad 0,95 > 0$$

$$2. \text{ Untuk } K = 1,0; R = 0,4; \theta = 0,9; \beta = 1,0 \text{ dan } q = 0,3;$$

$$(R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha) > 0 \quad \& \quad (1 - \lambda(t)q\beta) > 0$$

$$(0,4) - (1 - 0,9) - (0,5)(0,3)(1) \quad | \quad 1 - (0,5)(0,3)(1)$$

$$0,15 > 0 \quad | \quad 0,85 > 0$$

$$3. \text{ Untuk } K = 1,0; R = 0,4; \theta = 0,9; \beta = 1,0 \text{ dan } q = 0,9;$$

$$(R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha) > 0 \quad \& \quad (1 - \lambda(t)q\beta) > 0$$

$$(0,4) - (1 - 0,9) - (0,5)(0,9)(1) \quad | \quad 1 - (0,5)(0,9)(1)$$

$$-0,15 > 0 \quad | \quad 0,55 > 0$$

Ketiga kasus di atas memenuhi syarat kestabilan x_2 . Hal ini sesuai yang terlihat pada grafik simulasi populasi ikan di atas, bahwa populasi stabil di x_2 yang merupakan titik tetap berupa fungsi terhadap waktu.

B. Pembahasan

4.1 Pemanenan Konstan

Pada Model (4.1) merupakan pemanenan konstan dimana laju pertumbuhan persediaan ikan (dx/dt) adalah tingkat populasi ikan terhadap waktu pada suatu daerah tertentu. Model (4.1) menunjukkan laju pertumbuhan ikan sebesar (Rx) , merupakan laju pertumbuhan populasi ikan secara alami. Sedangkan laju perkapita populasi ikan berkurang sebesar $(1 - \frac{x}{K})$ untuk setiap bertambahnya populasi ikan, karena adanya keterbatasan daya dukung lingkungan. Terdapat proporsi ikan terawat dan tidak terawat sehingga mengakibatkan populasi ikan berkurang sebanyak $(1 - \theta)$ dalam satuan perwaktu. Selanjutnya terdapat kemampuan tangkap ikan sebanyak (q) yang mempengaruhi laju kelahiran dan kematian dari populasi ikan dan hasil pemanenan populasi ikan yang dijaga tetap konstan sebesar (U) .

Untuk menentukan kestabilan titik tetap Model pemanenan konstan, peneliti memisalkan nilai parameter yaitu $K = 1,0$; nilai daya dukung lingkungan pada kasus ini ditetapkan peneliti agar pencarian kestabilan proporsi populasi ikan stabil sedangkan untuk $R = 0,3$; $U = 1,15$; $\theta = 0,9$; dan $q = 0,10$; $0,20$; $0,36$; $0,42$ semua nilai parameter harus 0 sampai 1 tidak boleh lebih.

Dilihat dari grafik populasi ikan pemanenan konstan diperoleh hasil yaitu untuk $q = 0,10$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [0,2833333333]$.

Dapat dilihat bahwa untuk nilai parameter tersebut, grafik populasi ikan akan stabil di titik $x = [0,283333333]$ yang artinya ikan tidak akan punah. Untuk $q = 0,20$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [-0,1000000000]$. Berdasarkan grafik populasi ikan akan stabil dititik $[0]$. Dapat dilihat pada grafik populasi ikan diatas pada saat $t = 100$ ikan hampir punah.. untuk $q = 0,36$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [-0,07133333333]$, berdasarkan grafik populasi ikan akan stabil dititik $[0]$. Dapat dilihat pada grafik populasi ikan diatas pada saat $t = 40$ ikan hampir punah. Untuk $q = 0,42$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [-0,9433333333]$. berdasarkan grafik populasi ikan akan stabil dititik $[0]$. Dapat dilihat pada grafik populasi ikan diatas pada saat $t = 20$ populasi ikan lebih cepat menuju kepunahan.

Berdasarkan grafik populasi ikan untuk pemanenan konstan, semakin tinggi nilai q semakin cepat ikan punah karena kemampuan tangkap ikan mempengaruhi positif terhadap banyaknya populasi ikan yang dipanen.

4.2 Pemanenan Proporsional

Pada Model (4.11) merupakan pemanenan proporsional dimana laju pertumbuhan persediaan ikan (dx/dt) adalah tingkat populasi ikan terhadap waktu pada suatu daerah tertentu. Model (4.11) menunjukkan laju pertumbuhan ikan sebesar (Rx) , merupakan laju pertumbuhan populasi ikan secara alami. Sedangkan laju perkapita populasi ikan berkurang sebesar $(1 - \frac{x}{K})$ untuk setiap bertambahnya populasi ikan, karena adanya keterbatasan daya dukung lingkungan. Terdapat proporsi ikan terawat dan tidak terawat sehingga

mengakibatkan populasi ikan berkurang sebanyak $(1 - \theta)$ dalam satuan perwaktu. Selanjutnya terdapat kemampuan tangkap ikan sebanyak (q) yang mempengaruhi laju kelahiran dan kematian dari populasi ikan. Selanjutnya di asumsikan adanya pengaruh usaha pemanenan tak konstan yang dilambangkan (β) dan laju kematian yang dilambangkan (α) yang mengakibatkan kematian populasi ikan terjadi secara alami beserta (λ) yang merupakan laju pemanenan yang berubah secara konstan setiap tahunnya.

Untuk menentukan kestabilan titik tetap Model pemanenan proporsional, peneliti memisalkan nilai parameter yaitu $K = 1,0$; nilai daya dukung lingkungan pada kasus ini ditetapkan peneliti agar pencarian kestabilan proporsi populasi ikan stabil sedangkan untuk $R = 0,5$; $\theta = 0,9$; $\alpha = 0,3$; $\lambda = 0,5$; $q = 0,8$; dan $\beta = 1,0; 0,5; 0,3$. Semua nilai parameter harus 0 sampai 1 tidak boleh lebih.

Untuk simulasi populasi ikan dari pemanenan proporsional peneliti mengambil α fungsi konstan terhadap waktu. Untuk $\beta = 1,0; 0,5; 0,3$ diperoleh dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [0,5600000000]$. Populasi ikan stabil di titik tetap $[0,5600000000]$. Dapat dilihat pada grafik bahwa perubahan nilai β tidak berpengaruh signifikan terhadap populasi ikan dan populasi ikan akan terus ada dan tidak punah, baik pada saat nilai populasinya 0,8 atau 0,4.

4.3 Pemanenan Musiman

Pada Model (4.18) merupakan pemanenan proporsional dimana laju pertumbuhan persediaan ikan (dx/dt) adalah tingkat populasi ikan terhadap

waktu pada suatu daerah tertentu. Model (4.18) menunjukkan laju pertumbuhan ikan sebesar (Rx) , merupakan laju pertumbuhan populasi ikan secara alami. Sedangkan laju perkapita populasi ikan berkurang sebesar $\left(1 - \frac{x}{K}\right)$ untuk setiap bertambahnya populasi ikan, karena adanya keterbatasan daya dukung lingkungan. Terdapat proporsi ikan terawat dan tidak terawat sehingga mengakibatkan populasi ikan berkurang sebanyak $(1 - \theta)$ dalam satuan perwaktu. Selanjutnya terdapat kemampuan tangkap ikan sebanyak (q) yang mempengaruhi laju kelahiran dan kematian dari populasi ikan. Selanjutnya di asumsikan adanya pengaruh usaha pemanenan tak konstan yang dilambangkan (β) dan laju kematian yang dilambangkan (α) yang mengakibatkan kematian populasi ikan terjadi secara alami beserta $\lambda(t)$ yang merupakan fungsi periodik dengan periode satu tahun.

Untuk menentukan kestabilan titik tetap Model pemanenan musiman, peneliti memisalkan nilai parameter yaitu $K = 1,0$; nilai daya dukung lingkungan pada kasus ini ditetapkan peneliti agar pencarian kestabilan proporsi populasi ikan stabil sedangkan untuk $R = 0,4$; $\theta = 0,9$; $\beta = 1,0$ dan $q = 0,1$; $0,3$; $0,9$; semua nilai parameter harus 0 sampai 1 tidak boleh lebih.

Pada simulasi pemanenan musiman pengaruh perubahan nilai q terhadap populasi ikan dapat dilihat pada grafik yang diperoleh untuk $q = 0,1$ ada dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [0,6875000000 - 0,3926990817 \sin t]$, titik tetap yang kedua merupakan fungsi dari t . Jadi titik tetap ini akan berubah setiap waktu dan dapat dilihat bahwa populasi ikan stabil di titik tetap kedua, dimana ada selalu

ada perubahan untuk titik tetapnya. Untuk $q = 0,3$ dan $0,9$, pada kasus ini untuk nilai parameternya memiliki titik tetap yang sama yaitu $x = [0)$ dan $x = [0,5000000000 - 0,2500000000 \sin(6,283185307t)]$. Titik tetap yang kedua merupakan fungsi dari t . Jadi titik tetap ini akan berubah setiap waktu dan dapat dilihat bahwa populasi ikan stabil di titik tetap kedua, dimana ada selalu ada perubahan untuk titik tetapnya.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun kestabilan titik tetap dari pemanenan ikan secara konstan, proporsional dan musiman yaitu

a. Kestabilan titik tetap untuk pemanenan konstan yaitu

Untuk $x_1 = 0$ maka diperoleh titik tetap yaitu

$$R < (1 - \theta) + qU$$

Untuk $x_2 = K \left(1 - \frac{(1-\theta)-q}{R} \right)$ maka diperoleh titik tetap yaitu

$$R < \left(\frac{(1 - \theta) + qU}{\left(-1 - \frac{2(1 - \theta) + 2qU}{R} \right)} \right)$$

b. Kestabilan titik tetap untuk pemanenan proporsional yaitu

Untuk $x_1 = 0$ maka diperoleh titik tetap

$$\frac{R - (1 - \theta) - \lambda q \alpha}{1 - \lambda q \beta} < 0$$

Untuk $x_2 = K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda q \alpha}{R} \right)$ maka diperoleh titik tetap

$$\frac{-R + 1 + (-\theta) + \lambda q \alpha}{1 - \lambda q \beta} < 0$$

c. Kestabilan titik tetap untuk pemanenan musiman yaitu

Untuk $x_1 = 0$ maka diperoleh titik tetap

$$\frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} < 0$$

Untuk $x_2 = K \left(\frac{R - (1 - \theta) - \lambda(t)q\alpha}{R} \right)$ maka diperoleh titik tetap

$$\frac{-R + 1 + (-\theta) + \lambda(t)q\alpha}{1 - \lambda(t)q\beta} < 0$$

2. Berdasarkan simulasi populasi ikan pemanenan konstan, populasi ikan akan stabil di titik $x = [0,2833333333]$ yang artinya ikan tidak akan punah. Untuk simulasi populasi ikan dari pemanenan proporsional populasi ikan akan stabil di titik $x = [0,5600000000]$. Selanjutnya, untuk simulasi pemanenan musiman pengaruh perubahan nilai q terhadap populasi ikan dapat dilihat pada grafik yang diperoleh untuk $q = 0,1$ ada dua titik tetap yaitu $x = [0]$ dan $x = [0,6875000000 - 0,3926990817 \sin t]$.
3. Semakin tinggi nilai kemampuan tangkap ikan terhadap populasi ikan (q) semakin cepat ikan punah karena kemampuan tangkap ikan mempengaruhi positif terhadap banyaknya populasi ikan yang dipanen dan perubahan nilai β tidak berpengaruh signifikan terhadap populasi ikan dan populasi ikan akan terus ada dan tidak punah.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memodifikasi model pemanenan ikan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dicari solusi dari setiap model pemanenan ikan.



Daftar Pustaka

- Budi, Didit, Nugroho. *Persamaan Diferensial Biasa dan Aplikasinya*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:Perwakilan bagian percetakan dan penerbitan kementrian agama. 2002
- Haro Debi, Debora. *Dampak Kegiatan Budidaya Kermaab jarring Apung Terhadap Kualitas Air Danau Toba Dikecamatan Simalungun Sumatera Utara*. 2013.
- Juliah, Intan. "Analisis Kestabilan Titik Kesetimbangan Model Matematika Proses Transmisi Virus Dengue Di Dalam Tubuh Manusia Dengan Terapi Obat Herbal", Skripsi (Semarang: Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, 2015)
- Lestari, Dian. *Model Pemanenan dalam manajemen perikanan*. (Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor). 2009
- Marwan. (2009). *Persamaan diferensial*. Yogyakarta graha Ilmu
- Mustafa, Al-Maragi, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang:CV TOHA PUTRA. 1987
- Pagalay, Usman. *Mathematical Modeling aplikasi pada kedokteran,ilmunologi,Biologi dan perikanan*. UIN-Malang. 2009
- Prayudi. *Matematika Teknik Edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006
- Radhianti, Risya. *Simulasi dan Analisa Kestabilan Model Matematika Mengenai Proses Transmisi Virus Dengue Di Dalam Tubuh Manusia*. (Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Tekhnologi Universitas Islam Negeri Sunan Agung DJati Bandung, 2012).
- Sulasteri, Sri. (2014). *Persaman Diferensial Biasa*. Alauddin University Press.
- Toaha, Syamsuddin. *Pemodelan Matematika Dalam Dinamika Populasi*, Jl. Perintis Kemerdekaan 9 N0. 5A. Makassar :CV.21COM. 2013

L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A N S A R

A. Pemanenan Konstan

```
> restart : with(DEtools) : with(plots) : with(linalg) : with(DEtools) :  
with(LinearAlgebra) : with(VectorCalculus) :
```

```
# Model Pemanenan Konstan,  $U(t,x)=U$ 
```

```
model := [diff(x(t), t) = R·x(t) -  $\frac{R}{K}$  ·x(t)2 - (1 -  $\theta$ )·x(t) - q  
·U·x(t) ] :
```

```
# Menentukan Titik Tetap
```

```
TitikTetap := dsolve( [ R·x -  $\frac{R}{K}$  ·x2 - (1 -  $\theta$ )·x - q·U·x = 0 ],  
[x] ) :
```

```
#` Simulasi perubahan terhadap nilai q
```

```
> #Simulasi 1
```

```
> R := 0.3 : q1 := 0.10 : K := 1 : U := 1.15 :  $\theta$  := 0.9 :
```

```
> model1 := [ diff(x(t), t) = R·x(t) -  $\frac{R}{K}$  ·x(t)2 - (1 -  $\theta$ )·x(t)  
- q1·U·x(t) ] :
```

```
> #Koordinat Titik Tetap
```

```
> TitikTetap1 := solve( [ R·x -  $\frac{R}{K}$  ·x2 - (1 -  $\theta$ )·x - q1·U·x  
= 0 ], [x] )
```

```
TitikTetap1 := [[x = 0.], [x = 0.2833333333]]
```

```
> # Simulasi 2
```

```
> R := 0.3 : q2 := 0.20 : K := 1 : U := 1.15 :  $\theta$  := 0.9 :
```

```
> model2 := [ diff(x(t), t) = R·x(t) -  $\frac{R}{K}$  ·x(t)2 - (1 -  $\theta$ )·x(t)  
- q2·U·x(t) ] :
```

```
> TitikTetap2 := solve( [ R·x -  $\frac{R}{K}$  ·x2 - (1 -  $\theta$ )·x - q2·U·x  
= 0 ], [x] )
```

```
TitikTetap2 := [[x = 0.], [x = -0.1000000000]]
```

```
> #` Simulasi 3
```

```
> R := 0.3 : q3 := 0.36 : K := 1 : U := 1.15 :  $\theta$  := 0.9 :
```

```
> model3 := [ diff(x(t), t) = R·x(t) -  $\frac{R}{K}$  ·x(t)2 - (1 -  $\theta$ )·x(t)  
- q3·U·x(t) ] :
```

```
> TitikTetap3 := solve( { R*x - \frac{R}{K} * x^2 - (1 - \theta) * x - q3 * U * x
= 0 }, [x] )
```

```
TitikTetap3 := [[x = 0.], [x = -0.7133333333]]
```

```
> # Simulasi 4
```

```
> R := 0.3 : q4 := 0.42 : K := 1 : U := 1.15 : \theta := 0.9 :
```

```
> model4 := [ diff(x(t), t) = R * x(t) - \frac{R}{K} * x(t)^2 - (1 - \theta) * x(t)
- q4 * U * x(t) ] :
```

```
> TitikTetap4 := solve( { R*x - \frac{R}{K} * x^2 - (1 - \theta) * x - q4 * U * x
= 0 }, [x] )
```

```
TitikTetap4 := [[x = 0.], [x = -0.9433333333]]
```

B. Pemanenan Proporsional

```
> restart : with(DEtools) : with(plots) : with(linalg) :
with(LinearAlgebra) : with(VectorCalculus) :
```

```
# Model Pemanenan Proporsional,
```

```
model := [ diff(x(t), t) = \frac{R}{1 - \lambda * q * \beta} * x(t) - \frac{R}{K * (1 - \lambda * q * \beta)}
* x(t)^2 - \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda * q * \beta} * x(t) - \frac{\lambda * q * \alpha}{1 - \lambda * q * \beta} * x(t) ] :
```

```
#` Simulasi perubahan terhadap nilai q
```

```
> #Simulasi 1
> R := 0.5 : q := 0.8 : K := 1 : \theta := 0.9 : \lambda := 0.5 : \alpha := 0.3 : \beta1 := 1 :
```

```
> model1 := [ diff(x(t), t) = \frac{R}{1 - \lambda * q * \beta1} * x(t) - \frac{R}{K * (1 - \lambda * q * \beta1)}
* x(t)^2 - \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda * q * \beta1} * x(t) - \frac{\lambda * q * \alpha}{1 - \lambda * q * \beta1} * x(t) ] :
```

```
> #Koordinat Titik Tetap
```

```
> TitikTetap1 := solve( { \frac{R}{1 - \lambda * q * \beta1} * x - \frac{R}{K * (1 - \lambda * q * \beta1)} * x^2
- \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda * q * \beta1} * x - \frac{\lambda * q * \alpha}{1 - \lambda * q * \beta1} * x = 0 }, [x] )
```

```
TitikTetap1 := [[x = 0.], [x = 0.5600000000]]
```

```
> # Simulasi 2
```

> R := 0.5 : q := 0.8 : K := 1 : θ := 0.9 : λ := 0.5 : α := 0.3 : β2
:= 0.5 :

> model2 := $\left[\text{diff}(x(t), t) = \frac{R}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2} \cdot x(t) - \frac{R}{K \cdot (1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2)} \cdot x(t)^2 - \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2} \cdot x(t) - \frac{\lambda \cdot q \cdot \alpha}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2} \cdot x(t) \right] :$

> TitikTetap2 := solve $\left(\left\{ \frac{R}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2} \cdot x - \frac{R}{K \cdot (1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2)} \cdot x^2 - \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2} \cdot x - \frac{\lambda \cdot q \cdot \alpha}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 2} \cdot x = 0 \right\}, [x] \right)$

TitikTetap2 := [[x = 0.], [x = 0.5600000000Q]]

> #` Simulasi 3

> R := 0.5 : q := 0.8 : K := 1 : θ := 0.9 : λ := 0.5 : α := 0.3 : β3
:= 0.3 :

> model3 := $\left[\text{diff}(x(t), t) = \frac{R}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3} \cdot x(t) - \frac{R}{K \cdot (1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3)} \cdot x(t)^2 - \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3} \cdot x(t) - \frac{\lambda \cdot q \cdot \alpha}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3} \cdot x(t) \right] :$

> TitikTetap3 := solve $\left(\left\{ \frac{R}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3} \cdot x - \frac{R}{K \cdot (1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3)} \cdot x^2 - \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3} \cdot x - \frac{\lambda \cdot q \cdot \alpha}{1 - \lambda \cdot q \cdot \beta 3} \cdot x = 0 \right\}, [x] \right)$

TitikTetap3 := [[x = 0.], [x = 0.5600000000Q]]

C. Pemanenan Musiman

> restart : with(DEtools) : with(plots) : with(linalg) :
with(LinearAlgebra) : with(VectorCalculus) :

Model Pemanenan Musiman, $\lambda(t) = \frac{1 + \sin 2 \cdot \pi \cdot t}{4}$:

model := $\left[\text{diff}(x(t), t) = \frac{R}{1 - \lambda(t) \cdot q \cdot \beta} \cdot x(t) - \frac{R}{K \cdot (1 - \lambda(t) \cdot q \cdot \beta)} \cdot x(t)^2 - \frac{(1 - \theta)}{1 - \lambda(t) \cdot q \cdot \beta} \cdot x(t) - \frac{\lambda(t) \cdot q \cdot \alpha}{1 - \lambda(t) \cdot q \cdot \beta} \cdot x(t) \right] :$

$\lambda(t) = \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4}$:

#` Simulasi perubahan terhadap nilai q

> #Simulasi 1

> R := 0.4 : q1 := 0.1 : K := 1 : θ := 0.9 : α := 1 : β := 1 :

>

$$\begin{aligned}
 \text{modell} := & \left[\begin{aligned}
 \text{diff}(x(t), t) = & \frac{R}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta} \cdot x(t) \\
 & - \frac{R}{K \cdot \left(1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta\right)} \cdot x(t)^2 \\
 & - \frac{(1 - \theta)}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta} \cdot x(t) \\
 & - \frac{\frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \alpha}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta} \cdot x(t)
 \end{aligned} \right] :
 \end{aligned}$$

> #Koordinat Titik Tetap

>

$$\begin{aligned}
 \text{TitikTetap1} := & \text{solve} \left(\left[\begin{aligned}
 & \frac{R}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta} \cdot x \\
 & - \frac{R}{K \cdot \left(1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta\right)} \cdot x^2 \\
 & - \frac{(1 - \theta)}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta} \cdot x \\
 & - \frac{\frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \alpha}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q1 \cdot \beta} \cdot x = 0
 \end{aligned} \right], [x] \right)
 \end{aligned}$$

TitikTetap1 := [[x = 0.], [x = 0.6875000000 - 0.3926990817sin t]]

> # Simulasi 2

> R := 0.4 : q2 := 0.4 : K := 1 : θ := 0.9 : α := 1 : β := 1 :

$$\begin{aligned}
 > \text{model2} := \left[\begin{aligned}
 & \text{diff}(x(t), t) = \frac{R}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta} \cdot x(t) \\
 & - \frac{R}{K \cdot \left(1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta\right)} \cdot x(t)^2 \\
 & - \frac{(1 - \theta)}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta} \cdot x(t) \\
 & - \frac{\frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \alpha}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta} \cdot x(t) :
 \end{aligned} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 > \text{TitikTetap2} := \text{solve} \left(\left(\left[\begin{aligned}
 & \frac{R}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta} \cdot x \\
 & - \frac{R}{K \cdot \left(1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta\right)} \cdot x^2 \\
 & - \frac{(1 - \theta)}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta} \cdot x \\
 & - \frac{\frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \alpha}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q2 \cdot \beta} \cdot x = 0, [x]
 \end{aligned} \right] \right) \right)
 \end{aligned}$$

TitikTetap2 := [[x = 0.], [x = 0.5000000000
- 0.2500000000sin(6.283185307t)]]

> #`Simulasi 3 M A K A S S A R
> R := 0.4 : q3 := 0.9 : K := 1 : θ := 0.9 : α := 1 : β := 1 :

$$\begin{aligned}
 > \text{model3} := \left[\begin{aligned}
 & \text{diff}(x(t), t) = \frac{R}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta} \cdot x(t) \\
 & - \frac{R}{K \cdot \left(1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta\right)} \cdot x(t)^2 \\
 & - \frac{(1 - \theta)}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta} \cdot x(t) \\
 & - \frac{\frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \alpha}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta} \cdot x(t) :
 \end{aligned} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 > \text{TitikTetap3} := \text{solve} \left(\left(\left[\begin{aligned}
 & \frac{R}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta} \cdot x \\
 & - \frac{R}{K \cdot \left(1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta\right)} \cdot x^2 \\
 & - \frac{(1 - \theta)}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta} \cdot x \\
 & - \frac{\frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \alpha}{1 - \frac{1 + \sin(2 \cdot \pi \cdot t)}{4} \cdot q3 \cdot \beta} \cdot x = 0, [x]
 \end{aligned} \right] \right) \right)
 \end{aligned}$$

TitikTetap3 := [[x = 0.], [x = 0.1875000000
- 0.5625000000sin(6.283185307t)]]

M A K A S S A R



BIOGRAFI

Nama lengkap Susi Susanti atau biasa disapa Susi. Lahir di bulukumba, 15 Juni 1994 silam. Ia merupakan anak bungsu dari enam orang bersaudara. Pendidikan, Min Benjala pada pertengahan tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Bontobahari. Selama tiga tahun menjalani dibangku sekolah menengah pertama, akhirnya pada pertengahan tahun 2009 ia mampu menyelesaikannya dengan nilai yang baik. Ditahun yang sama ia melanjutkan ke sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Bontobahari yang sekarang berganti nama menjadi SMA Negeri 3 Bulukumba. Selama tiga tahun ia menuntut ilmu di sana, dan pada pertengahan tahun 2012 telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut. Dan sejak September 2012 lalu telah telah tercatat sebagai mahasiswi disalah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di Samata-Gowa. Sebagai seseorang yang ingin menjadi ingin menjadi ahli Matematika dan calon santis, tentunya memilih jurusan Matematika di fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan utamanya kuliah adalah untuk mendapatkan ilmu dan terlebih lagi agar dapat membahagiakan kedua orang tua, memberikan kebanggan tersendiri dalam hidupnya.

Pengalaman mengerjakan proposal ini sangat mengesankan, di dalamnya bercampur baur antara sedih dan bahagia. Semoga skripsi ini mampu memberi sumbangsi kepada siapa saja yang memerlukan.