

**PENERAPAN MODEL GARCH DALAM MENGUKUR
RISIKO BERINVESTASI**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar*

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ICAK FARIZAH
NIM. 60600113016

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Model GARCH dalam Mengukur Risiko Berinvestasi”, yang disusun oleh Saudari **Icak Farizah**, Nim: **60600113016** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **13 Februari 2018 M**, bertepatan dengan **27 Jumadil Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 13 Februari 2018 M
27 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T.
Sekretaris : Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
Munaqisy I : Irwan, S.Si., M.Si.
Munaqisy II : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.




Diketahui oleh:


Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk yang disebut bodynote atau daftar pustaka. Jika di kemudian hari apabila ada hasil jiplakan orang lain dalam skripsi ini maka penulis siap mempertanggungjawabkannya.

Samata-Gowa, Maret 2018



Icak Farizah

Nim: 60600113016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk yang disebut bodynote atau daftar pustaka. Jika di kemudian hari apabila ada hasil jiplakan orang lain dalam skripsi ini maka penulis siap mempertanggung jawabkannya.

Samata-Gowa, Maret 2018

Icak Farizah

Nim: 60600113016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila telah engkau selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (Q.S Al-Insyirah:6).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang menyayangiku, mendukung dan yang selalu memberikan dorongan dan motivasi terutama untuk ke dua orangtuaku tercinta Bapak Huraerah dan Ibu Nurlina beserta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa. Sahabat-sahabatku, Nursarina Basri dan Zurraedah yang senantiasa menjadi motivasi utama penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan SIGMA 2013 dan Almamaterku UIN Alauddin Makassar.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kesempatan, kesehatan dan kenikmatan yang telah Allah SWT karuniakan, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang karena berkat rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan draf proposal dengan judul “**Penerapan Model GARCH dalam Mengukur Risiko Berinvestasi**”. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menderang seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .

Penulisan skripsi ini memiliki banyak hambatan tanpa saran, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga semua hambatan dapat teratasi. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua penulis Huraerah dan Nurlina serta adek Ahmad Fauzi dan Rahmatullah Ramadhan yang telah banyak membantu dan mendidik penulis serta memberikan kasih sayang, cinta dan doa-doa yang tiada hentinya sehingga penulis kelak menjadi seseorang yang sukses di dunia maupun di akhirat.
3. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbasari, M.Si Rektor UIN Alauddin Makassar,

4. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Bapak Irwan. S.Si.,M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan mengarahkan untuk kelengkapan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Wahidah Alwi. S.Si.,M.Si., Sekertaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan mengarahkan untuk kelengkapan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si., Pembimbing II sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang tiada hentinya untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Adnan, S.Pd.,M.Si., sPenguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan mengarahkan untuk kelengkapan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu pada Staf dan Pengajar Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang namanya tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan do'a dan dorongan moral serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Serta segenap keluarga besar teman-teman SIGMA angkatan 2013 terutama teman-teman Int3grAl yang sama-sama berjuang mulai dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini dan semua pihak penulis tidak dapat di sebutkan satu persatu.

11. Semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan, materi maupun metode yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas perhatiannya penulis banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Samata-Gowa, Maret 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Penulis,
M A K A S S A R

Icak Farizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SIMBOL	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTARGAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Masalah	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Deret Waktu.....	8
B. ARIMA	8
C. Stasioneritas.....	15
D. ARCH/GARCH	24
E. VaR.....	31

F. Return.....	33
G. Volatilitas	34
H. Pasar Saham	35
I. Investasi.....	37
J. Risiko	40
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Waktu Penelitian	43
C. Jenis Data Dan sumber Data	43
D. Variabel Dan Defenisi Operasi Variabel.....	43
E. Prosedur Penelitian.....	44
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil.....	46
B. Pembahasan	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64
BIOGRAFI	65

DAFTAR SIMBOL

–	= Pengurangan
+	= Penjumlahan
×	= Perkalian
Z_t	= nilai variabel pada waktu ke t
c	= nilai variabel regresi
b_i	= koefisien regresi ($i = 1, 2, \dots, k$)
p	= orde AR
d	= orde <i>differencing</i> non-musiman
q	= orde MA
ϕ_p	= parameter yang menjelaskan AR
θ_q	= parameter yang menjelaskan MA
α_t	= sisaan acak pada waktu ke- t yang diasumsikan menyebar normal bebas stokastik
B	= operator <i>backshift</i>
Δ^n	= hasil <i>differencing</i> pada nilai ke- n
σ_t^2	= nilai ragam residual
α_0	= nilai konstanta
e_{t-1}^2	= kuadrat residual yang lalu
α_1	= nilai konstanta ke = (1, 2, ...)
α_p	= parameter ARCH, untuk $p = 1, 2, \dots, p$; dan $\alpha_p > 0$
λ_q	= parameter GARCH, untuk $p = 1, 2, \dots, q$; dan $\lambda_q > 0$

K = jumlah parameter dalam model

N = jumlah observasi (sampel)


S = Dana suatu saham/asset yang akan dialokasikan (Rp)

μ = Nilai rata-rata pada tabel

$\phi^{-1}(\alpha)$ = Nilai z-tabel


R_i = *Return* saham

P_t = Harga saham pada periode t



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Analisis Deskriptif	46
Tabel 4.2. Tabel <i>Correlogram of Return</i> PT. Telekomunikasi	49
Tabel 4.3. Estimasi Model ARIMA	50
Tabel 4.4. Uji ARCH-LM.....	53
Tabel 4.5. Pendugaan Parameter GARCH.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. *Plot* Data Harga Penutupan PT Telekomunikasi Tbk.....47

Gambar 4.2. Uji Normalitas Data Harga Penutupan PT Telekomunikasi Tbk...48



ABSTRAK

Nama : ICAK FARIZAH
NIM : 60600113016
Judul : Penerapan Model GARCH dalam Mengukur Risiko Berinvestasi

Skripsi ini membahas tentang data deret waktu. Dalam bidang keuangan pasar modal sering memiliki galat yang tak homogen (heteroskedastik), hal ini karena berhubungan dengan risiko yang memiliki aset, dimana semakin besar risiko akan semakin besar pengembalian yang diterima dan sebaliknya. Model yang cukup sederhana menggunakan informasi ragam galat sebelumnya untuk menghitung ragam galat saat ini adalah model GARCH. Tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan besaran kerugian yang diperoleh dalam risiko berinvestasi dengan menggunakan metode GARCH. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan digunakan model ARMA dan GARCH pada data *return* saham PT Telekomunikasi. Dari analisis yang digunakan, didapatkan model yang sesuai dengan data yaitu model ARMA(2,0,0) dan GARCH(1,1). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran kerugian yang diperoleh dalam risiko berinvestasi dengan menggunakan metode GARCH adalah dengan mengestimasi VaR bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% jika mengasumsikan besarnya investasi sebesar Rp 99.002,75 didapatkan kemungkinan kerugian sebesar Rp 9.769.050,9.

Kata Kunci : ARIMA, GARCH, Heteroskedastisitas, Return, VaR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia pasar modal banyak cara yang dapat dilakukan oleh investor salah satunya dengan melakukan investasi dan alternatif pendanaan yang dapat mengembangkan perusahaan di dunia nyata. Di pasar modal inilah setiap investor dapat memilih berbagai investasi yang ada, dimana setiap investasi memiliki karakteristik tersendiri dalam hal tingkat pengembalian risiko. Dengan itu, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dan memberikan investor tentang bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam waktu tertentu.

Saham lebih dikenal memiliki karakteristik *high risk-high return*. Artinya saham merupakan surat berharga yang dapat memberikan peluang keuntungan yang tinggi dan juga berpotensi risiko tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, harga saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian dalam waktu yang singkat. Jadi, bila investor memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk saham, maka yang perlu diperhatikan adalah tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh investor.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh investor dalam melakukan investasi misalnya dengan melakukan investasi di pasar modal. Pasar modal menjadi alternatif pendanaan dalam mengembangkan perusahaan dengan menjual surat berharga dalam bentuk instrumen keuangan melalui pasar modal. Di pasar modal inilah setiap investor dapat memilih berbagai investasi

yang ada, dimana setiap investasi memiliki karakteristik tersendiri dengan tingkat pengembalian dan risiko.

Di sektor keuangan seperti indeks saham dengan tingkat pengembalian risiko biasanya bersifat sangat acak (*random*) dan memiliki volatilitas yang tinggi atau varian *error* tidak konstan (heteroskedastisitas). Dengan itu dibutuhkan model yang dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar modal dalam bentuk lemah dengan kondisi heteroskedastisitas yaitu model GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*) dengan basis ekonometrika.

Model GARCH dapat memperlakukan heteroskedastisitas sebagai ragam untuk memodelkan, sehingga dapat memberikan hasil prediksi keragaman galatnya yang dapat diketahui, tidak hanya kekurangan pada metode kuadrat terkecil yang dapat terkoreksi, tetapi prediksi ragam galatnya juga dihitung. Firman Allah swt. QS Al-Baqarah (2:254 dan 275):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ

وَلَا خَلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989),h.42

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²

Dari Abu Hurairah *radliyallaahu ‘anhu*: Telah bersabda Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* yang artinya:

“Barangsiapa yang menjual dengan dua penjualan dalam satu transaksi, maka baginya harga yang terendah atau riba. [HR. Abu Dawud no. 3461, Ibnu Hibban no. 4974, Al-Haakim no. 2292, dan Al-Baihaqi 3/343; dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Ash-Shahiihah* no. 2326]”.³

Menurut Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah bila kita cermati ayat diatas mengandung makna yang sangat mendalam bahwa ketika Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang memakan riba, kondisi mereka seperti orang yang tidak memiliki ketenangan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989), h.69

³ Ilmu Tafsir, [HR. Abu Dawud no. 3461, Ibnu Hibban no. 4974, Al-Haakim no. 2292, dan Al-Baihaqi 3/343; dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Ash-Shahiihah* no. 2326]”.

dalam hidup, karena mereka, tenggelam dalam praktek riba yang melenakan, hingga tanpa perlu susah payah mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang menjanjikan. Hal inilah yang membuat mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk terus melakukan aktifitas mereka tanpa kenal lelah dan waktu sehingga mereka seperti orang yang gila dan kesurupan. Dengan itu, sama halnya dengan berinvestasi terhadap suatu saham karena dengan berinvestasi merupakan suatu hal yang baik dalam merencanakan kehidupan yang lebih baik kedepannya. Tapi dalam berinvestasi harus pula berhati-hati dalam melakukan investasi, jangan mudah percayakan saham kepada orang-orang yang tidak jelas agar tidak mendapat kerugian kedepannya.

Beberapa peneliti sebelumnya yang meneliti tentang model deret waktu yang berkaitan tentang heteroskedastisitas yaitu model ARCH yang dikenalkan pertama kali oleh Engle (1982). Model ini mampu menggambarkan karakteristik dalam keuangan yaitu tingkat pengembalian risiko. Sedangkan peneliti oleh Enders (1995) untuk menghindari ordo yang besar pada model ARCH, dan Bollerslev (1986) yaitu untuk mengembangkan model GARCH.⁴

Model GARCH dalam mengukur risiko berinvestasi terhadap suatu saham, dapat dilakukan pengukuran risiko secara kuantitatif yang mengestimasi potensi kerugian maksimal, yang mungkin terjadi pada masa

⁴ Engle RF, The Use of ARCH/GARCH Model in Applied Econometrics, “*Jurnal of Economic Perspectives*”, Volume 4.

yang akan datang dengan jangka waktu tertentu dan tingkat kepercayaan tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memilih judul “Penerapan Model GARCH dalam Mengukur Risiko Berinvestasi”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar kerugian yang diperoleh dalam mengukur risiko berinvestasi dengan menggunakan metode GARCH?

C. Tujuan

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan besaran kerugian yang diperoleh dalam risiko berinvestasi dengan menggunakan metode GARCH.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis: Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu telah diperoleh di bangku perkuliahan serta menambah wawasan penulis tentang penerapan model garch dalam mengukur risiko berinvestasi.
2. Bagi pembaca: Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

3. Bagi pustaka: Hasil penelitian ini dapat digunakan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperdalam wawasan keilmuan khususnya pada jurusan matematika mengenai masalah tentang tentang penerapan model garch dalam mengukur risiko berinvestasi.

E. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan ini lebih terarah pada permasalahan kerugian risiko dalam berinvestasi terhadap suatu saham.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan draft penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Pengertian Deret Waktu, ARIMA, Stasioneritas, ARCH/GARCH, Value at Risk (VaR), Return, Volatilitas, Pasar Saham, Investasi dan Risiko.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini dikemukakan metode penelitian yang berisi ruang jenis penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasi variabel, dan prosedur penelitian.


Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai penerapan model GARCH dalam mengukur risiko berinvestasi.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, sedangkan saran dibuat untuk penelitian lanjutan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Deret Waktu

Deret waktu (*time series*) merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan.

Tujuan analisis deret waktu antara lain untuk :

- a. Meramalkan kondisi di masa yang akan datang (*forecasting*)
- b. Mengetahui hubungan antara peubah
- c. Kepentingan kontrol (untuk mengetahui proses terkendali atau tidak).

B. ARIMA

Regresi merupakan suatu metode yang berupaya meramalkan variasi suatu peubah dari sejumlah faktor lain yang disebut peubah bebas. Bentuk umum sebuah model regresi untuk k peubah bebas adalah.

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon \quad (2.1)$$

Dimana ε merupakan peubah acak, parameter $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ adalah koefisien-koefisien regresi. Sedangkan X_1, X_2, \dots, X_k dapat berupa berbagai

faktor. Dan apabila peubah-peubah tersebut didefinisikan sebagai $X_1 =$

$Z_{t-1}, X_2 = Z_{t-2}, X_3 = Z_{t-3}, \dots, X_k = Z_{t-k}$, maka persamaan menjadi:

$$Z_t = c + b_1 Z_{t-1} + b_2 Z_{t-2} + \dots + b_k Z_{t-k} + b_t \quad (2.2)$$

Dimana:

Z_t = nilai variabel pada waktu ke t

c = nilai variabel regresi

$Z_{t-1}, Z_{t-2}, Z_{t-k}$ = nilai variabel pada waktu $t - 1, t - 2, t - k$

b_i = koefisien regresi ($i = 1, 2, \dots, k$)

Persamaan di atas merupakan nilai *time-lagged* dari peubah terikat, maka digunakan istilah *Autoregressive (AR)*. Dengan cara yang sama persamaan dapat ditulis dalam bentuk *moving average (MA)* yaitu:

$$Z_t = c + b_1 a_{t-1} + b_2 a_{t-2} + \dots + b_k a_{t-k} + a_t \quad (2.3)$$

Dimana a_t merupakan nilai galat (*error*) pada saat t . Hubungan ketergantungan antara nilai-nilai galat yang berurutan disebut model *Moving Average (MA)*. Dengan demikian model AR merupakan model yang menggambarkan hubungan antara peubah terikat Z dengan peubah bebas yang merupakan nilai Z pada waktu sebelumnya, sedangkan model MA adalah model yang menggambarkan ketergantungan peubah terikat Z terhadap nilai-nilai galat pada waktu sebelumnya yang berurutan.

Model-model yang dihasilkan dari data deret waktu dapat berupa model *Autoregressive (AR)*, *integrated (I)*, dan *Moving Average (MA)* atau kombinasi dari dua komponen model (*ARI, IMA, ARMA*) atau kombinasi dari tiga komponen dari tiga komponen model (*ARIMA*).

Secara umum bentuk model *ARIMA Box-Jenkins* atau *ARIMA (p,d,q)* adalah sebagai berikut:

$$\phi_p(B)(1 - B)^d Z_t = \theta_q(B) \alpha_t \quad (2.4)$$

Dimana:

p = orde AR

d = orde *differencing* non-musiman

q = orde MA

ϕ_p = parameter yang menjelaskan AR

θ_q = parameter yang menjelaskan MA

α_t = sisaan acak pada waktu ke- t yang diasumsikan menyebar normal bebas stokastik

B = operator *backshift*

$$\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)$$

$$\theta_q(B) = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q)$$

$\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_p$ adalah koefisien orde p

$\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_q$ adalah koefisien orde q

$(1 - B)^d$ adalah orde *differencing* non-musiman

$$\dot{Z}_t = Z_t - \mu$$

Z_t = besarnya pengamatan (kejadian) pada waktu ke- t

α_t = proses *white noise* atau galat pada waktu ke- t yang diasumsikan mempunyai rata-rata 0 dan variansi konstan σ_a^2 .

Model umum ARIMA (p, d, q) di atas merupakan proses campuran antar AR, MA disertai proses *differencing*.

Bentuk-bentuk dari model ARIMA (p, d, q), bentuk umum suatu proses *autoregressive* orde p , AR(p) adalah:

$$\dot{Z}_t = \phi_1 \dot{Z}_{t-1} + \phi_2 \dot{Z}_{t-2} + \dots + \phi_p \dot{Z}_{t-p} + a_t \quad (2.5)$$

Atau

$$(1 - \phi_1 B - \phi_1 B^2 - \dots - \phi_p B^p) \dot{Z}_t = a_t$$

$$\phi_p(B) \dot{Z}_t = a_t$$

Karena $\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_1 B^2 - \dots - \phi_p B^p)$ berhingga, tidak ada batasan yang dibutuhkan parameter dari proses *autoregressive* untuk menjamin *invertible*. Maka proses ini stasioner, akar-akar dari $\phi_p(B) = 0$ harus berada di luar lingkaran satuan. Selanjutnya proses *autoregressive* orde 1 atau AR(1) dan *autoregressive* orde (2) atau AR(2).

1. *Autoregressive* Orde 1, AR(1) atau ARIMA (1,0,0)

Suatu proses $\{Z_t\}$ dikatakan mengikuti model *autoregressive* orde 1 jika memenuhi:

$$(1 - \phi_1 B) \dot{Z}_t = a_t \text{ atau } \dot{Z}_t = \phi_1 \dot{Z}_{t-1} + a_t \quad (2.6)$$

Model AR(1) menandakan bahwa orde dari $p = 1, d = 0$ dan $q = 0$, sehingga bentuk umum persamaan tersebut dapat ditulis menjadi:

$$(1 - \phi_1 B)(1 - B)^0 \dot{Z}_t = a_t$$

$$(1 - \phi_1 B) \dot{Z}_t = a_t$$

$$\dot{Z}_t - \phi_1 B \dot{Z}_t = a_t \text{ dimana } B \dot{Z}_t = \dot{Z}_{t-1}$$

$$\dot{Z}_t - \phi_1 \dot{Z}_{t-1} = a_t$$

$$\dot{Z}_t = \phi_1 \dot{Z}_{t-1} + a_t$$

Rata-rata dari \dot{Z}_t dapat diperoleh melalui proses model AR(1):

$$(1 - \phi_1 B) \dot{Z}_t = a_t \text{ dimana } a_t \sim WN(0, \sigma_a^2)$$

$$\dot{Z}_t = \left(\frac{1}{1 - \phi_1 B} \right) a_t$$

$$= (1 + \phi_1 B + \phi_1^2 B^2 + \dots) a_t \text{ dengan syarat } |\phi_1|$$

$$= a_t + \phi_1 a_{t-1} + \phi_1^2 a_{t-2} + \dots$$

Jadi rata-rata (\dot{Z}_t)

$$E[\dot{Z}_t] = E[a_t + \phi_1 a_{t-1} + \phi_1^2 a_{t-2} + \dots]$$

$$= E(a_t + \phi_1 E(a_{t-1}) + \phi_1^2 E(a_{t-2}) + \dots)$$

$$= 0$$

a. Fungsi Autokorelasi Proses ARIMA (1,0,0) atau AR(1)

Fungsi Autokorelasi secara umum adalah:

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$$

$$\text{Var}(\dot{Z}_t) = \text{var}[a_t + \phi_1 a_{t-1} + \phi_1^2 a_{t-2} + \dots]$$

$$= \text{var}(a_t) + \phi_1^2 \text{var}(a_{t-1}) + \phi_1^4 \text{var}(a_{t-2}) + \dots$$

$$= \sigma_a^2 + \phi_1^2 \sigma_a^2 + \phi_1^4 + \dots$$

$$= \sigma_a^2 [1 + \phi_1^2 + \phi_1^4 + \dots]$$

$$\text{Var}(\dot{Z}_t) = \gamma_0 = \sigma_a^2 \left(\frac{1}{1 - \phi_1^2} \right).$$

$\text{Var}(\dot{Z}_t)$ berhingga dan tidak negative, haruslah $-1 < \phi_1 < 1$.

ketidaksamaan $-1 < \phi_1 < 1$ merupakan syarat deret waktunya

stasioner.

Autokovariansi γ_k dapat diperoleh dengan menggunakan aturan *Yule*

Walker yaitu:

1. Kalikan kedua ruas yaitu:

$$\dot{Z}_t (\dot{Z}_{t-k}) = (a_t + \phi_1 \dot{Z}_{t-1}) \dot{Z}_{t-k}$$

$$= a_t \dot{Z}_{t-k} + \phi_1 \dot{Z}_{t-1} \dot{Z}_{t-k}$$

2. Hitung nilai harapan

$$\begin{aligned}
 E[\dot{Z}_t \cdot \dot{Z}_{t-k}] &= E[a_t \dot{Z}_{t-k}] + \phi_1 \dot{Z}_{t-1} \dot{Z}_{t-k} \\
 &= 0 + \phi_1 E[\dot{Z}_{t-1} \dot{Z}_{t-k}] \\
 \gamma_k &= \phi_1 E[\dot{Z}_{t-1} \dot{Z}_{t-k}] \\
 \gamma_k &= \phi_1 \gamma_{k-1}
 \end{aligned}$$

Sehingga $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 \gamma_{k-1}}{\gamma_0}$

Jika $k = 0$ maka $\rho_0 = \frac{\gamma_0}{\gamma_0} = 1$

Jika $k = 1$ (pada *lag*1) maka:

$$\rho_1 = \frac{\phi_1 \gamma_{1-1}}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 \gamma_0}{\gamma_0} = \phi_1$$

Jika $k = 2$ (pada *lag*2) maka:

$$\rho_2 = \frac{\phi_1 \gamma_{2-1}}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 \gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 (\phi_1 \gamma_0)}{\gamma_0} = \phi_1^2$$

Jika $k = 3$ (pada *lag*3) maka:

$$\rho_3 = \frac{\phi_1 \gamma_{3-1}}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 \gamma_2}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 (\phi_1^2 \gamma_0)}{\gamma_0} = \phi_1^3$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dan seterusnya.

Seacara umum rumus untuk fungsi autokorelasi untuk AR(1)

adalah:

$$\rho_k = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ \phi_1^k, & k > 0 \end{cases} \quad (2.7)$$

Dari rumus umum fungsi autokorelasi untuk model AR(1) di atas terlihat bahwa nilai autokorelasi semakin kecil atau mendekati nol seiring bertambahnya $lag(k)$. dapat dikatakan bahwa bentuk fungsi autokorelasi dari model AR(1) turun secara eksponensial.

b. Fungsi Autokorelasi Parsial Proses ARIMA (1,0,0) atau AR(1)

Dengan menggunakan pendekatan *Durbin* maka, maka diperoleh nilai-nilai autokorelasi parsial sebagai berikut:

Untuk *lag* 1

$$\phi_{11} = \rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 \gamma_0}{\gamma_0} = \phi_1$$

Untuk *lag* 2

$$\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{\phi_1^2 - \phi_1^2}{1 - \phi_1^2} = \frac{0}{1 - \phi_1^2} = 0$$

$$\rho_{33} = \frac{\rho_3 - \rho_{21} \cdot \rho_2 - \rho_{22} \cdot \rho_1}{1 - \rho_{21} \cdot \rho_1 - \rho_{22} \cdot \rho_2}$$

$$= \frac{\phi_1^3 - \phi_1 \cdot \phi_1^2 - 0 \cdot \phi_1}{1 - \phi_1 \cdot \phi_1 - 0 \cdot \phi_1^2}$$

$$= \frac{0}{1 - \phi_1^2} = 0$$

Secara umum, AR(1) memiliki bentuk fungsi autokorelasi parsial sebagai berikut:

$$\rho_k = \begin{cases} \phi_1, & k = 1 \\ 0, & k > 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

Dari rumus umum di atas untuk model AR(1) tersebut terlihat bahwa nilai parsial autokorelasi yang signifikan berbeda dari nol hanya pada *lag* 1 saja.¹

Adapun bentuk diferensi proses ARIMA yaitu sebagai berikut:

¹ Aswi & Sukarna, 2006, “*Analisis Deret Waktu*”, (Andira Publisher: Makassar), h.35-42.

Suatu runtun waktu yang dihasilkan oleh proses ARIMA (p,d,q) dapat dinyatakan dalam bentuk observasi yang lalu dan sesatan yang lalu dan sekarang. Misalnya d=1, yakni:

$$z_t = (1 + \phi_1)z_{t-1} + (\phi_2 - \phi_1)z_{t-2} + \dots + (\phi_p - \phi_{p-1})z_{t-p} - \phi_p z_{t-p-1} + a_t + \phi_1 a_{t-1} + \dots + \theta_q a_{t-q} \quad (2.9)$$

Yang dikenal sebagai bentuk persamaan differensi model ARIMA (p,1,q). dengan itu. Bentuk inilah nanti yang akan digunakan untuk menghitung ramalan.

Sebagai contoh dalam bentuk persamaan diferensi proses ARIMA (1,1,1) dimana:

$$z_t = (1 + \phi_1)z_{t-1} - \phi_1 z_{t-2} + a_t + \theta_1 a_{t-1} \quad (2.10)$$

Jadi, proses ARMA (2,1) dengan $\phi_1 = 1 + \phi_1$ dan $\phi_2 = -\phi_1$ dan yang tidak memenuhi syarat-syarat stasioneritas. Demikian juga, bentuk persamaan differensi proses ARIMA (0,1,1) atau IMA (1,1) adalah:

$$z_t = z_{t-1} + a_t + \theta_1 a_{t-1}$$

Salah satu cara untuk melihat dari persamaan di atas adalah sebagai proses ARMA (1,1) nonstasioner dengan $\phi_1 = 1$. cara yang lain yaitu sebagai suatu random walk dengan suku *moving average* ($\theta_1 a_{t-1}$).²

C. Stasioneritas

Dalam mengasumsikan pembentukan model analisis deret waktu adalah deret waktu dikatakan stasioner, jika tidak ada perubahan kecenderungan dalam rata-rata dan perubahan variansi. Deret waktu yang

² Soejoeti, Zansawi, 1987, "Analisis Runtun Waktu", (Jakarta:Karunia Universitas Terbuka), h.48.

stasioner adalah relative tidak terjadi kenaikan atau penurunan nilai secara tajam pada data yang berada pada sekitar nilai rata-rata yang konstan.

Dalam menduga model *time series*, digunakan prosedur model ARIMA *Box Jenkins*. Data yang digunakan harus stasioner baik dalam *mean* maupun varians yaitu:

1. Fungsi *Autocorelation Function*(ACF)

Analisis deret waktu adalah koefisien autokeorelasi dengan deret waktu dengan selisih waktu (*lag*) 0,1,2,3 periode, atau lebih. Koefisien autokorelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi (hubungan linier) antara pengamatan pada waktu ke- t (Z_t) dengan pengamatan pada waktu sebelumnya ($Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}$). Untuk suatu data deret waktu (Z_1, Z_2, \dots, Z_n), maka nilai fungsi autokorelasinya adalah:

- a. Nilai autokorelasi *lag* k sampel

$$\begin{aligned} \gamma_k &= \text{corr}(Z_t, Z_{t-k}) \\ &= \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (Z_t - \bar{Z})(Z_{t-k} - \bar{Z})}{\sum_{t=1}^n (Z_t - \bar{Z})^2} \quad (2.11) \end{aligned}$$

- b. Taksiran kesalahan baku (*standard error*) dari γ_k

$$s_{\gamma_k} = \sqrt{\frac{1 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_j^2}{n}} \quad (2.12)$$

- c. Nilai statistik uji t untuk uji $\gamma_k = 0$ atau $\gamma_k \neq 0$

$$t_{\gamma_k} = \frac{\gamma_k}{s_{\gamma_k}} \quad (2.13)$$

Diagram fungsi autokorelasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kestasioneran data. Jika diagram ACF cenderung

turun lambat atau turun secara linear, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata.³

Suatu data *time series* dikatakan stasioner dalam varians apabila struktur data dari waktu ke waktu mempunyai data yang konstan dan tidak berubah-ubah. Dalam hal tersebut, maka digunakan plot *time series*, yaitu dengan menggunakan transformasi differensi dan transformasi log sebagai berikut:

a. Transformasi differensi

Transformasi differensi adalah salah satu transformasi yang sering digunakan dalam analisis data runtun waktu. Tujuan dari transformasi ini adalah membentuk barisan data runtun waktu yang bersifat stasioner, yakni untuk mencari komponen stasioner dari data yang memuat komponen musiman. Didefinisikan differensi orde 1 dari suatu data runtun waktu Z_t dengan persamaan:

$$\Delta Z_t = (1 - B)Z_t = Z_t - Z_{t-1} \quad (2.14)$$

Dengan:

$$(B^j Z)_t = Z_{t-j} \quad (2.15)$$

Persamaan di atas merupakan operator *Backward* orde ke- j .

Sedangkan differensi orde n didefinisikan sebagai:

$$\begin{aligned} \Delta^n Z_t &= (1 - B)^n Z_t \\ &= (1 - B)^{n-1} Z_t ((1 - B)Z_t) \end{aligned} \quad (2.16)$$

³Aswi & Sukarna, 2006, "*Analisis Deret Waktu*", (Andira Publisher: Makassar), h.7-14.

b. Transformasi log

Transformasi log adalah salah satu jenis transformasi yang sering digunakan dalam analisis data runtun waktu dan juga digabungkan dalam melakukan differensi terhadap data hasil logaritma.

Untuk melakukan differensi orde n terhadap data log (Z_t), maka persamaannya adalah:

$$\Delta^n \log(Z_t) = \Delta^{n-1}(\log(Z_t) - \log(Z_{t-1})).^4 \quad (2.17)$$

Dimana:

Δ^n =hasil differencing pada nilai ke- n

Δ^{n-1} =hasil differencing pada nilai ke- $n - 1$

Z_t =observasi pada periode waktu ke- t

Z_{t-1} =observasi pada periode waktu ke- $t - 1$

2. Fungsi Autokorelasi Parsial (PACF)

PACF digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (*association*) antara Z_t dan Z_{t-k} , apabila ada pengaruh dari lag waktu 1,2,3, ... $k - 1$ dianggap terpisah. PACF adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antar pengamatan pada waktu ke $t(Z_t)$ dengan pengamatan pada waktu yang sebelumnya ($Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}$).

Rumus umum dari PACF adalah:

$$\phi_{kk} = \text{corr}(Z_t, Z_{t-k} | Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k+1}). \quad (2.18)$$

Nilai ϕ_{kk} ditentukan oleh *Yule Walker* yaitu:

⁴Rosadi, 2012, "Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews", (Andi: Yogyakarta), h.24-25.

$$\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k}, \text{ untuk } j = 1, 2, \dots, k. \quad (2.19)$$

Untuk $j = 1, 2, \dots, k$, berlaku persamaan berikut:

$$\rho_1 = \phi_{k1}\rho_0 + \phi_{k2}\rho_1 + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-1}$$

$$\rho_1 = \phi_{k1}\rho_1 + \phi_{k2}\rho_0 + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-2}$$

$$\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots$$

$$\rho_k = \phi_{k1}\rho_{k-1} + \phi_{k2}\rho_{k-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_0 \quad (2.20)$$

Sistem persamaan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan *cramer*. Persamaan untuk $j = 1, 2, 3, \dots, k$ digunakan untuk mencari nilai-nilai eigen autokorelasi parsial lag k yaitu $\phi_{k1}, \phi_{k2}, \dots, \phi_{kk}$.

a. Lag pertama ($k = 1$) dan $j = 1$

Untuk lag pertama ($k = 1$) dan $j = 1$ diperoleh sistem persamaan $\rho_1 = \phi_{11}\rho_0$, karena $\rho_0 = 1$, sehingga $\phi_{11} = \rho_0$, yang berarti bahwa fungsi autokorelasi parsial pada lag pertama yang akan sama dengan fungsi autokorelasi pada lag pertama.

b. Lag kedua ($k = 2$) dan $j = 1, 2$

Untuk Lag kedua ($k = 2$) dan $j = 1, 2$ diperoleh persamaan

$$\rho_1 = \phi_{11}\rho_0 + \phi_{22}\rho_1$$

$$\rho_1 = \phi_{11}\rho_0 + \phi_{22}\rho_0 \quad (2.21)$$

Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk matriks yaitu:

$$\begin{bmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{11} \\ \phi_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{bmatrix}$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{bmatrix}$, dan dengan menggunakan aturan Cramer

adalah:

$$\phi_{22} = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} \quad (2.22)$$

c. Lag kedua ($k = 3$) dan $j = 1, 2, 3$

Untuk Lag kedua ($k = 3$) dan $j = 1, 2, 3$ diperoleh sistem persamaan:

$$\rho_1 = \phi_{11}\rho_0 + \phi_{22}\rho_1 + \phi_{33}\rho_2$$

$$\rho_2 = \phi_{11}\rho_0 + \phi_{22}\rho_1 + \phi_{33}\rho_1$$

$$\rho_3 = \phi_{11}\rho_0 + \phi_{22}\rho_1 + \phi_{33}\rho_0$$

Persamaan di atas dinyatakan dalam bentuk matriks yaitu:

$$\begin{bmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{11} \\ \phi_{22} \\ \phi_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \rho_3 \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{bmatrix}$, $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{bmatrix}$, dengan menggunakan aturan

cramer diperoleh:

$$\phi_{kk} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2}\rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-3}\rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{k-4}\rho_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2}\rho_{k-3} & \dots & \rho_1\rho_k & \vdots \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2}\rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-3}\rho_{k-2} \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{k-4}\rho_{k-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2}\rho_{k-3} & \dots & \rho_1 & 1 \end{bmatrix}} \quad (2.25)$$

Dengan ϕ_{kk} disebut PACF antara Z_t dan Z_{t-k} . Himpunan dari $\phi_{kk}, \{\phi_{kk}; k = 1, 2, \dots\}$ disebut *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Fungsi ϕ_{kk} akan menjadi notasi standar untuk autokorelasi parsial antara observasi Z_t dan Z_{t-k} dalam analisis time series. Fungsi ϕ_{kk} akan bernilai 0 untuk $k > p$. sifat ini dapat diidentifikasi melalui model AR dan MA, yaitu pada model *Autoregressive* berlaku ACF akan menurun secara bertahap menuju 0 dan *Moving Average* berlaku ACF menuju ke 0 setelah lag ke q sedangkan PACF model AR yaitu $\phi_{kk} = 0, k > p$ dan model MA yaitu $\phi_{kk} = 0, k > q$.⁵

3. Proses White Noise

Suatu proses a_t dinamakan proses WN (proses yang bebas dan identik) jika bentuk peubah acak yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Rata-rata $E(a_t) = \mu_a$ dari proses ini diasumsikan bernilai nol dan mempunyai variansi ang konstan yaitu $\text{var}(a_t) = \sigma_t^2$ dan kovariansi untuk proses ini $\gamma_k = \text{cov}(a_t a_{t+k}) = 0$ untuk $k \neq 0$.

⁵Wei, William W.S, 2006, "Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods", (Pearson: New York),h.11.

Suatu proses White Noise (a_t) dikatakan stasioner dengan beberapa sifat berikut:

a. Fungsi autokovariansi

$$\gamma_k = \begin{cases} \sigma_a^2, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

b. Fungsi autokorelasi

$$\rho_k = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

c. Fungsi autokorelasi parsial

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

Dengan demikian suatu deret waktu disebut proses *White Noise*

Jika rata-rata dan variansinya konstan dan saling bebas.

4. Differencing

Orde d pada ARIMA (p,d,q) digunakan untuk memodelkan

kejadian yang tidak stasioner dalam rata-rata, dimana d

menyatakan *differencing*. Secara umum *differencing* yang

menghasilkan suatu kejadian (proses) baru yang stasioner,

adalah:

$$W_t = (1 - B)^d Z_t \quad (2.26)$$

Dimana:

$$d = 1, 2, \dots$$

$B = \text{Backshift operator}$ (operator mundur) yang

didefinisikan bahwa $B^d = Z_{t-d}$

Dengan adanya *differencing* pada model ARIMA maka aspek-aspek *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA) hanya dapat diterapkan pada data dret waktu yang stasioner.⁶

5. Transformasi

Apabila kondisi proses stasioner dalam variansi tidak diperoleh maka dilakukan transformasi pangkat (*power transformasion*), yang diperkenalkan oleh Boc dan Cox. Transformasi dapat didefenisikan sebagai berikut:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{Z_t^{(\lambda)} - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \log(x), & \lambda = 0 \end{cases}$$

Dimana:

λ =sebagai parameter transformasi.⁷

D. ARCH/GARCH

Model ARCH (*Autoregressive conditional Heteroscedastisity*) yang dikembangkan oleh *Engle* dimana rata-rata dan ragam suatu data dengan deret waktu yang dimodelkan secara simultan dengan ragam residual yang berubah-ubah karena ragam residual tidak hanya fungsi dari peubah bebas tetapi juga tergantung seberapa besar residual dimasa lalu. Untuk menjelaskan model terbentuknya ARCH, misalnya terdapat model regresi univariat dengan persamaan berikut:

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t \quad (2.27)$$

⁶Aswi & Sukarna, 2006, "*Analisis Deret Waktu*", (Andira Publisher:Makassar), h.19-21.

⁷ Mutiah Salamah, Suhartono,2003 "*Time Series Analisis*", (Surabaya:Institut Teknologi), h.81.

Pada data *cross section*, heteroskedastitas yang terjadi berhubungan langsung dengan peubah bebas, sehingga untuk mengatasi hanya perlu melakukan transformasi persamaan regresi. Namun dalam model ARCH, heteroskedastisitas terjadi karena data deret waktu memiliki volatilitas yang tinggi. Adapun persamaan ragam residual dalam model ARCH dapat ditulis sebagai berikut:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 \quad (2.28)$$

Dimana:

σ_t^2 = nilai ragam residual

α_0 = nilai konstanta

e_{t-1}^2 = kuadrat residual yang lalu

α_1 = nilai konstanta ke = (1,2, ...)

Pada persamaan di atas, model ARCH(1) karena ragam dari residual e_t tergantung hanya dari fluktuasi residual kuadrat satu periode yang lalu.

Jika ragam residual e_t tergantung dari fluktuasi residual kuadrat dari periode yang lalu (*lag p*), maka model ARCH(p) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \alpha_2 e_{t-2}^2 + \dots + \alpha_p e_{t-p}^2 \quad (2.29)$$

Sedangkan pada model GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity*) oleh *Bollerslev* bahwa ragam residual tidak hanya tergantung dari residual periode lalu tetapi juga ragam residual periode yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, *Bollerslev* kemudian mengembangkan

model ARCH dengan memasukkan unsur residual periode lalu dan ragam residual. Maka model persamaan umum GARCH adalah:

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \lambda_1 \sigma_{t-1}^2 \quad (2.30)$$

Model persamaan di atas disebut model GARCH(1,1) karena ragam residual hanya dipengaruhi oleh residual satu periode sebelumnya dan ragam residual satu periode sebelumnya. Jika ragam residual dipengaruhi oleh residual p periode sebelumnya (*lag* p unsur ARCH) dan ragam residual q periode sebelumnya (*lag* q unsur GARCH), maka model GARCH(p,q) adalah:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \dots + \alpha_p e_{t-p}^2 + \lambda_1 \sigma_{t-1}^2 + \dots + \lambda_q \sigma_{t-q}^2 \quad (2.31)$$

Dimana:

σ_t^2 = kondisional varians

α_0, α_1 = konstanta

e_{t-p}^2 = kesalahan/error/residual pada bulan $t - p$

σ_{t-q}^2 = kondisional varians pada bulan $t - q$

α_p = parameter ARCH, untuk $p = 1, 2, \dots, p$; dan $\alpha_p > 0$

λ_q = parameter GARCH, untuk $q = 1, 2, \dots, q$; dan $\lambda_q > 0$.⁸

Adapun langkah-langkah dalam membangun model ARCH-GARCH adalah:

⁸Bambang Juanda, Junaidi, 2012, "Ekonometrika Deret Waktu", (Institut Pertanian Bogor:Press),h.94-96.

1. Meregresikan residual kuadrat melalui *Corelogram* dengan menggunakan konstanta dan nilai residual sampai lag ke- q , $a_{t-1}^2, a_{t-2}^2, a_{t-3}^2$. Sehingga membentuk persamaan regresi berikut:

$$a_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q a_{t-q}^2 + e_t \quad (2.32)$$

Dengan $t = q + 1, \dots, T$. Nilai m dapat ditentukan sesuai dengan hasil plot ACF dan PACF residual kuadrat. Kemudian akan menghasilkan nilai R^2 yang akan digunakan untuk menguji hipotesis yaitu:

$$H_0: a_1 = a_2 = \dots = a_q = 0$$

$$H_1: a_i \neq 0, \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, q$$

Jika nilai hasil perkalian antara T (banyaknya observasi) dengan R^2 lebih besar dari nilai tabel $X_{\alpha; q}^2$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki efek model ARCH dan GARCH atau bersifat *heteroskedasticity*.

2. Melakukan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang merupakan suatu uji terhadap kehadiran unsur *heteroskedasticity*. Residual yang diperoleh dari model ARIMA dikuadratkan yaitu:

$$a_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 \quad (2.33)$$

$H_0: a_1 = a_2 = \dots = a_p = 0$ (tidak terdapat efek ARCH/GARCH dalam residual sampai lag ke- p)

$H_1: \exists a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, p$ (terdapat efek ARCH/GARCH dalam residual).

Adapun prosedur untuk LM adalah:

Dengan sampel besar, persamaan (2.29) akan mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas = p

$$(n - p)R^2 \sim X_p^2 \quad (2.34)$$

Jika X^2 hitung lebih besar dari nilai kritis X^2 pada tingkat kepercayaan tertentu, tolak hipotesis (H_0). Dengan itu, menunjukkan adanya unsure dalam model ARCH/GARCH.

3. Apabila diketahui bahwa terdapat efek ARCH-GARCH maka selanjutnya adalah penentuan orde ARCH/GARCH berdasarkan plot PACF dari residual a_t^2 . Jadi, apabila residual a_t^2 mengikuti pola AR maka residual mengikuti model ARCH.
4. Langkah berikutnya adalah penaksiran dan uji signifikansi parameter ARCH-GARCH dengan menguji validasi model menggunakan uji LM.
5. Langkah terakhir adalah peramalan nilai σ_t^2 berdasarkan nilai galat runtun waktunya.⁹

Metode GARCH dilakukan melalui 2 proses yaitu proses *mean* dan proses *variance*. Proses *mean* pertama kali dikemukakan oleh *Box-Jenkins* dengan melakukan analisa *time series* dengan kombinasi *autoregressive* (AR) dan *moving average* (MA). Metode ini kemudian diintegrasikan menjadi ARMA untuk mendapatkan *time series* yang stasioner. *Bollerslev* menyempurnakan hasil kerja Engle dengan memasukkan proses AR dalam *heteroscedasticity* dari varians ke dalam *Generalised Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity* (GARCH).

Dalam menentukan orde GARCH langkah pertama dalam proses ARIMA adalah identifikasi. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah

⁹ Jurnal Sains dan Seni ITS, 2012, http://www.distrodoc.com/499012-analisis-volatulitas-saham-perusahaan-go-public-dengan-metode-ARCH_GARCH, vol.1,h.260.

data yang diamati bersifat stasioner. Jika tidak stasioner, lakukan proses diferensi sampai dengan data bersifat stasioner. Setelah itu membuat correlogram sebaran data untuk menentukan orde autoregresif dan orde moving average. Orde yang dipilih adalah kelambanan waktu yang koefisien autoregresif dan koefisien autoregresif parsial yang signifikan. Penentuan orde (kelambanan waktu) untuk AR dan MA dilakukan dengan cara coba-coba (*trial and error*).¹⁰

Model GARCH digunakan untuk model yang taklinier dalam ragam. Model ini dikembangkan dari model ARCH oleh *Bollerslev*. Dalam model ini, varians kondisional tidak hanya dipengaruhi oleh residual yang lampau tetapi juga oleh lag varians kondisional itu sendiri. Dengan demikian varians kondisional pada model GARCH terdiri atas dua komponen, yakni komponen lampau dari residual kuadrat (dinotasikan dengan derajat p) dan komponen lampau dari varians kondisional (dinotasikan dengan derajat q).

Adapun dalam bentuk matematis yaitu:

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^p a_i u_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2 \quad (2.35)$$

Dengan:

u_t^2 = kuadrat sisaan pada waktu t

σ_t^2 = ragam pada waktu t

Jika $q = 0$ maka diperoleh model ARCH *Engle*, sementara jika $p = q = 0$, dimiliki proses *white noise* dengan varian ω . Disini terlihat bahwa

¹⁰Engle, Robert dkk, 1994, "*ARCH Models*", (Elsivier Science B.V. California), h. 142.

meskipun proses bersifat tidak berkorelasi namun proses q_t ini tidak bersifat independen.¹¹

Berdasarkan model GARCH tersebut maka dapat diketahui bahwa proses u_t dapat didefinisikan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$u_t = \sigma_t v_t \quad (2.36)$$

Dimana σ_t adalah akar dari σ_t^2 dan v_t adalah proses berdistribusi normal standar $N(0,1)$.

Adapun koefisien-koefisien dari model GARCH (p, q) bersifat sebagai berikut:

$$\omega > 0 \quad (2.37)$$

$$\alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, p \quad (2.38)$$

$$\beta_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, q \quad (2.39)$$

$$\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (\alpha_i + \beta_j) < 1 \quad (2.40)$$

Kondisi persamaan (37) diperlukan agar model bersifat stasioner, sedangkan persamaan (38,39) dan (40) diperlukan agar $\sigma_t^2 > 0$.¹²

Model GARCH digunakan untuk model yang terbaik yaitu model AIC dan SIC sebagai berikut:

¹¹Ariefianto, M.D. 2012. "Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews", (Jakarta: Erlangga), h.98.

¹² Rosadi D, 2012, "Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews", (Andi: Yogyakarta), h.241.

1. Uji Akaike Information Criterion (AIC)

AIC digunakan untuk memilih model terbaik. Jika dua model dibandingkan, maka model dengan nilai AIC terkecil merupakan model yang lebih baik. Rumusan AIC adalah sebagai berikut :

$$AIC = \left(e^{\frac{2k}{n}} \right) \left(\frac{\sum e_i^2}{n} \right) = \left(e^{\frac{2k}{n}} \right) \left(\frac{SSE}{n} \right) \quad (2.41)$$

Di mana :

$$SSE = SumSquareError = \sum e_i^2 = \sum (\hat{Z}_i - Z_i)^2$$

K = jumlah parameter dalam model

n = jumlah observasi (sampel)

2. Uji Schwarz Information Criterion (SIC)

Kegunaan SIC pada prinsipnya tidak berbeda dengan AIC. Semakin kecil nilai AIC dan SIC maka semakin baik sebuah model. SIC digunakan untuk menentukan panjang lag atau lag yang optimum. Rumusan SIC adalah sebagai berikut:

$$SIC = \left(n^{\frac{k}{n}} \right) \left(\frac{\sum e_i^2}{n} \right) = \left(n^{\frac{k}{n}} \right) \left(\frac{SSE}{n} \right) \quad (2.42)$$

Di mana :

$$SSE = SumSquareError = \sum e_i^2 = \sum (\hat{Z}_i - Z_i)^2$$

K = jumlah parameter dalam model

n = jumlah observasi (sampel) ¹³

E. Value at Risk (VaR)

Secara umum VaR didefinisikan suatu batas risiko harga suatu saham yang dapat dilihat nilai maksimum besaran uang yang mungkin hilang

¹³ Ade Irma Aprilia, "Analisis Model Neuro-Garch Dan Model Backpropagation Untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan", Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), h.20-21

darisuatunya pada suatu waktu atau periode tertentu, pada tingkat kepercayaan yang diberikan.

VaR memiliki hubungan yang erat dengan metode GARCH, yang sering digunakan jika terjadi ketidakhomogenan ragam dari data tingkat pengembalian dan dapat menduga volatilitas yang akan datang. Hal tersebut adalah salah satu kelebihan dari metode ARCH/GARCH dibandingkan dengan pendugaan ragam biasa, yang tidak mampu melakukan pendugaan yang akan datang.

Secara matematis VaR dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$VaR(\alpha) = S\{\mu \times \phi^{-1}(\alpha)\sigma_t\} \quad (2.43)$$

Dengan:

VaR = Besarnya risiko tingkat kepercayaan sebesar (α)

S = Dana suatu saham/asset yang akan dialokasikan (Rp)

μ = Nilai rata-rata pada tabel

$\phi^{-1}(\alpha)$ = Nilai z-tabel

σ_t = Akar bersyarat ke-t yang diperoleh dari model.

Di dalam teori investasi dikatakan bahwa setiap saham akan menghasilkan return dan risiko. *Return* merupakan tingkat pengembalian dari nilai investasi yang diserahkan oleh investor, sedangkan risiko adalah perbedaan return yang diharapkan dengan *return* yang terealisasi dari saham tersebut. Jadi hubungan antara risiko investasi dan return saham adalah dua sisi dalam mata uang dimana return yang tinggi akan mempunyai risiko yang tinggi dan *return* yang rendah akan mempunyai risiko yang rendah

juga. Artinya, dalam berinvestasi disamping menghitung *return* yang diharapkan, investasi juga harus memperhatikan risiko yang ditanggungnya.¹⁴

Jumlah kerugian yang harus dilakukan oleh investor sangat besar disebabkan lemahnya manajemen risiko keuangan sehingga sejak saat itu banyak institusi keuangan dan regulator di hampir seluruh dunia mulai beralih menggunakan VaR. Pertimbangan lain pemilihan metode VaR karena mudah perhitungannya dan merupakan metode kuantitatif dalam menilai *market risk*. Metode ini menghitung nilai VaR berdasarkan pada nilai return, nilai aset dan korelasi antar aset tunggal. Metode ini mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal dan return portofolio bersifat linier terhadap return aset tunggalnya. Kedua faktor ini menyebabkan estimasi yang lebih rendah terhadap potensi volatilitas (standar deviasi) aset atau portofolio di masa depan.

F. Return

Return suatu saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan dengan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam suatu periodic tertentu. Maka dapat ditulis rumus yaitu:

¹⁴ Siti Komariah, dkk. “*Return Saham, Inflasi, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Risiko Investasi*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, vol.15, No.3 September 2011, hlm.376-391 terakreditasi SK.No.64a/DIKTI/Kep/2010.

$$R_i = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\% \quad (2.44)$$

Keterangan:

R_i = Return saham

P_t = Harga saham pada periode t

P_{t-1} = Harga saham pada periode t-1

Investor akan mengambil keputusan untuk membeli saham jika suatu saham diprediksi akan meningkat, sehingga investor tersebut akan mendapatkan tingkat pengembalian yang melebihi standar minimum *return* yang mereka tetapkan. Ketika saham diprediksi akan naik dan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi investor, maka permintaan terhadap suatu saham akan meningkat. Dan sebaliknya jika suatu saham diprediksi tidak akan memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, maka permintaan akan suatu saham akan menurun. Para investor akan cenderung menjual saham yang mereka anggap tidak mampu memenuhi tingkat pengembalian yang mereka harapkan. Hal ini dapat menyebabkan harga saham turun.¹⁵

G. Volatilitas

Volatilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar harga dapat meningkat dalam suatu periode waktu tertentu. Volatilitas dari pengembalian harga saham dapat mempresentasikan risiko pengembalian harga suatu saham. Model volatilitas merupakan komponen pembentuk dalam perhitungan *Value at Risk*. Terdapat berbagai cara dalam mengukur volatilitas,

¹⁵Jurnal akuntansi dan keuangan, 2005, <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?-%7CStudi+Empiris+terhadap+dua+factor+yang+mempengaruhi+return+saham.>, vol.7, h.101.

masing-masing memiliki karakter berbeda yang berdampak terhadap taraf akurasi pendugaan.¹⁶

Data deret waktu pada analisis keuangan biasanya memiliki ragam pengembalian harga saham yang tidak konstan pada tiap titik waktunya. Peubah-peubah pada dasar keuangan umumnya memiliki tiga karakteristik diantaranya:¹⁷

- a. Sebaran dari data deret waktu keuangan seperti pengembalian harga saham pada waktu ke- t (Z_t) yang memiliki suatu nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebaran normal.
- b. Nilai dari (Z_t) tidak memiliki autokorelasi yang tinggi, tetapi nilai dari Z_{t^2} memiliki autokorelasi yang tinggi.
- c. Perubahan pada nilai (Z_t) cenderung menyebar pada suatu titik.

H. Pasar saham

Saham merupakan surat berharga atau bukti posisi kepemilikan seseorang dalam perusahaan dan pemilik saham berhak atas keuntungan dari perusahaan dan besarnya keuntungan yang didapat sesuai dengan besarnya jumlah saham yang dimiliki. Disamping itu saham biasa juga memiliki hak untuk memilih (*vote*) untuk keputusan-keputusan yang memerlukan pemungutan suara seperti pembagian deviden, pengangkatan direksi dan komisaris. Saham yang dapat dijadikan wahana investasi adalah yang dikenal

¹⁶ Engle RF, *The Use of ARCH/GARCH Model in Applied Econometrics*, Jurnal of Economic Perspectives 4, (2001):h,157-158.

¹⁷ Lo MS, *GARCH Time Series Model*, thesis Departement of Statistic and Actuarial Science, Simon Fraser University, 2003.

sebagai emisi efisien yang diperdagangkan secara umum, yaitu saham yang tersedia bagi masyarakat.¹⁸

Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh *return* tidak normal (*abnormal return*), setelah disesuaikan dengan risiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Definisi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien harga-harga sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang sekuritas tersebut.

Berdasarkan tingkat penyerapan informasinya terdapat tiga bentuk efisiensi pasar yang dikenal dengan hipotesis pasar efisien, yaitu :

a. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa harga saham merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan masa lalu. Berdasarkan pada hipotesis pasar efisien bentuk lemah, pasar akan mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya.

b. Hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa harga saham mencerminkan harga saham historis dan informasi publik yang tersedia di pasar, termasuk didalamnya adalah laporan keuangan dan informasi tambahan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan. Berlawanan dengan pendukung hipotesis pasar

¹⁸ Bakasenjaya Ramadhona, 2004, "Analisis Risiko Investasi dengan Pendekatan Model ARCH-GARCH dan Pendugaan Harga Saham dengan Pendekatan Model Time Series pada Perusahaan Agribisnis Terpilih di PT. Bursa Efek Jakarta", (Bogor: Institut Pertanian Bogor), h.26.

efisien bentuk lemah, dalam pasar efisien bentuk semi kuat ada banyak investor yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan pengamatan secara seksama terhadap informasi publik yang tersedia di pasar.

c. Hipotesis pasar bentuk kuat

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi non publik/privat. Dalam pasar efisien bentuk kuat tidak ada seorangpun baik individu, maupun institusi dapat memperoleh *abnormal return*, untuk suatu periode tertentu, dengan menggunakan informasi yang tersedia dipublik dalam konteks kelebihan informasi.¹⁹

I. Investasi

Investasi adalah suatu komitmen sejumlah dana pada satu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai bentuk penanaman modal dengan memperoleh penghasilan di dalam perusahaan dengan tujuan agar kekayaan perusahaan bertambah.²⁰

Seseorang yang memutuskan untuk berinvestasi, maka secara otomatis yang bersangkutan tidak hanya berharap untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus siap menanggung segala kemungkinan akibat dari keputusan tersebut. Keuntungan yang diharapkan oleh investor yang dilakukan oleh aktivitas investasi, dapat berbentuk keuntungan modal yang berinvestasi pada saham.

¹⁹Hartono J, 2010, "Teori Portofolio dan Analisis Investasi", (Edisi Keenam. BPFE Yogyakarta), h.154.

²⁰ Reilly, F.K, 1989, "Investment Analysis and Portofolio Management" ,(The Dryden Press. New York), h.11.

Investor mendapatkan kemungkinan memperoleh dividen. Keuntungan modal yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh karena harga jual lebih tinggi daripada harga perolehan (pembelian). Selain kemungkinan diperolehnya kerugian modal yaitu suatu situasi dimana harga jual aset yang dimiliki lebih rendah daripada harga perolehan. Sedangkan dividen adalah diterima jika investor memiliki saham perusahaan tertentu dan perusahaan tersebut membagi sebagian dari laba bersihnya kepada pemegang saham.²¹

Adapun pembagian jenis-jenis investasi yaitu:

a. Autonomous investment

Autonomous investment (investasi otonom) adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, tetapi dapat bergeser ke atas atau ke bawah karena adanya perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat teknologi, kebijaksanaan pemerintah, harapan pengusaha dan sebagainya.

b. Public investment

Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah dan tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersifat personal.

c. Gross investment

²¹ Tatang Ary Gumanti, 2011, "Manajemen Investasi Konsep, Teori dan Aplikasi", (Jakarta: Mitra Wacana Media), h.3.

Gross investment (investasi bruto) adalah total seluruh investasi yang dilaksanakan pada suatu negara selama periode waktu yang ditentukan dengan tidak peduli jenis investasi yang akan dilaksanakan.²²

Secara umum, proses investasi dapat dikelompokkan ke dalam lima tahap utama yaitu:

1. Sifat investor

Sifat-sifat investor merupakan investor individu yang menetapkan kebijakan investasinya dimana kebijakan tersebut dalam bentuk tertulis, yang menggambarkan secara rinci tujuan dan batasan-batasan investasi dan mengandung tingkat pengembalian yang disyaratkan dan toleransi terhadap risiko.

2. Sarana investasi

Sarana investasi adalah fasilitas untuk seorang investor dapat menempatkan dana atau modalnya dalam rangka memperoleh peluang untuk meningkatkan kemakmurannya.

3. Pengembangan strategi

Pengembangan strategi adalah upaya yang harus dilakukan oleh seorang investor dalam rangka mengoptimalkan pembatasan berbagai sarana investasi dan karakteristik investor. Investor biasanya mencari suatu strategi yang mampu memberikan *return* harapan maksimum dengan pembatas-pembatas yang disyaratkan. Investasi terhadap risiko dan *return* merupakan suatu hal yang mutlak oleh seorang investor, karena

²²Suherman Rosyidi, 2014, "Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Teori Ekonomi Mikro dan Makro", (Jakarta: Rajawali Pers), h.188-192.

dapat memperhatikan tinggi rendahnya risiko dan *return* potensi kerugian dan juga keuntungan dapat dikendalikan.

4. Penerapan strategi

Penerapan strategi adalah proses pemilihan aset terputuskan kemudian investor baru memasuki tahapan penempatan strategi dalam kehidupan nyata atas keberhasilan penetapan atas keputusan alokasi aset yang tidak mudah dilakukan.

5. Strategi monitoring

Monitoring atas kinerja strategi adalah upaya untuk senantiasa mencermati pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Dalam hal ini, investor dituntut untuk terus melakukan evaluasi secara *periodic* atas investasinya. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perubahan kejadian lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan sekaligus jumlah akhir dari investasi kita.²³

J. Risiko

Risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian, yang biasanya diukur dalam bentuk kemungkinan (*probability*) bahwa beberapa hasil akan muncul yang bergerak dalam kisaran sangat baik (misalnya asetnya berlipat ganda) kesangat buruk (misalnya, asetnya tidak bernilai sama sekali). Bila investor menanamkan modal untuk mendirikan usaha, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan di masa depan, tetapi pada waktu yang sama juga memahami adanya risiko menerima kurang dari yang diharapkan. Makin

²³ Tatang Ary Gumanti, 2011, "*Manajemen Investasi Konsep, Teori dan Aplikasi*", (Jakarta: Mitra Wacana Media),h.12-15

besar kemungkinan rendahnya keuntungan atau bahkan rugi, maka makin besar risiko usaha tersebut.²⁴

Dalam manajemen investasi, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian actual, semakin besae penyimpangannya berarti semakin besar tingkat risikonya.

Apabila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka risiko dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Investor yang menyukai risiko

Apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih tinggi. Biasanya investor jenis ini bersifat agresif dan spekuatif dalam mengambil keputusan investasi karena mereka tahu bahwa hubungan tingkat pengembalian dan risiko adalah positif.


b. Investor yang netral terhdap risiko

Apabila investor yang akan meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor jenis ini umumnya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

²⁴ Iman soeharto, 1997, "*Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional*." (Jakarta:Erlangga),,h.. 439.

c. Investor yang tidak menyukai risiko

Investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih rendah dan lebih cenderung mempertimbangkan keputusan investasinya secara matang dan terencana.²⁵



²⁵Abdul Halim, 2005, “*Analisis Investasi*”,(Jakarta:Salemba Empat),h.42.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian terapan.

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini terhitung pada bulan Agustus - Desember 2017.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari harga penutupan bulanan data saham tahunan PT.Telekomunikasi di <https://finance.yahoo.com> yang dimulai pada awal tahun 2007-2016.

D. Variabel dan Defenisi Operasi Variabel

a. Variabel

Z_t = Return penutupan harga saham

b. Defenisi Operasi Variabel

Return penutupan harga saham (Z_t) yaitu untuk menghitung berapa besar kerugian apabila nilai harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian yang diperoleh tiap tahunnya.

E. *Prosedur Penelitian*

Prosedur penelitian ini untuk mendapatkan besaran keuntungan dan kerugian yang diperoleh dalam risiko berinvestasi dengan menggunakan metode GARCH. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Melakukan analisis data saham.
2. Plot data saham.
3. Didapatkan residual kuadrat melalui *Corelogram* yang menampilkan autokorelasi (ACF) dan autokorelasi parsial (PACF) dari *error* kuadrat dan perhitungan Ljung-Box Q statistik sampai lag tertentu. Jika koefisien ACF dan PACF signifikan secara statistik, berarti model mengandung ARCH.
4. Membuat model ARIMA *Box-Jenkins* dan memilih model terbaik pada model ARIMA dengan melihat nilai SICnya, dimana semakin kecil nilai SICnya maka semakin baik model tersebut untuk dilanjutkan.

Karena nilai $F\text{-Statistic} > \chi^2 = \text{tolak } H_0$

$F\text{-Statistic} < \chi^2 = \text{terima } H_0$

5. Melakukan uji Lagrange Multiplier (LM) yang merupakan suatu uji kehadiran unsur *heteroskedasticity*, dan jika terdapat heteroskedastisitas maka pemodelan GARCH dapat dilakukan.

$H_0: a_1 = a_2 = \dots = a_p = 0$ (tidak terdapat efek ARCH/GARCH dalam residual sampai lag ke- p)

$H_1: \exists a_i \neq 0$ (terdapat efek ARCH/GARCH dalam residual)

Taraf signifikan (α) = 0,05

6. Penaksiran dan uji signifikansi parameter ARCH/GARCH dengan menguji validasi model dengan menggunakan uji *Maximum Log Likelihood*.
7. Meramalkan nilai σ_t^2 berdasarkan nilai galat runtun waktunya.
8. Melakukan perhitungan VaR dengan menentukan nilai presentasi kerugian yang didapatkan dari hasil peramalan yang diperoleh akan datang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis hasil data saham


Dalam analisis pertama data yang akan diperoleh adalah data mengenai statistika deskriptif. Analisis deskriptif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam melakukan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 1 Januari 2007 sampai 1 Desember 2016. Pada periode tersebut terdapat 120 bulan perdagangan pada harga penutupan harga saham. Hasil deskriptif data saham pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Analisis Deskriptif Data Harga Saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Close	120	1080	4310	2148,13	739,681
Valid N (listwise)	120				

Selama periode tahun 2007 sampai 2016 terdapat 120 data harga saham. Data tersebut memiliki standar deviasi sebesar Rp 739,681 dan mean sebesar 2148,13 sehingga nilai indeks ini memiliki variasi dari nilai rata-ratanya yang cukup tinggi. Kemudian rata-rata harga saham penutupan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar 2148,13. Hal ini menunjukkan data tersebut tidak stasioner karena nilai rata-rata dan variannya cenderung berubah-ubah.

Standar deviasi (σ) adalah seberapa besar atau kemungkinan nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Semakin besar nilai Standar deviasi maka semakin besar kemungkinan nilai data yang diharapkan. Untuk mengubah data penutupan harga saham tersebut data time series dari non-stasioner menjadi stasioner berdasarkan data penutupan harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk yang terdapat pada lampiran maka dilakukan Program Minitab yang dapat diperoleh sebagai berikut:




Gambar 4.1. *Plot* Data Harga Penutupan PT Telekomunikasi Tbk

Pada Gambar di atas dapat menunjukkan bahwa data time series tersebut tidak stasioner, karena pergerakan harga saham untuk periode 1 Januari 2007 sampai 1 Desember 2016 mengalami penurunan setiap bulan. Maka dari itu, data tersebut tidak berada di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Selanjutnya pada data close dianalisis kembali untuk mendapatkan hasil data dari *return* melalui *microsoft office excel*, kemudian setelah itu dilakukan uji stasioner.

4.1.2 Plot data saham

Sebelum dilakukan transformasi dalam aplikasi *SPSS* ke dalam bentuk data saham *return*, terlebih dahulu diuji kenormalan datanya agar tidak ada unsur keraguan hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini. Sehingga untuk melakukan uji normalitas data penutupan harga saham PT Telekomunikasi Tbk yang sesuai data pada lampiran dengan menggunakan *Software Minitab* yaitu:



Gambar 4.2. Uji Normalitas Data Harga Penutupan PT Telekomunikasi Tbk

Pada Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Sminorv (KS) sebesar 0,067 dan nilai *p-value* sebesar 0,150, maka perbandingan nilai *p-value* dengan taraf signifikan (α) adalah $0,150 > 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data harga saham penutupan PT Telekomunikasi Tbk berdistribusi normal atau *stasioner*.

4.1.3 Melakukan residual kuadrat melalui *correlogram* melalui model *Box-Jenkins*.

Penerapan model autoregresif mensyaratkan bahwa data yang digunakan adalah data yang stasioner. Data dinyatakan stasioner jika nilai rata-rata dan

varian dari data tersebut tidak mengalami perubahan secara sistematis sepanjang waktu. Model AR dan MA yang digunakan untuk menguji stasioneritas data pada penelitian ini adalah dengan melihat *correlogram* melalui ACF dan PACF pada berbagai lag. Nilai ACF dan PACF hingga lag ke-36 terlihat bahwa nilai ACF dan PACF menurun secara bertahap menuju nol setelah lag-2. Hasil *correlogram* melalui ACF dan PACF hingga lag ke-36 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tabel *Correlogram of Return PT. Telekomunikasi*

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
. .	. .	1	-0.017	-0.017	0.0341	0.853
** .	** .	2	-0.245	-0.246	7.4916	0.024
. *	. *	3	0.097	0.094	8.6745	0.034
. *	. *	4	0.161	0.110	11.944	0.018
. .	. .	5	-0.060	-0.014	12.406	0.030
. .	. .	6	-0.031	0.023	12.532	0.051
. .	. .	7	0.045	0.004	12.796	0.077
. .	. .	8	-0.007	-0.021	12.802	0.119
. .	. .	9	-0.011	0.010	12.819	0.171
. .	. .	10	-0.031	-0.046	12.949	0.227
. .	* .	11	-0.058	-0.067	13.404	0.268
. *	. *	12	0.107	0.105	14.942	0.245
. .	* .	13	-0.056	-0.086	15.378	0.284
* .	* .	14	-0.142	-0.086	18.160	0.200
* .	* .	15	-0.091	-0.137	19.322	0.200
. *	. .	16	0.120	0.055	21.333	0.166
. *	* .	17	0.096	0.111	22.654	0.161
* .	. .	18	-0.102	-0.020	24.155	0.150
. .	. .	19	-0.013	0.028	24.179	0.189
. .	. .	20	0.052	-0.016	24.581	0.218
. *	. *	21	0.110	0.121	26.380	0.192
. .	. .	22	0.010	0.049	26.396	0.235
* .	. .	23	-0.079	-0.054	27.343	0.242
. *	. .	24	0.083	0.049	28.382	0.244
. *	* .	25	0.111	0.074	30.273	0.214
* .	* .	26	-0.140	-0.115	33.315	0.153
. .	. .	27	0.008	0.069	33.325	0.187
. .	* .	28	0.001	-0.156	33.325	0.224
. *	. *	29	0.078	0.090	34.297	0.229
* .	* .	30	-0.105	-0.072	36.094	0.205
. .	. *	31	0.024	0.084	36.191	0.239
. .	. .	32	-0.011	-0.041	36.213	0.278
. *	. *	33	0.109	0.125	38.218	0.244
. .	. .	34	0.010	0.019	38.236	0.283
* .	. .	35	-0.108	-0.007	40.247	0.249
. .	. .	36	0.053	0.055	40.739	0.270

Setelah identifikasi model, langkah selanjutnya adalah estimasi model ARIMA dengan variabel data *return*. Pada tahap ini dilakukan pengujian kelayakan model dengan mencari model terbaik dengan melihat nilai *Schwarz Information Criterion (SIC)* yang terkecil. Estimasi dari model-model ARIMA ditunjukkan pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3. Estimasi Model ARIMA

N O	MODEL	PARAMETER	ESTIMASI PARAMETER	T-STATISTIC	P-VALUE	SIC
1.	ARIMA (2,0,0)	C	99.00318	17959.47	0.0000	-2.361152
		AR(2)	-0.254630	-2.73029	0.0072	
2.	ARIMA (2,0,0) TANPA C	AR (2)	0.9999999	515653	0.0000	-1.203247
3.	ARIMA (2,0,2)	C	99.00314	16945.43	0.0000	-2.330793
		AR(2)	-0.555846	-2.078843	0.0398	
		MA(2)	0.318856	1.022238	0.3088	
4.	ARIMA (2,0,2) TANPA C	AR(2)	1.000000	67.20653	0.0000	12.14786
		MA(2)	-1.000000	-22744.69	0.0000	
5	ARIMA (0,0,2)	C	99.00312	17640.27	0.0000	-2.346671
		MA(2)	-0.199370	-2.221659	0.0282	

Adapun hasil estimasi dari model persamaan di atas adalah :

a. ARIMA (2,0,0)

Berdasarkan identifikasi model, model ARIMA yang pertama yaitu ARIMA(2,0,0) dapat dibentuk dalam persamaan $Z_t = 99.00318 - 0.254630 \text{ AR}(2) + \varepsilon_t$. Dengan mengikuti standar distribusi normal, maka interval dengan keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$, model yang diestimasi dapat dikatakan sudah baik jika hasil estimasi parameter model

ARIMA pada tabel di atas yang diperoleh nilai SIC yang terkecil dengan nilai parameter yang signifikan (nilai P-Value < 5%).

b. ARIMA (2,0,0) Tanpa Konstan

Berdasarkan identifikasi model, model ARIMA yang kedua yaitu ARIMA(2,0,0) dapat dibentuk dalam persamaan $Z_t = 0.999999 AR(2) + \varepsilon_t$. Dengan mengikuti standar distribusi normal, maka interval dengan keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$, model yang diestimasi dapat dikatakan sudah baik jika hasil estimasi parameter model ARIMA pada tabel di atas yang diperoleh nilai SIC yang terkecil dengan nilai parameter yang signifikan (nilai P-Value < 5%).

c. ARIMA (2,0,2)

Berdasarkan identifikasi model, model ARIMA yang ketiga yaitu ARIMA(2,0,2) dapat dibentuk dalam persamaan $Z_t = 99.00314 - 0.555846 AR(2) + 0.318856 MA(2) + \varepsilon_t$. Dengan mengikuti standar distribusi normal, maka interval dengan keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$, model yang diestimasi dapat dikatakan sudah baik jika hasil estimasi parameter model ARIMA pada tabel di atas yang diperoleh nilai SIC yang terkecil dengan nilai parameter yang signifikan (nilai P-Value < 5%).

d. ARIMA (2,0,2) Tanpa Konstan

Berdasarkan identifikasi model, model ARIMA yang keempat yaitu ARIMA(2,0,2) dapat dibentuk dalam persamaan $Z_t = 1.000000 AR(2) - 1.000000 MA(2) + \varepsilon_t$. Dengan mengikuti standar distribusi normal, maka interval dengan keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$,

model yang diestimasi dapat dikatakan sudah baik jika hasil estimasi parameter model ARIMA pada tabel di atas yang diperoleh nilai SIC yang terkecil dengan nilai parameter yang signifikan (nilai P-Value < 5%).

e. ARIMA (0,0,2)

Berdasarkan identifikasi model, model ARIMA yang kelima yaitu ARIMA(0,0,2) dapat dibentuk dalam persamaan $Z_t = 99.00312 - 0.199370 MA(2) + \varepsilon_t$. Dengan mengikuti standar distribusi normal, maka interval dengan keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$, model yang diestimasi dapat dikatakan sudah baik jika hasil estimasi parameter model ARIMA pada tabel di atas yang diperoleh nilai SIC yang terkecil dengan nilai parameter yang signifikan (nilai P-Value < 5%).

4.1.4 Pemilihan Model Terbaik

Dari Tabel 4.3, nilai SIC yang terkecil dengan parameter yang signifikan (nilai P-Value < 5%) adalah model ARIMA (2,0,0). Jadi model terbaik berdasarkan kriteria nilai sic minimum adalah model ARIMA (2,0,0).

Berdasarkan Tabel 4.3 maka diperoleh persamaan model ARIMA (2,0,0) adalah $Z_t = 99.00318 - 0.254630 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$

Keterangan:

Z_t = nilai return pada waktu ke t.

$\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}$ = nilai residual pada waktu $t, t - 1$, dan $t - 2$.

4.1.5 Uji Lagrange Multiplier (LM) terhadap adanya pengaruh ARCH/GARCH

Dalam melakukan uji pengaruh ARCH/GARCH model yang akan diuji adalah variansi residual model ARIMA (2,0,0) dengan menggunakan uji ARCH-LM. Pengujian dilakukan untuk lag pertama yaitu $\alpha_1 = 0$ dalam regresi linear yaitu:

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t$$

Dengan Z_t adalah residual dari persamaan ARIMA(2,0,0), e_t adalah *error*.

$$H_0: \alpha_1 = 0 \text{ (tidak terdapat efek ARCH).}$$

$$H_1: \alpha_1 \neq 0 \text{ (terdapat efek ARCH).}$$

Berikut ini adalah hasil uji ARCH-Lagrange Multiplier pada Tabel 4.4. yaitu :

Tabel 4.4 Uji ARCH-LM

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-Statistic	3.796695	Prob. F(1,117)	0.0537
Obs*R-Squared	3.740224	Prob. Chi-Square(1)	0.0531

Dalam pemodelan GARCH didahului dengan identifikasi apakah data yang diamati mengandung heteroskedastisitas atau tidak dapat dilakukan dengan mengamati F-Statistik dari data yaitu mengetahui pola residual kuadrat dari *correlogram* dan dengan menggunakan uji ARCH-LM. Uji ini didasarkan pada hipotesis nol yaitu terdapat efek ARCH/GARCH.

Berdasarkan Tabel 4.4. diperoleh nilai F-Statistic sebesar 3.796695 dengan nilai Probabilitas 0.0537. Demikian juga nilai hitung χ^2 (Obs*R-Square) adalah 3.740224 dengan probabilitas 0.0531. Karena nilai F-Statistic $> \chi^2$ maka tolak H_0 . Begitu pula dengan nilai p-value $< \alpha$ yang berarti tolak H_0 atau terdapat efek ARCH.

4.1.6 Penaksiran uji signifikansi parameter ARCH/GARCH dengan menggunakan uji *Maximum Log Likelihood*.

Pada metode *Maximum Log Likelihood*, dalam proses estimasinya mensyaratkan distribusi dalam error yaitu memenuhi asumsi normalitas yang variansnya konstan. Dengan itu, untuk mengatasi adanya pengaruh ARCH/GARCH dapat dilakukan dengan memodelkan data return dalam fungsi rata-rata dan fungsi ragam. Model ragam pertama yang digunakan adalah GARCH. Pendugaan parameter dari GARCH dilakukan dengan metode *Maximum Log Likelihood*. Hasil dari pendugaan parameter GARCH dengan variabel dependent data *return* ditunjukkan oleh Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5. Pendugaan Parameter GARCH.

NO	MODEL	PARAMETER	ESTIMASI PARAMETER	Z- STATISTIC	P- VALUE	SIC
1.	GARCH (1,1)	ϕ_1	99.00409	26314.12	0.0000	-2.355008
		θ_1	-2.262413	-2.496438	0.0125	
		α_0	-5.50E-05	-0.759853	0.4473	
		α_1	-0.033275	-1.589663	0.1119	
		β_1	1.042289	699.6684	0.0000	
2.	GARCH (1,2)	ϕ_1	99.00560	25303.84	0.0000	-2.316094
		θ_1	-0.284469	-2.446057	0.0144	
		α_0	-8.78E-05	-0.282672	0.7774	
		α_1	-0.040119	-1.127946	0.2593	
		β_1	-0.792770	35.56019	0.0000	
3.	GARCH (2,1)	ϕ_1	99.00247	16272.20	0.0000	-2.266501
		θ_1	-0.209357	-1.488581	0.1366	
		α_0	0.001302	0.729170	0.4659	
		α_1	-0.026695	-0.482863	0.6292	
		α_2	0.152020	1.736801	0.0824	
		β_1	0.615663	1.425506	0.1540	
4.	GARCH (2,2)	ϕ_1	99.00289	16224.63	0.0000	-2.228995
		θ_1	-0.221022	-1.526398	0.1269	
		α_0	0.001587	0.698049	0.4851	
		α_1	-0.016039	-0.279064	0.7802	
		α_2	0.162845	1.657411	0.0974	
		β_1	0.261126	0.501878	0.6158	
		β_2	0.275010	0.532645	0.5943	

NO	MODEL	PARAMETER	ESTIMASI PARAMETER	Z- STATISTIC	P- VALUE	SIC
5.	GARCH (2,3)	ϕ_1	99.01169	19109.39	0.0000	-2.241775
		θ_1	-0.299794	-2.007715	0.0447	
		α_0	0.001536	0.836738	0.4027	
		α_1	0.000668	0.021429	0.9829	
		α_2	0.247138	2.337657	0.0194	
		β_1	-0.328060	-1.397269	0.1623	
		β_2	0.409363	1.394600	0.1631	
		β_3	0.393049	72.43613	0.0000	
6.	GARCH (3,1)	ϕ_1	99.00496	18729.29	0.0000	-2.275180
		θ_1	-0.270472	-1.892639	0.0584	
		α_0	-3.72E-05	-0.287641	0.7736	
		α_1	-0.017180	-0.144028	0.8855	
		α_2	0.174179	0.958774	0.3377	
		α_3	-0.189051	-1.157980	0.2469	
		β_1	1.038131	30.59821	0.0000	
		7.	GARCH (3,2)	ϕ_1	99.00699	
θ_1	-0.319083			-3.092034	0.0020	
α_0	0.000633			0.106957	0.9148	
α_1	0.003416			0.080302	0.9360	
α_2	0.173958			2.022514	0.0431	
α_3	-0.161024			-0.866254	0.3864	
β_1	0.493532			0.515920	0.6059	
β_2	0.359596			0.690951	0.4896	
8.	GARCH (3,3)	ϕ_1	99.01097	18503.19	0.0000	-2.180379
		θ_1	-0.301618	-2.265828	0.0235	
		α_0	0.001407	0.517878	0.6045	
		α_1	0.006477	0.142328	0.8868	
		α_2	0.166003	1.561241	0.1185	
		α_3	-0.103053	-63.21760	0.0000	
		β_1	0.160109	0.363116	0.7165	
		β_2	0.340903	0.741147	0.4586	
		β_3	0.140357	0.252939	0.8003	

4.1.7 Pemilihan Model Terbaik GARCH

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai parameter yang signifikan adalah model pendugaan parameter GARCH yang digunakan adalah model ARIMA(2,0,0) dan GARCH(1,1). Untuk memilih model terbaik diperhatikan nilai SIC yang terkecil.

Dari Tabel 4.5 diperoleh persamaan model ARIMA(2,0,0) GARCH(1,1) adalah:

$$Z_t = 99.00318 - 0.254630 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dan

$$\sigma_t^2 = -5.50E - 05 - 0.033275\varepsilon_{t-1}^2 + 1.042289\sigma_{t-1}^2$$

4.1.8 Perhitungan VaR

Setelah pemodelan mean dan variansi dilakukan, selanjutnya akan dihitung besarnya VaR. Asumsikan nilai rata-rata dari nilai *return* yaitu 99,00275 untuk investasi pada PT.Telkom, besarnya VaR dihitung dengan cara yaitu:

Model ARMA(2,0,0) dan GARCH(1,1) akan dihitung Z_{121} dan σ_{121}^2 , adalah:

$$Z_{121} = 99.00318 - 0.254630 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$Z_{121} = 99.00318 - 0.254630 \varepsilon_{121-1} + \varepsilon_{120}$$

$$Z_{121} = 99.00318 - 0.254630(0.1667) + (0.1667)$$

$$= 99.00318 - 0.4244682 + 0.1667$$

$$= 98.7454118$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\sigma_{121}^2 = -5.50E - 05 - 0.033275\varepsilon_{t-1}^2 + 1.042289\sigma_{t-1}^2$$

$$\sigma_{121}^2 = -5.50E - 05 - 0.033275\varepsilon_{120}^2 + 1.042289\sigma_{120}^2$$

M A K A S S A R

$$= 0.0000550 - 0.033275(0.1667)^2$$

$$+ 1.042289(0.072596)^2$$

$$= 0.0000550 - 0.033275(0.02778889)$$

$$+ 1.042289(0.005270179)$$

$$= 0.0000550 - 0.0009246753 + 0.00549305$$

$$= 0.004623375$$

Jadi, nilai variansi ke-121 adalah $\sigma_{121}^2 = 0.004623375$ sehingga nilai volatilitasnya adalah $\sigma_{121} = \sqrt{0.004623375} = 0.0679954$

Untuk menghitung besarnya *quantile*, dicari Z_{121} dan σ_{121}^2 yang telah diketahui.

$$\begin{aligned} \text{quantile}(0.05) &= Z_{121} - 1.042289\sigma_{121}^2 \\ &= 98.7454118 - 1.042289(0.0679954) \\ &= 98.7454118 - 0.07087086 \\ &= 98.6745409 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan diperoleh VaR untuk PT.Telkom adalah:

$$\begin{aligned} VaR &= 98.6745409 \times 99.002,75 \\ &= 9.769.050,9 \end{aligned}$$

Sehingga VaR diperkirakan dengan selang 120 periode ke depan dengan tingkat kepercayaan 95% kemungkinan kerugian maksimum yang dapat ditolerir oleh seorang investor dari dana yang telah diinvestasikan adalah sebesar Rp 9.769.050,9.

4.2 Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga saham penutupan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 1 Januari 2007 sampai 1

Desember 2016. Pada periode tersebut terdapat 120 bulan perdagangan pada harga penutupan harga saham.

Langkah pertama plot data saham dapat dilihat pada Tabel 4.1 hasil statistika deskriptif. Hasil data tersebut, memiliki rata-rata harga saham penutupan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar 2148,13. Hal ini menunjukkan data tersebut tidak stasioner karena nilai variannya cenderung berubah-ubah. Dengan itu, untuk mendapatkan data yang tidak stasioner menjadi yang stasioer maka dilanjutkan uji normalitas yang dapat dilakukan melalui program minitab. Plot data harga penutupan PT Telekomunikasi Tbk pada Gambar 4.1 menunjukkan data time series yang dihasilkan tidak stasioner, karena mengalami penurunan setiap bulan yang tidak berada di sekitar nilai rata-rata yang konstan.

4.2.2 Plot data saham

Selanjutnya data penutupan harga saham (close) dianalisis untuk mendapatkan hasil data dari *return* melalui *microsoft office excel*, kemudian setelah itu dilakukan uji stasioner. Plot data saham Tabel 4.2 dengan menggunakan aplikasi *Software Minitab* menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Sminorv (KS) sebesar 0,067 dan nilai *p-value* sebesar 0,150, maka perbandingan nilai *p-value* dengan taraf signifikan (α) adalah $0,150 > 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data harga saham penutupan PT Telekomunikasi Tbk berdistribusi normal atau *stasioner*.

4.2.3 Melakukan residual kuadrat melalui *correlogram* model *Box-Jenkins*.

Data dinyatakan stasioner jika nilai rata-rata dan varian dari data tersebut tidak mengalami perubahan secara sistematis sepanjang waktu. Model AR dan MA yang digunakan untuk menguji stasioneritas data pada penelitian ini adalah dengan melihat *correlogram* melalui ACF dan PACF pada berbagai lag dengan mengestimasi model ARIMA dengan variabel data *return*. Pada tahap ini dilakukan pengujian kelayakan model terbaik dengan melihat nilai *Schwarz Information Criterion* (SIC) yang terkecil. Pada Tabel 4.3 estimasi model ARIMA yaitu ARIMA (2,0,0), ARIMA (2,0,0) tanpa konstan, ARIMA (2,0,2), ARIMA (2,0,2) tanpa konstan, dan ARIMA (0,0,2). Diantara ke-5 model tersebut, model yang terbaik dengan melihat nilai SIC yang terkecil adalah model ARIMA (2,0,0). Adapun persamaannya yaitu:

$$Z_t = 99.00318 - 0.254630 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

4.2.4 Uji *Lagrange Multiplier* (LM) terhadap adanya pengaruh ARCH/GARCH

Prosedur pengujian hipotesis keheterogenan ragam galat dalam secara formal adalah uji *Engle Lagrange Multiplier* (LM test). Hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis galat adalah konstan (*homoscedastic*) lawan galat yang merupakan proses ARCH atau GARCH. Dalam melakukan uji pengaruh tersebut bahwa variansi residual model ARIMA yang dihasilkan adalah model ARIMA (2,0,0). Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai F-Statistic sebesar 3.796695 dengan nilai Probabilitas 0.0537. Demikian juga nilai hitung χ^2 (Obs*R-Square) adalah 3.740224 dengan probabilitas 0.0531. Karena nilai F-Statistic $> \chi^2$ maka tolak H_0 . Begitu pula dengan nilai p-value $< \alpha$ yang berarti tolak H_0 atau terdapat efek

ARCH. Dengan pengujian tersebut maka menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah baik dan terbebas dari unsur heteroskedastisitas.

4.2.4 Penaksiran uji signifikansi parameter ARCH/GARCH dengan menggunakan uji *Maximum Log Likelihood*.

Pada metode *Maximum Log Likelihood* adalah salah satu asumsi normalitas untuk memenuhi pendugaan parameter dari GARCH. Berdasarkan tabel 4.5 bahwa nilai parameter yang signifikan adalah model pendugaan parameter GARCH yang digunakan adalah model ARIMA(2,0,0) dan GARCH(1,1). Untuk memilih model terbaik diperhatikan nilai SIC yang terkecil. Dari Tabel 4.5 diperoleh persamaan model ARIMA(2,0,0) GARCH(1,1) adalah:

$$Z_t = 99.00318 - 0.254630 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dan

$$\sigma_t^2 = -5.50E - 05 - 0.033275\varepsilon_{t-1}^2 + 1.042289\sigma_{t-1}^2$$

Setelah pemodelan ARIMA(2,0,0) GARCH(1,1) dilakukan selanjutnya akan dihitung nilai VaR. berdasarkan model tersebut bahwa VaR diperkirakan dengan selang 120 periode ke depan dengan tingkat kepercayaan 95% kemungkinan kerugian maksimum yang dapat ditolerir oleh seorang investor dari dana yang telah diinvestasikan adalah sebesar Rp9.769.050,9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data harga saham bulanan PT Telekomunikasi dapat diambil kesimpulan bahwa model ARMA(2,0,0) dan GARCH(1,1) merupakan model yang cukup baik dalam memodelkan data *return* harga saham. VaR diperkirakan dengan selang waktu 120 periode dengan tingkat kepercayaan 95% kemungkinan kerugian maksimum yang dapat ditolerir seorang investor dari dana yang telah diinvestasikan dengan menggunakan metode GARCH adalah sebesar Rp 9.769.050,9.

B. Saran

Penulis menerapkan bahwa model GARCH dan distribusi normal pada kemungkinan kerugian maksimum dari dana yang diinvestasikan pada saham PT Telekomunikasi Tbk. Penulis juga menyarankan untuk melakukan penelitian dengan model ataupun estimasi yang lain dengan menerapkan model yang lebih riil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Aprilia, “*Analisis Model Neuro-Garch Dan Model Backpropagation Untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan*”, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014)
- Ariefianto, M.D. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Aswi & Sukarna. 2006. *Analisis Deret Waktu*. Andira Publisher: Makassar.
- Bambang Juanda. Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu*. (Institut Pertanian Bogor: Press).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989).
- Dowd, K. 2002. *An Introduction to Market Risk Measurement*. John Wiley & Sons, Inc. United State American.
- Engle RF dan Daniel B. Nelson. 1994. *ARCH Models*. Elsvier Science B.V. California. *The Use of ARCH/GARCH Model in Applied Econometrics*. Jurnal of Economic Perspectives, Volume 4.
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. 2010. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Keenam. BPFE Yogyakarta.
- Ilmu Tafsir, [HR. Abu Dawud no. 3461, Ibnu Hibban no. 4974, Al-Haakim no. 2292, dan Al-Baihaqi 3/343; dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Ash-Shahiihah* no. 2326
- Komariah Siti, dkk., “*Return Saham, Inflasi, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Risiko Investasi*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, vol.15, No.3 September 2011, hlm.376-391 terakreditasi SK.No.64a/DIKTI/Kep/2010. https://jurnalbukubank.files.wordpress.com/2012/01/06sitikomariah_encrypted.pdf. (Diakses pada 10 Maret 2017).
- Lo MS, *GARCH Time Series Model*, thesis Departement of Statistic and Actuarial Science, Simon Fraser University, 2003.
- Ramadhona, Bakasenjaya. 2004. *Analisis Risiko Investasi dengan Pendekatan Model ARCH-GARCH dan Pendugaan Harga Saham dengan Pendekatan*

Model Time Series pada Perusahaan Agribisnis Terpilih di PT. Bursa Efek Jakarta. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Reilly, F.K. 1989. *Investment Analysis and Portofolio Management.* The Dryden Press. New York.

Rosadi, D. 2012. *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews.* Andi: Yogyakarta.

Rosyidi, Suherman.2014. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Teori Ekonomi Mikro dan Makro.* Jakarta:Rajawali Pers.

Jorion P. *Value at Risk: The new benchmark for managing financial risk.* (California, Nort America: McGraw-Hill,2011).

Jurnal Sains dan Seni ITS.2012.http://www.distrodoc.com/499012-analisis-volatulitas-saham-perusahaan-go-public-dengan-metode-ARCH_GARCH. vol.1.(Diakses pada tanggal 29 Januari 2017).

Tatang Ary Gumanti. 2011. *Manajemen Investasi Konsep, Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Salamah, Mutiah, dkk. *Time Series Analisis.* Surabaya: Institut Teknologi 10 November,2003.

Soeharto, iman. 1997. *Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional.* Jakarta:Erlangga.

Soejoeti, Zansawi. 1987.*Analisis Runtun Waktu.* Jakarta: Karunia Universitas Terbuka).

Wei, William W.S. 2006. *Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods.*Pearson: New York.

L

A

M


P

I


R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA.

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM

No : 116 / Val / M / 358_2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Icak Farizah

Nim : 60600113016

Judul Karya ilmiah

“Penerapan Model Garch dalam Mengukur Risiko Berinvestasi”

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan Valid.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Makassar, 2017

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan Sauddin
Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si

A. Data

Data harga saham penutupan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

selama 1 Januari 2007 sampai 1 Desember 2016 sebagai berikut:

No	Tanggal	Penutupan Harga Saham	Return	Nilai Rata-Rata (μ)	Variansi (σ)	Error(ϵ)
1.	01/01/2007	1460	98.8904	99.00275	0.072596	0.1667
2.	02/01/2007	1780	98.9382			
3.	03/01/2007	1970	99.0965			
4.	04/01/2007	2100	99.0619			
5.	05/01/2007	1910	98.9005			
6.	06/01/2007	1970	99.0305			
7.	07/01/2007	2240	99.1205			
8.	08/01/2007	2170	98.9677			
9.	09/01/2007	2200	99.0136			
10.	10/01/2007	2150	98.9767			
11.	11/01/2007	2030	98.9409			
12.	12/01/2007	2030	99.0000			
13.	01/01/2008	1850	98.9027			
14.	02/01/2008	1960	99.0561			
15.	03/01/2008	1930	98.9845			
16.	04/01/2008	1770	98.9096			
17.	05/01/2008	1620	98.9074			
18.	06/01/2008	1460	98.8904			
19.	07/01/2008	1540	99.0520			
20.	08/01/2008	1600	99.0375			
21.	09/01/2008	1430	98.8811			
22.	10/01/2008	1080	98.6759			
23.	11/01/2008	1170	99.0769			
24.	12/01/2008	1380	99.1522			
24.	01/01/2009	1260	98.9048			
26.	02/01/2009	1260	99.0000			
27.	03/01/2009	1510	99.1656			
28.	04/01/2009	1570	99.0382			
66.	06/01/2012	1630	99.0429			



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

67.	07/01/2012	1820	99.1044			
68.	08/01/2012	1860	99.0215			
69.	09/01/2012	1890	99.0159			
70.	10/01/2012	1950	99.0308			
71.	11/01/2012	1800	98.9167			
72.	12/01/2012	1790	98.9944			
73.	01/01/2013	1940	99.0773			
74.	02/01/2013	2150	99.0977			
75.	03/01/2013	2200	99.0227			
76.	04/01/2013	2340	99.0598			
77.	05/01/2013	2210	98.9412			
78.	06/01/2013	2250	99.0178			
79.	07/01/2013	2380	99.0546			
80.	08/01/2013	2200	98.9182			
81.	09/01/2013	2100	98.9524			
82.	10/01/2013	2350	99.1064			
83.	11/01/2013	2175	98.9195			
84.	12/01/2013	2150	98.9884			
85.	01/01/2014	2275	99.0550			
86.	02/01/2014	2325	99.0215			
87.	03/01/2014	2215	98.9503			
88.	04/01/2014	2265	99.0221			
89.	05/01/2014	2575	99.1204			
90.	06/01/2014	2465	98.9554			
91.	07/01/2014	2650	99.0698			
92.	08/01/2014	2665	99.0056			
93.	09/01/2014	2915	99.0858			
94.	10/01/2014	2750	98.9400			
95.	11/01/2014	2825	99.0266			
96.	12/01/2014	2865	99.0140			
97.	01/01/2015	2830	98.9876			
98.	02/01/2015	2935	99.0358			
99.	03/01/2015	2890	98.9844			
100.	04/01/2007	2615	98.8948			
101.	05/01/2015	2845	99.0808			
102.	06/01/2015	2930	99.0290			
103.	07/01/2015	2940	99.0034			
104.	08/01/2015	2870	98.9756			

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

105.	09/01/2015	2645	98.9149			
106.	10/01/2015	2680	99.0131			
107.	11/01/2015	2930	99.0853			
108.	12/01/2015	3105	99.0564			
109.	01/01/2016	3340	99.0704			
110.	02/01/2016	3250	98.9723			
111.	03/01/2016	3325	99.0226			
112.	04/01/2016	3550	99.0634			
113.	05/01/2016	3700	99.0405			
114.	06/01/2016	3980	99.0704			
115.	07/01/2016	4230	99.0591			
116.	08/01/2016	4210	98.9952			
117.	09/01/2016	4310	99.0232			
118.	10/01/2016	4220	98.9787			
119.	11/01/2016	3780	98.8836			
120.	12/01/2016	3980	99.0503			

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Close	120	1080	4310	2148,13	739,681
Valid N (listwise)	120				







TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

B. Output

Date: 11/10/17 Time: 10:00


Sample: 2007M01 2016M12

Included observations: 120

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
. .	. .	1	-0.017	-0.017	0.0341	0.853
** .	** .	2	-0.245	-0.246	7.4916	0.024
. *	. *	3	0.097	0.094	8.6745	0.034
. *	. *	4	0.161	0.110	11.944	0.018
. .	. .	5	-0.060	-0.014	12.406	0.030
. .	. .	6	-0.031	0.023	12.532	0.051
. .	. .	7	0.045	0.004	12.796	0.077
. .	. .	8	-0.007	-0.021	12.802	0.119
. .	. .	9	-0.011	0.010	12.819	0.171
. .	. .	10	-0.031	-0.046	12.949	0.227
. .	* .	11	-0.058	-0.067	13.404	0.268
. *	. *	12	0.107	0.105	14.942	0.245
. .	* .	13	-0.056	-0.086	15.378	0.284
* .	* .	14	-0.142	-0.086	18.160	0.200
* .	* .	15	-0.091	-0.137	19.322	0.200
. *	. .	16	0.120	0.055	21.333	0.166
. *	. *	17	0.096	0.111	22.654	0.161
* .	. .	18	-0.102	-0.020	24.155	0.150
. .	. .	19	-0.013	0.028	24.179	0.189
. .	. .	20	0.052	-0.016	24.581	0.218
. *	. *	21	0.110	0.121	26.380	0.192
. .	. .	22	0.010	0.049	26.396	0.235
* .	. .	23	-0.079	-0.054	27.343	0.242
. *	. .	24	0.083	0.049	28.382	0.244
. *	. *	25	0.111	0.074	30.273	0.214
* .	* .	26	-0.140	-0.115	33.315	0.153
. .	. .	27	0.008	0.069	33.325	0.187
. .	* .	28	0.001	-0.156	33.325	0.224
. *	. *	29	0.078	0.090	34.297	0.229
* .	* .	30	-0.105	-0.072	36.094	0.205
. .	. .	31	0.024	0.084	36.191	0.239
. .	. .	32	-0.011	-0.041	36.213	0.278
. *	. *	33	0.109	0.125	38.218	0.244
. .	. .	34	0.010	0.019	38.236	0.283
* .	. .	35	-0.108	-0.007	40.247	0.249
. .	. .	36	0.053	0.055	40.739	0.270

1. Tabel 4.3. Estimasi Model ARIMA

a. ARIMA (2,0,0)



Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids


Dependent Variable: RETURN
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/10/17 Time: 10:04
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Convergence achieved after 8 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99.00318	0.005513	17959.47	0.0000
AR(2)	-0.254630	0.093065	-2.736029	0.0072
SIGMASQ	0.004894	0.000507	9.661206	0.0000

R-squared	0.063510	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.047501	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070845	Akaike info criterion	-2.430840
Sum squared resid	0.587228	Schwarz criterion	-2.361152
Log likelihood	148.8504	Hannan-Quinn criter.	-2.402539
F-statistic	3.967273	Durbin-Watson stat	1.982657
Prob(F-statistic)	0.021525		

Inverted AR Roots	-.00+.50i	-.00-.50i
-------------------	-----------	-----------

b. ARIMA (2,0,0) TANPA C



Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids


Dependent Variable: RETURN
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/10/17 Time: 10:06
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Convergence achieved after 13 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(2)	0.999999	1.94E-06	515653.7	0.0000
SIGMASQ	0.012952	0.001176	11.00958	0.0000

R-squared	-1.478638	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	-1.499644	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.114767	Akaike info criterion	-1.249706
Sum squared resid	1.554235	Schwarz criterion	-1.203247
Log likelihood	76.98234	Hannan-Quinn criter.	-1.230839
Durbin-Watson stat	2.045932		

Inverted AR Roots	1.00	-1.00
-------------------	------	-------

c. ARIMA (2,0,2)




Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99.00314	0.005842	16945.43	0.0000
AR(2)	-0.555846	0.267383	-2.078843	0.0398
MA(2)	0.318856	0.311920	1.022238	0.3088
SIGMASQ	0.004846	0.000503	9.628880	0.0000

R-squared	0.072701	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.048719	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070800	Akaike info criterion	-2.423710
Sum squared resid	0.581465	Schwarz criterion	-2.330793
Log likelihood	149.4226	Hannan-Quinn criter.	-2.385976
F-statistic	3.031488	Durbin-Watson stat	1.998903
Prob(F-statistic)	0.032175		

Inverted AR Roots	-0.0+0.75i	-0.0-0.75i
Inverted MA Roots	-0.0+0.56i	-0.0-0.56i

d. ARIMA (2,0,2) TANPA C




Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(2)	1.000000	0.014880	67.20653	0.0000
MA(2)	-1.000000	4.40E-05	-22744.69	0.0000
SIGMASQ	9801.550	1166820.	0.008400	0.9933

R-squared	-1875738....	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	-1907802....	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	100.2640	Akaike info criterion	12.07817
Sum squared resid	1176186.	Schwarz criterion	12.14786
Log likelihood	-721.6904	Hannan-Quinn criter.	12.10647
Durbin-Watson stat	1.07E-06		

Inverted AR Roots	1.00	-1.00
Inverted MA Roots	1.00	-1.00

e. ARIMA (0,0,2)



Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids


Dependent Variable: RETURN
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/10/17 Time: 10:15
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Convergence achieved after 4 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99.00312	0.005612	17640.27	0.0000
MA(2)	-0.199370	0.089739	-2.221659	0.0282
SIGMASQ	0.004967	0.000492	10.09330	0.0000

R-squared	0.049430	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.033181	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.071376	Akaike info criterion	-2.416358
Sum squared resid	0.596057	Schwarz criterion	-2.346671
Log likelihood	147.9815	Hannan-Quinn criter.	-2.388058
F-statistic	3.042025	Durbin-Watson stat	1.982462
Prob(F-statistic)	0.051531		

Inverted MA Roots	.45	-.45
-------------------	-----	------

2. Tabel 4. 4 Uji ARCH-LM



Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.074961	Prob. F(1,117)	0.7847
Obs*R-squared	0.076194	Prob. Chi-Square(1)	0.7825

Test Equation:


Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/10/17 Time: 10:47
Sample (adjusted): 2007M02 2016M12
Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.005040	0.000990	5.092747	0.0000
RESID^2(-1)	-0.025305	0.092426	-0.273791	0.7847

R-squared	0.000640	Mean dependent var	0.004917
Adjusted R-squared	-0.007901	S.D. dependent var	0.009579
S.E. of regression	0.009617	Akaike info criterion	-6.433995
Sum squared resid	0.010820	Schwarz criterion	-6.387287
Log likelihood	384.8227	Hannan-Quinn criter.	-6.415029
F-statistic	0.074961	Durbin-Watson stat	1.984317
Prob(F-statistic)	0.784728		

3. Tabel 4.5 Pendugaan Parameter GARCH

a. GARCH(1,1)



Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: RETURN
Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps)
Date: 11/10/17 Time: 10:56
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 45 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)


Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.00409	0.003762	26314.12	0.0000
AR(2)	-0.262413	0.105115	-2.496438	0.0125

Variance Equation

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-5.50E-05	7.24E-05	-0.759853	0.4473
RESID(-1)^2	-0.033275	0.020932	-1.589663	0.1119
GARCH(-1)	1.042289	0.001490	699.6684	0.0000

R-squared	0.063273	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.055335	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070553	Akaike info criterion	-2.471154
Sum squared resid	0.587376	Schwarz criterion	-2.355008
Log likelihood	153.2692	Hannan-Quinn criter.	-2.423986
Durbin-Watson stat	1.981222		

b. GARCH(1,2)



Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: RETURN
Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps)
Date: 11/10/17 Time: 11:00
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 40 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) + C(6)*GARCH(-2)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.00560	0.003913	25303.84	0.0000
AR(2)	-0.284469	0.116297	-2.446057	0.0144

Variance Equation

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-8.78E-05	0.000311	-0.282672	0.7774
RESID(-1)^2	-0.040119	0.035568	-1.127946	0.2593
GARCH(-1)	0.792770	0.022294	35.56019	0.0000
GARCH(-2)	0.263259	0.096931	2.715944	0.0066

R-squared	0.061136	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.053179	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070634	Akaike info criterion	-2.455469
Sum squared resid	0.588717	Schwarz criterion	-2.316094
Log likelihood	153.3281	Hannan-Quinn criter.	-2.398868

c. GARCH(2,1)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: RETURN
Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps)
Date: 11/10/17 Time: 11:03
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Convergence achieved after 20 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.00247	0.006084	16272.20	0.0000
AR(2)	-0.209357	0.140642	-1.488581	0.1366

Variance Equation

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.001302	0.001786	0.729170	0.4659
RESID(-1)^2	-0.026695	0.055284	-0.482863	0.6292
RESID(-2)^2	0.152020	0.087529	1.736801	0.0824
GARCH(-1)	0.615663	0.431891	1.425506	0.1540

R-squared	0.061071	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.053114	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070636	Akaike info criterion	-2.405876
Sum squared resid	0.588757	Schwarz criterion	-2.266501
Log likelihood	150.3526	Hannan-Quinn criter	-2.349275

d. GARCH(2,2)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps)
Date: 11/10/17 Time: 11:05
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Convergence achieved after 29 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1) + C(7)*GARCH(-2)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.00289	0.006102	16224.63	0.0000
AR(2)	-0.221022	0.144800	-1.526398	0.1269

Variance Equation

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.001587	0.002273	0.698049	0.4851
RESID(-1)^2	-0.016039	0.057475	-0.279064	0.7802
RESID(-2)^2	0.162845	0.098252	1.657411	0.0974
GARCH(-1)	0.261126	0.520299	0.501878	0.6158
GARCH(-2)	0.275010	0.516310	0.532645	0.5943

R-squared	0.062139	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.054191	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070596	Akaike info criterion	-2.391599
Sum squared resid	0.588088	Schwarz criterion	-2.228995
Log likelihood	150.4059	Hannan-Quinn criter	-2.325665

e. GARCH (2,3)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Date: 11/10/17 Time: 12:10
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 73 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1)
+ C(7)*GARCH(-2) + C(8)*GARCH(-3)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.01169	0.005181	19109.39	0.0000
AR(2)	-0.299794	0.149321	-2.007715	0.0447

Variance Equation

C	0.001536	0.001836	0.836738	0.4027
RESID(-1)^2	0.000668	0.031175	0.021429	0.9829
RESID(-2)^2	0.247138	0.105720	2.337657	0.0194
GARCH(-1)	-0.328060	0.234787	-1.397269	0.1623
GARCH(-2)	0.409363	0.293534	1.394600	0.1631
GARCH(-3)	0.393049	0.005426	72.43613	0.0000

R-squared	0.039049	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.030905	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.071460	Akaike info criterion	-2.427608
Sum squared resid	0.602566	Schwarz criterion	-2.241775
Log likelihood	153.6565	Hannan-Quinn criter	-2.352140

f. GARCH (3,1)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Date: 11/10/17 Time: 12:19
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 44 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*RESID(-3)^2
+ C(7)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.00496	0.005286	18729.29	0.0000
AR(2)	-0.270472	0.142907	-1.892639	0.0584

Variance Equation

C	-3.72E-05	0.000129	-0.287641	0.7736
RESID(-1)^2	-0.017180	0.119281	-0.144028	0.8855
RESID(-2)^2	0.174179	0.181669	0.958774	0.3377
RESID(-3)^2	-0.189051	0.163259	-1.157980	0.2469
GARCH(-1)	1.038131	0.033928	30.59821	0.0000

R-squared	0.062453	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.054507	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070584	Akaike info criterion	-2.437783
Sum squared resid	0.587891	Schwarz criterion	-2.275180
Log likelihood	153.2670	Hannan-Quinn criter	-2.371749

g. GARCH (3,2)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Date: Fri, 07/11/14 Time: 12:22
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 32 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*RESID(-3)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8)*GARCH(-2)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.00699	0.005374	18421.76	0.0000
AR(2)	-0.319083	0.103195	-3.092034	0.0020

Variance Equation

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.000633	0.005921	0.106957	0.9148
RESID(-1)^2	0.003416	0.042537	0.080302	0.9360
RESID(-2)^2	0.173958	0.086011	2.022514	0.0431
RESID(-3)^2	-0.161024	0.185885	-0.866254	0.3864
GARCH(-1)	0.493532	0.956606	0.515920	0.6059
GARCH(-2)	0.359596	0.520436	0.690951	0.4896

R-squared	0.055537	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.047533	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.070844	Akaike info criterion	-2.393921
Sum squared resid	0.592227	Schwarz criterion	-2.208088
Log likelihood	151.6353	Hannan-Quinn criter	-2.318454

h. GARCH (3,3)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Date: Fri, 07/11/14 Time: 12:22
Sample: 2007M01 2016M12
Included observations: 120
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 46 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*RESID(-3)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8)*GARCH(-2) + C(9)*GARCH(-3)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	99.01097	0.005351	18503.19	0.0000
AR(2)	-0.301618	0.133116	-2.265828	0.0235

Variance Equation

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.001407	0.002718	0.517878	0.6045
RESID(-1)^2	0.006477	0.045508	0.142328	0.8868
RESID(-2)^2	0.166003	0.106328	1.561241	0.1185
RESID(-3)^2	-0.103053	0.001630	-63.21760	0.0000
GARCH(-1)	0.160109	0.440931	0.363116	0.7165
GARCH(-2)	0.340903	0.459967	0.741147	0.4586
GARCH(-3)	0.140357	0.554905	0.252939	0.8003

R-squared	0.042555	Mean dependent var	99.00275
Adjusted R-squared	0.034441	S.D. dependent var	0.072590
S.E. of regression	0.071329	Akaike info criterion	-2.389441
Sum squared resid	0.600368	Schwarz criterion	-2.180379
Log likelihood	152.3665	Hannan-Quinn criter	-2.304540

BIOGRAFI



Nama lengkap saya Icak Farizah yang biasa disapa Icha. Saya dilahirkan di Bulukumba (jln. andi sirajuddin no.03 Togambang) pada tanggal 27 November 1994. Saya merupakan anak sulung dari tiga bersaudara dari buah hati ibunda dan ayahanda yaitu Nurlina dan Huraerah. Saya mulai sekolah formal pada tahun 2001 dari SDN 26 Matekko dan lulus pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama saya dapat melanjutkan sekolah pendidikan ketingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Gangking lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama saya melanjutkan pendidikan ketingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Man 2 Bulukumba dan Alhamdulillah saya lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama saya megikuti seleksi Perguruan Tinggi lewat jalur SPMB di UIN Alauddin Makassar , dan Alhamdulillah sekarang tercatat sebagai mahasiswa Jurusan “MATEMATIKA” Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Harapan saya sebagai penulis yaitu sebagai diri saya pribadi jadilah anak yang bisa membanggakan bagi nusa dan bangsa terutama kepada kedua orang tua dan keluarga.