

**UJI POTENSI ANTIPLATELET EKSTRAK TEH HIJAU (*Camellia sinensis*
(L) O. Kuntze) DIBANDINGKAN DENGAN ASPIRIN PADA
MENCIT JANTAN (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh:

AJAD ADE SUADLI

NIM. 70100113085

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ajad Ade Suadli
NIM : 70100113085
Tempat, Tanggal Lahir : Lamunga, 16 Juli 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : BTP Blok I No 111
Judul : Uji Potensi Antiplatelet Ekstrak Teh Hijau
(*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) Dibandingkan Dengan
Aspirin Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 14 Februari 2018

Penyusun,



AJAD ADE SUADLI
NIM: 70100113085

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Uji Potensi Antiplatelet Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) Dibandingkan Dengan Aspirin Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)**” yang disusun oleh **Ajad Ade Suadli, NIM: 70100113085**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 14 Februari 2018 M** yang bertepatan dengan **28 Jumadil Awwal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 Februari 2018 M
28 Jumadil Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing I : Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. (.....)

Penguji I : Alifia Putri Febriyanti, S.Farm. M.Farm. Klin. Apt. (.....)

Penguji II : Dr. Hj Nurlaelah Abbas, Lc., M.A. (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Uji Potensi Antiplatelet Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) dibandingkan dengan Aspirin pada mencit jantan (*Mus musculus*)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Ali dan ibunda Jumiati dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, adikku Ajul Dwi Sahbani dan Ragil Fajri Nugraha serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

2. Bapak Prof. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A.,Ph.D, selaku Wakil Rektor III, Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D, selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
5. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
6. Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
7. Bapak Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
8. Ibu Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin. Apt., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
9. Ibu Dr. Hj Nurlaelah Abbas, Lc., M.A. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,

10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Far13ion) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.
12. Kakak – kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalam...

Makassar, 14 Februari 2018

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



AJAD ADE SUADLI
NIM: 70100113085

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teh Secara umum (<i>Camellia Sinensis</i> L).....	8
B. Tinjauan Platelet.....	15
C. Tinjauan Obat Platelet.....	18
D. Tinjauan Flavanoid.....	21

E. Ekstraksi.....	23
F. Uraian Hewan Coba	26
G. Tinjauan Islam	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Instrumen Penelitian	34
E. Metode Kerja	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
1. Tabel 1 hasil ekstraksi daun teh hijau (<i>Camellia sinensis</i> (L) O. Kuntze).....	38
2. Tabel 2 hasil penentuan waktu perdarahan pada hari ke-0 dan ke-9	38
3. Tabel 3 Persentase peningkatan rata-rata waktu perdarahan	39
4. Tabel 4 Nilai P dari rata-rata perlakuan antar kelompok	39
5. Tabel 5.3.1 Diskriptif.....	58
6. Tabel 5.3.2 Uji Normalitas.....	59
7. Tabel 5.3.3 Uji Homogenitas	59
8. Tabel 5.3.4 Uji Anova.....	59
9. Tabel 5.3.5 Uji Post Hoc Tests	60
10. Tabel 6 Analisis persentase (%) waktu perdarahan pada mencit jantan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tanaman Teh Hijau (<i>Camellia sinensis</i> (L) O. Kuntze).....	8
2. Proses pengolahan teh.....	10
3. Mencit (<i>Mus musculus</i>).....	26
4. Tanaman Teh Hijau (<i>Camellia sinensis</i> (L) O. Kuntze).....	68
5. Proses pengeringan	68
6. Proses penimbangan	68
7. Proses Maserasi.....	68
8. Proses Penyaringan	68
9. Proses rotavapor.....	68
10. Proses Ekstrak Cair	69
11. Proses Ekstrak Kental	69
12. Proses Ekstrak kering.....	69
13. Proses Aspilets.....	69
14. Proses Suspensi Na-CMC 1%.....	69
15. Proses Pengenceran Sampel.....	69
16. Pemberian sampel secara oral.....	70
17. Darah diserap dengan kertas saring	70
18. Bekuan darah	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja	51
2. Perhitungan Dosis	55
3. Analisis Varian	58
4. Analisis statistik persentase peningkatan waktu perdarahan	65
5. Dokumentasi Penelitian	68



ABSTRAK

NAMA MAHASISWA : AJAD ADE SUADLI
NOMOR MAHASISWA : 70100113085
JUDUL PENELITIAN :“Uji Potensi Antiplatelet Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) dibandingkan dengan Aspirin pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)”

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Potensi Antiplatelet Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) dibandingkan dengan Aspirin pada mencit jantan (*Mus musculus*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi aktivitas antiplatelet ekstrak teh pada mencit jantan (*Mus musculus*).

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium. Subjek penelitian ini terdiri dari 5 kelompok mencit yang tiap kelompok terdiri dari 3 mencit. Kelompok 1 diberikan aspirin dengan dosis 0,85%/30gBB, kelompok 2 diberikan Na-CMC 1 %, kelompok 3 diberikan ekstrak Tumbuhan teh hijau (*Camellia sinensis*(L) O. Kuntze) 10%, kelompok 4 diberikan ekstrak Tumbuhan teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 25%, dan kelompok 5 diberikan ekstrak Tumbuhan teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 50%. Metode penentuan antiplatelet berdasarkan parameter penentuan waktu perdarahan pada mencit jantan (*Mus musculus*). Induksi ekstrak dilakukan sehari sekali selama 8 hari berturut-turut, kemudian waktu perdarahan ditentukan pada hari ke-0 dan hari ke-9. Setelah diperoleh persentase peningkatan waktu perdarahan, dilakukan analisis data secara statistik dengan *one way analysis of variance* (ANOVA).

Hasil penelitian didapatkan waktu perdarahan dengan persentase peningkatan berturut-turut pada ekstrak Tumbuhan teh hijau10% (106,09) , ekstrak Tumbuhan teh hijau25% (145,51) dan ekstrak Tumbuhan teh hijau50% (178,78). Hasil analisis data dengan menggunakan *One Way Anova* menunjukkan perbedaan waktu perdarahan sebelum dan sesudah perlakuan dengan nilai *sig* (0,000) yang menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak Tumbuhan teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) memiliki potensi aktivitas sebagai antiplatelet terhadap mencit jantan (*Mus musculus*)

Kata Kunci : Antiplatelet, Ekstrak teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze), Mencit

ABSTRACT

NAME : AJAD ADE SUADLI
REG. NUMBER : 70100113085
TITLE : “Antiplaetlet Potential Test Extract Tea (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) Compared With Aspirin on Male Mice (*Mus musculus*)”

Having been done research about Antiplaetlet Potential Test of Green Tea Extract (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) was compared with Aspirin in male mice (*Mus musculus*). This research generally identified the potential activity of tea (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) toward male mice (*Mus musculus*)

This research was a laboratory experimental research, The subject of this research, consists of 5 groups of mice, each group consisting of 3 mice. Group 1 was given aspirin with a dose of 0.85% / 30gBB, group 2 was given 1% Na-CMC, group 3 was given green tea plant extract (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 10%, group 4 was given green tea plant extract (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 25%, and group 5 were given green tea plant extract (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 50%. Method of determining antiplatelet based on timing parameter of bleeding in male mice (*Mus musculus*). Induction of extract was performed once a day for 8 consecutive days, then the time of bleeding was determined on day-0 and day-9. After the percentage increase of bleeding time, statistical data were analyzed by one way analysis of variance (ANOVA).

Research result was found bleeding time with percentage of successive increase in extract Green tea 10% (106,09), extract Green tea plant 25% (145,51) and green tea plant extract 50% (178,78). The results of data analysis using One Way Anova showed differences in bleeding time before and after treatment with sig value (0.000) which showed a significant difference between treatment groups. So it can be concluded that green tea plant extract (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) has potential activity as antiplatelet against male mice (*Mus musculus*)

Keywords: Antiplaetlet, Green Tea extract (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze), Mice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) merupakan salah satu jenis tanaman yang populer sebagai minuman. Jenis tanaman ini mengandung potensi antioksidan dari flavonoid yang berasal dari senyawa polifenol (Sudaryat, 2015: 95). Teh hijau mempunyai karakter mutu dan aktivitas biologis yang sangat potensial. Publikasi-publikasi terkini seakan aklamasi memperkuat superioritas Teh hijau sebagai agen penyedia kesehatan. Sehingga tidaklah mengejutkan jika masyarakat dunia telah memosisikan Teh hijau sebagai minuman kedua setelah air putih (Rohdiana, 2015: 34).

Teh hijau merupakan tanaman yang dikenal luas dan salah satu produk minuman terpopuler yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia karena teh mempunyai rasa dan aroma yang khas, selain itu Teh hijau juga dipercaya mempunyai khasiat bagi kesehatan diantaranya mencegah kegemukan, kanker dan kolesterol (Kurnia, 2015: 123).

Platelet merupakan sel darah merah yang berperan penting dalam proses homeostatis. Platelet beragregasi membentuk suatu sumbatan hemostasis saat terjadi luka pada pembuluh darah. Sumbat homeostasi dapat berupa bekuan darah yang dapat terbentuk dari agregat-agregat platelet, biasa disebut trombus. Pada keadaan normal trombus terbentuk pada pencegahan pendarahan, namun pada pembentukan trombus akan tetap terbentuk walaupun tidak ada luka pada pembuluh darah. Trombus patologis tersebut dapat menyebabkan kelainan vaskuler infark miokard, stroke, dan penyakit perifer vaskuler. (Putri, 2014: 112).

Pada prinsipnya trombus terjadi karena terdapat gangguan keseimbangan antara yang merangsang trombosis dan yang mencegah trombosis. Faktor merangsang atau faktor resiko trombosis yaitu; endotel pembuluh darah yang tidak utuh, trombosit yang teraktivasi, defisiensi anti-pembekuan, klirens faktor pembekuan aktif berkurang, sistem fibrinolisis berkurang, stagnasi. Umumnya faktor yang mencegah trombosit merupakan kebalikan dari yang menstimulasi trombosit (khalilullah, 2011: 3).

Aspirin menghambat sintesis tromboxan A_2 (TXA_2) didalam trombosit pada prostaglandin (PGI_2) di pembuluh darah dengan menghambat secara reversibel enzim siklooksigenase (akan tetapi siklooksigenase dapat dibentuk kembali oleh sel endotel). Penghambat enzim siklooksigenase terjadi karena aspirin mengasetilasi enzim tersebut. Aspirin dosis kecil hanya dapat menekan pembentukan tromboxan A_2 (TXA_2) sebagai akibatnya terjadi pengurangan agregasi trombosit. Sebagai anti-platelet dosis efektif aspirin 80-320 mg per hari. Dosis lebih tinggi selain meningkatkan toksisitas (terutama perdarahan), juga menjadi kurang efektif karena selain menghambat tromboxan A_2 (TXA_2) juga menghambat pembentukan prostaglandin (Khalilullah, 2011: 3).

Efek samping aspirin misalnya tidak enak diperut, mual dan pendarahan saluran cerna biasanya dapat dihindari bila dosis perhari tidak melebihi 325 mg. Penggunaan bersama antacid atau antagonis H_2 reseptor dapat mengurangi efek tersebut. Obat ini dapat mengganggu homeostasis pada tindakan operasi dan bila diberikan bersama heparin atau anti koagulan oral dapat meningkatkan resiko perdarahan (Khalilullah, 2011: 3).

Flavonoid merupakan salah satu jenis antioksidan yang dapat menghambat pelekatan, agregasi, dan sekresi platelet (Shalehah, 2015: 140). Kemampuan

flavonoid dalam menghambat agregasi platelet ini disebabkan karena flavonoid tersebut mampu menghambat metabolisme asam arakidonat oleh Siklooksiginase. Siklooksiginase berperan dalam membantu meningkatkan jumlah trombosit, apabila jumlah Siklooksiginase dapat dihambat, maka jumlah trombosit pun juga akan ikut menurun (Middleton *et al*, 2000: 698). Flavonoid berperan penting dalam menekan terjadinya penyakit jantung koroner. Hal ini dikarenakan flavonoid dapat menghambat proses penggumpalan platelet yang merupakan penyebab penyakit jantung (Vita, 2005: 292). Antioksi dan flavonoid yang memiliki kemampuan untuk menurunkan jumlah trombosit, yang dapat meminimalkan risiko aterosklerosis. (Retnaningsih,2011: 80).

Obat-obatan tidak lagi dipandang sebagai penyebab langsung bagi kesembuhan dari suatu penyakit, tanpa kehendak atau izin dari Allah SWT. Namun, pengobatan tetaplah dianjurkan digunakan untuk menghilangkan sebab suatu penyakit dan dengan segala rahmat-Nya menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Obat itupun menjadi rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya.

Melihat dari kegunaan daun teh hijau (*Camellia sinensis*(L) O. Kuntze) sebagai obat tradisional yang banyak dimanfaatkan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Penggunaan obat tradisional ini untuk melihat potensi dalam arti kemampuan jangka waktu perdarahannya yang dibandingkan dengan aspirin.

Oleh karna itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi antiplatelet pada mencit jantan mengiat kandungan senyawa kimia yang ada pada tanaman teh hijau yang dapat menyembuhkan penyakit. Sehingga dilakukan penelitian “Uji Potensi Antiplatelet Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) dibandingkan dengan Aspirin pada mencit jantan (*Mus musculus*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) memiliki kemampuan sebagai antiplatelet pada mencit jantan ?
2. Pada Konsentrasi berapakah ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) memiliki efek yang lebih efektif sebagai antiplatelet pada mencit jantan ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional
 - a. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif dari simplisia nabati menggunakan pelarut yang sesuai (Dirjen POM, 2014: 42)
 - b. Platelet merupakan sel darah merah yang berperan penting dalam proses hemostasis (Putri, 2014: 112)
 - c. Teh hijau merupakan tanaman yang paling luas penggunaannya di dunia termasuk sebagai obat tradisional (Dewi, 2008: 2)
 - d. Antiplatelet adalah terapi yang sering digunakan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit trombosis (Hardman, 2014: 1505)
 - e. Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan Antiplatelet, yang apabila ia berubah akan mengaibatkan perubahan pada variabel lain (Sastroasmoro, 2014: 302)
 - f. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Mencit, yang berubah akibat perubahan variabel bebas (Sastroasmoro, 2014: 302)
 - g. Eksperimen Labolatorium adalah penelitian yang dilakukan dilabolatorim dan banyak menggunakan hewan coba. Serta dilakukan pada farmakologi (obat-obatan) (Siswanto, 2015: 43)

h. Least significance Different (LSD) adalah Analisis yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana yang berbeda mean-nya (Sastroasmoro, 2014: 129)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, adalah untuk mengetahui kemampuan potensi antiplatelet ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis*(L) O. Kuntze) dan konsentrasi berapa saja yang dapat sebanding dengan Aspirin yang dimana di ujikan pada mencit jantan (*Mus musculus*).

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Dwi, Abdul Mun'im, dkk. (2014) tentang Optimasi ekstraksi ampas teh hijau (*Camellia sinensis*) menggunakan metode *microwave assisted extraction* untuk menghasilkan ekstrak teh hijau Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang besar, namun sayangnya potensi sumber daya alam yang tersedia masih sedikit yang diteliti dan digunakan dalam pengobatan. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah teh. Ampas teh adalah limbah dari industri teh, tersedia cukup banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi ekstraksi ampas teh hijau menggunakan metode MAE (Microwave Assisted Extraction) yang paling efektif sehingga dihasilkan ekstrak teh hijau yang mempunyai antioksidan optimum. Dari hasil penelitian, kondisi optimum MAE adalah daya 450 W, pelarut etanol 60%, perbandingan simplisia – pelarut 1 : 8 dan lama ekstraksi 8 menit untuk menghasilkan ekstrak dengan kadar polifenol optimum. Ekstrak yang diperoleh mempunyai kadar air 7,83 %; pH 5,5; dan polifenol total, flavonoid total, asam galat, katekin, EGCG serta kofein berturut-turut

sebesar 7,1%; 1,04%; 2,76%; 0,83%; 5,18% dan 1,03%. Dibandingkan dengan acuan yang ada, ekstrak yang diperoleh memenuhi syarat sebagai bahan baku kosmetik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartika (2008) tentang Pengaruh Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* L) terhadap Penurunan Berat Badan, Kadar Trigliserida dan Kolesterol Total pada Tikus Jantan Galur Wistar yang dilakukan di Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Obesitas adalah masalah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Obesitas sentral merupakan salah satu faktor risiko sindrom metabolik yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas tinggi. Teh hijau (*Camellia sinensis* L) adalah salah satu alternatif pengobatan yang biasa menurunkan berat badan. Penelitian ini diusulkan untuk mengetahui lebih banyak tentang pengaruh teh hijau terhadap berat badan, trigliserida darah dan kadar kolesterol tikus Wistar. Ekstrak teh hijau diberikan sekali sehari selama 30 hari. Berat badan dan makanan tikus berat setiap hari. Kadar trigliserida darah dan kadar kolesterol dianalisis pada awal dan akhir penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 86,4 mg ekstrak teh hijau yang diberikan pada setiap tikus setiap hari dapat mengurangi berat badan karena tingkat trigliserida juga berkurang secara signifikan pada dosis 21,6 mg, 43,2 mg dan 86,4 mg dibandingkan dengan diet tinggi lemak. Namun tidak ada perubahan signifikan pada kadar kolesterol. Ringkasannya adalah bahwa ekstrak teh hijau memiliki efek mengurangi berat pada tikus Wistar serta tingkat trigliserida darah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Rizki Rica Rachim Fadilah, Evi Umayah Ulfa, dkk (2014) tentang Uji Aktivitas Antiplatelet Ekstrak Etanol Kubis Merah (*Brassica oleracea* var. *Capitata* L). uji efek antiagregasi platelet ekstrak etanol kubis merah (*Brassica oleracea* var. *capitata* L.), ditentukan melalui parameter penentuan waktu perdarahan pada mencit jantanalur Balb-C. Pemberian bahan uji

dilakukan sehari sekali secara oral selama 8 hari berturut-turut waktu perdarahan ditentukan pada hari ke-0 dan hari ke-9. Ekstrak etanol kubis merah dibuat dalam 3 dosis yaitu: 9,69 mg/kg BB; 19,38 mg/kg BB, dan 38,76 mg/kg BB. Setelah diperoleh persentase peningkatan waktu perdarahan, data dianalisis secara statistik menggunakan Uji Analisis Multivarian (Anova), yang dilanjutkan dengan uji LSD untuk mengetahui kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan bermakna. Semua bahan uji dapat meningkatkan waktu perdarahan dengan persentase peningkatan berturut-turut sebesar $58 \pm 16\%$; $70,7 \pm 8,9 \%$, dan $113 \pm 12\%$. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kubis merah dosis 38,76 mg/kg BB dapat meningkatkan waktu perdarahan sebanding dengan kontrol positif $129 \pm 8,2\%$.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui potensi sebagai antiplatelet ekstrak teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) pada mencit jantan (*Mus musculus*).
2. Mengetahui konsentrasi yang lebih efektif sebagai antiplatelet ekstrak teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) pada mencit jantan (*Mus musculus*).

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya meningkatkan kesehatan dengan mengembangkan obat tradisional sehingga dapat dimanfaatkan berdasarkan landasan ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teh Secara Umum

1. Klasifikasi teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Anak Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Gutticefales
Family	: Theaceae
Genus	: Camellia
Spesies	: <i>Camellia sinensis</i> L (Effendi, 2010: 3)



Gambar 1. Tanaman Teh Hijau (Foto Pribadi. Malino Kab.Gowa)

Teh hijau merupakan minuman penyegar yang paling luas penggunaannya di dunia. Teh hijau dibuat dari pucuk daun teh. Daerah penghasil teh hijau terkenal di dunia adalah india, cina, sri langka, Indonesia dan jepang (Dewi, 2008: 2).Teh merupakan tanaman yang dikenal luas dan salah satu produk minuman terpopuler yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia dikarenakan teh mempunyai rasa dan aroma yang khas, selain itu teh juga dipercaya mempunyai khasiat bagi kesehatan (Kurnia,2015: 123).

Teh hijau, tidak lagi hanya berperan sebagai minuman yang menerbitkan kenikmatan, tapi lebih dari itu, kini popularitas teh hijau sejalan dengan makin banyaknya publikasi yang menyatakan bahwa teh hijau juga mampu meningkatkan akreditasi kesehatan seseorang. Berbicara masalah aspek kesehatan teh hijau, rasanya tidak lengkap bila kita tidak membicarakan polifenol dan katekinnya (Rohdiana,2015: 37).

Tanaman teh hijau memiliki manfaat diantaranya sebagai anti kanker, antioksidan, antimikroba, antibakteria, pencegah aterosklerosis, menjaga kesehatan jantung, antidiabetes, menstimulasi sistem imun, mencegah parkinson, menurunkan kolesterol, mencegah karies gigi, mencegah bau mulut, melancarkan urine, menghindari stroke, dan menurunkan tekanan darah. Hal ini disebabkan kandungan bahan kimia aktif seperti katekin, asam amino, gula, polifenol oksidasi, klorofil dan karoten yang terdapat pada vakuola (Noriko, 2013: 106)

Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sebagai bahan minuman dibuat dari pucuk muda daun teh yang telah mengalami proses penolahan tertentu seperti

pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis dan pengeringan. Manfaat yang dihasilkan dari minuman teh hijau adalah memberikan rasa segar, dapat memulihkan kesehatan badan dan terbukti tidak memiliki dampak negatif (Balittri, 2013: 12).



Gambar 2. Proses pengolahan Teh hijau (Rohdiana, 2015: 35)

Teh putih atau *white tea* merupakan teh dengan proses pengolahan paling sederhana, yaitu pelayuan dan pengeringan. Bahan bakupembuatan teh putih inipun hanyaberasal dari pucuk dan dua daun dibawahnya. Pelayuan dapat dilakukan dengan memanfaatkan panas dari sinar matahari. Biasanya proses pelayuan ini mampu mengurangi kadar air sampai 12%. Selanjutnya, daun teh yang sudah layu dikeringkan menggunakan mesin pengering. Pucuk teh kemudian akan menjadi jenis mutu *silver needle*, sedangkan dua daun di bawahnya akan menjadi *white poeny* (Rohdiana, 2015: 35)

Teh hijau merupakan hasil olahan pucuk daun teh tanpa melalui proses fermentase. Teh hijau dibuat melalui inaktivitas enzim polifenol oksidasinya didalam dauh teh segar. Metode inaktifitas polifenol oksidasi teh hijau dapat dilakukan melalui pemanasan (udara panas) dan penguapan (steam/uap air). Kedua metode itu berguna untuk mencegah terjadinya oksidasi enzimatis katekin.

Teh hitam adalah teh yang paling banyak diproduksi yaitu sekira 78%, diikuti teh hijau 20% kemudian sisanya adalah teh oolong dan teh putih yaitu 2%. Teh hitam ini juga merupakan teh dengan proses pengolahan yang cukup rumit. Berdasarkan prosesnya teh hitam dibedakan menjadi teh hitam ortodoks dan *crushing-tearing-curling* (CTC). Pada proses pengolahan teh hitam ortodoks, daun teh dilayukan semalam 14-18 jam. Setelah layu, daun teh digulung, digiling dan dioksimatis selama kurang lebih 1 jam. Sementara itu, proses pengolahan CTC, pelayuannya lebih singkat yaitu, 8-11 jam dan diikuti dengan proses penggilingan yang sangat kuat untuk mengeluarkan cairan sel semaksimal mungkin. Proses selanjutnya adalah pengeringan yaitu proses pengolahan yang bertujuan untuk menghentikan proses oksimatis dan menurunkan kadar air. Teh kering selanjutnya disortasi dan *digrading* untuk menghasilkan jenis mutu teh tertentu. (Rohdiana, 2015: 36)

Tanaman teh hijau sudah lama dikenal oleh penduduk dunia sebagai bahan minuman maupun sebagai obat herbal yang mudah diperoleh masyarakat. Salah satu bioaktif yang terkandung pada pucuk teh hijau adalah tanin.

2. Komposisi Kimia Daun Teh Hijau

Daun Teh hijau mengandung beberapa zat kimia yang dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu : substansi fenol, bukan fenol, senyawa aromatis, dan enzim-enzim (Balittri, 2013: 12).

a. Golongan Fenol

Katekin merupakan senyawa yang paling penting dalam daun teh hijau, yang berfungsi sebagai antioksidan yang menyehatkan tubuh (Balittri, 2013: 12).

Teh hijau sebagian besar mengandung ikatan biokimia yang disebut polyphenols, termasuk didalamnya flavanoid. Flavanoid adalah suatu kelompok

antioksidan yang secara ilmiah ada pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman seperti teh dan anggur (Winarti, 2010: 207).

Pada tanaman, flavanoid memberikan perlindungan terhadap adanya stres lingkungan, sinar ultraviolet, serangga, jamur, virus, dan bakteri. Disamping sebagai pengendali hormon dan enzim inhibitor (Winarti, 2010: 207).

Flavanol merupakan satu dari sekian banyak antioksidan alami yang terdapat dalam tanaman pangan dan mempunyai kemampuan mengikat logam. Senyawa flavanol dalam teh hijau kurang disebut sebagai penentu kualitas, tetapi diketahui mempunyai aktivitas yang dapat menguatkan dinding pembuluh darah kapiler dan memacu pengumpulan vitamin C (Balittri, 2013: 13).

b. Golongan Bukan Fenol

Karbohidrat meliputi sukrosa, glukosa dan fruktosa. Keseluruhan karbohidrat yang terkandung dalam teh adalah 3-5% dari berat daun kering. Peranan karbohidrat dalam pengolahan teh yaitu dengan bereaksi dengan asam-asam amino dan katekin, yang pada suhu tinggi akan membentuk aldehid (Balittri, 2013: 13).

Pektin terutama terdiri dari pektin dan asam pektat, dengan kandungan berkisar antara 4,9-7,6% dari berat kering daun. Dalam proses pengolahan teh hijau pektin akan terurai menjadi asam pekat dan metal alkohol (Balittri, 2013: 14).

Alkaloid Sifat menyegarkan seduhan teh berasal dari senyawa alkaloid yang dikandungnya, dengan kisaran 3-4% dari berat kering daun. Alkaloid utama dalam daun teh adalah senyawa kafein, theobromin dan theofolin (Balittri, 2013: 14).

Protein dan Asam Amino dalam daun teh hijau dirasakan sangat besar peranannya dalam proses pembentukan aroma pada teh hijau terutama pada teh hitam. Perubahan utama pada proses pelayuan adalah penguraian protein menjadi asam-asam amino. Asam amino bersama karbohidrat dan katekin akan membentuk

senyawa aromatis asam amino, yang merupakan senyawa hidrokarbon, alkohol, aldehid, keton, dan ester. Asam amino yang banyak berperan dalam pembentukan senyawa aromatis adalah alanin, fenil alanin, valin, leusin, dan isoleusin (Balittri, 2013: 14).

Klorofil dan zat warna yang lain kandungan zat warna dalam daun teh hijau sekitar 0,019% dari berat daun kering daun. Salah satu unsur penentuan kualitas teh hijau adalah warnanya, sehingga klorofil sangat berperan dalam dalam warna hijau pada teh hijau (Balittri, 2013: 14).

Asam Organik dalam daun teh hijau berkisar 0,5-2% dari berat kering daun. Adapun jenis asam organik yang terkandung dalam daun teh hijau adalah asam malat, asam sitrat, asam suksinat dan asam oksalat. Dalam proses pengolahan teh hijau, asam-asam organik tersebut akan bereaksi dengan metal alkohol membentuk senyawa ester yang memiliki aroma yang enak (Balittri, 2013: 15).

Resin merupakan senyawa polimer rantai karbon, dengan kandungan pada daun teh hijau sekitar 3% dari berat kering daun. Peranan resin dalam pengolahan teh hijau adalah turut berperan dalam membentuk bau dan aroma teh hijau. Adapun peranan lain dari resin adalah meningkatkan daya tahan daun teh hijau terhadap embun beku (*frost*) (Balittri, 2013: 15).

Vitamin-Vitamin Pada daun teh hijau terkandung beberapa jenis vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E, dan K. pada umumnya vitamin-vitamin tersebut sangat peka terhadap proses oksidasi dan suhu yang tinggi, sehingga kandungan vitamin tersebut pada teh hijau (tanpa oksidasi) jauh lebih tinggi dari pada teh hitam.

Selain itu teh hijau mempunyai kandungan vitamin B (B1, B2, B3 dan B5) sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada sereal dan sayur. Begitupun kandungan vitamin C lebih tinggi dari buah apel, tomat ataupun jeruk,

sehingga minuman dua cangkir teh hijau akan setara dengan meminum segelas besar jus jeruk murni. Adapun dalam satu cangkir teh hijau mengandung vitamin E sebanyak 100-200 IU dan Vitamin K sebanyak 300-500 IU (Balittri, 2013: 15).

Kandungan vitamin dalam teh hijau dapat dikatakan kecil karena dalam proses pembuatannya teh hijau telah mengalami oksidasi sehingga menghilangkan vitamin C. demikian pula halnya dengan vitamin E yang banyak hilang selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pembuatan minuman teh hijau. Akan tetapi vitamin K terdapat dalam jumlah yang cukup banyak (300-500 IU/g) sehingga dapat menyumbang kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut (Winarti, 2010: 208).

Mineral dalam daun teh hijau sekitar 4-5% dari berat kering daun. Jenis mineral yang terkandung dalam daun teh adalah K, Na, Mg, Ca, F, Zn, Mn, Cu dan Se. dibandingkan dengan mineral lainnya F merupakan mineral yang kandungannya tertinggi dalam daun teh hijau, yang mempunyai fungsi penting dalam mempertahankan dan menguatkan gigi agar terhindar dari *karies* (Balittri, 2013: 15).

Senyawa aromatis merupakan salah satu sifat sebagai penentu kualitas teh hijau, dimana aroma tersebut sangat erat hubungannya dengan substansi aromatis yang terkandung dalam daun teh hijau. Substansi aromatis pembentuk aroma teh hijau merupakan senyawa volatile (mudah menguap), baik yang terkandung secara alamiah pada daun teh hijau maupun yang terbentuk sebagai hasil reaksi biokimia pada proses pengolahan teh hijau (pelayuan, penggulungan, oksidasi, enzimatik, pengeringan). Substansi aromatis yang terkadang secara alamiah jumlahnya jauh lebih sedikit dari pada yang terbentuk selama proses pengolahan teh hijau (Balittri, 2013: 15).

Enzim yang terkandung dalam daun teh hijau diantaranya adalah invertase, amylase, B-glukosidase, oksimetilase protease, dan proksidase yang berperan sebagai biokatalisator pada setiap reaksi kimia didalam tanaman (Balittri, 2013: 16).

B. Tinjauan Platelet

Platelet merupakan sel darah yang berperan pada proses hemostatis. Platelet beragregasi membentuk sumbat hemostatis ketika terjadi luka pada pembuluh darah. Sumbat hemostatis dapat berupa bekuan darah yang terbentuk dari agregat-agregat platelet, yang disebut sebagai thrombus. Dalam keadaan normal, thrombus terbentuk untuk mencegah perdarahan, namun pada pembentukan thrombus patologis, thrombus akan tetap terbentuk walaupun tidak ada luka pada pembuluh darah. Thrombus patologis tersebut dapat menyebabkan kelainan vaskuler infark miokard, stroke, dan penyakit perhiperal vaskuler. Penyakit kelainan vaskuler dapat ditangani dengan menggunakan terapi obat-obatan antitrombosit, meliputi antiplatelet, antikoagulan dan fibrinolitik (Putri, 2014: 112).

Platelet menjadi sumbat hemostasis awal di tempat perlukaan pembuluh darah. Platelet juga terlibat dalam trombus patologis yang menyebabkan infark miokard, stroke, dan trombosis pembuluh perifer. Inhibitor fungsi platelet yang kuat telah dikembangkan pada beberapa tahun terakhir. Obat-obat ini bekerja dengan mekanisme yang berlainan, karenanya jika dikombinasikan efeknya bersifat aditif atau bahkan sinergis. Ketersediaan antiplatelet telah membawa suatu revolusi dalam pengobatan kardiovaskular. Dengan obat-obat ini, angiospasi dan pemaangan stent pada lesi vaskular kini memungkinkan dengan laju kejadian restenosis dan trombosis yang rendah, jika inhibisi platelet yang efektif dilakukan (Hardman, 2014: 1505)

Pada saat terjadi pendarahan, secara alami tubuh akan merespon dengan mekanisme hemostatik untuk menghentikan pendarahan tersebut. Sistem

penghentian pendarahan yang berfungsi normal penting bagi kehidupan organisme, karena jika hemostasis terganggu maka luka yang kecil sekalipun dapat menyebabkan pendarahan yang membahayakan jiwa, sebaliknya pada kecenderungan darah untuk membeku akan mempermudah pembentukan thrombus dan meningkat resiko trombosis dan emboli (Ketut, 2011: 97)

Pada saat terjadi trauma, platelet, faktor pembekuan darah dalam plasma dan dinding pembuluh darah berinteraksi untuk menutup kebocoran pada pembuluh darah. Pembuluh darah yang rusak akan berkonstriksi melepaskan endotelin dan platelet akan beragregasi pada situs luka dan menarik platelet lain untuk menutup bocoran dengan sumbatan platelet. Waktu yang diperlukan untuk menutup luka tersebut disebut pendarahan yang berkisar 2-4 menit. Selanjutnya, sistem koagulasi akan memproduksi fibrin yang saling berikatan silang yang membentuk bekuan fibrin atau thrombus yang memperkuat proses penutupan luka. Proses rekalisasi pembuluh darah dapat dilakukan melalui fibrinolisis (Ketut, 2011: 98).

Fungsi platelet darah diatur oleh tiga katagori substansi. Kelompok pertama terdiri atas agen-agen yang dibentuk diluar platelet yang berintraksi dengan reseptor-reseptor membrane platelet, misalnya catecholamine, collagen, trombin, dan protacyclin. Katagori kedua terdiri atas agen-agen yang dibentuk didalam platelet yang berintraksi dengan reseptor-reseptor membrane, misalnya, ADP, prostaglandin D₂, Prostaglandin E₂, dan serotonin. Katagori ke 3 terdiri atas agen-agen yang dibentuk di dalam platelet yang bekerja di dalam platelet, misalnya, prostaglandin endoproxide dan thromboxane A₂, nukleotida- nukleotida siklis cAMP dan cGMP, dan ion kalsium. Dari daftar agen-agen ini beberapa target obat-obat telah diidentifikasi sebagai penghambat metabolisme prostaglandin (Aspirin), penghambatan

agregasi platelet yang diinduksi ADP (clopidogrel, ticlopidine), dan penyangkatan reseptor-reseptor GP IIb/IIIa pada platelet-platelet (Katzung, 2014: 405-406)

Pada saat terjadi trauma pada sel endothelial, platelet merupakan sel darah yang melekat pada serat kolagen sub-endothelial yang dijumpai oleh faktor von willebrand (vWF) yang dibentuk oleh sel endothelial dan bersirkulasi dalam kompleks plasma dengan faktor VIII. Kompleks glycoprotein GP Ib/ IX pada platelet merupakan reseptor vWF. Proses adhesi akan mengaktifkan platelet. Serotonin, platelet derived growth factor (PDGF) dan tromboxane A₂ (TXA₂) meningkatkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi dan kontraksi platelet akan memperlambat aliran darah (Ketut, 2011: 103).

Mediator yang dilepaskan oleh platelet meningkatkan aktivasi platelet sehingga menarik dan mengaktifkan lebih banyak platelet. Hal ini menyebabkan bentuk dari platelet teraktivasi berubah drastis. Platelet diskoid berubah menjadi sferik dan menghasilkan pseudopodia yang saling terjalin antar platelet. Agregasi platelet ini ditingkatkan oleh thrombin (IIA) yang berikatan dengan reseptor yang diaktivasi oleh protease (PAR 1 dan PAR 4) dan distabilisasi oleh GP IIb/IIIa yang diekspresikan pada permukaan platelet, yang mengarah pada ikatan fibrinogen dan agregasi platelet. Reseptor P2Y₁ dan P2Y₁₂ merupakan reseptor untuk ADP dan ketika terstimulasi akan mengaktifkan GP IIb/IIIa dan COX 1 yang meningkatkan sekresi dan daya adesi platelet sehingga memudahkan untuk berikatan dengan fibronectin subendothelial, Tromboxan A₂ (TXA₂) merupakan produk dari COX 1 yang mengaktifkan agregasi platelet sedangkan PGI₂ atau prostasiklin dihasilkan oleh sel endothelial untuk menghambat aktivasi agregasi platelet (Ketut, 2011: 103).

Proses terjadinya pembekuan darah. Bila kepingan darah menyentuh permukaan luka maka keping darah akan pecah. Pada saat pecah, keping darah mengeluarkan enzim trombokinase (tromboplastin) yang dikandungnya. Dengan bantuan ion kalsium (Ca^{2+}) dan vitamin K-enzim trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin adalah suatu zat yang larut dan dihasilkan di hati. Selanjutnya trombin merubah fibrinogen yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin membentuk benang-benang halus. Benang-benang halus menjerat sel darah merah membentuk gumpalan sehingga darah membeku (Ketut, 2011: 104).

C. Tinjauan Obat Platelet (Aspirin)

Asetosal atau asam asetil salisilat atau aspirin adalah agen analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi. Sifat anti-inflamasi berkaitan dengan penghambatan biosintesis prostaglandin. Struktur kimia asetosal dan turunan salisilat adalah sebagai berikut.

1. Farmakologi

Aspirin merupakan obat trombosis, radang, penyembuhan luka dan alergi, dimodulasi oleh metabolit arakidonat teroksidasi dan asam lemak poliatik jenuh lainnya yang secara keseluruhan dinamakan eikosanoid. Penggangguan pada sintesis eikosanoid merupakan dasar dari efek banyak senyawa terapeutik, termasuk analgesic, obat-obat anti radang, dan senyawa antitrombotik (Hardman, 2014: 1505)

Aspirin memblok produksi tromboksan A_2 dengan mengasetilasi residu sering secara kovalen di dekat sisi aktif siklooksigenase, yakni enzim yang menghasilkan precursor endoperoksida siklik tromboksan A_2 . Karena platelet tidak mensintesis protein baru, kerja aspirin pada platelet siklooksigenase bersifat permanen, bertahan sepanjang usia platelet (7 hingga 10 hari). Dengan demikian, dosis aspirin yang diberikan berulang menghasilkan efek kumulatif terhadap fungsi platelet. Inaktivitas

sempurna platelet siklooksigenase yang dicapai pada penggunaan 160mg aspirin setiap hari. Oleh karena itu, aspirin merupakan senyawa anti trombotik yang sangat aktif pada dosis yang jauh lebih rendah dari pada yang dibutuhkan untuk kerja lain dari obat ini. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa aspirin, jika digunakan sebagai obat anti trombotik akan efektif secara maksimal pada dosis 160 mg hingga 320mg per hari. Dosis yang lebih tinggi tidak memperbaiki efikasi; bahkan kemungkinan besar efeksikasinya berkurang akibat inhibisi produksi prostasiklin, hal ini sebagian besar dapat dihindarkan dengan penggunaan dosis aspirin yang lebih rendah. Dosis yang lebih tinggi juga meningkatkan toksisitas, terutama perdarahan (Hardman, 2014: 1505)

Pada saat terjadi trauma vaskular, sistem koagulasi akan diaktivasi. Platelet dan molekul fibrin bergabung membentuk bekuan darah untuk menyumbat dan menghentikan proses pendarahan atau hemostasis. Bekuan darah yang tidak diinginkan dalam pembuluh darah disebut thrombus. Trombosis biasanya muncul pada saat aliran darah lambat sehingga faktor pembekuan darah yang teraktivasi terakumulasi dan tidak mengalir. Masalah yang bisa muncul adalah trombosis pasca operasi pada vena kaki. Kadang sebagian trombus pecah (emboli) dan dibawa jauh sehingga dapat menyebabkan kerusakan parah seperti emboli paru-paru. Pada fibrilasi atrial, kehilangan kontraksi atrial menyebabkan statis darah dan menstimulasi pembentukan trombus. Trombus ini dapat lepas dan menyebabkan emboli pada otak atau yang lebih dikenal dengan stroke.

Asetosal menurunkan resiko infark miokard pada pasien dengan angina yang tidak stabil dan meningkatkan kelangsungan hidup pasien yang pernah mengalami infark miokardia akut. Asetosal juga menurunkan risiko stroke pada pasien dengan serangan iskemia transien. Efek yang menguntungkan dari asetosal pada penyakit

tromboemboli disebabkan oleh inhibisi sintesis platelet tromboksan A₂ (TXA₂). Tromboksan A₂ adalah penginduksi kuat terjadi agregasi platelet . Tromboksan A₂ (TXA₂) bekerja pada reseptor permukaan dan mengaktifasi fosfolipase C menyebabkan pembentukan inositol trifosfat yang menyebabkan peningkatan kalsium intraselular. Kalsium mengubah reseptor GPIIb/IIIa inaktif pada membrane platelet menjadi konformasi dengan afinitas tinggi terhadap fibrinogen yang membentuk ikatan silang antar platelet dan menyebabkan agregasi (Neal, 2010: 45).

Sel endotel pada dinding pembuluh darah menghasilkan prostaglandin, PGI₂ (prostasiklin), yang merupakan antagonis fisiologis dari tromboksan A₂ (TXA₂). PGI₂ menstimulai reseptor yang berbeda pada platelet dan mengaktifasi adenilsiklase. Hasil dari peningkatan cAMP ini berhubungan dengan penurunan kalsium intraselular dan inhibisi agregasi platelet. Asetosal menghambat pembentukan tromboksan A₂ (TXA₂) dengan menghambat siklooksigenase secara irreversible. Platelet tidak dapat mengintesis enzim baru tetapi sel endotelial dapat dan pada dosis rendah (75-300 mg) yang diberikan setiap hari, asetosal dapat memberikan efek inhibisi selektif pada enzim siklooksigenase. Dengan demikian keseimbangan efek antiagregasi platelet dari PGI₂ dan efek proagregasi platelet, tromboksan A₂ (TXA₂) berubah kearah yang menguntungkan (Neal, 2010: 45).

Inhibitor biosintesis eikosanoid lainnya telah dievaluasi sebagai senyawa antitrombiotik potensial, terutama inhibitor tromboksan sintetase. Secara teoritis, obat-obat ini memiliki manfaat dalam menghambat produksi tromboksan A₂ tanpa memblok sintesis prostasiklin, yaitu eikosanoid antrombiotik yang diproduksi oleh endothelium vaskular. Namun, obat-obat ini memungkinkan senyawa antara endoperoksida siklik berakumulasi; senyawa-senyawa antara tersebut menstimulasi aregasi platelet. dengan demikian, obat-obat ini relative tidak efektif dan tidak

sebanding dalam hal biaya, keamanan dan efikasi terhadap aspirin (Hardman, 2014: 1505)

Dosis antiagregasi oral 1 dd 40-100mg atau 50-125mg (Tjay, 2015: 322)

2. Efek samping

Efek samping yang umum adalah mual, muntah, dan diare. Yang paling berbahaya adalah neutropenia pada sekitar 1% pasien. Oleh karena itu, harus sering dilakukan perhitungan bilangan darah selama beberapa bulan pertama terapi jumlah platelet yang harus dipantau karena trombositopenia trombotik (yang terjadi) dikaitkan dengan pemakaian tiklopidin; hal ini biasanya berhenti jika obat dihentikan (Hardman, 2014: 1506)

D. Tinjauan Flavanoid

Tumbuhan merupakan faktor yang senantiasa dipersoalkan oleh manusia karena sangat berkaitan dengan kehidupan. Untuk itu diperlukan pengamatan yang serius atas berbagai macam tumbuhan, baik dilihat dari kegunaan yang dimiliki, sifat-sifat, kandungan kimia maupun kegunaan tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki fungsi atau kegunaan yang sangat bermanfaat bagi manusia sehingga mendorong para ahli untuk meneliti kandungan serta cara ekstraksi dan isolasi senyawa aktif (Handayani, 2016: 211)

Flavanoid adalah turunan 1,3-difenilpropan, merupakan sekelompok produk alami yang luas dan tersebar dalam tanaman tingkat tinggi. Kelompok senyawa ini juga ditemukan dalam tanaman tingkat rendah seperti algae. Kebanyakan flavanoid merupakan senyawa yang berwarna kuning, dan beberapa pada warna kuning bunga dan buah, yang mana flavonoid ini berada sebagai glikosida (Sarker, 2009: 521).

Kebanyakan flavanoid berada sebagai glikosida, dan dalam satu kelompok dapat dikarakterisasi sebagai monoglikosida, diglikosida, dan sebagainya. Saat ini

lebih dari 2000 glikosida flavon dan flavonol telah diisolasi sampai saat ini. Kebanyakan flavonoid merupakan senyawa antioksidan yang poten. Beberapa flavonoid mempunyai sifat anti inflamasi, anti-hipotoksik, anti-tumor, anti-mikroba, dan anti-virus, beberapa obat tradisional dan tanaman obat mengandung flavanoid sebagai senyawa bioaktif. Sifat antioksidan flavanoid yang pada buah dan sayuran segar diduga berkontribusi pada kemampuannya untuk melindungi tubuh terhadap penyakit jantung dan penyakit kanker (Sarker, 2009: 522).

Flavonoid merupakan salah satu jenis antioksidan yang dapat menghambat pelekatan, agregasi, dan sekresi platelet (Shalehah, 2015: 140). Kemampuan flavonoid dalam menghambat agregasi platelet ini disebabkan karena flavonoid tersebut mampu menghambat metabolisme asam arakidonat oleh Siklooksiginase. Siklooksiginase berperan dalam membantu meningkatkan jumlah trombosit, apabila jumlah Siklooksiginase dapat dihambat, maka jumlah trombosit pun juga akan ikut menurun (Middleton *et al*, 2000: 698). Flavonoid berperan penting dalam menekan terjadinya penyakit jantung koroner. Hal ini dikarenakan flavanoid dapat menghambat proses penggumpalan platelet yang merupakan penyebab penyakit jantung (Vita, 2005: 292). Antioksidan flavonoid yang memiliki kemampuan untuk menurunkan jumlah trombosit, yang dapat meminimalkan risiko aterosklerosis. (Retnaningsih, 2011: 80).

Flavonoid mampu menghambat agregasi platelet karena adanya kemampuan dalam menghambat pelepasan mediator asam arakidonat dari membrane sel sehingga jalur metabolisme siklooksigenase menjadi terhambat. Adanya penghambatan siklooksigenase menyebabkan tromboksan A₂ tidak terbentuk atau berkurang, penurunan aktivasi platelet dan penggumpalan platelet pada pembentukan trombus

terhambat. Ketika pembentukan trombus terhambat maka waktu pendarahan akan semakin meningkat (Putri, 2014: 112).

E. Ekstraksi

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Dirjen POM, 1979: 30).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 2014: 42).

Proses untuk mendapatkan ekstrak disebut ekstraksi, yaitu penyarian zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut

1. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Dirjen POM, 1995: 7).

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia dapat dipandang sebagai bahan awal dianalogkan dengan komoditi bahan baku obat dengan fitofarmasi

diproses menjadi bahan antara atau produk jadi. Ekstrak sebagai bahan antara berarti masih menjadi bahan yang dapat diproses lagi menjadi fraksi-fraksi. Isolat senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain.

Ekstrak dikelompokkan atas dasar sifatnya ,yaitu :

- a) Ekstrak encer adalah sediaan yang memiliki konsentrasi semacam madu dan dapat dituang.
- b) Ekstrak kental adalah sediaan yang liat didalam keadaan diinginkan tidak dapat dituang. Kandungan air berjumlah sampai 30% .
- c) Ekstrak kering sediaan yang memiliki konsentrasi kering dan mudah dituang. Sebaiknya memiliki kandungan lembab, tidak lebih dari 5%.
- d) Ekstrak cair adalah ekstrak yang dibuat sedemikian rupa sehingga 1 bagian simplisia sesuai dengan 2 bagian ekstrak cair.

2. Mekanisme Ekstraksi

Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara otomatis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel, mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif ke luar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harborne, 1987: 6).

3. Jenis-jenis Ekstraksi

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara kering. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dibagi kedalam dua cara yaitu:

Metode Dingin

a. Maserasi

Maserasi (perendaman) yakni merendam material di dalam pelarut. Maserasi adalah metode ekstraksi pilihan pada tahap pendahuluan ataupun ekstraksi perbanyakannya. Selain karena simple atau sederhana juga tidak banyak gangguan fisis. (Syaifuddin, 2014: 39).

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara memasukkan simplisia yang sudah diserbukkan dengan derajat halus tertentu sebanyak 10 bagian ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan 75 bagian cairan penyari, ditutup, kemudian dibiarkan selama 5 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, disaring ke dalam wadah penampung kemudian ampasnya diperas dan ditambah cairan penyari lagi secukupnya dan diaduk kemudian disaring lagi hingga diperoleh sari sebanyak 100 bagian. Sari yang diperoleh ditutup dan disimpan pada tempat yang terlindung dari cahaya selama 2 hari, endapan yang diperoleh dipisah dan filtrate dipisahkan (Fachruddin, 2001:20).

b. Perkolasi

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014: 363)

Metode Panas

a. Metode Soklet

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Ke-untungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehing-ga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiann-ya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang di-peroleh terus-menerus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014: 363)

b. Destilasi Uap

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak,lalu dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali. Pada metode reflux, sampel di-masukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pel-arut dipanaskan hingga mencapai titik did-ih. Uap terkondensasi dan kembali ke da-lam labu(Mukhriani, 2014: 363)

F. Uraian Hewan Coba

Mencit (*Mus musculus L.*) termasuk mamalia pengerat (rodensia) yang cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomisnya dan fisiologisnya terkarakteristik dengan baik. Mencit yang sering digunakan dalam penelitian di laboratorium merupakan hasil perkawinan

tikus putih “*inbreed*” maupun “*outbreed*”. Dari hasil perkawinan sampai generasi 20 akan dihasilkan strainstrain murni dari mencit. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Mencit (Foto Pribadi)

Karakteristik Hewan Uji

1. Klasifikasi Mencit(Akbar, 2010: 7)

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub Filum	: Vertebrata
Kelas	: Mammalia
Sub Kelas	: Theria
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i> L

Mencit (*Mus musculus* L.) memiliki ciri-ciri berupa bentuk tubuh kecil, berwarna putih, memiliki siklus estrus teratur yaitu 4-5 hari. Kondisi ruang untuk pemeliharaan mencit (*Mus musculus* L.) harus senantiasa bersih, kering dan jauh dari kebisingan. Suhu ruang pemeliharaan juga harus dijaga kisarannya antara 18-19°C serta kelembaban udara antara 30-70%. Mencit betina dewasa dengan umur 35-60

hari memiliki berat badan 18-35 g. Lama hidupnya 1-2 tahun, dapat mencapai 3 tahun. Masa reproduksi mencit betina berlangsung 1,5 tahun. Mencit betina ataupun jantan dapat dikawinkan pada umur 8 minggu. Lama kebuntingan 19-20 hari. Jumlah anak mencit rata-rata 6-15 ekor dengan berat lahir antara 0,5-1,5 g (Akbar, 2010: 6)

Pengamatan perilaku pada mencit (*Mus musculus L*) terdiri dari pengamatan jumlah jengukan, aktivitas motorik, fenomena straub, piloereksi, ptosis, refleks corneal, refleks pineal, lakrimasi, vasodilatasi, katalepsi, gelantung, reestablishment, jalan mundur, jalan melingkar, fleksi, haffner, geliat, grooming, tremor, gemetar badan, vokalisasi, urinasi, defekasi, denyut jantung, pernafasan, salivasi, mortalitas, dan sikap tubuh.

Mencit sering digunakan dalam penelitian dengan pertimbangan hewan tersebut memiliki beberapa keuntungan yaitu daur estrusnya teratur dan dapat dideteksi, periode kebuntingannya relatif singkat, dan mempunyai anak yang banyak serta terdapat keselarasan pertumbuhan dengan kondisi manusia (Akbar, 2010: 6)

Mencit putih jantan digunakan dengan alasan kondisi biologisnya stabil bila dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi masa siklus estrus. Disamping keseragaman jenis kelamin, hewan uji digunakan juga mempunyai keseragaman berat badan (antara 20-30 gram), dan umur (3-4 bulan). Hal ini bertujuan untuk memper kecil variabilitas biologis antar hewan uji yang digunakan, sehingga dapat memberikan respon yang relatif lebih seragam terhadap rangsang kimia yang digunakan dalam penelitian ini. Pengelompokan hewan uji dilakukan secara acak, maksudnya adalah setiap anggota dari masing-masing kelompok perlakuan memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

G. Tinjauan Islam

Agama kita yaitu islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan ibadah kepada kepada Allah SWT dan bekerja serta aktivitas lainnya. Tanpa adanya kondisi kesehatan seseorang, maka dari itu berbagai kewajiban pokok akan sulit dilaksanakan dan Allah menciptakan bintang-bintang untuk dimanfaatkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Yaasin: 71-73:

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَونَ ۗ ۷١ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۗ ۷٢ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۗ ۷٣

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur.

Adapun tafsiran dari ayat tersebut adalah “Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan,” yaitu, diantaranya ada yang ditunggangi dalam perjalanan serta untuk membawa berbagai barang-barang yang berat menuju berbagai arah dan daerah. “Dan sebahagiannya mereka makan,” jika mereka mau mereka dapat memotong dan menyembelihnya. “Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat,” yaitu pada bulu-bulu tebalnya, bulu-bulu tipisnya dan rambutnya sebagai barang-barang rumah tangga atau barang-barang dagangan hingga batas waktu tertentu. “Dan minuman,” dari susunya dan air seninya untuk berobat dan lain-lain. “Maka mengapakah mereka tidak

bersyukur?”Mengapakah mereka tidak juga mengesakan Pencipta dan Pengatur semua itu serta menyekutukan-Nya dengan yang lain-Nya (Shihab, 2009: 194-195).

Dalam Qur’an Surah An-Nahl: 66 Allah SWT berfirman:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ ۚ ۖ ٦٦

Terjemahannya:

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.” (an-Nahl [16]:66)

Tafsiran ayat diatas: Allah SWT berfirman “Dan sesungguhnya bagi kamu,” wahai sekalian umat manusia “pada bintang ternak itu,” yaitu unta, sapi dan kambing, “*benar-benar terdapat pelajaran,*” artinya, merupakan tanda sekaligus bukti atas kebijaksanaan kekuasaan, kasih sayang dan kelembutan Penciptanya. “Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya,” Dia sendirikan hal tersebut disini untuk kembali pada makna nikmat, ayau fhamir (kata ganti) disini kembali pada hewan, karena sesungguhnya binatang ternak itu adalah hewan. Artinya. Kami memberi kalian minum dari apa yang terdapat di dalam perut hewan tersebut (Shihab, 2009: 639).

Hal ini di dukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-qur’an dan hadits yang berkaitan dengan kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat An-Naba’ (78) : 14-15.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ ١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ ١٥

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan.

Adapun penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah menurunkan dari awan air hujan yang banyak dan memberi manfaat, terutama untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia dan binatang. Hal itu bertujuan agar dapat menumbuhkan biji-bijian seperti gandum, sayur, padi dan tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanan manusia dan hewan ternak. Dalam ayat ini, Allah menyebut bermacam-macam tanaman yang tumbuh di bumi, di antaranya ada yang mempunyai batang dan ada yang tidak. Ada yang menghasilkan buah-buahan dan ada pula yang menghasilkan biji-bijian seperti gandum, padi dan lain-lain untuk makanan manusia (Shihab, 2009: 12).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa rasulullah bersabda :

Artinya :

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . رواه البخاري

Dari Abu Hurairah ra, dari nabi saw, bersabda ; “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya”. (H.R. Al-Bukhari, VII, 12)

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui, penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, bukan berarti tumbuhan yang menyembuhkan tetapi atas seizin Allah.

Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.

Dari ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu

pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Agar manusia senantiasa mengisyaratkan atau bersyukur atas segala pemberian Allah SWT melalui tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kebutuhan pengobatan manusia. Tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT dapat digunakan sebagai obat untuk kesembuhan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengandung suatu zat atau obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi menyembuhkan penyakit tertentu.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimentatif laboratorium (Siswanto, 2015:43)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan pengaruh variabel lain. Metode ini dilaksanakan dengan memberikan variabel bebas kepada objek penelitian untuk diketahui akibatnya didalam variable terikat.

C. Sampel

1. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Daun Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

2. Pengambilan Sampel

Sampel diambil pada tanggal 17 Oktober 2017. Tumbuhan teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) yang diambil bagian daunnya. Daun yang digunakan adalah daun yang tidak rusak dan tidak berjamur. Daun teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) yang diambil sebanyak 6 kg sampel basah.

D. Instrumen Penelitian

Dalam Pelaksanaan penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang digunakan antara lain :

1. Alat

Alat yang digunakan antara lain adalah Tabung reaksi (Pyrex[®]), bejana maserasi, cawan porselin, *water bath*, pisau bedah steril no.11 (Gea[®]), rotavapor (heidolf[®]), timbangan analitik (precisa[®]), sendok besi (Stainlis), kanula, dan spoit (one mad[®])

2. Bahan

Bahan yang digunakan antara lain adalah alumunium foil, air suling, aspirin (aspilets[®]), ekstrak teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze), kertas saring, kapas, etanol 70%, dan Mencit jantan (*Mus musculus*).

E. Metode Kerja

1. Pengolahan Sampel

Daun teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) yang diambil 6 kg sampel basah, dipisahkan antara ranting-ranting, setelah dipisahkan dari ranting-rantingnya dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan dilemari pengering lalu di serbukkan hingga menjadi simplisia.

2. Ekstraksi sampel

Pengumpulan dan penyiapan daun teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze), kemudian daun teh hijau dicuci bersih, dikeringkan dan dimasukkan kedalam oven simplisia dengan suhu 50⁰C selama 1-2 hari. Daun teh hijau dinyatakan sudah kering jika mudah dipatahkan. Simplisia disediakan sebanyak 500 gram lalu dimasukkan kedalam wadah maserasi, direndam dengan penyari etanol 70% hingga simplisia terbasahi seluruhnya dan didiamkan selama 2-3 hari serta ditutup dengan menggunakan alumunium foil untuk menjaga agar tidak terjadi

penguapan dan hasil ekstrak yang diperoleh akan lebih baik. Proses ini disebut sebagai tahap maserasi. Rendaman serbuk daun teh hijau diperas dengan menggunakan kertas saring. Prosedurselanjutnya, hasil saringan daun teh hijau diekstraksi menggunakan alat rotavapor dengan suhu 50⁰C selama 4 jam yang berguna untuk memisahkan pelarut dengan ekstrak daun teh hijau agar diperoleh ekstrak yang kental.

3. Pemilihan dan Penyiapan hewan Uji

a. Pemilihan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang dewasa dan sehat dengan berat rata-rata 20-30 g sebanyak 15 ekor.

b. Penyiapan Hewan

Hewan yang digunakan pada penelitian ini adalah mencit jantan yang sehat dan dewasa sebanyak 15 ekor yang terlebih dahulu dikarantina selama seminggu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang diberi pakan dan minum.

4. Pembuatan suspensi NaCMC 1%

Serbuk NaCMC 1% ditimbang sebanyak 1 gram kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit aquadest dalam erlenmayer, sambil di aduk, lalu dicukupkan dengan aquadest 100 ml.

5. Pemberian Perlakuan

- a. Kelompok I (kontrol negatif) diberikan NaCMC 1 %
- b. Kelompok II (kontrol positif) diberikan Aspirin 0,85%/30g BB
- c. Kelompok III diberikan ekstrak etanol teh hijau konsentrasi 10%/30g BB
- d. Kelompok IV diberikan ekstrak etanol teh hijau konsentrasi 25%/30g BB
- e. Kelompok V diberikan ekstrak etanol teh hijau konsentrasi 50%/30g BB
- f. Aspirin dan semua dosis ekstrak teh hijau disuspensikan dengan NaCMC.

- g. Semua kelompok perlakuan diberi bahan uji secara oral sekali sehari selama 8 hari.

6. Pengukuran

Penentuan waktu pendarahan dilakukan pada mencit kelompok uji pada hari ke-0 dan hari ke-9, dengan cara melukai ekor mencit yang terlebih dahulu dibersihkan dengan etanol. Ekor mencit dilukai dengan menggunakan pisau bedah dengan kedalaman tidak lebih dari 2 mm. Darah yang diserap pada kertas saring dengan interval tertentu. Waktu mulai keluar tetesan darah sampai tidak terdapat tetesan darah lagi pada kertas saring digunakan sebagai waktu perdarahan. Perdarahan ditandai dengan mulai keluarnya darah pada saat ekor mencit dilukai.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan hasil penentuan waktu perdarahan pada hari ke-0, dan hari ke-9, dapat ditentukan persentase peningkatan waktu perdarahan, metode yang dipakai adalah anova satu arah, serta Least significance Different (LSD) untuk melihat perbandingan antara setiap perlakuan.

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan uji statistika yang sesuai, yang harus sudah ditulis dalam usulan penelitian. Uji hipotesis yang akan digunakan terhadap data yang mana harus pula sudah ditetapkan pada waktu perencanaan uji. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan uji hipotesis adalah skala pengukuran variable independen dan dependen, distribusi data (normal atau tidak normal), besar sampel, jumlah kelompok serta jumlah variable. Apabila variable bebas berskala nominal lebih dari 2 kelompok sedangkan variable efek berskala numeric, maka digunakan analisis varians (Anova) (Sastroasmoro, 2014: 92)

Setelah kita mengetahui langkah-langkah pengolahan data, selanjutnya akan dibahas entry data menggunakan SPSS. SPSS merupakan paket program statistic

yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Kemampuan yang dapat diperoleh dari SPSS meliputi pemrosesan segala bentuk file data, modifikasi data, membuat tabulasi berbentuk distribusi frekuensi, analisis statistic deskriptif, analisis lanjut yang sederhana maupun kompleks, dan sebagainya (Hastono, 2006: 103)

Bila jumlah kelompok lebih dari dua, maka uji hipotesis yang sesuai adalah Anova (analisis varians), dengan cara sekaligus membandingkan rerata antara semua kelompok. Bila Anova tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka pengujian selanjutnya tidak diperlukan. Sebaliknya, apabila Anova memberikan hasil yang bermakna, maka perlu dilakukan pengujian selanjutnya, dengan maksud untuk menentukan dimana letak perbedaan tersebut (Sastroasmoro, 2014: 92)

Telah disebutkan bahwa uji hipotesis dimulai dengan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan antar dua variable (hipotesis nol). Dengan dasar asumsi tersebut, dan dengan perhitungan menggunakan rumus tertentu, pada akhirnya akan diperoleh nilai p (Sastroasmoro, 2014: 329)

Sebelum era computer, nilai p dilihat dari table pada tiap buku statistika, sehingga tidak akan diperoleh nilai absolutnya, melainkan dinyatakan sebagai $p < 0,05$; atau $p < 0,01$, kini dengan computer nilai p yang tepat dapat diperoleh. Bila dinyatakan $p > 0,05$, maka ditafsirkan bahwa nilai p sebagai tidak bermakna (Sastroasmoro, 2014: 336)

Analisis multi comparison (Post Hoc Test) bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang berbeda mean-nya bilamana pada pengujian Anova dihasilkan ada perbedaan bermakna (H_0 ditolak) (Hastono, 2006: 129)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil dari Ekstrak Daun Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

Daun teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sebanyak 500 gram di ekstraksi menggunakan metode maserasi.

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun teh hijau (*Camellia Sinensis* L)

Sampel	Pelarut	Berat Ekstrak	Rendamen
Daun Teh hijau 500 gram	Etanol 70%	86 gram	17,2%

Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 15 ekor mencit digunakan sebagai sampel, yang terbagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 3 ekor mencit. Masing-masing kelompok yaitu, Kelompok 1 Aspirin 0,85 mg, kelompok 2 Na-CMC 1%, kelompok 3 Ekstrak daun Teh hijau 10%/30g BB, kelompok 4 ekstrak daun teh hijau 25% /30g BB, dan kelompok 5 Ekstrak daun teh hijau 50%/ 30g BB. Hasil penentuan waktu perdarahan pada hari ke-0 dan hari ke-9, dapat ditentukan persentase peningkatan waktu perdarahan, dianalisis secara statistik dengan uji Anova.

Tabel 2. Data hasil penentuan waktu perdarahan pada hari ke-0 dan ke-9

Kelompok Perlakuan	Rerata waktu perdarahan	
	Hari ke-0	Hari ke-9
Kontrol + (Aspirin 0,85 mg)	63,07	191,97
Kontrol – (Na-CMC 1%)	62,75	72,48
Ekstrak daun teh hijau 10% /30g BB	71,64	147,17
Ekstrak daun teh hijau 25% /30g BB	63,71	155,86
Ekstrak daun teh hijau 50% /30g BB	68,56	189,76

Berdasarkan data dari tabel tersebut, perbedaan besarnya peningkatan waktu perdarahan pada masing-masing kelompok diketahui, melalui perhitungan persentase peningkatan waktu perdarahan. Persentase peningkatan waktu perdarahan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Persentase peningkatan rata-rata waktu perdarahan

Kelompok Perlakuan	Peningkatan (%)
Kontrol + (Aspirin 0,85 mg)	210,84
Kontrol – (Na-CMC 1%)	15,25
Ekstrak daun teh hijau 10% /30g BB	106,09
Ekstrak daun teh hijau 25% /30g BB	145,51
Ekstrak daun teh hijau 50% /30g BB	178,78

Berdasarkan uji yang dilakukan pada (*multiple Comparisoms*) diperoleh nilai P dari perbandingan tiap kelompok untuk melihat tingkat signifikan antara tiap-tiap dua kelompok.

Tabel 4. Nilai p-value dari rata-rata perlakuan antar kelompok

No	Kelompok yang dibandingkan	Nilai P	Ket.*
1	Aspirin dan Na-CMC	0,000	Bermakna
2	Aspirin dan Teh hijau 10%	0,000	Bermakna
3	Aspirin dan Teh hijau 25%	0,000	Bermakna
4	Aspirin dan Teh hijau 50%	0,728	Tidak bermakna
5	Na-CMC dan Teh hijau 10%	0,000	Bermakna
6	Na-CMC dan Teh hijau 25%	0,000	Bermakna
7	Na-CMC dan Teh hijau 50%	0,000	Bermakna
8	Teh hijau 10% dan Teh hijau 25%	0,189	Tidak bermakna
9	Teh hijau 10% dan Teh hijau 50%	0,000	Bermakna
10	Teh hijau 25% dan Teh hijau 50%	0,000	Bermakna

Keterangan :

- Jika nilai $p < 0.05$ maka hasilnya bermakna atau signifikan
- Jika nilai $p > 0,05$ maka hasilnya perbedaan tidak bermakna atau non signifikan

B. Pembahasan

Teh merupakan tanaman yang dikenal luas dan salah satu produk minuman terpopuler yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia dikarenakan teh mempunyai rasa dan aroma yang khas, selain itu teh juga dipercaya mempunyai khasiat bagi kesehatan

Teh hijau merupakan tumbuhan obat yang mempunyai efek farmakologis antara lain sebagai antioksidan, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, trigliserida, serta glukosa, dapat mencegah karies pada gigi, antimutagenik, antibakteri. Teh hijau sebagian besar mengandung ikatan biokimia yang disebut polyphenols, termasuk didalamnya flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu jenis antioksidan yang dapat menghambat pelekatan, agregasi, dan sekresi platelet. Kemampuan flavonoid dalam menghambat agregasi platelet ini disebabkan karena flavonoid tersebut mampu menghambat metabolisme asam arakidonat oleh siklooksiginase. Siklooksiginase berperan dalam membantu meningkatkan jumlah trombosit, apabila jumlah siklooksiginase dapat dihambat, maka jumlah trombosit pun juga akan ikut menurun.

Pembuatan ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis* L) dilakukan dengan cara maserasi. Serbuk teh hijau sebanyak 500 gram dimaserasi menggunakan etanol 70% selama 24 jam, kemudian diganti pelarut yang sama hingga 3 kali penggantian. Ekstrak dipisahkan dengan residu menggunakan kertas saring. Ekstrak cari diuapkan dengan rotavapor ber suhu 50 °C sehingga diperoleh ekstrak kental 86 gram dan mempunyai persen rendamen sebanyak 17.2%.

Flavonoid mampu menghambat agregasi platelet karena adanya kemampuan dalam menghambat pelepasan mediator asam arakidonat dari membrane sel sehingga jalur metabolisme siklooksiginase menjadi terhambat. Adanya penghambatan siklooksigenase menyebabkan tromboksan A_2 tidak terbentuk atau berkurang, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan aktivasi platelet dan penggumpalan platelet pada pembentukan trombus akan terhambat. Ketika pembentukan trombus terhambat maka waktu perdarahan akan semakin meningkat.

Platelet merupakan sel darah merah yang berperan penting dalam proses hemostasis. Platelet beragregasi membentuk sumbatan hemostasis saat terjadi luka pada pembuluh darah yang menyebabkan lapisan endogen rusak yang kemudian serat kologen terbuka dan trombosit akan melekat pada serat kologen kemudian trombosit akan mensekresi sejumlah besar adenonin difosfat (ADP) dan enzim-enzimnya membentuk trombokson A_2 yang akan merangsang terjadinya agregasi platelet. Dengan demikian, pada setiap luka, dinding pembuluh darah yang rusak atau jaringan diluar pembuluh darah disekitar luka menimbulkan siklus aktivasi trombosit yang jumlahnya terus meningkat yang menyebabkan menarik lebih banyak lagi trombosit tambahan sehingga membentuk sumbatan.

Sumbatan hemostasis dapat berupa bekuan darah yang terbentuk dari agregat-agregat platelet, biasanya disebut trombus. Pada keadaan normal, trombus terbentuk untuk mencegah perdarahan. Antiplatelet adalah terapi yang sering digunakan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit trombosis.

Aspirin merupakan obat trombosis, radang, penyembuhan luka dan alergi, dimodulasi oleh metabolit arakidonat teroksidasi dan asam lemak poliatik jenuh lainnya yang secara keseluruhan dinamakan eikosanoid. Aspirin memblokir produksi tromboksan A_2 dengan mengasetilasi residu sering secara kovalen di dekat sisi aktif siklooksigenase, yakni enzim yang menghasilkan precursor endoperoksida siklik tromboksan A_2 . Karena platelet tidak mensintesis protein baru, kerja aspirin pada platelet siklooksigenase bersifat permanen, bertahan sepanjang usia platelet (7 hingga 10 hari).

Pada pengujian ini parameter yang diamati yaitu waktu perdarahan. Waktu perdarahan merupakan, waktu mulai keluarnya darah sampai tidak terdeteksi lagi pada kertas saring. Penentuan waktu perdarahan dilakukan pada mencit kelompok uji pada hari ke-0 dan hari ke-9 dengan cara, melukai ekor mencit dengan cara menyayat pangkal ekor mencit karena tidak mempengaruhi rentang keluarnya darah dari ekor mencit dan darah yang dikeluarkan diserap pada kertas saring. Setiap kelompok perlakuan diberi bahan uji secara oral, sekali sehari selama 8 hari, diberikan berulang selama 8 hari untuk menghasilkan efek kumulatif terhadap antiplatelet.

Penentuan waktu perdarahan merupakan pengujian untuk mengetahui sejauh mana intraksi antara platelet dengan dinding pembuluh darah dalam membentuk pembekuan darah. Pemanjangan waktu pembekuan darah menunjukkan adanya penurunan aktivitas agregasi platelet yang disebabkan karena penghambatan enzim siklooksigenase, sehingga sintesis tromboksan A_2 menurun. Tromboksa

A₂ merupakan salah satu mediator yang berpengaruh pada proses aktivitas platelet dan vasokonstriksi ketika proses hemostasis yang dimediasi oleh platelet.

Dalam penelitian ini, konsentrasi yang digunakan yaitu konsentrasi 10%/30g BB, 25%/30g BB dan 50%/30g BB mencit. Adapula kelompok pembanding hewan coba yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Sebagai kontrol positif digunakan aspirin sebagai obat antiplatelet, sedangkan kontrol negatif yaitu Na-CMC 1%.

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan karena memiliki sistem hormonal yang lebih stabil dibanding dengan mencit betina. Pengujian ini digunakan mencit (*Mus musculus*) yang sehat memiliki bobot rata-rata 20 – 30 gram yang dibagi menjadi 5 kelompok sehingga terdapat 3 mencit dalam setiap kelompok.

Dalam hal ini persentase rata-rata dari peningkatan waktu terendah ke waktu tertinggi yaitu dihasilkan oleh kontrol negatif (Na-CMC 1%) yang hasilnya 15,25, ekstrak teh hijau konsentrasi 10% hasilnya 106,09, ekstrak teh hijau konsentrasi 25% hasilnya 145,51, ekstrak teh hijau 50% hasilnya 178,78, dan kontrol positif aspirin 0,85 mg hasilnya 210,84. Persentase terendah terjadi pada kelompok kontrol negatif Na-CMC 1% dikarenakan hanya sebagai suspending agent dan tidak memiliki aktivitas sebagai antiplatelet.

Berdasarkan hasil persentase peningkatan waktu perdarahan, ekstrak teh hijau konsentrasi 50%/30gBB mampu menghasilkan peningkatan waktu perdarahan sebanding dengan kontrol positif. Hal ini dikarenakan semakin besar konsentrasi

ekstrak, maka semakin banyak kandungan senyawa-senyawa yang ada dalam ekstrak tersebut, sehingga semakin besar waktu peningkatan perdarahan yang dihasilkan.

Waktu perdarahan yang memanjang setelah pemberian ekstrak diduga karena terjadi penghambatan pembentukan sumbatan hemostatis. Penghambatan pembentukan sumbatan hemostatis terjadi ketika ada penumpukan platelet di jaringan ikat pada daerah luka yang dapat membentuk agregat-agregat platelet. Dengan dihambatnya penumpukan platelet tersebut, maka waktu perdarahan semakin meningkat. Efek ini diduga karena adanya aktivasi dari senyawa flavanoid yang terkandung dalam ekstrak daun teh hijau.

Berdasarkan pengambilan keputusan pada uji normalitas menunjukkan waktu perdarahan antara hari ke-0 dan hari ke-9 terdistribusi normal ($p > 0,05$). (Lampiran 5.3.2). dan pada uji homogenitas, jika nilai signifikan ($p > 0,05$) maka bersifat homogen. Nilai dari uji homogenitas pada waktu perdarahan seluruh kelompok bersifat homogen. sehingga dapat dilanjutkan dengan uji Anova (Lampiran 5.3.3.)

Bila Anova tidak menunjukkan adanya perbedaan yang tidak bermakna ($p > 0,05$), maka pengujian selanjutnya tidak diperlukan. Sebaliknya, apabila Anova memberikan hasil yang bermakna ($p < 0,05$), maka perlu dilakukan pengujian selanjutnya, dengan maksud untuk menentukan dimana letak perbedaan tersebut

Dari hasil ANOVA menunjukkan bahwa waktu perdarahan pada kelompok hari ke- 0 menunjukkan nilai 0,522 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan diwaktu perdarahannya pada hewan uji. sedangkan hari ke- 9 menunjukkan nilai 0,000 maka terdapat perbedaan diwaktu perdarahan setiap kelompok mencit. disinihasilnya

pada hari ke-9 memberikan hasil yang bermakna ($p < 0,05$) ada perbedaan yang signifikan (Lampiran 5.3.4)

Maka dilanjutkan dengan Analisis multi comparison (Post Hoc Test) bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang berbeda mean-nya bilamana pada pengujian Anova dihasilkan ada perbedaan bermakna dengan nilai signifikan ($p < 0,005$). Setelah dilanjutkan dengan multi comparison (Post Hoc Test) dilihat dari nilai signifikansi hari ke-9 pada Least significance Different (LSD) untuk mengetahui perbedaan antara setiap perlakuan.

Hasil Uji Least significance Different (LSD) hari ke-9 mengenai waktu perdarahan, pada kelompok kontrol positif (Aspirin) menunjukkan bermakna dengan nilai signifikan (0,000) berarti tidak ada lagi potensi sebanding dengan kontrol negatif (Na-CMC) dilihat dari waktu perdarahannya, begitu pula dengan ekstrak teh hijau 10% dan teh hijau 25% menunjukkan hasil yang bermakna dengan nilai signifikan (0,000) artinya tidak ada lagi potensi sebanding waktu perdarahan pada hewan uji mencit. Namun pada ekstrak teh hijau 50% menunjukan perbedaan yang tidak bermakna dengan nilai signifikan (0,728) yang mempunyai waktu perdarahan mendekati rata-rata waktu perdarahan pada kontrol positif (Aspirin). Kontrol negatif (Na-CMC) menunjukkan hasil yang bermakna dengan nilai signifikan (0,000) artinya tidak ada potensi sebanding waktu perdarahannya dengan seluruh kelompok uji. Kelompok ekstrak teh hijau 10% menunjukkan bermakna (0,000) artinya tidak ada potensi sebanding waktu perdarahannya dengan kelompok ekstrak teh hijau 50%, namun perbedaan yang tidak bermakna (0,189) ada potensi sebanding waktu

perdarahannya dengan ekstrak teh hijau 25% tapi tidak berpengaruh sebagai pembanding dengan kontrol positif (Aspirin). Dan pada Kelompok ekstrak teh hijau 25% menunjukkan hasil yang bermakna dengan nilai signifikan (0,000) Artinya tidak ada potensi sebanding waktu perdarahannya pada hewan uji mencit dengan ekstrak teh hijau 50%.

Maka dari itu ditarik kesimpulan dari semua kelompok konsentrasi tersebut hanya ekstrak teh hijau 50% yang tidak bermakna dengan nilai signifikan (0,728) yang mempunyai waktu perdarahan mendekati rata-rata waktu perdarahan kontrol positif. Berarti diuji Uji Least significance Different (LSD) ini yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan setiap kelompok hewan uji. ekstrak teh hijau 50% ini, ada potensi sebanding waktu perdarahan hewan uji mencit dengan kontrol positif (Aspirin) sebagai Antiplatelet dilihat dari rata-rata waktu perdarahannya. (Lampiran 5.3.5)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) mempunyai potensi sebanding dengan aspirin sebagai antiplatelet dengan dicobakan terhadap mencit jantan (*Mus musculus*) dilihat dari waktu perdarahannya.
2. Dari ketiga konsentrasi ekstrak, Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) dengan konsentrasi 50%/30gBB yang dapat menghasilkan peningkatan waktu perdarahan terbesar dan mampu sebanding dengan kontrol positif dibandingkan dengan ekstrak lainnya.

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengisolasi senyawa antiplatelet pada sampel Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek sebagai antiplatelet.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Budhi. *Tumbuhan Dengan Kandungan Senyawa Aktif Yang Berpotensi Sebagai Bahan Antifertilitas*. Adiba press: Jakarta, (2010): hal. 6-7
- Balitri, Juniaty Towaha. *Kandungan Senyawa Kimia Pada Daun Teh (Camellia Sinensis)* warta penelitian dan pengembangan tanaman industry, vol. 19 (2013): hal.12-16
- Dewi, Kartika. *Pengaruh Ekstrak Teh Hijau (Camellia Sinensis var. Assamica) terhadap Penurunan Berat Badan, Kadar Trigliserida dan Kolesterol Total pada Tikus Jantan Galur Wistar*. Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha, Bandung,(2008): hal. 29
- Dirjen POM, *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: DepertemenKesehatan RI, (1979): hal. 30
- Dirjen POM, *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: DepertemenKesehatan RI, (1995): hal. 7
- Dirjen POM, *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: DepertemenKesehatan RI, (2014): hal. 42
- Effendi, Dedi Soleh, M.Syakir, M.Yusron, dkk, *Budidaya Dan Pasca Panen Teh*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Bogor, (2010): 3
- Fachruddin, H. *Analisis Fitokimia Tumbuhan. Fakultas Farmasi*. Universitas Hasanuddin. Makassar, (2001): hal. 20
- Handayani, Dwi, Abdul Mun'im, dkk. *Optimasi Ekstraksi Ampas Teh Hijau (Camellia Sinensis) Menggunakan Metode Microwave Assisted Extraction Untuk Menghasilkan Ekstrak Teh Hijau*. Herbal Magister, Faculty of Pharmacy Universitas Indonesia,(2014): hal. 29
- Handayani, Gemy Nastity. *Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Aktivitas Antimikroba Ekstrak Metanol Daun Mimba (Azadirachta indica Juss.* Jurnal Teknosains, Vol 10, No 2. Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. (2016): hal.211
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penentuan Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung : Penerbit ITB, (1987): hal. 6


- Hardman, Joel G dan Lee E. *Limbird. Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapai*. Penerbit Buku Kedokteran. EGC, (2014): hal. 1505
- Hastono, Sutanto Priyo. *Analisis Data*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jakarta: (2006): hal. 103, 129
- Katzung, Bertram G. *Farmakologi Dasar Dan Klinik*. Buku 2 edisi 8. Universitas Airlangga, Jakarta, (2014): hal. 405-406
- Ketut, Widyani Astuti. *Kombinasi Asetosal Dan Ekstrak Buah Mengkudu Dapat Memperpanjang Waktu Perdarahan Dan Koagulasi Pada Mencit*. Universitas Udayana : Denpasar, (2011): hal. 97,98,103 dan 104
- Khalilullah, Said alfin. *Penggunaan Antiplatelet (Aspirin) Pada Akut Stroke Iskemik*. Medicine University of Syiah Kuala, (2011): hal.3
- Kurnia, Pandika Agung. dkk. *Potensi Ekstrak Teh Hijau (Camellia sinensis) Terhadap Peningkatan Jumlah Sel Fibroblas Soket Pasca Pencabutan Gigi pada Tikus Wistar*. e-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol. 3 (2015): hal.123
- Middleton, Elliott, Chithan Kandaswami, dkk. *The Effect of Plant Flavonoids on Mammalian Cells: Implication for Inflammation, Heart Disease and Cancer The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics*, Vol 52 No 4, 47/867/401, Printed in USA, (2000): hal. 698
- Mukhriani, Ekstaksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*. Vol. VII no.2 Program Studi Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar: (2014): hal.363
- Neal, M.J. *Farmakologi Medis Edisi Kelima*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta, (2010): hal.45
- Noriko, Nita. *Potensi Daun Teh (Camellia Sinensi L) Dan Daun Anting-Anting Acalpha Indica L. Dalam Menghambat Pertumbuhan Salmonella typhi*. Al-Azhar Indonesia. (2013): hal.106
- Putri, Rizki Rica Rachim Fadilah, Evi Umayah Ulfa, dkk. *Uji Aktifitas Antiplatelet Ekstrak Etanol Kubis Merah*. Universitas Jember, (2014): hal. 111,112, dan 113
- Retnaningsih, Andi Setiawan, dkk. *Potensi Antiplatelet kacang koro (Mucuna Pruries L) Dari Fraksi Heksan Dibandingkan Dengan Aspirin Pada Tikus Hiperkolestrolemia*. Seri Kajian Ilmiah, (2011): hal. 80

- Rohdiana, Dadan. *Teh proses, Karakteristik & Komponen Fungsionalnya*. Foodreview Indonesia| vol.10,(2015): hal. 35-36
- Sarker, Satyajit D. *Kimia Untuk Mahasiswa Farmasi Bahan Kimia Organik, Alam Dan Umum*. Pustaka Pelajar, (2009): hal.521-522
- Sastroasmoro, Sudigdo. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta:(2014): hal. 92, 129, 329, 336, 302
- Shalehah, Annisa, Noor Cahaya, dkk. *Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kajajahi (Leucosyke capitellata) Terhadap Efek Pembekuan Darah Dan Penurunan Agregasi Platelet Pada Darah Manusia Sehat Secara In-Vitro*. Program Studi Farmasi. UNIV Lampung, (2015): hal.140
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 6, 11,dan 15. Jakarta: Lentera Hati,(2009): hal. 194-195, 639, 12
- Siswanto dan Susila, dkk. *Metodologi Penelitian Kesehatan Dan Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu, (2015): hal. 45
- Sudaryat, yayat, Mimin kusmiati, dkk. *Aktivitas Antioksidan Seduhan Sepuluh Jenis Mutu Teh Hitam (Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze) Indonesia*. Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Garut, (2015): hal. 95
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Raharja. *Obat-obat Penting*. Jakarta: EGC, (2015): hal. 322
- Vita, Joseph A. *Dietary polyphenols and health: proceedings of the 1st international conference on polyphenols and health*. The American Jurnal of Clinical Nutrition, (2005): hal. 292
- Winarti, Sri. *Makanan Fungsional*. Graha Ilmu, Yogyakarta, (2010): hal. 207, 208


Lampiran 1.

Skema Kerja

1. Pembuatan simplisia




2. Cara kerja sampel



3. Perhitungan Persen Bobot Rendamen

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Bobot Rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak yang dihasilkan}}{\text{bobot awal simplisia}} \times 100\% \\
 &= \frac{86 \text{ gram}}{500 \text{ gram}} \times 100\% \\
 &= 17.2\%
 \end{aligned}$$

4. Pemberian Pada Mencit



Keterangan :

- I. Kontrol Positif
- II. Kontrol Negatif
- III. Ekstrak Tehhijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 10%/30gBB
- IV. Ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 25%/30gBB
- V. Ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 50%/30gBB

Lampiran 2

PERHITUNGAN DOSIS

1. Kontrol Positif (*Aspilets*[®])

Aspilets[®] tablet mengandung Acetyl Saliycil Acid 80 mg. konversi dosis dari manusia dewasa ke menci

$$\begin{aligned}
 Dk &= D_o \times F_k \times \frac{30g}{20g} \\
 &= 80 \text{ mg} \times 0,0026 \times \frac{30g}{20g} \\
 &= 0,208 \times \frac{30g}{20g} \\
 &= 0,208 \times 1,5 \\
 &= 0,312 \text{ mg/kg BB}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Berat rata-rata tablet} &= \frac{\text{berat 20 tablet}}{20} \\
 &= \frac{4,3522 \text{ g}}{20} \\
 &= 0,217 \text{ g} \\
 &= 21,7 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Berat yang ditimbang} &= \frac{Dk}{D_o} \times \text{berat rata-rata} \\
 &= \frac{0,312 \text{ mg}}{80 \text{ mg}} \times 21,7 \text{ mg} \\
 &= 0,85 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

Pengenceran :

Ditimbang sebanyak 85 mg aspirin dilarutkan ke 10 ml Na-CMC 1%, setelah dilatukan di ambil sebanyak 1 ml dan dicukupkan sampai 10 ml Na-CMC 1%.

Pembuatan sediaan suspense *Aspilets*[®]: ditimbang 0,85 mg *Aspilets*[®] yang telah digerus. Kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-CMC 1%.

Pemberian dosis maksimal 1 ml :

$$\text{Mencit I (30)} = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II (30)} = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III (29)} = \frac{29}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

2. Kontrol Negatif Na-CMC 1 %

Pembuatan sediaan suspense Na-CMC ditimbang 1 g Na-CMC kemudian dilarutkan dalam 100 ml air.

Pemberian dosis maksimal 1 ml :

$$\text{Mencit I (29)} = \frac{29}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II (29)} = \frac{29}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III (29)} = \frac{29}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

3. Ekstrak Teh hijau 10% delarutkan dalam 100 ml Na-CMC

Pembuatan sediaan suspense Ekstrak teh hijau 10% ditimbang 10 g ekstrak teh hijau kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-CMC

Pemberian dosis maksimal 1 ml :

$$\text{Mencit I (30)} = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II (28)} = \frac{28}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III (29)} = \frac{29}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

4. Ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 25% delarutkan dalam 100 ml Na-CMC

Pembuatan sediaan suspense Ekstrak teh hijau 25% ditimbang 25 g ekstrak teh hijau kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-CMC

Pemberian dosis maksimal 1 ml :

$$\text{Mencit I (30)} = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II (28)} = \frac{28}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III (30)} = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

5. Ekstrak Teh hijau (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) 50% delarutkan dalam 100 ml Na-CMC

Pembuatan sediaan suspense Ekstrak Teh hijau 50% ditimbang 50 g ekstrak Teh hijau, kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-CMC

Pemberian dosis maksimal 1 ml :

$$\text{Mencit I (30)} = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II (29)} = \frac{29}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III (29)} = \frac{29}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

Lampiran 3

ONEWAY Harike0 Harike9 BY Kelompok

/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY

/PLOT MEANS

/MISSING ANALYSIS

/POSTHOC= TUKEY DUNCAN LSD ALPHA(0.05).

One way

Notes	
Output Created	09-FEB-2018 23:59:18
Comments	
Input	Active Dataset DataSet0 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File 15 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	Cases Used Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis.
Syntax	ONEWAY Harike0 Harike9 BY Kelompok /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /PLOT MEANS /MISSING ANALYSIS /POSTHOC= TUKEY DUNCAN LSD ALPHA(0.05).
Resources	Processor Time 00:00:01.02 Elapsed Time 00:00:01.20

Descriptives

Tabel. 5.3.1

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean	
					Lower Bound	Upper Bound
Na-CMC 1%	3	62.7533	10.37203	5.98830	36.9878	88.5189
Ekstrak Teh 10%	3	71.6400	5.80313	3.35044	57.2242	86.0558
Hari Ekstrak Teh 25%	3	63.7167	5.61827	3.24371	49.7601	77.6732
Ke-0 Ekstrak Teh 50%	3	68.5600	6.63053	3.82814	52.0889	85.0311
Aspirin 0,85 mg	3	62.0667	9.32704	5.38497	38.8970	85.2363
Total	15	65.7473	7.63153	1.97045	61.5211	69.9735
Na-CMC 1%	3	72.5533	13.47229	7.77823	39.0863	106.0204
Ekstrak Teh 10%	3	147.1767	3.96143	2.28713	137.3359	157.0174
Hari Ekstrak Teh 25%	3	155.8600	4.15812	2.40069	145.5306	166.1894
Ke-9 Ekstrak Teh 50%	3	189.7667	7.09339	4.09537	172.1457	207.3876
Aspirin 0,85 mg	3	191.9733	4.42467	2.55459	180.9818	202.9648
Total	15	151.4660	45.26656	11.68778	126.3982	176.5338

Descriptives

		Minimum	Maximum
	Na-CMC 1%	53.66	74.05
	Ekstrak Teh 10%	65.73	77.33
Hari Ke-0	Ekstrak Teh 25%	60.11	70.19
	Ekstrak Teh 50%	61.23	74.14
	Aspirin 0,85 mg	53.86	72.21
	Total	53.66	77.33
	Na-CMC 1%	60.14	86.88
Hari Ke-9	Ekstrak Teh 10%	142.65	150.01
	Ekstrak Teh 25%	151.86	160.16
	Ekstrak Teh 50%	182.55	196.73
	Aspirin 0,85 mg	188.76	197.02
	Total	60.14	197.02

Tests of Normality

Tabel. 5.3.2

Kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Hari Ke-0	Na-CMC 1%	.251	3	.966	3	.647
	Ekstrak Teh 10%	.182	3	.999	3	.937
	Ekstrak Teh 25%	.362	3	.805	3	.126
	Ekstrak Teh 50%	.271	3	.948	3	.560
Hari Ke-9	Aspirin 0,85 mg	.249	3	.968	3	.655
	Na-CMC 1%	.223	3	.985	3	.765
	Ekstrak Teh 10%	.332	3	.863	3	.276
	Ekstrak Teh 25%	.195	3	.996	3	.881
	Ekstrak Teh 50%	.181	3	.999	3	.941
	Aspirin 0,85 mg	.327	3	.871	3	.299

Test of Homogeneity of Variances

Tabel. 5.3.3

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hari Ke-0	.590	4	10	.677
Hari Ke-9	1.692	4	10	.228

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANOVA

Tabel. 5.3.4

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Hari Ke-0	Between Groups	207.809	4	51.952	.855	.522
	Within Groups	607.556	10	60.756		
	Total	815.364	14			
Hari Ke-9	Between Groups	28118.099	4	7029.525	123.594	.000
	Within Groups	568.759	10	56.876		
	Total	28686.858	14			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Tabel. 5.3.5

Dependent Variable	(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	
Hari Ke-9	Tukey HSD	Na-CMC 1%	83.30667	6.15770	.000	63.0412	
		Ekstrak Teh 10%	8.68333	6.15770	.635	-11.5822	
		Ekstrak Teh 25%	-33.90667	6.15770	.002	-54.1722	
		Ekstrak Teh 50%	-36.11333	6.15770	.001	-56.3788	
		Aspirin 0,85 mg	-36.11333	6.15770	.001	-56.3788	
		Na-CMC 1%	117.21333	6.15770	.000	96.9478	
		Ekstrak Teh 10%	42.59000	6.15770	.000	22.3245	
		Ekstrak Teh 25%	33.90667	6.15770	.002	13.6412	
		Ekstrak Teh 50%	-2.20667	6.15770	.996	-22.4722	
		Aspirin 0,85 mg	-2.20667	6.15770	.996	-22.4722	
		Na-CMC 1%	119.42000	6.15770	.000	99.1545	
		Aspirin 0,85 mg	44.79667	6.15770	.000	24.5312	
	LSD	0,85 mg	Ekstrak Teh 25%	36.11333	6.15770	.001	15.8478
			Ekstrak Teh 50%	2.20667	6.15770	.996	-18.0588
			Ekstrak Teh 10%	-74.62333	6.15770	.000	-88.3435
		Na-CMC 1%	Ekstrak Teh 25%	-83.30667	6.15770	.000	-97.0269
			Ekstrak Teh 50%	-117.21333	6.15770	.000	-130.9335
			Aspirin 0,85 mg	-119.42000	6.15770	.000	-133.1402
		Ekstrak Teh 10%	Na-CMC 1%	74.62333	6.15770	.000	60.9031
			Ekstrak Teh 25%	-8.68333	6.15770	.189	-22.4035
			Ekstrak Teh 50%	-42.59000	6.15770	.000	-56.3102
			Aspirin 0,85 mg	-44.79667	6.15770	.000	-58.5169
			Na-CMC 1%	83.30667	6.15770	.000	69.5865
			Ekstrak Teh 10%	8.68333	6.15770	.189	-5.0369
			Ekstrak Teh 25%	-33.90667	6.15770	.000	-47.6269
			Aspirin 0,85 mg	-36.11333	6.15770	.000	-49.8335
			Na-CMC 1%	117.21333	6.15770	.000	103.4931
Ekstrak Teh 50%	Ekstrak Teh 10%	42.59000	6.15770	.000	28.8698		
	Ekstrak Teh 25%	33.90667	6.15770	.000	20.1865		

	Aspirin 0,85 mg	-2.20667	6.15770	.728	-15.9269
	Na-CMC 1%	119.42000	6.15770	.000	105.6998
Aspirin	Ekstrak Teh 10%	44.79667	6.15770	.000	31.0765
0,85 mg	Ekstrak Teh 25%	36.11333	6.15770	.000	22.3931
	Ekstrak Teh 50%	2.20667	6.15770	.728	-11.5135


Multiple Comparisons

Dependent Variable	(I) Kelompok	(J) Kelompok	95% Confidence Interval		
			Upper Bound		
Hari Ke-9	Tukey HSD	Na-CMC 1%		103.5722	
		Ekstrak Teh 10%		28.9488	
		Ekstrak Teh 25%		-13.6412	
		Ekstrak Teh 50%		-15.8478	
		Aspirin 0,85 mg		137.4788	
		Na-CMC 1%		62.8555	
		Ekstrak Teh 10%		54.1722	
		Ekstrak Teh 25%		18.0588	
		Aspirin 0,85 mg		139.6855	
		Na-CMC 1%		65.0622	
	LSD	Aspirin 0,85 mg	Ekstrak Teh 10%		56.3788
			Ekstrak Teh 25%		22.4722
			Ekstrak Teh 50%		-60.9031
			Ekstrak Teh 10%		-69.5865
			Ekstrak Teh 25%		-103.4931
		Na-CMC 1%	Aspirin 0,85 mg		-105.6998
			Na-CMC 1%		88.3435
			Ekstrak Teh 25%		5.0369
			Ekstrak Teh 10%		-28.8698
			Ekstrak Teh 50%		-31.0765
Ekstrak Teh 25%	Aspirin 0,85 mg		97.0269		
	Na-CMC 1%		22.4035		
	Ekstrak Teh 10%		-20.1865		
		Ekstrak Teh 50%			

	Aspirin 0,85 mg	-22.3931
	Na-CMC 1%	130.9335
Ekstrak Teh 50%	Ekstrak Teh 10%	56.3102
	Ekstrak Teh 25%	47.6269
Aspirin 0,85 mg	Aspirin 0,85 mg	11.5135
	Na-CMC 1%	133.1402
	Ekstrak Teh 10%	58.5169
	Ekstrak Teh 25%	49.8335
	Ekstrak Teh 50%	15.9269

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots



Lampiran 4

Tabel 6. Analisis persentase (%) waktu perdarahan pada mencit jantan

Kelompok	Waktu Perdarahan (Detik)		Hari ke9 - Hari ke0	% Peningkatan
	Hari ke-0	Hari ke-9		
Kontrol Positif (Aspirin 0.85mg)	60,13	188,76	128,63	213,92
	53,89	197,02	143,16	265,80
	75,21	190,14	114,93	152,81
Jumlah	189,2	575,92	386,72	632,53
Rata-rata	63,07	191,97	128,91	210,84
Kontrol Negatif (Na-CMC 1%)	74,05	86,66	12,61	17,03
	53,66	60,14	6,48	12,07
	60,55	70,64	10,09	16,66
Jumlah	188,26	217,44	29,18	45,76
Rata-rata	62,75	72,48	9,73	15,25
Ekstrak Teh hijau 10%	77,33	148,87	71,54	92,51
	65,73	142,65	76,92	117,02
	71,86	150,01	78,15	108,75
Jumlah	214,92	441,53	226,61	318,28
Rata-rata	71,64	147,17	75,53	106,09
Ekstrak Teh hijau 25%	60,11	155,56	95,45	158,79
	70,19	160,16	89,97	128,18
	60,85	151,86	91,01	149,56
Jumlah	191,15	467,58	276,43	436,53
Rata-rata	63,71	155,86	92,14	145,51
Ekstrak Teh hijau 50%	74,14	182,55	108,41	146,22
	61,23	190,02	128,79	210,34
	70,31	196,73	126,42	179,80
Jumlah	205,68	569,3	363,62	536,36
Rata-rata	68,56	189,76	121,21	178,78

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{\text{waktu hari ke9} - \text{waktu hari ke0}}{\text{waktu hari ke0}} \times 100\%$$

1. Aspirin

$$\text{Reflikasi I} = \frac{188,76-60,13}{60,13} \times 100\%$$

$$= \frac{128,63}{60,13} \times 100\%$$

$$= 213,92\%$$

$$\text{Reflikasi II} = \frac{197,02-53,89}{53,89} \times 100\%$$

$$= \frac{143,16}{53,89} \times 100\%$$

$$= 265,80\%$$

$$\text{Reflikasi III} = \frac{190,14-75,21}{75,21} \times 100\%$$

$$= \frac{114,93}{75,21} \times 100\%$$

$$= 152,81\%$$

2. Na-CMC

$$\text{Reflikasi I} = \frac{86,66-74,05}{74,05} \times 100\%$$

$$= \frac{12,61}{74,05} \times 100\%$$

$$= 17,03\%$$

$$\text{Reflikasi II} = \frac{60,14-53,66}{53,66} \times 100\%$$

$$= \frac{6,48}{53,66} \times 100\%$$

$$= 12,07\%$$

$$\begin{aligned}\text{Reflikasi III} &= \frac{70,64-60,55}{60,55} \times 100\% \\ &= \frac{10,09}{60,55} \times 100\% \\ &= 16,66\%\end{aligned}$$

3. Ekstrak Teh hijau 10%

$$\begin{aligned}\text{Reflikasi I} &= \frac{148,87-77,33}{77,33} \times 100\% \\ &= \frac{71,54}{77,33} \times 100\% \\ &= 92,51\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Reflikasi II} &= \frac{142,65-65,73}{65,73} \times 100\% \\ &= \frac{76,92}{65,73} \times 100\% \\ &= 117,02\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Reflikasi III} &= \frac{150,01-71,86}{71,86} \times 100\% \\ &= \frac{78,15}{71,86} \times 100\% \\ &= 108,75\%\end{aligned}$$

4. Ekstrak Teh hijau 25%

$$\begin{aligned}\text{Reflikasi I} &= \frac{155,56-60,11}{60,11} \times 100\% \\ &= \frac{95,45}{60,11} \times 100\% \\ &= 158,79\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Reflikasi II} &= \frac{160,16-70,19}{70,19} \times 100\% \\ &= \frac{89,97}{70,19} \times 100\%\end{aligned}$$

$$= 128,18\%$$

$$\text{Reflikasi III} = \frac{151,86-60,85}{60,85} \times 100\%$$

$$= \frac{91,01}{60,85} \times 100\%$$

$$= 149,56\%$$

5. Ekstrak Teh hijau 50%

$$\text{Reflikasi I} = \frac{182,55-74,14}{74,14} \times 100\%$$

$$= \frac{108,41}{74,14} \times 100\%$$

$$= 146,22\%$$

$$\text{Reflikasi II} = \frac{190,02-61,23}{61,23} \times 100\%$$

$$= \frac{128,79}{61,23} \times 100\%$$

$$= 210,34\%$$

$$\text{Reflikasi III} = \frac{196,73-70,31}{70,31} \times 100\%$$

$$= \frac{126,42}{70,31} \times 100\%$$

$$= 179,80$$

Lampiran 5

Lampiran Gambar Sampel



Gambar 4. Tanaman Teh hijau



Gambar 5. Proses Pengeringan



Gambar 6. Penimbangan



Gambar 7. Proses Maserasi



Gambar 8. Proses Penyaringan



Gambar 9. Proses Rotavapor



Gambar 10. Ekstrak cair



Gambar 11. Ekstrak kental



Gambar 12. Ekstrak kering



Gambar 13. Aspilet



Gambar 14. Suspensi Na-CMC 1%



Gambar 15. Pengenceran Sampel



Gambar 16. Pemberian sampel secara oral



Gambar 17. Darah diserap dengan kertas saring



Gambar 18. Bekuan darah

RIWAYAT PENULIS



Nama lengkap Ajad Ade Suadli, biasa akrab dengan panggilan Ajad atau Ade. Lahir di Lamunga pada tanggal 16 Juli 1994. Dimana terlahir dari pasangan Muhammad Ali dan Jumiati. Penulis mengawali pendidikan formalnya pada bangku MIN Lamunga pada tahun 2000, kemudian melanjutkan ke PONPES SMP Al-Ikhlas Taliwang dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis pindah ke SMK Kesehatan Sumbawa Barat dan menyelesaikan di tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan farmasi pada salah satu Universitas di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau biasa disebut UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R