

**SKRINING PARTISI-PARTISI DAN FRAKSI-FRAKSI TIDAK LARUT
HEKSAN DARI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KAYU JAWA
(*Lanneacoromandelica* (Houtt.) Merr.) SEBAGAI INHIBITOR
PERTUMBUHAN *Mycobacterium tuberculosis***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi (S. Farm)
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh:

NURHIDAYAH WAHID

NIM: 70100113042

M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Wahid
NIM : 70100113042
Tempat, Tanggal Lahir : Galung Tulu, 17 Oktober 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jln. Sultan Alauddin Lorong Salemba No. 21B
Judul : Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut
Heksan dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa
(*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) sebagai Inhibitor
Pertumbuhan *Mycobacterium Tuberculosis*

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Agustus 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Nurhidayah Wahid
70100113042

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan Dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr) sebagai Inhibitor Pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*", yang disusun oleh Nurhidayah Wahid, NIM : 70100113042, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 M yang bertepatan dengan 22 Dzulqa'idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

(.....)

Sekretaris : Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns, M.Kes.

(.....)

Pembimbing I : Nursalam Hamzah S.Si., M.Si., Apt.

(.....)

Pembimbing II : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.

(.....)

Penguji I : Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt.

(.....)

Penguji II : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.

(.....)

M A K A A



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Skrining Partisi-Partisi Dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan Dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) Sebagai Inhibitor Pertumbuhan *Mycobacterium Tuberculosis*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda (Alm.) Abd. Wahid dan Ibunda (Almh.) Naharah dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudariku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Taklupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu Dr. NurHidayah, S. Kep., Ns., M. Kes., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu Haeria, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S.Si., M. Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
5. Bapak Nursalam Hamzah, S. Si., M. Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Si., M. Si., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
6. Ibu Syamsuri Syakri, S.Farm., M. Si., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
7. Bapak Dr. Dudung Abdullah, M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,

9. Abang dan Ibo-Iboku (Ka Malik, Ka Wana dan Ka Jannah) serta ipar-iparku (Ka Ina, Ka Ahmad dan Ka Muhlis) yang selalu memberi doa dan memotivasi penulis dari awal sampe akhir penyusunan skripsi ini
10. Kakanda dan Adinda di kost salemba baruga (Ka Mul, Ka Ayu, Ka Nurul, Intan, Ira) yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini,
11. Teman-teman posko KKN-R Dusun Pappareang Desa Belapunranga Kec. Parangloe terima kasih dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
12. Sahabat-sahabat D'genk Letting (Intan, Mesya, Seri), terima kasih semangat dan dukungannya selama ini,
13. Teman-teman peneliti team kayu jawa (Zakiah dan Ihsan), team tuberculosis (Ammha) yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
14. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Far13ion) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, Kalian Luar Biasa.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalam.

Gowa,.....2017

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12-41
A. Uraian Tanaman Kayu Jawa.....	12
B. Uraian Bakteri Uji	18
C. Metode Penyarian.....	19
D. Skrining Fitokimia.....	20
E. Tuberkulosis	21
F. Resistensi Tuberkulosis	24
G. Obat Anti Tuberkulosis	28

H. Perkembangan Obat Lama dan Obat Baru.....	36
I. Uraian Metode Pengujian Tuberkulosis	38
J. Tinjauan Islam.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42-48
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Alat dan Bahan	42
D. Prosedur Kerja.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49-57
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
KEPUSTAKAAN	59-62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63-72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Kandungan kimia dan aktifitas kulit batang kayu jawa	14
2. Aktifitas dan jenis ekstrak kulit batang kayu jawa.....	17
3. Hasil ekstraksi kulit batang kayu jawa.....	49
4. Hasil partisi ekstrak metanol kulit batang kayu jawa.....	49
5. Hasil perbandingan fraksi ekstrak metanol kulit batang kayu jawa	50
6. Hasil penggabungan fraksi ekstrak metanol kulit batang kayu	50
7. Hasil identifikasi komponen senyawa fraksi kulit batang kayu jawa	51
8. Hasil uji penghambatan pertumbuhan <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. <i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr	12
2. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	19
3. Gejala tuberkulosis.....	22
4. Prevalensi TB menurut karakteristik umur, pekerjaan, berdasarkan Riskesdas tahun 2013.....	23
5. Prevalensi TB menurut karakteristik pendidikan, dan kuantil indeks kepemilikan berdasarkan Riskesdas tahun 2013.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Alur penelitian.....	63
2. Skema proses ekstraksi sampel kayu jawa.....	64
3. Uji kandungan senyawa kulit batang kayu jawa	65
4. Uji aktifitas antituberkulosis	66
5. Preparasi sampel.....	68
6. Proses ekstraksi kulit batang kayu jawa	69
7. Fraksinasi ekstrak metanol kulit batang kayu Baku.....	69
8. Hasil penggabungan fraksi	70
9. Hasil identifikasi komponen senyawa kulit batang kayu jawa	70
10. Hasil pengujian <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	71

ABSTRAK

Nama : Nurhidayah Wahid

NIM : 70100113042

Judul : Skrining Partisi-Partisi Dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan Dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) sebagai Inhibitor Pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*

Kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) merupakan salah satu tumbuhan yang sering digunakan masyarakat sebagai obat herbal untuk mengobati beberapa penyakit. Kemampuan kulit batang kayu jawa untuk menyembuhkan luka disebabkan adanya zat antibakteri sehingga diduga berkhasiat sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan partisi dan fraksi yang aktif menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. sampel di ekstraksi menggunakan pelarut metanol. Ekstrak ini di partisi dengan pelarut heksan dengan metode padat-cair. Partisi tidak larut heksan kemudian di fraksinasi dengan metode pemisahan kromatografi cair vakum. Fraksi dibuat dalam berbagai perbandingan (etil asetat : metanol) kemudian dilakukan uji penghambatan pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* dengan metode MODS pada bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv sensitif. Hasil uji penghambatan pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* menunjukkan bahwa pada fraksi G (etil asetat : metanol 1 : 70) tumbuh sedikit *cord* dibandingkan kontrol negatif. Sedangkan untuk fraksi yang lain tidak tumbuh *cord*. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 9 fraksi memiliki aktifitas sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* yang ditandai tidak tumbuhnya *cord* dibandingkan kontrol negatif. Sedangkan 1 fraksi memiliki pertumbuhan *cord* yang sedikit dibanding kontrol negatif.

Kata kunci: Kayu Jawa, Fraksi, *Mycobacterium tuberculosis*

ABSTRACT

Name : Nurhidayah Wahid

NIM : 70100113042

Title : Skinning Partitions and Fractions in Dissolved Hexane of Methanolic
Extracts of Java Wood Bark (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) As
Growth Inhibitors *Mycobacterium tuberculosis*

Kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) Is one of the plants that is often used by society as herbal medicine to treat some diseases. The wounds healy ability of kayu jawa bark is caused by antibacterial substance that are efficient as antibacterial agent. This study aims to determine the active partition and the fraction inhibiting the growth of *Mycobacterium tuberculosis*. Samples were extracted using methanol solvent. This extract is in partition with a hexane solvent by a liquid-solid method. The hexane-insoluble partition is then fractionated by a vacuum liquid chromatography separation method. The fractions were made in various ratios (ethyl acetate: methanol) and the test of *Mycobacterium tuberculosis* inhibition were used MODS methods on sensitive *Mycobacterium tuberculosis* H₃₇RV . The results growth that at fraction G (ethyl acetate: methanol 1: 70) have slightly growth cord compared to negative control. As for the other fractions do not have cord. From these results, it can be concluded that 9 fractions have activity as a *Mycobacterium tuberculosis* growth inhibitor characterized by no cord growth compared to negative control. Whereas 1 fraction has slightly less cord growth than negative control.

Keywords: Javanese Wood, Fraction, *Mycobacterium tuberculosis*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah kesehatan dunia saat ini adalah penyakit tuberkulosis (TB). Menurut laporan WHO tahun 2015, diperkirakan ada 10,4 juta kasus baru TB di seluruh dunia, dimana 56% terjadi pada laki-laki, 34% terjadi pada perempuan dan 10% terjadi pada anak-anak serta 11% diantaranya terjadi pada penderita HIV. Enam Negara dengan insiden tuberkulosis 60% dari kasus baru TB yaitu India, Indonesia, Cina, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan. Indonesia menempati peringkat kedua tingkat kejadian tuberkulosis di dunia (Health Organization, 2016)

Bersamaan dengan meningkatnya kasus TB, terjadi pula peningkatan kasus TB yang resisten terhadap beberapa obat antituberkulosis (OAT) termasuk resisten terhadap obat Isoniazid (INH) dan rifampisin dengan atau tanpa resistensi obat. Multi Drug Resistant (MDR) TB menjadi masalah besar di dalam pengobatan tuberkulosis sekarang ini. Pada tahun 2015, estimasi insiden kasus baru MDR-TB sebanyak 480.000, sementara insidens kasus TB resistan terhadap rifampisin (RR-TB) dengan riwayat pengobatan sebanyak 100.000 orang. Terdapat 580.000 kasus dan diperkirakan 1,4 juta kematian karena TB (0,4 juta diantaranya koinfeksi HIV). Tiga Negara dengan 45% insiden MDR-TB pada tahun 2015 adalah India, Cina dan Federasi Rusia. Meskipun jumlah kematian TB turun 22%

antara tahun 2000 dan 2015, TB tetap salah satu dari 10 penyebab kematian di seluruh dunia pada tahun 2015. Selain itu, untuk kasus XDR-TB telah dilaporkan oleh 92 negara pada tahun 2012 diperkirakan 13 negara memiliki kurang lebih 10 kasus XDR-TB. Empat Negara dengan insiden XDR-TB tertinggi adalah Azerbaijan 12,8%, Belarus 11,9%, Lithuania 24,8% dan Tajikistan 21%.(Health Organization;, 2016)

Di Indonesia, TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut Riskesdas 2013, prevalensi TB di Indonesia berdasarkan diagnosis sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 400 orang yang didiagnosis kasus TB oleh tenaga kesehatan(Kementerian Kesehatan RI, 2016)

Berdasarkan data Ditjen P2PL Kemenkes RI pada tahun 2013, angka keberhasilan pengobatan di Indonesia sebesar 90,5% artinya Indonesia telah mencapai standar keberhasilan pengobatan yang ditetapkan WHO sebesar 85% dan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI sebesar 87% (Kemenkes RI, 2014).

Berdasarkan hasil cakupan penemuan kasus TB Paru BTA (+) menurut provinsi tahun 2013, Sulawesi Selatan berada dalam urutan ke-5 terbanyak jumlah penemuan kasusnya. Jawa Barat sebesar 33.460 kasus, Jawa Timur sebesar 23.703 kasus, Jawa Tengah sebesar 20.446 kasus, Sumatera Utara sebesar 16.930 kasus dan Sulawesi Selatan sebesar 8.932 kasus (Kemenkes RI, 2014).

Berdasarkan angka penemuan kasus TB Paru BTA (+) di provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar yang memiliki kasus TB Paru BTA (+)

terbanyak yaitu sebesar 1.951 kasus. Meskipun angka kesuksesan pengobatan TB Paru BTA (+) kota Makassar yaitu sebesar 85,65% bukan yang tertinggi diantara semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan namun sudah mencapai target yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 85% (Dinkes Prov.Sul-Sel, 2012)

Tuberkulosis menjadi penyakit yang sangat berbahaya karena mematikan dan sangat mudah menular. Tuberkulosis disebabkan karena bakteri yang menyebar melalui udara dimana 1 orang pasien positif tuberkulosis dapat menularkan kurang lebih 10 orang disekitarnya (Dokter Paru Indonesia, 2012)

Menurut WHO, rifampisin merupakan pilihan utama untuk infeksi pada *Mycobacterium tuberculosis*. Penggunaan obat antibiotik yang tepat untuk infeksi ini tergantung pada tempat, tipe dan keparahan infeksi. Adanya resistensi antibiotik menjadi salah satu perhatian dalam pengobatan modern saat ini (Ruth A, 2012)

Tuberkulosis resisten obat menjadi masalah yang ada dan terus berkembang serta mengancam kesehatan masyarakat diseluruh dunia. Secara global, terlapor tingkat perkiraan kasus baru TB resisten obat sebesar 3,7%, sementara itu sebanyak 20% tingkat perkiraan kasus TB dengan riwayat pengobatan. Salah satu pencegahan MDR-TB yang telah direkomendasikan secara internasional yaitu melalui strategi *directly observed treatment shortcourse (DOTS)* yang terbukti efisien dan *cost-effective*, meskipun penyembuhan gagal dalam beberapa kondisi tertentu (Health Organization, 2011).

Berdasarkan data *Global Tuberculosis Report 2016*, di Indonesia estimasi kasus MDR-TB sebesar 10.000 kasus. Dimana persentasi kasus baru sebesar 2,8%

sedangkan persentasi untuk uji resistensi rifampisin sebesar <1% kasus baru. Sementara kasus MDR-TB yang diuji untuk ketahanan terhadap obat lini kedua sebesar 895 kasus. Data ini menunjukkan bahwa tingkat estimasi kasus MDR-TB di Indonesia cukup tinggi. (Health Organization;, 2016)

Dalam laporan WHO pada tahun 2013, memperkirakan di Indonesia terdapat 6.800 kasus baru TB dengan MDR-TB setiap tahunnya. Diperkirakan 2% dari kasus TB baru dan 12% dari kasus TB pengobatan ulang merupakan kasus TB MDR. Diperkirakan pula lebih dari 55% pasien MDR-TB belum terdiagnosis atau mendapat pengobatan dengan baik dan benar.

Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, di Indonesia perbandingan keberhasilan pengobatan lini kedua antara MDR-TB dan XDR-TB tingkat keberhasilan keduanya masing-masing hanya 51% dan 40%.

Banyaknya kasus tuberkulosis yang terjadi di Dunia maupun di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya dalam mengendalikan kasus tersebut. Selain itu, juga ditemukan kasus MDR-TB sehingga sangat dibutuhkan terobosan baru dalam pengobatan tuberkulosis.

Salah satu solusi untuk penyelesaian problematika tersebut adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati di dunia sehingga dapat dikelola. Salah satu jenis tumbuhan yang digunakan secara empiris oleh sebagian masyarakat yang berpotensi sebagai antikanker adalah kayu jawa (*Lannea coromandelica*) (Houtt.) Merr..

Penelitian Manik, dkk (2013) menunjukkan bahwa kulit batang tanaman Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) telah dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, glikosida jantung, terpenoid, tanin, dan flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efek antioksidan, antimikroba dan trombolitik dari ekstrak kulit batang dan daun kayu jawa. Setelah skrining fitokimia, fraksi etanol dari kulit batang dan daun kayu jawa dipartisi dengan pelarut polaritas yang berbeda. Selanjutnya hasil penapisan fitokimia dari penelitian Prawirodiharjo (2014) melaporkan bahwa ekstrak etanol 70% dan air kulit batang Kayu Jawa mengandung flavonoid, saponin, glikosida, fenol, dan tanin.

Penelitian Venkata 2010 melaporkan kulit batang kayu jawa memiliki potensi antikanker. Selain itu, studi farmakologi dari penelitian Alam, dkk (2012) juga telah dilaporkan bahwa ekstrak metanol kulit batang Kayu Jawa memiliki aktivitas biologis seperti antibakteri, antioksidan, analgesik, aktivitas hipotensi, aktivitas penyembuhan luka. Penelitian ini menjadi bentuk kajian pustaka berdasarkan aktifitas antibakteri penghambatan terhadap pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

Oleh karena itu, dari aktivitas antimikrobia ini yang kemudian menjadi inisiatif peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia khususnya daerah Sulawesi yaitu simplisia kayu jawa sebagai penghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

Sebagai seorang muslim, kita harus mensinergiskan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan agama. Oleh sebab itu, dalam pengobatan harus berkaitan

dengan agama. Allah SWT menciptakan alam dan isinya seperti hewan dan tumbuhan dengan hikmah yang sangat besar, semuanya tidak ada yang sia-sia dalam ciptaanNya. Manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan.

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Syu'ara'/26:80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ اللَّهُ لِي مِنْ رَبِّي وَأَنَا مِنَ الْمَرَضِينَ

Terjemahnya :

“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku,“(Kementrian agama RI, 2012)

Pada ayat ini tampak dengan jelas bahwa sakit (marald) terkait dengan manusia, sedangkan kesembuhan (syifa') merupakan sesuatu yang diberikan kepada manusia, dan bersandar kepada Allah SWT. Kandungan makna ini mengantarkan kita pada sebuah pemahaman bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obanya sesuai dengan penyakitnya, kesembuhan akan terjadi, dan atas izin dari Allah SWT.

Selain itu ada juga hadist riwayat Bukhari yang artinya“*Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.*” (HR Bukhari). Hadis ini memotivasi manusia untuk terus berusaha mencari kesembuhan, mencegah atau meringankan penyakit tersebut karena adanya jaminan dari Allah SWT bahwa seluruh penyakit yang menimpa seseorang hamba pasti ada obatnya. Islam memerintahkan agar berobat kepada ahlinya karena kesembuhan penyakit datangnya dari Allah SWT dan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pengobatan hukumnya mubah (dibolehkan) karena hal ini telah dilakukan oleh

pemimpin kita Rasulullah Muhammad swa, sehingga sama sekali tidak perlu dipersoalkan untuk dilakukannya pengobatan (Shihab, 2009). Bahkan, seandainya tidak ada perintah rinci dari hadis tentang keharusan berobat, prinsip-prinsip pokok yang diangkat dari Al-Quran dan hadist cukup untuk dijadikan dasar dalam upaya kesehatan dan pengobatan. Untuk itu, anjuran terhadap umat islam dalam menjaga kesehatan.

Berdasarkan paparan diatas, maka dilakukan penelitian Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan dari Ekstrak Metanol KulitBatang Kayu Jawa (*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr.) sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

B. Rumusan Masalah

Apakah partisi dan fraksi yang aktif sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) merupakan pohon yang banyak tumbuh di Sulawesi khususnya di Kabupaten Takalar. Di Makassar kayu jawa ini disebut kayu tammate, biasanya masyarakat menggunakan kayu jawa sebagai tanaman pagar dan ternyata memiliki banyak manfaat seperti getahnya sebagai penyembuhan luka, daunnya mengobati pembengkakan akibat keseleo, dan kortex kayu jawa sebagai antibakteri.

- b. Skrining fitokimia merupakan metode yang digunakan untuk menentukan fraksi yang aktif menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* yang terkandung dalam ekstrak kayu jawa
- c. Fraksi adalah hasil dari proses pemisahan komponen-komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak kayu jawa dengan menggunakan pelarut yang sesuai
- d. *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv adalah bakteri penyebab penyakit tuberkulosis yang sensitif

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji bagaimana ekstrak metanol kulit batang kayu jawa sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*

D. Kajian Pustaka

1. Manik, et all (2013) dengan judul penelitian “A Comparative Study of the Antioxidant, Antimicrobial and Thrombolytic Activity of the Bark and Leaves of *Lannea coromandelica* (Anacardiaceae) menunjukkan bahwa kulit batang tanaman Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) telah dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, glikosida jantung, terpenoid, tanin, dan flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efek antioksidan, antimikroba dan trombolitik dari ekstrak kulit batang dan daun kayu jawa. Setelah skrining fitokimia, fraksi etanol dari kulit batang dan daun kayu jawa dipartisi dengan pelarut polaritas yang berbeda. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi potensi antioksidan dari ekstrak adalah kandungan total fenolik, kandungan

total flavonoid, kapasitas penangkal radikal bebas, kapasitas total antioksidan dan uji kekuatan reduksi. Jumlah kandungan fenol dan flavonoid ditemukan paling tinggi pada kulit batang dan daun dalam fraksi etil asetat dan paling rendah dalam fraksi n-heksana. Pada uji penangkal radikal bebas DPPH, nilai IC_{50} paling rendah ditemukan pada fraksi etil asetat kulit batang dan daun dengan nilai IC_{50} masing-masing $3,8 \pm 0,14 \mu\text{g/ml}$ dan $6 \pm 0,32 \mu\text{g/ml}$. dari uji yang sama, fraksi etil asetat dari daun dan kulit batang kayu jawa menunjukkan kapasitas antioksidan tertinggi dan kekuatan reduksi. Uji kekuatan reduksi kulit batang dan daun ditemukan konsentrasi paling baik selama diamati dengan fraksi polaritas yang lebih baik dalam kulit batang dan daun. Kemudian ekstrak daun menunjukkan aktivitas antimikroba yang sedang, ekstrak kulit batang menunjukkan aktivitas antimikroba yang lemah. Fraksi diklorometana daun menunjukkan aktivitas antimikroba yang paling baik dengan zona penghambatan mulai dari 8 mm sampai 21 mm dengan dosis $400 \mu\text{g/disc}$ dan 10 mm sampai 23 mm dengan dosis $800 \mu\text{g/disc}$. Selain itu, ekstrak dari kedua bagian kayu jawa menunjukkan aktivitas trombolitik yang baik dibandingkan dengan streptokinase. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini untuk mengetahui kemampuan kulit batang kayu jawa sebagai antibakteri pada pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

2. Alam , et all (2012) dengan judul penelitian“Antioxidant and Analgesic Activities of *Lannea coromandelica* Linn. Bark Extract” menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit batang Kayu Jawa memiliki aktivitas biologis

seperti antibakteri, antioksidan, analgesik, aktivitas hipotensi, aktivitas penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sifat antioksidan dan analgesic dari ekstrak kulit batang kayu jawa. Aktivitas analgesik untuk efek farmakologi di saraf pusat dan perifer dengan menggunakan metode hotplate dan perendaman ekor dan uji pereda induksi asam asetat dengan nyeri induksi formalin pada tikus. Untuk evaluasi potensi antioksidan MLCB, total aktivitas antioksidan, pengumpulan oksida 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) serta total spesies oksigen reaktif (ROS) dan pengamatan daya reduksi yang digunakan. Ekstrak pada dosis 200 dan 400 mg kg⁻¹, menghasilkan peningkatan ambang nyeri yang signifikan ($p < 0,05$) pada metode hotplate dan perendaman ekor sedangkan secara signifikan ($p < 0,05$) mengurangi gesekan yang disebabkan asam asetat yang diinduksi formalin sesuai dosis. Pada DPPH dan metode total ROS, MLCB menunjukkan potensi antioksidan yang baik dengan nilai IC₅₀ masing-masing $12,32 \pm 0,16$ dan $34,72 \pm 0,48$ $\mu\text{g mL}^{-1}$ dengan daya pereduksi yang baik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan aktivitas antioksidan dan antinociceptive yang kuat dari ekstrak metanol kulit batang kayu jawa. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa MLCB dapat digunakan sebagai agen potensi antinociceptive dengan potensi antioksidannya. Dalam penelitian ini menjadi kajian pustaka karena kayu jawa diduga efektif sebagai antibakteri.

3. Xiaoyuan Wu, et all (2015) dengan judul penelitian “The indirect microscopic observation drug susceptibility assay demonstrated high

concordance with the indirect MGIT method for pyrazinamide susceptibility testing” menunjukkan bahwa Akurasi tinggi MODS dalam mendeteksi resistensi pirazinamid menunjukkan bahwa metode MODS akan menjadi alternatif untuk pengujian kerentanan pirazinamid; mutasi lain yang mempengaruhi ketahanan terhadap pirazinamid perlu diidentifikasi untuk menjelaskan perbedaan hasil antara fenotipe dan genotipe berbasis metode. Penelitian ini menggunakan seratus empat puluh delapan isolat klinis yang berasal dari 148 pasien TB MDR di RS Nanjing. Metode MODS dan the mycobacteria growth indicator tube (MGIT) 960 untuk uji kerentanan pirazinamida dilakukan secara terpisah untuk masing-masing isolat. Pengurutan gen *pncA* diterapkan untuk menunjukkan ketidaksesuaian hasil antara metode MODS dan MGIT 960. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini menunjukkan metode MODS memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menentukan partisi dan fraksi yang aktif menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi ilmiah tentang Pemanfaatan bahan alam dan potensi asli Indonesia

- b. Memberi sumbangsih pandangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu dasar penemuan obat baru antituberkulosis
- c. Memberikan masukan bahan dan informasi bagi instansi terkait yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai acuan pustaka dalam material medika.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.)

1. Klasifikasi Tanaman Kayu Jawa

Taksonomi tanaman kayu jawa dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Tjitrosoepomo G, 2010)



Gambar.1. *L. coromandelica* (Koleksi pribadi. Diambil maret 2017)

Kingdom	: Plantae
Super divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Sub kelas	: Dialepetaler

Ordo : Sapindales
Family : Anarcadiaceae
Genus : Lannae
Spesies : *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.

2. Nama Daerah

Tanaman kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) memiliki beragam nama daerah yakni dalam bahasa Jawa dinamakan kayu jaran, dalam bahasa Makassar dinamakan tammate, dan dalam bahasa bugisnya dinamakan aju jawa (Sasidharan, 2004).

3. Morfologi





Tanaman kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) adalah jenis tanaman habitus, dimana tinggi pohonnya mencapai 6-8 meter, akarnya tunggang, batangnya bercabang, daun majemuk gasal (ganjil), bentuk anak daun bulat memanjang, ada bekas ibu tangkai daun pada cabang / ranting, pertulangan daun menyirip, berwarna hijau pucat (Sasidharan, 2004).






4. Kandungan Kimia dan Kegunaan








Korteks kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) mengandung flavonoid, tanin dan terpenoid, sedangkan pada getahnya mengandung galaktosa (70%), arabinosa (11%), rhamnosa (2%), dan asam uronic (17%) (Sathish R, 2010). Kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) digunakan untuk luka, mengatasi memar, tuberkulosis, asam urat, keseleo dan disentri. Daun dari kayu



jawa berfungsi untuk mengobati pembengkakan akibat keseleo dan kaki gajah (Sathish R, 2010).

Tabel.1. Kandungan Kimia dan Aktivitas Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) (Wahid, 2012)

No	Senyawa Kimia	Aktivitas	Referensi
1.	 <p>Quercetin</p>	Anti inflamasi, stimulan and astringen	(Division of Applied Bioscience; et al., 2000); (Reddy, et al., 2011);(Vikrant & M.L., 2011); (Xiao-juan, et al., 2014);
2.	 <p>Isoquercetin</p>	Antiinflamasi	(Reddy, et al., 2011)
3.	 <p>Physicion</p>	Antimikroba, trombolitik, dan antioksidan, Ulcers,	(Reddy, et al., 2011) (Wahid, 2012)
4.	 <p>Leucocyanidin</p>	Anti inflamasi, stimulan and astringen	(Reddy, et al., 2011) (Vikrant & M.L., 2011)

5.	 <p>Leucodelphin</p>	-	(Reddy, et al., 2011)
6.	 <p>Morin</p>	-	(Reddy, et al., 2011)
7.	 <p>Kaempferol</p>	Antimikroba, Disentri, Diare	(Reddy, et al., 2011) (Division of Applied Bioscience; et al., 2000)
8.	 <p>β - Sitosterol</p>	Antimikroba, Trombolitik, Antioksidan, Kanker, Ulcer	(Xiao-juan, et al., 2014) (Vikrant & M.L., 2011) (Reddy, et al., 2011) (Wahid, 2012)
9.	 <p>Asam Gallat</p>	Antioksidan	(Alam, et al., 2017) (Vikrant & M.L., 2011)

10.	 <p>Epigallocatecin</p>	Antioksidan, Stimulan	(Alam, et al., 2017) (Vikrant & M.L., 2011)
11.	 <p>Aralia Cerebroside</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
12.	 <p>5,5'-dibutoxy-2,2'-bifuran</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
13.	 <p>β-sitosteryl-3β-glucopyranoside-6'-O-palmitat</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
14.	 <p>β-sitosterol palmitat</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
15.	 <p>Myricadiol</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)
16.	 <p>Asam Protocatechuic</p>	-	(Xiao-juan, et al., 2014)

17.	 <p>(2R,3S)-(+)-3',5-dihydroxy-4',7-dimethoxydihydroflavonol</p>	-	(Islam & Tahara, 2000)
18.	 <p>2: R₁=OCH₃, R₂=OCH₃, R₃=H R₄=OCH₃ 3: R₁=OH, R₂=OCH₃, R₃=OH, R₄=OCH₃ 4: R₁=OH, R₂=OCH₃, R₃=H, R₄=OCH₃ 5: R₁=OH, R₂=OH, R₃=OH, R₄=OCH₃</p> <p>2R3R Dihydroflavanols</p>	-	(Islam & Tahara, 2000)

Tabel.2. Aktifitas dan jenis ekstrak Kulit Batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) (Reddy, et al., 2011)

No.	Aktivitas	Jenis Ekstrak	Referensi
1.	Antioksidan dan Analgesik	Ekstrak Metanol	(Alam, et al., 2012)
2.	Antimikroba	Ekstrak Etanol, Ekstrak aseton	(Reddy, et al., 2011)
3.	Antagonisme Glukagon terhadap terapi DM Tipe 2 (T2DM), Penurunan kadar glukosa	Ekstrak Air	(Walunj, et al., 2015)
4.	Penyembuhan Luka	Ekstrak Etanol, Ekstrak Aseton	(Reddy, et al., 2011)
5.	Antiinflamasi	Ekstrak Etanol 96%	(Saputra, 2015)
6.	Penurunan Tekanan darah	Ekstrak Etanol	(Reddy, et al., 2011)
7.	Antihiperqlikemik, Penurunan kadar glukosa	Ekstrak Metanol	(Mannan, et al., 2010)
8.	Antifungi	Ekstrak Etanol 96%	(Mozer, 2015)
9.	Antimikroba	Ekstrak Etanol dan Ekstrak Air	(Kaur, et al., 2013)
10.	Antibakteri	Ekstrak Etanol 96%	(Rahmadani, 2015)
11.	Induksi Apoptosis terhadap sel kanker HepG ₂	Ekstrak Kombinasi Etanol 50% dan air.	(Weerapreeyakul, et al., 2016)
12.	Antibakteri	Ekstrak Air, ekstrak kloroform dan ekstrak	(Venkatesan, et al., 2015)

		methanol.	
13.	Antioksidan menggunakan sel RAW 264.7	Ekstrak Metanol	(Alam, et al., 2017)
14.	Hepatokprotektiv dan Antioksidan	Ekstrak Kombinasi alcohol dan air	(Rao, et al., 2014)

B. Uraian Bakteri Uji


1. *Mycobacterium tuberculosis*

a. Klasifikasi (Jawetz, 2010)

Kingdom : Bacteria
 Filum : Actinobacteria
 Ordo : Actinomycetales
 Sub Ordo : Corynebacterineae
 Famili : Mycobacteriaceae
 Genus : Mycobacterium
 Spesies : *Mycobacterium tuberculosis*

b. Sifat dan morfologi

Mycobacterium tuberculosis memiliki bentuk seperti batang lurus atau agak bengkok, berukuran panjang 5 μ dan lebar 3 μ . *Mycobacterium tuberculosis* akan tampak berwarna merah dengan latar belakang biru dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen seperti gambar berikut; gambar *Mycobacterium tuberculosis* perbesaran objektif 100x dengan menggunakan metode pewarnaan Ziehl Neelsen.



Gambar 2. *Mycobacterium tuberculosis* (Kementerian Kesehatan RI,2012)

Mycobacterium tuberculosis tidak tahan terhadap sinar uv sehingga dapat mati jika terpapar cahaya matahari secara langsung selama 2 jam. *Mycobacterium tuberculosis* mudah menular, mempunyai daya tahan tinggi dan mampu bertahan hidup beberapa jam ditempat gelap dan lembab. Oleh karena itu, dalam jaringan tubuh kuman ini dapat dormant (tidur), tertidur lama selama beberapa tahun. Basil yang ada dalam percikan dahak dapat bertahan hidup 8-10 hari. (Brooks, 2011).

Strain *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv adalah strain tuberkulosis yang paling banyak dipelajari di laboratorium penelitian. pertama kali diisolasi oleh Dr. Edward R. Baldwin pada tahun 1905. Seiring waktu, bakteri ini memiliki virulensi yang bervariasi pada hewan coba berdasarkan media yang ditumbuhkan. Koch pertama kali menemukan *Mycobacterium tuberculosis* sebagai penyebab tuberkulosis pada tahun 1892 namun strain yang diteliti tidak diawetkan dan merupakan genom pertama yang diterbitkan pada tahun 1998

C. Metode Penyarian

Ekstrak ialah berupa sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan cara menyari simplisia nabati atau hewani dengan cara yang sesuai, diluar pengaruh cahayamatahari langsung (Tiwari, et al., 2011). Ekstraksi merupakan metode pemisahan bagian aktif sebagai obat dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan pelarut yang sesuai berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan (Tiwari, et al., 2011).

D. Skrinning Fitokimia

Skrining fitokimia merupakan analisis kualitatif terhadap senyawa-senyawa metabolit sekunder. Suatu ekstrak dari bahan alam terdiri atas berbagai macam metabolit sekunder yang berperan dalam aktivitas biologinya. Senyawa-senyawa tersebut dapat diidentifikasi dengan pereaksi-pereaksi yang mampu memberikanciri khas dari setiap golongan dari metabolit sekunder.

1. Flavonoid

Flavanoid merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dan lain-lain. Flavanoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol, senyawa fenol mempunyai sifat efektif menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur (De Padua, et al.,).

2. Alkaloid

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Robinson, 1995).

3. Saponin

Saponin adalah suatu glikosida yang larut dalam air dan mempunyai karakteristik dapat membentuk busa apabila dikocok, serta mempunyai kemampuan menghemolisis sel darah merah. Saponin mempunyai toksisitas yang tinggi. Berdasarkan strukturnya saponin dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu saponin yang mempunyai rangkasteroid dan saponin yang mempunyai rangka

triterpenoid. Berdasarkan pada strukturnya saponin akan memberikan reaksi warna yang karakteristik dengan pereaksi Liebermann-Buchard (LB) (Gunawan, et al., 2004).

4. Tanin

Tanin adalah senyawa polifenol yang memiliki berat molekul antara 500-3000 dalton yang diduga berperan sebagai antibakteri, karena dapat membentuk kompleks dengan protein dan interaksi hidrofobik (Makkar, 1991). Tanin memiliki aktivitas antibakteri, secara garis besar mekanismenya adalah dengan merusak membran sel bakteri, senyawa astringent tanin dapat menginduksi pembentukan ikatan senyawa kompleks terhadap enzim atau substrat mikroba dan pembentukan suatu ikatan kompleks tanin terhadap ion logam yang dapat menambah daya toksisitas tanin itu sendiri (Harbone, 1987).

E. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang berbahaya dan masih menjadi masalah kesehatan hingga saat ini. *Mycobacterium tuberculosis* merupakan kuman penyebab penyakit TB. Dimana penyakit ini sangat mudah menular melalui udara. Ketika pasien positif penyakit TB mengalami batuk, bersin, berbicara dan bernyanyi maka bakteri TB akan berada di udara sehingga orang terdekat yang ada disekitar jika bernapas dapat menghirup bakteri TB yang keluar dari pasien tersebut. (CDC: *Tuberculosis (TB) Disease*, 2016).


Gejala yang ditimbulkan dari setiap penderita tuberkulosis berbeda-beda karena terkadang tidak menimbulkan gejala. Gejala klinis yang kadang terjadi pada penderita TB menurut Depkes RI (2008) yaitu misalnya menurunnya berat badan, sesak napas, batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih, dahak bercampur darah, badan lemas, batuk berdarah, nafsu makan menurun, tanpa kegiatan fisik berkeringat malam hari, demam meriang lebih dari satu bulan. Dengan gejala-gejala tersebut dapat disimpulkan positif TB, akan tetapi untuk lebih memastikan sebaiknya dilakukan foto rontgen dan pemeriksaan dahak (pemeriksaan mikroskopis) untuk pemeriksaan lebih lanjut (Widoyono, 2008).



Gambar 3. Gejala tuberkulosis (Badan Litbangkes, Kemenkes RI, 2014)

Pada Global Tuberculosis Report 2011 (WHO), dikatakan terdapat perbaikan mayordengan menurunnya kasus dan kematian akibat TB dalam dua dekade terakhir dengan laju penurunan insidens TB secara global sebesar 2,2% pada tahun 2010-2011. Meskipun demikian, beban global akibat TB tetap besar. Menurut estimasi tahun 2011, terdapat 8,7 juta insidens TB (13% di antaranya koinfeksi HIV) dan 1,4 juta orang meninggal karena TB. Lima negara dengan

insidens tuberkulosis tertinggi pada tahun 2011 adalah India, China, Afrika Selatan, Indonesia (0,4–0,5 juta), dan Pakistan.



Gambar 4. Prevelensi TB menurut Karakteristik Umur, Pekerjaan, Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013(Badan Litbangkes, Kemenkes RI, 2014)



Gambar 5. Prevelensi TB menurut Karakteristik Pendidikan, dan Kuantil Indeks Kepemilikan, Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013(Badan Litbangkes, Kemenkes RI, 2014)

Dari gambar dapat dilihat perbedaan tingkatan prevalensi di setiap kelompok indikator.

Ketidaktaatan pasien TB dalam minum obat secara teratur tetap menjadi hambatan untuk mencapai angka kesembuhan yang tinggi. Tingginya angka putus obat akan mengakibatkan tingginya kasus resistensi kuman terhadap obat

antituberkulosis(OAT) yang membutuhkan biaya dan lamapengobatan yang lebih besar. Angka putusobat di rumah sakit di Jakarta pada tahun2006 tercatat sekitar 7%. Berdasarkan laporanSubdit TB Depkes RI tahun 2009, proporsiputus obat pada pasien TB paru kasus barudengan hasil basil tahan asam (BTA) positifberkisar antara 0,6%-19,2% dengan angka putus obat tertinggi ditemukan di provinsiPapua Barat; angka putus obat di Jakarta padatahun 2009 terlapor sebesar 5,7% (Kemenkes RI, 2010).

F. Resistensi Tuberculosis

a. Multi Drug Resisten

TB MDR (*Multiple Drug Resistance*) adalah suatu keadaan dimana *Mycobacterium tuberculosis* telah resisten terhadap INH dan Rifampisin saja atau resisten terhadapINH dan Rifampisin serta OAT lini pertama lainnya.

Fenomena amplifikasi dan penyebaran kasus resistensi TB atau TB MDR seluruhnya adalah akibat perbuatan manusia. Telah dibuktikan bahwa kejadian resistensi *Mycobacterium tuberculosis* terhadap OAT adalah akibat mutasi alami. Amplifikasi *Mycobacterium tuberculosis* yang resisten selanjutnya terjadi akibat kesalahan manusia, seperti tersebut di bawah ini :

- 1) Kesalahan pengelolaan OAT.
- 2) Kesalahan manajemen kasus TB.
- 3) Kesalahan proses penyampaian OAT kepada pasien.
- 4) Kesalahan hasil uji DST
- 5) Pemakaian OAT dengan mutu rendah (Kemenkes, 2012; 6)


b. Extremely Drug Resistant

TB XDR merupakan TB MDR disertai resistensi terhadap salah satu obat golongan fluorokuinolon dan salah satu dari OAT injeksi lini kedua (kapreomisin, kanamisin dan amikasin) Hasil berbagai kajian di luar negeri memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan insidensi TB MDR dan TB XDR. TB XDR juga sudah dikonfirmasi keberadaannya di Indonesia. Jalan untuk menghambat laju kenaikan masalah TB XDR dimulai dengan keharusan menjalankan program DOTS sebaik-baiknya dan tidak dengan mudah menjalankan pengobatan dengan OAT lini kedua. Jika akan melakukan pengobatan dengan OAT lini kedua, hendaknya konsisten mengacu pada pedoman yang telah terbukti validitasnya. (Kemenkes, 2012; 7)

G. Obat Anti Tuberculosis (OAT)

a. Mekanisme kerja Obat Anti tuberculosis

Isoniazid



Isoniazid

INH mudah menembus sel inang dan berdifusi melintasi membran M. tuberculosis . INH adalah pro-drug, yang membutuhkan aktivasi oksidatif oleh katalase-peroksidase enzim katG pada *Mycobacterium tuberculosis*. Meskipun metabolit aktif dari INH telah dilaporkan menghambat beberapa jalur seluler

penting, termasuk sintesis asam nukleat, fosfolipid, dan metabolisme NAD, jalur utama yang bertanggung jawab untuk kegiatan pembunuhan pada obat ini adalah jalur sintesis asam mikolat. (Karakousis, 2012)

Kerja utama isoniazid adalah menghambat biosintesis asam-asam mikolat, yaitu unsur-unsur penting pada dinding sel mikobakteri. Mekanisme kerja isoniazid bersifat kompleks, disertai pemetaan resistensi terhadap mutasi pada sedikitnya lima gen yang berbeda (*katG*, *inhA*, *ahpC*, *kasA*, dan *ndh*). Sebagian besar bukti menunjuk *inhA* sebagai target utama obat. Gen *inhA* mengkodekan enoil-ACP reduktase pada asam lemak sintase II yang mengubah asam-asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh pada jalur untuk biosintesis asam mikolat. Karena asam mikolat merupakan kekhasan mikobakteri, kerja ini menjelaskan tingginya tingkat selektivitas aktivitas antimikroba isoniazid. Paparan isoniazid mengakibatkan hilangnya sifat tahan asam dan penurunan jumlah lipid yang dapat terekstraksi-metanol pada mikroorganisme tersebut (Takayama, 1975)

Rifampicin




Rifampicin mengandung inti aromatik di kedua sisi yang terkait oleh jembatan alifatik. Sehingga rifampicin mudah berdifusi melintasi membran sel *Mycobacterium tuberculosis* karena sifat lipofiliknya (Wade dan Zhang 2004). aktivitas bakterisidal rifampicin telah dikaitkan dengan kemampuannya untuk

menghambat transkripsi dengan mengikat dengan afinitas tinggi untuk DNA-dependent bakteri RNA polimerase.

DNA-dependent RNA polymerase (RNAP) adalah enzim penting dalam proses transkripsi. RNAP membaca urutan DNA target dan mengkatalisis polimerisasi RNA komplementer dengan monomer tripofonat ribonukleotida. 400 kDa RNAP inti enzim terdiri dari subunit yang berbeda yaitu, Subunit α -dimer (α_2), β , β' dan ω . Kode gen dari subunit α , β , β' dan ω masing-masing telah ditetapkan sebagai *rpoA*, *rpoB*, *rpoC* dan *rpoD*. RIF mengikat subunit β RNAP, dekat dengan saluran RNA / DNA dan menghambat β -Subunit RNAP bakteri, sehingga secara fisik menghalangi perpanjangan rantai RNA yang tumbuh Setelah penambahan 2 - 3 nukleotida. Namun, mekanisme yang tepat dari RIF-terkait transkripsi yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel, belum dipahami dengan baik. (Unissa A. D., 2016, hal. 5)

Etambutol




Jalur utama dipengaruhi oleh EMB ialah biosintesis arabinogalactan melalui penghambatan polimerisasi dinding sel arabinan (Mikusova, Slayden et al. 1995). EMB juga telah dilaporkan menghambat beberapa jalur seluler lainnya, termasuk metabolisme RNA, Transfer asam mycolic ke dalam dinding sel


(Takayama, Armstrong et al 1979.), Sintesis fosfolipid, dan biosintesis spermidine.(Karakousis, 2012, hal. 214)

Etambutol menghambat *polymerase* dinding sel arabinan dari arabinogalaktan dan lipoarabinomannan dan menyebabkan akumulasi *D-arabinofuranosyl-P-decaprenol*, perantara dalam biosintesa arabinan (Zhang dan Yew, 2009).

Pirazinamid



PZA adalah amida derivat pyrazine-2-asam karboksilat dan analog nikotinamide. PZA telah dihipotesiskan untuk bertindak terhadap basil yang berada di kompartemen diasamkan paru-paru yang hadir selama tahap inflamasi awal Infeksi, karena aktivitas sterilisasi obat tampaknya terbatas pada 2 bulan pertama terapi. PZA memasuki basil tuberkulosis pasif dan melalui sistem transportasi ATP-dependent. PZA sama seperti INH yang merupakan pro-drug, membutuhkan aktivasi ke bentuk aktifnya, memerlukan konversi asam pyrazinoic (POA) oleh enzim pyrazinamidase (PZase) yang dikode dalam *M. tuberculosis* oleh gen *pncA*. Serapan dan akumulasi basil dari POA meningkat ketika pH ekstraseluler adalah asam. (Karakousis, 2012, hal. 214)



Streptomisin

Seperti dalam bakteri lain, aksinya terhadap spesies mikobakteri adalah dengan mengikat 30S subunit ribosom, yang mempengaruhi polipeptida sintesis, akhirnya menghasilkan penghambatan terjemahan. (Karakousis, 2012)

b. Mekanisme Resistensi Obat Anti Tuberculosis

Isoniazid

INH merupakan obat anti tuberculosis yang paling umum digunakan, sehingga resistensi terhadap INH lebih sering dari pada agen yang lain (Karakousis 2009). Mutasi pada isolat klinis INH-resisten yang paling sering terdeteksi pada gen katG, terjadi pada 50-80% kasus, sehingga mengurangi kemampuan katalase-peroksidase untuk mengaktifkan INH pro-drug. Gen katG terletak di daerah yang bervariasi dan tidak stabil dari M. tuberculosis genom.

Dasar resistensi INH, Sekarang diketahui bahwa mekanisme INH Resistensi sangat kompleks dan melibatkan mutasi pada sejumlah gen yang relatif besar. Laporan Dari berbagai wilayah di dunia telah mendeteksi mutasi pada daerah intergenik katG, inhA, kasA, ndh, oxyR-ahpC, dan beberapa gen lainnya. Di antara semua gen yang terlibat dalam resistensi INH, Mutasi di katG nampaknya menjadi kontributor utama. (Unissa A. S., 2016, hal. 4)

Ripamficin

Mayoritas mutasi yang bertanggung jawab atas resistensi RIF telah dipetakan ke tiga hal yang berbeda, yaitu RIF- cluster I (512-534), RIF-cluster II (563-574), dan RIF-cluster III (687), dan dekat Pusat gen *rpoB*. Resistensi terhadap RIF biasanya berkembang dalam satu langkah tunggal, dan penyebab genetiknya resistensi RIF pada sebagian besar kasus (95%) disebabkan oleh mutasi pada RIF 81-bp daerah penentuan resistansi (RRDR) dari gen *rpoB* MTB. Wilayah ini sesuai dengan kodon 426 sampai 452 pada genom MTB dan kodon 507 - 533. Substitusi asam amino tunggal adalah jenis mutasi yang paling dominan, diikuti dengan penghapusan infark dan Sisipan yang terjadi pada frekuensi rendah. Sebagian besar mutasi yang dilaporkan terjadi pada posisi 521, 526, 531 dan 533 yang sesuai dengan posisi 440, 445, 450 dan 452 pada genom MTB. Perubahan asam amino pada kodon 526 dan 531 umumnya terkait dengan resistansi RIF tingkat tinggi, Sementara mutasi pada posisi 514 atau 533 biasanya menghasilkan resistansi RIF tingkat rendah. Secara umum, ada Korelasi kuat antara substitusi asam amino spesifik dan MIC. Dalam salah satu penelitian kami sebelumnya yang menyelidiki interaksi molekuler Antara RIF dan mutasi klinis yang berbeda (MTs) dari MTB dengan mutasi *RpoB* yang bertanggung jawab terhadap tingkat resistansi RIF yang sedang, tinggi dan rendah, kami mengamati bahwa kemampuan pengikatan RIF bervariasi diantara WT dan MTs, sebagai hasil dari perubahan konformasi protein MT, yang menyebabkan variasi ikatan interaksi dengan RIF, dan akhirnya menghasilkan resistensi RIF. (Unissa A. D., 2016, hal. 4)

Etambutol

Resistensi terhadap EMB dalam *M. tuberculosis* biasanya berhubungan dengan mutasi di *embCAB* operon (Belanger, Besra et al. 1996). Studi genetik dan biokimia telah menunjukkan bahwa *EmbA* dan *EmbB* protein yang terlibat dalam pembentukan terminal hexaarabinofuranoside selama sintesis arabinogalactan, sementara *EmbC* terlibat dalam sintesis lipoarabinomannan. Sebagai besar resistensi etambutol mengandung mutasi pada gen *embB*. (Karakousis, 2012, hal. 215)

Pirazinamid

Kerentanan MTB terhadap PZA berkorelasi dengan adanya enzim tunggal *PZase* dengan kedua Aktivitas nikotinamidase dan pirazinamidase. PZA resisten MTB biasanya terjadi di Aktivitas *PZase*, dan korelasi yang baik telah diamati antara resistensi PZA dan kehilangan Aktivitas *PZase*, yang menyebabkan kelangsungan hidup basil melalui penghambatan pembentukan POA. Scorpio dan Zhang (1996) mengidentifikasi *pncA* dari MTB dan menunjukkan bahwa mutasi pada gen *pncA* merupakan mekanisme utama untuk resistensi PZA. Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa 70- 97% mutasi resistensi PZA terjadi pada bagian struktural atau di daerah Gen *pncA*. Mutasi *pncA* yang diidentifikasi sebagian besar adalah mutasi missense yang menyebabkan substitusi asam amino ,dan dalam beberapa kasus, insert dan penghapusan nukleotida dan mutasi nonsens.(Unissa A. D., 2016, hal. 16)

Streptomisin

Streptomisin menghambat sintesa protein dengan mengikat 30S subunit ribosom bakteri, menyebabkan kesalahan membaca pesan mRNA selama translasi. Resistensi streptomisin disebabkan oleh mutasi pada S12 protein yang dikode oleh gen *rpsL* dan 16S rRNA yang dikode gen *rrs* (Zhang dan Yew, 2009).

Mutasi pada *rpsL* (50%) dan *rrs* (20%) merupakan mekanisme utama pada resistensi streptomisin (Zhang dan Yew, 2009; Da Silva dan Palomino, 2011). Mutasi utama pada *rpsL* adalah substitusi pada kodon 43 dari lisin ke arginin yang menyebabkan resisten yang tinggi terhadap streptomisin. Mutasi juga terjadi pada kodon 88. Mutasi gen *rrs* terjadi pada *loop* 16S rRNA yang terdiri dari 2 region ‘ nukleotida 530 dan 915 (Zhang dan Yew, 2009).

H. Perkembangan Obat Lama dan Obat Baru

Obat baru telah dikembangkan untuk pengobatan multidrug-resistant tuberculosis (TB). Kemajuan dalam mengembangkan regimen obat baru yang ada dilakukan untuk mempersingkat durasi pengobatan obat yang sensitif dan yang resisten TBC. Serta untuk membantu akses cepat ke obat-obatan ini dan regimen penting bagi pasien yang membutuhkan. Tetapi penggunaan obat baru dan rejimen harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menghindari penggunaan yang tidak baik dan resistensi terhadap obat ini (Sandgren, 2015).

Karena sifat dari penyakit ini, TB selalu menggunakan regimen yang terdiri dari setidaknya empat obat yang berbeda. Saat ini, anggota negara Uni Eropa / EEA mengikuti Standar Eropa untuk TB Care, atau pedoman yang sama untuk pengobatan dan manajemen kasus TB. Karena panjangnya durasi pengobatan dan besarnya jumlah obat diperlukan, pengobatan TB-MDR bahkan

lebih menantang daripada pengobatan obat sensitif (DS) TB. Tingkat keberhasilan pengobatan dari semua kasus TB untuk pengobatan kohort 2012 adalah 73,5%. Tingkat keberhasilan pengobatan MDR TB jauh lebih rendah dengan 37,8% dari TB MDRkasus memiliki hasil pengobatan yang berhasil untuk kohort pengobatan 2011 (kisaran antara negara 0-75%). Untuk XDR tingkat keberhasilan pengobatan TB terhadap resisten obat untuk kohort pengobatan 2010 hanya 25,9%(Kisaran antara negara 0-100%).obat baru sangat dibutuhkan untuk memperkuat rejimen saat ini untuk meningkatkan pengobatan TB.Dua obat baru, Bedaquiline (dalam Sirturo produk obat yang diproduksi oleh Janssen) dan Delamanid (dalam produk obat Deltyba diproduksi oleh Otsuka) telah resmi Uni Eropa untuk pengobatan TB. Sebagai tambahan untuk ini, kandidat obat lainnya sedang dievaluasi dan akan tersedia dalam waktu dekat. Ada beberapa yang sedang berjalan uji coba yang bertujuan untuk menemukan rejimen yang lebih baik untuk mengobati TB aktif dari standar rejimen saat ini. Ini Studi termasuk calon obat baru dalam tahap awal pengembangan, dengan beberapa dari mereka sudah dalam tahap uji coba III. Selain obat-obatan baru, ada sejumlah obat repurposed (obat yang awalnya dikembangkan untuk infeksi lain) yang sekarang diuji dan digunakan untuk pengobatan TB. (Sandgren.2015).

Beberapa obat baru telah diteliti sebagai calon potensial untuk pengobatan TB. Dalam kebanyakan kasus, mekanisme kerjanya berbeda dari obat anti-TB klasik, meskipun strain yang resisten terhadap beberapa obat-obatan baru sudah telah dijelaskan bahkan sebelum penggunaan klinis mereka.

Nitroimidazoles

Nitroimidazoles merupakan obat baru antimycobacterial yang aktif terhadap organisme sensitif dan organisme yang resistan terhadap obat [58]. Obat ini menunjukkan kegiatan serupa terhadap kedua organisme replikasi dan non replikasi, yang menunjukkan potensi untuk mempersingkat terapi. Dua nitroimidazoles saat ini sedang dalam pengembangan klinis. Pertama, OPC-67.683, yang dikembangkan oleh Otsuka Pharmaceutical Co Ltd (Tokyo, Jepang), adalah anggota dari nitroimidazo-oxazole subclass; itu saat ini sedang dievaluasi dalam percobaan fase II untuk pengobatan MDRTB. Kedua, PA-824, anggota dari nitroimidazooxazine yang subclass, sedang dikembangkan oleh Aliansi TB New York City, New York, Amerika Serikat, dan telah menunjukkan keamanan dan tolerabilitas yang baik pada pasien dewasa TB paru Afrika Selatan ketika diberikan sekali sehari selama 7 hari (Lienhardt.2010)

I. Uraian Metode Pengujian Tuberculosis

1. Metode Pengujian

a. Lowenstein-Jensen medium

Cara proporsi media LJ merupakan salah satu cara yang terstandarisasi (Ditjen Bina Upaya Kesehatan, 2012). Media LJ merupakan modifikasi dari media Lowenstein yang dikembangkan oleh Jensen, yang menggunakan telur segar (Accumedia, 2010; Essaway et al, 2014). Jensen memodifikasi medium dengan mengganti sitrat dan fosfat, mengeliminasi *congo red*, dan meningkatkan konsentrasi *malachite green*. Pemakaian media dari telur untuk isolasi primer mycobacteria mempunyai dua keuntungan yaitu media telur dapat digunakan

untuk berbagai macam tipe mycobacteria dan pertumbuhan mycobacteria pada media telur dapat digunakan untuk uji niasin (Accumedia, 2010). Medium LJ mengandung gliserol untuk pertumbuhan *M. tuberculosis*, sedangkan medium LJ tanpa gliserol tetapi mengandung piruvat untuk pertumbuhan *Mycobacterium bovis* (Ministry of Health and Family Welfare, 2009).

Prinsip prosedur media LJ yaitu: L-Asparagin dan *potato meal* merupakan sumber nitrogen dan vitamin dalam media LJ. Monopotasium fosfat dan magnesium fosfat meningkatkan pertumbuhan organisme dan bertindak sebagai *buffer*. Gliserol dan suspensi telur menghasilkan asam lemak dan protein yang dibutuhkan untuk metabolisme mycobacteria. Koagulasi dan albumin telur selama sterilisasi menghasilkan media padat untuk fungsi inokulasi. Sodium sitrat dan *malachite green* merupakan agen selektif untuk mencegah adanya kontaminasi dan membiarkan pertumbuhan dini mycobacteria (Accumedia, 2010).

Penelitian yang dilakukan Yadav *et al* (2013) di India menunjukkan bahwa kelemahan metode kultur konvensional dengan media LJ adalah adanya kontaminasi sebesar 57% atau hasil kultur yang negatif sebesar 38%. Pada uji kepekaan obat dengan media LJ memerlukan waktu yang lebih lama yaitu 70 hari (28 hari untuk kultur pertumbuhan kuman dan 42 hari untuk uji kepekaan obat).

b. Metode Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT)

Cara ini menggunakan media cair *Middlebrook 7H9* yang dimodifikasi. Pada dasar botol media terdapat indikator yang akan berfluorosensi jika kadar oksigen dalam botol menurun sebagai akibat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. Tingkat fluorosensi dapat diukur secara manual

ataupun secara otomatis. Pada cara manual, fluoresensi diamati sejak hari kedua dan isolat *Mtb* dinyatakan resisten jika fluoresensi terjadi bersamaan sampai dua hari kemudian dibandingkan kontrolnya. Cara manual ini dapat pula diterapkan untuk uji kepekaan langsung dari sputum. Cara MGIT ini telah diakui oleh Ferderal Drug Administration (FDA) Amerika dan setara dengan uji kepekaan cara konvensional maupun BACTEC radiometrik (Sjahrurachman;2008)

c. Uji Reduktase Nitrat

Uji nitrat reduktase (NRA) adalah teknik yang didasarkan pada kapasitas *M. tuberculosis* untuk mengubah nitrat menjadi Nitrit, yang dideteksi dengan menambahkan reagen Griess ke medium. Dengan memasukkan 1 mg / ml potasium nitrat (KNO_3) dalam media LJ, reduksi nitrat dapat dideteksi dengan menggunakan pereaksi Griess, yang menghasilkan reaksi berwarna. Dengan adanya rifampisin atau isoniazid pada konsentrasi kritis, kemunculan warna merah-pink untuk mengindikasikan adanya pertumbuhan yang diartikan sebagai resistensi terhadap obat. Hasil bisa didapat lebih cepat dibandingkan dengan deteksi makroskopis koloni, karena NRA menggunakan deteksi penurunan nitrat sebagai indikator. (Ködmön, 2016, hal. 79)

d. Metode Microscopically Observed Drug Susceptibility (MODS)

Metode MODS merupakan metode biakan untuk kuman *M. tuberculosis* dengan media *Middlebrook 7H9* yang sekaligus dapat mendeteksi kepekaan obat TB secara mikroskopik. Uji kepekaan tersebut difasilitasi dengan *Middlebrook 7H9* ditambah obat anti-TB. Metode MODS mempunyai sensitivitas yang lebih

tinggi dibandingkan dengan metode biakan yang lain dan dapat mendeteksi lebih cepat pertumbuhan *M. tuberculosis* dengan biaya yang relatif lebih murah serta cara yang mudah (Dewi, 2011)

2. Media kultur

Mycobacterium tuberculosis tumbuh lambat, dengan waktu 18-24 jam (Bakteri lain tumbuh dalam hitungan menit). Untuk itu, *M. tuberculosis* tidak dapat tumbuh pada teknik bakteriologis biasa dan isolasi primer pada media biasa. Satu-satunya media yang memungkinkan pertumbuhan bakteri ini ialah media telur yang diperkaya dengan gliserol dan asparagin, media agar atau media cair yang mengandung serum atau albumin sapi. Telah banyak media yang dikembangkan untuk pertumbuhan *M. tuberculosis* yang umumnya dikelompokkan menjadi dua yaitu media padat (Media telur dan media agar) dan media cair. Antibiotik dapat ditambahkan ke media kultur untuk mencegah pertumbuhan flora non spesifik. (Ködmön, 2016, hal. 49)

Media padat dan cair direkomendasikan untuk isolasi *M. tuberculosis* dari sampel biologis. Sebuah keuntungan Media padat di atas media cair adalah koloni kultur campuran dan kontaminan dapat diamati sementara media cair Meningkatkan pertumbuhan mycobacteria yang lebih cepat. Pilihan media terutama bergantung pada jenis spesimen. (Ködmön, 2016, hal. 49).

Media Non-Selektif :

- a. Media berbasis telur: Medium Löwenstein-Jensen (LJ) dan medium Ogawa
- b. Media berbasis agar : Middlebrook 7H10 dan Middlebrook 7H11; dan

c. Media cair : Middlebrook 7H9

Media cair memberikan keuntungan waktu yaitu 7-14 hari pada medium cair, dibandingkan dengan media agar middlebrokk 7H11 18-28 hari, atau 21-42 hari pada medium LJ. (Ködmön, 2016, hal. 49)

J. Tinjauan Islam

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan banyaknya berbagai penyakit yang muncul di kalangan masyarakat. Dan salah satu penyakit yang paling berbahaya saat ini adalah Tuberkulosis yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Oleh karena itu, dengan munculnya berbagai penyakit di kalangan masyarakat maka masyarakat dituntut untuk menggunakan akal pikirannya yang juga merupakan pemberian dari sang khalik sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-Imran (3): 190-191 yang firmanya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,

Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”
(Departemen Agama RI, 2014).

Dari ayat diatas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah SWT. memberikan akal kepada manusia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengkaji hasil ciptaan Allah yang terdapat di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian ini, dimana tujuannya adalah untuk memperoleh obat baru dari tumbuhan kayu jawa yang dapat digunakan sebagai obat anti tuberkulosis.

Allah berfirman dalam Q. S. Asy-syuara (26) : 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”(Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, 1989 : 572).

Dalam kitab Tafsir al-Mishbah (2002), dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan-melalui uraiannya-keniscayaan ke-Esaan Allah swt. karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab, 2009)

Firman Allah swt dalam QS. Al An’am / 6 : 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ^ط أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ

ج إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

"Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman" (Q.S Al-An'am: 99).

Menurut Jamaluddin Mahran dalam bukunya Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan, bahwa ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang menurunkan hujan dari awan, lantas mengeluarkan tumbuhan dari berbagai jenis, menumbuhkan tanaman, lalu mengistimewakan salah satu organ tubuhnya yakni daun untuk menjadi piranti penghasil zat hijau yang penting untuk memasak bahan makanan. Perhatikanlah keteraturan dan keindahan buahnya, bagaimna ia diciptakan sampai matangnya, bagaimana ia disempurnakan bentuknya yang beraneka (Mahran, 2005).

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit ada obatnya, jika benar obat yang digunakan dapat melawan penyakit yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh” (HR. Bukhari) (Mahmud, 2007: 13-14)

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya Semua Penyakit Ada Obatnya, prinsip pengobatan didalam penyembuhan penyakit ala Rasulullah saw. diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan. Rasulullah saw. mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah swt. yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang menyembuhkannya. Jika kita menginginkan kesembuhan dari Allah swt. maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhai oleh Allah swt. karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh kita (Muadzin, 2009).

Jadi, setiap penyakit yang diturunkan Allah swt pasti ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya, akan tetapi Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimental kuantitatif

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan di Laboratorium NECHRI Universitas Hasanuddin Makassar pada bulan Mei – Juni 2017.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *true experimental* dengan desain penelitian *control group post test only*.

C. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah Autoklaf (*Hirayama*), bejana maserasi, chamber (*Lamag*), inkubator (*Memmert*), Laminan Air Flower (LAF)(*ESCO*), lampu UV 254 nm dan 366 nm, lemari pendingin (*Modena*), mikroskop, vortex mixer, oven (*Memmert*), pipet mikro (*Socorex*), plat 24 well, rotary evaporator (*Heidolph*), timbangan analitik (*Kern*), dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah Air suling (Aquadestillata), Aluminium Klorida, Besi (III) Klorida (FeCl_3), Biakan Murni (*Mycobacterium tuberculosis*), Kloroform, kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.), Metanol, *Middlebrook 7H9*, Nutrien OADC (oxalid acid, albumin, destrosa, dan katalase), Nutrient PANTA, Paperdisk, Pereaksi (Liebermann-Buchard, FeCl_3 , wagner, dragendroff, H_2SO_4 10%, NaOH 10%).

D. Prosedur Kerja

1. Preparasi sampel

a. Pengambilan Sampel

Sampel berupa kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) yang diambil pada pagi hari pukul 09.00 dibagian batang utama dengan ukuran tertentu diambil tidak secara melingkar.

b. Pengolahan Sampel

Sampel kulit batang kayu jawa dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa kontak langsung sinar matahari. Setelah bersih dan kering, dipotong-potong kemudian diserbukkan dengan menggunakan alat *blender* sehingga diperoleh ukuran serbuk 40 mesh.

c. Ekstraksi

Cara kerja dengan metode ini adalah ditimbang sampel sebanyak 2.000 gram. Kemudian dimasukkan 2.000 gram sampel kedalam toples, lalu dibasahi sampel menggunakan pelarut metanol 12.000 ml, ditambahkan pelarut metanol

kedalam toples hingga melewati sampel, dan ditutup toples menggunakan aluminium foil kemudian ditutup rapat dengan penutup toples. Dibiarkan sampel terendam selama \pm 24 jam, lalu dilakukan proses penyarian setelah 3 x 24 jam menggunakan kain putih dan corong yang telah disumbat kapas, dilakukan proses remaserasi sampel yang telah disaring tadi, kemudian ditampung hasil maserasi. Filtrat dimasukkan kedalam rotavapor kemudian ekstrak cair yang diperoleh dari rotavapor diuapkan hingga kering (ekstrak metanol) kemudian ditimbang ekstrak yang diperoleh.

d. Partisi Padat-Cair

Dilakukan proses partisi dengan metode padat-cair dengan cara ditimbang ekstrak metanol sebanyak 20,514 gram, dimasukkan ke dalam lumpang, dilarutkan dengan n-heksan 1700 ml dan digerus lalu disentrifugasi hasil gerusan yang diperoleh dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Dipisahkan antara ekstrak larut n-heksan dengan ekstrak tidak larut n-heksan kemudian dilakukan berulang hingga larutan n-heksan yang diperoleh jernih.

e. Skrining Pelarut (Penentuan eluen)

Eluen ditentukan dengan berdasarkan profil KLT yang diperoleh dari metode Kromatografi Lapis Tipis, ekstrak metanol dilarutkan dalam pelarut kloroform : metanol (1:1), kemudian dielusi dengan menggunakan eluen etil asetat : metanol (1:1). Kemudian diamati penampakan noda dibawah lampu UV 254 nm dan 366 nm serta penampakan noda pada H_2SO_4 dengan cara disemprotkan asam sulfat 10% pada lempeng kemudian dipanaskan dalam oven hingga noda

terbentuk. Pemilihan eluen didasarkan pada kepolaran dan prinsip *Like Dissolves Like*.

f. Fraksinasi

Fraksinasi dilakukan dengan metode KCV (Kromatografi Cair Vakum), ditimbang silika sebanyak 60 gram, lalu ditimbang ekstrak kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) yang tidak larut n-heksan sebanyak 5 gram. Digerus ekstrak 5 gram + 1/3 gram silika atau 20 gram, dan dimasukkan silika 40 gram kedalam center glass sambil dimampatkan. Dimasukkan ekstrak + silika kedalam center glass dan dimampatkan dilapisi dengan kertas saring pada bagian atas, kemudian dihubungkan dengan pompa vakum. Setelah itu ditambahkan pelarut atau eluen sebanyak 120 ml dengan perbandingan tertentu, lalu ditampung dalam mangkuk, 1 mangkuk untuk 1 perbandingan eluen (16 mangkuk) kemudian diuapkan. Lalu ditambahkan sedikit pelarut, ditotol pada lempeng, lalu dielusi dan diamati dibawah lampu UV 254 nm dan 366 nmdan didapatkan fraksi terbaik. Digabungkan fraksi yang memiliki noda yang hampir sama atau sama.

g. Uji Golongan

a. Uji alkaloid

Ekstrak sebanyak 0,5 mg digerus dengan penambahan sedikit kloroform hingga larut. Ditambahkan 0,5 mL asam sulfat 1 M, kemudian dikocok perlahan. Didiamkan beberapa saat sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas yang jernih dibagi dua, 1 bagian ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Dragendorff dan bagian berikutnya ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Mayer. Endapan merah bata yang

terbentuk oleh pereaksi Dragendorf dan endapan putih oleh pereaksi Meyer menunjukkan adanya senyawa alkaloid (Fransworth, 1996).

b. Uji Flavonoid

Sebanyak 0,5 mg ekstrak dilarutkan dalam 5 mL air panas, dididihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat yang didapat lalu ditambah bubuk logam magnesium secukupnya, 1 ml asam sulfat pekat dan 2 mL etanol. Dikocok kuat dan biarkan terpisah. Terbentuknya warna merah, kuning atau jingga pada lapisan etanol menunjukkan adanya senyawa flavonoid (Tiwari, *et al.*, 2011).

c. Uji terpenoid

Sebanyak 0,5 mg ekstrak dilarutkan dalam kloroform dan disaring. Kemudian filtrat ditambahkan beberapa tetes asam sulfat dan dikocok. Terbentuknya warna kuning emas mengindikasikan adanya senyawa triterpen (Tiwari, *et al.*, 2011).

d. Uji Fenol

Sebanyak 0,5 mg ekstrak dilarutkan dengan 2 mL etanol 96% dan ditambahkan 3 tetes larutan FeCl. Terbentuknya warna hitam kebiruan mengindikasikan adanya senyawa fenol (Tiwari, *et al.*, 2011)

2. Prosedur Pengujian Antituberkulosis

a. Pembuatan media cair *MiddleBrook 7H9*

Ditimbang 0,65 g *MiddleBrook 7H9* dan casitone 0,138 g kemudian dimasukkan dalam wadah, ditambahkan 0,34 ml gliserol kedalam wadah dan dicukupkan dengan aquadest hingga 100 ml. dikocok sampai homogen, disterilisasi menggunakan autoklaf \pm 20 menit pada suhu 121 °C.

b. Pembuatan stok larutan fraksi

Ditimbang 25 mg tiap fraksi dan dimasukkan kedalam wadah vial. Ditambahkan 500 µl DMSO kedalam masing-masing vial kemudian dihomogenkan dengan magnetic stirrer. Sampel disimpan sebagai larutan stok fraksi.

c. Suspensi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*

Diambil larutan media cair *MiddleBrook 7H9* sebanyak 25 ml, dan ditambahkan OADC 2,5 ml ; PANTA + 4 OADC 0,5 ml dan dihomogenkan. Kemudian ditambahkan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV sebanyak 1 ml, dan disuspensikan kedalam tabung steril yang berisi 25 ml media *MiddleBrook 7H9* dan dihomogenkan.

d. Metode MODS (Microscopically Observed Drug Susceptibility)

Disiapkan plate 24 well untuk strain H₃₇RV. Dipipet 50 µl DMSO kemudian ditambahkan ke plate H₃₇RV (masing-masing) duplo sebagai kontrol negatif. Dipipet 50 µl obat Isoniazid kemudian ditambahkan ke plate H₃₇RV (masing-masing duplo) sebagai kontrol positif. Selanjutnya dipipet 50 µl ekstrak/partisi/fraksi uji kedalam well H₃₇RV (masing-masing duplo). Setelah itu, ditambahkan 950 µl suspensi bakteri kedalam seluruh well pada plate lalu dihomogenkan. Kemudian diinkubasi selama 7 hari dengan suhu 300 °C dan diamati pada mikroskop.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Kulit Batang Kayu Jawa

Kulit batang kayu jawa sebanyak 2.000 gram diekstraksi menggunakan metode maserasi. Hasil ekstraksi yang diperoleh dengan pelarut metanol 12000 ml sebanyak 96,247 gram.

Tabel 3. Hasil Ekstraksi Kulit Batang Kayu Jawa

No	Sampel	Pelarut	Berat ekstrak
1	Kulit batang kayu jawa	Metanol	96,247 gram

2. Hasil Partisi Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa

Ekstrak metanol kulit batang kayu jawa sebanyak 20,514 gram dipartisi menggunakan metode padat-cair dengan pelarut n-heksan. Hasil partisi yang larut heksan sebanyak 4,382 gram, sedangkan yang tidak larut heksan sebanyak 16,132 gram.

Tabel 4. Hasil Partisi Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa

No.	Sampel	Pelarut	Berat Ekstrak Larut	Berat Ekstrak Tidak Larut
1.	Ekstrak Kayu Jawa	n-Heksan	4, 382 gr	16, 132 gr

3. Hasil Fraksi Kulit Batang Kayu Jawa

Fraksinasi ekstrak metanol tidak larut heksan kulit batang kayu jawa dengan metode kromatografi cair vakum menggunakan campuran perbandingan eluen hasil profil KLT yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan hasil KCV, diperoleh 16 hasil fraksi (lih. Lampiran 7), yang kemudian dielusi dengan campuran eluen etil : metanol untuk ekstrak tidak larut heksan sehingga diperoleh

6 gabungan fraksi yang sama melalui penampakan bercak lampu UV 254 nm dan 366 nm .

Tabel 5. Hasil Perbandingan Fraksi Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa

No.	Eluen	perbandingan	Volume (ml)	Hasil fraksi
1	etil asetat	-	120 ml	A
2	etil asetat : metanol	60 : 1	120 ml	B
3	etil asetat : metanol	50 : 1	120 ml	C
4	etil asetat : metanol	40 : 1	120 ml	D
5	etil asetat : metanol	30 : 1	120 ml	E
6	etil asetat : metanol	20 : 1	120 ml	F
7	etil asetat : metanol	10 : 1	120 ml	G
8	etil asetat : metanol	1 : 1	120 ml	H
9	etil asetat : metanol	1 : 10	120 ml	I
10	etil asetat : metanol	1 : 20	120 ml	J
11	etil asetat : metanol	1 : 30	120 ml	K
12	etil asetat : metanol	1 : 40	120 ml	L
13	etil asetat : metanol	1 : 50	120 ml	M
14	etil asetat : metanol	1 : 60	120 ml	N
15	etil asetat : metanol	1 : 70	120 ml	O
16	Metanol	-	140 ml	P

Tabel 6. Hasil Penggabungan Fraksi Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa

No.	Fraksi gabungan	Fraksi	Berat (gr)
1.	Fraksi 1 (A)	B, C, D, E	0,105
2.	Fraksi 2 (B)	H	0,1799
3.	Fraksi 3 (C)	I	2,2708
4.	Fraksi 4 (D)	J	1,4595
5.	Fraksi 5 (E)	K	0,5128
6.	Fraksi 6 (F)	L	0,1069
7.	Fraksi 7 (G)	M, N, O	0,0948

4. Hasil Identifikasi Komponen Senyawa Partisi dan Fraksi Menggunakan Pereaksi Identifikasi

Partisi dan fraksi yang aktif kemudian diidentifikasi komponen senyawanya menggunakan pereaksi warna semprot Lieberman Buchard, Dragendorff, Besi (III) Klorida, Aluminium Klorida.

Tabel 7. Hasil Identifikasi Komponen Senyawa Partisi dan fraksi

NO	SAMPSEL	GOLONGAN SENYAWA				Keterangan
		ALKALOID	FENOLIK	FLAVANOI D	TERPEN	
1	Fraksi A	-	+	+	-	Mengandung fenolik, flavanoid
2	Fraksi B	-	-	+	+	Mengandung flavanoid, terpen
3	Fraksi C	+	+	-	+	Mengandung alkaloid, fenolik, terpen
4	Fraksi D	+	+	-	+	Mengandung alkaloid, fenolik, terpen
5	Fraksi E	-	+	-	+	Mengandung fenolik, terpen
6	Fraksi F	-	+	-	+	Mengandung fenolik, terpen
7	Fraksi G	-	+	-	+	Mengandung fenolik, terpen
8	Ekstrak	+	+	-	-	Mengandung alkaloid, fenolik
9	Partisi Tidak larut Heksan	+	+	-	+	Mengandung alkaloid, fenolik, terpen
10	Partisi Larut Heksan	-	-	-	+	Mengandung terpen

5. Uji Antituberkulosis

Pada pengujian antituberkulosis dengan metode MODS menggunakan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv sensitif dengan fraksi-fraksi. Masing-masing fraksi diencerkan menjadi satu konsentrasi 2500 ppm dan ditambahkan diatas media *middlebrook* yang telah ditambahkan OADC, Fanta dan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Daya hambat pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel.8

Tabel 8. Hasil Uji Penghambatan Pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv sensitif

No.	Sampel	Konsentrasi (ppm)	Keterangan
1	Kontrol negatif (-)	2500	Tidak menghambat
2	Kontrol positif (+)	2500	Menghambat
3	Fraksi A	2500	Menghambat
4	Fraksi B	2500	Menghambat
5	Fraksi C	2500	Menghambat
6	Fraksi D	2500	Menghambat

7	Fraksi E	2500	Menghambat
8	Fraksi F	2500	Menghambat
9	Fraksi G	2500	Menghambat
10	Ekstrak	2500	Menghambat
11	Partisi tidak larut heksan	2500	Menghambat
12	Partisi larut heksan	2500	Menghambat

B. Pembahasan

Kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) sering digunakan masyarakat sebagai obat herbal untuk mengobati beberapa penyakit. Kemampuan kulit batang kayu jawa untuk menyembuhkan luka disebabkan adanya zat antibakteri, dimana zat tersebut berperan sebagai antimikroba dan antijamur. Dengan adanya zat tersebut sebagai antibakteri dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan mencegah terjadinya infeksi pada luka sehingga kesembuhan luka dapat dipercepat.

Kayu jawa digunakan untuk luka, mengatasi memar, diare ophthalmia, asam urat, keseleo dan disentri. Daun dari kayu jawa berfungsi untuk mengobati pembengkakan akibat keseleo dan kaki gajah, getahnya sebagai penyembuhan luka, dan korteks kayu jawa sebagai antiinflamasi, antimitosis dan antioksidan. Kandungan kimia dari kayu jawa adalah polifenol dan flavanoid. Di Makassar kayu jawa ini disebut kayu tammate atau kampong biasa menyebutnya to'ba' kayu cina.

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakitmenular yang berbahaya dan masih menjadi masalah kesehatan hingga saat ini. *Mycobacterium tuberculosis* merupakan kuman penyebab penyakit TB. Dimana penyakit ini

sangat mudah menular melalui udara. Ketika pasien positif penyakit TB mengalami batuk, bersin, berbicara dan bernyanyi maka bakteri TB akan berada di udara sehingga orang terdekat yang ada disekitar jika bernapas dapat menghirup bakteri TB yang keluar dari pasien tersebut.

Strain *Mycobacterium tuberculosis* H37Rv adalah strain tuberkulosis yang paling banyak dipelajari di laboratorium penelitian. pertama kali diisolasi oleh Dr. Edward R. Baldwin pada tahun 1905. Seiring waktu, bakteri ini memiliki virulensi yang bervariasi pada hewan coba berdasarkan media yang ditumbuhkan. Koch pertama kali menemukan *Mycobacterium tuberculosis* sebagai penyebab tuberkulosis pada tahun 1892 namun strain yang diteliti tidak diawetkan dan merupakan genom pertama yang diterbitkan pada tahun 1998

Pembuatan simplisia dilakukan dengan pengambilan sampel dari kulit batang kayu jawa kemudian dilakukan pengeringan tanpa terkena sinar matahari. Hal ini dilakukan agar tidak merusak senyawa yang sensitif terhadap pemanasan tinggi. Setelah mengering, sampel kemudian dirajang hingga berbentuk serbuk simplisia. Semakin kecil ukuran simplisia, maka luas permukaannya akan semakin besar dan pelarut dapat menarik senyawa-senyawa kimia semakin banyak.

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maserasi. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesederhanaan metode yang digunakan dan kemudahan alat untuk didapatkan. Metanol digunakan karena dapat menarik senyawa polar dan senyawa nonpolar dari ekstrak sehingga memaksimalkan penarikan senyawa dalam simplisia. Ekstrak cair yang

didapatkan kemudian dipekatkan menggunakan *rotary evaporator* lalu dipartisi kembali menggunakan metode partisi padat-cair dengan pelarut heksan sehingga menghasilkan partisi larut heksan dan partisi tidak larut heksan.

Partisi tidak larut heksan kemudian difraksinasi kembali menggunakan metode KCV (Kromatografi Cair Vakum) untuk mendapatkan pemisahan senyawa yang lebih kompleks. Fraksinasi diawali terlebih dahulu dengan identifikasi KLT. Identifikasi KLT dilakukan untuk menentukan eluen terbaik pada proses KCV. Adapun campuran eluen yang digunakan dalam identifikasi KLT ini adalah etil asetat:metanol dengan perbandingan 10:1.

Hasil fraksi yang telah didapatkan kemudian diuji antituberkulosis menggunakan metode MODS. Dalam hal ini metode MODS digunakan karena metode ini mudah, cepat, mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi, serta biaya yang relatif lebih murah. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk mendiagnosis yang sensitif (DST), monoresisten dan multidrug resisten (MDR) dengan cepat dibandingkan dengan pengujian konvensional.

Media cair dalam pengujian ini adalah *middlebrook 7H9* yang mengandung *middlebrook*, casitone, glycerol dan aquadest yang penting untuk pertumbuhan bakteri. Media cair memberikan keuntungan waktu yaitu 7-14. OADC untuk nutrisi *Mycobacterium tuberculosis*. penggunaan PANTA + OADC sebagai antibiotik untuk membantu pencegahan kontaminasi. Setelah pembuatan larutan uji dimana sampel dilarutkan dengan DMSO, larutan uji kemudian ditambahkan kedalam well lalu diinkubasi. Setelah diinkubasi selama 7 hari kemudian diamati dengan mikroskop dan dilihat penghambatan pertumbuhannya. (Dewi, 2011)

Uji antituberkulosis digunakan metode MODS, karena pada metode ini menggunakan media cair (*Middlebrook 7H9*) sehingga bakteri lebih cepat tumbuh, kandungan nutrisi pada media cair yaitu OADC (oxalid acid, albumin, destrosa, dan katalase) dan PANTA (polymyxin, amphotericin B, nalidixic acid, trimethoprim and azlocillin) sebagai antibiotik.

Manik, dkk (2013) menunjukkan bahwa kulit batang tanaman Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) telah dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, glikosida jantung, terpenoid, tanin, dan flavonoid. Penelitian ini membandingkan efek antioksidan, antimikroba dan trombolitik dari ekstrak kulit batang dan daun kayu jawa. Setelah skrining fitokimia, fraksi etanol dari kulit batang dan daun kayu jawa dipartisi dengan pelarut polaritas yang berbeda. Dalam penelitian ini diduga kayu jawa memiliki sifat antibakteri.

Venkata 2010 melaporkan kulit batang kayu jawa memiliki potensi antikanker. Selain itu, studi farmakologi dari penelitian Alam, dkk (2012) juga telah dilaporkan bahwa ekstrak metanol kulit batang Kayu Jawa memiliki aktivitas biologis seperti antibakteri, antioksidan, analgesik, aktivitas hipotensi, aktivitas penyembuhan luka. Penelitian ini berdasarkan aktifitas antibakteri penghambatan terhadap pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

Prawirodiharjo (2014) dalam penelitiannya tentang hasil penapisan fitokimia melaporkan bahwa ekstrak etanol 70% dan air kulit batang Kayu Jawa mengandung flavonoid, saponin, glikosida, fenol, dan tanin.

Pada tumbuhan, flavonoid sebagai antimikroba dapat membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan dinding sel. Selain itu flavonoid yang bersifat lipofilik dapat merusak membran mikroba. Terpena atau terpenoid memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Mekanismenya tidak sepenuhnya diketahui, akan tetapi diduga senyawa ini bekerja pada pengrusakan membran oleh senyawa lipofilik.

Golongan triterpenoid/steroid merupakan senyawa yang larut dalam pelarut non polar seperti n-heksan, sedangkan senyawa flavonoid dan tanin dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, etil asetat atau pelarut polar lainnya.

Flavonoid umumnya lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar dikarenakan memiliki ikatan dengan gugus gula (Markham, 1988). Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air dan senyawa aktifnya dapat diekstraksi dengan etanol 70%.

Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antimikroba. Golongan fenolik ini diduga menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab menghambat pertumbuhan mikroba uji. Meskipun komponen senyawa fenol sendiri masih tergolong luas, sehingga belum dapat dipastikan senyawa spesifik apa yang memiliki aktivitas mikroba. Cara kerja senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein sel, senyawa flavonoid diduga mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi.

Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan dari reaksi penurunan dari terpena atau skualena. Mekanisme kerja antibakteri senyawa steroid yaitu dengan cara merusak membran sel bakteri.

Aktivitas antimikroba senyawa fenolik adalah dengan merusak lipid pada membran plasma mikroorganisme sehingga menyebabkan isi sel keluar.

Dalam proses pengerjaannya, pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi adalah pelarut metanol demi keamanan penarikan senyawa baik senyawa yang bersifat polar atau pun senyawa yang bersifat non polar dari sampel uji kulit batang kayu jawa. Kemudian dalam tahap partisi, dilakukan proses partisi cair padat dengan menggunakan pelarut n-heksan, sehingga diperoleh dua jenis partisi yakni partisi larut n-heksan dan partisi tidak larut n-heksan. Hasil partisi tersebut kemudian dipilih partisi tidak larut heksan untuk dilanjutkan ke tahap fraksinasi. Sebelum melakukan tahap fraksinasi, terlebih dahulu dilakukan proses elusi senyawa menggunakan metode kromatografi lapis tipis sehingga diperoleh perbandingan eluen etil : metanol, 10 : 1. Pada tahap fraksinasi, diperoleh 16 jenis fraksi dan berdasarkan hasil penggabungan fraksi hanya diperoleh 7 jenis fraksi.

Dalam proses penelitian selanjutnya pengujian menggunakan isolat bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv, sampel kulit batang kayu jawa digunakan untuk menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*. Hasil dari tahap pengujian ini menunjukkan bahwa untuk kontrol negatif (-) dengan perlakuan penambahan DMSO terdapat pertumbuhan bakteri, untuk kontrol negatif (+) dengan perlakuan penambahan obat isoniazid tidak terdapat pertumbuhan bakteri. Sedangkan untuk 10 sampel yang diujikan dan diamati

menggunakan mikroskop hanya 1 fraksi yang terlihat jelas penampakan pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* dan fraksi yang lain tidak terlihat jelas penampakan pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

Berdasarkan hasil uji penghambatan pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* dapat disimpulkan bahwa 9 fraksi memiliki aktifitas sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* yang ditandai tidak tumbuhnya *cord* dibandingkan kontrol negatif. Sedangkan 1 fraksi memiliki pertumbuhan *cord* yang sedikit dibanding kontrol negatif.

Menurut Jamaluddin Mahran dalam bukunya Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan, bahwa ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang menurunkan hujan dari awan, lantas mengeluarkan tumbuhan dari berbagai jenis, menumbuhkan tanaman, lalu mengistimewakan salah satu organ tubuhnya yakni daun untuk menjadi piranti penghasil zat hijau yang penting untuk memasak bahan makanan. Perhatikanlah keteraturan dan keindahan buahnya, bagaimana ia diciptakan sampai matangnya, bagaimana ia disempurnakan bentuknya yang beraneka (Mahran, 2005).

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit ada obatnya, jika benar obat yang digunakan dapat melawan penyakit yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh” (HR. Bukhari) (Mahmud, 2007: 13-14)

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya Semua Penyakit Ada Obatnya, prinsip pengobatan didalam penyembuhan penyakit ala Rasulullah saw. diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan. Rasulullah saw. mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah swt. yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang menyembuhkannya. Jika kita menginginkan kesembuhan dari Allah swt. maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhai oleh Allah swt. karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh kita (Muadzin, 2009).

Jadi, setiap penyakit yang diturunkan Allah swt pasti ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya, akan tetapi Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Pengobatan hukumnya mubah (dibolehkan) karena hal ini telah dilakukan oleh pemimpin kita Rasulullah Muhammad swa, sehingga sama sekali tidak perlu dipersoalkan untuk dilakukannya pengobatan (Shihab, 2009). Bahkan, seandainya tidak ada perintah rinci dari hadis tentang keharusan berobat, prinsip-prinsip pokok yang diangkat dari Al-Quran dan hadist cukup untuk dijadikan dasar dalam

upaya kesehatan dan pengobatan. Untuk itu, anjuran terhadap umat islam dalam menjaga kesehatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisi dan fraksi memiliki aktifitas sebagai inhibitor pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* yang ditandai tidak tumbuhnya *cord* dibandingkan kontrol negatif. Sedangkan 1 fraksi memiliki pertumbuhan *cord* yang sedikit dibanding kontrol negatif. Secara umum, semua sampel memiliki aktifitas menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*.

B. Saran

Perlunya dilakukan penelitian kuantitatif lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efektivitas hasil fraksi kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) dengan menentukan nilai MIC (Minimum Inhibitory Concentration) dan sensitivitas fraksi teraktif terhadap *Mycobacterium Tuberculosis*.


KEPUSTAKAAN

- Alam, B., Hussain, S., Habib, R., Rea, J., & Islam, A. (2012). Antioxidan and Analgesic Activities of *Lannea coromandelica* Linn. Bark Ekstrak. *International journal Of Pharmacology*, 8(4), 224-233. doi:10.3923/ijp.2012.224.233
- Alam, M. B., Kwon, K.-R., Lee, S.-H., & Lee, S.-H. (2017). *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway. *18*(266), 1-18. doi:10.3390/ijms18020266
- Division of Applied Bioscience; et al. (2000). Dihydroflavonols from *Lannea coromandelica*. *Journal Of Phytochemistri*, 901-907.
- Dokter Paru Indonesia, P. (2012). Tuberkulosis. *Pedoman diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*.
- Health Organization, W. (2011). Drug-Resistant Tuberculosis in south-east asia region. *Status Report*.
- Health Organization;. (2016). *Global Tuberculosis Report*. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Islam, M. T., & Tahara, S. (2000). Dihydroflavonols from *Lannea coromandelica*. *Phytochemistri*, 54, 901-907.
- Karakousis, A. (2012). Old and New TB Drugs : Mechanisms of Action and Resistance, Understanding Tuberculosis. (D. P. Cardona, Ed.)
- Kaur, R., Jaiswal, M. L., & Jain, V. (2013). Protective effect of *Lannea coromandelica* Houtt. Merrill. against three common pathogens. *Journal of Ayurveda*, 4(4), 224-227. doi:10.4103/0975-9476.123706
- Kementrian Agama RI, (1989). *Al-Qur'an dan terjemahannya*:572
- Kementerian Kesehatan RI, P. D. (2016). Infodatin. *TUBERCULOSIS Temukan Obati Sampai Sembuh*, ISSN 2442-7659.

- Ködmön, C. (2016, Maret). Handbook on TB laboratory diagnostic methods for the European Union. *European Centre for Disease Prevention and Control*.
- Mahran, J. (2005). *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan dan Obat-obatan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mannan, A., Das, H., Rahman, M., Jesmin, J., Siddika, A., Rahman, M., . . . Rahmatullah, M. (2010). Antihyperglycemic Activity Evaluation of *Leucas Aspera* (Willd.) Link Leaf and Stem and *Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr. Bark Extract in Mice. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 4(3), 385-388.
- Mozer, H. (2015). *Antifungal Activity Test of ethanol extract 96% stem bark of kayu jawa (Lannea coromandelica) Against Aspergillus niger, Candida albicans, and Trichophyton rubrum* (Vol. Skripsi). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muadzlin, M. d. (2009). *Semua Penyakit ada Obatnya, Menyembuhkan Penyakit Ala Rasulullah*. Jakarta: Mutiara Medika.
- Organization, W. H. (2016). Global Tuberculosis Report. (I. Law, Ed.) *Global Action And Investments Fall Far Short Of Those Needed To End The Global TB Epidemic*, ISBN 978 92 4 156539 4, 12.
- Rahmadani, F. (2015). *Skripsi Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Kulit Batang Kayu Jawa (Lannea coromandelica) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Pseudomonas*. Jakarta, Indonesia: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rao, V. S., Einstein, J. W., & Das, K. (2014). Hepatoprotective and antioxidant activity of *Lannea coromandelica* Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats. *International Letters of Natural Sciences*, 3, 30-43.
- Reddy, A. K., Joy, J. M., & Kumar, C. A. (2011). Review Article *Lannea coromandelica*: The Researcher's Tree. *Journal Of Pharmacy Research*, 4(3), 577-579.
- Ruth A, G. (2012). The Evaluation Of Antibiotics Using Kirby Bauer Disk Diffusion Method.
- Saputra, A. (2015). *Anti-inflammatory Activity Assay Toward Ethanol 96% Extract of Java Wood Bark (Lannea coromandelica) with Human Red*

- Blood Cell Stabilization In vitro* (Vol. Skripsi). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. Volume 3). Jakarta: Lentera Hati.
- Steenis, V. (2006). Flora.
- Unissa, A. D. (2016). Molecular mechanism of action, resistance, detection to the first-line anti tuberculosis drugs: Rifampicin and pyrazinamide. *Centre for Biomedical Informatics, National Institute for Research in Tuberculosis*.
- Unissa, A. S. (2016). Overview on mechanisms of isoniazid action and resistance in Mycobacterium.
- Venkatesan, S., Susindren, P., Balamurugan, V., Sundaresan, A., Rajkumar, K., Vasanthi, K., & Mahalakxmi, K. (2015). Phytochemical Analysis and Antibacterial Activity On Medicinal Plant *Lannea coromandelica* Linn. Bark Extract. *International Journal of Modern Research and Review*, 3(12), 1070-1074.
- Vikrant, A., & M.L., A. (2011). A Review on Anti-Inflammatory Plant Barks. *International Journal of PharmTech Research*, 3(2), 899-908.
- Wahid, A. (2012). *In Vitro Phytochemical and Biological Investigation of Plant Lannea coromandelica (Famili: Anacardiaceae)*. Bangladesh: Thesis to Departemen Pharmacy East West University.
- Walunj, S., Gupta, R., Joshic, S., a, S. S., & Joshi, K. (2015). *Lannea coromandelica* attenuates glucagon and oxyntomodulin mediated cAMP formation in HEK cells stably-expressing human glucagon receptor. *Journal Herbal Medicine*, 112, 1-5. doi:10.1016/j.hermed.2015.06.005
- Weerapreeyakul, N., Junhom, C., Barusrux, S., & Thitimetharoch, T. (2016). Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. and *Diospyros castanea* (Craib) Fletcher. *Chinese Medicine*, 11(19), 1-10. doi:10.1186/s13020-016-0091-z
- Xiao-juan, Y., Shu, H.-m., Chen, G.-y., Ji, M.-h., & Ding, J.-y. (2014). Chemical Constituents from Barks of *Lannea coromandelica*. *Chinese Herbal Medicine*, 6(1), 65-69.


Lampiran 1. Alur Penelitian



Lampiran 2. Skema Proses Ekstraksi Sampel *kayu jawa*




Lampiran 3. Uji kandungan senyawa




Lampiran 4. Uji aktivitas antituberkulosis


a. Pembuatan Media cair *middlebrook 7H9*



b. Isolasi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*



c. Metode MODS



LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran 5. Preparasi sampel



a



b



c



d

keterangan :

- a. Pohon sampel (kayu jawa)
- b. Kulit batang basah kayu jawa
- c. Kulit batang basah kayu jawa
- d. Kulit batang kering kayu jawa

Lampiran 6. Proses ekstraksi kulit batang kayu jawa



a



b



c

keterangan :

- a. Perendaman 1 X 24 jam
- b. Proses Penyarian
- c. Proses Rotary Evaporasi

Lampiran 7. Fraksinasi ekstrak metanol kulit batang kayu jawa



a



b



c



d



e




f

keterangan :


- a. penimbangan silika
- b. penimbangan sampel
- c. pencampuran sampel dan silika
- d. pemberian eluen
- e. proses pemisahan
- f. hasil fraksi


Lampiran 8. Hasil penggabungan fraksi



Etil asetat : metanol (10 : 1)

Lampiran 9. Hasil identifikasi komponen senyawa kulit batang kayu jawa







keterangan :

- a. pereaksi dragendorff
- b. pereaksi wagner
- c. pereaksi Lieberman bouchard
- d. pereaksi mayer
- e. pereaksi FeCl_3
- f. pereaksi AlCl_3

Lampiran 10. Hasil pengujian *Mycobacterium tuberculosis*





keterangan :

- a. Kontrol Negatif
- b. Kontrol Positif
- c. Fraksi A
- d. Fraksi B
- e. Fraksi C
- f. Fraksi D
- g. Fraksi E
- h. Fraksi F
- i. Fraksi G
- j. Ekstrak Metanol
- k. Partisi Tidak Larut Heksan
- l. Partisi Larut Heksan

Lampiran 11. Perhitungan

1. Pembuatan larutan stok fraksi

$$\begin{aligned} 50.000 \text{ bpj} &= 50.000 \text{ mg} / 1.000 \text{ ml} \\ &= 50 \text{ mg} / 1 \text{ ml} \text{ atau } 25 \text{ mg} / 500 \mu\text{l} \end{aligned}$$

Konsentrasi dalam media (2500 bpj/ppm)

$$50.000 (0,05 \text{ ml}) = 2.500 \cdot X$$

$$2.500 = 2.500 X$$

$$X = 1 \text{ ml}$$





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalene, Makassar 90245
Website www.rs.unhas.ac.id Email info@rs.unhas.ac.id Telp: (0411) 581331 Fax: (0411) 581332

Nomor : 3900/UN4.26.3.1/PL.09/2017

10 Agustus 2017

Hal : Keterangan Selesai Pengambilan Data

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nuhidayah Wahid

NIM : 70100113042

Institusi : Farmasi UIN Alauddin

Kode Peneliti : 170602_2

Telah menyelesaikan penelitian di Rumah Sakit Unhas

Terhitung : 20 Juni 2017

Sampel : 1 uji aktivitas anti Mycobacterium tuberculosis terhadap kulit batang kayu jawa

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul

"Skrining Fitokimia Fraksi-Fraksi dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr) sebagai inhibitor Pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Dr. Siti Wahyuni, PhD
NIP. 196612191998032001

RIWAYAT HIDUP



NURHIDAYAH WAHID, lahir pada 17 Oktober 1995 di Galung Tulu Kabupaten Polewali Mandar. Anak ke-empat dari empat bersaudara dan merupakan buah hati dari ayahanda (Alm.) Abd.Wahid dan ibunda (Almh.) Naharah.

Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan dasar pada tahun 2001 di Sekolah Dasar Inpres 064 Kampung Tulu, Kabupaten Polewali Mandar dan tamat pada tahun

2007, kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Tinambung dan tamat pada tahun 2013. Melalui ujian SBMPTN tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar). Menjadi bagian keluarga farmasi angkatan 013 bernama Far13ion.

Penulis memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan keluarga, terutama kedekatan itu terjalin sangat erat dengan ibunda tercinta. Bukan hanya tentang ikatan darah ibu dan anak, melainkan tentang ikatan antardua sahabat.

Penulis memiliki motto dalam hidupnya *the best preparation of tomorrow is do the best today*. Akhir kata, Thank You for Giver Meaning of Love ,, Thank You ALLAH , Thank You for your love, Aba dan Mama .. WASSALAM