

**MATRIKS SIMETRI SEMIDEFINIT NEGATIF DALAM
MENENTUKAN NILAI EIGEN TAK DOMINAN
MENGUNAKAN METODE KUASA INVERS
DENGAN *SHIFT***



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Matematika Jurusan Matematika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**ASMIANTI
NIM. 60600111009**

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2016

Penyusun,

Asmianti

Nim: 60600111009

MOTTO

*Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah,
bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan,
bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan,
bukanlah lulus kalau tidak ada ujian,
dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha”*

*Jaga Sikap, karena banyak hal yang dapat menjatuhkan tapi satu hal
yang benar-benar dapat menjatuhkan adalah sikap sendiri*

Hiduplah dengan sederhana, karena yang hebat
hanya tafsirannya

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk.....

Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan lautan kasih dan sayangnya yang selalu tercurah lewat doa dan pengorbanan yang tulus, Setiap jerih payah dan tetesan bulir keringatmu akan menjadi saksi betapa berharganya pengorbananmu.

Keluarga dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani hari-hariku.

Seluruh Guru dan Dosenku yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu dengan ikhlas kepadaku selama menempuh jenjang pendidikan. Terima kasih atas segala ilmu yang telah Engkau berikan, semoga senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Skripsi dengan judul :”**Matriks Simetri Semidefinit Negatif dalam Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift**” yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Perjalanan dalam meraih pengetahuan selama ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dengan nilai yang tak terhingga. Ketekunan dan keseriusan senantiasa diiringi doa telah mengantarkan penulis untuk mendapatkan semestinya, walaupun tidak seutuhnya. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang diperoleh selama ini adalah perjuangan bersama. Dukungan, semangat dan perhatian yang tulus menjadi embrio semangat baru dalam mengiringi perjalanan penulis untuk menyelesaikan pengembaraan dalam dunia pengetahuan ini. Sejatinya keberhasilan dan kesuksesan ini tidak lepas dari berbagai dukungan dan peran dari berbagai elemen yang terlibat didalamnya.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda **Muhammad Kamil Dg Massikki** dan ibunda **Indo Taang** yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si selaku ketua jurusan Matematika sekaligus pembimbing I dan Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si selaku sekretaris jurusan Matematika UIN Alauddin Makassar sekaligus pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
4. Segenap dosen jurusan Matematika dan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang layak selama penulis melakukan studi.
5. Seluruh keluarga besar penulis, terkhusus dan istimewa untuk kakak-kakakku Adi Firman dan Arianto yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya buat penulis dan adik-adikku Ambo Rappe Dg Mangitte, Alif Dg Manrapi, dan Aisyah sebagai penyemangat penulis.
6. Kakak-kakak iparku Fatmawati dan Ismawati yang ikut memberiku semangat, doa dan materil.
7. Seluruh keponakanku Adnan Bilal Kamil, Muawil Kamil, Ainun Mardiah Kamil, dan Adiba Kamil.
8. Sahabat Selamanya IPA3 yang selalu memberikan nasihat dan dukungan buat penulis.
9. Sahabat seperjuangan Muhammad Ridwan, Kiki Sumarni, Ekawati Umasangadji, Agustini, dan Uliana, Junarsih, Fauziah Lamusa, Fatma Achmad, Wahidah yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan buat penulis.

10. Teman-teman L1MIT (Leader In Math sc1enTech) terkhusus untuk L1MIT 'A' yang telah menjadi teman terbaik dan terhebat bagi penulis.
11. HMJ Matematika, senior maupun junior Matematika UIN Alauddin Makassar yang selama ini memberikan banyak motivasi, dan bantuan bagi penulis.
12. Sahabat-sahabat KKN Reguler Angk ke-50 UIN Alauddin Makassar, Kab. Gowa, kec. Bontonompo Selatan, desa Jipang yaitu Aswan, Dea Trimelya Gela, Sofiati, Asnidar, Andi Rahmayani, Khaerul Ramadhan, Nur Muttaqim, Abu, Hamdan Kurniawan. Bapak dan ibu kepala Desa, segenap tenaga pengajar, warga, staf Desa, serta adik-adik bimbingan di Desa Jipang.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Makassar, November 2016

Penulis

Asmianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv-v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SIMBOL.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah.....	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Matriks dan Operasi Matriks.....	9
1. Matriks	9
2. Penjumlahan Matriks	11
3. Perkalian Matriks dengan Skalar	12
4. Perkalian Dua Matriks.....	13
5. Transpose Suatu Matriks.....	15
6. Determinan Matriks	18

B. Jenis-jenis Matriks	22
C. Nilai Eigen	29
D. Dekomposisi- <i>LU</i>	32
E. Matriks Simetri Definit Negatif dan Semidefinit Negatif.....	39
F. Vektor Hampiran Awal	43
G. Metode Kuasa Invers dengan <i>Shift</i>	43
H. Analisis Galat	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis Penelitian.....	48
C. Prosedur Penelitian.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

DAFTAR SIMBOL

A	:	Matriks A
B	:	Matriks B
L	:	Matriks Segitiga Bawah (<i>Lower Triangular</i>)
U	:	Matriks segitiga Atas (<i>Upper Triangular</i>)
λ	:	Nilai Eigen
Det	:	Determinan
Σ	:	Penjumlahan berurutan
a_{ij}	:	Elemen matriks A pada baris i dan kolom j
l_{ij}	:	Elemen matriks L pada baris i dan kolom j
u_{kj}	:	Elemen matriks U pada baris k dan kolom j
+	:	Penjumlahan
\times	:	Perkalian
\div	:	Pembagian
-	:	Pengurangan
\leq	:	Tanda lebih kecil atau sama dengan
s	:	Nilai <i>shift</i>

\mathbf{A}' : Matriks \mathbf{A} transpose

$||$: Nilai Mutlak

\mathbf{x} : vektor

ABSTRAK

Nama : Asmianti

Nim : 60600111009

Judul : **Matriks Simetri Semidefinit Negatif dalam Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan dengan Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift**

Penelitian ini membahas matriks semidefinit negatif yang berbentuk simetri $n \times n$ dengan entri-entri bilangan real. Dalam matriks semidefinit negatif \mathbf{A} yang berukuran $n \times n$ dikenal istilah nilai eigen tak dominan. Nilai eigen dari suatu matriks semidefinit negatif \mathbf{A} dikatakan nilai eigen tak dominan \mathbf{A} jika nilai mutlaknya paling kecil dibandingkan dengan nilai mutlak nilai-nilai eigen yang lainnya. Dalam mencari nilai eigen tak dominan dari suatu matriks semidefinit negatif \mathbf{A} yang berukuran $n \times n$ dapat menggunakan Metode Kuasa Invers dengan *shift*. Nilai *shift* tersebut dapat diperoleh dari penerapan teorema *Gerschgorin*. Adapun untuk pendekatan nilai eigen tak dominannya dapat digunakan *Kuosien Rayleigh*. Hasil yang didapatkan dengan matriks yang berukuran 4×4 yaitu:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*, diperoleh nilai eigen tak dominannya yaitu $\lambda = -0,168$


Kata Kunci : *nilai eigen tak dominan, matriks semidefinit negatif, Metode Kuasa Invers dengan shift, teorema Gerschgorin, Kuosien Rayleigh.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2016

Penyusun,



Asmianti

Nim: 60600111009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Matriks Simetri Semidefinit Negatif dalam Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift”, yang disusun oleh Saudari **Asmianti**, Nim: **60600111009** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal **06 Februari 2017 M**, bertepatan dengan **09 Jumadil Awal 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 06 Februari 2017 M
09 Jumadil Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Munaqisy II	: Nur Aeni, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempelajari matematika yang sesuai dengan paradigma *ulul albab*, tidak cukup hanya berbekal kemampuan intelektual semata, tetapi perlu didukung secara bersamaan dengan kemampuan emosional dan spiritual. Pola pikir deduktif dan logis dalam matematika juga bergantung pada kemampuan intuitif dan imajinatif serta mengembangkan pendekatan rasionalis, empiris, dan logis. ¹ Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surat Shaad (38:29) yang berbunyi:

كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”. ²

Sumber studi matematika, sebagaimana sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, adalah konsep tauhid, yaitu ke-Esaan Allah Swt.. Namun, Al-Qur’an tidak mengangkat metode baru atau teknik baru dalam masalah ini, melainkan telah menunjukkan tentang adanya eksistensi dari sesuatu yang ada di balik alam

¹ Abdusysyakir, *Ketika Kyai Mengajar Matematika*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 24.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Depok: Pustaka Alfatih, 2009), h. 455.

semesta dengan cara yang sama seperti yang ia tunjukkan mengenai eksistensi dari alam semesta itu sendiri.³

Kata *mubarakun* terambil dari kata *barkah* bermakna sesuatu yang mantap juga berarti kebajikan yang melimpah dan beraneka ragam serta berkesinambungan. Kolam dinamai *birkah*, karena air yang ditampung dalam kolam itu menetap mantap di dalamnya, tidak tercecer kemana-mana. Keberkahan Ilahi datang dari arah yang sering kali tidak diduga atau dirasakan secara material dan tidak pula dapat dibatasi atau bahkan diukur. Dari sini segala penambahan yang tidak terukur oleh indra dinamai *berkah*.

Kata *al-albab* adalah bentuk jamak dari *lubb* yaitu saripati sesuatu. Kacang misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai *lubb*. *Ulul Albab* adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Yang merenungkan ayat-ayat Allah dan melaksanakan diharapkan dapat terhindar dari siksa, sedang yang menolaknya pasti ada kerancuan dalam berpikirnya.⁴

Secara umum beberapa konsep dari disiplin ilmu telah dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya informasi mengenai matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Matematika juga merupakan ilmu yang tidak terlepas dari agama. Pandangan ini dengan jelas dapat

³ Afzalur Rahman, *Al Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 92.

⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran)* volume 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.137-138.

⁵ Hairur Rahman, *Indahnya Matematika dalam Al-Quran*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 1.

diketahui kebenarannya dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan matematika, diantaranya adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai bilangan, operasi bilangan dan adanya perhitungan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam surat Maryam (19:94) yang berbunyi:

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti”.⁶

Maksud dari ayat tersebut keagungan Allah Swt. Yang Maha Esa telah mengetahui keadaan, kebutuhan, dan keinginan mereka dengan rinci baik sebelum hadir di pentas jagad raya dan telah menghitung mereka dengan hitungan yang teliti sehingga Allah Swt. penuhi semua kebutuhannya dan setiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri dalam keadaan hina dina tanpa anak, harta dan pembantu.

Ayat di atas dilukiskan oleh Allah Swt. sebagai *ahshahum* atau dalam istilah hadits *Asma' al-Husna* adalah *al-Muhshi*, dipahami oleh banyak ulama sebagai “ Dia yang mengetahui kadar setiap peristiwa dan rinciannya, baik apa yang terjangkau oleh makhluk maupun yang mereka tidak dapat jangkau, seperti hembusan nafas, rincian perolehan rezeki dan kadarnya untuk masa kini dan mendatang”. Alhasil, Allah adalah Dia yang mengetahui dengan amat teliti rincian segala sesuatu dari segi jumlah dan kadarnya, panjang dan lebarnya, jauh dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 311

dekatnya, tempat dan waktunya, kadar cahaya dan gelapnya, sebelum, sedang/ketika dan saat wujudnya dan lain-lain sebagainya.⁷

Ayat tersebut jelaslah pasti ada kajian Al-Quran dalam perspektif matematikanya karena berkaitan dengan hitungan yang teliti. Di dalam kehidupan, sering dijumpai masalah-masalah yang membutuhkan perlakuan khusus. Hal tersebut dimaksudkan untuk keperluan penyajian dan pencarian metode penyelesaiannya. Salah satu bentuk penyajiannya adalah dengan menyusun item-item dalam bentuk baris dan kolom, yang biasanya disebut dengan matriks. Sebuah matriks $n \times n$ dapat ditentukan nilai eigennya. Dimana nilai eigen dominan hanya dapat dikatakan jika ada satu nilai eigen mutlak yang paling besar dibandingkan dengan nilai mutlak dari nilai-nilai eigen lainnya. Sedangkan nilai eigen tak dominan yaitu jika ada satu nilai eigen mutlak yang paling kecil dibandingkan dengan nilai mutlak dari nilai-nilai eigen lainnya.

Nilai eigen suatu matriks dapat ditentukan dengan menggunakan suatu metode kuasa. Sedangkan nilai eigen yang tak dominan dapat ditentukan dengan menggunakan invers dari metode kuasa tersebut, dimana matriks yang digunakan dicari inversnya. Metode ini disebut metode kuasa invers. Nilai eigen juga dapat ditentukan dengan menggunakan nilai *shift*. Nilai *shift* adalah nilai pendekatan dari nilai eigen tak dominan.⁸

⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran)* volume 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 256.

⁸ Yuli Andriani, *Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Definit Negatif menggunakan Metode Kuasa Invers dengan shift*, Jurnal Penelitian Sains Vol. 14 No. 1(A). 2011., h. 1

Sebuah penelitian sains oleh Yuli Andriani, dalam penelitiannya bahwa Nilai *shift* dan galat masukan sangat berpengaruh terhadap nilai eigen tak dominan yang dihasilkan. Penggunaan metode Kuasa Invers dengan *shift* untuk menentukan nilai eigen tak dominan suatu matriks definit negatif akan lebih baik jika nilai *shift* yang diperkirakan sangat mendekati nilai eigen tak dominan. Matriks definit negatif dapat ditentukan nilai eigennya dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*.

Dari penelitian tersebut penulis bermaksud mengembangkan penelitian sebelumnya dimana metode kuasa invers dengan *shift* berlaku untuk matriks simetri definit positif dan simetri definit negatif dengan ukuran 3×3 . Penulis tertarik mengembangkan penelitian tersebut menggunakan matriks simetri semidefinit negatif, apakah masih dapat ditentukan nilai eigennya dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift* tersebut dengan ukuran matriks lebih besar yaitu 4×4 . Sehingga penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu "***Matriks Simetri Semidefinit Negatif dalam Menentukan Nilai Eigen tak Dominan Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana menentukan nilai eigen tak dominan suatu matriks semidefinit negatif dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan nilai eigen tak dominan matriks diagonal semidefinit negatif dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penulisan ini adalah:

1. Bagi Penulis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ialah sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti proses perkuliahan serta memperdalam pemahaman penulis mengenai materi matriks simetri semidefinit negatif dalam menentukan nilai eigen tak dominan dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*.

2. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan UIN Alauddin Makassar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan umum sebagai panduan untuk penyusunan skripsi berikutnya.

3. Bagi Pembaca

Tulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang nilai eigen tak dominan dan memberikan pengetahuan tentang penggunaan metode kuasa invers dengan *shift* pada penentuan nilai eigen tak dominan matriks semidefinit negatif.

E. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini dibatasi pada masalah nilai eigen tak dominan

pada matriks simetri semidefinit negatif $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ dan

menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal tugas akhir, bagian isi tugas akhir, dan bagian akhir tugas akhir.

1. Bagian awal tugas akhir

Bagian awal proposal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, dan daftar isi.

2. Bagian isi tugas akhir

Bagian isi proposal terbagi menjadi tiga bab, yaitu:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang mendasari dalam teori yang dikaji yaitu Matriks, Nilai Eigen, dan mencari Nilai eigen tak dominan dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini dikemukakan waktu penelitian, jenis penelitian, dan prosedur pelaksanaan penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian dalam menentukan nilai eigen tak dominan dari matriks semidefinit negatif dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift*.

e. Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir tugas akhir

Bagian akhir tugas akhir berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-lampiran yang mendukung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Matriks dan Operasi Matriks

1. Matriks

Matriks merupakan suatu susunan angka yang berbentuk segiempat yang diatur dalam baris dan kolom. Angka-angka dalam susunan itu disebut anggota dalam matriks. Ukuran matriks dinyatakan oleh jumlah baris dan jumlah kolom terdapat di dalamnya.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Susunan di atas disebut matriks m kali n (ditulis $m \times n$) karena memiliki m barisan dan n kolom. Sebagai aturan, kurung siku [], kurung biasa () atau bentuk $\| \quad \|$ digunakan untuk mengurungi susunan persegi panjang dari bilangan-bilangan tersebut.⁹

Suatu matriks yang hanya mempunyai satu baris dinamakan suatu matriks baris (vektor baris) sedangkan suatu matriks yang hanya mempunyai satu kolom dinamakan suatu matriks kolom (vektor kolom).¹⁰

⁹G.Hadley, *Aljabar Linear* (Jakarta: erlangga, 1983), h. 51.

¹⁰ Murray, *Matematika Lanjutan untuk Para Insinyur dan Ilmuwan*, (Jakarta: Erlangga, 1971), h. 363.

Contoh 2.1. Matriks

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

tetapi,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ 8 & 10 \\ 9 \end{bmatrix}$$

bukan matriks karena bukan susunan persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Matriks lazimnya akan dinotasikan dengan sebuah huruf besar yang dicetak tebal (**A**, **B**, dan seterusnya), dan elemen-elemen dinotasikan dengan huruf kecil yang dicetak miring (a_{ij} , b_{ij} dan seterusnya) kecuali kalau digunakan bilangan-bilangan khusus, dapat ditulis:

$$\mathbf{A} = \|a_{ij}\| = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Dapat dilihat lambang \mathbf{A} , $\|a_{ij}\|$ tidak menunjukkan berapa baris atau kolom yang dimiliki oleh matriks. Ini harus diketahui dari sumber-sumber lainnya. Jika hanya elemen istimewa a_{ij} dari matriks yang ditunjukkan menggunakan $\|a_{ij}\|$ daripada (a_{ij}) atau $[a_{ij}]$. Notasi terakhir tidak menunjukkan secara jelas apakah sebuah matriks yang dicantumkan atau dikurung ditempatkan sekitar sebuah elemen tunggal. Kurung siku akan digunakan untuk mengurungi

matriks yang mempunyai paling sedikit dua baris dan dua kolom. Kurung biasa akan digunakan untuk mengurungi sebuah matriks yang terdiri atas satu baris.¹¹

2. Penjumlahan Matriks

Definisi 2.1

Dua buah matriks \mathbf{A} dan \mathbf{B} dikatakan “sama” jika \mathbf{A} dan \mathbf{B} mempunyai ukuran (ordo) yang sama dan elemen-elemen bersesuaian sama, yaitu apabila $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ dan $\mathbf{B} = [b_{ij}]$, maka $a_{ij} = b_{ij}$ untuk $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

Definisi 2.2

$\mathbf{A} = [a_{ij}]$ dan $\mathbf{B} = [b_{ij}]$, adalah dua matriks dengan ukuran sama, maka $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ adalah matriks yang didapat dengan menambahkan/menjumlahkan elemen-elemen \mathbf{A} dan \mathbf{B} yang bersesuaian, yaitu $\mathbf{A} + \mathbf{B} = [a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$.¹²

Sifat-sifat penjumlahan matriks:

1. Komutatif : $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
2. Asosiatif : $\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$
3. Identik : $\mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{O} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$

¹¹ G.Hadley, *Aljabar Linear*, h. 52

¹² R.Gunawan Santosa, *Aljabar Linear Dasar*, (Yogyakarta: Andi, 2008), h. 25.

Contoh 2.2. Penjumlahan matriks

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 9 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 8 & 0 & 4 \\ 6 & 7 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Hasil untuk matriks $\mathbf{A} + \mathbf{B}$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 9 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 7 & 12 & 4 \\ 6 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Hasil untuk matriks $\mathbf{A} + \mathbf{C}$

$$\mathbf{A} + \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 8 & 0 & 4 \\ 6 & 7 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \text{tidak terdefinisi.}$$

Sama halnya dengan $\mathbf{B} + \mathbf{C}$ tidak terdefinisi karena ordo (ukuran) matriks \mathbf{A} dengan \mathbf{C} berbeda dan ordo (ukuran) matriks \mathbf{B} dengan \mathbf{C} berbeda.

3. Perkalian Matriks dengan Skalar

Bila diberikan sebuah matriks \mathbf{A} dan sebuah skalar λ , hasil kali λ dan \mathbf{A} , di definisikan sebagai

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Setiap elemen dari \mathbf{A} dikalikan dengan skalar λ . Hasil kali $\lambda\mathbf{A}$ adalah sebuah matriks lain yang mempunyai m baris dan n kolom jika \mathbf{A} mempunyai m baris dan n kolom. Dapat ditulis: $\lambda\mathbf{A} = \|\lambda a_{ij}\| = \|a_{ij}\lambda\| = \mathbf{A}\lambda$.¹³

Contoh 2.3. Perkalian matriks dengan skalar

Misalkan diberikan

$$\lambda = 4, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Hasil dari } \lambda\mathbf{A} = 4 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.2 & 4.0 \\ 4.8 & 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 32 & 4 \end{bmatrix}$$

4. Perkalian Dua Matriks

Perkalian antara dua matriks dapat terdefinisi jika banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Pandang matriks $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ berukuran $m \times n$ dan matriks $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ yang berukuran $n \times r$. Maka hasil kali \mathbf{AB} didefinisikan sebagai matriks $\mathbf{C} = [c_{ij}]$ yang berukuran $m \times r$, dimana elemen $[c_{ij}]$ diperoleh dengan rumus

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \quad \text{dimana } i = 1, \dots, m \quad ; j = 1, \dots, r$$

dalam hasil kali matriks \mathbf{AB} , \mathbf{A} disebut pengali dengan dan \mathbf{B} pengali belakang. Hasil kali \mathbf{AB} ditentukan hanya kalau jumlah kolom di \mathbf{A} sama dengan jumlah baris di \mathbf{B} .¹⁴

¹³ G. Hadley, *Aljabar Linear*, h. 53.

¹⁴ Kartono, *Aljabar Linear, Vektor dan Eksplorasinya dengan Maple*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), hal. 38.

Syarat perkalian matriks

jika matriks **A** berukuran $m \times n$ dan **B** berukuran $p \times q$ maka:

1. Perkalian matriks **AB** berordo $m \times q$ bisa dibentuk hanya jika $n = p$.
2. Perkalian matriks **BA** berordo $p \times n$ bias dibentuk hanya jika $q = m$.
3. **AB** tidak selalu sama dengan **BA**. (walaupun $m = n = p = q$).¹⁵

Contoh 2.4. Perkalian dua matriks

misal diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Hasil dari } \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} [2(4) + 1(3)] & [2(2) + 1(1)] \\ [0(4) + 3(3)] & [0(2) + 3(1)] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$$

Dalam hasil kali matriks **AB**, **A** disebut pengali dan **B** pengali belakang. Hasil kali **AB** ditentukan hanya kalau jumlah kolom di **A** sama dengan jumlah baris di **B**. Selama jumlah kolom di **A** sama dengan baris di **B**, **AB** terdefinisi tanpa perlu mempersoalkan berapa baris **A** atau berapa kolom di **B**. Perkalian matriks tidak memenuhi semua aturan perkalian dari bilangan-bilangan biasa. Salah satu beda yang paling penting ialah kenyataan bahwa pada umumnya perkalian matriks adalah tidak komutatif yaitu **AB** dan **BA** tidak sama (**AB** \neq **BA**).¹⁶

¹⁵ Wikaria Gazali, *Matriks & Transformasi Linear*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.12.

¹⁶ Abdul Azis, *Aljabar Matriks*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 14.

Contoh 2.5. perkalian matriks

$$1. \text{ Misalkan } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 14 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Tetapi \mathbf{BA} tidak dapat didefinisikan karena jumlah kolom \mathbf{B} tidak sama dengan jumlah baris \mathbf{A}

$$2. \text{ Misalkan } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = [3 \quad 4 \quad 2 \quad 5]$$

$$\text{hasil dari } \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} [3 \quad 4 \quad 2 \quad 5] = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 5 \\ 9 & 12 & 6 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{sedangkan hasil dari } \mathbf{BA} = [3 \quad 4 \quad 2 \quad 5] \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = (3 + 12 + 0 + 10) = [25],$$

dengan contoh ini \mathbf{AB} dan \mathbf{BA} terdefinisi, tetapi hasil perkaliannya sama sekali berbeda.

5. Transpose suatu Matriks

Transpose suatu matriks adalah merubah ordo suatu matriks dari $m \times n$ menjadi $n \times m$ jika \mathbf{A}' atau \mathbf{A}^T adalah tranpose dari matriks \mathbf{A} , maka baris pada matriks \mathbf{A} menjadi kolom pada matriks \mathbf{A}' dan sebaliknya kolom pada matriks \mathbf{A} menjadi baris pada matriks \mathbf{A}' .¹⁷

¹⁷ Pudjiastuti, *Matriks Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 4.

Contoh 2.6. Transpose matriks

$$\text{Jika } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{maka } \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{Jika } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{maka } \mathbf{B}' = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Sifat-sifat matriks transpose:

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C})' = \mathbf{A}' + \mathbf{B}' + \mathbf{C}'$
2. $(\mathbf{ABC})' = \mathbf{C}' \mathbf{B}' \mathbf{A}'$
3. $(\mathbf{A}')' = \mathbf{A}$

Contoh 2.7. Sifat-sifat matriks transpose

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C})' = \mathbf{A}' + \mathbf{B}' + \mathbf{C}'$

Misal diberikan matriks berikut:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}) = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\text{Hasil untuk } (\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C})' = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 6 & 6 \\ 4 & 6 & 12 \end{bmatrix}$$

Hasil untuk $\mathbf{A}' + \mathbf{B}' + \mathbf{C}'$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{B}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{C}' = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A}' + \mathbf{B}' + \mathbf{C}' &= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 6 & 6 \\ 4 & 6 & 12 \end{bmatrix} \text{ Terbukti: } (\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C})' = \mathbf{A}' + \mathbf{B}' + \mathbf{C}' \end{aligned}$$

2. $(\mathbf{ABC})' = \mathbf{C}' \mathbf{B}' \mathbf{A}'$

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Mengalikan matriks \mathbf{A} dan \mathbf{B} = $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 12 & 18 \end{bmatrix}$

Mengalikan hasil \mathbf{AB} dan \mathbf{C} = $\begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 94 & 88 \\ 102 & 84 \end{bmatrix}$

$$\text{Hasil untuk } (\mathbf{ABC})' = \begin{bmatrix} 94 & 102 \\ 88 & 84 \end{bmatrix}$$

Hasil untuk $\mathbf{C}'\mathbf{B}'\mathbf{A}'$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{C}' = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{B}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Mengalikan hasil transpose } \mathbf{C}' \text{ dan } \mathbf{B}' = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 24 \\ 4 & 6 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\text{Mengalikan hasil kali } \mathbf{C}'\mathbf{B}' \text{ dengan } \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 24 \\ 4 & 6 & 24 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 94 & 102 \\ 88 & 84 \end{bmatrix}$$

terbukti $(\mathbf{ABC})' = \mathbf{C}'\mathbf{B}'\mathbf{A}'$

3. $(\mathbf{A}')' = \mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 24 \\ 4 & 6 & 24 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 6 & 6 \\ 24 & 24 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{A}')' = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 24 \\ 4 & 6 & 24 \end{bmatrix} \text{ terbukti } (\mathbf{A}')' = \mathbf{A}$$

6. Determinan Matriks

Untuk setiap matriks persegi terdapat suatu bilangan tertentu yang disebut dengan determinan. Determinan merupakan jumlah semua hasil perkalian

elementer yang bertanda dari \mathbf{A} dan dinyatakan dengan $\det(\mathbf{A})$ atau $|\mathbf{A}|$, yang diartikan dengan sebuah hasil perkalian elementer bertanda dari suatu matriks \mathbf{A} .¹⁸

Suatu determinan orde n adalah scalar yang dikaitkan dengan matriks bujur sangkar $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ dimana i dan $j = 1, 2, \dots, n$, yang dituliskan

$$D = \det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Determinan matriks 2×2

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

dinyatakan dengan

$$\det(\mathbf{A}) = |\mathbf{A}| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.^{19}$$

Contoh 2.8. Mencari Determinan dari Matriks 2×2

Carilah determinan dari matriks berikut:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Karena matriks \mathbf{A} adalah matriks yang berukuran 2×2 , maka dapat langsung dihitung determinannya dengan memperkalikan diagonal utamanya dan memperkurangkannya, sehingga diperoleh:

¹⁸ Irwan, *Pengantar Aljabar Linear Elementer*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 201.

¹⁹ Howard Anton, *Elementary Linear Algebra*, (Canada: Simultaneously, 1977), h. 59.

$$\text{Det}(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = (3 \times 5) - (4 \times 2) = 15 - 8 = 7.$$

Pada matriks ukuran 3 x 3

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Dinyatakan dengan,

$$\det|\mathbf{A}| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{32}a_{21} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

Determinan matriks yang lebih besar 3 x 3 biasanya dihitung dengan prosedur yang disebut sebagai perluasan kofaktor (*expansion by cofactor*).

Determinan matriks 3 x 3 di atas dapat ditulis:

$$\begin{aligned} \det|\mathbf{A}| &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Definisi 2.3:

Misalkan M_{ij} menunjukkan matriks $(n - 1) \times (n - 1)$ yang diperoleh dengan jalan menghilangkan baris ke- i dan kolom ke- j dari $\mathbf{A}_{n \times n}$. Determinan $|M_{ij}|$ adalah sebuah minor dari matriks \mathbf{A} . Skalar $C_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$ menunjukkan apa yang

disebut kofaktor atau tanda dari minor elemen dari a_{ij} matriks \mathbf{A} . Matriks $n \times n$ menunjukkan adjoin \mathbf{A} dan dinotasikan dengan $\text{adj } \mathbf{A}$.

Determinan suatu matriks dapat dicari dengan prosedur perluasan kofaktor. Determinan \mathbf{A} dapat diperluas dalam baris i dengan rumus $|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{ij}$ untuk sebarang baris ke- $i = 1, 2, \dots, n$ dan kolom ke- j dengan rumus $|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{ij}$ untuk setiap kolom ke- $j = 1, 2, \dots, n$.

Determinan $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ di atas yaitu

$$|\mathbf{A}| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Dapat ditulis

$$|\mathbf{A}| = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13} = \sum_{j=1}^3 a_{ij} c_{ij}.^{20}$$

Contoh 2.9:

Misalkan diberikan matriks berikut

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \det|\mathbf{A}| &= (1 \times 1 \times 4) + (0 \times 1 \times 1) + (2 \times 2 \times 3) - (2 \times 1 \times 1) - (1 \times 2 \times 1) \\ &\quad - (4 \times 3 \times 0) \end{aligned}$$

²⁰ Jean E Weber, *Analisis Matematik Penerapan Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1999, h.192).

$$= 4 + 0 + 12 - 2 - 2 - 0$$

$$= 12$$

Cara lainnya yaitu dengan memperluas baris pertama:

$$\det|\mathbf{A}| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\det|\mathbf{A}| = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det|\mathbf{A}| = 1(4 - 2) - 0(12 - 1) + 2(6 - 1)$$

$$= 2 - 0 + 10$$

$$= 12$$

B. Jenis-jenis Matriks

1. Matriks Bujur Sangkar

Matriks bujur sangkar adalah matriks yang di mana banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jumlah dari semua entri-entri diagonal utama disebut trace (Tr) dari matriks tersebut.

Contoh 2.10. Matriks bujur sangkar

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \\ 5 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

Jumlah baris = 3, jumlah kolom = 3

Karena jumlah baris dan kolomnya maka matriks **A** disebut matriks bujur sangkar.

Untuk $\text{Tr}(\mathbf{A}) = 3 + 5 + 9 = 17$.

2. Matriks Diagonal

Matriks diagonal adalah suatu matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen diagonal utama sama dengan nol, dan paling tidak satu elemen pada diagonal utamanya tidak sama dengan nol.

Contoh 2.11. Matriks diagonal

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Dari matriks **A**, **B**, dan **C** semua elemen di luar elemen diagonal utamanya sama dengan nol, dan paling tidak ada satu elemen diagonal utamanya tidak sama dengan nol, sehingga matriks **A**, **B**, dan **C** adalah matriks diagonal.

3. Matriks Simetris

Definisi 2.4:

Suatu matriks **A** berorde $n \times n$ disebut simetris jika $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.²¹

Matriks simetris adalah suatu matriks bujur sangkar yang memiliki $a_{ij} = a_{ji}$, sehingga transposenya sama dengan matriks semula.

Contoh 2.12. Matriks simetris

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

²¹ Steven J. Leon, *Aljabar Linear dan Aplikasinya* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 47.

$$\text{maka } \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Matriks Segitiga Atas

Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai nol. Jadi yang tidak sama dengan nol elemen-elemen pada segitiga atasnya dan paling tidak satu elemen pada diagonal utama tidak sama dengan nol.

Contoh 2.13. Matriks Segitiga Atas

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriks \mathbf{A} dan \mathbf{B} adalah matriks segitiga atas, dimana elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan nol, elemen di atas diagonal utamanya tidak sama dengan nol, dan paling tidak dalam diagonal utamanya ada 1 elemen yang tidak sama dengan nol.

Contoh 2.14. Bukan Matriks Segitiga Atas

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriks **A** dan **B** merupakan matriks yang bukan matriks segitiga atas, dimana pada matriks **B** elemen di bawah diagonal utamanya terdapat elemen yang tidak sama dengan nol dan pada matriks **A** elemen diagonal utamanya sama dengan nol.

5. Matriks Segitiga Bawah

Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utama bernilai nol. Jadi yang tidak sama dengan nol adalah elemen-elemen pada segitiga bawahnya, dan paling tidak satu elemen pada diagonal utama tidak sama dengan nol.

Contoh 2.15. Matriks Segitiga Bawah

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 6 & 0 \\ 2 & 8 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks **A** dan **B** adalah matriks segitiga bawah, dimana elemen di atas diagonal utamanya sama dengan nol, elemen di bawah diagonal utamanya tidak sama dengan nol, dan paling tidak dalam diagonal utamanya ada 1 elemen yang tidak sama dengan nol.

Contoh 2.16. Bukan Matriks Segitiga Bawah

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 6 & 0 \\ 2 & 8 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks **A** dan **B** merupakan matriks yang bukan matriks segitiga bawah, dimana pada matriks **B** elemen di atas diagonal utamanya terdapat elemen yang tidak sama dengan nol dan pada matriks **A** elemen diagonal utamanya sama dengan nol.

6. Matriks Identitas

Matriks identitas adalah suatu matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di luar diagonal utamanya sama dengan nol, dan semua elemen pada diagonal utama sama dengan satu. Matriks identitas yang berorde n biasanya diberi simbol \mathbf{I}_n .

Contoh 2.17. Matriks Identitas

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{I}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dari matriks \mathbf{I}_2 , \mathbf{I}_3 adalah matriks identitas dimana elemen diagonal utamanya sama dengan 1 dan semua elemen di luar diagonal utamanya sama dengan nol.

7. Matriks Baris

Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri satu baris. Matriks ini sering disebut dengan vektor baris.

Contoh 2.18. Matriks Baris

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = [1 \quad 4 \quad 2] \quad \mathbf{B} = [2 \quad 5 \quad 0 \quad 3 \quad 6]$$

Matriks **A** dan **B** merupakan matriks baris meskipun terdiri dari beberapa kolom, tapi hanya terdiri dari 1 baris.

8. Matriks Kolom

Matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya terdiri satu kolom. Matriks ini sering disebut dengan vektor kolom.

Contoh 2.19. Matriks Kolom

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriks **A** dan **B** merupakan matriks kolom meskipun terdiri dari beberapa baris, tapi hanya terdiri dari 1 kolom.

9. Matriks Nol

Matriks nol adalah suatu matriks yang semua elemennya bernilai nol. Matriks ini biasanya diberi simbol **O** dan bentuknya tidak selalu bujur sangkar.

Contoh 2.20. Matriks Nol

$$\mathbf{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

10. Matriks Invers

Definisi 2.5:

Jika **A** adalah matriks bujur sangkar, dan jika dapat dicari matriks **B** sehingga $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$, maka matriks **A** dikatakan dapat dibalik (*invertible*) dan **B**

dinamakan invers (*inverse*) dari matriks \mathbf{A} . jika \mathbf{A} dapat dibalik, maka inversnya akan dinyatakan dengan simbol \mathbf{A}^{-1} . Jadi,

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \quad \text{dan} \quad \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

$$\text{Misal : } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix}.^{22}$$

Contoh 2.21. Matriks Invers

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Matriks invers dari \mathbf{A} , maka harus dipenuhi $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$

$$\mathbf{A} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1a + 2c & 1b + 2d \\ 3a + 1c & 3b + 1d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diperoleh suatu sistem persamaan linear:

$$\begin{aligned} 1a + 2c &= 1 & 1b + 2d &= 0 \\ 3a + 1c &= 0 & 3b + 1d &= 1 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan metode eliminasi substitusi, diperoleh:

$$\begin{array}{r} 1a + 2c = 1 \mid \times 1 \mid 1a + 2c = 1 \\ 3a + 1c = 0 \mid \times 2 \mid 6a + 2c = 0 \\ \hline -5a = 1 \end{array}$$

²² Ririen Kusumawati, *Aljabar Linear dan Matriks* (Surabaya:UIN Malang Press, 2009), h. 25.

$$a = -\frac{1}{5}$$

substitusi a ke persamaan $1a + 2c = 1$, sehingga diperoleh

$$1a + 2c = 1 \rightarrow c = \frac{3}{5}$$

$$1b + 2d = 0 \quad |x1| \quad 1b + 2d = 0$$

$$3b + 1d = 1 \quad |x2| \quad \underline{6b + 2d = 2} \quad -$$

$$-5b = -2$$

$$b = \frac{2}{5}$$

substitusi a ke persamaan $1b + 2d = 0$, sehingga diperoleh

$$1b + 2d = 0 \rightarrow d = -\frac{1}{5}$$

$$\text{Jadi, } a = -\frac{1}{5}, b = \frac{2}{5}, c = \frac{3}{5}, d = -\frac{1}{5}$$

Sehingga diperoleh matriks invers dari \mathbf{A} adalah $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$

C. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Definisi 2.6:

Suatu nilai eigen dari suatu matriks \mathbf{A} dinamakan nilai eigen tak dominan dari \mathbf{A} jika nilai mutlaknya lebih kecil dari nilai-nilai eigen yang lainnya, sedangkan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tak dominan dinamakan vektor eigen tak dominan \mathbf{A} .²³

$$\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x}$$

²³Yuli Andriani, *Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Definit Negatif menggunakan Metode Kuasa Invers dengan shift*, 2011, h.4

Keterangan: \mathbf{A} : Matriks \mathbf{A}
 λ : Nilai Eigen
 \mathbf{x} : Vektor Eigen

Nilai Eigen dikali dengan matriks identitas (\mathbf{I}), maka:

$$\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{Ix}$$

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{x} = 0$$

Salah satu cara menentukan nilai eigen tak dominan apabila aproksimasi terhadap vektor eigen tak dominan telah diketahui dengan menggunakan nilai bagi Rayleigh untuk suatu matriks simetris yaitu jika \mathbf{x} adalah sebuah vektor eigen dari matriks \mathbf{A} dan bersesuaian dengan nilai eigen maka

$$\lambda = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{Ax} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$$

Hasil bagi ini disebut *Kuesien Rayleigh*.

Keterangan: \mathbf{A} : Matriks \mathbf{A}
 λ : Nilai Eigen
 \mathbf{x} : Vektor Eigen

Contoh 2.22. Nilai eigen dan vektor eigen

Misalkan diberikan matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

Nilai eigen dari matriks \mathbf{A} adalah

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = 0$$

$$\left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \right) \mathbf{x} = 0$$

$$\left(\begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \right) \mathbf{x} = 0$$

Untuk memenuhi nilai λ yang scalar berlaku:

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$((\lambda - 1)(\lambda - 4)) - ((-2)(1)) = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

$$\lambda = 2 \text{ dan } \lambda = 3$$

sehingga nilai-nilai eigen dari \mathbf{A} adalah 1 dan 2.

Dari contoh 2.22 didapatkan nilai eigen tak dominannya yaitu 2, dimana 2 adalah nilai mutlak terkecil dari nilai-nilai eigen lainnya.

Untuk vektor eigennya

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{x} = 0$$

$$\left(\begin{bmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ -1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \right) \mathbf{x} = 0$$

$$\left(\begin{bmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ -1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

Untuk nilai $\lambda = 2$, maka:

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Terbentuk system persamaan linear:

$$x_1 + 2x_2 = 0$$

$$-x_1 - 2x_2 = 0$$

Sehingga diperoleh

$$x_1 = -2 \text{ dan } x_2 = 1$$

Untuk nilai $\lambda = 3$, maka:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Terbentuk system persamaan linear:

$$2x_1 + 2x_2 = 0$$

$$-x_1 - x_2 = 0$$

Sehingga diperoleh

$$x_1 = 1 \text{ dan } x_2 = -1$$

D. Dekomposisi-LU

Definisi 2.7:

Sebuah faktorisasi matriks \mathbf{A} kuadrat seperti $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, dimana \mathbf{L} adalah matriks segitiga bawah dan \mathbf{U} matriks segitiga atas dikatakan sebuah dekomposisi \mathbf{LU} .²⁴

Matriks dapat difaktorkan (diuraikan atau didekomposisikan) menjadi matriks segitiga bawah \mathbf{L} dan matriks segitiga atas \mathbf{U} . Biasa ditulis dengan rumus umum:

$$\mathbf{A} = \mathbf{LU}.$$

Komposisi matriks \mathbf{L} dan \mathbf{U} dalam bentuk ini dikenal sebagai metode crout. Cara mendapatkan \mathbf{L} dan \mathbf{U} dengan metode crout adalah sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & 1 & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

²⁴ Yuli Andriani, *Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Definit Negatif menggunakan Metode Kuasa Invers dengan shift*, h.4

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}^{25}$$

Contoh 2.23

misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk matriks \mathbf{L} dan matriks \mathbf{U} terlebih dahulu.

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \text{ dan } \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya adalah memperkalikan matriks \mathbf{L} dan matriks \mathbf{U} dengan hasilnya adalah matriks \mathbf{A} ,

$$[\mathbf{L}] \times [\mathbf{U}] = [\mathbf{A}]$$

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari elemen-elemen matriks \mathbf{L} dan matriks \mathbf{U} .

²⁵ Buyung Kosasih, *Komputasi Numerik Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), h. 61.

- Untuk baris pertama perkalian matriks \mathbf{L} dan matriks \mathbf{U} , maka diperoleh nilai-nilai yaitu:

- $l_{11} \times 1 = 2$

diperoleh nilai $l_{11} = 2$

- $l_{11} \times u_{12} = -3$

diperoleh nilai $u_{12} = -\frac{3}{l_{11}} = -\frac{3}{2}$

- $l_{11} \times u_{13} = 4$

diperoleh nilai $u_{13} = \frac{4}{l_{11}} = \frac{4}{2} = 2$

- Untuk baris kedua perkalian matriks matriks \mathbf{L} dan matriks \mathbf{U} , maka diperoleh nilai sebagai berikut:

- $l_{21} = 0$

- $(l_{21} \times u_{12}) + (l_{22} \times 1) = 5$

diperoleh nilai l_{22} yaitu:

$$l_{22} = 5 - l_{21} \times u_{12}$$

$$l_{22} = 5 - \left(0 \times \left(-\frac{3}{2}\right)\right)$$

$$l_{22} = 5 - 0$$

$$l_{22} = 5$$

- $(l_{21} \times u_{13}) + (l_{22} \times u_{23}) = 6$

diperoleh nilai u_{23} yaitu:

$$u_{23} = \frac{6 - l_{21} \times u_{13}}{l_{22}}$$

$$u_{23} = \frac{6 - (0 \times 2)}{5}$$

$$u_{23} = \frac{6}{5}$$

- Untuk baris ketiga perkalian matriks matriks \mathbf{L} dan matriks \mathbf{U} , maka diperoleh nilai sebagai berikut:

- $l_{31} \times 1 = -5$
- $(l_{31} \times u_{12}) + (l_{32} \times 1) = 3$

diperoleh nilai l_{32} yaitu:

$$l_{32} = 3 - l_{31} \times u_{12}$$

$$l_{32} = 3 - \left((-5) \times \left(-\frac{3}{2} \right) \right)$$

$$l_{32} = 3 - \frac{15}{2}$$

$$l_{32} = \frac{6-15}{2}$$

$$l_{32} = -\frac{9}{2}$$

- $(l_{31} \times u_{13}) + (l_{32} \times u_{23}) + l_{33} = 1$

diperoleh nilai l_{33} yaitu:

$$l_{33} = 1 - (l_{31} \times u_{13}) - (l_{32} \times u_{23})$$

$$l_{33} = 1 - (-5 \times 2) - \left(-\frac{9}{2} \times \frac{6}{5} \right)$$

$$l_{33} = 1 - (-10) - \left(-\frac{54}{10} \right)$$

$$l_{33} = 11 + \frac{54}{10}$$

$$l_{33} = \frac{110+54}{10}$$

$$l_{33} = \frac{164}{10} = \frac{82}{5}$$

$$\mathbf{L U} = \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ -5 & -\frac{9}{2} & \frac{82}{5} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Cara lainnya yaitu dengan cara mencari jejak dari semua pengali, misalkan

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Baris pertama untuk semua kolom dikalikan dengan $\frac{1}{2}$.

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 5 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ Baris ke-3, untuk semua kolom pada baris pertama dikalikan}$$

dengan 5 dan dijumlahkan dengan baris ketiga pada masing-masing kolom.

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & -\frac{9}{2} & 11 \end{bmatrix}$$

Baris ke-2 untuk semua kolom dikalikan dengan $\frac{1}{5}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} \\ 0 & -\frac{9}{2} & 11 \end{bmatrix}$$

Baris ke-3, untuk semua kolom pada baris kedua dikalikan dengan $\frac{9}{2}$ dan

dijumlahkan dengan baris ketiga pada masing-masing kolom.

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & \frac{82}{5} \end{bmatrix}$$

semua kolom pada baris ketiga dikalikan dengan $\frac{5}{82}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ terbentuk matriks U}$$

Untuk matriks L didapat

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

- $l_{11} \times 1 = 2$

diperoleh nilai $l_{11} = 2$

- $l_{21} = 0$

- $(l_{21} \times u_{12}) + (l_{22} \times 1) = 5$

diperoleh nilai l_{22} yaitu:

$$l_{22} = 5 - l_{21} \times u_{12}$$

$$l_{22} = 5 - \left(0 \times \left(-\frac{3}{2}\right)\right)$$

$$l_{22} = 5 - 0$$

$$l_{22} = 5$$

- $l_{31} \times 1 = -5$
- $(l_{31} \times u_{12}) + (l_{32} \times 1) = 3$

diperoleh nilai l_{32} yaitu:

$$l_{32} = 3 - l_{31} \times u_{12}$$

$$l_{32} = 3 - \left((-5) \times \left(-\frac{3}{2} \right) \right)$$

$$l_{32} = 3 - \frac{15}{2}$$

$$l_{32} = \frac{6-15}{2}$$

$$l_{32} = -\frac{9}{2}$$

- $(l_{31} \times u_{13}) + (l_{32} \times u_{23}) + l_{33} = 1$

diperoleh nilai l_{33} yaitu:

$$l_{33} = 1 - (l_{31} \times u_{13}) - (l_{32} \times u_{23})$$

$$l_{33} = 1 - (-5 \times 2) - \left(-\frac{9}{2} \times \frac{6}{5} \right)$$

$$l_{33} = 1 - (-10) - \left(-\frac{54}{10} \right)$$

$$l_{33} = 11 + \frac{54}{10}$$

$$l_{33} = \frac{110+54}{10}$$

$$l_{33} = \frac{164}{10} = \frac{82}{5}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ -5 & -\frac{9}{2} & \frac{82}{5} \end{bmatrix} \text{ terbentuk matrik } \mathbf{L}.$$

E. Matriks Simetri Definit Negatif dan Semidefinit Negatif

Pada penentuan matriks simetri definit negatif dan semidefinit negatif dikenal beberapa istilah yaitu *leading principal minor* dan *leading principal determinant*.

Definisi 2.8:

Jika terdapat suatu matriks berukuran $(n \times n)$, maka *leading principal minor* ke- k ($k \leq n$) adalah suatu sub matriks dengan ukuran $(k \times k)$ yang diperoleh dengan menghapus $(n - k)$ baris dan kolom yang bersesuaian dari matriks tersebut.²⁶

Leading principal minor ke k dari suatu matriks $(n \times n)$ diperoleh dengan menghapus $(n - k)$ baris terakhir dan kolom yang bersesuaian, sedangkan banyaknya *leading principal determinant* dari suatu matriks $(n \times n)$ adalah n . Determinan dari *leading principal minor* dinamakan *leading principal determinant*.

1. Matriks Simetri Definit Negatif

Sebuah matriks dapat dikatakan sebagai matriks simetri definit negatif jika memenuhi syarat berikut :

- (1) Semua elemen diagonal harus negatif.
- (2) Semua *leading principal determinant* harus negatif.

²⁶ Pethut Tantri, http://eprints.undip.ac.id/32209/6/M02_Pethut_Tantri_chapter_II.pdf. (14 Juni 2015), h. 14.

Contoh 2.24. matriks simetri definit negatif

Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Akan dibuktikan bahwa matriks \mathbf{A} adalah matriks simetri definit negatif.

→ Langkah pertama menguji matriks $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$

$$\text{Dari matriks } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix} \text{ didapatkan } \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

menunjukkan bahwa $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$.

→ Langkah kedua menunjukkan bahwa semua elemen diagonalnya harus negatif.

$$\text{Diagonal dari matriks } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix} = -2, -2, -2 \text{ (semua elemen}$$

diagonalnya negatif).

→ Langkah ketiga mencari *leading principal minor* untuk mendapatkan *leading principal determinant* dengan cara mencari determinan dari *leading principal minor*.

Leading principal minor ke-1 = $(n - k) = 3 - 1 = 2$, maksudnya menghapus 2 baris terakhir dan 2 kolom terakhir. Maka *leading principal minor* ke-1

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix} = [-2]$$

Leading principal determinant = -2

Leading principal minor ke-2 = $(n - k) = 3 - 2 = 1$, menghapus 1 baris terakhir dan 1 kolom terakhir. Maka *leading principal minor ke-2*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Leading principal determinant} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = (a \times d) - (b \times c) = 4 - 9 = -5$$

Leading principal minor ke-3 = $(n - k) = 3 - 3 = 0$, menghapus 0 baris dan 0

$$\text{kolom terakhir. Maka } \text{leading principal minor ke-3} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Leading principal determinant} \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 & -2 & 3 \\ 3 & -2 & 4 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \\ &= ((-8) + (-36) + (-36)) - ((-18) + \\ &\quad (-32) + (-18)) \\ &= -80 - (-68) \\ &= -12 \end{aligned}$$

Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

merupakan sebuah matriks simetri definit negatif, dimana $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, semua elemen diagonal utamanya negatif, dan *leading principal determinantnya* negatif.

2. Matriks Simetri Semidefinit Negatif

Sebuah matriks dapat dikatakan sebagai matriks simetri semidefinit negatif

jika $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, dan $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$, untuk semua $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}$.

Contoh 2.25: Matriks simetri semidefinit negatif.

Misalkan diberikan matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$, akan dibuktikan bahwa matriks

\mathbf{A} adalah matriks simetri semidefinit negatif.

➤ Langkah pertama menguji matriks $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$

Dari matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$, didapatkan $\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$,

menunjukkan bahwa $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$.

➤ Langkah kedua membuktikan bahwa $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$, untuk semua $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}$.

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \begin{bmatrix} -x_1 - 2x_2 + x_3 \\ -2x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1(-x_1 - 2x_2 + x_3) + x_2(-2x_1 - 2x_2 + 3x_3) + x_3(x_1 + 3x_2 - x_3)$$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = -x_1^2 - 2x_1x_2 + x_1x_3 - 2x_1x_2 - 2x_2^2 + 3x_2x_3 + x_1x_3 + 3x_2x_3 - x_3^2$$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = -x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2^2 + 6x_2x_3 - x_3^2$$

Untuk

$$x = 1 \rightarrow -1 - 4 + 2 - 2 + 6 - 1 = 0$$

$$x = 2 \rightarrow -4 - 16 + 8 - 8 + 24 - 4 = 0$$

$$x = 0 \rightarrow 0 - 0 + 0 - 0 + 0 - 0 = 0$$

$$x = -1 \rightarrow -1 - 4 + 2 - 2 + 6 - 1 = 0$$

$$x = -2 \rightarrow -4 - 16 + 8 - 8 + 24 - 4 = 0$$

Terbukti bahwa matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ merupakan matriks simetri

semidefinit negatif karena memenuhi $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$, untuk semua $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}$.

F. Vektor Hampiran Awal

Pada umumnya vektor hampiran awal untuk metode iterasi dalam mencari vektor eigen dan nilai eigen tak dominan dari suatu matriks $n \times n$ adalah berbentuk $\mathbf{x}_0 = (1 \ 1 \ 1 \ \dots \ n)^T$, karena vektor yang dihamperi jarang sekali banyak memiliki komponen nol. Karena proses penormalan di atas maka vektor hampiran awalnya menjadi berbentuk

$$\mathbf{x}_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \ \frac{1}{\sqrt{n}} \ \frac{1}{\sqrt{n}} \ \dots \ \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^T. \quad ^{27}$$

G. Metode Kuasa Invers dengan Shift

Metode pangkat (metode kuasa) didasarkan pada perkalian berulang dari sebuah vektor eigen oleh matriks \mathbf{A} dengan penskalaan vektor hasil \mathbf{y} , sehingga faktor penskalaan mencapai nilai eigen terbesar λ dan skala vektor \mathbf{y} menjadi vektor eigen dari nilai eigen yang bersesuaian.²⁸ Selain metode kuasa ada juga yang dinamakan metode kuasa invers. Dimana dalam pemakaiannya seringkali juga harus menghitung nilai eigen terkecil dan vektor eigennya. Salah satu cara menghitung nilai eigen tersebut adalah dengan menggunakan matriks invers, jika matriks invers tersebut ada. Misalkan \mathbf{A} matriks berukuran $n \times n$ yang dapat didiagonalkan dengan nilai eigen

²⁷ Yuli Andriani, *Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Definit Negatif Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift*, h. 4.

²⁸ Joe D Hoffman, *Numerical Methods for Engineers and Scientists*, (New York: Marcel Dekker, Inc, 2001), h. 89.

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots |\lambda_n| > 0$$

Kemudian nilai eigen dari matriks \mathbf{A}^{-1} adalah

$$\left| \frac{1}{\lambda_n} \right| > \dots \geq \left| \frac{1}{\lambda_2} \right| \geq \left| \frac{1}{\lambda_1} \right| \geq 0$$

Nilai eigen yang terkecil dari matriks \mathbf{A} menjadi nilai eigen terbesar dari matriks \mathbf{A}^{-1} .²⁹ Selain itu dikenal juga metode pergeseran (perubahan), misalkan diketahui matriks \mathbf{A} berukuran $n \times n$ yang dapat didiagonalkan. Kemudian untuk sebarang bilangan real s matriks

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} - s\mathbf{I}$$

Ket: \mathbf{B} : Matriks \mathbf{B}

\mathbf{A} : Matriks \mathbf{A}

\mathbf{I} : Matriks Identitas

s : Nilai *shift*

Mempunyai nilai eigen

$$\lambda_1 - s, \lambda_2 - s, \dots, \lambda_n - s$$

dengan λ_i merupakan nilai eigen matriks \mathbf{A} .

Metode kuasa invers dengan *shift* secara perhitungan menggunakan suatu nilai pendekatan terhadap nilai eigen tak dominan dari matriks \mathbf{A} yang disebut

²⁹ Wono Setya Budhi, *Aljabar Linear*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.416

dengan *shift*. Besarnya nilai *shift* akan diperoleh menggunakan Teorema *Gerschgorin*.³⁰

Teorema 2.1 Teorema Gerschgorin $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$.³¹

Bukti:

Asumsikan bahwa λ adalah nilai eigen dari matriks kompleks A yang bersesuaian dengan vektor eigen \mathbf{x} yaitu $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$

Misalkan diperlihatkan

$$\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$$

Sehingga dapat dituliskan pula

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = \lambda x_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = \lambda x_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = \lambda x_3$$

⋮

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + a_{nn}x_n = \lambda x_n$$

³⁰ Yuli Andriani, *Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Definit Negatif Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift*, h.3-4

³¹ Steven, *Aljabar Linear dan Aplikasinya*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h.396.

Yang dapat dituliskan juga

$$\lambda x_i = a_{ii}x_i + \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j \text{ dimana } j = 1, 2, \dots, n$$

$$\lambda x_i = a_{ii}x_i + \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j$$

$$\lambda x_i - a_{ii}x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j$$

$$(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j$$

masing-masing ruas dibagi dengan x_i

$$(\lambda - a_{ii}) = \frac{\sum_{j \neq i} a_{ij}x_j}{x_i}$$

memutlakkan kedua ruas

$$|\lambda - a_{ii}| = \left| \frac{\sum_{j \neq i} a_{ij}x_j}{x_i} \right| \leq \sum_{j \neq i} \left| \frac{a_{ij}x_j}{x_i} \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Berdasarkan teorema apit sehingga didapat

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Sehingga terbukti *Teorema Gerschgorin*.

H. Analisis Galat

Di dalam metode kuasa invers terdapat dua buah kriteria untuk menghentikan iterasi. Kriteria penghentian pertama berdasarkan galat relatif dari hampiran vektor eigen tak dominan dan kriteria kedua berdasarkan galat relatif

dari nilai eigen tak dominan. Kriteria kedua dipakai bila ingin menghentikan iterasi pada galat relatif yang diperbolehkan ε_i . Maka iterasi dihentikan jika

$$\left| \frac{\lambda_i - \lambda_{i-1}}{\lambda_i} \right| \leq \varepsilon_i$$

dengan λ_i adalah nilai eigen tak dominan pada iterasi ke-i. Kriteria kedua ini dapat pula dipakai untuk menentukan ketelitian nilai eigen tak dominan yang diperoleh pada iterasi tertentu yang dihentikan karena telah memenuhi ketelitian yang diinginkan bagi nilai eigen tak dominan. Begitu pula sebaliknya.³²

³² Yuli Andriani, *Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Definit Negatif Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift*, h.5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada mulai bulan oktober 2015 sampai dengan bulan oktober 2016.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini adalah berupa kajian literatur atau kajian pustaka.

C. Prosedur Penelitian

Nilai eigen tak dominan dari suatu matriks simetri semidefinit negatif dengan menggunakan metode kuasa invers dengan *shift* dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan sebarang matriks simetri semidefinit negatif **A**.
2. Menormalkan vektor hampiran awal yang telah diketahui.
3. Menentukan nilai *shift* (*s*) dengan menggunakan teorema *Gershgorin*.
4. Menentukan matriks **L** sebagai matriks segitiga bawah, **U** matriks segitiga atas dari matriks $(\mathbf{A} - s\mathbf{I}) = \mathbf{B}$.
5. Melakukan iterasi (perulangan) sampai mendekati toleransi galat yang diinginkan dengan cara
 - a) Menyelesaikan $\mathbf{L}\mathbf{Y} = \mathbf{X}_0$ dan $\mathbf{U}\mathbf{Z} = \mathbf{Y}$.

- b) Menormalisasikan kembali nilai $Z_k = \frac{Z_k}{\|Z_k\|}$ kemudian mengalikan dengan matriks A .
- c) Menghitung nilai eigen tak dominan dengan menggunakan persamaan *Kuesien Rayleigh* $\lambda = \frac{\langle Z, AZ \rangle}{\langle Z, Z \rangle}$.
- d) Menghitung nilai kesalahan relatif relatif $\left| \frac{\lambda_i - \lambda_{i-1}}{\lambda_i} \right| \leq \varepsilon_i$.
- e) Mendefinisikan kembali nilai $X_0 = Z$.
6. Menghentikan iterasi apabila ketelitian nilai eigen tak dominan mendekati toleransi galat terkecil.
7. Mendapatkan nilai eigen tak dominan yang eksak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bentuk umum matriks simetri semidefinit negatif ordo 4×4

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Dimana $\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$, untuk semua $x \in z$. Penentuan nilai eigen tak dominan matriks simetri semi definit negatif menggunakan metode kuasa invers dengan *Shift diuraikan sebagai berikut:*

1. Misalkan diberikan matriks simetri semidefinit negatif \mathbf{A} dan membuktikannya :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Dengan vektor hampiran awal

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4] \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4] \begin{bmatrix} -2x_1 - x_2 + x_3 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_4 \\ x_1 - 2x_3 - x_4 \\ 2x_2 - x_3 - 2x_4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1(-2x_1 - x_2 + x_3) + x_2(-x_1 - 2x_2 + 2x_4) + x_3(x_1 - 2x_3 - x_4) + x_4(2x_2 - x_3 - 2x_4)$$

$$\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} = -2x_1^2 - x_1x_2 + x_1x_3 - x_1x_2 - 2x_2^2 + 2x_2x_4 + x_1x_3 - 2x_3^2 - x_3x_4 + 2x_2x_4 - x_3x_4 - 2x_4^2$$

$$\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} = -2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2^2 + 4x_2x_4 - 2x_3^2 - 2x_3x_4 - 2x_4^2$$

$$x = 1 \rightarrow -2(1)^2 - 2(1)(1) + 2(1)(1) - 2(1)^2 + 4(1)(1) - 2(1)^2 - 2(1)(1) - 2(1)^2 = -6$$

$$x = 2 \rightarrow -2(2)^2 - 2(2)(2) + 2(2)(2) - 2(2)^2 + 4(2)(2) - 2(2)^2 - 2(2)(2) - 2(2)^2 = -24$$

$$x = 0 \rightarrow 0$$

$$x = -1 \rightarrow -2(-1)^2 - 2(-1)(-1) + 2(-1)(-1) - 2(-1)^2 + 4(-1)(-1) - 2(-1)^2 - 2(-1)(-1)$$

$$- 2(-1)^2 = -6$$

$$x = -2 \rightarrow -2(-2)^2 - 2(-2)(-2) + 2(-2)(-2) - 2(-2)^2 + 4(-2)(-2) - 2(-2)^2 - 2(-2)(-2)$$

$$- 2(-2)^2 = -24$$

Dapat disimpulkan bahwa matriks \mathbf{A} adalah matriks semidefinit negatif karena memenuhi syarat $\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$, untuk semua $x \in Z$

2. Menormalkan vektor hampiran awal (\mathbf{x}) yang telah diketahui.

Normalisasi vektor hampiran awal

$$x_0 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ -0,5 \\ -0,5 \\ -0,5 \end{bmatrix}$$

3. Menentukan nilai *shift* dari daerah nilai eigen tak dominan menurut Teorema *Gerschgorin*. (Teorema II.1 pada bab II)

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$$

Dimana matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$

- $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$

$$|\lambda - a_{11}| \leq |a_{12}| + |a_{13}| + |a_{14}|$$

$$|\lambda + 2| \leq |-1| + |1| + |0|$$

$$|\lambda + 2| \leq 2 \rightarrow -2 \leq \lambda + 2 \leq 2 \rightarrow -4 \leq \lambda \leq 0$$

- $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$

$$|\lambda - a_{22}| \leq |a_{21}| + |a_{23}| + |a_{24}| \quad |\lambda + 2| \leq |-1| + |1| + |0|$$

$$|\lambda + 2| \leq |-1| + |0| + |2|$$

$$|\lambda + 2| \leq 3 \rightarrow -3 \leq \lambda + 2 \leq 3 \rightarrow -5 \leq \lambda \leq 1$$

- $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$

$$|\lambda - a_{33}| \leq |a_{31}| + |a_{32}| + |a_{34}|$$

$$|\lambda + 2| \leq |1| + |0| + |-1|$$

$$|\lambda + 2| \leq 2 \rightarrow -2 \leq \lambda + 2 \leq 2 \rightarrow -4 \leq \lambda \leq 0$$

- $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$

$$|\lambda - a_{44}| \leq |a_{41}| + |a_{42}| + |a_{43}|$$

$$|\lambda + 2| \leq |0| + |2| + |-1|$$

$$|\lambda + 2| \leq 3 \rightarrow -3 \leq \lambda + 2 \leq 3 \rightarrow -5 \leq \lambda \leq 1$$

Daerah nilai eigen tak dominan yaitu $-4 \leq \lambda \leq 0$. Penentuan shift (s) ditentukan berdasarkan daerah nilai eigen tak dominan. Dari daerah nilai eigen tak dominan misalkan diambil nilai *shift* (s) = -1,2.

4. Menentukan matriks **L** sebagai matriks segitiga bawah dan matriks **U** sebagai matriks segitiga atas dengan memfaktorkan matriks $\mathbf{A} - s\mathbf{I} = \mathbf{B}$

$$\mathbf{A} - s\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-(-1,2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-} \begin{bmatrix} -1,2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1,2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -0,8 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -0,8 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -0,8 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -0,8 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya membentuk \mathbf{L} dan \mathbf{U} dari matriks \mathbf{B}

$$[\mathbf{L}] \times [\mathbf{U}] = [\mathbf{B}]$$

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & 0 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & l_{44} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} & u_{14} \\ 0 & 1 & u_{23} & u_{24} \\ 0 & 0 & 1 & u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,8 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -0,8 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -0,8 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -0,8 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan perkalian matriks diperoleh

Untuk baris pertama perkalian matriks \mathbf{L} dan matriks \mathbf{U} , diperoleh nilai-nilai yaitu:

- $l_{11} = -0,8$

- $l_{11} \times u_{12} = -1$

$$u_{12} = \frac{1}{l_{11}} = \frac{-1}{-0,8} = 1,25$$

- $l_{11} \times u_{13} = 1$

$$u_{13} = \frac{1}{l_{11}} = \frac{1}{-0,8} = -1,25$$

- $l_{11} \times u_{14} = 0$

$$u_{14} = \frac{0}{l_{11}} = 0$$

Untuk baris kedua diperoleh nilai-nilai yaitu:

- $l_{21} = -1$
- $l_{21} \times u_{12} + l_{22} = -0,8$
 $-1 \times 1,25 + l_{22} = -0,8$
 $l_{22} = -0,8 + 1,25$
 $l_{22} = 0,45$
- $(l_{21} \times u_{13}) + (l_{22} \times u_{23}) = 0$
 $(-1 \times -1,25) + (0,45 \times u_{23}) = 0$
 $1,25 + (0,45u_{23}) = 0$
 $u_{23} = \frac{-1,25}{0,45} = -2,778$
- $(l_{21} \times u_{14}) + (l_{22} \times u_{24}) = 2$
 $(-1 \times 0) + (0,45 \times u_{24}) = 2$
 $0 + (0,45u_{24}) = 2$
 $u_{24} = \frac{2}{0,45} = 4,445$

Untuk baris ketiga diperoleh nilai-nilai yaitu:

- $l_{31} = 1$
- $l_{31} \times u_{12} + l_{32} = 0$
 $1 \times 1,25 + l_{32} = 0$
 $l_{32} = 0 - 1,25$
 $l_{32} = -1,25$

- $$(l_{31} \times u_{13}) + (l_{32} \times u_{23}) + l_{33} = -0,8$$

$$(1 \times -1,25) + (-1,25 \times -2,778) + l_{33} = -0,8$$

$$-1,25 + 3,4725 + l_{33} = -0,8$$

$$l_{33} = -3,023$$
- $$(l_{31} \times u_{14}) + (l_{32} \times u_{24}) + (l_{33} \times u_{34}) = -1$$

$$(1 \times 0) + (-1,25 \times 4,445) - 3,023u_{34} = -1$$

$$0 - 5,556 - 3,023u_{34} = -1$$

$$-3,023u_{34} = 4,556$$

$$u_{34} = \frac{4,556}{-3,023} = -1,507$$

Untuk baris keempat diperoleh nilai-nilai yaitu:

- $$l_{41} = 0$$
- $$l_{41} \times u_{12} + l_{42} = 2$$

$$0 \times 1,25 + l_{42} = 2$$

$$l_{42} = 2$$
- $$(l_{41} \times u_{13}) + (l_{42} \times u_{23}) + l_{43} = -1$$

$$(0 \times -1,25) + (2 \times -2,778) + l_{43} = -1$$

$$0 - 5,556 + l_{43} = -1$$

$$l_{43} = 4,556$$
- $$(l_{41} \times u_{14}) + (l_{42} \times u_{24}) + (l_{43} \times u_{34}) + l_{44} = -0,8$$

$$(0 \times 0) + (2 \times 4,445) + (4,556 \times -1,507) + l_{44} = -0,8$$

$$0 + 8,89 - 6,866 + l_{44} = -0,8$$

$$l_{44} = -2,824$$

Sehingga diperoleh Matriks **L** dan **U**

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} -0,8 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0,45 & 0 & 0 \\ 1 & -1,25 & -3,023 & 0 \\ 0 & 2 & 4,556 & 2,824 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & 1,25 & -1,25 & 0 \\ 0 & 1 & -2,778 & 4,445 \\ 0 & 0 & 1 & -1,507 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Melakukan iterasi (perulangan) sampai mendekati toleransi galat yang diinginkan

Iterasi pertama

menyelesaikan $\mathbf{LY} = \mathbf{X}_0$ dan $\mathbf{UZ} = \mathbf{Y}$

Menyelesaikan $\mathbf{LY} = \mathbf{X}_0$ Untuk mendapatkan nilai **Y**

$$\begin{bmatrix} -0,8 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0,45 & 0 & 0 \\ 1 & -1,25 & -3,023 & 0 \\ 0 & 2 & 4,556 & -2,824 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ -0,5 \\ -0,5 \\ -0,5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0,8y_1 \\ -y_1 + 0,45y_2 \\ y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 \\ 2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ -0,5 \\ -0,5 \\ -0,5 \end{bmatrix}$$

- $-0,8y_1 = -0,5$

$$y_1 = \frac{-0,5}{-0,8} = 0,625$$

- $-y_1 + 0,45y_2 = 0,5$

$$-0,625 + 0,45y_2 = -0,5$$

$$0,45y_2 = 0,125$$

$$y_2 = \frac{0,125}{0,45} = 0,278$$

- $y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 = -0,5$

$$0,625 - 1,25(0,278) - 3,023y_3 = -0,5$$

$$0,625 - 0,348 - 3,023y_3 = -0,5$$

$$- 3,023y_3 = -0,777$$

$$y_3 = \frac{0,777}{3,023} = 0,257$$

- $2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 = -0,5$

$$2(0,278) + 4,556(0,257) - 2,824y_4 = -0,5$$

$$0,556 + 1,171 - 2,824y_4 = -0,5$$

$$-2,824y_4 = -2,227$$

$$y_4 = \frac{-2,227}{-2,824} = 0,789$$

Sehingga diperoleh matriks Y

$$Y = \begin{bmatrix} 0,625 \\ 0,278 \\ 0,257 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

Setelah mendapatkan nilai Y selanjutnya menyelesaikan $UZ=Y$ untuk mendapatkan nilai Z_1

$$\begin{bmatrix} 1 & 1,25 & -1,25 & 0 \\ 0 & 1 & -2,778 & 4,445 \\ 0 & 0 & 1 & -1,507 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,625 \\ 0,278 \\ 0,257 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} z_1 + 1,25z_2 - 1,25z_3 \\ z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 \\ z_3 - 1,507z_4 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,625 \\ 0,278 \\ 0,257 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

- $z_4 = 0,789$

- $z_3 - 1,507z_4 = 0,257$

$$z_3 - 1,507(0,789) = 0,257$$

$$z_3 - 1,189 = 0,257$$

$$z_3 = 1,446$$

- $z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 = 0,278$

$$z_2 - 2,778(1,446) + 4,445(0,789) = 0,278$$

$$z_2 - 4,017 + 3,507 = 0,278$$

$$z_2 = 0,788$$

- $z_1 + 1,25(0,788) - 1,25(1,446) = 0,625$

$$z_1 + 0,985 - 1,807 = 0,625$$

$$z_1 = 1,447$$

Sehingga diperoleh nilai Z pada iterasi pertama yaitu

$$Z_1 = \begin{bmatrix} 1,447 \\ 0,788 \\ 1,446 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya menormalisasi Z_1 menghasilkan:

$$Z_1 = \frac{1}{\sqrt{(1,447)^2 + (0,788)^2 + (1,446)^2 + (0,789)^2}} \begin{bmatrix} 1,447 \\ 0,788 \\ 1,446 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2,094 + 0,621 + 2,091 + 0,622}} \begin{bmatrix} 1,447 \\ 0,788 \\ 1,446 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5,428}} \begin{bmatrix} 1,447 \\ 0,788 \\ 1,446 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2,330} \begin{bmatrix} 1,447 \\ 0,788 \\ 1,446 \\ 0,789 \end{bmatrix}$$

$$Z_1 = \begin{bmatrix} 0,621 \\ 0,338 \\ 0,621 \\ 0,339 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya Mengalikan Z_1 dengan A , menghasilkan

$$AZ_1 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,621 \\ 0,338 \\ 0,621 \\ 0,339 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2(0,621) - (0,338) + (0,621) \\ -(0,621) - 2(0,338) + 2(0,339) \\ (0,621) - 2(0,621) - (0,339) \\ 2(0,338) - (0,621) - 2(0,339) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,959 \\ -0,619 \\ -0,960 \\ -0,623 \end{bmatrix}$$

Dengan menggunakan persamaan *Kuesien Rayleigh* perkiraan pertama dari nilai eigen tak dominan adalah

$$\lambda_1 = \frac{\langle Z_1, AZ_1 \rangle}{\langle Z_1, Z_1 \rangle}$$

$$\lambda_1 = \frac{[0,621 \quad 0,338 \quad 0,621 \quad 0,339] \begin{bmatrix} -0,959 \\ -0,619 \\ -0,960 \\ -0,623 \end{bmatrix}}{[0,621 \quad 0,338 \quad 0,621 \quad 0,339] \begin{bmatrix} 0,621 \\ 0,338 \\ 0,621 \\ 0,339 \end{bmatrix}}$$

$$= \frac{0,621(-0,959) + 0,338(-0,619) + 0,621(-0,960) + 0,339(-0,623)}{0,621(0,621) + 0,338(0,338) + 0,621(0,621) + 0,339(0,339)}$$

$$= \frac{-1,612118}{1,000447}$$

$$\lambda_1 = -1,6114$$

Langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan kembali nilai $X_0 = Z_1$ kemudian melanjutkan ke iterasi kedua

Iterasi kedua

menyelesaikan $LY = X_0$ dimana $X_0 = Z_1$

$$\begin{bmatrix} -0,8 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0,45 & 0 & 0 \\ 1 & -1,25 & -3,023 & 0 \\ 0 & 2 & 4,556 & -2,824 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,621 \\ 0,338 \\ 0,621 \\ 0,339 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0,8y_1 \\ -y_1 + 0,45y_2 \\ y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 \\ 2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,621 \\ 0,338 \\ 0,621 \\ 0,339 \end{bmatrix}$$

- $-0,8y_1 = 0,621$

- $y_1 = \frac{0,621}{-0,8} = -0,776$

- $-y_1 + 0,45y_2 = 0,338$

$$0,776 + 0,45y_2 = 0,338$$

$$0,45y_2 = -0,438$$

$$y_2 = \frac{-0,438}{0,45} = -0,973$$

- $y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 = 0,621$

$$-0,776 - 1,25(-0,973) - 3,023y_3 = 0,621$$

$$-0,776 + 1,216 - 3,023y_3 = 0,621$$

$$-3,023y_3 = 0,181$$

$$y_3 = \frac{0,181}{-3,023} = -0,060$$

- $2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 = 0,339$

$$2(-0,973) + 4,556(-0,060) - 2,824y_4 = 0,339$$

$$-1,946 - 0,273 - 2,824y_4 = 0,339$$

$$-2,824y_4 = 2,558$$

$$y_4 = \frac{2,558}{-2,824} = -0,906$$

Sehingga diperoleh matriks Y

$$Y = \begin{bmatrix} -0,776 \\ -0,973 \\ -0,060 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

Setelah mendapatkan nilai Y selanjutnya menyelesaikan $UZ=Y$ untuk mendapatkan nilai Z_2

$$\begin{bmatrix} 1 & 1,25 & -1,25 & 0 \\ 0 & 1 & -2,778 & 4,445 \\ 0 & 0 & 1 & -1,507 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,776 \\ -0,973 \\ -0,060 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} z_1 + 1,25z_2 - 1,25z_3 \\ z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 \\ z_3 - 1,507z_4 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,776 \\ -0,973 \\ -0,060 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

- $z_4 = -0,906$
- $z_3 - 1,507z_4 = -0,060$

$$z_3 - 1,507(-0,906) = -0,060$$

$$z_3 + 1,365 = -0,060$$

$$z_3 = -1,425$$

- $z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 = -0,973$

$$z_2 - 2,778(-1,425) + 4,445(-0,906) = -0,973$$

$$z_2 + 3,959 - 4,027 = -0,973$$

$$z_2 = -0,905$$

- $z_1 + 1,25z_2 - 1,25z_3 = -0,776$

$$z_1 + 1,25(-0,905) - 1,25(-1,425) = -0,776$$

$$z_1 - 1,131 + 1,781 = 0,625$$

$$z_1 = -1,426$$

Sehingga diperoleh nilai Z pada iterasi kedua yaitu

$$Z_2 = \begin{bmatrix} -1,426 \\ -0,905 \\ -1,425 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya menormalisasi Z_2 menghasilkan:

$$Z_2 = \frac{1}{\sqrt{(-1,426)^2 + (-0,905)^2 + (-1,425)^2 + (-0,906)^2}} \begin{bmatrix} -1,426 \\ -0,905 \\ -1,425 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2,033 + 0,819 + 2,031 + 0,821}} \begin{bmatrix} -1,426 \\ -0,905 \\ -1,425 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5,704}} \begin{bmatrix} -1,426 \\ -0,905 \\ -1,425 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2,388} \begin{bmatrix} -1,426 \\ -0,905 \\ -1,425 \\ -0,906 \end{bmatrix}$$

$$Z_2 = \begin{bmatrix} -0,597 \\ -0,379 \\ -0,597 \\ -0,379 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya Mengalikan Z_2 dengan A , menghasilkan

$$AZ_2 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,597 \\ -0,379 \\ -0,597 \\ -0,379 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2(-0,597) - (-0,379) + (-0,597) \\ -(0,597) - 2(-0,379) + 2(-0,379) \\ (0,597) - 2(-0,597) - (-0,379) \\ 2(-0,379) - (-0,597) - 2(-0,379) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,976 \\ 0,597 \\ 0,976 \\ 0,597 \end{bmatrix}$$

Dengan menggunakan persamaan *Kuesien Rayleigh* perkiraan kedua dari nilai eigen tak dominan adalah

$$\lambda_2 = \frac{\langle Z_2, AZ_2 \rangle}{\langle Z_2, Z_2 \rangle}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{[-0,597 \quad -0,379 \quad -0,597 \quad -0,379] \begin{bmatrix} 0,976 \\ 0,597 \\ 0,976 \\ 0,597 \end{bmatrix}}{[-0,597 \quad -0,379 \quad -0,597 \quad -0,379] \begin{bmatrix} -0,597 \\ -0,379 \\ -0,597 \\ -0,379 \end{bmatrix}} \\
&= \frac{-0,597(0,976) - 0,379(0,597) - 0,597(0,976) - 0,379(0,597)}{-0,597(-0,597) - 0,379(-0,379) - 0,597(-0,597) - 0,379(-0,379)} \\
&= \frac{-1,6177082}{1,0001}
\end{aligned}$$

$$\lambda_2 = -1,6177$$

Sehingga diperoleh Error relative dari iterasi pertama sampai iterasi kedua

$$\left| \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2} \right| = \left| \frac{-1,6177 - (-1,6114)}{-1,6177} \right| = \left| \frac{-0,0063}{-1,6177} \right| = 0,0038$$

Langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan kembali nilai $X_0 = Z_2$ kemudian melanjutkan ke iterasi ketiga

Iterasi ketiga

menyelesaikan $LY = X_0$ dimana $X_0 = Z_2$

$$\begin{bmatrix} -0,8 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0,45 & 0 & 0 \\ 1 & -1,25 & -3,023 & 0 \\ 0 & 2 & 4,556 & -2,824 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,597 \\ -0,379 \\ -0,597 \\ -0,379 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0,8y_1 \\ -y_1 + 0,45y_2 \\ y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 \\ 2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,597 \\ -0,379 \\ -0,597 \\ -0,379 \end{bmatrix}$$

- $-0,8y_1 = -0,597$

$$y_1 = \frac{-0,597}{-0,8} = 0,746$$

- $-y_1 + 0,45y_2 = -0,379$

$$-0,746 + 0,45y_2 = -0,379$$

$$0,45y_2 = 0,367$$

$$y_2 = \frac{0,367}{0,45} = 0,816$$

- $y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 = -0,597$

$$0,746 - 1,25(0,816) - 3,023y_3 = -0,597$$

$$0,746 - 1,020 - 3,023y_3 = -0,597$$

$$-3,023y_3 = -0,323$$

$$y_3 = \frac{-0,323}{-3,023} = 0,107$$

- $2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 = -0,379$

$$2(0,816) + 4,556(0,107) - 2,824y_4 = -0,379$$

$$1,632 + 0,487 - 2,824y_4 = -0,379$$

$$-2,824y_4 = -2,498$$

$$y_4 = \frac{-2,498}{-2,824} = 0,885$$

Sehingga diperoleh matriks Y

$$Y = \begin{bmatrix} 0,746 \\ 0,816 \\ 0,107 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

Setelah mendapatkan nilai Y selanjutnya menyelesaikan $UZ=Y$ untuk mendapatkan nilai Z_3

$$\begin{bmatrix} 1 & 1,25 & -1,25 & 0 \\ 0 & 1 & -2,778 & 4,445 \\ 0 & 0 & 1 & -1,507 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,746 \\ 0,816 \\ 0,107 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} z_1 + 1,25z_2 - 1,25z_3 \\ z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 \\ z_3 - 1,507z_4 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,746 \\ 0,816 \\ 0,107 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

- $z_4 = 0,885$
- $z_3 - 1,507z_4 = 0,107$

$$z_3 - 1,507(0,885) = 0,107$$

$$z_3 - 1,334 = 0,107$$

$$z_3 = 1,441$$

- $z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 = 0,816$

$$z_2 - 2,778(1,441) + 4,445(0,885) = 0,816$$

$$z_2 - 4,003 + 3,934 = 0,816$$

$$z_2 = 0,885$$

- $z_1 + 1,25z_2 - 1,25z_3 = 0,746$

$$z_1 + 1,25(0,885) - 1,25(1,441) = 0,746$$

$$z_1 + 1,106 - 1,801 = 0,746$$

$$z_1 = 1,441$$

Sehingga diperoleh nilai Z pada iterasi ketiga yaitu

$$Z_3 = \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya menormalisasi Z_3 menghasilkan:

$$= \frac{1}{\sqrt{(1,441)^2 + (0,885)^2 + (1,441)^2 + (0,885)^2}} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2,076 + 0,783 + 2,076 + 0,783}} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5,718}} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2,391} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$Z_3 = \begin{bmatrix} 0,603 \\ 0,370 \\ 0,603 \\ 0,370 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya Mengalikan Z_3 dengan **A**, menghasilkan

$$\begin{aligned}
 AZ_3 &= \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,603 \\ 0,370 \\ 0,603 \\ 0,370 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -2(0,603) - (0,370) + (0,603) \\ -(0,603) - 2(0,370) + 2(0,370) \\ (0,603) - 2(0,603) - (0,370) \\ 2(0,370) - (0,603) - 2(0,370) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -0,973 \\ -0,603 \\ -0,973 \\ -0,603 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan *Kuesien Rayleigh* perkiraan kedua dari nilai eigen tak dominan adalah

$$\begin{aligned}
 \lambda_3 &= \frac{\langle Z_3, AZ_3 \rangle}{\langle Z_3, Z_3 \rangle} \\
 &= \frac{[0,603 \quad 0,370 \quad 0,603 \quad 0,370] \begin{bmatrix} -0,973 \\ -0,603 \\ -0,973 \\ -0,603 \end{bmatrix}}{[0,603 \quad 0,370 \quad 0,603 \quad 0,370] \begin{bmatrix} 0,603 \\ 0,370 \\ 0,603 \\ 0,370 \end{bmatrix}} \\
 &= \frac{0,603(-0,973) - 0,370(-0,603) - 0,603(-0,973) - 0,370(-0,603)}{0,603(0,603) + 0,370(0,370) + 0,603(0,603) - 0,370(0,370)} \\
 &= \frac{-1,619658}{1,001018}
 \end{aligned}$$

$$\lambda_3 = -1,6180$$

Sehingga diperoleh Error relatif dari iterasi kedua sampai iterasi ketiga

$$\left| \frac{\lambda_3 - \lambda_2}{\lambda_3} \right| = \left| \frac{-1,6180 - (-1,6177)}{-1,6180} \right| = \left| \frac{0,0003}{-1,6180} \right| = 0,0001$$

Langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan kembali nilai $X_0 = Z_3$ kemudian melanjutkan ke iterasi keempat

Iterasi keempat

menyelesaikan $LY = X_0$ dimana $X_0 = Z_3$

$$\begin{bmatrix} -0,8 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0,45 & 0 & 0 \\ 1 & -1,25 & -3,023 & 0 \\ 0 & 2 & 4,556 & -2,824 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,597 \\ -0,379 \\ -0,597 \\ -0,379 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0,8y_1 \\ -y_1 + 0,45y_2 \\ y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 \\ 2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,597 \\ -0,379 \\ -0,597 \\ -0,379 \end{bmatrix}$$

- $-0,8y_1 = -0,597$

$$y_1 = \frac{-0,597}{-0,8} = 0,746$$

- $-y_1 + 0,45y_2 = -0,379$

$$-0,746 + 0,45y_2 = -0,379$$

$$0,45y_2 = 0,367$$

$$y_2 = \frac{0,367}{0,45} = 0,816$$

- $y_1 - 1,25y_2 - 3,023y_3 = -0,597$

$$0,746 - 1,25(0,816) - 3,023y_3 = -0,597$$

$$0,746 - 1,020 - 3,023y_3 = -0,597$$

$$-3,023y_3 = -0,323$$

$$y_3 = \frac{-0,323}{-3,023} = 0,107$$

- $2y_2 + 4,556y_3 - 2,824y_4 = -0,379$

$$2(0,816) + 4,556(0,107) - 2,824y_4 = -0,379$$

$$1,632 + 0,487 - 2,824y_4 = -0,379$$

$$-2,824y_4 = -2,498$$

$$y_4 = \frac{-2,498}{-2,824} = 0,885$$

Sehingga diperoleh matriks Y

$$Y = \begin{bmatrix} 0,746 \\ 0,816 \\ 0,107 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

Setelah mendapatkan nilai Y selanjutnya menyelesaikan $UZ=Y$ untuk mendapatkan nilai Z_3

$$\begin{bmatrix} 1 & 1,25 & -1,25 & 0 \\ 0 & 1 & -2,778 & 4,445 \\ 0 & 0 & 1 & -1,507 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,746 \\ 0,816 \\ 0,107 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} z_1 + 1,25z_2 - 1,25z_3 \\ z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 \\ z_3 - 1,507z_4 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,746 \\ 0,816 \\ 0,107 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

- $z_4 = 0,885$
- $z_3 - 1,507z_4 = 0,107$

$$z_3 - 1,507(0,885) = 0,107$$

$$z_3 - 1,334 = 0,107$$

$$z_3 = 1,441$$

- $z_2 - 2,778z_3 + 4,445z_4 = 0,816$

$$z_2 - 2,778(1,441) + 4,445(0,885) = 0,816$$

$$z_2 - 4,003 + 3,934 = 0,816$$

$$z_2 = 0,885$$

- $z_1 + 1,25z_2 - 1,25z_3 = 0,746$

$$z_1 + 1,25(0,885) - 1,25(1,441) = 0,746$$

$$z_1 + 1,106 - 1,801 = 0,746$$

$$z_1 = 1,441$$

Sehingga diperoleh nilai Z pada iterasi keempat yaitu

$$Z_4 = \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya menormalisasi Z_4 menghasilkan:

$$Z_4 = \frac{1}{\sqrt{(1,441)^2 + (0,885)^2 + (1,441)^2 + (0,885)^2}} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2,076 + 0,783 + 2,076 + 0,783}} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5,718}} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2,391} \begin{bmatrix} 1,441 \\ 0,885 \\ 1,441 \\ 0,885 \end{bmatrix}$$

$$Z_4 = \begin{bmatrix} 0,603 \\ 0,370 \\ 0,603 \\ 0,370 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya Mengalikan Z_4 dengan A , menghasilkan

$$\begin{aligned} AZ_4 &= \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,603 \\ 0,370 \\ 0,603 \\ 0,370 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2(0,603) - (0,370) + (0,603) \\ -(0,603) - 2(0,370) + 2(0,370) \\ (0,603) - 2(0,603) - (0,370) \\ 2(0,370) - (0,603) - 2(0,370) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -0,973 \\ -0,603 \\ -0,973 \\ -0,603 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan *Kuesien Rayleigh* perkiraan kedua dari nilai eigen tak dominan adalah

$$\lambda_4 = \frac{\langle Z_4, AZ_4 \rangle}{\langle Z_4, Z_4 \rangle}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{[0,603 \quad 0,370 \quad 0,603 \quad 0,370] \begin{bmatrix} -0,973 \\ -0,603 \\ -0,973 \\ -0,603 \end{bmatrix}}{[0,603 \quad 0,370 \quad 0,603 \quad 0,370] \begin{bmatrix} 0,603 \\ 0,370 \\ 0,603 \\ 0,370 \end{bmatrix}} \\
&= \frac{0,603(-0,973) - 0,370(-0,603) - 0,603(-0,973) - 0,370(-0,603)}{0,603(0,603) + 0,370(0,370) + 0,603(0,603) - 0,370(0,370)} \\
&= \frac{-1,619658}{1,001018}
\end{aligned}$$

$$\lambda_4 = -1,6180$$

Sehingga diperoleh Error relatif dari iterasi ketiga sampai iterasi keempat

$$\left| \frac{\lambda_4 - \lambda_3}{\lambda_4} \right| = \left| \frac{-1,6180 - (-1,6180)}{-1,6180} \right| = \left| \frac{0}{-1,6180} \right| = 0$$

6. Cukup sampai iterasi keempat sudah memenuhi batas toleransi yang diinginkan.
7. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dengan iterasi sebanyak empat saja sudah menunjukkan λ konvergen dimana $\lambda = -1,6180$

B. PEMBAHASAN

Menentukan nilai eigen tak dominan matriks simetri semidefinit negatif menggunakan metode kuasa invers dengan *Shift* diawali dengan pemisalan suatu matriks \mathbf{A} , dimana matriks \mathbf{A} merupakan matriks simetri semidefinit negatif yang memenuhi $(X^t \mathbf{A} X \leq 0, \text{ untuk semua } x)$. Dalam hal ini yang diuji adalah $-2 \leq x \leq 2$. Selanjutnya menormalkan vektor hampiran yang telah diketahui dalam hal

ini nilai X_0 . Selanjutnya menentukan nilai shift (s). Nilai shift untuk menentukan nilai eigen tak dominan diperoleh dari Teorema *Gerschgorin*. Penentuan nilai Shift bergantung pada daerah nilai eigen tak dominan, dalam kasus ini diambil $s = -1,2$. Pengambilan nilai shift berpengaruh terhadap banyaknya iterasi yang digunakan untuk mendapatkan nilai eigen.

Langkah selanjutnya menentukan matriks L dan U sedemikian sehingga diperoleh $L \times U = B$ dimana $B = (A - sI)$. Langkah selanjutnya yaitu melakukan iterasi. Iterasi digunakan untuk mendapatkan nilai eigen tak dominan dari proses perulangan terus menerus sehingga diperoleh nilai eigen tak dominan yang konvergen kesuatu nilai tertentu. Caranya yaitu dengan menyelesaikan $LY = X_0$ sehingga diperoleh nilai Y . Nilai Y kemudian digunakan untuk menyelesaikan $UZ = Y$ sehingga diperoleh lah nilai Z . Langkah selanjutnya menormalisasikan nilai Z dan digunakan untuk mencari nilai eigen melalui persamaan *Kuesien Rayleigh* $\lambda = \frac{\langle Z, AZ \rangle}{\langle Z, Z \rangle}$. Setelah diperoleh nilai eigennya lakukan iterasi berikutnya dengan mendefinisikan kembali nilai $X_0 = Z$. Iterasi kemudian dihentikan sampai memenuhi batas toleransi (ϵ) terkecil yang diinginkan dengan menghitung nilai eror relatif untuk setiap iterasi.

Pada hasil penelitian diperoleh nilai eigen tak dominan untuk setiap iterasi $\lambda_1 = -1,6114, \lambda_2 = -1,6177, \lambda_3 = -1,6180, \lambda_4 = -1,6180$. Pada kasus ini cukup pada iterasi kedua sudah diperoleh nilai eigen tak dominan yang konvergen yakni $\lambda = -1,6180$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai eigen tak

dominan suatu matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ yang merupakan matriks

simetri semidefinit negatif menggunakan metode kuasa invers dengan *Shift* adalah $\lambda = -1,6180$. Iterasi berhenti pada iterasi keempat karena nilai eigen tak dominan sudah konvergen ke suatu nilai tertentu.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian berikutnya yaitu:

1. Menggunakan Metode kuasa invers dengan *Shift* untuk menyelesaikan matriks simetri semi definit positif, semi definit negatif, dan indefinit.
2. Menggunakan matriks 4 x 4 secara umum.
3. Menggunakan matriks yang lebih besar untuk ukuran 5 x 5 , 6 x 6, dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusysyagir. *Ketika Kyai Mengajar Matematika*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Andriani, Yuli. *Menentukan Nilai Eigen suatu Matriks Definit Negatif Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift*. Jurnal Penelitian Sains Vol. 14 No. 1(A). 2011.
- Anton, Howard. *Aljabar Linear Elementer*. Jakarta: Erlangga, 1997
- _____. *Elementary Linear Algebra*. Canada: Simultaneously. 1977.
- Arfawi, Kurdhi Nughthoh. *Non Linear Programming*. 2013.
- Azis, Abdul. *Aljabar Matriks*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Bijaksana, Arif. *Menentukan Nilai Eigen Tak Dominan Suatu Matriks Semi Definit dan Indefinit Menggunakan Metode Kuasa Invers dengan Shift*. Jurnal Sains Matematika dan Statistika. 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Depok: Pustaka Alfatih. 2009.
- Gazali, Wikaria. *Matriks & Transformasi Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Hadley, G. *Aljabar Linear*. Jakarta: Erlangga 1983.
- Hoffman, Joe D. *Numerical Methods for Engineers and Scientists*. New York: Marcel Dekker, Inc. 2001
- Irwan. *Pengantar Aljabar Linear Elementer*. Makassar: Alauddin University Press. 2011.
- Kartono, *Aljabar Linear, Vector dan Eksplorasinya dengan Maple*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2002.
- Kosasih Buyung, *Komputasi Numerik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Kusumawati, Ririen. *Aljabar Linear dan Matriks*. Surabaya: UIN Malang Press, 2009.

- Leon, Steven J. *Aljabar Linear dan Aplikasinya*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Pudjiastuti. *Matriks Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Rahman, Afzalur. *Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahman, Hairur. *Indahnya Matematika dalam Al-Qur'an*. Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Rorres, Anton. *Aljabar Linear Elementer*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Santoso, Gunawan. *Aljabar Linear Dasar*. Yogyakarta: Andi, 2008.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol: 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Spiegel, Murray R dan Koko Martono. *Matematika Lanjutan untuk Para Insinyur dan Ilmuwan*. Jakarta: Erlangga 1971.

RIWAYAT HIDUP



Asmianti, lahir di Kassi, kelurahan Tanah Jaya, kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 September 1993. Anak ketiga dari tujuh bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Muhammad Kamil Dg Massikki dan ibu Indo Taang. Penulis memulai pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Pertiwi pada tahun 1997 dan lulus pada tahun 1999. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 100 Centre Kajang selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kajang dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Sekolah Menengah Atas Negeri I Kajang dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Matematika dan lulus pada tahun 2017.

Selama berstatus mahasiswa, penulis pernah aktif di Lembaga Dakwah Fakultas (LDF). Selanjutnya penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank BRI Cabang Bulukumba Selama 2 bulan.