

FORMULASI DAN UJI EFEKTIFITAS ANTIOKSIDAN KRIM EKSTRAK

ETANOL DAUN KERSEN (*Muntingia Calabura L*)

DENGAN METODE DPPH



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

FITRIANI TAMU

NIM. 70100113020

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN KRIM EKSTRAK
ETANOL DAUN KERSEN (*Muntingia Calabura L*)
DENGAN METODE DPPH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FITRIANI TAMU
NIM. 70100113020

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Tamu
NIM : 70100113020
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 01 Maret 1994
Jurusan : Farmasi
Alamat : Perumahan Bukit Garaganti Graha Blok C3
Judul : Formulasi dan uji efektivitas antioksidan krim ekstrak etanol
daun kersen (*Muntingia Calabura L*) dengan metode DPPH

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, Agustus 2017

Penyusun,

FITRIANI TAMU
NIM. 70100113020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi Dan Uji Efektivitas Antioksidan Krim Ekstrak Daun Kersen (*Muntingia calabura L.*) Dengan Metode DPPH” yang disusun oleh Fitriani Tamu, NIM: 70100113020, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 21 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **28 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, **21 Agustus 2017 M**
28 Dzulqa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)
Sekretaris : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)
Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing II : Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Penguji I : Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. (.....)

Dekan,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran **ALLAH SWT**, karena atas hidayah dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita **MUHAMMAD SAW**, yang telah menuntun umat ke jalan yang lurus dengan ajaran Islam yang dibawanya.

Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesainya, penulis banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi berkat usaha yang sungguh-sungguh dan adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan itu dapat teratasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **H.Tamu** dan Ibunda **Hj. Husnaini** yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat keluarga saudaraku tercinta , Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun

FITRIANI TAMU
NIM : 70100113020

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian	4-5
1. Definisi operasional	4
2. Ruang lingkup penelitian	5
D. Kajian pustaka.....	5-6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8-34
	A. Uraian Tanaman	8
	B. Nama Daerah.....	8
	C. Morfologi.....	8
	D. Kandungan Kimia.....	9
	E. Kegunaan.....	9
	F. Metode Penyarian.....	9-10
	G. Ekstraksi.....	10
	H. Tujuan Ekstraksi.....	10-11
	I. Kulit.....	11-16
	J. Proses Penuaan Kulit.....	16-17
	K. Radikal Bebas dan Antioksidan.....	17-20
	L. Metode DPPH.....	21
	M. Krim.....	21-28
	N. Spektrofotometer UV-VIS.....	29-30
	O. Tinjauan Islam.....	30-33
BAB III	Metodologi Penelitian	34-39
	A. sJenis dan Lokasi Penelitian.....	34
	1..Jenis Penelitian.....	34
	2..Lokasi Penelitian.....	34
	B. Populasi dan Sampel	34
	C. Alat dan Bahan.....	35

D. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan	35-39
E. Validasi dan Reabilitas Instrumen	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40-44
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan.....	40-44
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
KEPUSTAKAAN	46-47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	48-64
BIOGRAFI.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Anatomi Kulit	12
Gambar 2	Pohon Kersen (<i>Muntingia Calabura L</i>).....	60
Gambar 3	Proses Pengeringan.....	60
Gambar 4	Proses Maserasi	61
Gambar 5	Penimbangan Ekstrak Kental.....	61
Gambar 5	Sediaan Krim Formula I	62
Gambar 6	Sediaan Krim Formula II.....	62
Gambar 7	Sediaan Krim Formula III.....	63
Gambar 8	Sediaan Krim Formula IV.....	63
Gambar 9	Sediaan Krim Formula V.....	64
Gambar 10	DPPH.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja Daun Kersen (<i>Muntingia Calabura L</i>).....	49
Lampiran 2	Skema Kerja Formulasi Krim Ekstrak Daun Kersen	50
Lampiran 3	Skema Kerja Pembuatan Kurva baku DPPH	51
Lampiran 4	Skema Kerja Uji Larutan Kontrol	52
Lampiran 5	Skema Kerja Pembuatan Larutan DPPH dan Penentuan Panjang Gelombang Maksimum DPPH.....	53
Lampiran 6	Pengukuran Aktivitas Antioksidan	54
Lampiran 7	Perhitungan Bahan.....	55-57
Lampiran 8	Perhitungan persen inhibisi krim anti aging.....	58-60
Lampiran 9	Gambar.....	61-65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rancangan Formula Krim.....	37
Tabel 2	Hasil Pengukuran Efektivitas Antioksidan dengan metode DPPH	41
Tabel 3	HLB butuh.....	56
Tabel 4	Absorbansi DPPH pada Krim Ekstrak Daun Kersen	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Panjang Gelombang Maksimum DPPH.....	64
----------	--------------------------------------	----

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Formulasi dan uji efektivitas antioksidan krim ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia Calabura L*) dengan metode DPPH**
Nama Penyusun : **Fitriani Tamu**
NIM : **70100113020**

Telah dilakukan penelitian formulasi dan uji efektivitas antioksidan krim ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura L*) dengan metode DPPH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura L*) terhadap DPPH dan untuk mengetahui berapa konsentrasi ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura L*) yang efektif sebagai antioksidan pada sediaan krim. Daun kersen (*Muntingia calabura L*) di ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dan dibuat sediaan krim menggunakan variasi konsentrasi ekstrak pada formula I, II, dan III berturut-turut 0,03%, 0,3%, dan 3%. Kemudian di uji aktivitas antioksidannya terhadap DPPH dan dihitung rata-rata persen peredaman pada formula I, II, dan III berturut-turut 23,26%, 45,12% dan 55,28%. Dari ketiga formula yang paling efektif aktivitas antioksidannya yaitu pada konsentrasi ekstrak 3%.

Kata kunci : Daun kersen (*Muntingia calabura L*) antioksidan, Radikal bebas, DPPH

ABSTRACT

Title : Formulation and test of antioxidant cream extract ethanol leaf of chery (*Muntingia Calabura L*) with method of DPPH.
Name : Fitriani Tamu
NIM : 70100113020

A research have been done formulations and test the effectiveness of ethanol leaf extract antioxidant cream chery (*Muntingia Calabura L*) by DPPH method. This study aims to determine the antioxidant activity cream preparation containing ethanol extract of leaves chery (*Muntingia Calabura L*). is effective as an antioxidant the cream preparation. Kersen (*Muntingia Calabura L*) was extracted by maceration using 96% formula I, II and III respectively 0,03%, 0,3%, and 3%. Then tested antioxidant activity 23,26%, 45,12% and 55,28%. Of the three most effective formula that antioxidant activity at a concentration 3% extract.

Keywords: Extract cherry (Muntingia Calabura L) free radicals, DPPH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terbebas dari senyawa radikal bebas asap rokok, paparan sinar matahari berlebih, obat-obat tertentu, racun dan polusi udara merupakan beberapa sumber pembentuk senyawa radikal bebas. Senyawa ini merupakan molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Elektron yang tidak berpasangan ini menyebabkan radikal bebas menjadi senyawa yang sangat reaktif terhadap sel-sel tubuh mencari pasangan dengan cara mengikat elektron molekul sel (Wijaya. 1996: 12). Radikal bebas dalam jumlah normal bermanfaat bagi kesehatan sementara dalam jumlah berlebih mengaibatkan stress oksidatif. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan oksidatif mulai dari tingkat sel, jaringan hingga ke organ tubuh yang mempercepat terjadinya proses penuaan dan munculnya penyakit. Oleh karena itu antioksidan dibutuhkan untuk dapat menunda atau menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas (Niken widiastuti.2010: 9).

Dewasa ini, penggunaan senyawa antioksidan baik secara sistemik maupun lokal semakin digemari karena dipercaya dapat mencegah berbagai macam penyakit serta melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Penggunaan antioksidan topikal banyak ditemui pada sediaan kosmetik (Trifena, 2012: 12). Sediaan kosmetik perawatan kulit sangat diperlukan untuk melindungi kulit sangat sensitif terhadap peradangan, kanker dan penuaan dini yang disebabkan oleh efek oksidatif radikal bebas (wahyuni, 2005: 3).

Penuaan kulit yang bersifat irreversibel dimulai pada usia 20 tahun, meskipun tanda-tanda tidak terlihat dalam waktu yang lama. Penuaan pada kulit merupakan suatu proses biologis yang dihasilkan dari penuaan intrinsik (dari dalam tubuh seperti genetik) dan perubahan yang berkembang seiring waktu serta dampak ekstrinsik disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor ekstrinsik sangat berperan dalam penuaan adalah ekspresi wajah repetitive, posisi tidur yang buruk, merokok dll. Tanda-tanda eksternal dari penuaan kulit yakni kerutan halus, kulit tipis dan transparan, bintik-bintik pigmen, kulit kendur, kulit kering dengan atau tanpa gatal, ketidak mampuan untuk berkeringat cukup, rambut berubah, rambut rontok, rambut yang tidak diinginkan, penipisan lempeng kuku, hilangnya kuku setengah bulan dll (Mackiewicz and Rimkevicius. 2008: 103).

Sediaan yang beredar di masyarakat adalah krim. Krim merupakan bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kelebihan krim dari sediaan yang lain yaitu praktis, mudah menyebar rata, mudah dibersihkan atau dicuci, tidak lengket terutama tipe m/a, dan bahan untuk pemakaian topikal tidak cukup beracun (Ansel, 2008: 515).

Akhir-akhir ini banyak dikembangkan penelitian yang berfokus pada bahan alam, termasuk penelitian di bidang industri kosmetik. Manfaat bahan alam yang dapat diambil antara lain sifat antioksidannya yang dapat menghambat radikal bebas sehingga antioksidan digunakan untuk mencegah penuaan dini. Secara alami beberapa jenis tumbuhan merupakan antioksidan, hal ini dapat ditemukan pada beberapa jenis sayuran, buah-buahan segar beberapa jenis tumbuhan dan rempah-rempah. Tanaman dan buah-buahan terbukti berpotensi sebagai antioksidan karena

mengandung berbagai zat seperti karoten, flavonoid dan komponen fenolik lain, serta vitamin C dan E (Praksh, 2001: 4).

Menurut cerita rakyat, daun kersen dapat direbus atau direndam dalam air untuk mengurangi pembengkakan kelenjar prostat, sebagai obat untuk menurunkan panas, menghilangkan sakit kepala, flu dan mengobati penyakit asam urat, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik, antioksidan, antimikroba, anti inflamasi (mengurangi radang), anti diabetes, dan anti tumor (Siddiqua et al.2010: 23).

Daun kersen mengandung kelompok senyawa atau lignin antara lain flavonoid, tannin, triterpen, saponin, dan polifenol yang menunjukkan aktivitas antioksidatif (Priharyanti. 2007: 53). Aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan oleh bagian daun. Berbagai komponen senyawa fenolik pada daun kersen ini, diduga berpotensi sebagai antioksidan yang kuat. Ekstrak etanol 96% daun kersen tua memiliki aktivitas antioksidan sebesar 18,214 mg/L (Kuntorini DKK. 2010:15).

Allah swt brfirman. Dalam Al-Qur'an surah As-Sajadah ayat 27

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

Ayat di atas menjelaskan bahwa berbagai tumbuhan diciptakan oleh Allah tanpa mau berfikir dan berusaha untuk meningkatkan nilai tambah ciptaannya serta mengembangkannya menjadi suatu ilmu pengetahuan.

Berdasarkan literatur diatas bahwa daun kersen memiliki banyak khasiat salah satunya sebagai antioksidan, maka dilakukan penelitian mengenai formulasi dan efektivitas sediaan krim ekstrak etanol 96% daun kersen sebagai antioksidan dengan menggunakan metode DPPH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sediaan krim ekstrak etanol 96% daun kersen (*Muntingia Calabura* L.) memiliki efektifitas antioksidan?

2. Berapakah konsentrasi krim ekstrak etanol 96% daun kersen (*Muntingia Calabura* L.) yang efektif sebagai antioksidan?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

b. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar.

c. Antioksidan adalah semua bahan yang dapat menunda atau mencegah kerusakan akibat oksidasi pada molekul sasaran.

d. Metode DPPH adalah suatu senyawa radikal nitrogen. Metode DPPH mudah digunakan, cepat, cukup teliti dan mudah untuk mengukur kapasitas antioksidan

dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu.

e. Kulit adalah salah satu organ yang membungkus seluruh bagian tubuh, sehingga kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahan yang berbahaya, dan kulit juga merupakan salah satu organ yang paling luas permukaannya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada penentuan konsentrasi ekstrak yang efektif sebagai antioksidan pada ekstrak daun kersen yang dibuat sediaan krim antioksidan dengan menggunakan metode DPPH.

D. Kajian Pustaka

1. Isolasi senyawa antioksidan ekstrak metanol daun kersen (*Muntingia Calabura* L.). Nenden nurhasanah. 2012. Tanaman kersen (*Muntingia calabura* L) dapat dengan mudah ditemui di Indonesia. Tanaman ini kaya akan flavonoid, flavon dan flavanon. Salah satu manfaat flavonoid adalah sebagai antioksidan. Telah dilakukan isolasi senyawa antioksidan dari daun kersen yang diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut campuran metanol-air selanjutnya difraksinasi menggunakan pelarut air, n- heksana dan etil asetat. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun Kersen yaitu alkaloid, polifenol, tanin, flavonoid, monoterpen-seskuiterpen, steroid-triterpenoid, kuinon serta saponin.

2. Efek pemberian ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia Calabura* L.) terhadap kadar asam urat serum tikus putih (*Rattus norvegicus* L.) galur wistar hiperurikemia. Veronika Yanik Sulistyowati. 2009. Daun kersen mengandung quercetin yang dapat menurunkan kadar asam urat dengan menghambat aktivitas xanthine oxydase. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh daun kersen ekstrak etanol terhadap kadar asam urat serum tikus jantan hyperuricemic dan untuk mengetahui dosis yang paling efektif daun kersen ekstrak etanol yang dapat menurunkan tingkat serum asam urat dari tikus jantan hyperuricemic.

3. Struktur anatomi dan uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun kersen. Evi Mintowati Kuntorini 2013. Kersen (*Muntingia calabura* L.) merupakan tumbuhan yang banyak dijumpai, pohonya yang rindang biasanya digunakan sebagai peneduh. Berdasarkan hasil penelitian daun kersen mengandung berbagai senyawa bioaktif yaitu senyawa flavonoid, saponin, triterpen, steroid, dan tannin.

4. Efek ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia Calabura* L.) terhadap penghambatan peningkatan kadar gula darah pada tikus putih jantan galur wistar. Erna apriyanti. 2016. Diabetes mellitus adalah gangguan, di mana tingkat gula (glukosa) dalam darah tinggi karena tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh. Ekstrak etanol kersen (*Muntingia calabura* L.) Daunnya mengandung flavonoid yang diyakini memiliki efek dalam menurunkan kadar gula darah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan efek extracted kersen (*Muntingia calabura* L.) daun dalam mencegah peningkatan kadar gula darah pada tikus putih jantan dari keturunan Wistar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menentukan efektifitas antioksidan krim ekstrak etanol 96% daun kersen (*Muntingia Calabura L.*)
- b. Menentukan konsentrasi krim ekstrak etanol 96% (*Muntingia Calabura L.*) yang efektif sebagai antioksidan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Diperolehnya bahan aktif antioksidan dari ekstrak daun kersen (*Muntingia Calabura L.*) untuk sediaan krim dan diharapkan dapat menjadi alternatif bahan antioksidan alami untuk sediaan krim.
- b. Diperoleh data ilmiah mengenai sediaan krim yang mengandung ekstrak daun kersen (*Muntingia Calabura L.*) sebagai antioksidan serta dapat menunjang pengembangan dan pemanfaatannya khususnya dibidang kesehatan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tanaman kersen

1. Klasifikasi Tanaman

Kingdom : Plantae
Super divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Malvales
Suku : Tiliaceae
Genus : *Muntingia*
Spesies : *Muntingia calabura* L.

(Steenis et al. 2005).

2. Nama Daerah

Tanaman daun kersen memiliki beragam nama daerah yakni Jakarta (ceri), Lumajang (baleci), Filipina (datiles), Vietnam (matsam), Laos (khum somz), Thailand (takhop farang), Malaysia (kerupuk siam), Spanyol (nigua), Inggris (cherry), Talok (Jawa), Ceri (Kalimantan) Karseng (Bugis) (Raina. 2011).

3. Morfologi

Berperawakan pohon kecil yang selalu hijau, tingginya 3-12 m. Percabangannya mendatar, menggantung ke arah ujung, berbulu halus-halus. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur sampai berbentuk lanset, dengan pangkal lembaran daun yang nyata tidak simetris, tepi daun bergerigi, lembaran daun bagian bawah berbulu kelabu. Bunga-bunga terletak pada satu berkas yang letaknya supra-

aksilar dari daun, bersifat hermafrodit. Buahnya bertipe buah buni, berwarna merah kusam, berdiameter 15 mm, berisi beberapa ribu biji yang kecil, terkubur dalam daging buah yang lembut (Raina. 2011).

4. Kandungan kimia

Kandungan kimia daun kersen yaitu flavonoid, ester, alkohol, sesquiterpen, ester, derivat furan (Lim. 2012).

5. Kegunaan

Kegunaan daun kersen yaitu: mengobati asam urat, menyembuhkan diabetes, antioksidan, meredakan gejala flu, mengatasi kejang atau kaku dibagian saluran pencernaan akibat gastritis dan diare, anti bakteri atau antiseptik, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengatasi infeksi, anti tumor, meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan sakit kepala, pembunuh mikroba, mencegah dan menyembuhkan batuk, mengatasi radang (Andareto. 2015: 57).

B. Metode Penyarian

Penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari, sehingga terjadi larutan zat aktif dalam cairan penyari tersebut. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari makin luas. Dengan demikian maka makin halus serbuk simplisia seharusnya makin baik penyariannya.

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang

diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Septiningsih, 2008: 24).

1. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya (Fachruddi, 2001: 19).

2. Tujuan ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan dan biota laut dengan pelarut organik tertentu. Dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan antara konsentrasi di dalam dan konsentrasi di luar sel, mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen POM, 1995: 9).

3. Ekstraksi secara maserasi

Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif,


zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan yang terpekat di desak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan (Dirjen POM, 1995:10).

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, strirak dan lain-lain. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air etanol atau pelarut lain. Bila cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian.

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut-pelarut organik dengan kepolaran yang semakin meningkat secara berurutan. Pelarut yang digunakan pada saat ekstraksi harus memenuhi syarat tertentu yaitu tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harganya murah, tidak korosif, aman, dan tidak mudah meledak.

C. Kulit

Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit disebut juga integument atau kutis, tumbuh dari dua macam jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam). Kulit merupakan organ yang paling luas sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, cahaya matahari, mikroorganisme dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan (Syaifuddin. 2012: 48).



Gambar 1 Anatomi Kulit

a. Lapisan

1. Epidermis

Epidermis adalah bagian terluar kulit. Bagian ini tersusun dari jaringan epitel skuamosa bertingkat yang mengalami keratinisasi, jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah, dan sel-selnya sangat rapat. Bagian epidermis yang paling tebal dapat ditemukan pada pada telapak tangan dan telapak kaki yang mengalami stratifikasi menjadi lima lapisan berikut:

a. Stratum basalis

Stratum basalis (germinativum) adalah lapisan tunggal sel-sel yang melekat pada jaringan ikat dari lapisan kulit dibawahnya, dermis. Pembelahan sel yang cepat berlangsung pada lapisan ini, dan sel baru di dorong masuk ke lapisan berikutnya.

b. Stratum spinosum

Stratum spinosum adalah lapisan sel spina atau tanduk, disebut demikian karena sel-sel tersebut disatukan oleh tonjolan yang menyerupai spina. Spina adalah bagian penghubung intraseluler yang disebut desmosome.

c. Stratum granulosum

Stratum granulosum terdiri dari tiga atau lima lapisan atau barisan sel dengan granula-granula keratohialin yang merupakan prekursor pembentukan keratin.

1. Keratin adalah protein keras dan resilen, anti air serta melindungi permukaan kulit yang terbuka.
2. Keratin pada lapisan epidermis merupakan keratin lunak yang berkadar sulfur rendah. Berlawanan dengan keratin yang ada pada kuku dan rambut.
3. Saat keratohialin dan keratin berakumulasi, maka nucleus sel berdisintegrasikan, menyebabkan kematian sel.

d. Stratum lusidum

Stratum lusidum adalah lapisan jernih dan tembus cahaya dari sel-sel gepeng tidak bernukleus yang mati atau hampir mati dengan ketebalan empat sampai tujuh lapisan sel.

e. Stratum korneum

Stratum korneum adalah lapisan epidermis teratas, terdiri dari 25 sampai 30 lapisan sisik tidak hidup yang sangat terkeratinisasi dan semakin gepeng saat mendekati permukaan kulit. Epidermis tipis yang melapisi seluruh tubuh, kecuali

pada telapak tangan dan telapak kaki, tersusun hanya dari lapisan basalis dan korneum.

1. Permukaan terbuka dari stratum korneum mengalami proses pergantian ulang yang konstan atau deskuamasi.
2. Ada pembaharuan yang konstan pada sel yang terdeskuamasi melalui pembelahan sel di lapisan basalis. Sel tersebut bergerak ke atas, ke arah permukaan, mengalami keratinisasi, dan kemudian mati. Dengan demikian, seluruh permukaan tubuh terbuka di tutup oleh lembaran sel epidermis mati.
3. Keseluruhan lapisan epidermis akan diganti dari dasar ke atas setiap 15 sampai 30 hari.

2. Dermis

Dermis dipisahkan dari lapisan epidermis dengan adanya membran dasar, atau lamina. Membran ini tersusun dari dua lapisan jaringan ikat.

a. Lapisan papiler

Lapisan papiler adalah jaringan ikat areolar renggang dengan fibroblas, sel mast, dan makrofag. Lapisan ini mengandung banyak pembuluh darah, yang memberi nutrisi pada epidermis di atasnya.

1. Papilla dermal serupa jari, yang mengandung reseptor sensorik taktil dan pembuluh darah, menonjol ke dalam lapisan epidermis.
2. Pada telapak tangan dan telapak kaki, papilla yang ada sangat banyak dan tinggi, jumlahnya sekitar 65.000 / inci persegi ($10.400/\text{cm}^2$).

3. Pola tonjolan dan guratan pada telapak tangan dan telapak kaki pada setiap orang sangat unik dan mencerminkan pengaturan papilla dermal. Kegunaan guratan tangan adalah untuk mempermudah pengengaman melalui peningkatan friksi.

b. Lapisan retikular

Lapisan retikular terletak lebih dalam dari lapisan papilar. Lapisan ini tersusun dari jaringan ikat ireguler yang rapat, kolagen dan serat elastik. Sejalan dengan penambahan usia, deteriorasi normal pada simpul kolagen dan serat elastik mengakibatkan pengeriputan kulit.

3. Lapisan subkutan

Lapisan subkutan atau hypodermis (fasia superfisial) mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Lapisan ini mengandung jumlah sel lemak yang beragam, bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh darah ujung saraf.

b. Warna

1. Melanosit

Terletak pada stratum basalis, memproduksi pigmen, melanin yang bertanggung jawab untuk pewarnaan kulit dari coklat sampai hitam.

a. Pada rentang yang terbatas, melanin melindungi kulit dari sinar ultraviolet matahari yang merusak. Peningkatan produksi melanin (tanning) berlangsung jika terpajan sinar matahari.

b. Jumlah melanosit (sekitar $1.000/\text{mm}^2$ sampai $2.000/\text{mm}^2$) tidak bervariasi antar ras, tetapi perbedaan genetik dalam besarnya jumlah produksi melanin dan pemecahan pigmen yang lebih melebar mengakibatkan perbedaan ras.

c. Putting susu, areola dan area sirkumanal, skrotum, penis, dan labia mayora, adalah daerah tempat terjadinya pigmentasi yang besar, sedangkan telapak tangan dan telapak kaki mengandung sedikit pigmen.

2. Darah

Darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Ini lebih jelas terlihat pada kulit putih (caucasian).

3. Keberadaan dan jumlah pigmen kuning, karotin, hanya ditemukan pada stratum korneum, dan dalam sel lemak dermis dan hypodermis, yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit (Sloane. 2004: 84-86).

D. Proses Penuaan Kulit

Proses penuaan antara lain tampak dari kerutan dan keriput pada kulit atau kemunduran lain ketika masih muda. Ada dua teori yang dapat menjelaskan proses penuaan yakni, penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari oleh semua makhluk hidup, dan penuaan adalah akibat kerusakan anatomi maupun fisiologi pada semua organ tubuh, mulai dari pembuluh darah dan organ tubuh lainnya sampai kulit.

Perubahan akibat proses penuaan yang terjadi pada kulit dapat dibagi atas perubahan anatomi, fisiologis, serta kimiawi. Beberapa perubahan anatomi dapat

terlihat langsung, seperti hilangnya elastisitas kulit dan fleksibilitas kulit yang menyebabkan timbulnya kerut dan keriput, berkurangnya jumlah rambut dikepala walaupun pada wanita justru sering tumbuh kumis atau rambut panjang di leher atau pipi, hiperpigmentasi dan tumor kulit terutama di usia 40 tahun ke atas akibat terlalu lama terpapar sinar matahari, penebalan kulit, epidermis kering dan pecah-pecah, perubahan bentuk kuku dan rambut dan sebagainya.

Banyak faktor yang mempengaruhi penuaan kulit tetapi yang terkuat adalah sinar matahari (photoaging), khususnya sinar UV yang terdapat di dalam sinar matahari. Knox et al menemukan perbedaan yang nyata antara kulit yang tidak tertutup pakaian sehingga sering terpapar sinar matahari dan kulit yang sering tertutup pakaian. Kulit yang terbuka cepat kering, keriput, kasar, dan menderita kerusakan lain akibat sinar UV matahari (Syaifuddin. 2009: 393-395).

E. Radikal Bebas dan Antioksidan

Radikal bebas adalah suatu molekul atau atom yang mempunyai 1 atau lebih elektron tidak berpasangan. Radikal ini dapat berasal dari atom hidrogen, molekul oksigen atau ion logam transisi. Senyawa radikal bebas sangat reaktif dan selalu berusaha mencari pasangan elektron agar kondisinya stabil.

Radikal dapat terbentuk secara endogen dan eksogen. Radikal endogen terbentuk dalam tubuh melalui proses metabolisme normal di dalam tubuh. Sementara radikal eksogen berasal dari bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, pencernaan, dan penyerapan kulit. Radikal bebas dalam jumlah normal bermanfaat bagi kesehatan misalnya memerangi peradangan, membunuh bakteri, dan mengendalikan tonus otot polos pembuluh darah serta organ-organ dalam


tubuh. Sementara dalam jumlah berlebih mengakibatkan stress oksidatif. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan oksidatif mulai dari tingkat sel, jaringan, hingga ke organ tubuh yang mempercepat terjadinya proses penuaan dan munculnya penyakit. Oleh karena itu, antioksidan dibutuhkan untuk dapat menunda atau menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas (Niken widiastuti, 2010: 9).

Dalam rangka mendapatkan stabilitas kimia, radikal bebas tidak dapat mempertahankan bentuk asli dalam waktu lama dan segera berikatan dengan bahan sekitarnya. Radikal bebas akan menyerang molekul stabil yang terdekat dan mengambil elektron, zat yang terambil elektronnya akan menjadi radikal bebas juga sehingga akan memulai suatu reaksi berantai, yang akhirnya terjadi kerusakan sel tersebut. Antioksidan mampu menstabilkan atau menonaktifkan, radikal bebas sebelum mereka menyerang sel-sel. Antioksidan penting untuk mempertahankan optimal seluler dan sistemik (Sjamsul, 2010: 2).

Antioksidan merupakan semua bahan yang dapat menunda atau mencegah kerusakan akibat oksidasi pada molekul sasaran (Winarno, 1997). Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi lemak. Untuk mempermudah pemahaman tentang mekanisme kerja antioksidan perlu dijelaskan lebih dahulu mekanisme oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap utama yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi (Sjamsul, 2010: 4).


Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari hilangnya satu atom hydrogen (reaksi 1). Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi, radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi (

Reaksi 2). Radikal peroksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru (Reaksi 3).



Mekanisme reaksi antioksidan

Hidropeoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton yang bertanggung jawab atas flavor makanan berlemak. Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan mengalami terminasi melalui reaksi antar radikal bebas membentuk kompleks bukan radikal (reaksi 4)



Antioksidan yang baik bereaksi dengan radikal asam lemak segera setelah senyawa tersebut terbentuk. Dari berbagai antioksidan yang ada, mekanisme kerja serta kemampuannya sebagai antioksidan sangat bervariasi. Seringkali, kombinasi beberapa jenis antioksidan memberikan perlindungan yang lebih baik (sinergisme) terhadap oksidasi dibanding dengan satu jenis antioksidan saja. Sebagai contoh asam askorbat seringkali dicampur dengan antioksidan yang merupakan senyawa fenolik untuk mencegah reaksi oksidasi lemak. Antioksidan adalah senyawa yang dapat

menunda atau menghambat oksidasi lemak atau molekul lainnya dengan menghambat inisiasi atau propagasi bereaksi oksidasi (Sjamsul, 2010: 2005).

Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas yang dapat menimbulkan stress oksidatif (Sjamsul, 2010: 7). Antioksidan yang dikenal ada yang berupa enzim dan ada yang berupa mikronutrien. Enzim antioksidan dibentuk dalam tubuh, yaitu superoksida dismutase (SOD), glutathionperoksida, katalase, dan glutathion reduktase. Sedangkan antioksidan yang berupa mikronutrien dikenal tiga yang utama yaitu: b-karoten, vitamin C dan vitamin E. B-caroten merupakan oksigen tunggal, vitamin C pemulung superoksida dan radikal bebas yang lain.

Berdasarkan fungsinya, antioksidan dapat dibagi menjadi:

- a. Tipe pemutus rantai reaksi pembentuk radikal bebas, dengan menyumbangkan atom H, misalnya vitamin E.
- b. Tipe pereduksi, dengan mentransfer atom H atau oksigen, atau bersifat pemulung, misalnya vitamin C.
- c. Tipe pangkat logam, mampu mengikat zat peroksidan, seperti Fe^{2+} dan Cu^{2+} misalnya flavonoid.
- d. Antioksidan sekunder, mampu mendekomposisi hidroperoksida menjadi bentuk stabil, pada manusia dikenal SOD, katalase, glutathion peroksidase (Sjamsul, 2010).

F. Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl)

Metode DPPH (1,1 difenil-2-Picrylhydrazyl) merupakan senyawa radikal nitrogen. DPPH akan mengambil atom hidrogen yang terdapat dalam suatu senyawa fenol. Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini berlangsung melalui transfer elektron. Larutan DPPH yang berwarna ungu memberikan serapan absorbansi maksimum pada 515,5 nm. Larutan DPPH ini akan mengoksidasi senyawa dalam ekstrak tanaman. Proses ini ditandai dengan memudarnya warna larutan dari ungu menjadi kuning (Widyastuti, 2010: 14).

Metode DPPH mudah digunakan, cepat, cukup teliti dan murah untuk mengukur kapasitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas 1,1 difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH). Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu. Elektron bebas dalam radikal DPPH memberikan absorbansi maksimum pada 517 nm dan berwarna ungu (Praksh et al, 2001: 1-2).

G. Krim

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar tersesuai. Istilah ini secara tradisonal telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air (Depkes RI, 1995: 6).

Pada formulasi krim, ada dua tipe basis yang digunakan yaitu minyak dalam air (M/A) atau air dalam minyak (A/M). Pemilihan basis didasarkan atas tujuan penggunaannya dan jenis bahan yang akan digunakan (Lachman, 1994: 1111).

Komposisi dari sediaan krim adalah emulgator, yang merupakan surfaktan yang mengurangi tegangan antar muka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan-tetesan terdispersi dengan lapisan kuat sehingga mencegah koalesensi dan pemecahan fase terdispersi (Parrot, 1971: 313).

Komponen krim terdiri dari bahan dasar, bahan aktif dan bahan tambahan. Bahan dasar terdiri dari fase minyak, fase air dan emulgator atau surfaktan. Emulgator dan surfaktan berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase yang tidak saling bercampur, sedangkan bahan tambahannya meliputi pengawet, pengkhelat, pengental, pelembab, pewarna, dan pewangi.

1. Komposisi krim

1. Fase Minyak

Fase minyak atau fase lipofil (hidrofobik) adalah minyak mineral atau minyak tumbuhan atau lemak (minyak lemak, paraffin, vaselin, lemak coklat, malam bulu domba) (Voight, 1995:).

a. Asam stearat

Rumus molekul : $C_{18}H_{36}O_2$

Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari lemak. Merupakan zat padat, Kristal mengkilat, menunjukkan susunan hablur, putih, atau kuning pucat, mirip lemak lilin, praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol (95%) P, dalam 2 bagian kloroform P, suhu lebur tidak kurang dari 54° C. asam stearat merupakan bahan pengemulsi. Digunakan luas secara oral dan topikal dalam formulasi. Untuk penggunaan topikal asam stearat digunakan sebagai bahan

pengemulsi. Digunakan umumnya karena tidak toksik dan tidak mengiritasi (Kibbe A.H, 2000: 534).

b. Setil alkohol

Rumus molekul : $C_{16}H_{34}O$

Setil alkohol merupakan lilin, putih, granul, persegi,. Memiliki bau dan rasa yang khas. Setil alkohol yang digunakan dalam sediaan farmasi merupakan alkohol alifatik padat yang umumnya. Setil alkohol umumnya digunakan dalam bidang farmasi dan kosmeik, seperti emulsi, krim dan salep. Dalam emulsi M/A setil alkohol dapat meningkatkan stabilitas dari emulsi. Memiliki titik lebur 45° - 52° C (Kibbe A.H, 2000: 117).

c. Paraffin

Cairan kental transparan, tidak berwarna, bebas dari fluoresensi pada cahaya matahari. Praktis tidak berasa dan tidak berbau ketika ketika dingin dan mempunyai bau lemah ketika dipanaskan. Praktis tidak larut dalam etanol (95%), gliserin dan air. Larut dalam aseton, benzen, kloroform, karbon disulfid, eter dan eter minyak tanah. Berfungsi sebagai emolient, pelarut (Kibbe A.H, 2000).

d. Adeps lanae

Cairan jernih, tidak berasa, tidak berwarna. Praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam kloroform dan eter. Berfungsi sebagai peningkat konsistensi (Kibbe A. H, 2000).

2. Emulgator

Emulgator (zat pengemulsi) merupakan komponen paling penting agar memperoleh emulsi yang baik.

a. Polisorbat 60

Rumus molekul : $C_{64}H_{126}O_{26}$

Polisorbat memiliki karakteristik berbau dan hangat, kadang-kadang rasa menggigit, berwarna kuning, cairan berminyak. Digunakan sebagai bahan pengemulsi non ionik tipe M/A. Pada konsentrasi 1-15%, sedangkan dalam kombinasi 1-10%, memiliki HLB butuh yaitu 14,9%. Berfungsi sebagai emulgator untuk fase air (Kibbe A. H, 2000: 416).

b. Sorbitan 60

Rumus molekul : $C_7OH_{130}O_{30}$

Merupakan bahan pengemulsi non ionik yang dapat dikombinasikan dengan bahan pengemulsi lain dengan konsentrasi 1-10%. Banyak digunakan sebagai bahan pengemulsi karena tidak bersifat tidak toksik. Umumnya larut dan bercampur dengan minyak, juga larut dalam kebanyakan pelarut organik, dalam air umumnya tidak larut tetapi terdispersi. Nilai HLB butuh adalah 4,7. Span 60 melebur pada suhu $50^{\circ} - 53^{\circ}C$. Berfungsi sebagai emulgator fase minyak (Kibbe A. H, 2005: 511).

3. Pengawet

Pengawet digunakan pada sediaan, agar sediaan tidak terkontaminasi dengan mikroba.

a. Metil paraben

Rumus molekul : $C_8H_8O_3$

Merupakan serbuk putih, berbau, serbuk higroskopik, mudah larut dalam air. Digunakan sebagai pengawet pada kosmetik, makanan dan sediaan farmasetik. Dapat digunakan sendiri, kombinasi, dengan pengawet paraben lain atau dengan antimikroba lainnya. Lebih efektif terhadap gram negative daripada gram positif. Aktif pada pH antara 6-8. Efektivitas pengawetnya meningkat dengan peningkatan Ph (Kibbe A. H, 2000: 340).

b. Propil paraben

Rumus molekul : $C_{10}H_{12}O_3$

Merupakan kristal putih, berbau dan berasa. Aktif pada range pH 4-8 lebih efektif pada gram positif dibandingkan gram negatif. Untuk penggunaan topikal konsentrasi yang digunakan yaitu 0,001-0,006%. Dapat digunakan sendiri atau kombinasi dengan pengawet paraben lainnya (Kibbe A. H, 2000: 450).

4. Humektan

Gliserin

Rumus molekul : $C_3H_8O_3$

Cairan seperti cairan sirup berwarna, tidak berbau, manis di ikuti rasa hangat, higroskopik. Dapat bercampur dengan air dan dengan etanol (95%) P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam eter P dan minyak lemak. Berfungsi sebagai humektan (Kibbe A. H, 2000).

a. Uji Stabilitas

Sesudah penyimpanan, kestabilan emulsi dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Bentuk kestabilan emulsi selama penyimpanan ditunjukkan dengan terjadinya kriming, perubahan visokitas, perubahan ukuran tetes terdispersi serta inverse fase (Lahman, 1994).

1. Organoleptik

Organoleptik merupakan penilaian mutu produk berdasarkan panca indera manusia melalui saraf sensorik. Penilaian dengan indera banyak digunakan untuk menilai mutu suatu produk terutama produk hasil pertanian dan makanan. Salah satu cara penilaian organoleptik adalah dengan menggunakan uji hedonik. Uji hedonik merupakan penilaian penulis tentang suka atau tidak suka, dapat menerima atau tidak dapat menerima terhadap suatu produk yang diuji. Kriteria yang biasa digunakan dalam penilaian organoleptik terdiri dari rasa, warna, tekstur, dan aroma. Kriming

2. Kriming

Kriming adalah naik atau turunnya tetes-tetes terdispersi membentuk suatu lapisan pada permukaan atau dasar suatu emulsi. Kriming terjadi karena pengaruh gravitasi bumi dan naik atau turunnya tetesan tergantung pada rapat jenis kedua fase. Bila kriming terjadi tanpa penggabungan, maka emulsi dapat diemulsikan kembali dengan penggocokan.

3. Viskositas

Persamaan juga menunjukkan bahwa kecepatan kriming berbanding terbalik dengan viskositas. Viskositas emulsi merupakan kriteria yang penting untuk mempelajari kestabilan emulsi dan tidak berhubungan dengan viskositas absolut tetapi dengan perubahan viskositas pada berbagai periode waktu. Tetesan-tetesan pada emulsi yang dibuat bergabung dengan segera dan menunjukkan peningkatan viskositas. Setelah perubahan ini kebanyakan emulsi menunjukkan perubahan viskositas yang berhubungan dengan waktu. Jika viskositas tidak berubah dengan waktu diterima, emulsi dianggap ideal meskipun kebanyakan sistem masih dapat diterima kestabilannya bila menunjukkan sedikit kenaikan viskositas dalam waktu 400 hari. Kebanyakan emulsi menjadi encer pada suhu tinggi dan mengental bila ditempatkan pada suhu kamar.

4. Perubahan ukuran tetes terdispersi

Perubahan rata-rata ukuran tetes terdispersi atau distribusi ukuran tetes terdispersi merupakan parameter yang penting untuk mengevaluasi suatu emulsi. Analisis ukuran tetes terdispersi dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu adalah pengukuran diameter tetes terdispersi dengan mikroskop yang memberikan nilai rata-rata pada jumlah tetes untuk setiap ukuran.

5. Inverse fase

Emulsi dikatakan membaik ketika perubahan emulsi dari M/A ke A/M atau sebaliknya. Inverse kadang-kadang terjadi dengan penambahan elektrolit atau dengan mengubah rasio volume. Inverse dapat dilihat ketika emulsi disiapkan dengan pemanasan dan pencampuran dua fase kemudian di dinginkan.

Hal ini terjadi kira-kira karena adanya daya larut bahan pengemulsi tergantung pada perubahan temperatur.

6. Daya Sebar

Daya sebar ini merupakan kemampuan penyebaran krim pada kulit. Penentuannya dilakukan dengan perlakuan sampel krim dengan yang baik akan menjamin pelepasan bahan obat yang memuaskan.

7. Kondisi penyimpanan yang dipercepat

Salah satu cara evaluasi kestabilan adalah dengan penyimpanan selama beberapa periode waktu pada temperature yang lebuah tinggi dari normal. Tetapi cara ini khususnya berguna untuk mengevaluasi “ shelf life” emulsi dengan siklus antara dua suhu.

Di dalam laboratorium siklus suhu 5° C dan 40° C dalam 24 jam digunakan selama 24 siklus. Sedangkan siklus lainnya 5° C dan 35° C dalam 12 jam digunakan selama 10 siklus.

Efek normal penyimpanan suatu emulsi pada suhu yang lebih tinggi biasanya adalah mempercepat koalesensi atau terjadinya krimuin dan hal ini biasanya diikuti dengan perubahan kekentalan. Kebanyakan emulsi menjadi lebih encer pada suhu tinggi dan menjadi lebih kental bila dibiarkan mencapai suhu kamar. Pembekuan dapat merusak emulsi dari pada pemanasan, karena kelarutan emulgator baik dalam fase air maupun fase minyak lebih sensitive pada pembekuan dari pada pemanasan (Lahman, 1994).

H. Spektrofotometer UV-VIS

Spektrofotometer UV-Vis adalah analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrument spektrofotometer UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibanding kualitatif (Syifa. 2010: 26-27).

Sinar tampak (Visible) adalah sinar polikromatis yang dengan bantuan monokromator misalnya prisma dapat diuraikan menjadi beberapa sinar monokromatis dengan berbagai panjang gelombang. Analisa spektrofotometri UV-Visible biasanya dilakukan pada panjang gelombang absorpsi maksimum (λ maks) yang didefinisikan sebagai jarak antara dua puncak dari suatu gelombang. Dimana sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200 – 400 nm sedangkan sinar tampak pada panjang gelombang 400 – 800 nm.

Spektrum serapan kandungan tumbuhan dapat diukur dalam larutan yang sangat encer dengan pembanding blanko pelarut serta menggunakan spektrofotometer yang merekam otomatis. Senyawa tanpa warna diukur pada jangka 200 sampai 400 nm, senyawa berwarna pada jangka 200 sampai 700 nm. Panjang gelombang serapan maksimum dan minimum pada spektrum serapan yang diperoleh direkam dalam nm (nano meter), demikian juga kekuatan absorbansinya pada maksimal dan minimal yang khas. Bahan yang diperlukan hanya sedikit saja karena sel spektrofotometri baku (1x1 cm) hanya dapat diisi 3 ml larutan.

Penyerapan sinar UV-visibel oleh suatu molekul akan menyebabkan transisi diantara tingkat energi elektronik dari molekul. Transisi ini dapat terjadi antar orbital ikatan (bonding) atau ikatan anti-bonding. Panjang gelombang yang diserap sebanding dengan perbedaan tingkat energi orbital. Kegunaan utama spektroskopi ini adalah untuk mengidentifikasi jumlah ikatan rangkap/konjugasi aromatik.

Pelarut yang banyak digunakan untuk spektroskopi UV – Visible adalah etanol 96% atau etanol absolut karena kebanyakan golongan senyawa larut dalam pelarut tersebut. Alkohol niaga harus dihindari karena mengandung benzena yang menyerap di daerah UV pendek. Pelarut lain yang sering digunakan ialah air, etanol, heksana, eter minyak bumi, dan eter. Pelarut seperti kloroform dan piridina umumnya harus dihindari karena menyerap kuat di daerah 200-260 nm; tetapi sangat cocok untuk mengukur pigmen tumbuhan, seperti karotenoid, di daerah spektrum tampak.

Pemurnian merupakan suatu keharusan sebelum kita melakukan telah spektrum, dan kandungan tumbuhan yang menunjukkan ciri serapan yang khas harus diulangi pemurniannya sampai ciri tersebut tidak berubah lagi. Spektrum serapan mempunyai nilai khusus pada telah pigmen tumbuhan dan demikianlah halnya, baik untuk bahan pewarna tumbuhan yang larut dalam air maupun yang larut dalam lipid (Sastrohamidjodjo. 2002).

I. Tinjauan Islam tentang Penggunaan Tanaman dan pemanfaatannya dalam menjaga keindahan

Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga, serta kekayaan yang paling mahal harganya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari

oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohania belaka tanpa mengindahkan aspek jasmania.

Allah berfirman dalam QS An-Nahl/16: 11:

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Kementrian agama RI, 2008: 403).

Ayat diatas ditutup dengan kalimat “bagi kaum yang memikirkan” dengan kalimat tersebut dapat di pahami sebagai isyarat Allah kepada ummatnya yang berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam yaitu tumbuh-tumbuhan.

Dalam pandangan Islam, segala ciptaan Allah swt tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang manfaatnya dapat diketahui dari melakukan penelitian-penelitian, termasuk diantaranya adalah tanaman daun kersen.

Di dalam firman Allah swt dalam QS Thaha/20 :53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementrian Agama RI, 2006: 315).

Ayat diatas menyatakan: Dia, yakin Allah, yang telah menjadikan bagi kamu, wahai fir'aun dan seluruh manusia, sebagaimana besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan dia, Tuhan itu juga, yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya (Shihab, 2009: 604-605).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuh-tumbuhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya lebih mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan akarnya (Sandi, 2008: 4).

Menurut pendapat saya ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Allah menjadikan bumi sebagai tempat beraktivitas, juga air dan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Manusia yang mengolah contohnya pada judul skripsi saya tumbuhan diolah menjadi sediaan krim agar dapat dimanfaatkan manusia untuk mencegah radikal bebas ,dan menjaga bumi beserta

isinya dengan baik akan merasakan manfaat yang sangat banyak. Begitupula sebaliknya manusia yang tidak menjaga bumi dan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah akan merasakan penderitaan dan merasa hidupnya sia-sia.

Di dalam firman Allah swt QS Al-Qashash/ 28: 57.

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِنَ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا تَجْبِي
إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

Dan mereka berkata: "Jika Kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami". dan Apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan .Subhanallah, begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak mengharapkan balasan dari makhluk lain (Savitri. 2008: 5).

Menurut pendapat saya ayat ini memerintahkan umat manusia untuk menggunakan potensi yang dimiliki yang membedakan antara manusia dengan hewan, yaitu akal. Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal mereka untuk merenungi betapa besar nikmat Allah swt yang telah diberikan kepada manusia. Alangkah tidak wajarnya jika kita tidak mempunyai rasa terima kasih kepada Allah swt yaitu dengan menjaga apa yang telah ada di bumi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara experimental dengan metode DPPH, menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis untuk melihat aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol 96% daun kersen (*Muntingia calabura* L.).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Farmasetik dan Laboratorium Analisis Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan dan laboraturium Kimia Fakultas Sains dan Tekhnologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pohon kersen (*Muntingia calabura* L.) diambil dari Makassar BTP Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kersen (*Muntingia calabura* L) diambil dari Makassar BTP Sulawaesi Selatan.

C. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan adalah labu tentukur 10 ml dan 100 ml, rotavapor, spektrofotometer UV-Vis, timbangan analitik.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah air suling, ekstrak daun kersen, DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl), etanol 96%, kertas watman, etanol p.a, aluminium foil, asam stearat, paraffin cair, gliserin, metil paraben, propil paraben, vitamin E p.a, setil alkohol, span 80, tween 80, dan adeps lanae.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penyiapan sampel

a.) Sampel

Sampel daun kersen diambil dari Makassar BTP, Sulawesi Selatan.

b.) Pengolahan Sampel

Sampel daun kersen diambil dan dipisahkan dari tangkai kemudian dibersihkan, dan dicuci dengan air bersih yang mengalir. Setelah itu sampel dikeringkan, kemudian dipotong-potong kecil dan selanjutnya dihaluskan, sampel siap diekstraksi.

c.) Ekstraksi Sampel

Sampel daun kersen (*Muntingia calabura* L.) yang telah kering ditimbang sebanyak 450 gr dimasukkan kedalam wadah maserasi, dibasahi dengan etanol 96% hingga terendam semua sambil diaduk, didiamkan selama 1 jam, kemudian

ditambahkan etanol 96% hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 2 x 24 jam di tempat yang tanpa pemaparan sinar matahari sambil diaduk, selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas di ekstraksi kembali dengan pelarut etanol 96%. Hal ini dilakukan selama 2 x 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan, di pekatkan dan cairan penyaringnya diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol kental.

a.)Rancangan Formula

Tabel 1. Rancangan formula krim

Bahan	Kegunaan	Formula krim antioksidan (%)				
		FI	F II	F III	F IV (-)	F V (+)
Ekstrak daun kersen	Zat aktif	0,03	0,3	3	-	-
Vitamin E	Pembanding	-	-	-	-	0,05
Paraffin cair	Pembentuk massa	5	5	5	5	5
Asam stearate	Penstabil	5	5	5	5	5
Setil alcohol	Pengemulsi	5	5	5	5	5
Gliserin	Emollient	15	15	15	15	15
Adeps lanae	Basis	5	5	5	5	5
Tween 80	Emulgator	5	5	5	5	5
Span 80	Emulgator	5	5	5	5	5
Metilparaben	Pengawet	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Propil paraben	Pengawet	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Air suling	Pelarut	100	100	100	100	100

b.) Pembuatan Krim

Alat dan bahan yang digunakan disiapkan. Masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan perhitungan. Fase minyak dibuat dengan melebur berturut-turut adeps lanae, asam stearat, setil alkohol, span 80 di atas penangas air, kemudian

ditambahkan propil paraben. Kemudian fase air dibuat dengan cara melarutkan metil paraben dalam air yang telah dipanaskan hingga 70°, kemudian ditambahkan gliserin dan tween 80. Emulsi dibuat dengan cara menambahkan fase minyak kedalam fase air sambil diaduk dalam lumpang hingga terbentuk corpus emulsi yang stabil. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit ekstrak etanol 96% daun kersen (*Muntingia calabura* L.) gerus dalam lumpang hingga terbentuk emulsi yang homogen. Krim dimasukkan dalam wadah tertutup rapat dan diberi etiket.

c.) Pengujian krim antioksidan

a. Pembuatan Larutan DPPH

Ditimbang DPPH (1,1-difenil-2-picrylhidrazil) sebanyak 10 mg kemudian dilarutkan dalam etanol p.a dengan menggunakan labu ukur 100 ml, sebagai larutan stock. Untuk konsentrasi 5 ppm, dipipet larutan DPPH sebanyak 0,5 ml kemudian dicukupkan volumenya dengan etanol p.a hingga 10 ml dan diamati absorbansinya pada spektrofotometer. Hal yang sama dilakukan untuk masing-masing konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm.

b. Uji Larutan Kontrol

Timbang 10 mg vitamin e, lalu dilarutkan etanol p.a sampai 10 ml dan larutan stock 100 µg/ml dengan perbandingan konsentrasi 100 µl, 500 µl, 1000 µl, 1250 µl. λ maks yang digunakan untuk vitamin e adalah 516 nm.

c. Pengukuran panjang gelombang maksimum larutan DPPH

Timbang 10 mg DPPH, larutkan dengan etanol p.a sampai 100 ml kemudian larutan DPPH 100 ml diambil 3,5 ml larutan DPPH kemudian

masukkan ke dalam labu ukur 10 ml etanol p.a. Larutan ini kemudian dipindahkan dalam wadah gelas coklat dan didiamkan selama 30 menit pada suhu 37° C dan amati absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm. Panjang gelombang yang memberikan nilai absorbansi paling besar di tetapkan sebagai panjang gelombang maksimum DPPH.

d. Pengukuran serapan blanko DPPH

Diambil 1 ml larutan hingga 5 ml etanol p.a dalam labu ukur 5 ml kemudian didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 516 nm.

e. Uji aktivitas krim ekstrak daun kersen terhadap DPPH

Sampel krim sebanyak 2,5 gram dimasukkan dalam lumpang, kemudian ditambahkan etanol p.a 5 ml. selanjutnya dilakukan pemusingan pada sentrifuge selama 10 menit, lalu disaring dengan kertas saring hingga jernih. Filtrat kemudian dimasukkan dalam labu tentukur 10 ml, ditambahkan 2 ml larutan DPPH dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a hingga 10 ml, diinkubasi pada suhu 37° C selama 30 menit, dimasukkan dalam kuvet, kemudian di ukur serapannya pada UV-Vis panjang gelombang 516 nm. Dihitung persen peredaman yang menggunakan rumus:

$$\% \text{ peredaman} = \frac{\text{serapan kontrol} - \text{serapan sampel}}{\text{serapan kontrol}} \times 100\%$$

E. Validasi dan Reabilitas Instrumen

Metode yang digunakan untuk melihat aktivitas antioksidan yaitu metode DPPH. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometri UV-Vis. Validasi dijaga dengan cara menggunakan instrument yang terkalibrasi. Reabilitas dijaga dengan melakukan pengulangan pengukuran sampai tiga kali untuk konsentrasi yang sama.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan 450 gram simplisia daun kersen (*Muntingia calabura* L) dimaserasi menggunakan larutan penyari etanol 96%.

Sediaan terdiri dari 5 formula krim dengan konsentrasi antioksidan yang berbeda formula I sampai III merupakan krim dengan ekstrak daun kersen 0,03%, 0,3%, 3%, formula IV merupakan kontrol negatif dimana tidak memakai ekstrak sedangkan formula V merupakan kontrol positif dimana memakai vitamin E dengan konsentrasi 0,05%.

1. Pengujian formula krim terhadap DPPH

Tabel 2. Hasil pengukuran evektifitas antioksidan dengan metode DPPH

Formula Krim	Konsentrasi (%)	Peredaman (%)	Absorbansi Kontrol
I	0,03	23,26	0,639
II	0,3	45,12	0,639
III	3	55,28	0,639
IV	-	14,23	0,639
V	0,05	57,59	0,639

B. Pembahasan

Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan sehingga bersifat reaktif dan tidak stabil sehingga cenderung untuk membentuk molekul yang stabil. Radikal bebas dapat dihasilkan dari dalam tubuh (endogen) dan juga dari luar tubuh (eksogen). Radikal bebas dalam jumlah normal bermanfaat bagi

kesehatan sementara dalam jumlah berlebih mengakibatkan stress oksidatif. Oleh karena itu, antioksidan dibutuhkan untuk dapat menunda atau menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas.

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas sehingga kerusakan sel akan dihambat. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stress oksidatif (Sjamsul, 2010:7).

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah daun kersen (*Muntingia calabura* L.) yang umumnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat beberapa literatur menerangkan bahwa daun kersen (*Muntingia calabura* L.) dapat menghambat radikal bebas. Untuk meningkatkan pemanfaatannya maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi ekstrak daun kersen (*Muntingia calabura* L.) yang efektif sebagai antioksidan untuk formula krim dengan konsentrasi berbeda dengan menggunakan pembanding yaitu vitamin E.

Ekstrak simplisia daun kersen dilakukan dengan menggunakan metode maserasi menggunakan cairan penyari etanol 96%. Etanol adalah pelarut organik yang dapat menarik sebagian besar senyawa-senyawa bioaktif yang terdapat dalam simplisia karena memiliki polaritas yang tinggi, juga berdasarkan ekstraksi senyawa fenolik seperti flavonoid dan tannin dari jaringan tumbuhan menggunakan pelarut etanol pada suhu kamar dengan cara maserasi.

Berdasarkan kemampuannya sebagai antioksidan (anti radikal bebas) maka ekstrak ini diformulasikan dalam bentuk sediaan krim dan menilai kemampuan

sediaan tersebut dalam meredam radikal bebas (penilaian efek antioksidan). Antioksidan dalam sediaan topikal diharapkan menangkap radikal bebas yang mengenai kulit serta radikal bebas lain yang ada pada lingkungan. Krim merupakan sediaan yang mudah dicuci, bersifat tidak lengket, memberikan efek melembabkan kulit, serta memiliki kemampuan penyebaran yang baik. Formula krim yang dibuat dibedakan berdasarkan variasi konsentrasi ekstrak yang digunakan terbagi dalam tiga konsentrasi yaitu 0,03%, 0,3%, dan 3%. Formula krim juga dibuat tanpa menggunakan ekstrak sebagai kontrol negatif dan krim menggunakan vitamin E sebagai control positif dengan konsentrasi 0,05% karena dengan konsentrasi tersebut dapat meredam DPPH.

Pada penelitian ini, dilakukan uji efektifitas antioksidan dengan metode DPPH. Metode DPPH (1,1-difenil-2 pikrilhidrazil) merupakan senyawa radikal nitrogen DPPH akan mengambil atom hydrogen yang terdapat dalam suatu senyawa, misalnya senyawa fenol. Mekanisme reaksi terjadinya DPPH ini berlangsung melalui transfer elektron. Uji efektivitas antioksidan secara kuantitatif menggunakan metode DPPH dipilih karena ujinya sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya memerlukan sedikit sampel. Adanya efektifitas antioksidan dari sampel mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada larutan (Pratimasari, 2009: 11).

Menurut penelitian oleh Hangga Cakrabuana, alasan diinkubasi selama 30 menit karena reaksi tersebut berjalan lambat dan sampel yang mengandung antioksidan telah optimum dalam meredam radikal bebas DPPH Pada waktu tersebut serta untuk mendapatkan hasil yang stabil. Proses inkubasi juga dilakukan pada suhu 37° C karena merupakan suhu yang optimum agar reaksi antara radikal DPPH dan senyawa antioksidan berlangsung lebih cepat dan optimal. Hal ini dapat dilihat

hubungan suhu dan laju reaksi, dimana suhu merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Pada saat proses inkubasi pada suhu 37° C terjadi perubahan warna (Hangga, 2011:68).

Berdasarkan hasil pengamatan dari uji efektivitas krim ekstrak daun kersen terhadap DPPH diperoleh hasil bahwa formula I dengan konsentrasi ekstrak 0,03% dengan persen penghambatan sebesar 23,26%, formula II dengan konsentrasi ekstrak 0,3% dengan persen penghambatan sebesar 45,12%, formula III dengan konsentrasi 3% dengan persen penghambatan sebesar 55,28%, formula IV sebagai kontrol negatif dengan persen penghambatan sebesar 14,23%, dan formula V sebagai kontrol positif dengan persen penghambatan sebesar 57,59%.

Dari hasil pengujian aktivitas krim antioksidan terhadap DPPH untuk masing-masing formula FI, FII, FIII, FIV, FV yang paling efektif sebagai krim antioksidan dari ekstrak daun kersen adalah F3 yang mengandung ekstrak sebesar 3% dengan persen penghambatan sebesar 55,28%. Hal ini dibuktikan setelah dilakukan penelitian yang sama terhadap DPPH dengan menggunakan krim yang mengandung bahan aktif vitamin E sebagai kontrol positif yaitu FV dengan persen penghambatan sebesar 57,59%. Dalam hal ini, nilai persen penghambatan FIII adalah nilai yang setara dengan persen penghambatan kontrol positif dari krim yang mengandung vitamin E. penelitian ini juga dilakukan terhadap krim tanpa adanya kandungan bahan aktif dengan maksud apakah ada pengaruh dari masing-masing bahan yang digunakan dalam pembuatan krim sebagai antioksidan dan terlihat persen penghambatannya terhadap DPPH sebesar 14,23%.

Senyawa-senyawa terlarut dalam etanol 96%, dan pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 96%, sehingga dapat diketahui bahwa salah satu penyebab adanya efektivitas yang tinggi dari formula krim antioksidan ekstrak daun kersen adalah keberadaan senyawa flavonoid didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sediaan krim ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L) memiliki efektivitas antioksidan.
2. Sediaan krim ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L) yang paling efektif sebagai antioksidan adalah formula yang mengandung ekstrak sebesar 3% dengan persen penghambatan 57,59%.

B. Implikasi Penelitian


1. Sebaiknya uji kemampuan antioksidan sediaan dilanjutkan secara in vivo agar efikasinya sebagai antioksidan dapat diketahui pada kulit manusia.
2. Sebaiknya dilakukan pengujian karakteristik sediaan sehingga nantinya memiliki kriteria fisik yang baik.
3. Sebaiknya pada pembuatan larutan baku harus di kerjakan dengan baik sehingga pada saat pengujian di spektrofotometri Uv-Vis hasilnya lebih baik.

KEPUSTAKAAN


- Ansel, H.C. *Pengantar bentuk sediaan farmasi*. Edisi ke 4. 2008
- Andareto, obi. *Apotek herbal di sekitar anda: buku yang memuat jenis daun herbal*. Jakarta: pustaka ilmu semesta. 2015
- Apriyanti,erna. *Efek ekstrak etanol daun kersen (Muntingia Calabura L) terhadap penghambatan peningkatan kadar gula darah pada tikus putih jantan galur wistar*. Program studi ilmu farmasi sekolah tinggi ilmu kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran. 2016
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung. 2006
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung. 2008
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Ed. IV*. Jakarta. Departemen Kesehatan RI. 1995
- Fachruddin, H. *Analisis Fitokimia tumbuhan*. Fakultas farmasi. Universitas Hasanuddin: Makassar. 2001
- Kuntorini, EM dan MD. *Penentuan aktivitas antioksidan ekstrak etanol bulbas bawang dayak*. Sains dan terapan kimia. 2010
- Kuntorini, EM dan MD. *Struktur anatomi dan uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun kersen*. Sains dan terapan kimia. 2013
- Kibbe, A.H. *Hand book pharmaceutical card excipients 5 th*. Edition pensylvania university of pharmacy. 2000
- Lachman. *Teori dan Praktek Industri Farmasi*. Ui Press: Jakarta. 1994
- Lim I. K. *Edible medicinal and non-medicinal plant*. London new york springer Dordrecht heidelberg. 2012
- Mackiewicz and Rimkevicius, A. *Skin aging*. Gerontologija. 2008
- Niken widiastruti. *Pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode CUPRAC, DPPH, & FRAP serta kolerasinya dengan fenol dan flavonoid pada enam tanaman*. Fakultas MIPA.Institut pertanian: Bogor. 2010
- Nurhasanah nenden. *Isolasi senyawa antioksidan ekstrak methanol daun kersen (muntingia calabura L)*. Cimahi: fakultas matematika & ilmu pengetahuan alam. 2012
- Praksh, A. *Antioxidant activity*. Medallion laboratories: analithycal progress. 2001
- Praksh, A. Rieglhof, F, & A, M. *Analyticalprogres antioxidant activity*. Medallion laboratories. 2001
- Parrot, Eugene. *Pharmaceutical technology*. USA: Borger publishing technology. 1971
- Raina, M.H. *Ensiklopedi tanaman obat untuk kesehatan*.yogyakarta: Absolut. 2011
- Siddiqua A. Premakuri KB, Roukiya S, vithya & savitha. *Antioxidant activity and estimation of total phenolic content of muntingia calabur*. by colorimetry. 2010

- Sastrohamidjojo, H. *Kromatografi*. Penerbit liberty: Yogyakarta. 2002
- Savitri, evika. *Rahasia tumbuhan berkhasiat obat perspektif islam*. malang: pres UIN malang. 2008
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-mishab, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009
- Syaifuddin, AMK. *Anatomi fisiologi. Berbasis kompetensi edisi IV*. Jakarta: penerbit buku kedokteran. 2012
- Sjamsul, A. *Radikal bebas pdf*: <http://www.pediatrik>. 2010
- Septiningsih. *Efek penyembuhan luka bakar ekstrak etanol 70% daun pepaya dalam sediaan gel pada kulit punggung kelinci*. Skripsi fakultas farmasi universitas muhammadiya. 2008
- Sloane ethel. *Anatomi dan fisiologi.penerbit kedokteran: EGC*. 2004
- Sandi, evika savitri. *rahasia tumbuhan berkhasiat obat perspektif islam*. Pres: UIN malang. 2008
- Syifa, octa. *Uji efektifitas & fotostabilitas krim ekstrak etanol 70% (cameliasensis) sebagai tabir surya secara in vitro*. Jakarta: universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta. 2010
- Sulistyowati, veronica, yanik. *Efek pemberian ekstrak etanol daun talok (muntingia calabura L) terhadap kadar asam urat serum tikus putih (rattus novergicus L) galur wistar hiperurikemia*. 2009
- Steenis, C. G.G. J., S. Bloembergen., P. J. Eyma. *Flora*. Cetakan ke sepuluh PT. pradnya paramita: Jakarta. 2005
- Syaifuddin. *Anatomi Tubuh Manusia*. Jakarta: salemba medica. 2009
- Trifina analisis uji in vitro & in vivo. *Ekstrak kombinasi kulit manggis dan pegangan sebagai krim antioksidan*. Skripsi fakultas MIPA Depok:UI. 2012
- Voight, R. *Buku pelajaran tekhnologi farmasi*. Edisi kelima. yogyakarta: gadjah mada university. 1995
- Wahyuni, T. *Cara rasional peremajaan kulit*. Jakarta: health today. 2005
- Wijaya, A. *Radikal bebas dan parameter status antioksidan, forum diagnosticum, prodia diagnosticeducarional services*. 1996


Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi daun kersen




Lampiran 2. Skema kerja formulasi krim ekstrak daun kersen




Lampiran 3. Pembuatan kurva baku DPPH




Lampiran 4 Uji Larutan Control



Lampiran 5. Pembuatan larutan DPPH dan penentuan panjang gelombang maksimum DPPH



Lampiran 6 pengukuran aktivitas antioksidan



Lampiran 7. Perhitungan Bahan dan nilai HLB

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak daun kersen kons.I} \quad 0,03\% &= \frac{0,03}{100} \times 50 \\ &= 0,015 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak daun kersen kons.II} \quad 0,3\% &= \frac{0,3}{100} \times 50 \\ &= 0,15 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak daun kersen kons. III} \quad 3\% &= \frac{3}{100} \times 50 \\ &= 15 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vitamin E} \quad 0,05\% &= \frac{0,05}{100} \times 50 \\ &= 0,025 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Paraffin Cair} \quad 5\% &= \frac{5}{100} \times 50 \\ &= 2,5 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Asam Stearat} \quad 5\% &= \frac{5}{100} \times 50 \\ &= 2,5 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Setil Alkohol} \quad 5\% &= \frac{5}{100} \times 50 \\ &= 2,5 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Adeps Lanae} \quad 5\% &= \frac{5}{100} \times 50 \\ &= 2,5 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tween 80} \quad 5\% &= \frac{5}{100} \times 50 \\ &= 2,5 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Span 80} \quad 5\% &= \frac{5}{100} \times 50 \end{aligned}$$

$$= 2,5 \text{ gram}$$

Gliserin 15% $= \frac{15}{100} \times 50$

$$= 7,5 \text{ gram}$$

Metil Paraben 0,18% $= \frac{0,18}{100} \times 50$

$$= 0,09 \text{ gram}$$

Propil Paraben 0,02 $= \frac{0,02}{100} \times 50$

$$= 0,01 \text{ gram}$$

Aqua I = 50-22,60 = 27,4 gram

 II = 50- 22,62 = 27,4 gram

 III = 50-22,65 = 28,3 gram

Tabel 3. Perhitungan HLB


Fase Minyak	A(%)	B	A x B
Setil Alkohol	5	15	3,75
Asam Stearat	5	15	3,75
Parafin Cair	5	12	3
Adeps Lanae	5	10	2,5
JUMLAH	20	52	13

Keterangan:

A= Konsentrasi fase minyak

B= Nilai HLB butuh (ketetapan)

Nilai HLB butuh minyak = 13



Konsentrasi Emulgator 10%

$$\frac{10}{100} \times 50 \text{ g} = 5 \text{ gram}$$

$$\text{Tween} = \frac{2}{10,7} \times 5 = 0,934 \text{ gram}$$

$$\text{Span} = \frac{8,7}{10,7} \times 5 = 4,065 \text{ gram}$$

Lampiran 8. Perhitungan persen inhibisi krim ekstrak daun kersen

Tabel 4. Absorbansi DPPH pada krim ekstrak daun kersen

NO	Formula	Konsentrasi	Absorbansi			Absorban
			I	II	III	DPPH
1	I	0,03%	0,438	0,532	0,501	0,639
2	II	0,3%	0,329	0,389	0,334	0,639
3	III	3%	0,276	0,302	0,279	0,639
4	IV	-	0,538	0,521	0,585	0,639
5	V	0,05%	0,276	0,277	0,271	0,639

$$\% \text{ Peredaman} = \frac{\text{Serapan Kontrol} - \text{Serapan Sampel}}{\text{Serapan Kontrol}} \times 100\%$$

Untuk Formula I

$$Ia = \frac{0,639 - 0,438}{0,639} \times 100\% = 31,45\%$$

$$Ib = \frac{0,639 - 0,532}{0,639} \times 100\% = 16,74\%$$

$$Ic = \frac{0,639 - 0,501}{0,639} \times 100\% = 21,59\%$$

Rata-rata 23,26%

Untuk Formula II

$$\text{IIa} = \frac{0,639-0,329}{0,639} \times 100\% = 48,51\%$$

$$\text{IIb} = \frac{0,639-0,389}{0,639} \times 100\% = 39,12\%$$

$$\text{IIc} = \frac{0,639-0,334}{0,639} \times 100\% = 47,73\%$$

Rata-rata 45,12%

Untuk Formula III

$$\text{IIIa} = \frac{0,639-0,276}{0,639} \times 100\% = 56,80\%$$

$$\text{IIIb} = \frac{0,639-0,302}{0,639} \times 100\% = 52,73\%$$

$$\text{IIIc} = \frac{0,639-0,279}{0,639} \times 100\% = 56,33\%$$

Rata-rata 55,28%

Untuk Formula IV

$$\text{IVa} = \frac{0,639-0,538}{0,639} \times 100\% = 15,80\%$$

$$\text{IVb} = \frac{0,639-0,521}{0,639} \times 100\% = 18,46\%$$

$$\text{IVc} = \frac{0,639-0,585}{0,639} \times 100\% = 8,45\%$$

Rata-rata 14,23%

Untuk Formula V

$$V_a = \frac{0,639-0,276}{0,639} \times 100\% = 56,80\%$$

$$V_b = \frac{0,639-0,277}{0,639} \times 100\% = 56,65\%$$

$$V_c = \frac{0,639-0,271}{0,639} \times 100\% = 57,59\%$$

Rata-rata 57,59%

Lampiran 9. Gambar



Gambar 1. Pohon Kersen



Gambar 2. Proses pengeringan



Gambar 3. Proses Maserasi



Gambar 4. Penimbangan Ekstrak Kental



Gambar 5. Sediaan krim formula I



Gambar 6. Sediaan krim formula II




Gambar 7. Sediaan krim formula III



Gambar 8. Sediaan krim formula IV



Gambar 9. Sediaan krim formula V



Gambar 10. Panjang gelombang maksimum

BIOGRAFI PENULIS



Fitriani Tamu, lahir di Pinrang 01 Maret 1994. Penulis anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri H. Tamu dan Hj. Husnaini. Penulis mengawali pendidikan di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Lerang Kab. Pinrang pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan MTs (Madrasah Sanawiyah) Ujung Kab. Pinrang dan selesai pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di MAN 2 (Madrasah Aliyah Negeri) Parepare dan selesai pada tahun 2013.

Penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pengalaman organisasi penulis, pernah aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi.

Menjalani pendidikan di Farmasi merupakan hal yang tidak mudah, akan tetapi meskipun penuh dengan rintangan yang begitu berat, penulis yakin “ Kesuksesan akan bersama kita selama kita bersungguh-sungguh dan tidak mengenal kata putus asa serta ALLAH tidak akan pernah memberi cobaan hambanya melampaui batas kemampuannya. AMIN YA RABBAL ALAMIN.