

**Uji Aktivitas Fraksi Ekstrak Etanol Kulit Buah Muda Pisang
Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Terhadap Bakteri
Penyebab Jerawat *Propionibacterium acne* Dan *Staphylococcus
epidermidis***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih
Gelar sarjana Farmasi jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

TRIA WULAN PURNAMEI

70100113065

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Wulan Purnamei
NIM : 70100113065
Tempat/Tgl. Lahir : Sumbawa, 17 Mei 1995
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : jalan H.M Yasin Limpo Samata-Gowa
Judul : Uji Aktivitas Fraksi Ekstrak Kulit Buah Muda Pisang
Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Terhadap
Bakteri Penyebab Jerawat *Propionibacterium acne* dan
Staphylococcus epidermidis

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya Penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2017

Penulis,

Tria Wulan Purnamei
70100113065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Fraksi Ekstrak Kulit Buah Muda Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*” yang disusun oleh **Tria Wulan Purnamei**, NIM : 70100113065, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 15 Agustus 2017** yang bertepatan dengan **22 Dzul Qa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2017 M
22 Dzul Qa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	:Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	:Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	:Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	:Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	:Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji II	:Dr. Wahyuddin G, M.Ag.	(.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Rauf S.Sosdan Ibunda Mastari serta kakak saya Rama Juni Wansyah S.Kep dan Alfian S.Kep.,M.Kep., Ners, kakak ipar saya Sarni Atyah S.Si dan Asty S.Kep., Ners serta Bagus Tri Hartono, S.H yang seluruh kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan sepenuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Wakil Dekan I (bidang akademik) Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Wakil Dekan II (bidang keuangan) Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Haeria, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
8. Ibu Surya Ningsi, S. Si., M. Si., Apt, selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
9. Ibu Karlina Amir Tahir, S. Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
10. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Si., M. Si., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
11. Bapak Dr. Wahyuddin G, M. Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
12. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,

13. Kakanda-kakanda Laboran yang senantiasa selalu membantu dan meluangkan waktunya selama penelitian dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini,
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Far13ion) yang bersama-sama merasakan canda tawa dan tangis sedih serta memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.
15. Teman dekatku A. Isma Nursyamsu, Muhammad Faris Hidayat, Baso Arwan, Husniar, Nur Amalia, Nur Annisa Maulidia, Besse Dasriah Rivai, Wulan Rukmana, Wahyu Lyana Ningsi, Rizky Fauziah, Andi Arnisa, Resky Mauliyanti, Syafirah Tizawani, Rifqa Choirunnisa, dan Nur Azizah. Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat serta selalu ada untuk penulis selama ini.
16. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta
17. Teman-teman alumni SDN 11, SMPN 2, SMAN 2 Sumbawa Besar dan teman-teman KKN53 Kec.Parangloeyang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalam.

Gowa, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Uraian Bahan.....	11
B. Uraian Mikroba Uji	16
C. Uraian Umum Antimikroba.....	18
D. Jerawat.....	26
E. Ekstraksi.....	30
F. Tinjauan Islam.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. Hasil Ekstraksi Kulit Buah Muda Pisang Ambon (<i>Musa Paradisiaca</i> Var. <i>sapientum</i>).....		46
2. Hasil Partisi Ekstrak Etanol 96% Kulit Buah Mmuda Pisang Ambon (<i>Musa Paradisiacal</i> var. <i>sapientum</i>).....		46
3. Hasil Skrining Antibakteri Kulit Buah Muda Pisang Ambon (<i>Musa Paradisiacal</i> var. <i>sapientum</i>) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat <i>Propionibacterum Acne</i> Dan <i>Staphylococcus Epidermidis</i>		47
4. Hasil Fraksi Gabungan Fraksinasi Ekstrak n-Heksan Dan Etil Asetat		48
5. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi n-Heksan		49
6. Hasil Identifikasi Kompenen Kimia Fraksi C Dari Ekstrak n-Heksan		49
7. Hasil Identifikasi Komponen Kimia Fraksi C Dari Ekstrak Etil Asetat		50
8. Hasi Nilai Rf Dari Noda Yang Tampak Pada Hasil Fraksinasi Ekstrak n-Heksan dan Etil Asetat.....		80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Unit Polisebasium Normal.....	27
2. <i>Musa paradisiaca</i> var. <i>sapientum</i>	63
3. Hasil Ekstraksi Metode Maserasi.....	71
4. Hasil Partisi Metode Cair-cair.....	72
5. Hasil Uji Skrining Antibakteri Penyebab Jerawat <i>Propionibacterium acne</i> Dan <i>Staphylococcus epidermidis</i>	73
6. Hasil Fraksinasi.....	74
7. Noda Yang Tampak Dari Ekstrak N-Heksan Pada Lempeng KLT	75
8. Uji antibakteri Fraksi n-Heksan, Etil Asetat Dan Control Negatif	76
9. Hasil Noda Berflouresensi Yang Menunjukkan Adanya Golongan Senyawa Tertentu Pada Fraksi C Etil Asetat	78
10. Hasil Noda Berflouresensi Yang Menunjukkan Adanya Golongan Senyawa Tertentu Pada Fraksi C n-Heksan	79

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pisang Ambon (<i>Musa paradisiaca</i> var. <i>sapientum</i>).....	63
2. Skema Pengambilan Dan Pengolahan Sampel.....	64
3. Skema Ekstraksi Sampel.....	65
4. Skema Partisi.....	66
5. Skema Sterilisasi Alat.....	67
6. Skema Uji Antibakteri Hasil Partisi.....	68
7. Skema Fraksinasi (Kromatografi Cair Vakum) Dan Uji Antibakteri.....	69
8. Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Fraksi Teraktif.....	70
9. Ekstrak Kulit Buah Muda Pisang Ambon (<i>Musa Paradisiacavar. sapientum</i>)	71
10. Ekstrak Hasil Partisi Dengan Metode Cair-Cair.....	72
11. Zona Bening Skrining Antibakteri <i>Propionibacterium Acne</i> Dan <i>Staphylococcus Epidermidis</i>	73
12. Hasil Fraksinasi.....	74
13. Noda Yang Tampak Dari Ekstrak n-Heksan Pada Lempeng KLT.....	75
14. Uji Anti Bakteri Fraksi n-Heksan, Etil Asetat Dan Control Negatif.....	76
15. Hasil Noda Berflouresensi Yang Menunjukkan Adanya Golongan Senyawa Tertentu Pada Fraksi C Etil Asetat.....	78
16. Hasil Noda Berflouresensi Yang Menunjukkan Adanya Golongan Senyawa Tertentu Pada Fraksi C n-Heksan.....	79
17. Hasi Nilai Rf Dari Noda Yang Tampak Pada Hasil Fraksinasi Ekstrak N- Heksan.....	80
18. Perhitungan Konsentrasi Pada Uji Skrining Antribakteri Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol+air.....	81

19. Perhitungan Konsentrasi Pada Uji Antribakteri Fraksi n-Heksan, dan Etil Asetat.....	82
---	----

ABSTRAK

Nama : Tria Wulan Purnamei
NIM : 70100113065
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi: Uji Aktivitas Fraksi Ekstrak Etanol Kulit Buah Muda Pisang Ambon
(*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Terhadap Bakteri Penyebab
Jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*

Telah dilakukan penelitian fraksi ekstrak etanol kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) terhadap bakteri *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ekstrak dan fraksi teraktif yang dapat menghambat bakteri penyebab jerawat. Ekstrak kulit buah muda pisang ambon diperoleh dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%, uji skrining antibakteri dengan metode difusi agar pada konsentrasi 30, 50 dan 100 mg/mL, fraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum, uji antibakteri hasil fraksi serta identifikasi golongan senyawa. Hasil Skrining menunjukkan ekstrak teraktif diperoleh pada konsentrasi 100 mg/mL ekstrak n-heksan dan etil asetat terhadap bakteri *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona bening 10,66;12, dan 17,33;17,33 mm secara berturut-turut yang merupakan kategori antibakteri kuat. Didapatkan masing-masing 5 penggabungan fraksi ekstrak n-heksan dan etil asetat berdasarkan nilai Rf. Uji antibakteri hasil fraksi ekstrak n-heksan dan etil asetat pada konsentrasi 100 mg/mL menunjukkan fraksi C yang memiliki aktivitas teraktif pada bakteri *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona bening 13,33;14 mm merupakan kategori antibakteri kuat, dan 23,66;24,33 mm merupakan kategori antibakteri sangat kuat. Kandungan kimia dari fraksi C n-heksan positif mengandung steroid, triterpen, flavanoid dan fenol, serta fraksi C etil asetat positif mengandung alkaloid, triterpen, flavanoid, dan kumarin.

Kata kunci: Kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*),
bakteri *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*

ABSTRACT

Name : Tria Wulan Purnamei
Registration Number : 70100113065
Department : Pharmacy
The Title Of Thesis : Activity Test Of Ethanol Extract Fraktion Of Unripe Fruit Ambon Banana Peel (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Against Bacteria That Cause *Propionibacterium acne* And *Staphylococcus epidermidis*

The research had been implemented regarding ethanol extract fraction of unripe fruit ambon banana peel (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) against *Propionibacterium acne* and *Staphylococcus epidermidis* bacteria. This study aims to determine the most active extracts and fractions that can inhibit acne causing bacteria. Unripe fruit ambon banana peel extract obtained by maseration method using ethanol 96% solvent, antibacterial screening test with the agar diffusion method at concentration 30, 50 and 100 mg/mL, fractination by vacuum liquid chromatography method, antibacterial test of the fraction and the compound class identification. The screening result showed that the most activity extracts obtained at concentration 100 mg/mL of n-hexan and ethyl acetate extract of *Propionibacterium acne* and *Staphylococcus epidermidis* bacteria with clear zone diameter 12 mm;10,66 and 17,33mm;17,33mm respectively which was a strong antibacterial category. There were 5 combination of n-hexane and ethyl acetate extract based on Rf value. The antibacterial test of the fraction n-hexan and ethyl acetat at consentration100mg/mL showed fraction C which had the most active activity in *Propionibacterium acne* and *Staphylococcus epidermidis* bacteria with clear zone diameter 14mm;13,33 mm was strong antibacterial category, and 23,66 and 24,66 mm was a very strong antibacterial category. The chemical content of positive fraction C of n-hexane containing steroids, triterpene, flavonoid, phenol, as well positive fraction C of ethyl acetate containingg alkaloid, triterpene, flavanoid, and coumarin.

Keyword: Unrip fruit ambon banana peel (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), *Propionibacterium acne* and *Staphylococcus epidermidis*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman pisang (*Musa*, sp), merupakan salah satu jenis tanaman yang paling banyak terdapat di Indonesia, tetapi masih belum memiliki acuan informasi yang lengkap, baik dari segi fitokimia maupun dari segi farmakologi guna dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan pisang sebagai bahan industri belum populer dan yang dikenal sampai saat ini masih terbatas pada buahnya. Pengolahan bagian lainnya yang berupa limbah seperti batang, daun, kulit buah dan sebagainya masih sedikit sekali (Pane Elfira Rosa, 2013).

Sejak dahulu tumbuhan telah dijadikan tanaman obat tradisional untuk memelihara kesehatan, pengobatan maupun untuk kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Firman Allah SWT dalam QS. Al – Thaaha / 20: 53

وَمَا نُنَبِّتُ مِنْ أَزْوَاجٍ بِهَاءٍ فَأَخْرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَأَنْزَلْ سُبُلًا فِيهَا لَكُمْ وَسَلَكْ مَهْدًا الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي



Terjemahan:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”(Departemen Agama RI, 2013).

Ayat di atas menyatakan bahwa dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hampan adalah isyarat bahwa keberadaan manusia di pentas bumi dalam kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah. Firman-Nya: menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-nya. Selanjutnya firman-Nya bahwa: dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan dan hidayah buay hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (shibab, 2002).

Dalam pengobatan tradisional buah pisang dapat digunakan dalam mengobati diare, disentri, ususlesi pada kolitis ulserativa, diabetes mellitus, sariawan, uremia, nephritis, asam urat, hipertensi, penyakit jantung. *Musa sapientum* juga digunakan dalam pengobatan menstruasi yang berlebihan, daun pisang digunakan sebagai obat kulit yang melepuh karena luka bakar. Bunga digunakan dalam mengobati disentri dan menorrhagia. Jus batang tanaman berbuah digunakan untuk mengobati diare, disentri, kolera, otalgia, hemoptisis dan bunga digunakan dalam disentri, diabetes dan menorrhagia. Akar digunakan sebagai obat cacing, gangguan penyakit kelamin. (Imam, dan Akter, 2011).

Menurut “Statistik Produksi Hortikultura Tahun 2014” pisang merupakan buah yang paling banyak diproduksi di Indonesia yaitu mencapai 6.862.558 ton pertahunnya dan terus meningkat tiap tahunnya. Bertambahnya produksi pisang maka semakin banyak pula limbah kulit pisang yang dihasilkan. Selama ini pengolahan hasil tanaman pisang hanya berkonsentrasi pada pengolahan buah pisang saja dan belum memperhatikan pemanfaatan hasil limbah seperti batang pisang, tandan buah dan kulit pisang (Aslamia Suaibatul dkk, 2016).

Salah satu dari tanaman Indonesia ialah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) yang sudah dikenal lama dan dibudidayakan serta memiliki berbagai manfaat, seperti batang tanaman pisang biasa digunakan oleh masyarakat di Indonesia sebagai obat luka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010), bahwa ekstrak batang tanaman pisang ambon bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka pada mencit dengan nilai reepitalisasi 0,52 pada hari ke 7. Sedangkan fraksi ekstrak kulit buah muda pisang ambon dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dengan konsentrasi 90 µL (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

Kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri disebabkan karena adanya senyawa aktif yang terkandung di dalam kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) diantaranya yaitu tannin, flavanoid, saponin, glikosida, terpenoid, dan alkaloid (Ighodaro, 2012).

Dalam studi 2001 dari 3305 wanita yang berusia 25 sampai 40 tahun, prevalensi jerawat adalah 41%, dan dalam studi kedua dari 2895 perempuan yang

berusia 10-70 tahun jerawat memuncak pada usia remaja, namun 25% wanita menderita jerawat setelah 21 tahun, dengan puncak 45% pada wanita antara 21 dan 30 tahun (Di Landro et al, 2016).

Penyebab terjadinya jerawat sangat banyak diantaranya produksi sebum yang berlebihan, genetik, usia, kebersihan wajah, dan stress (Latifah Sofia, 2015). Menurut Khalid Zulfikar (2010) penyebab timbulnya jerawat yaitu adanya sumbatan dipori-pori kulit oleh sebum yang berubah menjadipadat. Peningkatan produksi sebum akibat pengaruh hormonal, kondisi fisik, dan psikologis. Dalam lingkungan hormonal bakterilah yang berperan dalam perkembangan jerawat. Spesies bakteri pokok yang terkait dengan jerawat adalah *Propionibacterium acnes*. Mikroorganisme ini adalah bakteri yang normal pada kulit dan di dalam folikel rambut. Dua spesies bakteri lain yang hidup dan tumbuh di permukaan kulit dan dapat dikaitkan sebagai penyebab dari jerawat adalah *Propionibacterium granulosum* dan *Staphylococcus epidermidis* (Brigham Narins, 2003).

Berdasarkan penelitian “Aktivitas Antibakteri Fraksi Ekstrak Kulit Buah Muda Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Terhadap *Staphylococcus aureus*” Hasil pengukuran zona hambat menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan memiliki respon hambatan pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* yang lebih tinggi dilihat dari zona hambat yang terbentuk, dibandingkan dengan ekstrak etil asetat dan etanol-air.

Informasi mengenai aktivitas anti bakteri penyebab jerawat dari kulit buah pisang masih sangat sedikit, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian penggunaan ekstrak kulit buah tanaman pisang serta menguji aktivitasnya pada bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*.

B. Rumusan masalah

1. Apakah ekstrak kulit buah muda pisang ambon memiliki aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* ?
2. Ekstrak manakah yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*?
3. Fraksi manakah yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*?
4. Senyawa kimia apakah yang terkandung dalam fraksi teraktif?

C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Uji Aktivitas

Uji aktivitas adalah tehnik untuk mengukur seberapa besar potensi atau konsentrasi suatu senyawa dapat memberikan efek bagi mikroorganisme.

- b. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen aktif yang terkandung dalam tanaman menggunakan bahan pelarut yang sesuai dengan kelarutan komponen aktifnya.

c. Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut dan masa atau serbuk yang tersisa diperlukan sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

d. Maserasi

Proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar.

e. Fraksinasi

Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa kimia berdasarkan tingkat kepolarannya. Senyawa yang dapat dipisahkan menjadi fraksi berbeda-beda tergantung pada jenis tumbuhan.

f. Loading dose

Jumlah atau ukuran yang diharapkan dapat menghasilkan efek terapi.

g. *Staphylococcus epidermidis*

Staphylococcus epidermis adalah bakteri gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 - 1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik dengan suhu optimum 35 - 40°C.

h. *Propionibacterium acne*

Propionibacterium acne adalah bakteri tidak berspora, termasuk bakteri gram positif, anaerob, batang pleomorfik. Bakteri ini flora normal di rongga mulut, usus besar, konjungtiva, saluran eksternal telinga dan kulit, di mana ia mendominasi lebih dari konstituen flora normal lain di folikel pilosebaceous.

i. Jerawat

Jerawat adalah suatu kondisi yang mempengaruhi folikel rambut. Sebuah folikel rambut terdiri dari pori-pori terbuka di permukaan kulit. Pori-pori mengarah ke dalam untuk sebuah rongga yang terhubung ke kelenjar minyak. Kelenjar, yang disebut kelenjar sebasius, memproduksi minyak (sebum) yang melumasi kulit dan folikel rambut yang tumbuh keluar dari rongga.

j. Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia, termasuk golongan ini yang akan dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika, antiseptika, desinfektansi, preservatif.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menentukan aktivitas antibakteri penyebab jerawat dari kulit buah pisang ambon muda *Musa paradisiaca* var. *sapientum*.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya mengenai pisang ambon *Musa paradisiaca* var. *sapientum*.

1. Normayunita dkk (2015) Aktivitas Antibakteri Kulit Buah Muda Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) Terhadap *Staphylococcus aureus*. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan fraksi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dengan aktivitas tertinggi dan menentukan fraksi yang mempunyai efektivitas hampir sama dengan kontrol positif (tetrasiklin). Data yang diperoleh berupa statistik, dari hasil uji *two-way* ANOVA menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan yang bermakna ($p < 0,05$) terhadap semua jenis sampel. Berdasarkan uji Tukey HSD menunjukkan bahwa aktivitas paling tinggi dari keempat fraksi n-heksan dengan konsentrasi 30, 60, dan 90 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ terdapat pada fraksi n-heksan dengan konsentrasi 90 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$. Pada kontrol positif untuk semua kelompok uji terdapat perbedaan bermakna ($p < 0,05$), artinya efektivitas kontrol positif dengan semua perlakuan menunjukkan perbedaan efektivitas antara kontrol positif dengan semua fraksi uji. Dapat disimpulkan bahwa fraksi n-heksan yang paling aktif dengan konsentrasi 90 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ memiliki aktivitas paling besar dan tidak ada efektivitas fraksi yang hampir sama dengan kontrol positif.

2. Pane ElfiraRosa (2013) Uji Aktivitas Senyawa Antioksidan dari Ekstrak Metanol Kulit Pisang Raja (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*). Telah dilakukan penelitian uji aktivitas senyawa antioksidan dari ekstrak metanol kulit pisang raja (*Musa paradisiacavar.sapientum*). Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi

menggunakan pelarut metanol. Ekstraksi bertingkat dilakukan terhadap ekstrak metanol dengan n-heksan dan etil asetat. Dari uji fitokimia terhadap fraksi metanol menunjukkan positif flavonoid. Pengujian aktifitas antioksidan dilakukan dengan reaksi oksidasi asam linoleat dengan metoda feritiosianat (FTC) 0,05%. Sebagai standar antioksidan digunakan Butil hidroksianisol (BHA). Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak metanol, fraksi n-heksan dan etil asetat memiliki aktifitas antioksidan yang tidak jauh berbeda dengan BHA. Sedangkan fraksi etil asetat memiliki aktifitas antioksidan yang lebih tinggi daripada BHA.

3. Wahyu Dwi dan Krisnawati Oktavia (2015) Ekstrak Kulit Buah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum* L. Kunt) Penghambat Bakteri *Shigella dysenteriae*. *Shigella dysenteriae* adalah bakteri patogen yang menyebabkan disentri basiler. *Shigella dysenteriae* menjadi resisten terhadap beberapa antibiotik. Solusi alternatif masalah ini adalah dengan menggunakan bahan alami, seperti pisang ambon (*Musa paradisiacavar. sapientum* L. Kunt.) mengelupas. Senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba adalah flavonoid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi antimikroba ekstrak kulit pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum* (L.) Kunt.). Teknik maserasi digunakan untuk mendapatkan ekstrak menggunakan etanol sebagai pelarut. Penelitian ini termasuk dalam laboratorium eksperimen penelitian dan menggunakan metode difusi. Konsentrasi ekstrak ambon kulit pisang yang digunakan adalah 1%, 510%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50%. Hasil pengamatan menunjukkan pisang ekstrak kulit (*Musa paradisiaca* var. *sapientum* L. Kunt.) dapat menghambat

pertumbuhan *Shigella dysentri* mulai dari konsentrasi 10% sampai 50%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak kulit pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum* L. Kunt.) memiliki efek antimikroba untuk *Shigella dysentriae* dengan konsentrasi hambat minimum (MIC) adalah 10%.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui aktivitas anti bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* menggunakan kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).
- b. Mengetahui ekstrak kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*.
- c. Mengetahui fraksi kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) yang memiliki aktivitas sebagai anti bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*.
- d. Mengetahui senyawa kimia apa yang terkandung di dalam fraksi terakif.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat lain dari kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var *sapientum*), yaitu dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi jerawat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Bahan

1. Klasifikasi (Barua Nilotpal, dan Das Mitali, 2013)

Kingdom : Plantae

Sub Kingdom : Traheobionta

Divisio : Spermatophyta

Classis : Liliopsida

Sub classis : Zingiberidae

Ordo : Zingiberales

Familia : Musaceae

Genus : Musa

Spesies : *Musa paradisiaca* var. *sapientum*

2. Nama Daerah

Jawa: Cau, gedang, pisang, kisang, kedhang, pesang, pisah. Sumatra: pisang, galuh, gaol, punti, puntik, puti, galo, gae. Kalimantan: harias, peti, pisang, pute, puti, rahias. Nusa Tenggara: biu, pisang, kalo, mutu, punti, kulu, muko, busa, wusa, huni, hundi, uki. Sulawesi: tagin see, lambi, lutu, loka, unti pepe, sagin, punti, uti. Maluku: fudir, pitah, uki, temai, seram, kulla, uru, temae empulu, fust, at, tela, Irian: nando, rumaya, pipi, mayu (Dalimartha Setiawan, 2007).

3. Morfologi

Tanaman pisang tumbuh di daerah tropik karena menyukai iklim panas dan memerlukan matahari penuh. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah dengan ketinggian sampai 2.000 m dpl. Umumnya, pisang merupakan tanaman pekarangan, walaupun di beberapa daerah sudah diperkebunkan untuk diambil buahnya. Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, kemudian mati. Tingginya antara 2-9 m, berakar serabut dengan batang bawah tanah (bonggol) yang pendek. Dari mata tunas yang ada pada bonggol inilah bisa tumbuh tanaman baru. Pisang mempunyai batang semu yang sebenarnya tersusun atas tumpukan pelepah daun yang tumbuh dari batang bawah tanah sehingga mencapai ketebalan 20-50 cm. Daun yang paling muda terbentuk di bagian tengah tanaman, keluarinya menggulung dan terus tumbuh memanjang, kemudian secara progresif membuka. Helai daun bentuknya lanset memanjang, mudah koyak, panjang 1,5-3 m, lebar 30-70 cm, permukaan bawah berkilin, tulang tengah penopang jelas disertai tulang daun yang nyata, tersusun sejajardan menyirip, warnanya hijau. Pisang mempunyai bungamajemuk, yang tiap kuncup bunga dibungkus oleh seludang berwarna merah kecokelatan. Seludang akan lepas dan jatuh ke tanah jika bunga telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara normal, sedang bunga jantan yang berada di ujung tandan tidak berkembang dan tetap tertutup oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Jantung pisang ini harus dipangkas setelah selesai berbuah. Tiap kelompok bunga disebut sisir, yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir betina antara 5-15 buah. Buahnya buah buni, bulat memanjang, membengkok, tersusun seperti sisir

dua baris, dengan kulit berwarna hijau, kuning, atau coklat. Tiap kelompok buah atau sisir terdiri dari beberapa buah pisang. Berbiji atau tanpa biji. Bijinya kecil, bulat, dan warnanya hitam. Buahnya dapat dipanen setelah 80--90 hari sejak keluarnya jantung pisang (Dalimartha Setiawan, 2007).

Tanaman pisang merupakan tumbuhan berbatang basah yang besar, biasanya mempunyai batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun. Tangkai daun jelas beralur pada sisi atasnya, helaian daun lebar, bangun jorong (oval memanjang), dengan ibu tulang yang nyata dan tulang-tulang cabang yang menyirip dan kecil-kecil. Bunga dalam suatu bunga majemuk dengan daun-daun pelindung yang besar dan berwarna merah. Masing-masing bunga mempunyai tenda bunga yang mempunyai mahkota atau jelas mempunyai kelopak dan mahkota yang biasanya berlekatan. Benang sari 6 yang 5 fertil yang satu staminoidal. Bakal buah tenggelam, beruang 3 dengan 1 bakal biji dalam tiap ruang. Tangkai putik berbelah 3. Buahnya buah buni atau buah kendaga (Imam dan Akter, 2011).

4. Khasiat

Kulit buah pisang ambom *Musa paradisiaca* var. *sapientum* memiliki khasiat sebagai agen pencegah pertumbuhan dan perkembangan sel kanker tanpa mengganggu sel normal (NAM Andini, dan I Wandart, 2014). Memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri spesies *Staphylococcus* dan *Pseudomonas* (Imam dan Akter, 2011). Kulit pisang muda dapat menyembuhkan berbagai penyakit infeksi, diantaranya diare oleh *Escherichia coli* (Minerva dan Permatasari,

2015). Kulit buah pisang genus ini juga memiliki aktivitas antioksidan (Pane Elfira Rosa, 2013). Menurut empiris kulit buah pisang dapat mengatasi jerawat.

5. Kandungan Kimia

Akar mengandung serotonin, norepinefrin, tanin, hidroksitriptamin, dopamin, vitamin A, B dan C. Buah mengandung flavonoid, glukosa, fruktosa, sukrosa, tepung, protein, lemak, minyak menguap, kaya akan vitamin (A, B, C, dan E), mineral (kalium, kalsium, fosfor, Fe), pektin, serotonin, 5-hidroksi triptamin, dopamin, dan noradrenalin (Dalimartha Setiawan, 2007). Kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri disebabkan karena adanya senyawa aktif yang terkandung di dalam kulit buah muda pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) diantaranya yaitu tannin, flavanoid, saponin, glikosida, terpenoid, dan alkaloid (Ighodaro, 2012). *Musa paradisiaca* var *sapientum* mengandung triterpenoid, dan gallokatekin (Someya S. dkk, 2002). Memiliki kandungan pigmen karotenoid dari golongan zeantin, xantofil, dan β -karoten (Suparmi dan Prasetya, 2010). Komposisi kulit pisang yaitu air 68,90%, karbohidrat 18,50%, lemak 2,11%, protein 0,32% dan komposisi kandungan kimia lainnya seperti pektin (Widya ningsih Senny, 2012).

6. Uraian Umum Tanaman

Tanaman pisang termasuk tanaman monokotil dengan Sistem pembuluh berbeda dengan tanaman dikotil. Tanaman monokotil biasanya mempunyai ikatan pembuluh (floem dan xilem) yang tersebar di jaringan batang. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat terlarut, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis (Fanh A, 1995).

Metabolit sekunder adalah senyawa yang disintesis oleh makhluk tumbuhan mikrobial atau hewan melewati proses biosintesis yang digunakan untuk menunjang kehidupan namun tidak vital (jika tidak ada tidak mati) sebagaimana gula, asam amino dan asam lemak. Metabolit ini memiliki aktifitas farmakologi dan biologi. Di bidang farmasi secara khusus, metabolit sekunder digunakan dan dipelajari sebagai kandidat obat atau senyawa penuntun (lead compound untuk melakukan optimasi agar diperoleh senyawa yang lebih poten dengan toksisitas minimal). Metabolit Primer Memiliki ciri Esensial untuk hidup: pertumbuhan normal, perkembangan dan reproduksi. Berupa enzim fisiologis, menghasilkan energi misalnya karbohidrat. Terlibat langsung dalam fungsi fisiologis normal: protein dan enzim terdapat di dalam organisme atau sel dikenal dengan istilah metabolit sentral berat molekul (BM) dari kecil dalam bentuk monomer hingga sangat besar polimer 1500 Dalton). Contoh: glukosa, asam organik sederhana, asam lemak protein, hormon, enzim adalah metabolit primer (Saifuddin Aziz, 2014).

Metabolit sekunder memiliki ciri: tidak terlibat langsung dalam metabolisme/kehidupan dasar pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Tidak esensial, ketiadaan jangka pendek tidak berakibat kematian Ketidadaan jangka panjang mengakibatkan kelemahan dalam pertahanan diri, survival, estetika, menarik serangga. Golongan metabolit sekunder distribusi hanya pada spesies pada filogenetik /familia tertentu. Seringkali berperan di dalam pertahanan terhadap musuh. Senyawa organik dengan berat molekul 50-1500 Dalton. Sehingga disebut mikro molekul. Penggolongan utama: terpenoid, fenil propanoid. poliketida. dan alkaloid adalah

metabolit sekunder. Pemanfaatan oleh manusia: untuk obat, parfum, aroma, bumbu, bahan rekreasi dan relaksasi. Mikroba dan tumbuhan baik darat maupun laut merupakan salah satu sumber utama bahan obat. Berbagai obat penting yang diresepkan di dalam terapi klinik seperti antibiotik, statin, vinkristin, takso didapatkan dengan pemurnian dari sumber alami yakni mikroba dan tetumbuhan (Saifuddin Aziz, 2014).

B. Uraian Mikroba Uji

1. *Staphylococcus epidermidis*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004)

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales
 Suku : Staphylococcaceae
 Marga : Staphylococcus
 Jenis : *Staphylococcus epidermis*

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus epidermis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 - 1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam

keadaan aerobik. Suhu optimum 35 - 40°C. Terutama berosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. Bersifat koagulasa negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

2. *Propionibakterium acne*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004:245-245)

Domain : Bacteria
Filum : Actinobacteria
Kelas : Actinomycetales
Bangsa : propiobanibacterineae
Suku : propionibacteriaceae
Marga : propionibacterium
Jenis : *Propionibacterium acne*

b. Sifat dan Morfologi

Propionibacterium acne adalah termasuk bakteri gram positif berbentuk batang, tidak berspora, tangkai anaerob ditemukan dalam specimen spesimen klinis. Bakteri *Propionibacterium acne* termasuk bakteri yang tumbuh relatif lambat dan memiliki karakteristik sangat pleomorfik, berbentuk batang atau panjang dengan ujung yang melengkung, berbentuk gada atau lancip, dengan pewarnaan yang tidak

rata dan bermanik-manik, dan kadang-kadang berbentuk kokoid atau bulat (Jawet, 2013).

Propionibacterium acnes (*P. acnes*) merupakan bakteri gram positif, fakultatif anaerobik, jenis diphtheroid, tidak membentuk spora bacillus. Bakteri ini merupakan bagian dari mikrobia kulit dan telah dikonfirmasi keberadaannya di stratum korneum dan unit pilosebaceous. Kontribusi *P. acnes* di kulit, diperkirakan kepadatan 10²-10⁶ klon per sentimeter persegi. Di kulit, distribusinya adalah lazim di daerah wajah dan kulit kepala, dan terkait dengan unit pilosebaceous konsentrasi *P. acne* tinggi di situs tersebut. Hal ini umum di daerah yang kaya akan kelenjar keringat ekrin dan selaput lendir, namun juga hadir dalam jumlah kecil di anggota tubuh bagian bawah. *Propionibacterium acne* juga merupakan bagian dari konjungtiva, telinga luar, rongga mulut, dan saluran pernapasan bagian atas. Hal ini dapat sesekali komensal dalam jaringan paru-paru perifer dan kelenjar getah bening mediastinum (Neves J.S. et al, 2015).

C. Uraian Umum Antimikroba

1. Definisi Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia, termasuk golongan ini yang akan dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika, antiseptika, desinfektansia, preservatif (Djide dan Sartini, 2008).

2. Sifat-sifat Antimikroba

a. Bakteriostatika dan Fungistatika

Bakteriostatika yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Fungistatika yaitu zat atau bahan yang dapat menghentikan pertumbuhan fungi, sitostatika terhadap kanker. Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner tidak dapat lagi multiplikasi dan berkembang biak.

b. Bakteriosida

Bakteriosida yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Djide dan Sartini, 2008).

3. Mekanisme Kerja Anti mikroba

Anti mikroba mempunyai mekanisme kerja ada sepuluh cara antara lain:

a. Penginaktifan Enzim Tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan disinfektaria, seperti turunan aldehida, amida, karbanilida, etilen oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa amonium kuarternar.

b. Denaturasi Protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, senyawa merkuri peroksida, turunan fenol dan senyawa amonium kuarternar bekerja sebagai antiseptika dan desinfektan dengan cara denaturasi dan konyugasi protein sel bakteri.

c. Mengubah Permeabilitas Membran Sitoplasma bakteri

Cara ini adalah model kerja dari tanin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa amnium kuarterner. Dengan mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri, senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang essensial sehingga bakteri mengalami kematian.

d. Intekalasi DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesis DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

e. Pembentukan Khelat

Beberapa turunan fenol, seperti Leksokikrofen dan oksikuinolin dapat membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim, sehingga mikroorganismenya mengalami kematian.

f. Bersifat Antimetabolite

AM bekerja memblokir tahap metabolik spesifik mikroba seperti pada sulfonamida dan trimetoprim. Sulfonamida menghambat pertumbuhan sel dengan menghambat sintesis asam folat oleh bakteri.

g. Penghambatan Sintesa Dinding Sel

Antimikroba golongan ini dapat menghambat sintesis atau menghambat aktivitas enzim yang dapat merusak dinding sel mikroorganisme.

h. Penghambat Fungsi Permeabilitas Membran Sel

Disini mikroba bekerja secara langsung pada membrane sel yang mempengaruhi permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler mikroorganisme (bakteri).

i. Penghambat Sintesis Protein

Antimikroba disini mempengaruhi fungsi ribosom pada mikroorganisme yang menyebabkan sintesa protein terhambat seperti berinteraksi dengan ribosom 30S dan berinteraksi dengan ribosom 50S.

j. Penghambat Asam Nukleat

Dalam hal ini antimikroba mempengaruhi metabolisme asam nukleat (Djide dan Sartini, 2008).

4. Sterilisasi

Sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh atau memusnahkan semua mikroorganisme atau jasad renik yang adasehingga jika ditumbuhkan di dalam suatu medium tidak adalagi mikroorganisme atau jasad renik yang dapat berkembang biak. Sterilisasi harus dapat membunuh mikroorganisme atau jasad renin yang paling tahan panas yaitu spora bakteri (Djide dan Sartini, 2008).

Macam-macam sterilisasi sebagai berikut:

a. Metode uap panas bertekanan tinggi

1) Prinsip dasar

Uap panas pada suhu, tekanan, dan waktu pemaparan tertentu mampu membunuh mikroba patogen dengan cara denaturasi protein dari enzim dan membran sel.

2) Teknis pelaksanaan

Alat yang digunakan adalah sebuah bejana tertutup yang dilengkapi dengan manometer, termometer, termostat, dan pengatur tekanan. Dengan demikian suhu dan tekanan uap panas dapat diatur. Sterilisator metode uap panas bertekanan tinggi ini disebut Autoklav, dengan urutan kerja sebagai berikut:

- a) peralatan medis seperti instrumen, sarung tangan, dan linen dimasukkan dalam kamar (chamber) dan diletakkan di atas rak-rak yang tersedia,
- b) uap panas yang berasal dari pemanasan air dialirkan ke dalam kamar (chamber) sehingga mendesak udara yang ada di dalam kamar. Pemanasan air dilanjutkan, sehingga suhu uap air mencapai 121°C karena adanya kenaikan tekanan
- c) saat suhu efektif ini tercapai, hitungan waktu dimulai yaitu 20 menit untuk peralatan medis yang tidak terbungkus dan 30 menit untuk peralatan medis terbungkus
- d) bila durasi/waktu untuk sterilisasi telah berakhir, katup pengatur tekanan dibuka sehingga tekanan uap akan turun dan selanjutnya akan diikuti dengan penurunan suhu.

Metode sterilisasi uap panas bertekanan tinggi ini adalah metode yang banyak digunakan, aman, cukup efektif, serta mudah pengoperasiannya. Ada tiga jenis Autoklav yang secara teknis sama.

3) Pengawasan terhadap mutu/kualitas sterilisasi

Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui keandalan suatu metode proses sterilisasi. Pengawasan mutu/kualitas ini dijalankan dengan melakukan evaluasi

(monitoring) selama proses maupun pada hasil akhirnya. Tiga parameter/indikator yang digunakan untuk menilai mutu/kualitas proses sterilisasi adalah:

a) Indikator mekanik

Indikator ini digunakan untuk mengetahui, apakah sterilisator sebagai sebuah mesin dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Hal ini dapat dibuktikan dengan memerhatikan bagian-bagian sterilisator seperti manometer, termometer, dan sebagainya dalam bentuk laporan atau grafik.

b) Indikator kimia

Dengan menggunakan indikator kimia dapat diketahui apakah proses sterilisasi telah berjalan dengan benar atau tidak. Sebagai alat untuk menilai efektivitas sterilisasi digunakan indikator berbentuk pita dengan bahan kimia di dalamnya. Bahan kimia ini sensitif terhadap panas dan akan berubah warna. Atau menggunakan butir-butir yang berada dalam sebuah vial yang akan mencair pada suhu dan waktu tertentu. Baik pita maupun vial diletakkan di sela-sela objek yang akan disterilkan.

c) Indikator biologis

Indikator ini menggunakan bakteri, yaitu *Bacillus stearothermophilus* (untuk sterilisasi dengan uap panas bertekanan tinggi) atau *Bacillus subtilis* (untuk sterilisasi panas kering). Kedua bakteri ini memiliki batas resistensi terhadap panas. Bila proses sterilisasi berjalan dengan baik, maka bakteri ini akan mati yang berarti bakteri lain beserta endosporanya juga mati. Bila proses sterilisasi berjalan tidak sempurna,

Bacillus stearothermophilus tetap hidup dan ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna karena gula sebagai media akan diuraikan.

b. Metode panas kering

1) Prinsip dasar

Melalui mekanisme konduksi, panas akan diabsorpsi oleh permukaan luar dari peralatan yang disterilkan. Lalu merambat ke bagian yang lebih dalam dari peralatan tersebut sampai suhu untuk sterilisasi tercapai secara merata. Mikroba terbunuh dengan cara oksidasi, dimana protein mikroba akan mengalami koagulasi.

2) Teknis pelaksanaan

Sterilisasi ini menggunakan udara panas pada sebuah alat yang disebut Oven, sebuah bejana yang udara di dalamnya harus dipanaskan dengan cara pemanasan udara dalam Oven dengan memanfaatkan gas atau listrik, suhunya dapat mencapai 160-180°C, durasi waktu untuk proses sterilisasi 1-2 jam, lebih lama daripada menggunakan autoklav karena daya penetrasinya tidak sebaik uap panas, digunakan untuk sterilisasi alat-alat dari gelas seperti tabung reaksi, labu, cawan petri, dan sebagainya.

c. Metode gas kimia

1) Sterilisasi dengan etilen oksida:

a) Prinsip dasar

Etilen oksida membunuh mikroba melalui reaksi kimia, yaitu reaksi alkilasi. Pada reaksi ini terjadi penggantian gugus atom hidrogen pada sel mikroba dengan gugus alkil, sehingga metabolisme dan reproduksi sel terganggu.

b) Teknis pelaksanaan

Proses sterilisasi menggunakan Autoklav khusus pada suhu yang lebih rendah (36-60 C) serta konsentrasi gas tidak kurang dari 400 mg/liter, dengan cara setelah peralatan medis dimasukkan, gas etilen oksida dipompakan ke dalam kamar (chamber) selama 20-30 menit pada kelembapan 50-75%. Setelah selesai waktu pemaparan dengan gas etilenn oksida, diikuti oleh tahap aerasi pertukaran udara, yaitu proses membuang gas etilen oksida pada sterilisator maupun pada peralatan medis.

Cara sterilisasi ini dapat digunakan untuk peralatan medis dari plastik, alat-alat optik pacemaker, dan lain-lain yang sulit disterilkan dengan cara lain. Afinitasnya yang tinggi akan berakibat timbulnya residu pada peralatan medis yang telah disterilkan. Gas etilen oksida cukup toksik sehingga dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mukosa. Oleh karenanya perlu perhatian pada masalah keselamatan kerja.

2) Sterilisasi dengan formaldehid

a) Prinsip dasar

Mikroba terbunuh dengan cara mengikat gugus asam amino dari protein mikroba.


b) Teknis pelaksanaan

Alat yang dianjurkan untuk sterilisasi adalah formalin Autoklav dengan suhu 70°C Setelah peralatan medis yang akan disterilkan dimasukkan, gas formaldehid

dialirkan ke dalam kamar (chamber) dengan konsentrasi 15 mg/m³ (dr. Darmadi, 2008).

D. Jerawat

Jerawat adalah suatu kondisi yang mempengaruhi folikel rambut. Sebuah folikel rambut terdiri dari pori-pori terbuka di permukaan kulit. Pori-pori mengarah ke dalam untuk sebuah rongga yang terhubung ke kelenjar minyak. Kelenjar, yang disebut kelenjar sebasius, memproduksi minyak (sebum) yang melumasi kulit dan folikel rambut yang tumbuh keluar dari rongga. Minyak yang tumbuh dari dalam rongga akan menyebar di atas permukaan kulit, yang membentuk lapisan pelindung. Namun, dalam kondisi seperti jerawat, minyak akan menumpuk dalam rongga folikel rambut. Hal ini menyebabkan peradangan. Dalam lingkungan hormonal bakterial yang berperan dalam perkembangan jerawat. Spesies bakteri pokok yang terkait dengan jerawat adalah *Propionibacterium acnes*. Mikroorganisme ini adalah bakteri yang normal pada kulit dan di dalam folikel rambut. Biasanya, aliran minyak akan keluar mengenai bakteri ke permukaan dan dihilangkan ketika wajah dicuci. produksi minyak yang berlebihan, merupakan sumber nutrisi untuk *Propionibacterium acnes* dalam rongga sehingga bakteri berkembang tumbuh dengan baik dan cepat. Dua spesies bakteri lain yang hidup dan tumbuh di permukaan kulit dan dapat dikaitkan sebagai penyebab dari jerawat adalah *Propionibacterium granulosum* dan *Staphylococcus epidermidis* (Brigham Narins, 2003).



Gambar 1. Unit Pilosebasiun Normal

Faktor risiko dan penyebab akne, antara lain:

1. Sebum

Merupakan faktor utama penyebab timbulnya akne. Produksi sebum dipengaruhi oleh diet atau makanan tinggi lemak, karbohidrat, yodium, alkohol dan makanan pedas. Pemakaian kosmetik seperti krim muka, pelembab, sunscreen, minyak rambut juga berperan dalam meningkatkan produksi sebum.

2. Genetik

Faktor herediter yang sangat berpengaruh pada besar dan aktivitas kelenjar glandula sebacea. Apabila kedua orang tua mempunyai parut bekas akne, kemungkinan besar anaknya akan menderita akne.

3. Usia

Umumnya insiden terjadi pada sekitar umur 14 –17 tahun pada wanita, 16–19 tahun pada pria dan pada masa itu lesi yang predominan adalah komedo dan papul dan jarang terlihat lesi berat pada penderita.

4. Kebersihan wajah

Meningkatkan perilaku kebersihan diri dapat mengurangi kejadian akne vulgaris pada remaja.

5. Psikis

Pada beberapa penderita, stres dan gangguan emosional dapat menyebabkan eksaserbasi akne. Stres akan mengakibatkan teraktivasi HPA (Hipotalamus Pituitari Axis). Stresor fisiologis seperti rasa lapar, haus, aktivitas fisik ataupun trauma bersifat umum, mengancam homeostasis dan respon fisiologis yang akan terjadi (termasuk aktivasi HPA) merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan atau mengembalikan homeostasis. Stresor psikologis tidak secara langsung mengacaukan homeostasis, ataupun individu dan respon stres yang terjadi dapat dipelajari. Stresor psikologis menghasilkan perasaan emosional seperti gelisah, takut, marah, frustrasi, depresi, dan sebagainya, dimana timbulnya dan besarnya perasaan tersebut bergantung pada penilaian seseorang terhadap suatu keadaan. Kondisi stres tersebut selain dapat memicu timbulnya akne vulgaris juga dapat memperberat kondisi akne vulgaris yang sudah ada (Latifah dan Kurniawati, 2015).

Patogenesis acne meliputi empat faktor, yaitu hiperproliferasi epidermis folikular sehingga terjadi sumbatan folikel, produksi sebum berlebihan, inflamasi, dan aktivitas *Propionibacterium acnes* (*P. acnes*). Androgen berperan penting pada patogenesis acne tersebut. Acne mulai terjadi saat adrenarke, yaitu saat kelenjar adrenal aktif menghasilkan dehidroepiandrosteron sulfat, prekursor testosteron. Penderita acne memiliki kadar androgen serum dan kadar sebum lebih

tinggi dibandingkan dengan orang normal, meskipun kadar androgen serum penderita acne masih dalam batas normal. Androgen akan meningkatkan ukuran kelenjar sebacea dan merangsang produksi sebum, selain itu juga merangsang proliferasi keratinosit pada duktus seboglandularis dan akroinfundibulum.

Hiperproliferasi epidermis folikular juga diduga akibat penurunan asam linoleat kulit dan peningkatan aktivitas interleukin 1 alfa. Epitel folikel rambut bagian atas, yaitu infundibulum, menjadi hiperkeratotik dan koheisi keratinosit bertambah, sehingga terjadi sumbatan pada muara folikel rambut. Selanjutnya di dalam folikel rambut tersebut terjadi akumulasi keratin, sebum, dan bakteri, dan menyebabkan dilatasi folikel rambut bagian atas, membentuk mikrokomedo. Mikrokomedo yang berisi keratin, sebum, dan bakteri, akan membesar dan ruptur. Selanjutnya, isi mikrokomedo yang keluar akan menimbulkan respons inflamasi. Akan tetapi, terdapat bukti bahwa inflamasi dermis telah terjadi mendahului pembentukan komedo. Faktor keempat terjadinya acne adalah *P. acnes*, bakteri positif gram dan anaerob yang merupakan flora normal kelenjar pilosebacea. Remaja dengan acne memiliki konsentrasi *P. acnes* lebih tinggi dibandingkan remaja tanpa acne, tetapi tidak terdapat korelasi antara jumlah *P. acnes* dengan berat acne. Peranan *P. acnes* pada patogenesis acne adalah memecah trigliserida, salah satu komponen sebum, menjadi asam lemak bebas sehingga terjadi kolonisasi *P. acnes* yang memicu inflamasi (Movita Theresia, 2013).

E. Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Siplisia yang diekstrak mengandung senyawa kimia yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung siplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 2000).

Ekstrak/sari adalah material hasil penarikan oleh pelarut air atau pelarut organik dari bahan kering (dikeringkan). Hasil penyarian tersebut kemudian pelarutnya dihilangkan dengan cara penguapan dengan alat evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental jika pelarutnya pelarut organik. Jika pelarutnya air, pada tahap akhir dilakukan penghilangan total dengan cara liofilisasi menggunakan alat freeze dryer. Hasil liofilisasi akan berupa serbuk. Akan tetapi teknologi liofilisasi di Indonesia tergolong komersial dan sangat mahal serta terbatas dimiliki institusi ilmiah di Indonesia. Untuk itu, cara lain bisa ditempuh dengan pengentalan dengan waterbath

dengan temperature kurang dari 60°C (Saifudin Aziz, 2012).

Macam-macam ekstraksi yaitu:

1. Cara dingin
 - a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar (Depkes RI, 2000).

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna (Exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes RI, 2000).

2. Cara panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

b. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Biomasa ditempatkan dalam wadah soklet yang dibuat dengan kertas saring, melalui alat ini pelarut akan terus direfluks. Alat soklet akan mengkosongkan isinya ke dalam labu dasar bulat setelah pelarut mencapai kadar tertentu. Setelah pelarut segar melawati alat ini melalui pendingin refluks, ekstraksi berlangsung sangat efisien dan senyawa dari biomasa secara efektif ditarik ke dalam pelarut karena konsentrasi awalnya rendah dalam pelarut.

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C selama waktu tertentu (15-20 menit).

e. Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (suhu lebih dari 30°C) dan temperatur sampai titik didih air.

f. Destilasi Uap

Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap (minyak atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara kontinu sampai sempurna diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran (senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat air bersama senyawa kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian. Destilasi uap, bahan simplisia benar-benar tidak tercelup ke air yang mendidih, namun dilewati uap air sehingga senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi. Destilasi uap dan air, bahan (simplisia) bercampur sempurna atau sebagian dengan air mendidih, senyawa kandungan menguap tetap kontinu ikut terdestilasi (Depkes RI, 2000).

G. Tinjauan Islam

Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia sangatlah berlimpah dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Firman Allah SWT didalam QS.Al-syu'ara '(26): 7

﴿كَرِيمٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا أَنْبَتْنَا كَمَا الْأَرْضُ إِلَى يَرَوْنَ أَوْلَمَ﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berabagai macam tumbuh – tumbuhan yang baik ?” (Kementrian Agama RI, 2013)

Alangkah kasar jika manusia hanya tau memakai hasil bumi saja, tetapi tidak mau tahu betapa asal tumbuhan makanan itu? Semuanya terjadi *min kulli zaujin karimin*, dari perkawinan atau kelamin jantan dan betina (Hamka, 2015).

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memberi tahukan kepada manusia untuk mencari tahu tentang apa yang telah Allah tumbuhkan di muka bumi ini, hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara meneliti, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan didalam al-qur’an mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Sejak dahulu tumbuhan telah dijadikan tanaman obat tradisional untuk memelihara kesehatan, pengobatan maupun untuk kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Firman Allah SWT dalam QS. Al – Thaaha / 20

عَلَىٰ نَبَاتٍ مِّنْ أَرْوَاجٍ بِيضَةٍ فَأَخْرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَّأَنْزَلَ سُبُلًا فِيهَا كُتُبٌ مَّهْدًى الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”(Kementrian Agama, 2013)

Ayat di atas menyatakan bahwa dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan adalah isyarat bahwa keberadaan manusia di pentas bumi dalam kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah. Firman-Nya: menjadikan bagi kamu dibumi itu jalan-jalan, adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia dibumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-nya. Selanjutnya firman-Nya bahwa: dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan dan hidayah buay hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (shibab, 2002).

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat dan merupakan anugerah Allah swt, kerana Allah swt tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah RA:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya:

”Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678).

Ungkapan “setiap penyakit pasti ada obatnya”, artinya bisa bersifat umum, sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Allah sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya. Akan tetapi ilmu tersebut tidak ditampakkan Allah untuk menggapainya. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah swt. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati. Karena setiap ciptaan Allah swt itu pasti ada penawarnya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Berdasarkan Q.S At-Thaha ayat 53 bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi sebagai tempat tinggal, beserta kebutuhan umat manusia. Allah menciptakan air hujan sehingga tumbuhlah berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Dimana tumbuhan tersebut sangatlah bermanfaat yaitu sebagai sumber makanan, pengobatan dan kehidupan umat manusia. Allah menegaskan pada surah Al-Asyu'ara' ayat 7, bahwa adakalanya manusia mencari ilmu, mencari informasi tentang apa yang Allah ciptakan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan tidaklah sia-sia. Allah telah memberitahukan banyaknya tumbuh-tumbuhan baik yang diciptakan. Disinilah peran seorang Farmasis untuk mencari kegunaan dan manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut dengan cara penelitian. Mencari tahu kandungan senyawa aktif, yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan dan makanan yang memiliki nutrisi

yang baik. Karena sesungguhnya *tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya* (H.R. Al-Bukhari).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan melihat uji aktivitas fraksi ekstrak etanol 96% kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne*, dan *Staphylococcus epidermidis*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Mikrobiologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode eksperimental. Seperti yang telah dijelaskan di atas, metode ini merupakan metode penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*).

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti dari gejala yang ada (Sukmadinata, 2005).

E. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah autoklaf (*Hirayama*®), batang pengaduk, bejana cawan petri (*Iwake Pyrex*®), botol coklat, cawan porselin, chamber (*Iwake Pyrex*®), corong pisah (*Iwake Pyrex*®), erlenmeyer (*Iwake Pyrex*®), gelas kimia (*Iwake Pyrex*®), gelas ukur (*Iwake Pyrex*®), inkubator (*Memmer*®), kompor gas (*Kirin*®), Laminar Air Flower (*Esco*®), lampu UV 254 dan 366 nm, mikropipet ®(*Socorex*),

oven ®(Memmer®), pinset, piper disc, sendok besi, seperangkat alat kromatografi cair vakum, spoit (One Med®), timbangan analitik (END®), toples kaca.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*), air suling (aqua destillata), biakan murni *Staphylococcus epidermidis* dan *Propionibacterium acne*. etanol 96%, etil asetat, kertas cakram (*piper disk*), kertas saring, medium nutrient agar (NA), n-heksan, pereaksi AlCl_3 5%, pereaksi dragendorf, pereaksi FeCl_3 5%, pereaksi KOH, pereaksi lieberman bouchard, dan serbuk silica gel 60 GF₂₅₄.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengambilan Sampel

Sampel kulit buah muda pisang ambon diambil dalam kondisi yang masih segar dan muda (tangkai putih masih menempel atau masih terdapat pada ujung buah) (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

2. Pengelolaan Sampel

Kulit buah muda pisang dipisahkan dari isinya lalu dicuci dengan air mengalir, kulit buah muda pisang selanjutnya dirajang kecil-kecil, dan dikeringkan di lemari pengering (Nurmayunita Sri dkk, 2015)

3. Ekstraksi Sampel

Ekstraksi kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) dilakukan dengan cara maserasi. Sampel kulit buah muda pisang ambon di timbang

sebanyak 600 gram. Dimasukkan ke dalam wadah toples, kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 4 liter dan ditutup rapat. Ekstraksi dilakukan dengan pengadukan tiap 1x24 jam selama 3 hari hingga ekstrak kulit buah muda pisang ambon terendam dengan baik dan bercampur rata dengan pelarut. Kemudian disaring, dan dilakukan remaserasi sebanyak 2 kali hingga larutan berwarna bening. Hasil maserasi dan remaserasi digabungkan dan dipekatkan menggunakan *vacuum rotary evaporator* pada suhu pemanasan 70°C sampai pelarut itu tidak menguap lagi dan diperoleh ekstrak kental (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

4. Partisi

Partisi dilakukan dengan cara kulit buah muda pisang ambon sebanyak 30 gram dilarutkan dalam etanol dan air dengan perbandingan 1 : 1 sebanyak 150 mL. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah, ditambahkan 150 mL n-heksana, kemudian dikocok, setelah itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara fraksi n-heksana dan etanol-air. Dipisahkan ekstrak dengan cara membuka keran yang terdapat pada corong pisah. Di ulangi penambahan pelarut n-heksan hingga 7 kali dengan jumlah yang sama sampai larutan berwarna bening, didapatkanlah ekstrak n-heksan. Residu ekstrak etanol+air di aptisi kembali dengan pelarut etil asetat sebanyak 150 mL. dimasukkan ke dalam corong pisah, dikocok hingga terjadi dua lapisan. Dipisahkan ekstrak dengan cara membuka keran yang terdapat pada corong pisah. Diulangi sebanyak 7 kali hingga larutan etil asetat berwarna bening. didapatkanlah ekstrak kental n-heksana, etil asetat dan etanol-air (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

5. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, dan dibilas dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas putih. Tabung reaksi dan botol coklat terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya serta medium NA (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

6. Penyiapan Sampel Uji

Sampel kulit buah muda pisang ambon diambil sebanyak 30 mg, 50 mg, dan 100 mg dari tiap-tiap ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol+air, kemudian dilarutkan dalam 1 mL dimetil sulfoksida, lalu masing-masing sampel uji dipipet 5 µL sehingga diperoleh loading dose 150, 250 dan 500 µg (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

7. Penyiapan bakteri uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Staphylococcus epidermidis* dan *Propionibacterium acne*. Pengujian antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar, yaitu dengan cara nutrient agar (NA) yang telah mencair dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi suspensi bakteri *Propionibacterium acne* atau *Staphylococcus epidermidis*, kemudian dihomogenkan lalu dibiarkan memadat secara merata. Di atas permukaan agar diletakkan *paper disc* (diameternya = 6 mm) yang telah ditetesi bahan uji sebanyak 5 µL dengan berbagai konsentrasi

yang telah dibuat, lalu diinkubasi selama 18 – 24 jam pada suhu 37°C (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

8. Interpretasi

Zona jernih disekitar *paper disc* mengindikasikan adanya penghambat dari senyawa uji.

9. Fraksinasi dengan Kromatografi Cair Vakum

Sebelum dilakukannya fraksinasi, dilakukan pencarian pemisahan noda yang baik dengan lempeng KLT GF₂₅₄, sehingga didapatkan perbandingan eluen dengan pemisahan senyawa yang baik terhadap ekstrak n-heksan dan etil asetat. Selanjutnya ditimbang tiap-tiap ekstrak sebanyak sebanyak 30 gram (ekstrak n-heksan dan etil asetat) dikeringkan dengan silica gel 60 GF₂₅₄ dalam cawan porselin yang berbeda, dan diaduk sampai menjadi serbuk kering. Bagian bawah *sinterglass* dimasukkan kertas saring, kemudian diisi dengan serbuk fase diam silica gel 60 GF₂₅₄ sampai mencapai ketinggian kurang lebih setengah dari tinggi *sinterglass* sambil divakum, serbuk sampel ditambahkan di atasnya dan permukaan serbuk ditutupi lagi dengan kertas saring. Pada ekstrak n-heksan dan etil asetat difraksinasi dengan fase gerak dari pelarut yang kurang polar sampai pelarut yang lebih polar dengan berbagai perbandingan eluen. Hasil fraksinasi selanjutnya ditotolkan pada lempeng KLT untuk mencari noda dan nilai R_f yang sama guna penggabungan fraksi (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

10. Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi

Fraksi-fraksi yang dihasilkan dari kromatografi cair vakum selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus epidermidis* dan *Propionibacterium acne* menggunakan metode difusi agar, yaitu dengan cara nutrient agar (NA) yang telah mencair dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi suspensi bakteri kemudian dihomogenkan lalu dibiarkan memadat secara merata. Konsentrasi ekstrak yang digunakan yaitu 100 mg/mL yang dilarutkan dengan dimetil sulfoksida sebanyak 1 mL, diambil sebanyak 1 μ L sehingga didapatkan loading dose 100 μ g/ μ L. Di atas permukaan agar diletakkan *paper disc* (diameternya = 6 mm), yang telah dibasahi ekstrak uji. Lalu dilihat zona bening disekitar *paper disc* mengindikasikan adanya penghambatan dari senyawa uji (Nurmayunita Sri dkk, 2015).

11. Skrining Fitokimia

Fraksi teraktif dari fraksinasi ekstrak n-heksan dan etil asetat ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan eluen (5:1), dan (3:2). Lempeng KLT diamati dibawah sinar UV 254 nm dan 366 nm kemudian disemprotkan dengan menggunakan pereaksi penampakan noda antara lain sebagai berikut:

a. Uji Alkaloid

Pereaksi yang digunakan yaitu Dragoendorf, jika sampel positif mengandung alkaloid, maka timbul warna jingga dengan latar belakang kuning.

b. Uji Steroid

Pereaksi yang digunakan Lieberman-Bouchard. Kromatogram terlebih dahulu di panaskan, kemudian diamati di lampu UV 366 nm, munculnya noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.

c. Uji Flavanoid

Pereaksi yang digunakan yaitu Aluminium Klorida dan diamati di lampu UV 366 nm, jika sampel mengandung senyawa Flavanoid maka noda akan berfluoresensi kuning.

d. Uji Fenol

Pereaksi yang digunakan Besi (III) Klorida, jika positif mengandung fenol maka akan dihasilkan warna hijau atau biru.

e. Uji Khumarin

Pereaksi yang digunakan KOH etanolik, jika sampel positif mengandung senyawa khumarin maka akan dihasilkan warna merah terang (Harbone, 1984).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Kulit Muda Buah Pisang Ambon

Kulit buah muda pisang ambon diekstraksi dengan pelarut etanol 96% menggunakan metode maserasi.

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Kulit Muda Buah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)

No	Sampel	Berat Sampel	Berat Ekstrak	Volume Pelarut (Etanol 96%)	Persen Rendamen
1	Kulit Muda Buah Pisang Ambon	600 gram	72 gram	10 liter	12%

2. Partisi

Partisi dilakukan dengan metode partisi cai-cair menggunakan tiga pelarut yang berbeda mulai dari pelarut yang kurang polar n-heksan, semi polar etil asetat, dan polar etanol+air.

Tabel 2. Hasil Partisi Ekstrak Etanol 96% Kulit Muda Buah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)

No	Jenis Ekstrak	Berat Ekstrak
1	Ekstrak etanol+air	13,6 gram
2	Ekstrak n-heksan	13,2 gram
3	Ekstrak etil asetat	3,2 gram

3. Pengujian Skrining Antibakteri

Skrining antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan bakteri penyebab jerawat yang di uji dari konsentrasi rendah hingga konsentrasi yang tinggi (30, 50, dan 100 mg/mL).

Tabel 3. Hasil Uji Skrining Ekstrak Etanol 96% Kulit BuahMuda Pisang Ambon (*Musa paradisiacal* var. *sapientum*) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat dengan melihat diameter zona hambat (mm)

No	Ekstrak	<i>Propionibacterium acne</i>			<i>Staphylococcus epidermidis</i>		
		30 mg/mL	50 mg/mL	100 mg/mL	30 mg/mL	50 mg/mL	100 mg/mL
1	n-Heksan	8	10,6	12	14,6	15,6	17,3
2	Etil Asetat	10	10,3	10,6	14,6	16,3	17,3
3	Etano+air	9	9,3	9,3	7	7	7

Keterangan:

Diameter >20 mm : Daya hambat sangat kuat

Diameter 10-20 mm : Daya hambat kuat

Diameter 5-10 mm : Daya hambat cukup/medium

Diameter <5 mm : Daya hambat lemah

(Suryawiria, 1978 dalam Faradhila, 2015).

4. Fraksi Ekstrak n-Heksan Dan Ekstrak Etil Asetat Dengan Kromatografi Cair Vakum

Pada fraksinasi digunakan ekstrak n-heksan dan etil asetat. Perbandingan eluen untuk ekstark n-heksan yaitu n-heksan:etil asetat (50:1, 25:1, 20:1, 15:1, 10:1, 5:1, 1:1, 1:10), etil asetat 100%, etil asetat:methanol (1:1) dan methanol 100%,

sedangkan pada ekstrak etil asetat yaitu n-heksan:etil asetat (25:1, 20:1, 15:1, 10:1, 5:1, 1:1, 1:10), etil asetat 100%, etil asetat:methanol (10:1, 1:1) dan methanol 100%, sehingga didapatkan 5 penggabungan fraksi tiap-tiap ekstrak berdasarkan jumlah noda yang tampak dan nilai Rf.

Tabel 4. Fraksi Gabungan Hasil Fraksinasi Ekstrak n-Heksan dan Etil Asetat

No	Ekstrak	Fraksi	Eluen	Perbandingan	Bobot Fraksi (Gram)
1	n-Heksan	A	n-Heksan:Etil Asetat	50:1 25:1	0,287
		B	n-Heksan:Etil Asetat	20:1 15:1 10:1	0,105
		C	n-Heksan:Etil Asetat	5:1 1:1	0,165
		D	n-Heksan:Etil Asetat Etil Asetat	1:10 100%	0,181
		E	Etil Asetat:Methanol Methanol	1:1 100%	0,176
2	Etil Asetat	A	n-Heksan:Etil Asetat	25:1 20:1	0,103
		B	n-Heksan:Etil Asetat	15:1 10:1 5:1	0,108
		C	n-Heksan:Etil Asetat	1:1 1:10	0,397

		D	Etil Asetat Etil Asetat:Methanol	100% 10:1	0,450
		E	Etil Asetat:Methanol Methanol	1:1 100%	0,424

5. Uji Aktivitas Antibakteri Fraksinasi

Uji aktivitas antibakteri terhadap fraksi n-heksan dan etil asetat dilakukan dengan metode agar, bakteri yang digunakan *Propionibacterium acnedan* *Staphylococcus epidermidis*. Dan konsentrasi yang digunakan adalah 100 mg/mL.

Tabel 5. Diameter Zona Bening (mm) Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Ekstrak n-Heksan dengan konsentrasi 100 mg/mL

No	Ekstrak	Fraksi									
		<i>Propionibacterium acne</i>					<i>Staphylococcus epidermidis</i>				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	n-Heksan	9	9,66	13,3 3	13	8	10	13	23,6 6	7	15,6 6
2	Etil Asetat	7,66	11	14	10,6 6	7	15	16	24,6 6	15,6 6	8

6. Uji Identifikasi Golongan Senyawa Kimia

Uji identifikasi golongan senyawa untuk mengetahui senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri pada kulit buah muda pisang ambon.

Tabel 6. Hasil Identifikasi Komponen Kimia Fraksi C dari Ekstrak n-Heksan

No	Pereaksi	Jenis Senyawa	Hasil
1	Dragondrof	Alkaloid	-
2	AlCl ₃	Flavonoid	+

3	Lieberman-Bouchard	Triterpenoid	+
4	KOH	Khumarin	-
5	FeCl ₃	Fenol	+

Tabel 7. Hasil Identifikasi Komponen Kimia Fraksi C dari Ekstrak Etil Asetat

No	Pereaksi	Jenis Senyawa	Hasil
1	Dragondrof	Alkaloid	+
2	AlCl ₃	Flavonoid	+
3	Lieberman-Bouchard	Steroid	+
4	KOH	Khumarin	+
5	FeCl ₃	Fenol	-

B. Pembahasan

Pengambilan sampel dilakukan di Desa Bungaya, Kecamatan Sapaya, Kabupaten Gowa. Kulit buah muda pisang ambon diambil pada buah yang (tangkai putik masih menempel atau masih terdapat pada ujung buah). Dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi kulit buah muda pisang ambon sebanyak 600 gram menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 4 liter guna untuk menarik senyawa kimia yang terkandung di dalam sampel dan dilakukan remaserasi 2x24 jam. Maserat yang diperoleh dari maserasi lalu dipekatkan dengan *vaccum rotary evaporator* sehingga diperoleh ekstrak kental. Berdasarkan Tabel 1. Hasil ekstraksi kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiacavar. sapientum*) diperoleh ekstrak etanol kulit buah muda pisang ambon sebanyak 72 gram dengan persen rendamen 12%. Rendemen merupakan perbandingan jumlah (kuantitas) ekstrak dari hasil ekstraksi

dari suatu tumbuhan, satuan yang digunakan adalah persen (%). Semakin tinggi nilai rendamen menunjukkan bahwa semakin besar hasil ekstraksi yang diperoleh (Armando, 2009).

Pemilihan etanol sebagai pelarut karena pelarut etanol 96% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan pengganggu hanya skala kecil yang larut ke dalam cairan pengekstraksi (R. Voight, 1994).

Pelarut etanol memiliki sifat yang dapat melarutkan seluruh bahan aktif yang terkandung dalam bahan alami, baik bahan aktif yang bersifat polar, semi polar, dan non polar (Tiwari dkk, 2011).

Menurut Farmakope Indonesia cairan penyari adalah air, etanol, etanol-air, eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak atsiri, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil (Anonim, 1989 dalam Saraswati, 2015).

Setelah didapatkan ekstrak kental, maka dilakukan partisi dengan metode ekstraksi cair-cair. Partisi dilakukan dengan menggunakan ekstrak etanol 96% sebanyak 30 gram dan disuspensikan dengan etanol+air (1:1) sebanyak 150 mL, n-heksan, dan etil asetat masing-masing sebanyak 150 mL. Proses partisi cair-cair berdasarkan kemampuan kelarutannya dalam suatu pelarut, sehingga dihasilkan bagian yang larut dan tidak larut. Menggunakan tiga pelarut tersebut bertujuan untuk

memisahkan senyawa yang kepolarannya rendah tertarik oleh n-heksan, dan senyawa yang kepolarannya sedang tertarik oleh etil asetat dan yang kepolarannya tinggi tertarik oleh etanol+air. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh ekstrak kental etanol+air sebanyak 13,6 gram dengan persen rendamen 45,33%, ekstrak kental n-heksan sebanyak 13,2 gram dengan persen rendamen 44%, dan ekstrak kering etil asetat sebanyak 3,2 gram 10,66%.

Setelah dilakukannya partisi dilakukan skrining antibakteri dengan metode difusi agar dengan *paper disc* menggunakan bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*. *Paper disc* yang telah dibasahi ekstrak lalu diletakkan dalam cawan petri yang telah diinokulasi bakteri uji kemudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37°C. Inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkonsisikan lingkungan pada suhu optimum perkembangan bakteri sehingga dapat diketahui bakteri dapat berkembang dengan baik (Saraswati, 2015). Aktivitas antibakteri dinyatakan positif apabila terbentuk zona bening disekeliling kertas cakram, bagian yang dihitung dengan jangka corong adalah diameter dari zona bening yang terbentuk (Pratiwi, 2008 dalam Saraswati, 2015).

Menurut Suryawiria (1978) dalam Saraswati (2015), berdasarkan zona hambat yang terbentuk maka aktivitas antibakteri dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu, antibakteri lemah diameter zona hambat <5 mm, antibakteri sedang zona hambat antara 5-10 mm, antibakteri kuat 10-20 mm dan antibakteri sangat kuat >20mm. Tujuan dari skrining antibakteri ini untuk melihat ekstrak teraktif dari ekstrak hasil partisi. Dibuat konsentrasi Ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol+air

sebanyak 30, 50 dan 100 mg/mL yang dilarutkan dengan dimetil sulfoksida (DMSO). Pemilihan pelarut ini karena polaritas aprotik yang efektif melarutkan berbagai bahan kimia organik dan anorganik, serta terbukti tidak memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Normayunita S., 2015).

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol+air, etil asetat, dan n-heksan memiliki aktivitas antibakteri. Diperoleh ekstrak n-heksan dan etil asetat yang memiliki aktivitas teraktif terhadap bakteri *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* pada konsentrasi 100 mg/mL dengan diameter zona bening 12 mm; 10,6 mm dan 17,33 mm ; 17,33 mm yang termasuk dalam golongan daya hambat kuat.

Setelah dilakukannya skrining antibakteri maka dilakukannya pencarian profil KLT dari ekstrak n-heksan dan ekstrak etil asetat dengan menggunakan perbandingan eluen tertentu. Lempeng KLT yang telah ditotolkan ekstrak n-heksan dan ekstrak etil asetat dielusi dengan pelarut n-heksan : etil asetat dengan perbandingan konsentrasi lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan terlebih dahulu, setelah dielusi lempeng KLT dikeluarkan dari chamber kemudian dilihat noda yang terdapat pada lempeng KLT di bawah lampu UV 254 nm dan 366 nm. Pemisahan bercak noda yang baik ekstrak n-heksan dan etil asetat yaitu pada perbandingan eluen n-heksan:etil (5:1) dan (4:1).

Setelah didapatkan pemisahan bercak noda yang baik maka dilanjutkan ke fraksinasi dengan menggunakan metode Kromatografi Cair Vakum. Dimana fraksinasi ini dilakukan memisahkan senyawa setelah didapatkan ekstrak aktif.

Metode ini dipilih karena kecepatan proses (efisiensi waktu) pengelusan yaitu dipercepat dengan cara kolom dihisap menggunakan vakum. Selain itu kromatografi cair vakum juga dapat memisahkan komponen senyawa dalam jumlah yang banyak serta baik untuk memisahkan komponen senyawa kimia dalam jumlah yang sedikit dalam ekstrak dan hasilnya cepat diperoleh (Saifuddin, 2012). Pada fraksinasi fase diam yang digunakan yaitu silika gel 60 GF 254 dan fase gerak dari pelarut yang kurang polar hingga pelarut yang lebih polar. Pada ekstrak n-heksan fraksinasi dilakukan menggunakan eluen n-heksan : etil asetat (50:1, 25:1, 20:1, 15:1, 10:1, 5:1, 1:1, dan 1:10) etil asetat 100%, etil asetat : methanol (1:1), dan methanol 100%. Pada ekstrak etil asetat fraksinasi dilakukan menggunakan eluen n-heksan : etil asetat (25:1, 20:1, 15:1, 10:1, 5:1, 1:1, dan 1:10) etil asetat 100%, etil asetat : methanol (1:1 dan 10:1), dan methanol 100%.

Hasil fraksinasi yang didapatkan kemudian dilakukan penotolan pada lempeng KLT yang bertujuan untuk melihat persamaan profil kromatogram (bercak atau noda), bila profil kromatogram sama atau nilai R_f tiap-tiap noda dari beberapa fraksi sama maka dapat digabungkan menjadi satu fraksi karena dapat dikatakan memiliki kandungan senyawa kimia yang sama (Normayunita, 2015). Berdasarkan Tabel 4, 5 dan 6 dapat dihasilkan lima penggabungan fraksi dengan bobot yang berbeda yaitu fraksi A (fraksi 1 dan 2) dengan bobot 0,287 gram, fraksi B (fraksi 3, 4, dan 5) dengan bobot 0,095 gram, fraksi C (fraksi 6 dan 7) dengan bobot 0,165 gram, fraksi D (8 dan 9) dengan bobot 0,181 gram, fraksi E (fraksi 10 dan 11) dengan bobot 0,176 gram. Sedangkan pada fraksi ekstrak etil asetat yaitu fraksi A

(fraksi 1 dan 2) dengan bobot 0,103 gram, fraksi B (fraksi 3, 4, dan 5) dengan bobot 0,098 gram, fraksi C (fraksi 6 dan 7) dengan bobot 0,397 gram, fraksi D (8 dan 9) dengan bobot 0,450 gram, fraksi E (fraksi 10 dan 11) dengan bobot 0,424 gram.

Setelah diperoleh penggabungan fraksi maka dilakukan uji antibakteri fraksi ekstrak n-heksan dan fraksi ekstrak etil asetat. Dimana metode yang digunakan sama seperti uji skrining anti bakteri yaitu menggunakan metode difusi agar dengan menggunakan medium NA yang telah diinokulai oleh bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*. Konsentrasi yang digunakan pada uji antibakteri hasil fraksinasi diambil dari konsentrasi yang memiliki aktifitas teraktif pada uji skrining antibakteri yaitu 100 mg/mL. Berdasarkan Tabel 7 fraksi C memiliki aktifitas terbaik terhadap bakteri *Propionibacterium acne* dengan diameter zona bening 13,33 mm dan 14 mm masuk dalam kategori daya hambat kuat dan pada bakteri *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona bening 23,66 mm dan 24,33 mm masuk dalam kategori daya hambat sangat kuat. Kontrol negatif yang digunakan yaitu DMSO pelarut untuk melarutkan ekstrak dalam pembuatan konsentrasi, hasil menunjukkan DMSO tidak memiliki zona bening pada sekeliling *paper disk*, hal ini membuktikan bahwa DMSO tidak memiliki aktifitas sebagai antibakteri pada konsentrasi 1 mL.

Setelah mengetahui fraksi teraktif, maka dilakukannya uji identifikasi senyawa kimia. Pada perbandingan konsentrasi eluen n-heksan:etil asetat (5:1) memiliki pemisahan bercak noda yang baik sehingga perbandingan tersebut dapat digunakan mengelusi fraksi C n-heksan untuk diuji identifikasi senyawa kimianya.

Sedangkan pada fraksi C etil asetat memiliki pemisahan bercak noda yang baik pada perbandingan konsentrasi eluen n-heksan:etil (3:2). Setelah pencarian noda menggunakan lempeng KLT, kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi penampakan noda seperti Dragendorf untuk golongan alkaloid, Lieberman Bouchard untuk golongan senyawa terpenoid seperti triterpen dan steroid, AlCl_3 untuk senyawa golongan flavonoid, FeCl_3 untuk senyawa golongan fenol dan KOH untuk senyawa kumarin.

Pada uji identifikasi golongan kimia fraksi C dari ekstrak n-heksan menunjukkan hasil negatif terhadap alkaloid ditandai dengan tidak adanya noda berflouresensi (jingga latar kuning), kumarin (merah terang), dan positif mengandung triterpen ditandai dengan munculnya noda berflouresensi (coklat dan biru), Steroid (hijau kebiruan), flavonoid (kuning), fenol (hijau). Sedangkan pada fraksi C ekstrak etil asetat menunjukkan negatif pada fenol, positif terhadap alkaloid, triterpen, flavonoid, dan kumarin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis*
2. Hasil ekstrak kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) yang memiliki aktivitas teraktif sebagai antibakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* yaitu ekstrak n-heksan dan etil asetat dengan zona bening 12 mm 10,66 mm dan 17,33 mm, 17,33 mm yang masuk dalam kategori daya hambat kuat.
3. Hasil fraksi ekstrak n-heksan dan etil asetat kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*) memiliki aktivitas teraktif terhadap bakteri *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* pada fraksi C dengan zona bening 13,33 mm, 14 mm yang masuk dalam kategori daya hambat kuat dan 24,33 mm, 23,99 masuk dalam kategori daya hambat sangat kuat.

4. Kandungan kimia dari fraksi C n-heksan yaitu steroid, triterpen, flavanoid dan fenol. Sedangkan fraksi C etil asetat yaitu alkaloid, triterpen, flavanoid, dan kumarin.

B. Saran

Sebaiknya peneliti berikutnya melakukan penelitian mengenai isolasi senyawa yang terkandung di dalam kulit buah muda pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*). Serta dapat dikembangkan dalam pembuatan formulasi obat jerawat.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad I., dan Beg A.Z., *Antimicrobial and phytochemical studies on 45 Indian medicinal plants against multi-drug resistant human pathogens*, India: Aligarh Muslim University, 2001.
- Ar Rumaikhon, Ali Bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islam*, Solo: Al Qowam, 2008.
- Armando Rochim, *Memproduksi 15 Jenis Minyak Atsiri Berkualitas*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2009.
- Aslamiah S., Kartika R., dan Yusuf B., *Pembuatan Etanol Dari Kulit Buah Pisang Mahuli (Musa paradisiaca var. sapentum)*, Samarinda: Jurusan Farmasi, FMIPA, Universitas Mulawarman, 2015.
- Brigham Narins, *World Of Microbiology And Immunology Volumes 1 and 2*, New York: Thomson, 2003.
- Browning, B. L., “*Methods of Wood Chemistry*”. Vol I, II, Interscience Publishers. New York, 1966.
- Chapagain, B.P., dan Wiesman, Z., “*Larvicidal Activity of the Fruit Mesocarp Extract of Balanites aegyptiaca and its Saponin Fractions against Aedes aegypti*”, *Dengue Bulletin*, 2005.
- Chusnie, T.T.P. and Lamb, A.J., *Antimicrobial activity of flavonoid*. International Journal of Antimicrobial Agents, 2005.
- Dalimartha Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 3*, Jakarta: Puspa Swara, 2007.
- Darmadi, *Infeksi Nosokomial Probematika dan Pengendaliaanya*, Jakarta: Salemba Manika, 2008.
- Djide, M. N. Sartini Kadir, S. H, *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2008.
- Direktorat Jendral Hortikultura, Kementrian Pertanian, *Statistik Produk Hortikultura Tahun 2014*, Kementrian Pertanian, Direktorat Jendral Hortikultura, 2015.
- Dirjen POM, *Farmakoterapi Indonesia Edisi IV*, Jakarta: Depertemen Kesehatan RI, 1995.

- Dirjen POM., *Parameter Standar Umum Ekstrak tumbuhan Obat*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000.
- Fahn.A. *Anatomi tumbuhan edisi 3*, Yogyakarta: UGM press, 1995.
- Garrity George M., Bell Julia A., Lilburn Timothy G., *Taxonomic Outline Of The Prokaryotes Bergey's Manual® Of Systemic Bacteriology, Seceond Edition*, America: Bergey Manual Trus, 2004.
- Hadis Riwayat Al Bukhari no. 5678 dari Abu Hurairah Radhiyallahu' anhu.
- Harahap, M., *Ilmu Penyakit Kulit*, Jakarta: Hipocrates, 2000.
- Harbone, J.B., *Metode Fitokimia, edisi 1*, Bandung: ITB, 1987.
- Ighodaro, O.M., *Evaluation Study On Nigerian Species Of Musa Paradisiaca Peels: Phytochemical Screening, Proximate Analysis, Mineral Composition And Antimicrobial Activities*. Journal Lead City University Vol, Nigeria: Biochemistry Laboratory, Lead City University, 2012.
- Imam M.Z. dan Akter S., *Musa paradisiaca L. and Musa sapientum L. : A Phytochemical and Pharmacological Review*, Bangladesh: Department of Pharmacy Stamford University Bangladesh, 2011.
- Ismarani, *Potensi Senyawa Tannin Dalam Menunjang Produksi Ramah Lingkungan, Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah Vol. 3 No. 2*, 2012.
- Jawetz, Melnick, & Adelberg's, *Medical Microbiology Twenty Sixth Edition*, new york: The McGraw-Hill Companies, Inc, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2013
- Landro Anna Di et al, *Adult Female Acne And Associated Risk Factors: Results Of A Multicenter Case-Control Study In Italy*, Italy: Dermatology Acne Study Group, 2016.
- Latifah Sofia dan Kurniawaty Evy, *Stres dengan Akne Vulgaris*, Lampung: Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, 2015.
- Movita Theresia, *Acne Vulgaris*, Jakarta: Erha Clinic & Erha Apothecary, 2013.

- NAM Andini dan I windarti, *Potensi Kulit Pisang Ambon (Musa sapientum) Sebagai Agen Kemopreventif dan Ko-Kemoterapi pada Kanker Payudara*, Lampung: Fakultas Kedokteran Lampung, 2014.
- Ngajow M., Abidjulu J., Kamu V.S., Pengaruh Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Matao (*Pametia pinnata*) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro*, Manado: FMIPA, 2013.
- Neves J.R et al, *Propionibacterium acnes and bacterial resistance*, Brazil: Dermatology Department, 2015
- Nilotpal Barua dan Das Mitali, *An Overview On Pharmacological Activities Of Musa sapientum and Musa paradisiaca*, Departement Of Pharmacology, 2013.
- Normayanti S., Anam S., dan Khumaidi A., *Aktivitas Anti Bakteri Fraksi Ekstrak Kulit Buah Mentah Pisang Ambon (Musaa paradisiaca var. sapientum) Terhadap Staphylococcus Aureus*, Palu: Jurusan Farmasi, FMIPA, Universitas Tadulako, 2013.
- Noorhamdani, Permatasari N., dan Minerva A., *Ekstrak Metanol Kulit Pisang Ambon Muda (Musa Paradisiaca L.) Sebagai Antimikroba Terhadap Bakteri Escherichia Coli Secara InVitro*, Surabaya: Program Studi Pendidikan Dokter FKUB
- Pane Rosa Elfira, *Uji Aktivitas Senyawa Antioksidan dari Ekstrak Metanol Kulit Pisang Raja (Musa paradisiaca Sapientum)*, Palembang: Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2013.
- Pelczar, Michael j. and Chan. E.C.S, *Dasar-dasar Mikrobiologi* Jilid 2, Terjemahan Sri Hadioetomo, dkk. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Perry A.L and Lambert P.A., *Propionibacterium acnes*, UK: Biomedical Sciences, School of Life and Heath Sciences, Aston University, 2006.
- Rahmawati Dewi, *Hubungan Perawatan Kulit Wajah Dengan Timbulnya Akne Vulgari*, Skripsi, Semarang: Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2012.
- Saifuddin A., *Senyawa Alam Metabolit Skunder; Teori, Konsep dan Tekhnik Pemurnian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.
- Saraswati F.N., *Uji Aktivitas Antibakteri Eksrtak Etanol 96% Limbah Kulit Pisang Kepok Kuning (Musa balbasiana) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acne*, Jakarta: Skripsi, 2015

Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3*. Jakarta: Penerbit Lentari Hati, 2009

Suparmi dan Prasetya Harka, *Aktifitas Antioksidan Ekstrak Kasar Pigmen Karotenoid pada Kulit Pisang Ambon Kuning (Musa parasidiaca sapientum): Potensi sebagai Suplemen Vitamin A*, Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, 2012.

Voight, R. 1994, *Buku Tekhnolog Sediaan Farmas Edisi V*. Yogyakarta: UGM Press


Wahyuni Dwi, Dan Krisnawati Oktavia, *Ekstrak Kulit Pisang Ambon (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) Kunt.) Penghambat Bakteri Shigella dysenteriae*, Jember: Nasional Pendidikan Dan Pameran Produk Akademik Fkip Universitas Jember.

Lampiran 1. Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)




Gambar 2. Buah pisang ambon (*Musa paradisiaca* var. *sapientum*)


Lampiran 2. Skema Pengambilan dan Pengolahan Sampel




Lampiran 3. Skema Ekstraksi Sampel




Lampiran 4. Skema Partisi




Lampiran 5. Skema Sterilisasi Alat




Lampiran 6. Skema Uji Antibakteri Hasil Partisi



Lampiran 7. Skema Fraksinasi (Kromatografi Cair Vakum) dan Uji Anti Bakteri



Lampiran 8. Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Fraksi Teraktif



Lampiran 9. Ekstrak Kulit Buah Muda Pisang Ambon (*Musa Paradisiacavar. sapientum*)




Gambar 3. (a) ekstrak cair kulit buah muda pisang ambon, (b) ekstrak kental kulit buah muda pisang ambon


Lampiran 10. Ekstrak Hasil Partisi Dengan Metode Cair-Cair



a




b



c


Gambar 4. (a) ekstrak n-heksan, (b) ekstrak etil asetat, (c) ekstrak etanol+air.

Lampiran 11. Zona Bening Skringing Antibakteri *Propionibacterium acne* Dan *Staphylococcus epidermidis*




Gambar 5. (a) ekstrak n-heksan terhadap bakteri *Propionibacterium acne*, (b) ekstrak n-heksan terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*, (c) ekstrak etil asetat terhadap bakteri *Propionibacterium acne*, (d) ekstrak etil asetat terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*, (e) ekstrak etanol+air terhadap bakteri *Propionibacterium acne*, (f) ekstrak etanol+air terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Lampiran 12. Hasil Fraksinasi




Gambar 6. (a) hasil fraksinasi ekstrak n-heksan, (b) hasil fraksinasi ekstrak etil asetat.

Lapiraan 13. Noda Yang Tampak Dari Ekstrak n-Heksan dan Etil Asetat Pada Lempeng KLT




Gambar 7. (a) noda yang tampak pada uv 366 fraksi ekstrak n-heksan, (b) noda yang tampak pada uv 254 fraksi ekstrak n-heksan, (c) noda yang tampak pada uv 366 fraksi ekstrak etil asetat, (d) noda yang tampak pada uv 254 fraksi ekstrak etil asetat.

Lampiran 14. Uji Anti Bakteri Fraksi n-Heksan, Etil Asetat Dan Control Negatif




a




b




c



d



e




f



g




h




Gambar 8. (a) zona hambat bakteri *Staphylococcus epidermidis* fraksi n-heksan (fa, fb), (b) zona hambat bakteri *Staphylococcus epidermidis* fraksi n-heksan (fc, fd, fe), (c) zona hambat bakteri *Propionibacterium acne* fraksi n-heksan (fa, fb), (d) zona hambat bakteri *Staphylococcus epidermidis* fraksi n-heksan (fc, fd, fe), (e) zona hambat bakteri *Staphylococcus epidermidis* fraksi etil asetat (fa, fb), (f) zona hambat bakteri *Staphylococcus epidermidis* fraksi etil asetat (fc, fd, fe), (g) zona hambat bakteri *Propionibacterium acne* fraksi etil asetat (fa, fb), (h) zona hambat bakteri *Propionibacterium acne* fraksi etil asetat (fc, fd, fe), (i) control negative terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*, (j) control negative terhadap bakteri *Propionibacterium acne*.

Lampiran 15. Hasil Noda Berflouresensi Yang Menunjukkan Adanya Golongan Senyawa Tertentu Pada Fraksi C Etil Asetat



Gambar 9. (a) positif alkaloid (jingga latar kuning), (b) positif triterpen (coklat), (c) positif flavanoid (kuning), (d) negatif fenol, (e) positif kumarin (merah terang).

Lampiran 16. Hasil Noda Berfluoresensi Yang Menunjukkan Adanya Golongan Senyawa Tertentu Pada Fraksi C N-Heksan



Gambar 10. (a) negatif alkaloid (jingga), (b) positif tri terpen dan streoid (coklat atau bitu dan hijau kebiruan), (c) positif flavanoid (kuning), (d) positif fenol (hijau), (e) negatif kumarin (merah).

Lampiran 18. Perhitungan Konsentrasi Pada Uji Skrining Antribakteri Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol+air

a. 30 mg/1 mL

↓

30.000 μm /1000 μL

↓

150 μm /5 μL

b. 50 mg/1 mL

↓

50.000 μm /1000 μL

↓

250 μm /5 μL

c. 100 mg/1 mL

↓

100.000 μm /1000 μL

↓

500 μm /5 μL

Lampiran 19. Perhitungan Konsentrasi Pada Uji Antribakteri Fraksi Ekstrak n-Heksan, dan Etil Asetat

a. $100 \text{ mg}/1 \text{ mL}$
 \downarrow
 $100.000 \text{ } \mu\text{m}/1000 \text{ } \mu\text{L}$
 \downarrow
 $100 \text{ } \mu\text{m}/1 \text{ } \mu\text{L}$

RIWAYAT HIDUP



Tria Wulan Purnamei lahir di kota Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 mei 1995, anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan bapak Abdul Rauf S.Sos dan ibu Mastari.

Penulis mengawali pendidikannya di SDN 11 Sumbawa Besar. Setelah tamat SD, lanjut ke Pondok Pesantren Al-ikhlas Sumbawa Barat hingga kelas 2 semester pertama dan pindah ke SMPN 2 Sumbawa Besar. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 2 Sumbawa Besar. Dan sekarang penulis menempuh Program Sarjana Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menjalani pendidikannya di jurusan Farmasi, penulis aktif dalam berbagai oragnisai, seperti menjadi anggota HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Farmasi dalam Divisi Logistik dan Keuangan Periode 2014-2015 dan pernah menjadi anggota DEMA (Dewan Mahasiswa) FKIK periode 2015-2016.