

**PENGARUH PEMBERIAN OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG (*Rastrelliger
brachysoma*) SUBSTITUSI BUAH LAMUN (*Enhallus acoroides*)
TERHADAP STATUS GIZI PADA SISWA GIZI KURANG DI
SDN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH
KOTA MAKASSAR 2016**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Gizi Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**NISRINA NADHIFAH ARSYAD
70200112083**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi yang disusun oleh Nisrina Nadhifah Arsyad NIM 70200112083 ini telah kami periksa dan setuju untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan

Samata, @g Maret 2017

Tim Pembimbing

Pembimbing I




Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes

Pembimbing II



Nurdyanah S, SKM., MPH

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat



Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes

NIP: 19790525 200901 1 019

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum wr.wb

Segala puji hanyalah milik Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Otak-otak Ikan Kembung (*Rastrelliger brachysoma*) Substitusi Buah Lamun (*Enhallus acoroides*) Terhadap Status Gizi Pada Siswa Gizi Kurang di SDN Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016. guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk ummat yang mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H.M. Arsyad B dan Ibunda Hj. Hamsiah Hamzah serta saudara-saudaraku yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. DR. H. Musafir Pababbari, M.Hi, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak DR. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Bapak Azriful, SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurdiyana S, SKM., MPH. Selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Syarfaini, SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. H. Syahrudin Usman, M.Pd selaku Dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kepala Sekolah, Guru-guru, dan orangtua siswa SDN Cambaya yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian di SDN Cambaya.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Hj. Patmawati, Andi Rifah, Wahyuni Mansur, Nurul Wahyu Septiani, Arlinandari, Assriani, Nur Azizah Azis, Nurika, Naurah, Nurjidadah, dan Nur Azizah Pratiwi atas segala bantuan, dan dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Achilles 2012, khususnya pada peminatan Gizi 2012, teman-teman Posko I PBL, dan teman-teman KKNP angkatan 51 RS. Haji Kota Makassar.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis dari awal menempuh pendidikan di Universitas hingga penyelesaian skripsi ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta do'a dan harapan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi semua.

Gowa, Maret 2017

Penulis

Nisrina Nadhifah Arsyad
NIM 70200112083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional dan kriteria objektif penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan umum tentang Status Gizi.....	12
B. Tinjauan umum tentang Anak Usia Sekolah.....	23
C. Tinjauan umum tentang Otak-otak.....	30
D. Tinjauan umum tentang Ikan Kembung.....	34
E. Tinjauan umum tentang Buah Lamun.....	42
F. Tinjauan umum tentang Otak-otak Ikan Kembung Buah Lamun.....	45
G. Kerangka Konsep.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
2. Hasil Analisis.....	61
B. Pembahasan.....	67
1. Asupan Energi.....	68
2. Asupan Protein.....	71
3. Berat Badan.....	74
4. Status Gizi.....	78
C. Keterbatasan Penelitian.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	90
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB, Standar Baku Antropometri WHO-NCHS.....	20
Tabel 2.2	Angka Kecukupan Gizi Rata-rata yang dianjurkan Bagi Anak Sekolah.....	30
Tabel 2.3	Kandungan Zat Gizi Ikan Kembung Perempuan (<i>Rastrelliger Brachyoma</i>).....	42
Tabel 2.4	Kandungan Zat Gizi Makro Ikan Kembung Lelaki (<i>Rastrelliger kanagurta</i>).....	42
Tabel 2.5	Kandungan Zat Gizi Pada Buah Lamun Jenis (<i>Enhalus Acoroides</i>).....	45
Tabel 2.6	Kandungan Gizi Dalam 100 gram Otak-otak Ikan Kembung Substitusi Buah Lamun.....	46
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016.....	59
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Kelas di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016.....	59
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016.....	60
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orangtua di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016.....	60

Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016.....	61
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016.....	62
Tabel 4.7	Rata-rata Perubahan Asupan Energi Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tahun 2016.....	63
Tabel 4.8	Rata-rata Perubahan Asupan Protein Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tahun 2016.....	64
Tabel 4.9	Rata-rata Perubahan Berat Badan Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tahun 2016.....	65
Tabel 4.10	Rata-rata Perubahan Status Gizi Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tahun 2016.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ikan Kembung Perempuan.....	37
Gambar 2.2	<i>Enhalus acoroides</i>	43
Gambar 2.3	<i>Enhalus Acoroides</i>	44
Gambar 3.1	Rancangan Penelitian.....	49
Gambar 3.2	Timbangan Berat Badan.....	54
Gambar 3.3	Timbangan Makanan.....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Grafik Perubahan Asupan Energi Sebelum dan Setelah Intervensi.....	69
Grafik 4.2	Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum dan Setelah Intervensi.....	73
Grafik 4.3	Grafik Perubahan Berat Badan Sebelum dan Setelah Intervensi.....	75
Grafik 4.4	Grafik Perubahan Status Gizi Sebelum dan Setelah Intervensi.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kesiapan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Kuesioner Identitas Responden
- Lampiran 3 Lembar *Food Recall* 24 jam
- Lampiran 4 Form Data Pengukuran Antropometri
- Lampiran 5 Form Pemantauan Konsumsi Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung
- Lampiran 6 Cara Pembuatan Otak-otak Ikan Kembung Substitusi Buah Lamun dan Otak-otak Ikan Kembung
- Lampiran 7 Foto Hasil *Food Recall* 24 jam Melalui Aplikasi Nutri Survey 2007
- Lampiran 8 Kandungan Gizi Otak-otak Ikan Kembung Substitusi Buah Lamun
- Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10 Master Tabel
- Lampiran 11 Hasil Pemantauan Konsumsi
- Lampiran 12 Hasil Analisis Dengan Menggunakan SPSS Versi 21
- Lampiran 13 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
- Lampiran 14 Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

Nama : Nisrina Nadhifah Arsyad

NIM : 70200112083

Judul : Pengaruh Pemberian Otak-otak Ikan Kembung (*Rastrelliger brachysoma*) Substitusi Buah Lamun (*Enhalus acoroides*) Terhadap Status Gizi Pada Siswa Gizi Kurang Di SDN Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 2016

Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein merupakan salah satu kejadian malnutrisi yang umumnya terjadi pada anak usia sekolah dimana jumlah asupan zat gizi yaitu energi dan protein kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh yang ditandai dengan berat badan rendah/kurus yang apabila kejadian tersebut terjadi terus menerus akan mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih serius. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian Otak-otak Ikan Kembung Substitusi Buah Lamun, Otak-otak Ikan Kembung dan perbedaan keduanya terhadap status gizi pada siswa Gizi Kurang di SDN Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian *quasi eksperimen* dengan rancangan *non randomized pre-post control design* dengan metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah Responden 36 anak terbagi menjadi dua kelompok (kasus dan kontrol) yang diberikan intervensi selama 30 hari. Sebelum dan setelah intervensi dilakukan pengukuran berat badan. Metode Analisis menggunakan paired t-test.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan asupan energi pada kedua kelompok perlakuan. Pada kelompok kasus terjadi peningkatan sebesar 131.52 kkal ($p=0.000$) dan pada kelompok kontrol 48.08 kkal ($p=0.000$). Asupan protein meningkat pada kedua kelompok perlakuan, yaitu 8.59 g ($p=0.000$) pada kelompok kasus dan 8.47 g ($p=0.000$) pada kelompok kontrol. Terjadi peningkatan berat badan pada kedua kelompok perlakuan, yaitu 0.65 kg ($p=0.000$) pada kelompok kasus dan 0.30 kg ($p=0.001$) pada kelompok kontrol. Pada status gizi terjadi peningkatan secara bermakna pada kelompok kasus, yaitu -0.21 SD ($p=0.000$) dan -0.05 SD ($p=0.100$) menandakan bahwa tidak terjadi peningkatan status gizi pada kelompok kontrol ($p>0.05$). Pemberian intervensi otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung selama 30 hari belum mampu mengubah status gizi (BB/U) anak gizi kurang menjadi normal, ditandai dengan rata-rata nilai z-score masih berada pada angka <-2 SD menandakan responden masih berada pada kategori gizi kurang.

Jadi disarankan agar dilakukannya penelitian lanjutan untuk mengetahui durasi dan frekuensi yang efisien untuk pemberian intervensi guna mendapat hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci : Gizi Kurang, Anak Sekolah, Otak-otak Ikan Kembung Substitusi Buah Lamun, Otak-otak Ikan Kembung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status Gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, yang dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih (Almatsier 2009).

Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin (Almatsier 2001).

Peranan gizi sangatlah penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia khususnya pada anak usia sekolah yang masih pada fase pertumbuhan. Tumbuh kembang dalam usia anak sekolah sangat menentukan kualitas seseorang bila sudah dewasa. Tumbuh kembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung pemberian zat gizi dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan benar. Dimana, pada usia ini anak sangatlah memerlukan asupan zat gizi yang seimbang untuk menopang aktivitas fisiknya yang semakin aktif.

Malnutrisi yang umumnya terjadi pada anak usia sekolah yaitu kekurangan gizi dalam hal zat karbohidrat (zat tenaga) dan protein (zat pembangun) yang ditandai dengan badan yang kurus atau berat badan lebih rendah dari standar usia.

WHO menyebutkan bahwa kejadian *underweight* mengalami peningkatan dari 24% pada tahun 1990, menjadi 26,8% pada tahun 2014. Uniceff menyebutkan *underweight* telah menjadi masalah yang serius di beberapa negara di dunia. Hasil studi 2013-2014 oleh Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) di Amerika serikat menunjukkan bahwa 3,8% dari anak-anak dan remaja usia 2-19 tahun mengalami *underweight* (NHANES 2016).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional tahun 2013, prevalensi kurus (IMT/U) pada anak umur 5-12 tahun adalah sebesar 11,2% yang terdiri dari 4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus. Adapun data menurut provinsi Sulawesi Selatan, Prevalensi kurus (IMT/U) pada anak umur 5-12 tahun adalah sebesar 11,4% yang terdiri dari 3,4% sangat kurus dan 8,0% kurus (Kemenkes RI 2013).

Lingkungan permukiman nelayan di kawasan pesisir pada umumnya merupakan kawasan kumuh dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, untuk mendukung kesehatan (Mahmud 2007). Mayoritas masyarakat pesisir hidup dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan penyelam tradisional. Problema yang dihadapi nelayan sangatlah kompleks salah satunya menyangkut penghasilan mereka. Tidak dapat disangkal, bahwa penghasilan keluarga akan turut menentukan hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari-hari, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa makanan yang memenuhi persyaratan gizi hanya mungkin disajikan di lingkungan keluarga yang berpenghasilan cukup saja. Pemanfaatan sumber daya secara baik dan berdayaguna akan dapat membantu sehingga memungkinkan keluarga yang berpenghasilan terbatas dapat menghadirkan makanan yang cukup memenuhi syarat gizi bagi keluarganya (Ipa 2010).

Berdasarkan penelitian (Ahdal 2014) diketahui bahwa tingginya prevalensi kecacangan di SDN Cambaya, sebesar 57,7%. Dari data tersebut maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di SDN Cambaya, ini dikarenakan Penyebab langsung masalah gizi disebabkan oleh asupan makanan dan penyakit infeksi (Supriasa 2002).

Berdasarkan data tersebut, peneliti kemudian turun kelapangan melakukan observasi awal dan pengukuran antropometri di SDN Cambaya yang berada di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan didapatkan angka gizi kurang yang terbilang cukup tinggi yaitu dari total 274 siswa, terdapat 83 siswa yang berstatus gizi kurang, 8 siswa yang berstatus gizi buruk, 1 siswa berstatus gizi lebih, dan 182 siswa berstatus gizi baik berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U).

Dari Uraian tersebut, diketahui bahwa masih banyaknya kejadian gizi kurang pada anak sekolah sehingga diperlukan upaya perbaikan gizi. Salah satunya dengan diversifikasi pangan guna meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal (Hanafie 2010).

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar pada sektor kelautan. Berdasarkan data 2013, capaian tangkapan perikanan laut di kota Makassar sebanyak 2.945,6 ton, dengan jumlah tangkapan terbanyak terdapat pada ikan Kembung Jenis *Rastrelliger brachysoma* sebanyak 822,6 ton (DKP Suksel 2013).

Dalam hal zat gizi makro, ikan kembung jenis *Rastrelliger brachysoma* mengandung zat gizi makro yang lebih tinggi yaitu protein sebesar 20.48% dan lemak 3.32%, sedangkan pada ikan kembung jenis *Rastrelliger kanaguarta* memiliki kandungan protein sebesar 17.13% dan lemak 0.37% (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, 2016 dalam Naurah, 2016).

Selain ikan, juga terdapat sumber daya lain yaitu buah lamun dari jenis lamun (*Enhalus acoroides*) merupakan satu-satunya jenis lamun yang berbuah dan tumbuh subur di seluruh wilayah perairan dangkal di Indonesia serta mampu untuk diolah menjadi berbagai bahan makanan serta memiliki kandungan zat gizi

yang relatif tinggi yaitu karbohidrat sebesar 59,26%, protein 5,65% dan kandungan lemak sebesar 0,76% (Badui 2010).

Selain kandungan gizi makro, buah lamun juga mengandung senyawa kimia lain seperti fenol. Senyawa fenol termasuk dalam kelompok antioksidan alam (Cahyadi 2009). Dimana antioksidan berfungsi untuk membunuh bakteri dan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel sehat di dalam tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui beberapa potensi sumberdaya alam khususnya sektor kelautan dalam hal ini pemanfaatan biota laut ikan kembung dan buah lamun yang kemudian diolah menjadi sebuah produk sederhana yang akan digunakan pada intervensi yaitu otak-otak.

Otak-otak ikan merupakan modifikasi produk olahan berbahan dasar surimi, seperti bakso, nugget, sosis, empek-empek dan lain-lain (Ahmad et al. 2015). Otak-otak diolah dengan cara dikukus sehingga makanan tidak melalui proses pemanasan tinggi, yang dapat merusak senyawa antioksidan dan mengakibatkan terbentuknya radikal bebas dalam makanan.

Otak-otak yang terbuat dari bahan dasar ikan kembung (*Rastrelliger brachysoma*) disubstitusi buah lamun (*Enhalus acoroides*) memiliki kandungan zat gizi makro yang bagus sehingga dimaksudkan sebagai sumber kalori dan diharapkan dapat lebih mempercepat perkembangan berat badan pada anak, serta kandungan senyawa fenol diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak karena pada umumnya anak yang mengalami cacangan sangat rentan sakit akibat menurunnya daya tahan tubuh yang disebabkan kurangnya asupan gizi karena adanya cacing yang mengambil nutrisi dan menurunkan nafsu makan pada anak. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti kejadian gizi kurang pada anak sekolah dengan pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun di Sekolah Dasar

Negeri Cambaya, agar kedepannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan gizi kurang pada anak sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung dengan substitusi buah lamun terhadap status gizi pada siswa sekolah dasar yang mengalami gizi kurang?

C. Hipotesis

Untuk mengarahkan penelitian dan pembinaan pada pokok permasalahan, maka ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesa yang diajukan adalah:

1. Hipotesa alternatif (Ha) adalah “Ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung dengan substitusi buah lamun terhadap status gizi pada siswa sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.”
2. Hipotesa nol (Ho) adalah “Tidak ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung dengan substitusi Buah lamun terhadap status gizi pada siswa sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.”

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Ikan Kembung

Definisi Operasional: Ikan Kembung yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis ikan kembung perempuan (*Rastrellinger brachysoma*) atau yang dalam bahasa Makassar biasanya disebut dengan istilah ikan katombo.

Ruang Lingkup Penelitian: Ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan yang masih dalam keadaan segar.

2. Buah Lamun

Definisi Operasional: Buah Lamun yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah dari tanaman Lamun jenis *Enhalus Acoroides*.

Ruang Lingkup Penelitian: Buah Lamun yang digunakan merupakan buah lamun yang masih segar.

3. Otak-otak ikan kembung

Definisi Operasional: Otak-otak ikan kembung adalah otak-otak yang dibuat dari bahan ikan kembung yang diperuntukkan sebagai makanan tambahan pada anak yang menderita gizi kurang (berat badan kurus).

Ruang Lingkup Penelitian: Otak-otak Ikan kembung yang digunakan dihaluskan dan diberi tambahan bumbu dasar pembuatan otak-otak kemudian dibungkus oleh daun pisang dan melalui proses pengukusan serta pemanggangan.

4. Otak-otak Ikan Kembung substitusi Buah Lamun

Definisi Operasional: Substitusi buah lamun adalah penggantian sebagian ikan kembung dengan buah lamun dalam pembuatan otak-otak tujuannya untuk meningkatkan kualitas otak-otak sebagai makanan tambahan bagi anak sekolah yang mengalami gizi kurang (berat badan kurus).

Ruang Lingkup penelitian: Pada penelitian ini, digunakan formula 3:1 yaitu (75 gram) ikan kembung dan (25 gram) buah lamun segar yang dihaluskan dan diberi tambahan bumbu dasar pembuatan otak-otak kemudian dibungkus oleh daun pisang dan melalui proses pengukusan serta pemanggangan.

5. Status Gizi

Definisi Operasional: Status gizi adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara jumlah asupan (*intake*) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (*requirement*) oleh tubuh.

Ruang Lingkup penelitian: Pengukuran antropometri yang digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U) yang dinyatakan dalam *z-score*, dengan kriteria objektif penelitian yaitu anak sekolah gizi kurang (kekurangan energi protein ringan).

6. Anak Sekolah

Definisi Operasional: Anak sekolah adalah anak yang berusia 7-12 tahun, memiliki fisik yang lebih kuat memiliki sifat individual serta aktif.

Ruang Lingkup Penelitian: Pada Penelitian ini, anak yang menjadi obyek penelitian yaitu anak Sekolah Dasar yang memiliki usia 7-9 tahun dikarenakan kebutuhan zat gizi yang sama pada rentan usia tersebut.

7. Gizi Kurang (Kekurangan Energi Protein)

Definisi Operasional: KEP merupakan suatu kondisi dimana jumlah asupan zat gizi yaitu energi dan protein kurang dari yang dibutuhkan, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Hal tersebut ditandai dengan berat badan rendah/kurus.

Ruang lingkup Penelitian: Pada penelitian ini jenis KEP yang menjadi fokus penelitian adalah KEP ringan. KEP ringan biasanya nampak kurus karena ukuran berat badan anak lebih rendah jika dibandingkan dengan anak seumurnya yang dinyatakan berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) bila nilai *Z-score* $-3 \text{ SD} \leq Z < -2 \text{ SD}$.

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Suriani Rauf 2007)	Pengaruh Pemberian Abon Ikan Terhadap Perubahan Status Gizi Anak Gizi Kurang Umur 24-59 Bulan (Studi Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan).	Hasil Penelitian selama 3 minggu menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat kecukupan energi (TKE) pada kedua kelompok. Tidak ada pengaruh pemberian abon ikan terhadap perubahan status gizi anak gizi kurang umur 24-59 bulan ($p>0,05$).
2	(Marsaoly, Michran 2011)	Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (Telur Rebus dan Bubur Kacang Hijau) Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah tahun 2011	Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan zat gizi energi, protein, vitamin A dan zat besi kelompok intervensi meningkat dan berbeda signifikan dengan kelompok kontrol. Perbedaan signifikan terhadap <i>z-score</i> status gizi anak sebelum dan sesudah pemberian intervensi pada kelompok perlakuan.
3	(Badui 2010)	Analisis Kadar Gizi Buah Lamun (<i>Enhalus acoroides</i>) dan Hubungan antara Pengetahuan, Persepsi dengan Pemanfaatan Buah Lamun sebagai Sumber Makanan Alternatif Masyarakat Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. (Tesis)	Hasil analisis menunjukkan bahwa buah lamun <i>Enhalus Acoroides</i> memiliki kandungan nutrisi karbohidrat yang relatif lebih tinggi yaitu 59,26%, kandungan protein sebesar 5,65% dan kandungan lemak sebesar 0,76%. Terdapat hubungan tidak langsung yang signifikan antara pengetahuan masyarakat dengan pemanfaatan buah lamun <i>Enhalus acoroides</i> .
4	(Salamah 2004)	Studi Tentang Asam Lemak Omega-3 Dari Bagian-Bagian Tubuh Ikan Kembung Laki-Laki (<i>Rastrelliger Kanagurta</i>)	Hasil Penelitian menunjukkan kandungan linolenat, EPA dan DHA pada masing-masing bagian tubuh ikan adalah sebagai berikut: Linolenat pada bagian kepala berkisar antara (0,0260,160)g/100g; perut antara (0,043-0,190)g/100g; daging antara (0,031-0,199)g/100g. EPA pada bagian kepala berkisar (0,031-0,199)g/100g;

			<p>perut antara (0,120-0,212)g/100g; daging antara (0,0350-132)g/100g. DHA pada bagian kepala (0,034-0,084)g/100g; perut antara (0,076-0,157)g/100g; daging antara (0,041-0,176)g/100g.</p> <p>Penyimpanan berpengaruh nyata terhadap kandungan omega-3 baik pada bagian kepala, daging dan perut ikan. Kandungan linolenat pada bagian kepala dan perut ikan turun dari hari ke-0 ke hari ke-4 tetapi pada bagian daging tidak.</p>
5	(Zulaiha, 2006)	<p>Hubungan Kecukupan Asam Eikosapentanoat (EPA), Asam Dokosaheksanoat (DHA) Ikan dan Status Gizi dengan Prestasi belajar siswa</p>	<p>Ikan sering dikonsumsi oleh responden adalah bandeng 5% , tongkol 4% , kembung 1% dan mujair 1% . EPA , DHA % RDA defisit 62% , status gizi normal 93% dan kategori rata-rata prestasi belajar 55% . Ada hubungan antara frekuensi makan ikan dan ikan EPA , DHA % RDA ($\rho=0,000$) , tidak ada hubungan antara frekuensi makan ikan dan status gizi ($\rho=0,213$), ada hubungan antara makanan ikan frekuensi dan prestasi belajar ($\rho=0,000$) , ada hubungan antara ikan EPA , DHA rekomendasi dan prestasi belajar ($\rho=0,000$) , dan tidak ada hubungan antara status gizi dan prestasi belajar ($\rho=0,378$).Berdasarkan uji korelasi Pearson, tidak ada hubungan antara ikan EPA, rekomendasi DHA dan status gizi ($\rho=0,000$) .</p>
6	(Alfiyah 2016)	<p>Analisis Kandungan Otak-otak Ikan Kembung (<i>Rastrelliger brachyoma</i>) Substitusi Buah Lamn (<i>Enhalus acoroides</i>) sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Di Masyarakat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 perlakuan konsentrasi berbeda dengan penambahan buah lamun yaitu 1:0; 1:1; 3:1 dan 1:3 dengan 3 kali pengulangan. Hasil Penelitian Karbohidrat 17,52%, protein 6,36%. lemak 0,47%, fenol 344,49ug/g, Kalsium 194,17ug/g, Fe 36,89ug/g. Uji organoleptik paling disukai dan bermutu baik perlakuan 1:1. Uji Friedmen $P<0,05$ terhadap aroma dan mutu overall. Rekomendasi produk terbaik dari keempat sampel untuk kebutuhan zat gizi makro perbandingan 3:1, zat gizi mikro 1:3.</p>

Dari beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan adanya relevansi dengan penelitian yang dilakukan kali ini, namun berbagai penelitian tersebut memiliki ciri khas dan fokus masing-masing yang berbeda dengan penelitian kali ini. Dalam hal ini, peneliti secara signifikan hanya berfokus pada penelitian berupa pemberian otak-otak ikan kembung dengan substitusi buah lamun yang langsung diintervensikan untuk melihat pengaruhnya terhadap anak sekolah yang mengalami gizi kurang berdasarkan pengukuran Indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U).

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung dengan substitusi buah lamun terhadap status gizi pada siswa sekolah dasar yang mengalami gizi kurang di SDN Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menilai perbedaan asupan energi, protein, berat badan dan status gizi pada siswa gizi kurang sebelum dan setelah melakukan intervensi.
- 2) Menganalisis pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung dengan substitusi buah lamun terhadap perubahan asupan energi, protein, berat badan dan status gizi pada siswa gizi kurang sebelum dan setelah melakukan intervensi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan perbaikan status gizi anak sekolah dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu referensi atau bahan informasi guna lebih memperluas wawasan khususnya di bidang gizi kesehatan masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumber informasi dan bahan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar, khususnya bagi pusat pelayanan kesehatan setempat serta masyarakat mengenai adanya alternatif makanan tambahan yang dapat diberikan kepada anak sekolah gizi kurang dalam rangka penentuan arah kebijakan perbaikan gizi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir Kota Makassar.

c. Kegunaan Peneliti

Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan menuju cara berfikir ilmiah dan melakukan penelitian di bidang gizi masyarakat serta sebagai wadah dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan khususnya pada bidang gizi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan umum tentang Status Gizi*

1. Pengertian Status Gizi

Gizi menurut Islam berasal dari bahasa arab “*Al Gizzai*” yang artinya makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. *Al Gizzai* juga dapat diartikan sebagai sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan(Syarfaini 2012). Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi (Supriasa 2002).

Status gizi merupakan gambaran kesehatan sebagai refleksi dari konsumsi pangan dan penggunaannya oleh tubuh (Soekirman 2002). Status gizi dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih (Almatsier 2009).

Status gizi optimal adalah suatu keadaan dimana terdapat keseimbangan antara asupan makanan dengan kebutuhan zat gizi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sangat dianjurkan seseorang untuk memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi baik dari segi jenis, jumlah serta prosesnya hingga siap untuk dikonsumsi, sehingga diharapkan dapat mendatangkan dampak positif bagi tubuh manusia. Anjuran tentang memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi telah dijelaskan dalam firman Allah swt, QS ‘Abasa/80:24.

 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Depag RI 2010).

Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan tugas-tugasnya secara sempurna, *maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya* memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan (Shihab 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya seseorang untuk memerhatikan makanan yang akan dikonsumsi baik itu dari segi kandungan gizi, jumlah, maupun proses yang dilalui makanan tersebut hingga siap/tersaji dihadapan kita. Dengan demikian, kita dapat memperoleh makanan yang dibenarkan oleh agama dan dapat mendatangkan dampak positif untuk menumbuhkan dan memberikan kekuatan jasmani setelah mengkonsumsinya.

2. Penilaian Status Gizi

Status gizi merupakan tanda klinis seseorang berdasarkan pemasukan dan pengeluaran zat-zat gizi yang dikonsumsi. Untuk mengetahui status gizi seseorang dapat dilakukan dengan 2 jenis, yaitu :

a. Penilaian Status Gizi Secara Langsung :

1) Antropometri

Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Metode antropometri sangat berguna untuk melihat ketidakseimbangan energi dan protein (Supariasa 2002).

2) Klinis

Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis dapat dilihat pada jaringan epitel

yang terdapat di mata, kulit, rambut, mukosa mulut, dan organ yang dekat dengan permukaan tubuh atau kelenjar tiroid (Supariasa 2002).

3) Biokimia

Pemeriksaan biokimia disebut juga cara laboratorium. Pemeriksaan biokimia pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi, dimana dilakukan pemeriksaan pada berbagai macam jaringan tubuh seperti darah, urine, tinja, hati dan otot(Supariasa 2002).

4) Biofisik

Pemeriksaan biofisik merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti kejadian buta senja (Supariasa 2002).

b. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung :

1) Survei Konsumsi Makanan

Survei konsumsi makanan merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, individu maupun keluarga. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi (Supariasa 2002). Metode pengukuran konsumsi makanan berdasarkan jenis data yang diperoleh adalah:

a) Metode Kualitatif

Biasanya untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan menggali informasi tentang kebiasaan makan (food habits) serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. Metode-metode pengukuran konsumsi makanan bersifat kualitatif antara lain: Metode frekuensi

makanan (*food frequency*), Metode *dietary history*, Metode telepon, dan Metode pendaftaran makanan.

b) Metode Kuantitatif

Metode secara kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan (DKBM) atau daftar lain yang diperlukan seperti Daftar Ukuran Rumah tangga (URT), Daftar Konversi Mentah Masak (DKMM) dan daftar penyerapan Minyak.

Metode-metode untuk pengukuran konsumsi secara kuantitatif antara lain: Metode recall 24 jam, Perkiraan Makanan (*estimated food records*), Penimbangan Makanan (*food Weighing*), Metode food account, Metode Inventaris (*inventory method*), Pencatatan (*household food records*).

c) Metode *Food Recall* 24 jam

Prinsip dari metode *recall* 24 jam, dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Biasanya dimulai sejak responden bangun pagi kemarin sampai dia istirahat tidur malam harinya. Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa dengan *recall* 24 jam data yang diperoleh cenderung lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan individu ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat URT (sendok, gelas, piring dan lain-lain) atau ukuran lainnya yang biasa dipergunakan sehari-hari.

Kelebihan metode *recall* 24 jam: mudah melaksanakannya serta tidak terlalu membebani responden, biaya relatif murah karena tidak memerlukan peralatan khusus dan tempat yang luas untuk wawancara, cepat sehingga dapat mencakup banyak responden, dapat digunakan untuk responden yang buta huruf,

dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung intake zat gizi sehari.

Kekurangan metode *recall* 24 jam: tidak dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari, bila hanya dilakukan *recall* satu hari, ketepatannya sangat tergantung pada daya ingat responden oleh karena itu responden harus mempunyai daya ingat yang bagus sehingga metode ini tidak cocok dilakukan pada anak usia dibawah 7 tahun atau orang yang berusia diatas 70 tahun dan orang yang lupa ingatan dan pelupa, *The flat slope syndrome* yaitu kecenderungan bagi responden yang kurus untuk melaporkan konsumsinya lebih banyak sedangkan responden yang gemuk cenderung melaporka lebih sedikit, membutuhkan tenaga atau petugas yang terlatih dan terampil dalam menggunakan alat-alat bantu URT dan ketepatan alat bantu yang dipakai menurut kebiasaan masyarakat, responden harus diberi motivasi dan penjelasan tentang tujuan dari penelitian, untuk mendapat gambaran konsumsi makanan sehari-hari *recall* jangan dilakukan pada saat panen, hari pasar, hari akhir pekan, pada saat melakukan upacara-upacara keagamaan, selamatan dan lain-lain.

2) Statistik Vital

Statistik Vital merupakan salah satu metode penilaian status gizi melalui data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, seperti angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan dan kematian, statistik pelayanan kesehatan, dan angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan gizi.

3) Faktor Ekologi

Faktor Ekologi merupakan penilaian status gizi dengan menggunakan faktor ekologi karena masalah gizi dapat terjadi karena interaksi beberapa faktor ekologi, seperti faktor biologis, faktor fisik, dan lingkungan budaya. Penilaian

berdasarkan faktor ekologi digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian gizi salah (*malnutrition*) di suatu masyarakat yang nantinya akan sangat berguna untuk melakukan intervensi gizi.

3. Indeks Antropometri

Menurut (Supariasa 2002) Indeks Antropometri merupakan kombinasi antara beberapa parameter:

a. Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya karena penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi, berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil, oleh karena itu, indeks Berat badan menurut umur (BB/U) lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini.

Penilaian status gizi berdasarkan indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U) memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Adapun kelebihan Indeks BB/U yaitu :

- 1) Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 2) Baik untuk mengukur status gizi akut atau kronis.
- 3) Berat badan dapat berfluktuasi
- 4) Sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil
- 5) Dapat mendeteksi kegemukan

Serta kelemahan Indeks BB/U yaitu :

- 1) Dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat edema maupun asites
- 2) Di daerah pedesaan yang masih terpencil dan tradisional, umur sering sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan umur yang belum baik.

- 3) Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak dibawah usia lima tahun
- 4) Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak pada saat penimbangan.
- 5) Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya setempat. Dalam hal ini orang tua tidak mau menimbang anaknya, karena dianggap seperti barang dagangan dan sebagainya.

b. Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan penambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Indeks tinggi badan menurut umur menggambarkan status gizi masa lalu, juga lebih erat kaitannya dengan status sosial-ekonomi.

Penilaian status gizi berdasarkan indeks Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Adapun kelebihan Indeks TB/U:

- 1) Baik untuk menilai status gizi masa lampau
- 2) Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa

Serta kelemahan dari Indeks TB/U yaitu :

- 1) Tinggi badan tidak cepat naik, bahkan tidak mungkin turun
- 2) Pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus berdiri tegak, sehingga diperlukan dua orang untuk melakukannya.
- 3) Ketepatan umur sulit didapat.

c. Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini (sekarang). Indeks BB/TB merupakan indeks yang independen terhadap umur.

Penilaian status gizi berdasarkan Indeks Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Adapun kelebihan Indeks BB/TB yaitu :

- 1) Tidak memerlukan data umur
- 2) Dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan kurus)

Serta kelemahan dari Indeks BB/TB yaitu :

- 1) Tidak dapat memberikan gambaran, apakah anak tersebut pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi badan menurut umurnya, karena faktor umur tidak dipertimbangkan.
- 2) Dalam praktek sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran panjang/tinggi badan pada kelompok balita.
- 3) Membutuhkan dua macam alat ukur.
- 4) Pengukuran relatif lebih lama.
- 5) Membutuhkan dua orang untuk melakukannya.
- 6) Sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukuran, terutama bila dilakukan oleh kelompok non-profesional.

Tabel 2.1
Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB, Standar Baku Antropometri WHO-NCHS

No	Indeks yang dipakai	Batas Pengelompokan	Sebutan Status Gizi
1	BB/U	< -3 SD - 3 s/d <-2 SD - 2 s/d +2 SD > +2 SD	Gizi buruk Gizi kurang Gizi baik Gizi lebih
2	TB/U	< -3 SD - 3 s/d <-2 SD - 2 s/d +2 SD > +2 SD	Sangat Pendek Pendek Normal Tinggi
3	BB/TB	< -3 SD - 3 s/d <-2 SD - 2 s/d +2 SD > +2 SD	Sangat Kurus Kurus Normal Gemuk

Sumber : *Depkes RI, 2004.*

Berdasarkan standar Baku Antropometri WHO-NCHS status gizi dikategorikan menjadi:

a. Gizi Baik

Seorang anak dikatakan mengalami status gizi yang baik apabila nilai z-score yang diperoleh adalah -2 s/d +2 SD. Hal ini diwujudkan dengan adanya keselarasan antara tinggi badan terhadap umur, berat badan terhadap umur dan tinggi badan terhadap berat badan. Kejadian ini disebabkan oleh seimbangannya antara asupan zat gizi dengan kebutuhan tubuhnya untuk menopang aktivitas sehari-hari yang dilakukan.

b. Gizi Lebih

Seorang anak dikatakan mengalami gizi lebih apabila nilai z-score yang diperoleh adalah > +2 SD. Seseorang yang dikatakan mengalami gizi lebih disebabkan oleh konsumsi makanan yang melebihi kebutuhan tubuhnya. Kondisi seperti ini dapat dijumpai pada anak yang mengalami obesitas/kegemukan.

c. Gizi Kurang

Seorang anak dikatakan mengalami gizi kurang apabila nilai z-score yang diperoleh adalah -3 s/d <-2 SD. Seseorang yang kekurangan gizi disebabkan oleh

konsumsi gizi yang tidak sesuai/rendah dari kebutuhannya sehingga, zat gizi cadangan yang berada di dalam lapisan lemak akan dipecah menjadi energi sehingga anak yang mengalami gizi kurang umumnya terlihat kurus. Kejadian gizi semestinya haruslah segera mendapatkan penanganan agar tidak berlanjut menjadi gizi buruk. Namun, kurangnya pengetahuan dari orangtua atau masyarakat mengenai kejadian gizi kurang ini sehingga tidak adanya penanganan yang dapat dilakukan.

d. Gizi Buruk

Seorang anak dikatakan mengalami gizi buruk apabila nilai z-score yang diperoleh adalah $<-3SD$. Kejadian ini merupakan lanjutan dari kejadian gizi kurang pada anak yang telah lama berlangsung dan tidak mendapat penanganan sehingga menyebabkan peningkatan tingkat kekurangan gizi. Dimana, hal ini dapat menyebabkan pemecahan lemak yang berlangsung secara terus menerus sehingga mengakibatkan anak nampak sangat kurus seperti tulang yang hanya terbungkus kulit.

Pengukuran Skor Simpang Baku (Z-score) dapat dilakukan dengan menggunakan software WHO Anthro dan WHO Anthro Plus. Selain dapat menggunakan software, pengukuran Skor Simpang Baku juga dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus:

a. Bila Nilai Riil, BB, TB di atas nilai Median

$$\frac{\text{Nilai(Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai}(+1 SD) - \text{Nilai (Median)}}$$

b. Bila Nilai Riil, BB, TB di bawah nilai Median

$$\frac{\text{Nilai(Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai(Median)} - \text{Nilai}(-1 SD)}$$

- c. Bila Nilai Riil, BB, TB sama dengan nilai Median

$$\frac{\text{Nilai(Riil)} - \text{Nilai (Median)}}{\text{Nilai (Median)}}$$

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Status Gizi Pada Usia Sekolah

Makin bertambah usia seorang anak, maka makin bertambah pula kebutuhannya. Konsumsi makanan dalam keluarga dipengaruhi jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi dalam keluarga dan kebiasaan makan secara perorangan. Konsumsi juga tergantung pada pendapatan, agama, adat istiadat, dan pendidikan keluarga yang bersangkutan (Almatsier 2009). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak sekolah yaitu:

- a. Usia sekolah merupakan usia puncak pertumbuhan

Anak Sekolah Dasar yang berusia 7-12 tahun merupakan masa pertumbuhan tercepat kedua setelah masa balita. Dimana pada usia ini diharapkan anak mendapatkan perhatian/pengasuhan yang baik dari orangtua, baik dari segi pendidikan maupun asupan makanannya agar tercipta pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak.

- b. Selalu aktif

Semakin bertambahnya usia pada anak akan mempengaruhi aktivitas fisik yang semakin meningkat pula sehingga anak usia sekolah sangat memerlukan asupan nutrisi yang memadai agar menghasilkan energi yang dapat menunjang keaktifan fisik anak.

- c. Perubahan sikap terhadap makanan

Anak usia Sekolah Dasar termasuk kelompok usia yang sulit untuk ditebak selera makan yang sedang ia senangi, perubahan sikap terhadap makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh dari luar. Pada masa-masa inilah perhatian ibu terhadap pengaruh pola konsumsi makanan sepertinya harus digalakan.

d. Tidak suka makanan-makanan bergizi

Anak usia sekolah sangat sulit untuk dapat mengonsumsi makanan-makanan bergizi yang sangat diperlukan pada masa pertumbuhannya. Kriteria makanan yang banyak disukai oleh anak usia ini adalah jajanan sekolah dengan tampilan menarik yang biasanya banyak mengandung gula dan pewarna buatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Sekolah

1. Pengertian dan Karakteristik Anak Sekolah Dasar

Anak sekolah dasar adalah anak yang berusia 7-12 tahun, memiliki fisik lebih kuat mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung dengan orang tua. Biasanya pertumbuhan anak putri lebih cepat dari pada putra. Kebutuhan gizi anak sebagian besar digunakan untuk aktivitas pembentukan dan pemeliharaan jaringan. Karakteristik anak sekolah meliputi:

- a) Pertumbuhan tidak secepat bayi.
- b) Gigi merupakan gigi susu yang tidak permanen (tanggall).
- c) Lebih aktif memilih makanan yang disukai.
- d) Kebutuhan energi tinggi karena aktivitas meningkat.
- e) Pertumbuhan lambat.
- f) Pertumbuhan meningkat lagi pada masa pra remaja.

Anak sekolah biasanya banyak memiliki aktivitas bermain yang menguras banyak tenaga, dengan terjadi ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar, akibatnya tubuh anak menjadi kurus. Untuk mengatasinya harus mengontrol waktu bermain anak sehingga anak memiliki waktu istirahat cukup (Moehji 2003).

2. Masalah Gizi Pada Anak Sekolah Dasar

Kelompok anak usia sekolah pada umumnya mempunyai kondisi gizi yang lebih baik daripada kelompok balita, karena kelompok umur sekolah mudah dijangkau oleh berbagai upaya perbaikan gizi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh kelompok swasta. Meskipun demikian masih terdapat berbagai kondisi gizi anak sekolah yang tidak memuaskan dan sering ditemukan berdampak pada prestasi belajar dan pertumbuhan fisik anak SD, antara lain Obesitas dan masalah kurang gizi seperti Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), dan kurang Vitamin A (Almatsier 2009).

a) Berat Badan Berlebih (Obesitas)

Suatu kondisi akibat ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar. Apabila tidak teratasi maka, keadaan ini akan berlanjut sampai remaja dan dewasa. Berbeda dengan dewasa, berat badan anak tidak boleh diturunkan, karena penyusutan berat akan sekaligus menghilangkan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Maka yang perlu dilakukan yaitu perlambatan penambahan berat badan dan meningkatkan tinggi badan sehingga proporsi berat badan terhadap tinggi badan kembali normal. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengurangi asupan makan dan memperbanyak olahraga.

b) Kurang Energi Protein (KEP)

Kurang Energi Protein (KEP) disebabkan oleh kekurangan makan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Pada anak-anak, KEP dapat menghambat pertumbuhan, rentan terhadap penyakit terutama penyakit infeksi dan mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan. Pada orang dewasa, KEP bisa menurunkan produktivitas kerja dan derajat kesehatan sehingga rentan terhadap penyakit. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya

KEP, namun selain kemiskinan faktor lain yang berpengaruh adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan pendamping serta tentang pemeliharaan lingkungan yang sehat (Almatsier 2001).

c) Anemia Defisiensi Gizi

Suatu kondisi pada anak SD dengan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal (kurang dari 12 gr %). Akibat buruk dari anemia gizi besi adalah anak menjadi lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai (5 L) dan mengurangi daya serap otak terhadap pelajaran. Keadaan ini terjadi, karena terlalu sedikit kandungan zat besi dalam makanan yang dikonsumsi terutama pada anak yang sering jajan sehingga mengendurkan keinginan untuk menyantap makanan lain (Adriani 2012).

d) Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

Suatu gejala yang diakibatkan oleh kekurangan asupan yodium dalam makanan sehari-hari yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Masalah GAKY pada umumnya ditemukan di dataran tinggi. Akibat buruk GAKY adalah anak menjadi lamban dan sulit menerima pelajaran.

e) Kurang Vitamin A (KVA)

Suatu kondisi yang diakibatkan oleh jumlah asupan vitamin A tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Akibat buruk dari kurang vitamin A adalah menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi sehingga anak mudah sakit. Disamping itu vitamin A terkait dengan fungsi penglihatan.

Adapun dalam segi Islam membahas mengenai anak yang seharusnya diasuh dengan sungguh-sungguh, baik dari segi pendidikannya maupun asupan makanannya sehingga mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dijelaskan dalam QS al- Nisa/4: 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. . . . (Depag RI 2010).

Adapun ayat tersebut berpesan: *dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada anak-anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? tentu saja tidak! karena itu-hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa depan (Shihab 2002).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya untuk merawat dan memikirkan pertumbuhan dan perkembangan anak hingga masa depannya. Dimana perkembangan anak pada usia sekolah sangatlah ditentukan oleh keadaan gizi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang, sehingga orangtua sangatlah diharapkan untuk memberikan asupan zat gizi yang baik pada anak, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi optimal. Anak yang kekurangan gizi akan sangat rentan penyakit sehingga mengakibatkan anak lesuh dan dapat mengurangi aktivitas pada anak. Oleh karena itu, pemberian makanan tambahan ini sebagai salah satu pencegahan agar anak sekolah tidak kekurangan gizi serta memberi tambahan gizi untuk anak sekolah khususnya yang mengalami kekurangan energi protein (KEP) agar status gizinya menjadi lebih baik.

3. Kebutuhan Gizi Pada Anak Sekolah Dasar

Anak dari golongan usia sekolah memerlukan makanan yang kurang lebih sama dengan yang dianjurkan untuk anak prasekolah hanya saja memiliki perbedaan dari segi porsi yang lebih besar karena bertambahnya berat badan dan aktivitasnya. Menurut (Adriani 2012) terdapat beberapa fungsi dan sumber zat gizi yang perlu diketahui agar kebutuhan zat gizi anak usia sekolah dapat tercukupi:

a. Energi

Aktivitas fisik memerlukan energi di luar kebutuhan untuk metabolisme basal. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Selama aktivitas fisik, otot membutuhkan energi di luar metabolisme untuk bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Penggunaan energi di luar AMB bagi bayi dan anak selama masa pertumbuhan adalah untuk bermain dan sebagainya. Besar kecilnya angka kecukupan energi sangat dipengaruhi oleh lama serta intensitas kegiatan jasmani tersebut.

Sumber energi berkonsentrasi tinggi adalah bahan makanan sumber lemak, seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan dan biji-bijian. Setelah itu bahan makanan sumber karbohidrat, seperti padi-padian, umbi-umbian, dan gula murni. Semua makanan yang dibuat dari dan dengan bahan makanan tersebut merupakan sumber energi.

b. Karbohidrat

Di dalam tubuh, zat-zat makanan yang mengandung unsur karbon dapat digunakan sebagai bahan pembentuk energi yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Energi yang terbentuk dapat digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh

baik yang disadari maupun yang tidak disadari misal, gerakan jantung, pernapasan (paru-paru), usus, dan organ-organ lain dalam tubuh.

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan keperluan energi tubuh, selain itu karbohidrat juga mempunyai fungsi lain yaitu karbohidrat diperlukan bagi kelangsungan proses metabolisme lemak, diketahui juga karbohidrat mengadakan suatu aksi penghematan terhadap protein. Pangan sumber karbohidrat misalnya sereal, biji-bijian, gula, buah-buahan, umumnya menyumbang paling sedikit 50% separuh kebutuhan energi keseluruhan.

c. Protein

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Kebutuhan protein menurut FAO/WHO/UNU (1985) adalah konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Angka kecukupan protein (AKP) anak usia sekolah umur 7-9 tahun: 400mg untuk laki-laki dan perempuan, umur 10-12 tahun laki-laki adalah 400 mg dan untuk perempuan adalah 350 mg. Disarankan untuk memberi protein 1,5-2 g/kg berat badan bagi anak sekolah.

Sumber protein terdapat di bahan makanan hewani yang merupakan sumber protein yang baik, dalam jumlah maupun mutu, seperti: telur, susu, daging, unggas, ikan dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang, kedelai dan hasilnya, seperti tempe dan tahu serta kacang-kacangan lain.

d. Lemak

Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh, Seperti halnya dengan karbohidrat dan protein. Fungsi utama lemak yaitu menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh, mempunyai fungsi pembentuk struktur tubuh, mengatur proses yang berlangsung dalam tubuh secara langsung dan tak langsung, pembawa (*Carrier*) vitamin larut dalam lemak.

Defisiensi lemak dalam tubuh akan mengurangi kesediaan energi dan mengakibatkan terjadinya katabolisme atau perombakan protein. Cadangan lemak akan semakin berkurang dan lambat laun akan terjadi penurunan berat badan. Defisiensi asam lemak akan mengganggu pertumbuhan dan menyebabkan terjadinya kelainan pada kulit. Sumber lemak diantaranya susu, minyak *olive*, minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak ikan, dan lain-lain.

e. Kalsium

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5-2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 Kg dan jumlah ini, 99% berada dalam jaringan keras (tulang dan gigi). Peningkatan kebutuhan terjadi pada masa pertumbuhan khususnya pada anak usia sekolah dan remaja, kehamilan, menyusui, defisiensi kalsium, dan tingkat aktivitas fisik yang meningkatkan densitas tulang. Angka kecukupan rata-rata sehari untuk kalsium bagi orang Indonesia ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi LIPI (1998) untuk anak-anak: 500 mg dan remaja: 600-700 mg.

Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu, seperti keju. Ikan dimakan dengan tulang, termasuk ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik. Serelia, kacang-kacangan dan hasil kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, sayuran hijau juga merupakan sumber kalsium yang baik tetapi dan bahan makanan ini banyak mengandung zat yang menghambat penyerapan kalsium seperti serat, fitat, dan oksalat. Susu *nonfat* merupakan sumber terbaik kalsium karena ketersediaan biologisnya yang tinggi.

f. Besi

Besi berfungsi sebagai cadangan untuk memproduksi hemoglobin. Kekurangan besi dapat menurunkan kekebalan tubuh sehingga sangat peka terhadap serangan bibit penyakit. Hal ini, berhubungan erat dengan menurunnya

fungsi enzim pembentuk *antibody* seperti mielo-peroksida. Senyawa-senyawa besi berperan dalam transportasi dan pendayagunaan oksigen.

Angka kecukupan besi untuk anak sekolah adalah 10 mg. Sumber besi yaitu makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan, sumber baik lainnya adalah telur, sereal tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan beberapa jenis buah.

g. Yodium

Yodium berfungsi sebagai bagian dari tiroksin dan senyawa lain yang disintesis oleh kelenjar tiroid. Tubuh mengandung sekitar 25 mg yodium, dimana sepertiganya terdapat dalam kelenjar tiroid dan berfungsi untuk mengontrol transduksi energi selular.

Kebutuhan yodium sehari-hari sekitar 1-2 $\mu\text{g}/\text{kg}$ berat badan. Widyakarya pangan dan gizi (1998) menganjurkan angka kecukupan gizi yodium untuk anak sekolah 70-120 μg . Sumber yodium yang utama yaitu makanan laut berupa ikan, udang, dan kerang serta ganggang laut. Di daerah pantai air dan tanah banyak mengandung yodium sehingga tanaman yang tumbuh di daerah pantai mengandung cukup banyak yodium.

Tabel 2.2

Angka Kecukupan Gizi Rata-rata yang Dianjurkan Bagi Anak Sekolah

Golongan Umur (tahun)	BB (kg)	TB (cm)	E (kkal)	KH (g)	P (g)	L (g)	Ca (mg)	Besi (mg)	I (mcg)
7-9 Tahun	27	130	1850	254	49	72	1000	10	120
Laki-laki 10-12	34	142	2100	289	56	70	1200	13	120
Perempuan 10-12	36	145	2000	275	60	67	1200	20	120

Sumber : *Riskesdas 2007 dan 2010.*

C. Tinjauan umum tentang Otak-Otak

1. Pengertian Otak-otak

Otak-otak ikan merupakan modifikasi produk olahan antara bakso dan kamaboko. Masyarakat pada umumnya telah mengenal otak-otak ikan karena

rasanya yang enak dan cara pengolahannya yang cukup sederhana. Umumnya ikan yang biasa digunakan untuk membuat otak-otak ikan adalah ikan laut. Pembuatan otak-otak ikan tidak jauh berbeda dengan pembuatan makanan yang berbahan dasar surimi, seperti bakso, nugget, sosis, empek-empek, dan lain-lain (Ahmad et al. 2015).

2. Bahan Pembuatan Otak-otak

a. Daging Ikan

Ikan adalah sumber protein hewani yang sangat mudah didapatkan karena merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai ekonomis serta bernilai gizi tinggi yang sangat diperlukan bagi manusia. Ikan merupakan suatu produk yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan. Dalam pembuatan otak-otak, ikan dijadikan sebagai bahan utama.

b. Tepung Tapioka

Tepung tapioka merupakan salah satu olahan dari singkong dalam bentuk tepung. Kualitas tepung yang digunakan sebagai bahan makanan sangat berpengaruh terhadap otak-otak. Tepung tapioka yang digunakan harus berwarna putih bersih, tidak banyak kotoran, berasa tawar, dan dalam air panas membentuk gel yang bersifat kental.

Kandungan gizi dalam tepung tapioka adalah kalori 362/100gr, karbohidrat 86,9%, lemak 0,3%, protein 0,5% (Djuwardi 2009). Tujuan dari penambahan tepung tapioka pada adonan ini adalah agar adonan cepat mengembang saat bahan-bahan sudah tercampur.

c. Santan

Santan kelapa merupakan suatu cairan berwarna putih seperti susu yang diperoleh dari hasil pengepresan atau pemerasan dari buah kelapa yang telah

diparut dengan penambahan atau tanpa air. Tujuan dari penambahansantan adalah sebagai penambah rasa gurih pada masakan.

d. Bawang merah

Bawang merah mengandung senyawa aktif flavonoid yang bersifat sebagai antiinflamasi atau antiradang sangat berguna membantu penyembuhan radang akibat luka memar, luka bakar, atau radang pada organ tubuh dalam. Bawang merah berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat menekan efek karsinogenik dari senyawa radikal bebas. Kandungan senyawa dalam bawang merah juga turut berperan dalam menetralkan zat-zat toksin berbahaya dan membantu membuangnya dari dalam tubuh (Kurniawati 2010). Tujuan dari penambahan bawang merah adalah sebagai penambah rasa pada masakan.

e. Bawang putih

Bawang Putih (*Allium sativum*) adalah tanaman yang mengandung antioksidan dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri khamir karena adanya zat allicin yang sangat efektif. Bahan ini juga memiliki sifat antimikrobia terhadap *E. Coli*, *Aerobacter aeromonas* dan *Staphylococcus aureus*.

Kandungan gizi dalam bawang putih per 100 gram adalah kadar air 66,2-71 ml, protein 4,5-7 gr, karbohidrat 23,1-24,6 gr, serat 0,8 gr, kalsium 26-42 mg, vitamin C 10 gr, fosfor 15-109 mg, dan Kalium 346-377 mg (Syamsiah 2003). Tujuan dari penambahan bawang putih dalam proses pembuatan otak-otak ini adalah sebagai penambah cita rasa serta memberikan rasa harum yang khas pada masakan.

f. Garam

Garam berfungsi untuk meningkatkan cita rasa, berperan sebagai pembentuk tekstur, pengontrol pertumbuhan mikroorganismenya dan menghambat

pertumbuhan pembusuk dan patogen, karena mempunyai sifat tekanan osmotik yang tinggi sehingga kadar air sel-sel bakteri berkurang.

g. Gula

Gula adalah bentuk dari karbohidrat, jenis gula yang paling sering digunakan adalah kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk merubah rasa dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa (yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam) menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Dalam istilah kuliner, gula adalah tipe makanan yang diasosiasikan dengan rasa manis.

h. Merica

Lada atau merica (*Piper nigrum* L) adalah tumbuhan penghasil rempah-rempah yang berasal dari bijinya. Biji lada yang telah dikeringkan biasa digunakan sebagai penambah rasa lezat pada makanan dan sebagai pengawet daging.

i. Daun pisang

Penggunaan daun pisang dalam pembuatan otak-otak adalah sebagai wadah adonan otak-otak dan penambah aroma pada olahan prodak. Selain sebagai pembungkus makanan, daun pisang juga berpotensi digunakan dalam bidang medis karena diketahui adanya aktivitas antimikroba dan antioksidan (Sahaa dkk, 2013) dalam (Mastuti & Handayani 2013).

3. Proses pembuatan Otak-otak

a. Pencucian

Proses pencucian pada bahan makanan bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada bahan baku, bekas darah maupun lendir. Pencucian dengan air bersih dapat mengurangi jumlah bakteri yang ada. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan segala sesuatu yang tidak diperlukan dalam makanan.

Pencucian dapat dilakukan dengan menggunakan air dingin atau air hangat. Pencucian menggunakan air merupakan salah satu proses membersihkan bahan baku yang paling sering digunakan.

b. Pengemasan

Pengemasan merupakan suatu cara dalam memberikan kondisi sekeliling yang tepat bagi bahan pangan. Pengemasan berfungsi menjaga produk bahan pangan agar tetap bersih dan terlindung dari kotoran dan kontaminasi, melindungi makanan dari kerusakan fisik, dan menjaga mutu bahan pangan selama masa tenggang penggunaan atau dengan kata lain kemasan mempunyai fungsi penting dalam pengawetan.

c. Pengukusan

Mengukus makanan akan membuat rasa maupun kandungan gizi makanan tetap terjaga. Bisa dikatakan segala jenis makanan dari sayuran sampai ikan bisa dimasak dengan cara dikukus

d. Pemanggangan

Proses pemanggangan dilakukan agar tekstur otak-otak tidak berair. Selain itu, teknik memanggang merupakan cara bijak dalam memasak daging merah, unggas, atau ikan sehingga kita tidak perlu menambah lemak apapun pada makanan.

D. Tinjauan umum tentang Ikan Kembung

1. Deskripsi Ikan Kembung

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya :

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan

limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314 dan dishohihkan Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Al Shohihah no.1118).

Penjelasan hadis ini menurut al-Manawy sebagai berikut:

1. Penghalalan dua bangkai dan dua darah hanya berlaku untuk syari’at Muhammad, tidak untuk syari’at umat lain.
2. Bangkai menurut fuqaha adalah binatang yang hilang hidupnya tanpa disembeli secara syara’ (Sabir 2014)

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) bangkai yang dihalalkan untuk dikonsumsi oleh umat manusia yaitu bangkai ikan dan belalang karena hewan tersebut mati begitu saja bukan akibat ulah manusia. Sehingga apabila jika ditemukan telah menjadi bangkai maka ia halal dan suci.

Kembung adalah nama sekelompok ikan laut yang tergolong ke dalam marga *Rastrelliger*, ikan ini masih sekerabat dengan tenggiri, tongkol, tuna, madidihang, dan makerel. Kembung termasuk ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis menengah, sehingga terhitung sebagai komoditas yang cukup penting bagi nelayan lokal.

Di perairan Nusantara dikenal dua spesies kembung, yaitu: Kembung perempuan (*Rastrelliger brachysoma*), dan Kembung lelaki (*Rastrelliger kanaguarta*), nama tersebut tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin karena nama-nama tersebut hanya sekedar nama lokal (*vernacular name*) di populasinya masing-masing, dimana pada setiap jenis tersebut terdiri dari ikan jantan dan ikan betina.

Ikan kembung perempuan (*Rastrelliger brachysoma*) merupakan ikan ekonomis tersebar secara umum diperaian pantai (zona neritik) dan menjadi komoditi utama bagi perikanan tradisional (Suwarso 2015).

Ikan kembung perempuan (*Rastrelliger brachysoma*) merupakan salah satu ikan pelagis kecil yang sangat potensial di Indonesia. Klasifikasi ikan

kembung perempuan (*Rastrelliger brachysoma*) menurut Saanin (1984) dalam (Larasati 2011) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Pisces

Sub kelas : Teleostei

Ordo : Parcomorphy

Sub ordo : Scombroidea

Famili : Scombridae

Genus : *Rastrelliger*

Spesies : *Rastrelliger brachysoma* (Bleeker, 1851)

Nama umum : Short Mackerel

Nama Lokal : Kembung Perempuan (Jakarta)

Ikan kembung perempuan (*Rastrelliger brachysoma*) memiliki genus yang sama dengan ikan kembung lelaki (*Rastrelliger kanagurta*). Ciri yang membedakannya adalah adanya satu bintik atau totol hitam dekat sirip dada pada ikan kembung lelaki. Selain itu, ikan kembung perempuan memiliki perut yang lebih lebar dibandingkan ikan kembung lelaki.

Ikan kembung perempuan (*Rastrelliger brachysoma*) banyak ditemukan di perairan laut Indonesia. Produksi ikan kembung perempuan di kota Makassar pada tahun 2013 lebih besar dibanding dengan jenis ikan lainnya (seperti: cakalang, tongkol komo, tongkol krai, dan kembung lelaki/banyar) mencapai 822,6 ton (DKP Sukse 2013). Ini menandakan bahwa penangkapan ikan kembung perempuan merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang cukup potensial di daerah tersebut. Selain jumlah produksinya yang tinggi di daerah Makassar, Ikan

ini juga mengandung minyak omega-3 yang sangat tinggi, dagingnya lembut, dan tidak menimbulkan alergi (Santoso dkk. 1997) dalam (Indaryanto 2014).

2. Struktur morfologis

Ikan kembung perempuan memiliki bentuk tubuh pipih dengan bagian dada lebih besar daripada bagian tubuh yang lain dan ditutupi oleh sisik yang berukuran kecil dan tidak mudah lepas. Warna tubuh biru kehijauan di bagian punggung dengan titik gelap atau totol-totol hitam di atas garis rusuk sedangkan bagian bawah tubuh berwarna putih perak. Sirip punggung (*dorsal*) terpisah nyata menjadi dua buah sirip, masing-masing terdiri atas 10 hingga 11 jari-jari keras dan 12 hingga 13 jari-jari lemah (Direktorat Jendral Perikanan 1979). Sirip dubur (*anal*) berjari-jari lemah 12. Di belakang sirip punggung kedua dan sirip dubur terdapat 5 sampai 6 sirip tambahan yang disebut finlet. Sirip perut (*ventral*) terdiri dari 1 jari-jari keras dan 5 jari-jari lemah. Sirip ekor (*caudal*) bercagak dalam dan sirip dada (*pectoral*) lebar dan meruncing (Anwar 1970 in Ruswahyuni 1979). Mata mempunyai selaput yang berlemak, gigi yang kecil pada tulang rahang. Tapis insang halus 29-34, pada bagian bawah busur insang pertama tapis insang panjang dan banyak terlihat seolah-olah bulu jika mulutnya dibuka (Burhanudin *etal* 1984 in Astuti 2007) dalam (Larasati 2011).



Gambar 2.1 Ikan Kembung Perempuan

3. Waktu pemijahan

Gonad akan bertambah berat sebelum terjadinya pemijahan dalam proses reproduksi, begitu juga ukuran diameter telur yang ada di dalam ovarium ikan.

Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer objektif dan okuler berskala yang sudah ditera (Effendie 1997). Sebelum terjadinya pemijahan, sebagian besar hasil metabolisme ikan tertuju untuk perkembangan gonad. Berat gonad akan mencapai maksimum ketika ikan memijah kemudian akan menurun secara cepat dengan berlangsungnya musim pemijahan hingga selesai. Ovarium ikan yang mengandung telur masak berukuran sama semua atau seragam menunjukkan waktu pemijahan yang pendek. Sebaliknya, waktu pemijahan yang panjang dan terus menerus ditandai oleh banyaknya ukuran telur ikan yang berbeda di dalam ovarium (Hoar *in* Lumbanbatu 1979).

Ikan kembang lelaki (*Rastrelliger kanagurta*) di Laut Jawa mempunyai dua musim pemijahan yang berlangsung pada musim barat mulai dari bulan Oktober hingga Februari dan pada musim timur yaitu mulai dari bulan Juni hingga September (Astuti 2007), sedangkan ikan kembang perempuan (*Rastrelliger brachysoma*) memiliki musim pemijahan dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober (Ochavillo *et al.* 1991; Froese and Pauly 2006 *in* Lachita 2006) dalam (Larasati 2011)

4. Kandungan Gizi

Dalam Al-Quran menunjukkan beberapa karunia Allah swt yang telah diberikan kepada umat manusia. Salah satunya yaitu sumber makanan yang berasal dari laut. Hal ini dijelaskan dalam QS al-Nahl/16: 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Terjemahnya:

Dan Dia-lah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya (Depag RI 2010).

Adapun maksud dari ayat tersebut menyatakan bahwa: Dan dia, yakni Allah swt, yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya area hidup

binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam disana sehingga kamu dapat *memakan darinya daging yang segar*, yakni binatang-binatang laut itu. Sedangkan kalimat Allah yang mengatakan “*daging yang segar*”. Yakni binatang-binatang laut itu, dan apabila bersungguh-sungguh maka kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu gunakan: seperti permata, mutiara, merjan dan sebagainya. Allah menundukkan itu agar kamu memanfaatkannya dan agar kamu bersungguh-sungguh mencari rezeki, sebagian dari karunia-Nya itu dan agar kamu terus-menerus bersyukur (Shihab 2002).

Adapun maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa: Allah swt telah menundukkan lautan dan sungai agar manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu yang bersumber darinya, terutama manusia dapat memperoleh makanan yang segar, dimana makanan yang segar khususnya ikan segar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.

Selain itu, perintah untuk mengkonsumsi makanan yang baik yang telah dikaruniakan oleh Allah swt terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Depag RI 2010).

Adapun makna dari ayat tersebut: “*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah daripada yang baik-baik apa yang telah kami karuniakan kepada kamu*, Makanan yang baik-baik itu senantiasa disediakan oleh Tuhan asal kamu suka mengusahakannya, demikian pula. Asal kamu berusaha mencari dan memilih

mana yang baik-baik itu, pastilah kamu tidak akan kekurangan makanan. “*Dan bersyukurlah kepada Allah.*” Karena segala sesuatunya telah lengkap Dia sediakan buat kamu (Hamka 1982).

Senada dengan ayat di atas, Allah swt kembali memberikan petunjuk kepada hambanya agar mengkonsumsi makanan yang halal serta baik yang telah diberikan kepada hambanya. Dalam firmanNya QS al-Maidah/5:88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Depag RI 2010).

Adapun makna dari ayat tersebut adalah: Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang *halal* dan *baik*, yang telah dikaruniakannya kepada mereka (Hamka 1984).

Adapun maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa: Allah swt memerintahkan kepada hamba-Nya agar menikmati rezeki Allah yang halal dan baik. “*Halal*” disini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan “*Baik*” adalah dari segi kemanfaatannya. Yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Prinsip halal dan baik itu hendaklah senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani melainkan juga rohani. Serta kita patut mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah swt. Seperti halnya dalam penelitian ini yang memanfaatkan rezeki dari Allah swt yang berasal dari sektor kelautan yaitu buah lamun dan ikan kembung yang memiliki kandungan zat gizi yang baik.

Ikan pada umumnya dan ikan laut pada khususnya merupakan bahan pangan yang absorpsi proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk hewani lain seperti daging sapi dan ayam. Daging ikan mempunyai serat-serat protein lebih pendek dari pada serat-serat protein daging sapi atau ayam. Ikan juga kaya akan mineral seperti Yodium yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat membentuk hormon tiroksin, dengan demikian konsumsi ikan laut yang tinggi dapat mencegah penyakit gangguan akibat kurangnya konsumsi yodium (GAKY) (Effendie 2002). Serta Kalsium, Phospor yang diperlukan untuk pembentukan tulang, serta zat besi yang diperlukan untuk pembentukan haemoglobin darah. Selain itu ikan merupakan sumber alami asam lemak Omega 3 yaitu Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) dan Dacosa Hexaenoic Acid (DHA), yang berfungsi mencegah arterosklerosis (terutama EPA). Keduanya dapat menurunkan secara nyata kadar trigliserida di dalam darah dan menurunkan kadar kolesterol di dalam hati dan jantung.

Komposisi gizi ikan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu spesies, jenis kelamin, tingkat kematangan (umur), musim, siklus bertelur dan letak geografis. Kandungan protein ikan sangat dipengaruhi oleh kadar air dan lemaknya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa ikan bersirip mengandung protein 16–24%, sedangkan pada ikan yang telah diolah kandungan proteinnya dapat mencapai 35 persen. Proporsi protein kolektif (kolagen) pada ikan jauh lebih rendah daripada daging ternak yaitu berkisar antara 3-5 persen dari total protein. Hal ini juga yang menyebabkan daging ikan lebih empuk. Ikan sebagai salah satu sumber protein hewani mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi (Khomsan 2004). Berikut ini tabel kandungan zat gizi ikan kembung per 100 gram.

Tabel 2.3
Kandungan Zat Gizi Ikan kembung Perempuan
(*Rastrelliger Brachyoma*)

No	Zat Gizi	Jumlah %	Satuan
1	Karbohidrat	0.36	Gr
2	Protein	20.48	Gr
3	Lemak	3.32	Gr
4	Kalsium	20	Mg
5	Fosfor	200	Mg
6	Zat Besi	1	Mg
7	Vit A	30	Si
8	Vit B	0.05	Mg
9	Vit C	0	Mg

Sumber: Kemenkes Republik Indonesia dan Balai Besar LabKes Makassar, 2016 dalam Naurah 2016.

Tabel 2.4
Kandungan Zat Gizi Makro Ikan Kembung Lelaki
(*Rastrelliger Kanagurta*)

No	Zat Gizi	Jumlah %	Satuan
1	Karbohidrat	1.16	Gr
2	Protein	17.13	Gr
3	Lemak	0.37	Gr

Sumber: Balai Besar LabKes Makassar, 2016 dalam Naurah 2016.

E. Tinjauan umum tentang Buah Lamun

1. Deskripsi Lamun

Lamun (*seagrass*) merupakan tumbuhan berbunga (*angiospermae*) yang memiliki rhizoma, daun, dan akar sejati, yang hidup terbenam di dalam air laut (Bengen, 2004). Hal serupa dinyatakan oleh Den Hartog (1977) bahwa lamun merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di dalam air laut yang memiliki daun, akar, batang rimpang (*rhizoma*), buah dan berkembangbiak dengan biji. Tumbuhan lamun kadang-kadang membentuk komunitas yang lebat yang disebut padang lamun. Padang lamun merupakan sumberdaya laut yang penting baik secara ekologi maupun ekonomi (Mangando 2014).

Dari 60 jenis lamun yang tersebar di dunia, 12 diantaranya terdapat di Indonesia yang termasuk dalam famili *Hydrocharitaceae* yaitu *Halophila decipiens*, *Halophila minor*, *Halophila ovalis*, *Halophila spinulosa*, *Thalassia hemprichii* serta *Enhalus acoroides* dan yang termasuk dalam famili *Cymodoceaceae* yaitu *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Halodule uninervis*, *Halodule pinifolia*, *Syringodium isoetifolium* dan *Thalassodendron ciliatum* (Green dan Short, 2003 dan Tomascik et al., 1997) dalam (Hasanah 2013).

2. Lamun *Enhalus Acoroides*

Jenis lamun yang besar dengan panjang daun 30-200 cm dan lebar 1,2-2 cm. Tepi daun menggulung dengan permukaan halus. Memiliki bristel yaitu bulu kaku berwarna hitam seperti yang terlihat pada gambar 2.

Adapun klasifikasi dari *Enhalus acoroides* menurut den Hartog (1970) dalam (Mangando 2014) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Division : Anthophyta

Class : Angiospermae

Order : Helobiae

Family : Hydrocharitaceae

Genus : *Enhalus*

Species : *Enhalus acoroides*




Gambar 2.2 *Enhalus acoroides*

Enhalus acoroides memiliki helaian daun yang lurus, kaku dan panjang lebih dari 50 cm serta lebar lebih dari 1,5 cm dan berbentuk seperti pita (Susetiono, 2004). Ujung daun membulat dan terkadang agak bergerigi. Rhizomanya menancap dalam substrat dan berukuran besar dengan diameter dapat mencapai 1,5 cm. Bagian rhizoma ditutupi oleh serabut hitam yang rapat yang berasal dari hasil pembusukan daun tuanya (*bristle*) (Den Hartog, 1970). Daun *Enhalus* yang besar dijadikan tempat berlindung bagi organisme terutama bagi epifauna dan infauna dari kekeringan dan sengatan matahari.

Enhalus acoroides dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual pada lamun *Enhalus acoroides* berbeda dengan reproduksi seksual pada jenis lamun lainnya.

Bunga *Enhalus acoroides* disembulatkan ke permukaan air untuk melakukan penyerbukan. Proses penyerbukan ini dikontrol oleh periode pasang surut (King et al., 1990) dalam (Patiri 2013). Bunga jantan bertangkai pendek lurus, bunga betina bertangkai lurus ke atas. Saat terjadi pembuahan tangkai bunga berubah berlekuk seperti spiral. Buah berukuran besar dengan permukaan luar berambut tebal. Jumlah biji dalam satu buah bervariasi antara 8-12 biji (Gambar 2.3).



3. Kandungan Gizi buah Lamun (*Enhalus Acoroides*)

Tabel 2.5. kandungan zat gizi pada buah lamun jenis *Enhalus Acoroides*

Komponen	Jumlah
Karbohidrat	59,62%
Protein	5,65%
Lemak	0,76%

Sumber: Badui, 2010.

F. Tinjauan Umum Tentang Otak-otak Ikan Kembang Buah Lamun

1. Otak-otak ikan kembang buah lamun

Otak-otak Ikan Kembang Substitusi Buah Lamun merupakan salah satu variasi terbaru dari otak-otak, yaitu otak-otak yang bahan dasarnya terbuat dari campuran ikan kembang katombo (*Rastrelliger brachyoma*) dan buah lamun jenis *Enhalus acoroides* dicampur dengan adonan dasar pembuatan otak-otak pada umumnya.

Substitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pergantian (Depdikbud 1996). Substitusi dalam pembuatan otak-otak pada penelitian ini adalah mengganti bahan utama yaitu ikan kembang dalam skala kecil. Bahan yang digunakan untuk menggantikan yaitu buah lamun.

Tujuan dari pembuatan otak-otak ini yaitu sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak sekolah terkhususnya anak sekolah yang mengalami Kurang Energi Protein (KEP) ringan.

Adapun otak-otak terdiri dari 4 sampel otak-otak yang telah diuji di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar (BBLK Makassar), yang terdiri dari otak-otak ikan kembang dan otak-otak ikan kembang substitusi buah lamun dengan perbandingan bahan yang berbeda-beda yaitu (3:1), (1:1), (1:3). Dari keempat perbandingan tersebut, peneliti mengambil otak-otak Ikan Kembang Substitusi buah lamun dengan perbandingan 3:1 untuk diintervensikan kepada


anak sekolah gizi kurang pada kelompok kasus, serta otak-otak ikan kembung untuk diintervensikan kepada anak sekolah gizi kurang pada kelompok kontrol. Alasan peneliti memilih otak-otak perbandingan 3:1 untuk diintervensikan kepada anak sekolah gizi kurang kelompok kasus karena berdasarkan hasil uji otak-otak dengan perbandingan 3:1 memiliki kandungan zat gizi makro yang bagus dari sampel otak-otak lainnya (1:3, 1:1, dan otak-otak ikan kembung tanpa substitusi) untuk nantinya dilihat apakah ada pengaruh pemberian terhadap perubahan status gizi. Sedangkan pemilihan otak-otak ikan kembung untuk diintervensikan kepada anak sekolah gizi kurang kelompok kontrol karena memiliki kandungan energi yang lebih rendah dari otak-otak yang diintervensikan kepada anak sekolah gizi kurang kelompok kasus. Pemberian yang berbeda kepada kedua kelompok kasus ini agar memudahkan peneliti melihat pengaruh pemberian otak-otak terhadap status gizi anak sekolah gizi kurang. Berikut daftar kandungan gizi dari otak-otak Ikan Kembung Substitusi buah lamun dengan berbagai perbandingan.

Tabel 2.6.
Kandungan Gizi Dalam 100 Gram Otak-otak
Ikan Kembung Substitusi Buah Lamun

Otak-otak ikan kembung buah lamun	Parameter					
	Karbohidrat (g)	Protein (g)	Lemak (g)	Fenol (ug/g)	Kalsium (ug/g)	Zat Besi (ug/g)
3:1	14,48	6,36	0,31	230,96	121,28	22,55
1:1	13,38	5,83	0,47	301,63	194,17	24,22
1:3	17,52	3,21	0,41	344,49	191,57	36,89
1:0	7,73	9,63	0,4	183,66	201,06	23,18

Sumber : Data Sekunder, 2016 dalam (Naurah, 2016)

G. Kerangka Konsep



Keterangan

- : Variabel Independen yang Diteliti
- : Variabel Independen yang Tidak Diteliti
- : Variabel Dependen
- : Hubungan Variabel ke Variabel

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian


Pendekatan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah studi eksperimen semu (*quasi experimental design*) yang merupakan jenis penelitian dengan menguji pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Pengujian dilakukan melalui intervensi pada anak sekolah gizi kurang (kekurangan energi protein), dengan rancangan penelitian yaitu *Non Equivalent Control Group*. Rancangan ini memungkinkan untuk membandingkan hasil intervensi program kesehatan dengan suatu kelompok kontrol yang serupa. Dalam rancangan ini, pengelompokan anggota sampel pada kelompok kasus dan kelompok kontrol tidak dilakukan secara random atau acak tetapi ditentukan oleh peneliti. Oleh sebab itu rancangan ini sering disebut juga *non randomized control group pretest posttest design* (Notoatmodjo 2012).

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas (variabel independen) adalah otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun, sedangkan yang menjadi variabel terikatnya (dependen) adalah status gizi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Intervensi yang dilakukan pada anak sekolah dasar gizi

kurang adalah pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun pada kelompok kasus dan otak-otak ikan kembung pada kelompok kontrol.

Peneliti mengambil sampel pada anak sekolah yang mengalami gizi kurang sebanyak 36 siswa yang terbagi masing-masing 18 anak sekolah gizi kurang kelompok kasus dan 18 anak sekolah gizi kurang lainnya sebagai kelompok kontrol.

Gambar 3.1 Rancangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Anak sekolah dasar gizi kurang yang didapatkan berdasarkan pengukuran antropometri (BB/U) dan sesuai dengan kriteria inklusi peneliti. Terlebih dahulu dilakukan sosialisasi mengenai penelitian kepada siswa dan orangtua/wali siswa. Kemudian dilakukan *Recall 24 Hours* untuk mengetahui gambaran asupan makanan pada anak dan pemberian obat cacing pada anak (apabila anak belum

mengonsumsi obat cacing dalam rentan waktu 6 bulan terakhir). Hal ini dilakukan untuk menurunkan intensitas infeksi cacing pada anak, karena infeksi cacing perut dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi (seperti protein, karbohidrat, vitamin A dan zat besi) pada anak, 2 (dua) hari setelah pemberian obat cacing kemudian dilakukan intervensi.

Intervensi yang dilakukan, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pada kelompok kasus dan Kontrol diberikan makanan tambahan sebanyak 1 kali dalam sehari selama 30 hari diluar makanan sehari-hari pada anak serta dilakukan pencatatan besaran jumlah otak-otak yang dikonsumsi. Setelah pemberian otak-otak tersebut, peneliti kembali melakukan *Recall 24 Hours* dan penimbangan berat badan dan menganalisis dengan menggunakan indeks berat badan menurut umur (*z-score*), baik pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini semua anak sekolah gizi kurang (Kekurangan Energi Protein) di SDN Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tahun 2016 yang berjumlah 83 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel pada penelitian ini diambil secara *purposive sampling* atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo 2012).

- a. Subyek Penelitian harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

Kriteria Inklusi:

- 1) Mengalami gizi kurang dengan BB/U bila z-score -3 s/d <-2 SD
- 2) Tidak mengalami penyakit infeksi yang serius seperti Thypoid, DBD, Diare dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)
- 3) Tidak memiliki reaksi alergi terhadap bahan intervensi
- 4) Umur 7-9 tahun
- 5) Bersedia untuk diwawancarai dan bersedia menjadi subjek penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan responden.
- 6) Bersedia mengikuti prosedur sebagai subjek penelitian selama penelitian berlangsung.
- 7) Menetap/tidak pindah daerah.

Kriteria Eksklusi:

- 1) Anak yang berstatus gizi baik
- 2) Mengalami penyakit infeksi yang serius seperti Thypoid, DBD, Diare dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)
- 3) Memiliki reaksi alergi terhadap bahan intervensi
- 4) Umur berada dibawah 7 tahun dan diatas 9 tahun
- 5) Tidak bersedia untuk diwawancarai dan menjadi subjek penelitian dengan tidak menandatangani lembar persetujuan responden.
- 6) Tidak bersedia mengikuti prosedur sebagai subjek penelitian selama penelitian berlangsung.
- 7) Pindah daerah atau meninggal dunia.

b. Besar Sampel

Perhitungan besar sampel dilakukan agar memenuhi jumlah syarat analisis, dengan menggunakan rumus Federer (1963) dalam (Hasyim 2014), dimana sampel (n) dapat ditentukan berdasarkan total kelompok (t) yang digunakan dalam penelitian. Sehingga jika $t=2$ kelompok maka besar sampel yang digunakan:

$$\begin{aligned}
 (n-1)(t-1) &\geq 15 \\
 (n-1)(2-1) &\geq 15 \\
 (n-1)(1) &\geq 15 \\
 n-1 &\geq 15 \\
 n &\geq 15 + 1 = 16 \\
 n &\geq 16
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, setiap kelompok perlakuan terdapat minimal 16 sampel. Adapun sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebanyak 36 siswa gizi kurang yang akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok kasus sebanyak 18 siswa dan kelompok kontrol sebanyak 18 siswa untuk selanjutnya diintervensi otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung. Berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus di atas, maka jumlah sampel yang digunakan telah memenuhi besar sampel minimum.

Hal ini di dasari teori dari beberapa ahli, Menurut Baley dalam (Mahmud 2011) menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Baley, Roscoe dalam (Sugiyono 2012) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. Senada dengan Roscoe, Pendapat Gay dalam (Mahmud 2011) berpendapat bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu Metode *experimental* minimal 15 subjek per kelompok.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu melakukan pengukuran antropometri, dan wawancara pada obyek

penelitian untuk mengetahui asupan makan pada sampel dengan menggunakan *recall 24 hours*.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui penelusuran pustaka, jurnal-jurnal hasil penelitian, buku literatur, data siswa dari sekolah yang terkait.

E. Instrumen Penelitian

1. Perangkat alat tulis

Terdiri dari buku tulis dan ballpoint, perangkat ini digunakan untuk menghimpun informasi yang didapatkan dilapangan, berupa catatan yang dianggap penting untuk keperluan penelitian.

2. *Inform Consent*/Form pernyataan kesediaan menjadi responden.

3. Form identitas responden

4. Form *Food recall* 24 jam

Untuk mencatat semua makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam. Dalam metode ini dimulai dari responden bangun pagi kemarin sampai istirahat tidur malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh (Supriasa 2002). Form *recall* 1x24 jam digunakan untuk mengetahui konsumsi protein dan sumber energi, hasil *recall* kemudian dihitung dengan bantuan *software* komputer *Nutri Survey* 2007 dan kemudian dihitung Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak usia 7-9 tahun dan tingkat konsumsi responden terhadap AKG.

5. Form data pengukuran antropometri

Untuk memantau hasil pengukuran antropometri responden berupa berat badan.

6. Form pemantauan konsumsi

Untuk memantau konsumsi otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung oleh responden. Pemantauan konsumsi otak-otak pada responden dilakukan dengan cara menimbang sisa otak-otak yang dikonsumsi oleh responden menggunakan timbangan makanan digital.

7. Foto-foto makanan berdasarkan Ukuran Rumah Tangga (URT)

Digunakan pada saat melakukan recall 24 jam untuk mempermudah responden mengingat ukuran/porsi makanan yang telah dimakan selama 24 jam yang lalu.

8. Timbangan Berat badan digital

Digunakan untuk mengukur berat badan sampel (dengan kapasitas 150 kg dan ketelitian 0,1 kg).



Sumber: Primer, 2016
Gambar 3.2 Timbangan Berat Badan

Adapun cara pengukuran Berat Badan sampel yaitu:

- a. Memastikan timbangan berat badan berfungsi dengan baik dengan cara mengatur petunjuk angka tepat diangka 0 (nol).
- b. Meminta anak untuk melepas sepatu/sandal dan meletakkan barang bawaan yang berat.
- c. Meminta anak untuk naik keatas timbangan, dengan posisi berhadapan dengan pemeriksa.
- d. Memperhatikan angka berhenti pada display timbangan

9. Timbangan Makanan Digital

Digunakan untuk menimbang bahan-bahan pembuatan otak-otak sehingga keakurasian ukuran timbangan sesuai dengan resep pembuatan otak-otak. Serta digunakan untuk menimbang sisa otak-otak yang dikonsumsi oleh responden sehingga memudahkan peneliti dalam mencatat konsumsi otak-otak responden selama proses intervensi (dengan kapasitas 3 kg dan ketelitian 0.01 g).



Sumber: Primer, 2016
Gambar 3.3 Timbangan Makanan

Adapun cara menggunakan timbangan makanan digital yaitu:

- a. Menggunakan Wadah, mengaktifkan timbangan dengan menekan tombol ON/OFF lalu letakkan wadah diatas timbangan lalu tekan tombol TARE pada timbangan, maka ukuran akan kembali ke posisi 0 (nol) kemudian masukkan bahan yang akan ditimbang kedalam wadah dan perhatikan angka yang muncul pada display timbangan.
- b. Tanpa Menggunakan Wadah, mengaktifkan timbangan dengan menekan tombol ON/OFF lalu setelah angka 0 (nol) tertera pada display timbangan kemudian masukkan bahan yang akan ditimbang kedalam wadah dan perhatikan angka yang muncul pada display timbangan.

10. Obat Cacing

Pemberian obat cacing dilakukan untuk membunuh cacing dalam tubuh manusia dengan menggunakan obat yang aman dan efektif dalam memberantas

berbagai jenis cacing usus sehingga dapat menurunkan intensitas kecacingan pada anak.

11. Pengolahan dan analisis data menggunakan software WHO Anthroplus, Nutrisurvey 2007, Microsoft Excel dan SPSS versi 21.

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya (Sugiyono 2013).

Biasanya alat ukur buatan pabrik telah melalui tahap validitas di masing-masing pabrik sebagai produsen alat tersebut. Namun, untuk lebih memastikan keakuratan alat maka perlu dilakukan perbandingan hasil ukur pada alat ukur menggunakan dua atau lebih alat ukur. Untuk alat ukur yang menggunakan baterai seperti timbangan maka perlu dilakukan pengecekan daya baterai (sumber energi) yang digunakan dalam keadaan baik (baru).

2. Reliabilitas

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Notoatmodjo 2012). Untuk menjaga tingkat konsistensi (Reliabilitas) alat ukur (timbangan), maka peneliti sebaiknya melakukan pengulangan pengukuran sebanyak berkali-kali agar data yang diperoleh dapat diakui kebenaran dan hasilnya lebih akurat.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS 21.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi distribusi frekuensi persentase variabel baik variabel independen maupun variabel dependen. Selain itu dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 21 yang disesuaikan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis Univariat

Dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisis Bivariat

Dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Data yang diperoleh dalam ordinal dianalisis menggunakan uji statistik yaitu uji T berpasangan (*paired T-Test*), uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung terhadap status gizi anak sekolah gizi kurang pada kelompok kasus dan kelompok kontrol dengan tingkat kepercayaan semua uji yaitu 95% atau $\alpha = 5\%$ (0.05).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sekolah Dasar Negeri Cambaya terletak di jalan Barukang Utara No. 60 di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan daerah pesisir kota makassar. Gedung yang dimiliki SD Negeri Cambaya terdiri dari 7 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 ruang perpustakaan sekaligus sebagai ruang UKS, dan 1 ruang rapat. Jumlah siswa sampai saat peneliti melakukan penelitian sebanyak 274 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 147 orang dan perempuan sebanyak 127 orang.

Sekolah Dasar Negeri Cambaya, didukung oleh 11 tenaga pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 8 orang guru kelas, 1 orang guru PAI (Agama Islam), 1 orang guru Olah Raga, dan ditambah 1 orang penjaga sekolah.

b. Visi dan Misi SDN Cambaya

1) Visi SDN Cambaya

Mewujudkan generasi berprestasi, terampil, mandiri, serta mampu menguasai dan mengembangkan materi pendidikan standar dunia.

2) Misi SDN Cambaya

- a) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam mendidik anak mengubah sikap menjadi beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, serta mandiri.
- b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan demokratis dengan dilandasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

- c) Menerapkan manajemen partisipatif dalam mengembangkan sekolah dan meningkatkan prestasi belajar siswa.
- d) Mendorong anak meningkatkan kebersihan lingkungan.

c. Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin

Berikut hasil analisis univariat pada kelompok jenis kelamin pada anak Sekolah Dasar Gizi Kurang :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
Tahun 2016

Jenis Kelamin	Kelompok I (Kasus)		Kelompok II (Kontrol)	
	n	%	n	%
Laki-laki	8	44.4	11	61.1
Perempuan	10	55.6	7	38.9
Jumlah	18	100	18	100

Sumber : Data Primer, 2016

Dari tabel 4.1, di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden pada kelompok kasus, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (44.4%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang (55.6%). Sedangkan dari 18 responden pada kelompok kontrol, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (61.1%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (38.9%).

2) Tingkatan Kelas

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Kelas
di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Tingkatan Kelas	Kelompok I (Kasus)		Kelompok II (Kontrol)	
	n	%	n	%
Kelas 1	3	16.7	2	11.1
Kelas 2	5	27.8	6	33.3
Kelas 3	4	22.2	4	22.2
Kelas 4	6	33.3	6	33.3
Jumlah	18	100	18	100

Sumber : Data Primer, 2016

Dari tabel 4.2, di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden pada kelompok kasus, responden paling banyak pada kelas 4 dengan jumlah 6 orang

(33.3%), dan paling sedikit pada kelas 1 dengan jumlah 3 orang (16.7%). Sedangkan dari 18 responden pada kelompok kontrol, responden paling banyak pada kelas 2 dan 4 dengan jumlah masing-masing 6 orang (33.3%), dan paling sedikit pada kelas 1 dengan jumlah 2 orang (11.1%).

3) Umur

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

<i>Kelompok Umur (tahun)</i>	Kelompok I (kasus)		Kelompok II (kontrol)	
	n	%	n	%
7 tahun	7	38.9	7	38.9
8 tahun	7	38.9	6	33.3
9 tahun	4	22.2	5	27.8
Jumlah	18	100	18	100

Sumber : Data Primer, 2016

Dari tabel 4.3, di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden pada kelompok kasus, terdapat masing-masing 7 orang (38.9%) yang berusia 7 dan 8 tahun, selanjutnya terdapat 4 orang (22.2%) yang berusia 9 tahun. Sedangkan dari 18 responden pada kelompok kontrol, terdapat 7 orang (38.9%) yang berusia 7 tahun, selanjutnya terdapat 6 orang (33.3%) yang berusia 8 tahun, dan terdapat 5 orang (27.8%) yang berusia 9 tahun.

4) Pekerjaan Orangtua

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orangtua
di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Pekerjaan Orangtua	Kelompok I (kasus)				Kelompok II (kontrol)			
	Ayah		Ibu		Ayah		Ibu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Buruh	7	38.9	0	0	9	50	0	0
Nelayan	6	33.3	0	0	5	27.8	0	0
Wiraswasta	5	27.8	1	5.6	4	22.2	1	5.6
IRT	0	0	17	94.4	0	0	17	94.4
Jumlah	18	100	18	100	18	100	18	100

Sumber : Data Primer, 2016

Dari tabel 4.4, di atas menunjukkan bahwa pada kelompok kasus kebanyakan orangtua responden khususnya ayah bekerja sebagai buruh sebanyak 7 orang (38.9%), nelayan 6 orang (33.3%) dan wiraswasta sebanyak 5 orang (27.8%), sedangkan ibu paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 17 orang (94.4%) dan 1 orang (5.6%) yang bekerja sebagai wiraswasta. Pada kelompok kontrol ayah paling banyak bekerja sebagai buruh 9 orang (50%), nelayan 5 orang (27,8%), dan wiraswasta 4 orang (22.2%), ibu paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 17 orang (94.4%) dan wiraswasta sebanyak 1 orang (5.6%).

2. Hasil Analisis

a. Analisis Univariat

1) Gambaran Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Variabel	Kelompok Perlakuan		Independent t- test
	Kelompok I (Kasus)	Kelompok II (Kontrol)	
Asupan Energi (kcal)	789.37	877.02	0.084
Asupan Protein (g)	27.33	31.65	0.026
Berat Badan (kg)	17.96	18.75	0.158
Status Gizi (SD)	-2.78	-2.44	0.000

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.5, di atas menunjukkan bahwa untuk uji homogenitas varian asupan energi, asupan protein, berat badan, dan status gizi diperoleh hasil Uji *Independent t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *Levene's test for equality of Variances* untuk kolom Sig didapatkan nilai $p > 0,05$ maka varian data tidak berbeda (homogen). Karena varian data tidak berbeda maka, hasil uji t tidak berpasangan dapat dilihat pada kolom *t-test for equality of*

means untuk kolom sig. (2-tailed) baris pertama. Pada variabel asupan energi dan berat badan didapatkan nilai $p > 0,05$ maka diambil kesimpulan "secara statistik tidak terdapat perbedaan rerata asupan energi, dan berat badan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol sebelum intervensi". Sedangkan Pada variabel asupan protein dan status gizi didapatkan nilai $p < 0,05$ maka diambil kesimpulan "secara statistik terdapat perbedaan rerata asupan protein, dan status gizi antara kelompok kasus dan kelompok kontrol sebelum intervensi".

2) Gambaran Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Variabel	Kelompok Perlakuan		Independent t- test
	Kelompok I (Kasus)	Kelompok II (Kontrol)	
Asupan Energi (kkal)	920.90	925.10	0.944
Asupan Protein (g)	35.92	40.13	0.095
Berat Badan (kg)	18.61	19.06	0.449
Status Gizi (SD)	-2.57	-2.39	0.013

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.6, di atas menunjukkan bahwa untuk uji homogenitas varian asupan energi, asupan protein, berat badan, dan status gizi diperoleh hasil Uji *Independent t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *Levene's test for equality of Variances* untuk kolom Sig didapatkan nilai $p > 0,05$ maka varian data tidak berbeda (homogen). Karena varian data tidak berbeda maka, hasil uji t tidak berpasangan dapat dilihat pada kolom *t-test for equality of means* untuk kolom sig. (2-tailed) baris pertama.

Pada variabel asupan energi, asupan protein dan berat badan didapatkan nilai $p > 0,05$ maka diambil kesimpulan "secara statistik tidak terdapat perbedaan rerata asupan energi, asupan protein dan berat badan antara kelompok kasus dan

kelompok kontrol setelah intervensi”. Sedangkan Pada variabel status gizi didapatkan nilai $p < 0,05$ maka di ambil kesimpulan ”secara statistik terdapat perbedaan rerata status gizi antara kelompok kasus dan kelompok kontrol setelah intervensi”.

b. Analisis Bivariat

1) Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun Terhadap Asupan Energi pada anak Sekolah Dasar Gizi Kurang

Tabel 4.7
Rata-rata Perubahan Asupan Energi Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Asupan Energi	Mean Asupan Energi		Mean (selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	789.38	920.90	131.52	0.000
Kelompok control	877.02	925.10	48.08	0.000

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.7 Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap asupan energi pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap asupan energi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap asupan energi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan energi pada masing-

masing kelompok, namun memiliki makna yang berbeda dimana pada kelompok kasus terjadi peningkatan rata-rata asupan energi yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu 131.52 kkal pada kelompok kasus dan 48.08 kkal pada kelompok kontrol.

2) Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun Terhadap Asupan Protein pada anak Sekolah Dasar Gizi Kurang.

Tabel 4.8
Rata-rata Perubahan Asupan Protein Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Asupan Protein	Mean Asupan Protein		Mean (selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	27.33	35.92	8.59	0.000
Kelompok kontrol	31.65	40.13	8.47	0.000

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.8 Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap asupan protein pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap asupan protein pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap asupan protein pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan protein pada masing-masing kelompok, namun memiliki makna yang berbeda dimana pada kelompok kasus terjadi peningkatan rata-rata asupan protein yang lebih signifikan

dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu 8.59 gram pada kelompok kasus dan 8.47 gram pada kelompok kontrol.

3) Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun Terhadap Berat Badan pada anak Sekolah Dasar Gizi Kurang.

Tabel 4.9
Rata-rata Perubahan Berat Badan Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Berat Badan	Mean Berat Badan		Mean (selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	17.96	18.61	0.65	0.000
Kelompok kontrol	18.75	19.06	0.30	0.001

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.9 Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap rata-rata berat badan pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap rata-rata berat badan pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.001$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap asupan protein pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan rata-rata berat badan pada masing-masing kelompok, namun memiliki makna yang berbeda dimana pada kelompok kasus terjadi peningkatan rata-rata berat badan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu 0.65 kg pada kelompok kasus dan 0.30 kg pada kelompok kontrol.

4) Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun Terhadap Status Gizi pada anak Sekolah Dasar Gizi Kurang.

Tabel 4.10
Rata-rata Perubahan Status Gizi Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol Sebelum dan Setelah Intervensi di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2016

Status Gizi	Mean Status Gizi		Mean (Selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	-2.78	-2.57	-0.21	0.000
Kelompok kontrol	-2.44	-2.39	-0.05	0.100

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.10 Pengaruh Pemberian Otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap rata-rata status gizi pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap rata-rata status gizi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test*. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.100$ yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), maka tidak terdapat pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap status gizi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari hasil uji statistika antara dua kelompok, terdapat perbedaan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Dimana, pada kelompok kasus terdapat pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap kenaikan status gizi pada siswa gizi kurang. Berbeda dengan kelompok kontrol, dimana tidak terdapat pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap kenaikan status gizi pada siswa gizi kurang.

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 oktober 2016 hingga 09 november 2016 di SD Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah anak sekolah dasar kelas 1-4 dengan rentan umur 7-9 tahun yang berat badannya berada dalam kategori rendah atau gizi kurang dengan nilai *z-score* ($-3 \leq z < -2$ SD). Diperoleh 36 anak yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Sebelum dilakukan intervensi terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tentang program intervensi kepada orangtua/wali siswa yang menjadi responden serta pemberian obat cacing dimaksudkan agar meminimalisir kejadian cacingan pada anak. Namun pada penelitian ini, pemberian obat cacing tidak dilakukan oleh peneliti dikarenakan seluruh siswa di SDN Cambaya khususnya siswa yang menjadi responden penelitian telah mengkonsumsi obat cacing pada bulan agustus tahun 2016, yang dibagikan oleh instansi kesehatan setempat.

Dari 36 responden penelitian, kemudian di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. 18 orang anak yang termasuk dalam kelompok kasus setiap hari diberikan kudapan sebanyak 100 gram otak-otak-ikan kembung substitusi buah lamun sedangkan 18 anak lainnya yang termasuk dalam kelompok kontrol diberikan kudapan sebanyak 100 gram otak-otak ikan kembung yang dibagikan pada saat jam istirahat.

Penelitian intervensi dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun digunakan formula 3:1 yaitu 75 gram ikan kembung dan 25 gram buah lamun yang dapat memberikan tambahan energi sebanyak 86.15 kkal dan protein sebanyak 6.36 gram pada anak sekolah yang mengalami gizi kurang. Hal ini didasarkan juga pada hasil penelitian (Alfiyah 2016) dengan judul penelitian "Analisis Kandungan Zat Gizi Otak-Otak Ikan

Kembang Substitusi Buah Lamun (*Enhallus Acoroides*) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Di Masyarakat” yang merekomendasikan perbandingan 3:1 sebagai produk terbaik dalam hal kandungan zat gizi makro.

Selain zat gizi makro tersebut, juga terdapat zat antioksidan yang berasal dari senyawa fenol sebanyak 230,96 ug.

Senyawa fenol (C_6H_6OH) merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzene. Senyawa fenol dapat mengalami oksidasi sehingga dapat berperan sebagai reduktor sehingga dapat menghentikan laju radikal bebas sehingga tidak merusak sel sehat didalam tubuh. Semakin mudah teroksidasi maka semakin efektif antioksidan tersebut (Khaira 2010).

Fenolik merupakan metabolit sekunder yang ditemukan tersebar di beberapa bagian tanaman, seperti buah, daun, dan batang. Senyawa yang digolongkan sebagai senyawa fenolik memiliki ciri khas yaitu terdapat satu atau lebih gugus hidroksil (OH) yang menempel pada struktur cincinnya. (Hoelz, et al., 2010) dalam (Pangestuty 2016). Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama senyawa induknya yaitu fenol. Kelompok terbesar dari senyawa fenolik adalah flavonoid, yang merupakan senyawa yang secara umum dapat ditemukan pada semua jenis tumbuhan.

Menurut (Hernani dan Rahardjo 2005) menyatakan bahwa kandungan senyawa fenolik yang ditemukan pada tanaman dapat beraktivitas sebagai antioksidan. Konsumsi antioksidan dalam jumlah memadai dapat mencegah terbentuknya radikal bebas, menurunkan kejadian penyakit degeneratif, dan meningkatkan status imunologis (Winarsi 2007).

1. Asupan Energi


Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan,

pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Energi yang masuk melalui makanan harus seimbang dengan kebutuhan energi seseorang. Apabila hal tersebut tidak tercapai, akan terjadi pergeseran keseimbangan kearah negatif atau positif.

Kebutuhan energi untuk setiap orang berbeda-beda, berbagai faktor yang mempengaruhi kecukupan energi yaitu berat-badan, tinggi badan, pertumbuhan dan perkembangan (usia), dan jenis kelamin. Adapun kebutuhan energi pada anak sekolah dengan rentan usia 7-9 tahun yaitu sebesar 1850 kkal per hari. Asupan energy dapat diperoleh dengan melakukan survey konsumsi makanan yaitu recall 24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur,1997) dalam (Supariasa 2002).

Gambaran asupan zat gizi yang diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam, selanjutnya hasil wawancara recall 24 jam dimasukkan kedalam aplikasi nutrisurvey 2007 untuk menggambarkan akumulasi asupan energi pada responden. Perubahan asupan energi responden sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.1
Grafik Perubahan Asupan Energi Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2016

Pada Grafik 4.1 di atas, dapat dilihat perubahan asupan energi pada kelompok kasus dan kelompok kontrol sebelum dan setelah intervensi.

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata asupan energi responden pada kelompok kasus yaitu 789.37 kkal dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 920.90 kkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap perubahan asupan energi pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($p=0.000$). sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh hasil rata-rata asupan energi sebelum dilakukan intervensi yaitu 877.02 kkal dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 925.10 kkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap perubahan asupan energi pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($p=0.000$).

Pada kedua kelompok intervensi sama-sama mengalami peningkatan asupan energi akan tetapi peningkatan asupan energi yang signifikan terjadi pada kelompok kasus dengan rata-rata selisih asupan energi sebanyak 131.52 kkal. Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan rata-rata selisih asupan energi sebanyak 48.08 kkal.

Adanya perbedaan asupan energi responden antara kelompok kasus dan kelompok kontrol disebabkan oleh adanya peningkatan asupan makanan sehari-hari pada anak khususnya karbohidrat pada nasi dan juga karena kandungan gizi otak-otak yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda. Kandungan gizi otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun yang diberikan pada kelompok kasus memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi yaitu karbohidrat sebanyak 14.48 gram pada otak-otak ikan kembung yang diberikan pada kelompok kontrol memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 7.73 gram. Dari segi konsumsi prodak selama intervensi 30 hari, pada kelompok kasus lebih banyak mengkonsumsi prodak yaitu sebesar 77.71% atau sebanyak 66.94 kkal sedangkan pada kelompok kontrol 63.22% atau sebanyak 46.17 kkal. Kurangnya asupan prodak pada

kelompok kontrol disebabkan karena berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan oleh (Alfiyah 2016), otak-otak ikan kembung memiliki nilai organoleptik yang lebih rendah dari otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun, dilihat dari segi warna, aroma, tekstur dan rasanya.

Walaupun terjadi peningkatan asupan energi pada kelompok kasus dan kontrol namun jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan energi sesuai AKG (2013). Hal ini disebabkan masih tingginya konsumsi jajanan pada anak yang mengakibatkan belum maksimalnya asupan makanan pokok sehari-hari dan asupan prodak, serta kurangnya pengetahuan orangtua tentang gizi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ode et al. 2012) pada penelitiannya yang berjudul “Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Terhadap Status Gizi Siswa SD Inpres 2 Pannampu” bahwa tingkat pengetahuan orangtua tentang gizi sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap dalam memilih makanan untuk anaknya. Keadaan gizi yang baik akan menentukan tingginya angka presentase status gizi secara nasional. Ketidaktahuan tentang makanan yang mempunyai gizi baik akan menyebabkan pemilihan makanan yang salah dan rendahnya gizi yang terkandung dalam makanan tersebut dan akan menyebabkan status gizi anak tersebut menjadi buruk atau kurang.

2. Asupan Protein

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada didalam otot, seperlima berada didalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh didalam kulit, dan selebihnya didalam jaringan lain dan cairan tubuh.

Protein mempunyai fungsi yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan sebagai sumber energi


dimana protein menyumbang energi sebanyak 4 kkal/gram. Apabila tubuh mengalami kekurangan zat energi maka protein terlebih dahulu akan menghasilkan energi untuk membentuk glukosa.

Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada asupan dan transportasi zat-zat gizi. Kekurangan protein yang terus menerus akan menimbulkan gejala yaitu pertumbuhan kurang baik, daya tahan tubuh menurun, rentan terhadap penyakit, daya kreatifitas dan daya kerja merosot, mental lemah dan lain-lain. Tingkat kecukupan asupan protein akan mempengaruhi status gizi.

Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi (Almatsier 2001).

Adapun angka kecukupan protein (AKP) pada anak sekolah dengan rentan usia 7-9 tahun yaitu sebanyak 49 gram (AKG 2013). Gambaran asupan protein dapat diperoleh dengan melakukan survey asupan makanan yaitu recall 24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur,1997) dalam (Supariasa 2002). Gambaran asupan zat gizi yang diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam, selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi nutrisurvey 2007 untuk menggambarkan akumulasi asupan protein pada responden. Perubahan asupan protein responden sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.2
Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2016

Pada Grafik 4.2 di atas, dapat dilihat perubahan asupan protein pada kelompok kasus dan kelompok kontrol sebelum dan setelah intervensi.

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata asupan protein responden pada kelompok kasus yaitu 27.33 gram dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 35.92 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($\rho=0.000$). sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh hasil rata-rata asupan protein sebelum dilakukan intervensi yaitu 31.65 gram dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 40.13 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($\rho=0.000$).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Kusumawati 2015) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan secara bermakna ($\rho<0.05$) asupan energi, karbohidrat, lemak dan protein sebelum dan setelah intervensi.

3. Berat Badan

Berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai keadaan suatu gizi manusia. Berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan diukur dengan alat ukur berat badan dengan suatu satuan kilogram (Mabella 2000)


Pada keadaan normal, dimana kondisi kesehatan seseorang dan seimbang antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi tubuh terjamin, maka berat badan juga bertambah seiring bertambahnya umur. Sedangkan, pada keadaan abnormal, penambahan berat badan dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari keadaan normal.

Berat badan merupakan salah satu parameter penilaian status gizi yang sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makanan yang menurun. Parameter berat badan ini dinyatakan dalam bentuk Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka Indeks BB/U lebih dapat menggambarkan kondisi seseorang saat ini.

Pemantauan berat badan sangatlah perlu untuk dilakukan sebagai tindakan preventif guna mengetahui laju penurunan atau penambahan berat badan yang tidak diinginkan sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin.

Berikut adalah grafik perubahan rata-rata berat badan pada kelompok kasus dan kelompok kontrol mulai dari sebelum dan setelah intervensi.

Grafik 4.3
Grafik Perubahan Berat Badan Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2016

Pada grafik 4.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Hal tersebut ditunjukkan pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata berat badan responden kasus sebelum intervensi yaitu 17,96 kg menjadi 18.61 kg setelah intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol sebelum intervensi yaitu 18.75 kg menjadi 19.06 kg setelah intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan berat badan pada kedua kelompok dengan hasil uji *paired t-test* didapatkan nilai ($p=0.000$) pada kelompok kasus dan ($p=0.001$) pada kelompok kontrol. Karena nilai p kedua kelompok tersebut kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung pada kelompok kasus dan kelompok kontrol.

Hasil ini didukung dengan hasil penelitian sejalan oleh Sandjaya (2002) dalam (Marsaoly, Michran 2011) yang mengatakan bahwa dari berbagai kajian, intervensi PMT mampu memberikan dampak positif pada penambahan berat badan anak meskipun kecil.

Walaupun pada kedua kelompok sama-sama terjadi peningkatan berat badan, namun pada kelompok kasus terjadi peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dimana selisih kenaikan berat badan pada kelompok kasus sebelum dan setelah dilakukan pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun didapatkan nilai selisih berat badan sebesar 0.65 kg sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan nilai selisih berat badan sebesar 0.30 kg.

Adanya perbedaan nilai rata-rata selisih kenaikan berat badan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol dikarenakan adanya peningkatan asupan energi dan asupan protein yang lebih signifikan pada kelompok kasus serta kandungan senyawa fenol yang terdapat pada produk intervensi kelompok kasus yang memiliki aktivitas antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas didalam tubuh.

Radikal Bebas adalah oksidan yang sangat reaktif, karena radikal bebas merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya yang kemudian merebut elektron dari molekul lain, yang apabila tidak diinaktifkan akan merusak makromolekul pembentuk sel, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan *deoxyribo nucleic acid* (DNA) (Khaira 2010)

Pembentukan radikal bebas terjadi secara terus menerus di dalam tubuh. Hal ini terjadi melalui proses metabolisme sel normal, proses peradangan, kekurangan nutrisi, maupun sebagai respons adanya radiasi sinar gama, ultraviolet (UV), polusi lingkungan dan asap rokok (Wijaya, 1996) dalam (Sayuti & Yernina 2015). Ditambahkan (Winarti 2010) faktor yang menyebabkan timbulnya radikal bebas dalam tubuh antara lain sinar X, asap mobil, bahan kimia dalam makanan (pengawet, pewarna sintetik, residu pestisida, dan bahan tambahan makanan lainnya), bahan kimia termasuk obat-obatan. Diet (pola makan sendiri) juga dapat

menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Oleh karena itu, seiring dengan usia yang bertambah, maka bertambah pula penumpukan radikal bebas dalam tubuh, hingga terjadi stres oksidatif.

Adanya radikal bebas didalam tubuh pada dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen, diantaranya adalah enzim *catalase* yang berikatan dengan Fe, *glutathione peroxidase* dan *glutathione S-transferase* yang berikatan dengan Se, *superoxide dismutase* yang berikatan dengan Cu, Zn dan Mn. akan tetapi jika senyawa radikal bebas terdapat berlebih dalam tubuh atau melebihi batas kemampuan proteksi antioksidan seluler, maka dibutuhkan antioksidan tambahan dari luar atau antioksidan eksogen untuk membantu menetralkan radikal bebas yang terbentuk (Reynertson, 2007) dalam (Sayuti & Yenrina 2015).

Antioksidan eksogen terbagi menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) yang terdiri dari *Butylated Hidroxyanisol* (BHA), *Butylated Hidroxytoluene* (BHT), *Tert-Butylated Hidroxyquinon* (TBHQ) dan tokoferol. dan antioksidan alami yaitu antioksidan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan (Sayuti & Yenrina 2015). Terutama berasal dari golongan senyawa turunan fenol seperti flavonoid (Khaira 2010).

Flavonoid dapat bersifat sebagai antioksidan dengan cara menangkap radikal bebas, sehingga sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan antara oksidan dengan antioksidan di dalam tubuh. Flavonoid mampu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dapat mengurangi kepekaan LDL terhadap pengaruh radikal bebas dan dapat bersifat hipolipidemik, antiinflamasi serta sebagai antioksidan. Flavonoid adalah antioksidan eksogen yang telah dibuktikan bermanfaat dalam mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Mekanisme kerja dari flavonoid sebagai antioksidan bisa secara langsung maupun

secara tidak langsung. Flavonoid sebagai antioksidan secara langsung adalah dengan mendonorkan ion hidrogen sehingga dapat menetralkan efek toksik dari radikal bebas. Flavonoid sebagai antioksidan secara tidak langsung yaitu dengan meningkatkan ekspresi gen antioksidan endogen melalui beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme peningkatan ekspresi gen antioksidan adalah melalui aktivasi *Nuclear factor erythroid 2 related factor 2* (Nrf2) sehingga terjadi peningkatan gen yang berperan dalam sintesis enzim antioksidan endogen seperti misalnya *superoxide dismutase* (SOD) (Sumardika 2012) Enzim SOD merupakan enzim antioksidan yang paling kritis yang mampu memperbaiki efek tekanan (*stress*) oksidatif.

Dengan adanya kandungan senyawa fenol pada buah lamun yang terdapat didalam produk intervensi kelompok kasus sehingga dapat membantu enzim-enzim tersebut agar dapat bekerja sebagai penangkal serangan radikal bebas didalam tubuh serta meningkatkan sistem imunitas pada anak sehingga nutrisi yang dikonsumsi oleh anak gizi kurang dapat terabsorpsi dengan baik yang akhirnya dapat menyebabkan peningkatan berat badan anak sekolah gizi kurang pada kelompok kasus menjadi lebih optimal dibandingkan dengan kelompok kontrol.

4. Status Gizi

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Oleh karena itu, makanan bagi tubuh mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan sel-sel yang rusak. Status gizi adalah suatu tanda-tanda atau penampilan fisik yang diakibatkan karena adanya keseimbangan antara gizi seseorang dipengaruhi oleh tingkat konsumsi atau asupan makanan dan status kesehatan. Adapun akibat dari


tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat.

Pengukuran status gizi yang paling sering dan umum digunakan adalah penilaian status gizi secara antropometri, yaitu menggunakan ukuran tubuh manusia. Parameter yang digunakan antara lain berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Indeks antropometri yang digunakan antara lain BB/U, TB/U dan BB/TB (Supariasa 2002).

Adapun pada penelitian ini, menggunakan indeks BB/U dengan ambang batas status gizi kurang yaitu (-3SD sampai <-2SD). Hasil dari pengukuran anthropometri selanjutnya dimasukkan kedalam aplikasi *WHO Anthroplus* untuk mendapatkan nilai *z-score* yang selanjutnya dicocokkan dengan tabel status gizi pada buku SK Antropometri 2010 untuk mengetahui kalsifikasi status gizi pada anak.

Berikut adalah grafik perubahan status gizi kelompok kasus dan kelompok kontrol sebelum dan setelah intervensi.

Grafik 4.4
Grafik Perubahan Status Gizi Sebelum Dan Setelah Intervensi



Sumber: Data primer, 2016

Dari grafik 4.4 terlihat adanya perubahan status gizi anak sekolah yang mengalami gizi kurang sebelum dan setelah intervensi. Terdapat peningkatan status gizi pada kedua kelompok perlakuan.

Hasil uji *paired t-test* pada variable status gizi kelompok kasus sebelum dan setelah intervensi terdapat angka ($\rho=0.000$) karena nilai $p<0.05$ maka dianggap terdapat perbedaan pada nilai rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap status gizi siswa gizi kurang pada kelompok kasus”. Sedangkan pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji *paired t-test* pada variable status gizi sebelum dan setelah intervensi terdapat angka ($\rho=0.100$) karena nilai $p>0.05$ maka dianggap tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Maka dapat disimpulkan bahwa “tidak ada pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung terhadap status gizi siswa gizi kurang pada kelompok kontrol”. Hal ini disebabkan oleh peningkatan rata-rata berat badan pada kelompok kontrol yang lebih kecil sehingga kurang berpengaruh terhadap peningkatan status gizi pada anak gizi kurang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tanziha 2013) yang menyatakan bahwa “ada perbedaan signifikan pada rata-rata status gizi siswa antara sebelum dan sesudah intervensi pemberian kudapan”.

Berdasarkan perhitungan nilai z-score pada tiap responden, masih terdapat 2 responden anak sekolah gizi kurang yang mengalami penurunan status gizi antara sebelum dan setelah pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun, hal tersebut disebabkan karena menurunnya asupan energi dan protein serta konsumsi prodak yang lebih kecil daripada responden yang lainnya. Dilihat dari jumlah energi kedua responden setelah intervensi yaitu 714.10 dan 715.25

kkal. serta konsumsi otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun yaitu 45.06 dan 45.7 gram yang menandakan bahwa pada kedua responden hanya mendapatkan tambahan energi sebesar 38.81 dan 39.37 kkal setelah intervensi 30 hari. Hal tersebut disebabkan oleh masih tingginya kebiasaan jajan pada anak yang mengakibatkan kurangnya asupan sehari-hari serta konsumsi prodak.

Pada kedua kelompok perlakuan, walaupun terjadi peningkatan status gizi kearah status gizi yang baik pada kedua kelompok, namun kedua kelompok tersebut masih terdapat dalam kategori gizi kurang hal ini terlihat dari nilai rata-rata status gizi pada kelompok kasus setelah intervensi yaitu -2.57 dan pada kelompok kontrol setelah intervensi yaitu -2.39. nilai rata-rata status gizi tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok masih berada pada kisaran angka <-2 SD yang menunjukkan bahwa kedua kelompok masih dalam kategori gizi kurang.

Hal ini disebabkan karena status gizi adalah variabel terikat yang tidak konstan, sehingga amatlah penting mempertimbangkan durasi (lama) pemberian makanan tambahan pada anak. Efek perubahan status gizi kemungkinan dapat terlihat secara signifikan jika durasi pemberian makanan tambahan lebih lama (Marsaoly, Michran 2011). Sejalan dengan pernyataan tersebut (Widodo dkk 2015) menyatakan bahwa intervensi selama 90 hari dapat meningkatkan status gizi BB/U, BB/TB, dan Kadar Albumin anak Gizi Kurang. Namun dalam penelitian ini, intervensi diberikan pada anak hanya selama 30 hari disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah bahan baku prodak intervensi yang digunakan yaitu buah lamun.

Dengan adanya pengaruh status gizi setelah pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun, maka direkomendasikan atas pemberian otak-otak ini sebagai kudapan alternatif pada siswa sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Didalam al-Qur'an telah diperintahkan agar manusia merubah diri ke arah yang lebih baik, dalam hal ini yaitu mengubah asupan makanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Rad/13:11.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾....

Terjemahnya:

„,Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.... (Depag RI 2010).

Makna dari ayat tersebut yaitu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang terlebih dahulu mengubah nasibnya. Disinilah Allah akan melihat ikhtiar hambanya. Sebagai muslim kita tidak boleh menyerah saja kepada takdir, tetapi kita percaya akan adanya takdir (Hamka 1983).

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah swt tidak akan mengubah keadaan seseorang melainkan adanya kesadaran dari diri-nya sendiri untuk berubah kearah yang lebih baik. Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu, dengan mengetahui sumber daya alam yang ada dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini yaitu ikan kembung dan buah lamun yang memiliki kandungan zat gizi yang baik khususnya zat gizi makro beserta senyawa antioksidan yang baik untuk mengatasi kejadian malnutrisi/KEP pada anak, maka diharapkan kepada masyarakat agar memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai alternatif makanan tambahan sehingga perlahan-lahan akan memberikan dampak yang bagus bagi anak yaitu mengubah status gizi anak dari status gizi kurang ke status gizi yang baik. karena perubahan status gizi kearah yang lebih baik akan terjadi apabila adanya usaha dari diri sendiri untuk merubahnya kearah yang lebih baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu :

1. Frekuensi pemberian yang hanya dilakukan 1 kali/hari sehingga kurang tercapainya konsumsi produk yang maksimal pada anak.
2. Adanya keterbatasan peneliti untuk mengontrol faktor lain yang memengaruhi status gizi kurang pada anak sekolah.
3. Tidak dilakukannya pengukuran aktivitas pada responden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tentang pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap status gizi pada siswa gizi kurang, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, asupan protein, berat badan, dan status gizi pada siswa gizi kurang sebelum dan setelah pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun selama 30 hari.
2. Tidak terdapat pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap perubahan status gizi pada siswa gizi kurang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tentang pengaruh pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun terhadap status gizi pada siswa gizi kurang, maka ada beberapa saran yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Agar orangtua lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak mereka sehingga kualitas gizi pada anak menjadi lebih baik.
2. Diharapkan kepada pihak sekolah agar mengaktifkan kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan adanya pengawasan dari institusi kesehatan setempat sehingga dapat dilakukan penilaian status gizi serta penyuluhan gizi secara berkala guna dilaksanakannya upaya-upaya preventif kejadian malnutrisi pada siswa.

3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang durasi dan frekuensi yang efisien untuk pemberian intervensi otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun guna mendapat hasil yang lebih optimal.
4. Diharapkan kepada pemerintah agar membudidayakan tanaman lamun khususnya tanaman lamun dari jenis *Enhalus Acoroides* serta menjadikan otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun sebagai PMT lokal khususnya pada wilayah pesisir dan kepulauan, sehingga penyaluran PMT menjadi lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M. dan B.W., 2012. *Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahdal, M.T., 2014. Hubungan Infestasi Kecacingan Dengan Status Gizi Pada Anak SDN Cambaya di Wilayah Pesisir Kota Makassar.
- Ahmad, D. et al., 2015. Pengaruh Penambahan Karagenan Sebagai Stabilizer Terhadap Karakteristik Otak-otak Ikan Kurisi (*Nemipterus nematophorus*). *Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan*, 4, pp.1–10.
- Alfiyah, N., 2016. Analisis Kandungan Otak-otak Ikan Kembung (*Rastrelliger brachyoma*) Substitusi Buah Lamun (*Enhalus acoroides*) sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Di Masyarakat. *Skripsi*.
- Almatsier, S., 2009. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Almatsier, S., 2001. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badui, D., 2010. Analisis kadar gizi buah limun (*Enhalus acoroides*) dan hubungan anatara pengetahuan, persepsi dengan pemanfaatan buah lamun sebagai sumber makanan alternatif masyarakat desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Tesis*.
- Cahyadi, W., 2009. *Bahan Tambahan Pangan Edisi Kedu.*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depag RI, 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depdikbud, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwardi, A., 2009. *CASSAVA Solusi Pemberagaman Kemandirian Pangan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Available at: [https://books.google.co.id/books?id=krSRNyxvsgUC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=kandungan+gizi+tepung+tapioka+per+100+gram&source=bl&ots=FGGj4Jskhc&sig=OuUyalBD0glzqmtXxenlpCcBrtw&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kandungan gizi tepung tapioka per 100 gram&f=false](https://books.google.co.id/books?id=krSRNyxvsgUC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=kandungan+gizi+tepung+tapioka+per+100+gram&source=bl&ots=FGGj4Jskhc&sig=OuUyalBD0glzqmtXxenlpCcBrtw&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kandungan%20gizi%20tepung%20tapioka%20per%20100%20gram&f=false).
- DKP Suksel, 2013. *Produksi Laut*, Sulawesi Selatan: Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Effendie, M.I., 2002. *Biologi Perikanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Hamka, P.D., 1982. *Tafsir Al-Azhar Juzu 1-2-3.*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, P.D., 1984. *Tafsir Al-Azhar Juzu 7-8-9.*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, P.D., 1983. *Tafsir Al-Azhar Juzu 13-14.*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Hanafie, R., 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Hasanah, 2013. Efek umur semaian lamun *Enhalus acoroides* terhadap pertumbuhan dan sintasanya saat ditanam di Pulau Barranglombo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp.1689–1699.
- Hasyim, A.W., 2014. Pengaruh Pendekatan Bermain Terhadap Motivasi Siswa Dalam Aktivitas Pembelajaran Renang.
- Hernani dan Rahardjo, M., 2005. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan* Cetakan I., Jakarta: Penebar Swadaya.
- Indaryanto, F.R. dkk, 2014. Penyebaran Cacing Paratistik Pada Ikan Kembung. , 4(4), pp.215–220.
- Ipa, A. dan S., 2010. Status Gizi Anak Sekolah Keluarga Nelayan di SDN 40 Lumpangang Desa Biangkeke Kabupaten Bantaeng. *Media Gizi Pangan*.
- Kemenkes RI, 2013. *Riset Kesehatan Dasar 2013*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Khaira, K., 2010. Menangkal Radikal Bebas dengan Antioksidan. *Saintek*, II.
- Khomsan, A., 2004. *Ikan, Makanan Sehat dan Kaya Gizi, dalam peranan pangan dan Gizi untuk Kualitas Hidup*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kurniawati, N., 2010. *Sehat dan Cantik Alami Berkat Khasiat Bumbu Dapur I*, Bandung: Mizan Pustaka. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=FOR8AwAAQBAJ&pg=PT1&dq=bumbu+dapur&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjo1fCX-uHOAhVLs48KHb4KCT0Q6AEIJjAC#v=onepage&q=bumbu+dapur&f=false>.
- Kusumawati, H., 2015. Perbedaan Asupan Zat Gizi Makro Sebelum dan Setelah Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Bubur Instan Berbasis Ikan Gabus dan Labu Kuning Pada Balita Gizi Kurang.
- Larasati, D.A., 2011. Kajian Biologi Reproduksi Ikan Kembung Perempuan (*Rastrelliger brachysoma* Bleeker, 1851) di Perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara. *Skripsi*, p.20.
- Mabella, 2000. *Berat Badan*, Jakarta: Yudha Media.
- Mahmud, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmud, A., 2007. Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah. Available at: <http://eprints.undip.ac.id/15352/>.
- Mangando, S., 2014. Studi Rekolonisasi Lamun di Pulau Barrang Lombo. *Skripsi*, p.18.

- Marsaoly, Michran, dkk, 2011. Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (Telur Rebus dan Bubur Kacang Hijau) Terhadap Status Gizi Anak Sekolah.
- Mastuti, T.S. & Handayani, R., 2013. Senyawa Kimia Penyusun Ekstrak Ethyl Asetat dari Daun Pisang Batu dan Ambon Hasil Distilasi Air.
- Moehji, S., 2003. *Penanggulangan Gizi Buruk*, Jakarta: Papas Sinar Siranti.
- NHANES, 2016. *Health E-Stats*,
- Notoatmodjo, S., 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ode, L. et al., 2012. Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Terhadap Status Gizi Siswa SD Inpres 2 Pannampu.
- Pangestyuty, A., 2016. *Uji Aktivitas Antioksidan dan Penetapan Kadar Fenolik Total Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanol*. Universitas Sanata Dharma.
- Patiri, J., 2013. *Sintasan dan pertumbuhan semaian lamun*,
- Sabir, M.D.M.A., 2014. *Pandangan Kesehatan Dalam Islam (Suatu Pendekatan Hadis)* I. S. Aisyah, ed., Makassar: Alauddin University Press.
- Salamah, E. dkk, 2004. Studi Tentang Asam Lemak Omega-3 dari Bagian-bagian Tubuh Ikan Kembung Laki-laki (*Rastrelliger kanagurta*). , VIII No,II.
- Sayuti, K.P.D.I. & Yenrina, R.D.I., 2015. *Antioksidan, Alami dan Sintetik I*, Padang: Andalas University Press.
- Shihab, M.Q., 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekirman, 2002. *Ilmu Gizi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta.
- Sumardika, I.W. dan I.M.J., 2012. Ekstrak Air Daun Ubi Jalar Ungu Memperbaiki Profil Lipid dan Meningkatkan Kadar SOD darah Tikus yang diberi Makanan Kolesterol.
- Supariasa, N. dkk, 2002. *Penilaian Status Gizi Revisi.*, Jakarta: Kedokteran EGC.
- Suriani Rauf, 2007. *Pengaruh Pemberian Abon Ikan Terhadap Perubahan Status Gizi Anak Gizi Kurang Umur 24-59 Bulan*. UNDIP.
- Suwarso, T.E. dan T.H., 2015. Biologi Reproduksi dan Dugaan Pemijahan Ikan Kembung (*Rastrelliger Brachysoma*) di Pantai Utara Jawa. , 7(April), pp.9–16.

- Syamsiah, I. dan T., 2003. *Khasiat dan Manfaat Bawang Putih*, Jakarta: Agromedia. Available at: [https://books.google.co.id/books?id=cpUhb8Ab8soC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=syamsiah+manfaat+bawang+putih&source=bl&ots=XInIWcwTUw&sig=eQeOcSRWmg9DsWzPZcn0EoIj478&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=syamsiah manfaat bawang putih&f=false](https://books.google.co.id/books?id=cpUhb8Ab8soC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=syamsiah+manfaat+bawang+putih&source=bl&ots=XInIWcwTUw&sig=eQeOcSRWmg9DsWzPZcn0EoIj478&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=syamsiah%20manfaat%20bawang%20putih&f=false).
- Syarfaini, 2012. *Dasar-dasar Ilmu Gizi*, Makassar: Alauddin University Press.
- Tanziha, I. dkk, 2013. Pengaruh Pemberian Kudapan Terhadap Status Gizi dan Status Anemi Siswa SDN Pasanggrahan 2 Purwakarta. *ekologia*, 13(1), pp.24–32.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin Press.
- Widodo dkk, S. dkk, 2015. Perbaikan Status Gizi Anak Balita dengan Intervensi Biskuit Berbasis Blondo, Ikan Gabus dan Beras Merah. *Gizi Pangan*, 10(2), pp.85–92.
- Winarsi, dr. H., 2007. *Antioksidan Alami & Radikal Bebas*, Yogyakarta: Kanisius. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AIC1KQ2Oaj0C&oi=fnd&pg=PA5&dq=antioksidan&ots=F0ebY-777Z&sig=YB5u3TQp7cQdnlhDQC8AwkN2BnI&redir_esc=y#v=onepage&q=antioksidan&f=false.
- Winarti, S., 2010. *Makanan Fungsional*, Yogyakarta.
- Zulaihah, L.W., 2006. Hubungan Kecukupan Asam Eikosapentanoat (EPA), Asam Dokosaheksanoat (DHA) Ikan dan Status Gizi dengan Prestasi belajar siswa. , 1, pp.15–25.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

PENGARUH PEMBERIAN OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG SUBSTITUSI BUAH LAMUN TERHADAP STATUS GIZI PADA SISWA GIZI KURANG DI SDN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orangtua/wali siswa :

Nama Siswa :

Tanggal lahir : / /20

Alamat :

Memberi izin pada siswa yang nama-nya tertera diatas untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh NISRINA NADHIFAH A, dari Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dalam penelitian ini ada perubahan/keberatan menjadi responden dapat mengajukan pengunduran diri.

Makassar,2016

Mengetahui/menyetujui,

Orangtua/Wali Responden

(.....)

Lampiran 2

KUESIONER IDENTITAS RESPONDEN

PENGARUH PEMBERIAN OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG SUBSTITUSI BUAH LAMUN TERHADAP STATUS GIZI PADA SISWA GIZI KURANG DI SDN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR 2016

Tanggal Wawancara :

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Orangtua : Ayah , Ibu
2. Pekerjaan Orangtua : Ayah , Ibu
3. Nama Siswa :
4. Tanggal Lahir : / /20
5. Jenis Kelamin :
6. Kelas :
7. Alamat :
8. Nomor telp :

II. DATA RESPONDEN

1. Riwayat penyakit* :
2. Konsumsi Obat cacing* : ** YA TIDAK
3. Telah Menerima PMT : ** YA TIDAK
4. Berat Badan : kg

*Selama 6 (enam) bulan terakhir

** (Centang salah satu pada kotak yang tersedia)

Lampiran 3

LEMBAR *FOOD RECALL* 24 JAM

PENGARUH PEMBERIAN OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG SUBSTITUSI BUAH LAMUN TERHADAP STATUS GIZI PADA SISWA GIZI KURANG DI SDN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR 2016

Nama Siswa :

Umur : (Tahun)

Pengukuran hari / minggu ke : / Tanggal :
...../...../2016

Waktu Makan	Nama Masakan/ Metode Pemasakan	Nama Bahan Makanan	Berat (URT)	Berat (g)	Ket
Pagi					
Selingan					
Siang					
Selingan					
Malam					

Lampiran 4

FORM DATA PENGUKURAN ANTROPOMETRI

PENGARUH PEMBERIAN OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG SUBSTITUSI
BUAH LAMUN TERHADAP STATUS GIZIPADA SISWA GIZI KURANG DI
SDN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR 2016

NamaSiswa :

Pengukuran ke:	Hari / Tanggal Pengukuran	Jenis Pengukuran
		BB (kg)

Lampiran 5

**FORM PEMANTAUAN KONSUMSI OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG
(KATOMBO) SUBSTITUSI BUAH LAMUN**

No	Hari/tanggal	Total yang dikonsumsi (gram)	Keterangan (masalah)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

**FORM PEMANTAUAN KONSUMSI OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG
(KATOMBO)**

No	Hari/tanggal	Total yang dikonsumsi (gram)	Keterangan (masalah)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Lampiran 6

Cara Pembuatan otak-otak Ikan Kembung Buah Lamun dan Otak-otak Ikan Kembung

1. Cara Pembuatan otak-otak Ikan Kembung Buah Lamun dalam 100 gram

Alat:

- a. Timbangan kue digital
- b. Pinset
- c. Panci Kukus
- d. Baskom
- e. Pisau
- f. Gunting
- g. Blender
- h. Kompor
- i. Talenan

Bahan:

- a. Ikan Kembung 75 g
- b. Buah Lamun 25 g
- c. Tepung Tapioka 35 g
- d. Merica bubuk 1 g
- e. Bawang Putih 5 g
- f. Bawang Merah 7 g
- g. Putih telur 1 butir
- h. Santan 15 mL
- i. Daun pisang (sebagai pembungkus)

Prosedur Pembuatan:

- a. Membuat pola daun pisang yang akan digunakan sebagai wadah pembungkus otak-otak
- b. Ikan kembung dibersihkan dari tulang kemudian difillet dicuci dan dihaluskan menggunakan blender selama 30 detik
- c. Buah lamun dibersihkan dari kulit kemudian dicuci lalu dicincang kasar menggunakan pisau
- d. Campurkan ikan dan buah lamun dalam satu wadah lalu diaduk. Kemudian tambahkan putih telur, santan dan bumbu (bawang merah dan bawang putih) yang telah dihaluskan lalu aduk lagi hingga adonan rata
- e. Tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit
- f. Setelah semua bahan telah tercampur dengan sempurna kemudian tuangkan sedikit demi sedikit adonan ke dalam daun pisang
- g. Setelah dibungkus kemudian dikukus selama 25 menit.
- h. Setelah dikukus kemudian otak-otak dipanggang dalam waktu singkat.

2. Cara Pembuatan otak-otak Ikan Kembung dalam 100 gram**Alat:**

- a. Timbangan kue digital
- b. Pinset
- c. Panci Kukus
- d. Baskom
- e. Pisau
- f. Gunting
- g. Blender
- h. Kompor
- i. Talenan

Bahan:

- a. Ikan Kembung 100 g
- b. Tepung Tapioka 35 g
- c. Merica bubuk 1 g
- d. Bawang Putih 5 g
- e. Bawang Merah 7 g
- f. Putih telur 1 butir
- g. Santan 15 mL
- h. Daun pisang (sebagai pembungkus)

Prosedur Pembuatan:

- a. Membuat pola daun pisang yang akan digunakan sebagai wadah pembungkus otak-otak
- b. Ikan kembung dibersihkan dari tulang kemudian difillet dicuci dan dihaluskan menggunakan blender selama 30 detik
- c. Masukkan ikan dalam satu wadah lalu diaduk. Kemudian tambahkan putih telur, santan dan bumbu (bawang merah dan bawang putih) yang telah dihaluskan lalu aduk lagi hingga adonan rata
 - i. Tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit
 - j. Setelah semua bahan telah tercampur dengan sempurna kemudian tuangkan sedikit demi sedikit adonan ke dalam daun pisang
 - k. Setelah dibungkus kemudian dikukus selama 25 menit.
 - l. Setelah dikukus kemudian otak-otak dipanggang dalam waktu singkat.

Lampiran 7

HASIL *RECALL* 24 JAM DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI *NUTRI SURVEY* 2007

Recall pertama sebelum intervensi

Food	Amount	kcal	water	protein	fat	carbohyd	choleste	Vit. A	carotene	calcium	iron	zinc
1 PAGI												
2 nasi putih kukus	60	78.0		1.4	0.1	17.2	0.0	0.0		1.8	0.1	0.2
3 mie sedaap	45.5	205.0		4.0	8.0	29.0						
4												
5 SIANG												
6 nasi putih kukus	60	78.0		1.4	0.1	17.2	0.0	0.0		1.8	0.1	0.2
7 cumi-cumi segar	32	47.0		8.0	0.7	1.6	119.4	2.6		16.3	0.4	0.8
8												
9 SELINGAN												
10 krupuk asin	20	87.2		1.4	2.7	14.1	0.0	0.0		2.2	0.2	0.1
11 biskuit goriorio	1	40.0		0.5	1.0	5.5				10.0		
12												
13 MALAM												
14 nasi putih kukus	120	156.0		2.9	0.2	34.3	0.0	0.0		3.6	0.2	0.5
15 cumi-cumi segar	32	47.0		8.0	0.7	1.6	119.4	2.6		16.3	0.4	0.8
16 udang segar	15	11.9		2.5	0.1	0.0	23.4	7.7		4.7	0.4	0.2
17												
18 SELINGAN MALAM												
19 teh	2	1.0		0.0	0.0	0.2	0.0	0.0		2.0	0.0	0.0
20 gula pasir	20	77.4		0.0	0.0	20.0	0.0	0.0		0.2	0.0	0.0
21 biscuit roma	16	68.9		1.2	1.6	12.6	2.1	8.0		17.8	0.1	0.1
22												
23												
24												

Total analysis:
 energy 897.5 kcal
 water - g
 protein (14%) 31.4 g
 fat (15%) 15.4 g
 carbohydr. (70%) 153.2 g
 cholesterol 204.2 mg
 Vit. A 20.8 ug
 carotene - mg
 calcium 76.7 mg
 iron 1.9 mg
 zinc 3.0 mg

Recall kedua sebelum intervensi

Food	Amount	kcal	water	protein	fat	carbohyd	choleste	Vit. A	carotene	calcium	iron	zinc
1 PAGI												
2 kue kembang-kembang	16	30.1		0.4	0.7	5.7	0.0	0.0		0.6	0.1	0.1
3												
4 SELINGAN												
5 martabak manis	41	91.0		1.0	7.0	6.2	34.8	15.6		4.1	0.1	0.1
6 minuman teh gelas	185.4	70.0		0.0	0.0	18.0						
7												
8 SIANG												
9 nasi putih kukus	60	78.0		1.4	0.1	17.2	0.0	0.0		1.8	0.1	0.2
10 ikan kembung goreng	40	80.8		6.4	6.0	0.0	23.6	2.4		14.4	0.4	0.5
11 intermie	10	46.2		0.8	2.0	6.3						
12												
13 MALAM												
14 nasi putih kukus	60	78.0		1.4	0.1	17.2	0.0	0.0		1.8	0.1	0.2
15 mie sedaap	91	410.0		8.0	16.0	58.0						
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												

Total analysis:
 energy 884.1 kcal
 water - g
 protein (9%) 19.4 g
 fat (32%) 31.9 g
 carbohydr. (59%) 128.5 g
 cholesterol 58.4 mg
 Vit. A 18.0 ug
 carotene - mg
 calcium 22.7 mg
 iron 0.9 mg
 zinc 1.1 mg

Recall pertama setelah intervensi

NutriSurvey for Windows - D:\dhifa\SKRIPSI\data RECALL\CASE SETELAH\1.arya hari 1.epl

File Edit Calculations Food Extras Help

Children 7-9 years DGE2000 Portion 1 Days

Food	Amount	kcal	water	protein	fat	carbohyd	choleste	Vit. A	carotene	calcium	iron	zinc
1 PAGI												
2 kue bolu kukus	30	62.1		1.3	0.6	12.9	21.6	9.6		3.6	0.2	0.1
3												
4 SELINGAN												
5 otak-otak LAMUN LAB	100	86.5		6.4	0.3	14.5				0.1	0.0	
6 minuman ale-ale	206	69.9		0.0	0.0	17.0						
7												
8 SIANG												
9 Nasi Kuning	60	200.8		4.0	0.9	43.5	0.0	21.0		28.8	1.9	0.7
10 tahu	20	15.2		1.6	1.0	0.4	0.0	0.0		21.0	1.1	0.2
11 tempe oreg/sayur tempe/sambal	10	10.0		1.0	0.4	0.9	0.0	1.6		5.0	0.1	0.1
12 mie basah	10	14.1		0.5	0.1	2.8	0.0	0.0		0.7	0.1	0.1
13 telur ayam	30	46.5		3.8	3.2	0.3	127.2	57.0		15.0	0.4	0.3
14 daging ayam bagian paha	50	107.0		10.1	7.1	0.0	29.5	14.5		5.0	0.6	0.7
15												
16 SELINGAN												
17 bakso pentol	34	125.8		8.0	10.2	0.0	35.4	3.4		2.0	0.5	1.3
18 minuman marimas	1	30.0		0.0	0.0	8.0						
19												
20 MALAM												
21 mie sedaap	91	410.0		8.0	16.0	58.0						
22												
23												

Display options: TA A% FA MA NC

Total analysis:

- energy 1177.9 kcal
- water - g
- protein (15%) 44.6 g
- fat (35%) 39.7 g
- carbohydr. (55%) 158.3 g
- cholesterol 213.7 mg
- Vit. A 107.1 mg
- carotene - mg
- calcium 81.3 mg
- iron 4.7 mg
- zinc 3.4 mg

Recall kedua setelah intervensi

NutriSurvey for Windows - D:\dhifa\SKRIPSI\data RECALL\CASE SETELAH\1.arya hari 2.epl

File Edit Calculations Food Extras Help

Children 7-9 years DGE2000 Portion 1 Days

Food	Amount	kcal	water	protein	fat	carbohyd	choleste	Vit. A	carotene	calcium	iron	zinc
1 PAGI												
2 kue kambing-kambeng	32	60.2		0.7	1.3	11.4	0.0	0.0		1.3	0.2	0.1
3 biskuit goriorio	2	80.1		1.0	2.0	11.0				20.0		
4 otak-otak LAMUN LAB	100	86.5		6.4	0.3	14.5				0.1	0.0	
5												
6 SIANG												
7 nasi putih kukus	120	156.0		2.9	0.2	34.3	0.0	0.0		3.6	0.2	0.5
8 sayur bayam jagung	15	5.6		0.2	0.1	1.2	0.0	25.2		4.2	0.1	0.0
9 tempeh goreng	100	337.0		19.0	23.7	17.0	0.0	1.0		93.0	2.3	1.8
10												
11 SELINGAN												
12 pisang goreng	30	47.4		0.3	3.1	5.3	0.0	1.8		1.2	0.1	0.1
13 coklat	10	47.7		0.4	3.0	6.3	0.0	0.2		3.2	0.3	0.2
14												
15 MALAM												
16 nasi putih kukus	90	117.0		2.2	0.2	25.7	0.0	0.0		2.7	0.2	0.4
17 telur dadar	60	112.1		6.9	8.8	0.7	229.2	104.4		30.6	0.7	0.6
18												
19												
20												
21												
22												
23												

Display options: TA A% FA MA NC

Total analysis:

- energy 1049.6 kcal
- water - g
- protein (15%) 39.9 g
- fat (36%) 42.8 g
- carbohydr. (49%) 127.5 g
- cholesterol 229.2 mg
- Vit. A 132.6 mg
- carotene - mg
- calcium 159.9 mg
- iron 4.1 mg
- zinc 3.6 mg

Lampiran 9

DOKUMENTASI PENELITIAN

Otak-Otak ikan kembung substitusi Buah Lamun dan Otak-otak ikan kembung yang diintervensikan kepada Anak Sekolah Gizi Kurang



Penimbangan Berat Badan





Pengisian Formulir persetujuan menjadi responden penelitian



Wawancara Recall 24 jam



Pemberian otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung





Lampiran 10

MASTER TABEL

	KLP	JK	TK	Umur	PA	PI	AESebelum	AESetelah	APSebelum	APSetelah	BBSebelum	BBSetelah	SGSebelum	SGSetelah
1	case	laki-laki	Kelas 1	7 tahun	Nelayan	IRT	890.80	1113.75	25.40	42.25	16.00	16.80	-2.85	-2.52
2	case	perempuan	Kelas 1	7 tahun	Wiraswasta	IRT	562.30	825.85	19.45	42.40	15.50	16.50	-2.74	-2.32
3	case	laki-laki	Kelas 1	7 tahun	Nelayan	IRT	771.90	854.90	29.35	31.85	16.70	17.40	-2.88	-2.60
4	case	perempuan	Kelas 2	7 tahun	Wiraswasta	IRT	790.35	714.10	20.30	20.40	16.90	16.70	-2.55	-2.71
5	case	perempuan	Kelas 2	8 tahun	Buruh	IRT	773.20	936.05	25.60	32.40	17.40	18.00	-2.75	-2.57
6	case	perempuan	Kelas 2	7 tahun	Wiraswasta	IRT	646.00	884.15	28.80	34.55	15.80	16.50	-2.57	-2.31
7	case	perempuan	Kelas 2	7 tahun	Wiraswasta	IRT	759.40	827.30	26.85	30.85	16.40	17.00	-2.61	-2.41
8	case	laki-laki	Kelas 2	7 tahun	Buruh	IRT	798.45	861.60	26.10	26.55	16.80	17.20	-2.91	-2.79
9	case	laki-laki	Kelas 3	8 tahun	Nelayan	IRT	979.95	1163.55	27.90	48.85	19.10	19.90	-2.71	-2.44
10	case	laki-laki	Kelas 3	8 tahun	Buruh	IRT	795.05	1065.40	31.15	37.05	18.70	20.00	-2.91	-2.42
11	case	laki-laki	Kelas 3	9 tahun	Nelayan	IRT	872.85	939.70	35.80	48.25	19.40	20.20	-2.83	-2.56
12	case	laki-laki	Kelas 3	8 tahun	Buruh	Wiraswasta	968.75	1089.75	29.80	32.95	18.50	19.20	-2.88	-2.64
13	case	perempuan	Kelas 4	8 tahun	Buruh	IRT	826.45	921.60	28.15	29.15	18.40	18.70	-2.84	-2.79
14	case	laki-laki	Kelas 4	9 tahun	Nelayan	IRT	640.90	715.25	22.65	33.65	20.10	20.20	-2.96	-2.98
15	case	perempuan	Kelas 4	8 tahun	Buruh	IRT	672.15	735.45	22.85	32.70	19.10	19.80	-2.60	-2.41
16	case	perempuan	Kelas 4	8 tahun	Buruh	IRT	684.30	785.70	24.05	34.15	18.10	18.90	-2.90	-2.65
17	case	perempuan	Kelas 4	9 tahun	Wiraswasta	IRT	802.10	967.90	36.50	46.60	19.90	21.10	-2.97	-2.61
18	case	perempuan	Kelas 4	9 tahun	Nelayan	IRT	973.85	1174.25	31.30	42.10	20.50	20.90	-2.72	-2.66
19	control	laki-laki	Kelas 1	7 tahun	Nelayan	IRT	927.90	1029.15	29.45	43.20	18.00	18.40	-2.22	-2.12
20	control	laki-laki	Kelas 1	7 tahun	Nelayan	IRT	807.00	830.15	23.30	36.25	17.30	17.50	-2.35	-2.33
21	control	laki-laki	Kelas 2	7 tahun	Buruh	IRT	828.60	845.80	32.70	33.65	17.20	17.50	-2.41	-2.34
22	control	laki-laki	Kelas 2	7 tahun	Nelayan	IRT	1065.95	1126.70	35.30	51.00	17.70	18.30	-2.59	-2.38
23	control	laki-laki	Kelas 2	7 tahun	Buruh	IRT	822.20	835.50	35.25	44.90	17.00	16.90	-2.54	-2.67

Otak-otak Ikan Kembung (*Rastrelliger brachysoma*)

NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	RATA-RATA
ARD	40	100	100	21	50	100	51	67	60	100	100	100	53	50	62	64	60	57	49	61	65	58	76	70	80	100	85	100	100	93	72.4
MRV	40	46	71	55	60	47	40	33	30	50	52	50	49	60	57	43	7	26	52	59	58	51	48	53	55	50	73	60	36	82	49.76
IPN	17	25	54	57	100	50	58	51	35	51	50	60	58	50	27	32	51	65	49	53	73	34	52	41	39	57	65	47	43	91	51.16
MR	20	40	50	100	100	77	100	100	100	100	100	100	92	100	55	69	100	92	97	82	100	91	90	82	75	50	79	100	100	100	84.7
RZS	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	56	52	5	0	0	9	16	20	51	60	92	98	100	93	100	100	100	73.4
MS	30	28	40	20	22	50	100	92	86	100	100	100	100	82	89	100	67	51	31	50	47	56	52	49	61	72	89	100	100	100	68.8
SZ	17	30	52	82	59	100	100	100	100	100	90	50	51	100	90	50	53	89	49	69	80	53	62	64	70	75	79	60	47	89	70.33
WNR	23	65	64	100	100	72	50	56	50	100	100	100	95	50	67	92	100	92	95	90	75	93	82	89	93	97	89	100	100	100	82.63
AR	27	52	48	10	20	24	7	10	20	50	50	53	46	41	33	26	42	38	41	57	52	48	41	54	49	51	53	46	39	64	39.73
WR	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	100	100	100	71	89	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	96.63
RWN	50	51	52	63	57	100	52	100	90	65	58	89	100	100	100	100	100	100	94	81	96	86	91	95	94	89	84	100	100	100	84.56
HR	15	20	21	28	31	29	51	51	47	30	27	33	31	36	21	27	19	25	31	34	48	52	49	45	49	36	40	49	51	46	35.73
NV	20	25	24	68	57	50	14	33	50	51	55	63	57	60	40	47	53	52	48	50	58	40	46	43	45	39	43	40	53	51	45.83
AK	27	51	64	62	65	62	70	71	69	65	63	58	61	82	83	86	74	80	79	82	100	91	87	68	73	65	92	100	73	100	73.43
LIP	2	6	4	10	17	50	15	22	24	20	50	35	20	67	20	49	48	40	37	51	65	42	33	21	15	4	20	49	11	57	30.13
MLD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	89	100	100	62	67	100	51	87	93	75	48	72	100	58	100	89.83
NFDL	20	31	31	33	29	28	53	47	45	42	47	50	49	55	57	54	48	51	39	40	52	53	60	61	59	70	76	82	73	78	50.43
RA	6	4	7	17	30	32	50	35	49	50	54	80	76	71	53	55	47	21	6	10	32	21	35	51	49	42	53	47	31	42	38.53
r																															63.22

Lampiran 12

HASIL ANALISIS SPSS

KELOMPOK KASUS

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	8	44.4	44.4
	perempuan	10	55.6	100.0
	Total	18	100.0	100.0

Tingkatan Kelas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kelas 1	3	16.7	16.7
	Kelas 2	5	27.8	44.4
	Kelas 3	4	22.2	66.7
	Kelas 4	6	33.3	100.0
	Total	18	100.0	100.0

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7 tahun	7	38.9	38.9
	8 tahun	7	38.9	77.8
	9 tahun	4	22.2	100.0
	Total	18	100.0	100.0

Pekerjaan Ayah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nelayan	6	33.3	33.3
	Wiraswasta	5	27.8	61.1
	Buruh	7	38.9	100.0
	Total	18	100.0	100.0

Pekerjaan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	17	94.4	94.4
	Wiraswasta	1	5.6	100.0
	Total	18	100.0	100.0

KELOMPOK KONTROL

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	11	61.1	61.1	61.1
	perempuan	7	38.9	38.9	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

Tingkatan Kelas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kelas 1	2	11.1	11.1	11.1
	Kelas 2	6	33.3	33.3	44.4
	Kelas 3	4	22.2	22.2	66.7
	Kelas 4	6	33.3	33.3	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7 tahun	7	38.9	38.9	38.9
	8 tahun	6	33.3	33.3	72.2
	9 tahun	5	27.8	27.8	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

Pekerjaan Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nelayan	5	27.8	27.8	27.8
	Wiraswasta	4	22.2	22.2	50.0
	Buruh	9	50.0	50.0	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

Pekerjaan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	17	94.4	94.4	94.4
	Wiraswasta	1	5.6	5.6	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

UJI NORMALITAS

SEBELUM INTERVENSI

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Asupan Energi	.179	36	.005	.945	36	.075
Asupan Protein	.078	36	.200 [*]	.962	36	.240
Berat Badan	.089	36	.200 [*]	.966	36	.328
Status Gizi	.117	36	.200 [*]	.949	36	.097

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

SETELAH INTERVENSI

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Asupan Energi	.165	36	.014	.945	36	.073
Asupan Protein	.103	36	.200 [*]	.973	36	.523
Berat Badan	.110	36	.200 [*]	.946	36	.076
Status Gizi	.089	36	.200 [*]	.973	36	.521

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

**UJI INDEPENDENT
SEBELUM INTERVENSI**

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Asupan Energi	Case	18	789.3750	119.27343	28.11302
	Control	18	877.0250	171.40798	40.40125
Asupan Protein	Case	18	27.3333	4.67930	1.10292
	Control	18	31.6556	6.34880	1.49643
Berat Badan	Case	18	17.9611	1.56962	.36996
	Control	18	18.7556	1.72668	.40698
Status Gizi	Case	18	-2.7878	.13632	.03213
	Control	18	-2.4422	.20119	.04742

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Asupan Energi	Equal variances assumed	2.649	.113	-1.781	34	.084	-87.65000	49.21994	-187.67696	12.37696
	Equal variances not assumed			-1.781	30.336	.085	-87.65000	49.21994	-188.12384	12.82384
Asupan Protein	Equal variances assumed	1.229	.275	-2.325	34	.026	-4.32222	1.85896	-8.10008	-.54436
	Equal variances not assumed			-2.325	31.261	.027	-4.32222	1.85896	-8.11231	-.53213
Berat Badan	Equal variances assumed	.530	.472	-1.444	34	.158	-.79444	.55001	-1.91219	.32330
	Equal variances not assumed			-1.444	33.695	.158	-.79444	.55001	-1.91256	.32368
Status Gizi	Equal variances assumed	1.582	.217	-6.033	34	.000	-.34556	.05728	-.46196	-.22915
	Equal variances not assumed			-6.033	29.892	.000	-.34556	.05728	-.46256	-.22855

SETELAH INTERVENSI

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Asupan Energi	Case	18	920.9028	148.95456	35.10893
	Control	18	925.1083	200.98427	47.37245
Asupan Protein	Case	18	35.9278	7.72055	1.81975
	Control	18	40.1306	6.93633	1.63491
Berat Badan	Case	18	18.6111	1.61241	.38005
	Control	18	19.0611	1.90205	.44832
Status Gizi	Case	18	-2.5772	.17636	.04157
	Control	18	-2.3922	.24014	.05660

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Asupan Energi	Equal variances assumed	2.013	.165	-.071	34	.944	-4.20556	58.96427	-124.03537	115.62426
	Equal variances not assumed			-.071	31.347	.944	-4.20556	58.96427	-124.41009	115.99897
Asupan Protein	Equal variances assumed	.175	.679	-1.718	34	.095	-4.20278	2.44631	-9.17427	.76872
	Equal variances not assumed			-1.718	33.617	.095	-4.20278	2.44631	-9.17636	.77080
Berat Badan	Equal variances assumed	.312	.580	-.766	34	.449	-.45000	.58773	-1.64441	.74441
	Equal variances not assumed			-.766	33.112	.449	-.45000	.58773	-1.64559	.74559
Status Gizi	Equal variances assumed	2.282	.140	-2.634	34	.013	-1.18500	.07023	-.32772	-.04228
	Equal variances not assumed			-2.634	31.206	.013	-1.18500	.07023	-.32819	-.04181

UJI PAIRED
NORMALITAS

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Asupan Energi Case Sebelum	.124	18	.200 [*]	.956	18	.524
Asupan Energi Case Setelah	.116	18	.200 [*]	.939	18	.276
Asupan Energi Control Sebelum	.222	18	.019	.917	18	.116
Asupan Energi Control Setelah	.244	18	.006	.916	18	.111
Asupan Protein Case Sebelum	.087	18	.200 [*]	.974	18	.862
Asupan Protein Case Setelah	.182	18	.119	.949	18	.416
Asupan Protein Control Sebelum	.116	18	.200 [*]	.947	18	.385
Asupan Protein Control Setelah	.115	18	.200 [*]	.973	18	.859
Berat Badan Case Sebelum	.139	18	.200 [*]	.951	18	.442
Berat Badan Case Setelah	.163	18	.200 [*]	.905	18	.070
Berat Badan Control Sebelum	.225	18	.017	.897	18	.052
Berat Badan Control Setelah	.172	18	.172	.920	18	.127
Status Gizi Case Sebelum	.177	18	.140	.917	18	.113
Status Gizi Case Setelah	.115	18	.200 [*]	.965	18	.697
Status Gizi Case Sebelum	.119	18	.200 [*]	.973	18	.856
Status Gizi Case Setelah	.149	18	.200 [*]	.951	18	.447

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

ASUPAN ENERGI

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Asupan Energi Case Sebelum	789.3750	18	119.27343	28.11302
	Asupan Energi Case Setelah	920.9028	18	148.95456	35.10893
Pair 2	Asupan Energi Control Sebelum	877.0250	18	171.40798	40.40125
	Asupan Energi Control Setelah	925.1083	18	200.98427	47.37245

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Asupan Energi Case Sebelum -	-131.52778	89.02687	20.98384	-175.79980	-87.25576	-6.268	17	.000
	Asupan Energi Case Setelah								
Pair 2	Asupan Energi Control Sebelum -	-48.08333	40.08540	9.44822	-68.01733	-28.14933	-5.089	17	.000
	Asupan Energi Control Setelah								

ASUPAN PROTEIN

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Asupan Protein Case Sebelum	27.3333	18	4.67930	1.10292
	Asupan Protein Case Setelah	35.9278	18	7.72055	1.81975
Pair 2	Asupan Protein Control Sebelum	31.6556	18	6.34880	1.49643
	Asupan Protein Control Setelah	40.1306	18	6.93633	1.63491

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Asupan Protein Case Sebelum - Asupan Protein Case Setelah	-8.59444	6.69130	1.57715	-11.92195	-5.26694	-5.449	17	.000
Pair 2	Asupan Protein Control Sebelum - Asupan Protein Control Setelah	-8.47500	6.35458	1.49779	-11.63506	-5.31494	-5.658	17	.000

BERAT BADAN

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Berat Badan Case Sebelum	17.9611	18	1.56962	.36996
	Berat Badan Case Setelah	18.6111	18	1.61241	.38005
Pair 2	Berat Badan Control Sebelum	18.7556	18	1.72668	.40698
	Berat Badan Control Setelah	19.0611	18	1.90205	.44832

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Berat Badan Case Sebelum - Berat Badan Case Setelah	-.65000	.36178	.08527	-.82991	-.47009	-7.623	17	.000
	Pair 2	Berat Badan Control Sebelum - Berat Badan Control Setelah	-.30556	.31524	.07430	-.46232	-.14879	-4.112	17

STATUS GIZI

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Status Gizi Case Sebelum	-2.7878	18	.13632	.03213
	Status Gizi Case Setelah	-2.5772	18	.17636	.04157
Pair 2	Status Gizi Case Sebelum	-2.4422	18	.20119	.04742
	Status Gizi Case Setelah	-2.3922	18	.24014	.05660

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Status Gizi Case Sebelum -	-.21056	.15791	.03722	-.28908	-.13203	-5.657	17	.000
	Status Gizi Case Setelah								
Pair 2	Status Gizi Case Sebelum -	-.05000	.12204	.02877	-.11069	.01069	-1.738	17	.100
	Status Gizi Case Setelah								



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI CAMBAYA
KELURAHAN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH
Jl. Barukang Utara No.60 Kode Pos 90162
NSS : 101 196 000 100 / NPSN : 40312083

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/018/SDN.CBY-UT/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Cambaya Menerangkan bahwa :

Nama : NISRINA NADHIFA ARSYAD
Tempat Tgl Lahir : Ujung Pandang, 14 Mei 1994
NIM : 70200112083 / Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No.63, Makassar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Makassar Nomor 070/1615/DPK/IX/2016. Tanggal, 30 September 2016. Telah selesai penelitian di SD Negeri Cambaya dalam rangka Penyusunan Skripsi, dengan Judul. "**PENGARUH PEMBERIAN OTAK- OTAK IKAN KEMBUNG SUBSTITUSI BUAH LAMUN TERHADAP STATUS GIZI PADA SISWA GIZI KURANG DI SDN CAMBAYA KEC UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016**" mulai Tanggal 10 Oktober s.d 08 November 2016.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 09 November 2016
Kepala Sekolah
SD NEGERI CAMBAYA
KEC. UJUNG TANAH
DINAS PENDIDIKAN
Dan N. Andi Muhayana
Pangkat : Pembina Tk I
Nip. 19610801 198203 2 013

RIWAYAT HIDUP

Nisrina Nadhifah Arsyad., Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 mei 1994, anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan H.M. Arsyad dan Hj. Hamsiah Hamzah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1999 di TK Melati. Pada tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan di SDN Bontokamase dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di SMAN 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi Masyarakat angkatan 2012 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.