

**ISOLASI DAN IDENTIFIKASI ANTIOKSIDAN
TERHADAP DAUN PEDADA (*Sonneratia caseolaris L.*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

NURDIA
NIM. 70100113078

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURDIA
NIM : 70100113078
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 04 juli 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Samata - Gowa
Judul : Isolasi dan identifikasi antioksidan terhadap daun pedada
(*Sonneratia caseolaris* L.)

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Agustus 2017

Penyusun,



NURDIA

NIM. 70100113078

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Isolasi dan Identifikasi Antioksidan Terhadap Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris L.*)**” yang disusun oleh **Nurdia, NIM : 70100113078**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 18 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **25 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Haeria, S.Si., M.Si	(<u>Haeria</u>)
Pembimbing I	: Muh. Fitrah., S.Si., M.Farm., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji Kompetensi	: M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji Integrasi	: Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag	(<u>Abdullah</u>)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi “Isolasi Dan Identifikasi Antioksidan Terhadap Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar setelah melalui proses yang panjang dan menapaki berbagai rintangan dalam usaha mengejar ilmu. Tak lupa pula salam dan salawat yang selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, merupakan suri tauladan yang wajib dicontoh bagi seluruh ummatnya.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahanda Amrullah dan Ibunda ST.Sudarmi, K.S.pd. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dukungan, semangat, dan do'a restu di setiap langkah ini, yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih juga penulis berikan kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian kepada penulis sehingga penulis bisa sampai menyelesaikan pendidikan di sini. Serta tak lupa juga untuk kakak ku tercinta Muh. Arham , S.pd yang telah banyak memberikan doa dan segala dukungan serta kasih sayang kepada penulis.

Rasa terima kasih penulis kepada semua pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Olehnya itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. H. Lomba Sultan, M.A., selaku Wakil Rektor II, dan Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D., selaku Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M. Kes., selaku Wakil Dekan I (Bidang Akademik), Ibu Dr. A. Susilowaty, selaku Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan) Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Haeria S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar dan Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt selaku Sekertaris Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar
6. Bapak Muh.Fitra, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pembimbing Pertama yang telah memberikan waktu luangnya untuk mengarahkan serta mengoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si, M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
8. Bapak Muh.Rusdi, S.Si, M.Si , Apt., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Abdullah., S.Ag., M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
11. Sahabat FARBION 2013, yang selama hampir empat tahun terakhir telah mengukir banyak cerita, tawa, masalah, kisah yang tak akan lekang oleh masa. Walau berbeda-beda tetap satu, paling heboh suka kepo, paling kocak tapi tetap kompak. Kebersamaan, dukungan, jasa, nasihat, cerita, curahan hati, dan gossip kalian tak terlupakan.
12. Sahabat-sahabat setiakku PSL, Ayu Setiawati irwan, Nunung, Uswa, Rina, Putri, Imma, Nita, Amirah, Resty, Andira, Kak Iccang. Jangan pernah lukai persahabatan kita dengan permasalahan apapun meski luka hati seringkali tak terhindari. Dan yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, kesabaran serta

kasih sayang yang tulus kepada penulis yang tak terhingga nilainya. Dan teman-teman selama KKN angkatan 53 Dusun Paso'tanae Desa Belabori, Parangloe.

13. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang Farmasi pada umumnya. Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan penelitian selanjutnya.

Makassar, Agustus 2017

Penulis.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Definisi Operasional	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka	10
A. Klasifikasi dan Morfolologi Tumbuhan	10
B. Metode Ekstraksi	12
C. Radikal Bebas	13
D. Antioksidan	18
E. DPPH	19
F. Vit C	20
G. Fraksinasi	21

H. Kromatografi Lapis Tipis	24
I. Isolasi	26
J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel.....	33
D. Instrumen Penelitian	33
1. Alat Penelitian.....	33
2. Bahan Penelitian	34
E. Pengolahan Dan Analisis Data	34
1. Penyiapan Sampel.....	34
2. Penyiapan Larutan	35
3. Analisis Kuantitatif.....	36
4. Analisis Data.....	37
5. Kromatografi Lapis Tipis	37
6. Fraksinasi Komponen Kimia	38
7. Identifikasi Komponen Kimia	39
8. Identifikasi Isolat Dengan Spektrofotometri IR	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	45
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Implikasi dalam penelitian	50
KEPUSTAKAAN	51
LAMPIRAN	54
RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Ekstrak.....	40
2. Hubungan Ekstrak Dengan Aktivitas Radikal Bebas Terhadap DPPH	40
3. Identifikasi KLT	41
4. Hasil fraksinasi kolom pertama.....	41
5. Hasil fraksinasi kolom kedua.....	41
6. Hubungan Fraksi Dengan Aktivitas Radikal Bebas Terhadap DPPH.....	42
7. Hubungan Antara Konsentrasi Isolat Dengan Aktivitas Radikal Bebas Terhadap DPPH.....	43
8. Hubungan Antara Konsentrasi Isolat Dengan Aktivitas Radikal Bebas Terhadap DPPH.....	43
9. Hasil Identifikasi Komponen Kimia	43
10. Hasil Identifikasi Isolat dengan Spektrofotometri IR	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tumbuhan Pedada.....	68
2. Ekstrak Daun Pedada	68
3. Kromatografi lapis tipis.....	69
4. Proses kromatografi kolom.....	70
5. Penggabungan hasil fraksi	72
6. Alat instrumen.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja Penyiapan Sampel dan Ekstraksi Sampel	52
2. Skema kerja Fraksinasi Kromatografi Kolom	54
3. Skema Kerja Penyiapan Larutan.....	55
4. Skema Kerja Pengukuran Absorbansi.....	56
5. Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa	57
6. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Isolat.....	61
7. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Vit C.....	62
8. Perhitungan Penyiapan Larutan DPPH.....	63
9. Perhitungan % penghambatan untuk uji antioksidan pada ekstrak dan isolat dengan menggunakan DPPH.....	64
10. Perhitungan Absorbansi.....	65
11. Perhitungan Nilai IC ₅₀	67
12. Gambar Penelitian.....	68

ABSTRAK

Nama : Nurdia
NIM : 70100113078
Judul : “ Isolasi dan Identifikasi Antioksidan Terhadap Daun Pedada
(*Sonneratia caseolaris* L.)

Telah dilakukan penelitian tentang isolasi dan identifikasi antioksidan terhadap daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai aktivitas perendaman radikal bebas dengan metode DPPH, dan mengetahui senyawa apa yang terdapat dari daun pedada yang memberikan efek antioksidan. Ekstraksi daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dilakukan dengan metode maserasi bertingkat menggunakan n –Heksan, etil asetat, etanol 96% dan air. Ekstrak etanol difraksi dengan menggunakan kromatografi kolom, sehingga diperoleh 12 fraksi, fraksi yang memiliki aktivitas antioksidan yang bagus diisolasi kembali dengan kromatografi kolom, kemudian diperoleh isolat, hasil identifikasi dengan spektrofotometri IR isolat tersebut diduga flavonoid. Pengujian aktivitas peredaman radikal bebas ditentukan oleh nilai IC50 dengan metode DPPH secara spektrofotometri UV-Visibel pada panjang gelombang 517 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) memiliki aktivitas peredaman radikal bebas dengan nilai IC50 45,85 ppm.

Kata Kunci : radikal bebas, DPPH, flavonoid, spektrofotometer UV-Vis, Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)

ABSTRACT

Name : Nurdia

NIM : 70100113078

Title : Isolation and antioxidants identification toward Pedada leaves
(*sonneratia caseolaris* L.)

Has done the research about Isolation and antioxidants identification toward Pedada leaves (*sonneratia caseolaris* L.). The objective of the research was to know the value of free radical submersion activity used DPPH method, and to know the compound which is contained in Pedada leaves that give antioxidants effect. The extract of pedada leaves (*sonneratia caseolaris* L.) did by high-rise macerare method used e -Heksan ,etil asetat, etanol 96% and water. Ethanol extract fractioned by using column chromatography until gain 12 fraction, fraction that has a good antioxidants activities, reisolation with column chromatography, and then gain Isolate, the result of identification with the isolate spectrophotometry IR was flavonoid. The testing of free radical submersion activity determined by the value of IC50 with DPPH method on spectrophotometry UV-Visible in a long wave 517 nm. The result of the research shows that isolat pedada leaves (*sonneratia caseolaris* L.) has free radical submersion activity with the value IC50 45,85 ppm.

Key words: free radical, flavonoid, spectrometer UV-Vis, Pedada leaves
(*sonneratia caseolaris* L.)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tubuh manusia dengan berbagai proses yang terjadi di dalamnya ternyata dapat menghasilkan suatu radikal bebas yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti peristiwa metabolisme sel normal, peradangan, polusi lingkungan, sinar ultraviolet dan asap rokok. Faktor tersebut tidak dapat terlepas begitu saja dari kehidupan, oleh karena itu dibutuhkan senyawa yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Menurut penelitian tingkat sel yang dilakukan Bruce (2005), membuktikan bahwa antioksidan mampu melindungi jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas.

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat laju oksida molekul lain atau menetralkan radikal bebas (Fajriah dkk, 2007). Tubuh kita memerlukan senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas mengingat begitu banyaknya radikal bebas yang berasal dari luar tubuh berupa makanan yang banyak mengandung bahan pengawet, pewarna, pestisida, polusi, debu dan radikal ultraviolet. Emisi kendaraan bermotor dan industri, asap rokok serta pelepasan senyawa kimia reaktif ke alam merupakan penyumbang radikal bebas yang cukup besar (Zuhra, Taringan, Sihotang, 2008).

Salah satu contoh tumbuhan mangrove yaitu daun pedada (*Sonneratia caesularis* L), tumbuh di tepi muara sungai terutama pada daerah dengan salinitas rendah dengan campuran air tawar. Tumbuhan ini mampu tumbuh hingga ketinggian dengan 5-20 meter. Daun-daunnya tunggal, berhadapan, atau memanjang. Tangkai daun pendek dan seringkali kemerahan. Bunga sendirian atau berkelompok. Benang sari sangat banyak, putih dengan pangkal kemerahan yang cepat rontok. Tangkai

putik besar dan panjang, tetap tinggal sampai lama. Buah berbiji banyak berbentuk bola pipih. Daging buahnya kekuningan, masam asin, dan berbau busuk (Sukmadi R, dkk. 2008).

Salah satu tumbuhan yang berpotensi sebagai antioksidan adalah tumbuhan pedada merah. Tumbuhan ini mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin dan fenol (Avenido, P. and Serrano, A.E. 2012).

Buah pedada memiliki 24 komponen diantaranya 8 steroid, 9 triterpenoid, dan 3 flavonoid, dan 4 turunan karboksil benzena. Diantara senyawa- senyawa tersebut senyawa triterpenoid yang memiliki kandungan paling tinggi (Minqing *et al*, 2009).

Salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu tumbuhan pedada (*Sonneratia caseolaris*). Masyarakat di Kabupaten Pangkep memanfaatkan buah pedada untuk olahan makanan. Biasanya dicampur dengan ikan masak, sambal untuk ikan bakar, bisa juga dimakan secara langsung jika buah sudah matang, dan didaerah tersebut banyak folusi udara dan asap kendaraan oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah ada hubungan sampel daun pedada terhadap radikal bebas dengan masyarakat yang masih sehat, sehingga peneliti melakukan penelitian uji antioksidan .

Secara tradisional masyarakat Kalimantan Selatan sering menjadikan buah dan daun tumbuhan pedada sebagai bahan ramuan bedak dingin. Penggunaan kulit kayu pedada untuk merangsang nafsu makan anak-anak telah umum dikenal penduduk Makiyan di Maluku Utara dan hasilnya sangat efektif.

Dalam islam, pengobatan dengan menggunakan bahan alam terutama tumbuh-tumbuhan telah lama dikenal. Allah swt. tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Semua yang diciptakan Allah swt. di muka bumi ini mempunyai manfaat

masing-masing tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai bahan pangan, tumbuh-tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”
(Kementrian Agama, 2013).*

Kata *ila* pada firman-Nya di awal ayat ini : awalama yara ila al-aradh, apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2010: 11).

Kata *zauj* berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan , karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangan dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan pertanyaan

yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2010: 11-12).

Kata *karim*, antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2010: 12).

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengandung suatu zat/ obat yang digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit, meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt. di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah dari Allah swt.

Peneliti ingin melakukan penelitian uji antioksidan dari isolat daun pedada menggunakan metode DPPH dengan menghitung nilai IC_{50} Kemudian diisolasi untuk mengetahui senyawa kimia yang mampu memberikan efek terapeutik dari daun pedada yang diambil dari pinggir sungai Sukawati Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol, Etil Aset, n-Heksan dan Air, dari daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.), mempunyai aktivitas terhadap antioksidan ?

2. Apakah isolat dari daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.), mempunyai aktivitas terhadap antioksidan ?
3. Berapakah Nilai IC_{50} isolat dari daun pedada yang memberikan efek Antioksidan ?
4. Senyawa apa yang terkandung pada daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang memiliki aktivitas antioksidan ?

A. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

Terdapat berbagai macam istilah pada judul skripsi ini, diantaranya :

a. Isolasi

Isolasi adalah suatu cara memisahkan senyawa yang bercampur sehingga kita dapat menghasilkan senyawa tunggal yang murni.

b. Isolat

Isolat adalah suatu senyawa tunggal yang diperoleh dari hasil isolasi

c. Identifikasi

Identifikasi adalah suatu reaksi kimia yang dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan suatu zat (ion/gugus) dalam suatu sampel tertentu.

d. Metanol

Merupakan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi sampel daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.).

e. Etil Asetat

Merupakan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi sampel daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.).

f. n-Heksan

Merupakan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi sampel daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.).

g. Antioksidan

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat laju oksida molekul Lain atau menetralsir radikal bebas.

h. Radikal bebas

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, yang sangat reaktif terhadap sel-sel tubuh.

i. Nilai IC_{50}

Nilai IC_{50} dapat didefinisikan sebagai adanya konsentrasi yang dapat menghambat aktivitas radikal, yaitu menghambat aktifitas radikal bebas sebanyak 50%. Nilai IC_{50} yang semakin kecil menunjukkan aktifitas antioksidan pada sampel yang diuji semakin besar.

j. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut sehingga bahan yang terlarut akan berpisah dengan bahan yang tidak terlarut.

k. Fraksinasi

Merupakan suatu hasil dari proses pemisahan komponen-komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak yang dipisahkan melalui beberapa metode tertentu.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya untuk mengetahui aktivitas antioksidan hasil isolasi dari daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L). dan penentuan IC_{50} dengan menggunakan metode DPPH.

B. Kajian Pustaka

Berdasarkan *jurnal skripsi Yulianis (2015)*, yang berjudul Isolasi Senyawa dari Fraksi Etil Asetat Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dan Uji Aktifitas Antioksidan Telah dilakukan penelitian tentang isolasi senyawa dari fraksi etil asetat daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dan aktifitas antioksidannya. Dengan menggunakan metode Fraksi dan dilakukan pemurnian dengan KLT preparatif. Kemudian dilakukan Uji Aktivitas antioksidan fraksi dilakukan dengan metode DPPH diperoleh nilai IC_{50} Sebesar 39,89 ppm. Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan penelitian yulianis yakni pada jenis sampel yang digunakan peneliti dimana peneliti mengambil sampel di daerah pangkep sedangkan penelitian sebelumnya mengambil sampel di pesisir sungai Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungal Ilir, Bandung. Perbedaan kedua yakni pada penelitian yuliani, sampel yang di uji yaitu dari hasil fraksi sedangkan pada penelitian ini sampel di ujikan yaitu dari hasil isolasi.

Herwinda S (2013), Aktivitas Ekstrak dan Fraksi Daun Pedada Merah (*Sonneratia Caseolaris* L.) sebagai Antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak dan fraksi daun pedada sebagai antioksidan terhadap radikal bebas DPPH. Daun pedada serbuk diekstraksi menggunakan alat maserasi dengan pelarut metanol. Ekstrak metanol difraksinasi dengan n-heksan, etil asetat, dan pelarut n-butanol. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode

DPPH secara spektrofotometri. Pengukuran absorbansi dilakukan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 516 nm. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak dan fraksi daun pedada memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai IC₅₀ dari ekstrak metanol adalah 21,62 ppm, fraksi –heksan adalah 82,62 ppm, fraksi etil asetat adalah 13,41 ppm, dan fraksi n-butanol adalah 13,04 ppm.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah ekstrak n-Heksan, Etil Asetat, metanol, dan Air daun pedada (*Sonneratia caseolaris L*), mempunyai aktivitas terhadap antioksidan.
- b. Untuk mengetahui apakah isolat daun pedada (*Sonneratia caseolaris L*), mempunyai aktivitas terhadap antioksidan.
- c. Untuk mengetahui Berapakah Nilai IC₅₀ Isolat daun pedada yang memberikan efek Antioksidan.
- d. Mengetahui Senyawa yang terkandung pada daun pedada (*Sonneratia caseolaris L.*) yang memiliki aktivitas antioksidan.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui aktualisasi penelitian ini diharap memberikan manfaat, yaitu:

- a. Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengolahan khasiat penggunaan daun pedada (*Sonneratia caseolaris L.*) sebagai antioksidan.
- b. Memperkaya khazanah ilmiah tanaman Indonesia yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehatan.
- c. Secara umum diharapkan dari penelitian ini diperoleh data ilmiah tentang penggunaan daun pedada (*Sonneratia caseolaris L.*) sebagai antioksidan Secara

khusus dari penelitian ini diperoleh senyawa aktif daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang dapat digunakan sebagai sumber senyawa antioksidan baru di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Uraian Tanaman*

1. **Klasifikasi** (Tomlinson,1986)

Kingdom : Plantae

Phyllum : Anthophyta

Kelas : Angiospermae

Ordo : Myrtales

Famili : Sonneratiaceae

Genus : *Sonneratia*

Species : *Sonneratia caseolaris* L.

2. **Nama daerah** (Hasan Nur, 2015)

Sumatera Timur (Barembang), Banjarmasin (Rambai), Sunda (Bogem), Jawa (Bidada, betah), Madura (Bughem), Ternate (Posi-posi merah), Ambon (Wahat merah), Sulawesi (Wahat merah), Internasional (Crabapple mangrove) dan pangkep (padada).

3. **Morfologi**

Sonneratia caesolaris tumbuh di tepi muara sungai terutama pada daerah dengan salinitas rendah dengan campuran air tawar (*Mangrove Information Center*, 2009).Tumbuhan ini mampu tumbuh hingga ketinggian dengan 5-20 meter, dengan struktur batang terdiri dari, akar, batang, ranting, daun, bunga dan buah. Batang berukuran kecil hingga besar, di ujung batang terdapat ranting yang tumbuh menyebar. Daun-daunnya tunggal, berhadapan, bundar telur terbalik atau memanjang,

5–13 cm × 2–5 cm, dengan pangkal bentuk baji dan ujung membulat atau tumpul. Tangkai daun pendek dan seringkali kemerahan.

Bunga sendirian atau berkelompok hingga 3 kuntum di ujung ranting. Kelopak bertaju 6 (jarang 7–8), runcing, panjang 3–4,5 cm dengan tabung kelopak serupa cawan dangkal di bawahnya, hijau di bagian luar dan putih kehijauan atau kekuningan di dalamnya. Daun mahkota merah, sempit, 17-35 mm × 1,5-3,5 mm. Benangsari sangat banyak, panjang 2,5–3,5 cm, putih dengan pangkal kemerahan yang cepat rontok. Tangkai putik besar dan panjang, tetap tinggal sampai lama. Buah berbiji banyak berbentuk bola pipih, hijau, 5–7,5 cm diameternya dan tinggi 3–4 cm, terletak di atas taju kelopak yang hampir datar. Daging buahnya kekuningan, masam asin, dan berbau busuk (Sukmadi R, dkk.2008).

4. Kandungan Kimia

Pedada merah diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti flavanoid, steroid, fenol hidrokuinon dan tanin. Pada bagian buah pidada merah memiliki kandungan senyawa flavanoid (Sadhu, *et all.* 2006)

Buah pedada memiliki 24 komponen diantaranya 8 steroid, 9 triterpenoid, dan 3 flavonoid, dan 4 turunan karboksil benzena. Diantara senyawa- senyawa tersebut senyawa triterpenoid yang memiliki kandungan paling tinggi (Minqing *et al.*,2009).

5. Kegunaan

Secara tradisional tumbuhan pidada merah digunakan sebagai ramuan bedak dingin (Heyne K, 1987), sebagai tapal (daun-daun yang dihancurkan dengan garam) untuk mengobati luka, memar, keseleo, dan bengkak. Daun-daunnya yang dihaluskan juga dapat digunakan untuk mengobati cacar (Perry 1980 *dalam* Duke 1983). Fermentasi air buah digunakan sebagai obat untuk menghentikan pendarahan, air

buah yang setengah matang dapat digunakan sebagai obat batuk dan bubur buah pedada dipercaya dapat mengobati kejang-kejang atau salah urat (Soeroyo. 1989). Getah buah pedada dapat digunakan sebagai anti sinar ultraviolet (Kusmana *et al.* 2008).

B. Metode Ekstraksi

1. Pengertian

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih berupa zat kimia murni, dan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Depkes RI, 1979: 28). Persyaratan simplisia nabati dan hewani diberlakukan pada simplisia yang diperdagangkan, tetapi pada simplisia yang digunakan untuk suatu pembuatan atau isolasi minyak atsiri, alkaloid, glikosida atau zat aktif lain, tidak harus memenuhi persyaratan (Depkes RI, 1995: 5).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

2. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa

komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Dirjen POM, 1986: 4).

3. Jenis-Jenis Ekstraksi

Ekstraksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara panas dan cara dingin. Ekstraksi cara panas yaitu dengan metode destilasi uap air dan refluks, sedangkan ekstraksi cara dingin yaitu dengan metode maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Dirjen POM, 1986: 10-11).

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama dan seterusnya.

b. Refluks

Refluks adalah metode penyarian dengan cara cairan penyari dipanaskan hingga mendidih, penyari akan menguap ke atas melalui serbuk simplisia, uap penyari pengembun karena didinginkan oleh pendingin balik (kondensor). Embun turun melalui serbuk simplisia sambil melarutkan zat aktifnya dan kembali ke labu. Cairan akan menguap berulang hingga pelarut jenuh.

C. Radikal Bebas

Radikal bebas (free radical) atau sering juga disebut senyawa oksigen reaktif (reactive oxygen species/ROS) adalah sebuah molekul atau atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Radikal bebas bersifat tidak stabil, sangat reaktif dan dapat merebut elektron dari molekul lain dalam upaya mendapatkan pasangan elektronnya. Molekul yang kehilangan elektron

ini dapat bersifat reaktif, terutama asam lemak tidak jenuh yang kemudian ditransformasikan menjadi radikal bebas yang sangat reaktif (Nabet, 1996). Radikal bebas yang elektronnya tidak berpasangan secara cepat akan menarik elektron makro molekul biologis yang berada di sekitarnya seperti protein, asam nukleat, dan asam deoksiribonukleat (DNA). Jika makro molekul yang teroksidasi dan terdegradasi tersebut merupakan bagian dari sel atau organel, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada sel tersebut (Halliwell, 1990).

Pada keadaan normal, secara fisiologis sel memproduksi radikal bebas sebagai konsekuensi logis pada reaksi biokimia dalam kehidupan aerobik. Organisme aerobik memerlukan oksigen untuk menghasilkan ATP, yaitu suatu senyawa yang merupakan sumber energi bagi makhluk hidup melalui fosforilasi oksidatif yang terjadi dalam mitokondria. Pada proses tersebut terjadi reduksi O₂ menjadi H₂O yang memerlukan pengalihan elektron. Namun, dalam keadaan tertentu, pengalihan elektron tersebut berjalan kurang sempurna sehingga dapat terbentuk radikal bebas yang dapat merusak sel jika tidak diredam (Suryohudoyo, 2007). Pembentukan radikal bebas akan dinetralisir oleh antioksidan yang diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang berimbang. Pengaruh negatif radikal bebas terjadi jika jumlahnya melebihi kemampuan detoksifikasi oleh sistem pertahanan antioksidan tubuh sehingga menimbulkan kondisi stres oksidatif. Radikal bebas dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu :

1. secara endogen, sebagai respon normal dari rantai peristiwa biokimia dalam tubuh, dalam sel (intrasel) maupun ekstrasel.
2. secara eksogen, radikal bebas didapat dari polutan lingkungan, asap rokok, obat-obatan, dan radiasi ionisasi atau sinar ultraviolet (Langseth, 2000). Mekanisme

reaksi radikal bebas paling tepat dibayangkan sebagai suatu deret reaksi-reaksi bertahap, yaitu (Fessenden, 1992: 224):

a. Inisiasi

Tahap inisiasi ialah pembentukan awal radikal-radikal bebas. Dalam klorinasi metana, tahap inisiasi adalah pemaksapisahan (cleavage) homolitik molekul Cl_2 menjadi dua radikal bebas klor. Energi untuk reaksi ini diberikan oleh cahaya ultraviolet (UV) atau oleh pemanasan campuran ke temperatur yang sangat tinggi.

b. Propagasi

Setelah terbentuk, radikal bebas klor mengawali sederetan reaksi sehingga terbentuk radikal bebas baru. Secara kolektif, terbentuknya reaksi ini disebut tahap propagasi dari reaksi radikal bebas. Pada hakikatnya, pembentukan awal beberapa radikal bebas akan mengakibatkan perkembangbiakan radikal bebas baru dalam suatu reaksi pengabdian diri (self perpetuating) yang disebut reaksi rantai. Sebagai tahap propagasi pertama, radikal bebas klor yang reaktif merebut sebuah atom hidrogen dari molekul metana, menghasilkan radikal bebas metil dan HCl. Radikal bebas metil itu juga reaktif. Dalam tahap propagasi kedua, radikal bebas metil merebut sebuah atom klor dari dalam molekul Cl_2 . Tahap ini menghasilkan salah satu dari produk keseluruhan klorometana. Produk ini juga menghasilkan ulang radikal bebas klor, yang nantinya dapat merebut atom hidrogen dari molekul metana lain dan memulai deret propagasi selanjutnya.

c. Terminasi

Daur propagasi terputus oleh reaksi-reaksi pengakhiran (termination). Reaksi apa saja yang memusnahkan radikal bebas atau mengubah radikal bebas menjadi radikal yang stabil dan tidak reaktif, dapat mengakhiri daur propagasi radikal

bebas. Klorinasi metana diakhiri terutama oleh bergabungnya radikal-radikal bebas, inilah pemusnahan radikal bebas. Senyawa apa saja yang mudah terurai menjadi radikal bebas dapat bertindak sebagai satu inisiator. Satu contoh ialah peroksida (ROOR), yang mudah membentuk radikal bebas karena energi disosiasi ikatan RO-RO hanyalah sekitar 35 kkal/mol, lebih rendah daripada kebanyakan ikatan. Sistem pertahanan tubuh terhadap senyawa radikal dibedakan menjadi sistem pertahanan preventif dan sistem pertahanan melalui mekanisme pemutusan reaksi rantai radikal bebas. Sistem pertahanan preventif dilakukan oleh antioksidan sekunder, sedangkan pemutusan reaksi berantai radikal bebas dilakukan oleh antioksidan primer (Nabet, 1996). Menurut Gordon (1990), antioksidan primer merupakan substansi yang berperan sebagai akseptor radikal bebas sehingga dapat menghambat mekanisme radikal bebas pada proses oksidasi. Antioksidan ini juga disebut sebagai antioksidan pemecah rantai yang dapat bereaksi dengan radikal lipid dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih stabil. Contoh antioksidan primer antara lain tokoferol dan asam askorbat. Antioksidan sekunder atau antioksidan pelindung berperan dalam mereduksi kecepatan rantai inisiasi melalui berbagai mekanisme. Mekanisme antioksidannya dapat terjadi melalui pengikatan ion-ion logam, scavenger oksigen, dekomposisi hidroperoksida menjadi bentuk-bentuk non radikal, menyerap radiasi sinar ultra violet atau deaktivasi singlet oksigen. Contoh antioksidan sekunder antara lain asam sitrat dan turunan asam fosfat, karoten, enzim superoksida dismutase, katalase dan glutathion peroksidase. Menurut Nabet (1996), menyatakan bahwa pada sistem pertahanan preventif, pembentukan senyawa ROS dan radikal bebas dihambat dengan mengikat logam atau merusak pembentukannya. Sistem pengikatan logam tersebut terjadi dalam cairan ekstraseluler. Sebaliknya di dalam cairan intraseluler,

senyawa ROS dan radikal bebas dirusak oleh sistem enzim. Reaksi antara radikal bebas dan molekul itu berujung pada timbulnya suatu penyakit, yaitu antara lain:

1) Kerusakan DNA pada inti sel

Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan DNA disamping penyebab lain seperti virus, radiasi, dan zat kimia karsinogen. Bila kerusakan tidak terlalu parah, masih dapat diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA. Namun bila sudah menyebabkan rantai DNA terputus di berbagai tempat, kerusakan ini tidak dapat diperbaiki lagi sehingga pembelahan sel akan terganggu bahkan terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit kanker (Reynertson, 2001: 2).

2) Kerusakan protein

Terjadinya kerusakan protein akibat serangan radikal bebas termasuk proses oksidasi protein yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan protein tersebut. Contohnya meningkatnya kadar LDL (low density lipoprotein) oleh oksigen reaktif dapat merusak dinding arteri yang menyebabkan aterosklerosis (Langseth, 1995: 13).

3) Kerusakan lipid peroksida

Proses ini berlangsung bila radikal bebas menyerang lemak tak jenuh dalam tubuh sehingga terjadi peroksidasi yang menyebabkan munculnya penyakit seperti iskemia, aterosklerosis, diabetes melitus, dan penuaan kulit.

4) Proses penuaan

Terjadi kerusakan jaringan disebabkan radikal bebas yang merupakan proses terjadinya penuaan, seperti kehilangan elastisitas jaringan kolagen dan otot sehingga

kulit tampak keriput, terjadinya lipofuchsin atau bintik-bintik pigmen kecoklatan di kulit yang merupakan timbunan sisa pembakaran dalam sel.

D. Antioksidan

Antioksidan adalah zat penghambat reaksi oksidasi akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan asam lemak tak jenuh, membran dinding sel, pembuluh darah, basa DNA, dan jaringan lipid sehingga menimbulkan penyakit (Subeki, 1998).

Reaksi oksidasi dapat dicegah oleh bahan-bahan berikut (Kenneth, 1985):


- a. Bahan pengkhelat, yaitu untuk ion-ion logam pencetus terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas. EDTA dan asam sitrat paling sering digunakan.
- b. Bahan pereduksi, yaitu senyawa yang dapat mereduksi obat yang teroksidasi. Natrium tiosulfat dan asam askorbat adalah bahan yang dimanfaatkan untuk kemampuan ini.
- c. Senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi, yaitu berupa bahan yang mempunyai sifat lebih mudah teroksidasi dibanding senyawa yang dilindungi. Sebenarnya bahan-bahan ini bertindak sebagai pembersih oksigen. Contoh senyawa adalah natrium bisulfit (juga sulfit) dan asam askorbat.
- d. Terminator rantai, yaitu suatu bahan yang dalam larutan mampu bereaksi dengan radikal, membentuk senyawa baru yang bersifat radikal terminator rantai, yang tidak lagi membuat pemasukan baru dalam siklus propagasi radikal. Radikal yang baru ini diharapkan akan bersifat stabil secara intrinsik atau mungkin berupa dimer untuk membentuk molekul yang inert. Sebagian besar antioksidan larut air yang dapat bereaksi sebagai terminator rantai, seperti tiol, sistein, tiogliserol, asam tioglikolat, dan tiosorbitol. Keseluruhan antioksidan larut lemak bereaksi

sebagai terminator rantai. Contoh-contoh utama adalah askorbitil palmitat, hidroksianisol terbutilasi (BHA), hidroksitoluen terbutilasi (BHT), propilgallat, dan asam nordihidroguaiaretik (NDGA).

E. *1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)*

Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu senyawa radikal nitrogen. DPPH akan mengambil atom hidrogen yang terdapat dalam suatu senyawa, misalnya senyawa fenol. Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini berlangsung melalui transfer elektron. Larutan DPPH yang berwarna ungu memberikan serapan absorban maksimum pada 517 nm. Larutan DPPH ini akan mengoksidasi senyawa dalam ekstrak tanaman. Proses ini ditandai dengan memudarnya warna larutan dari ungu menjadi kuning (Prakash, 2011).

Metode DPPH mudah digunakan, cepat, cukup teliti dan mudah untuk mengukur kapasitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu. Elektron bebas dalam radikal DPPH memberikan absorbansi maksimum pada 517 nm dan berwarna ungu (Prakash, 2011).




Gambar 1. Rumus Struktur 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl

Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti aktivitas transfer hidrogen juga untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas. Pada

uji DPPH, penangkapan radikal diikuti dengan monitoring penurunan absorpsi yang terjadi karena reduksi oleh radikal (Prakash, 2011).

Adanya senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal akan mereduksi radikal DPPH menurut reaksi:



Gambar 2. Reaksi antara DPPH dengan Antiradikal Bebas


Akibatnya penambahan senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal bebas akan menurunkan konsentrasi DPPH. Adanya penurunan konsentrasi DPPH akan menyebabkan penurunan absorbansi dibandingkan dengan absorbansi bebas control yang tidak diberi dengan senyawa uji yang diduga mempunyai aktivitas antiradikal (Rohman, 2005).

F. Uraian Vitamin C

Vitamin C adalah salah satu antioksidan sekunder yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Berbagai penelitian yang dilakukan vitamin C digunakan dalam beberapa tingkat konsentrasi untuk dapat mengetahui aktivitas antioksidan, yaitu kemampuan untuk dapat meredam radikal bebas dengan menggunakan metode DPPH (Sayuti, 2015).

Vitamin C sebagai sumber antioksidan memiliki manfaat bagi tubuh antara lain membantu menjaga pembuluh-pembuluh kapiler, meningkatkan penyerapan asupan zat besi, menghambat produksi nitrosamine, zat pemicu kanker dan

memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Senyawa yang digunakan sebagai pembanding (kontrol positif) dalam uji aktivitas penangkapan radikal hidroksil dalam penelitian ini adalah vitamin C (Cahyadi, 2008).



Gambar 3: Struktur Kimia Asam Askorbat

Dalam keadaan murni, vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 176,13 dengan rumus bangun $C_6H_8O_6$, dengan titik lebur $190-192^{\circ}C$ (Depkes RI, 2014).

Asam askorbat dapat meningkatkan fungsi imun, dengan menstimulasi produksi interferon (protein yang melindungi sel dari serangan virus). Vitamin ini dapat menstimulasi kemotaksis dan respon proliferasi netrofil, serta melindungi sel dari serangan radikal bebas yang diproduksi oleh netrofil teroksidasi. Asam askorbat dinyatakan dapat memacu kerja sintesis factor humoral, terutama antibody IgG dan IgM. Vitamin C mampu mereduksi radikal superoksidasi, hidroksil, asam hipoklorida dan oksigen reaktif yang berasal dari netrofil dan monosit yang teraktifasi.

G. Fraksinasi

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan

metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari, 2012).

Kolom kromatografi dikemas kering (biasanya dengan penjerap mutu KLT 10-40 μm) dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai. Cuplikan dilarutkan ke dalam pelarut yang cocok, dimasukkan langsung pada bagian atas kolom atau pada lapisan penjerap dan dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu, kromatografi vakum cair menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann *et al.*, 1995).

Kromatografi vakum cair merupakan modifikasi dari kromatografi kolom gravitasi. Metode ini lebih banyak digunakan untuk fraksinasi sampel dalam jumlah besar (10-50 g). Kolom yang digunakan biasanya terbuat dari gelas dengan lapisan berpori pada bagian bawah. Ukuran kolom bervariasi tergantung ukurannya. Kolom disambungkan dengan penampung eluen yang dihubungkan dengan pompa vakum. Pompa vakum akan menghisap eluen dalam kolom, sehingga proses pemisahan berlangsung lebih cepat. Penggunaan tekanan dimaksudkan agar laju aliran eluen meningkat sehingga meminimalkan terjadinya proses difusi karena ukuran silika gel yang biasanya digunakan pada lapisan kromatografi KLT sebagai fasa diam dalam kolom yang halus yaitu 200-400 mesh. Kolom yang digunakan berukuran lebih

pendek dari pada kolom kromatografi gravitasi dengan diameter yang lebih besar (5-10 cm). Kolom KVC dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Sampel yang akan dipisahkan biasanya sudah diadsorbsikan ke dalam silika kasar terlebih dahulu (ukuran silika kasar 30-70 mesh) agar pemisahannya lebih teratur dan menghindari sampel langsung menerobos ke dinding kaca tanpa melewati adsorben terlebih dahulu, yang dapat berakibat gagalnya proses pemisahan. Pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap yang sebelumnya sudah dimasukkan sampel. Kolom dihisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan memvakumkannya. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan. Kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi, sehingga kromatografi vakum cair disebut juga kolom fraksinasi (Atun, 2014).

Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi adsorpsi. Senyawa yang dipisahkan dengan kromatografi kolom memiliki mekanisme yang sama dengan jenis kromatografi lain yaitu berkaitan dengan perbedaan gaya-gaya antar molekul dalam sampel dengan fase gerak dan antara komponen dengan fase diam. Prinsip kerja kromatografi kolom yaitu zat cair sebagai fase gerak akan membawa cuplikan senyawa mengalir melalui fase diam sehingga terjadi interaksi berupa adsorpsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Kecepatan bergerak suatu komponen dalam cuplikan tergantung pada seberapa besar/lama komponen tersebut tertahan oleh padatan penyerap dalam kolom. Hasil yang diperoleh berupa fraksi-fraksi senyawa (eluat) yang ditampung pada bagian bawah kolom (Rubiyanto, 2016).

Beberapa jenis pelarut dan fasa gerak untuk kromatografi kolom menurut deret Trappe. Deret ini menggambarkan kekuatan elusi pelarut-pelarut dengan kolom yang menggunakan padatan penyerap silika gel:

*Air murni < metanol < etanol < propanol < aseton < etil asetat < dietil
eter < kloroform < metilen klorida < benzena < toluena < trikloro etilen < karbon
tetraklorid < sikloheksana < heksana*

Urutan pelarut-pelarut diatas menunjukkan bahwa semakin turun kepolarannya maka semakin bertambah kekuatan pelarut tersebut untuk mengelusi senyawa yang teradsorpsi oleh silika gel (Rubiyanto, 2016).

H. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen campuran suatu senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa diantara padatan penyerap (adsorbent, fase diam) yang dilapisi pada pelat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent (padatan penyerap). Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut (elusi). KLT mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa organik maupun senyawa anorganik, karena relatif sederhana dan kecepatan analisisnya. Di dalam analisis dengan KLT, sampel dalam jumlah yang sangat kecil ditotolkan menggunakan pipa kapiler di atas permukaan pelat tipis fasa diam (adsorbent), kemudian pelat diletakkan dengan tegak dalam bejana pengembang yang berisi sedikit pelarut pengembang. Oleh aksi kapiler, pelarut mengembang naik sepanjang permukaan lapisan pelat dan membawa komponen-komponen yang terdapat pada sampel (Atun, 2014).

Fase diam yang digunakan dalam KLT adalah bahan penyerap. Penyerap yang umum adalah silika gel, aluminium oksida, selulosa, kiselgur, selulosa dan

turunannya. Dua sifat yang penting dari penyerap adalah besar partikel dan homogenitasnya, karena adhesi terhadap penyokong sangat tergantung pada hal tersebut. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensinya dan resolusinya (Rohman, 2007).

Pemilihan fasa gerak yang tepat merupakan langkah yang sangat penting untuk keberhasilan analisis dengan KLT. Umumnya fasa gerak dalam KLT ditemukan dengan coba-coba dan jarang sekali yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Sifat-sifat pelarut pengembang juga merupakan faktor dominan dalam penentuan mobilitas komponen-komponen campuran. Umumnya kemampuan suatu pelarut pengembang untuk menggerakkan senyawa pada suatu adsorben berhubungan dengan polaritas pelarut (Atun, 2014).

Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak berwarna. Berikut adalah cara-cara kimiawi untuk mendeteksi bercak (Rohman, 2007):

1. Menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi secara kimia dengan seluruh solut yang mengandung gugus fungsional tertentu sehingga bercak menjadi berwarna. Kadang-kadang lempeng dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas warna bercak.
2. Mengamati lempeng di bawah lampu UV 254 atau 366 untuk menampakkan solut sebagai bercak yang gelap atau bercak yang berfluoresensi terang pada dasar yang berfluoresensi seragam

3. Menyemprot lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat lalu dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organik yang akan nampak sebagai bercak hitam sampai kecoklat-coklatan
4. Memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup
5. Melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan sitometer, suatu instrumen yang dapat mengukur intensitas radiasi yang direfleksikan dari permukaan lempeng ketika disinari dengan lampu UV atau lampu sinar tampak.

Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi adalah nilai R_f (retention factor). Dua senyawa dikatakan identik jika mempunyai nilai R_f yang sama jika diukur pada kondisi KLT yang sama. Harga R_f ditentukan oleh jarak rambat senyawa dari titik awal dan jarak rambat fase gerak dari titik awal. Penentuan harga R_f adalah sebagai berikut:

$$R_f = \frac{\text{Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal sampai noda yang terbentuk}}{\text{Jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas atas}}$$

(Rohman, 2007).

I. *Isolasi*

Isolasi merupakan suatu cara untuk mengambil satu senyawa aktif yang terdapat di dalam tanaman untuk mengetahui senyawa yang berkhasiat dalam tumbuhan. Pekerjaan isolasi membutuhkan keterampilan dan pengalaman dalam memadukan berbagai teknik pemisahan. Untuk mendapatkan senyawa murni biasanya peneliti menggunakan beberapa teknik ekstraksi dan kromatografi. Langkah pertama yang biasanya dilakukan dalam isolasi senyawa organik bahan alam adalah ekstraksi sampel menggunakan pelarut organik. Ada beberapa metode ekstraksi sampel bahan alam, antara lain maserasi, infusdasi, digesti, perkolasi dan soxletasi. Langkah berikutnya setelah diperoleh ekstrak dalam isolasi senyawa organik bahan

alam adalah pemisahan komponen-komponen yang terdapat dalam ekstrak tersebut. Teknik yang banyak digunakan adalah kromatografi. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase yaitu fase diam dan fase gerak (Atun, 2014).

Hasil pemisahan secara kromatografi selanjutnya diperoleh fraksi-fraksi yang ditampung dalam botol atau tabung dan dianalisis secara kromatografi lapis tipis (KLT), yang biasa disebut kromatogram. Kromatogram yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan lampu UV pada panjang gelombang 254 atau 356 atau disemprot dengan reagen warna. Salah satu reagen warna yang banyak digunakan antara lain serium sulfat yang dapat mendeteksi hampir semua senyawa bahan alam, maupun reagen yang khusus seperti Lieberman Burchard untuk mendeteksi terpenoid dan steroid. Fraksi-fraksi yang telah dianalisis secara KLT selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jumlah senyawa maupun Rf-nya yang sama digabungkan untuk dianalisis lebih lanjut. Pemisahan dianggap cukup apabila sudah diperoleh fraksi yang menunjukkan noda tunggal pada beberapa uji KLT dengan menggunakan berbagai variasi eluen yang berbeda. Adanya noda tunggal pada beberapa uji KLT tersebut menunjukkan bahwa sudah diperoleh senyawa dengan tingkat kemurnian tinggi (Atun, 2014).

J. Pemanfaatan Tumbuhan dalam Perspektif Islam

Allah *subhanahu wa ta'ala* menciptakan manusia dan alam semesta bukanlah tanpa sebab, melainkan agar manusia dapat mengambil hikmah dan manfaat semaksimal mungkin dari alam semesta. Manfaat tersebut baik digunakan untuk dikonsumsi maupun sebagai pengobatan. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang

menyatakan bahwa segala ciptaanNya dapat dimanfaatkan untuk manusia tertuang dalam QS. Al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu” (Kementerian Agama, 2013).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kekuasaannya yang meliputi segala-galanya dan menunjukkan kepada makhluknya betapa banyak karunia yang telah Dia berikan dengan menjadikannya sebagai bekal dan persediaan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai obat, seperti daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang dimanfaatkan sebagai obat antioksidan alami yang dapat menghambat radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia.

Agar pemanfaatan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya diperlukan penelitian ilmiah yang bersumber dari bacaan-bacaan yang memiliki validalitas yang tinggi. Perintah membaca pun tertuang dalam QS. Al-Alaq/96: 1, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” (Kementerian Agama, 2013).

Kata *iqra'* berasal dari kata *qara'a* yang pada mulanya berarti *menghimpun*. Hal ini berarti pula *menyampaikan, menelaah, membaca, memahami, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu*, dan sebagainya yang bermuara pada arti *menghimpun* (Shihab, 2009: 454). Penggalan ayat ini merupakan salah satu dari banyak ayat yang senantiasa menyeru manusia untuk mendalami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi acuan kehidupan termasuk dalam mengobati berbagai penyakit.

Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam segala kekuasaannya mampu menurunkan penyakit kepada hambaNya, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Atas keadilan dari Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada makhlukNya pula, Allah *subhanahuwa ta'ala* menurunkan obat sebagai penawar dari penyakit tersebut melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan obat yang paling sempurna untuk berbagai macam penyakit. Penyakit tidak akan sanggup menanggungkan kalamullah (Al-Qur'an) bagi orang-orang yang yakin dan memahami kandungan Al-Qur'an sebab dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat ketauhidan, puji-pujian, kesempurnaan tawakkal, segala kekuasaannya, dan permasalahan yang akhirnya berpulang hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* serta berisikan permohonan kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya kesembuhan dari penyakit. Dari uraian beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan kekuasaannya menurunkan penyakit kepada makhlukNya, dan atas kekuasaannya pula Allah *subhanahu wata'ala* yang menyembuhkan.

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat dan merupakan anugerah Allah swt, kerana Allah swt tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah RA

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya : *Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R. Al-Bukhari: 5678).*

Ungkapan “setiap penyakit pasti ada obatnya”, artinya bisa bersifat umum, sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Allah sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya. Akan tetapi ilmu tersebut tidak ditampakkan Allah untuk menggapainya. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah swt. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati. Karena setiap ciptaan Allah swt itu pasti ada penawarnya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman pula dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ النَّاسُ
وَمَا أَشْفَى إِلَّا اللَّهُ

Terjemahannya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Kementerian Agama, 2013).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* yang memberikan sakit kepada manusia, baik berat maupun ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Allah *subhanahu wa ta'ala* yang akan menyembuhkannya, salah satunya adalah dengan memanfaatkan karunia Allah yang ada di muka bumi yaitu tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat salah satunya adalah daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang dimanfaatkan sebagai

obat antioksidan alami yang dapat menghambat radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia.

Dalam islam, pengobatan dengan menggunakan bahan alam terutama tumbuh-tumbuhan telah lama dikenal. Allah swt. tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Semua yang diciptakan Allah swt. di muka bumi ini mempunyai manfaat masing-masing tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai bahan pangan, tumbuh-tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementrian Agama, 2013).

Kata *ila* pada firman-Nya di awal ayat ini : awalam yara ila al-aradh, apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2010: 11).

Kata *zauj* berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan , karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri

pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangan dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2010: 11-12).

Kata *karim*, antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2010: 12).

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengandung suatu zat/ obat yang digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit, meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt. di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu, salah satunya adalah daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang dimanfaatkan sebagai obat antioksidan alami yang dapat menghambat radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia.

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah dari Allah swt.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimental dengan uji antioksidan terhadap daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah tumbuhan pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang diperoleh dari Jalan Sukawati, Kabupaten Pangkep.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan adalah daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dari Jalan Sukawati, Kabupaten Pangkep.

D. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah wadah maserasi, gelas kimia (*Iwaki Pyrex*®), labu tentukur (*Iwaki Pyrex*®), mikro pipet (*Dragon OneMed*®), neraca analitik (*Kern ABT 220-5DM*®), rotavapor (*Heidolph*®) spektrofotometer UV-Vis (*Thermo Scientific*®), penangas air ®(Memmert), pipa kapiler, chamber, seperangkat alat

kromatografi kolom, seperangkat alat refluks, gelas Erlenmeyer (*Pyrex*) 100 ml, gelas kimia (*Pyrex*) 250 ml, gelas ukur (*Pyrex*) 5 ml, 10 ml dan 50 ml, timbangan analitik ®(Kern), timbangan kasar ®(O’Hauss), vortex ®(VM-300) lampu UV 254 nm dan 366 nm.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah Etanol 96%, n-Heksan, Etil Asetat, Aquades Indikator DPPH, daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.), Vitamin C, lempeng silica gel F₂₅₄, pereaksi AlCl₃5%, pereaksi dragendorf, pereaksi FeCl₃ 5%, serium sulfat, pereaksi Lieberman Bouchard, silica gel 60 GF₂₅₄, selit, kapas, dan kertas saring.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Penyiapan sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) diperoleh di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari pada pukul 10.00 WITA. Daun yang ambil adalah daun yang bagus, tidak rusak, tidak berjamur dan tidak berwarna kuning atau terlalu tua.

b. Pengolahan sampel

Sebelum di lakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) disortasi basah. Setelah proses pencucian, kemudian daun di angin-anginkan di dalam ruangan yang terlindung oleh cahaya matahari langsung karena dapat merusak kandungan kimia yang terkandung dalam daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.).

c. Ekstraksi sampel

Sampel daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang telah kering ditimbang sebanyak 600 g untuk di maserasi bertingkat menggunakan 3 pelarut yaitu n-heksan,

etil asetat, dan etanol 96%. Sampel dimasukkan kedalam bejana maserasi kemudian sampel direndam dengan pelarut n-Heksan. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang terlindung sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk, selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama, dilakukan selama 3 hari. Ekstrak n-heksan cair yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak n-heksan kental. Ampas diangin-anginkan untuk menghilangkan sisa pelarut. Ampas dimaserasi kembali menggunakan pelarut etil asetat, dilakukan prosedur yang sama hingga diperoleh ekstrak etil asetat. Kemudian yang terakhir yaitu dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96%, dilakukan prosedur yang sama hingga diperoleh ekstrak etanol 96%. Pada hari ke 10 sampel direfluks menggunakan pelarut aquades pada suhu 100°C selama 4 jam. Setelah itu sampel disaring dan dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ekstrak yang diperoleh kemudian diuapkan.

2. Penyiapan Larutan

a. Pembuatan Larutan Stok

Sebanyak 10 mg Ekstrak yang diperoleh dilarutkan dengan 10 ml metanol p.a sehingga kadarnya 1000 ppm larutan stok.

b. Pembuatan Larutan Uji Vitamin C (Control)

Sebanyak 10 mg vitamin C dilarutkan dalam metanol p.a 100 ml sehingga diperoleh konsentrasi sebesar 100 ppm sebagai larutan stok.

c. Penyiapan Larutan DPPH

Ditimbang DPPH sebanyak 15,77 mg kemudian dilarutkan dalam 100 ml metanol p.a sehingga kadarnya 0,4 mmol.

3. Analisis Kuantitatif

a. Pengukuran Daya Antiradikal Bebas Ekstrak Daun pedada

Larutan stok masing-masing ekstrak dipipet, 0.1 ml kemudian ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya dengan pelarut sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 20 ppm dari masing-masing ekstrak. Campuran tersebut dikocok dengan menggunakan vortex dan inkubasi 30 menit pada suhu 37°C. Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm. Pengerjaan dilakukan dengan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

b. Pengukuran Daya Antiradikal Bebas Fraksi Daun pedada

Larutan stok masing-masing fraksi dipipet, 0.1 ml, kemudian ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya dengan pelarut sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 20 ppm dari masing-masing fraksi. Campuran tersebut dikocok dengan menggunakan vortex dan inkubasi 30 menit pada suhu 37°C. Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm. Pengerjaan dilakukan dengan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

c. Pengukuran Daya Antiradikal Bebas Isolat Daun pedada

Larutan stok masing-masing dipipet, 0.25 ml, 0,5 ml dan 0,75 ml, kemudian ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya dengan pelarut sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 50 ppm, 100 ppm dan 150 ppm. Campuran tersebut dikocok dengan menggunakan vortex dan inkubasi 30 menit pada suhu 37°C. Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm. Pengerjaan dilakukan dengan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

d. Pengukuran Daya Antiradikal Bebas Vitamin C

Larutan stok masing-masing dipipet 0,15 ml, 0,45 ml, dan 0,75 ml, kemudian ditambahkan 1 ml larutan DPPH dan dicukupkan volumenya dengan pelarut sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi Vitamin C 3 ppm, 9 ppm, 15 ppm. Campuran tersebut dikocok dengan menggunakan vortex dan inkubasi 30 menit pada suhu 37°C. Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm. Pengerjaan dilakukan dengan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat

4. Analisis Data

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik menggunakan regresi linear dari data % inhibisi dengan konsentrasi sampel. Besarnya persentase pengikatan radikal bebas dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Penghambatan} = \frac{\text{absorban blanko} - \text{absorban sampel}}{\text{absorban blanko}} \times 100\%$$

5. Kromatografi Lapis Tipis

a. Penjenuhan Chamber

Cairan pengelusi yang digunakan dimasukkan kedalam chamber setinggi lebih kurang 4 cm kemudian diberi kertas. Kejenuhan chamber ditandai dengan naiknya cairan pengelusi pada kertas saring hingga batas akhir.

b. Penotolan Sampel Pada Lempeng

Ekstrak teraktif dari sampel ditotolkan pada lempeng bagian batas bawahnya. Lempeng dielusi dengan eluen dalam chamber, sampai cairan pengelusi mengelusi lempeng sampai batas akhir. Lempeng dikeluarkan dan diangin-anginkan, lempeng siap untuk diamati penampakan nodanya.

c. Penampakan Noda Pada Lampu UV 254 nm dan 366 nm.

Lempeng yang telah dielusi diamati penampakan noda yang terbentuk dibawah sinar lampu UV 254 nm dan 366 nm.

d. Penampakan Noda dengan Serium sulfat

Setelah diamati di bawah lampu UV, lempeng disemprot dengan larutan serium sulfat, kemudian dipanaskan pada penangas listrik hingga terbentuk noda.

6. *Fraksinasi Komponen Kimia*

Ekstrak etanol 96% ditimbang sebanyak 15 gram, kemudian difraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom. Kolom kromatografi disiapkan dengan membuat bubuk silika yang dimasukkan ke dalam kolom kromatografi secara perlahan-lahan. Ekstrak dilarutkan dengan pelarutnya lalu kemudian dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian dibuat sistem fase gerak dengan gradien kepolaran yang semakin meningkat yaitu berturut-turut Heksan : etil asetat {(10:1), (7:1), (5:1), (3:1), (1:1)}, kloroform, kloroform:metanol {(10:1), (5:1), (3:1), (1:1)}, metanol. Langkah pertama dilakukan dengan mengaliri kolom, pelarut yang menetes dari kolom ditampung dalam vial yang sebelumnya telah ditimbang dan diberi nomor. Penggantian gradient fase gerak dilakukan ketika fase gerak gradien sebelumnya telah habis digunakan untuk mengaliri kolom.

Fraksi-fraksi hasil pengoloman ditampung dan kemudian diuapkan. Seluruh fraksi yang diperoleh diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan eluen Heksan:etil (5:1) dan kloroform:metanol (10:1). Kemiripan bercak yang timbul pada lempeng dapat diamati baik secara langsung maupun dibawah sinar UV 254 nm dan UV 366 nm. Fraksi yang mempunyai kemiripan bercak dijadikan satu. Setelah didapatkan 12 fraksi kemudian diuji aktivitas antioksidannya untuk mendapatkan hasil fraksi yang aktif, setelah didapatkan fraksi yang aktif kemudian dilakukan

kembali kromatografi kolom ke-2 untuk mendapatkan senyawa murni, pertama ditimbang sebanyak 500 mg. Kolom kromatografi disiapkan dengan membuat bubuk silika yang dimasukkan ke dalam kolom kromatografi secara perlahan-lahan. Hasil fraksi dilarutkan dengan pelarutnya lalu kemudian dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian dibuat sistem fase gerak dengan gradien kepolaran yang semakin meningkat yaitu berturut-turut kloroform:metanol (5:1), selanjutnya pelarut yang menetes dari kolom ditampung dalam vial yang sebelumnya telah ditimbang dan diberi nomor, Fraksi-fraksi hasil pengoloman ditampung dan kemudian diuapkan. Seluruh fraksi yang diperoleh diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan eluen kloroform:metanol (5:1) Kemiripan bercak yang timbul pada lempeng dapat diamati baik secara langsung maupun dibawah sinar UV 254 nm dan UV 366 nm, untuk melihat adanya noda tunggal atau isolat. Setelah itu diuji aktifitas antioksidannya.

7. Identifikasi Komponen Kimia

Fraksi teraktif ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan kloroform:metanol (10:1) dengan profil KLT yang diperoleh. Kromatogramnya diamati di bawah UV 254 dan 366 nm kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi penampakan noda antara lain sebagai berikut :

a. Alkaloid

Pereaksi yang digunakan yaitu Dragendorf, jika sampel positif mengandung alkaloid, maka timbul warna jingga dengan latar belakang kuning.

b. Steroid

Pereaksi yang digunakan Liebermann-Burchard atau pereaksi Salkowski. Kromatogram terlebih dahulu dipanaskan, kemudian diamati di lampu UV 366 nm,

munculnya noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.

c. Flavanoid

Pereaksi yang digunakan yaitu *Aluminium Klorida* diamati di lampu UV 366 nm, jika sampel mengandung senyawa flavonoid maka noda akan berfluoresensi kuning.

d. Fenol

Pereaksi yang digunakan Besi (III) Klorida, jika sampel positif mengandung fenol akan dihasilkan warna hijau atau biru.

e. Khumarin

Pereaksi yang digunakan KOH etanolik, jika sampel positif mengandung senyawa khumarin akan dihasilkan warna merah terang.

8. Identifikasi isolat dengan spektrofotometri IR

Hasil isolat kemudian diuji spektrofotometri IR untuk mengetahui analisis senyawa tunggal, ditimbang isolat 10 mg kemudian dilakukan analisis dengan spektrofotometri IR.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil dari ekstraksi 600 g simplisia daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) Menggunakan metode maserasi bertingkat dengan pelarut Etil asetat, n-Heksan, etanol 96%, dan air

1. Ekstraksi Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)

Tabel 1. Jumlah ekstrak yang diperoleh dari hasil ekstraksi.

Simplisia 600 g	Bobot Ekstrak	% Rendamen
n-Heksan	8,3 gr	1,38%
Etil Asetat	19,05 gr	3,175%
Etanol 96%	24 gr	4%
Air	4,15 gr	0.69%

2. Hasil Nilai IC50 Peredaman Radikal Bebas Ekstrak Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)

Tabel 2. Hubungan antara ekstrak daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dengan Aktivitas peredaman radikal bebas terhadap DPPH.

Ekstrak daun pedada	Absorbansi sampel	% penghambatan
Etil Asetat	0,0039	90
n-Heksan	0,0058	84
Etanol	0,0022	93
Air	0,0015	95

Dari hasil uji aktivitas perendaman radikal bebas ekstrak daun pedada dengan metode DPPH, dapat dilihat bahwa ekstrak yang berpotensi sebagai antioksidan adalah ekstrak etanol dengan nilai penghambatan yaitu 93 %, dan ekstrak air 95 %.

3. Identifikasi KLT

Tabel 3. Hasil identifikasi KLT ekstrak etanol daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)

No.	Ekstrak	UV 254 nm		UV 366 nm		Perbandingan
		Noda	N.Rf	Noda	N.Rf	
1.	Etanol 96%	-	-	1	0,84	Kloroform:Metanol 10:1
				2	0,75	
				3	0,62	
				4	0,51	
				5	0,22	

4. Fraksinasi Sampel

Tabel 4. Hasil fraksinasi kolom pertama daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)

No	Fraksi	Vial	Berat (gram)
1	F1	1-15	130 mg
2	F2	16-32	90 mg
3	F3	33-73	100 mg
4	F4	74-83	70 mg
5	F5	90-116	120 mg
6	F6	117-134	100 mg
7	F7	135-193	390 mg
8	F8	194-208	80 mg
9	F9	209-219	80 mg
10	F10	220-239	400 mg
11	F11	240-285	650 mg
12	F12	286-365	650 mg

Tabel 5. Hasil fraksinasi kolom kedua daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)

No	Fraksi	Vial	Berat (gram)
1	Fraksi 1	1-15	30 mg
2	Fraksi 2	16-32	20 mg

5. Hasil Nilai IC₅₀ Peredaman Radikal Bebas Hasil Fraksi Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.)

Tabel 6. Hubungan antara fraksi daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dengan

Aktivitas peredaman radikal bebas terhadap DPPH.

Fraksi Daun Pedada	Absorbansi Sampel	(%) Penghambatan
Fraksi F1	0,0045	88,5
Fraksi F2	0,0046	88,3
Fraksi F3	0,0043	89,08
Fraksi F4	0,0040	89,8
Fraksi F5	0,0041	89,5
Fraksi F6	0,0058	85
Fraksi F7	0,0042	89,3
Fraksi F8	0,0023	94,1
Fraksi 9	0,0029	92,6
Fraksi 10	0,0021	94,6
Fraksi 11	0,0015	95
Fraksi 12	0,0027	93,1

Tabel 7. Hubungan antara konsentrasi dari hasil isolat daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dengan aktivitas peredaman radikal bebas terhadap DPPH

Konsentrasi	Absorbansi Sampel	(%) Penghambatan	Persamaan garis regresi linear
50	0,3433	47,937	y=0,382+32,486 IC ₅₀ = 45,85 ppm
100	0,1583	77,979	
150	0.0997	86,134	

Tabel 8. Hubungan antara konsentrasi dengan aktivitas peredaman radikal bebas terhadap Asam Askorbat (Vit C).

Konsentrasi (bpj)	Absorbansi Sampel	(%) Penghambatan	Persamaan garis regresi linear
3	0,443	39,77	y= 4,6825 x + 34,06 IC ₅₀ = 3,4024 ppm
9	0,051	92,90	
15	0,029	95,96	

Tabel 9. Hasil identifikasi komponen kimia

Pereaksi	Jenis senyawa	Hasil
Dragendorf	Alkaloid	-
AlCl ₃	Flavonoid	+
Lieberman-Bouchard	Steroid	+
KOH	Khumarin	-
FeCl ₃	Fenol	+

Tabel 10. Hasil identifikasi isolat dengan spektrofotometri IR

No	Frekuensi	Rentang Frekuensi	Tipe Ikatan	Tipe Senyawa
1	3427,70 2926,22	3500 - 2400	O-H CH	Hidroksil

2	2361,93 1692,69 1458,87	2400 - 2000	C = O	Aldehyd Keton Amida Ester
3	1372,47 1244,43 1168,77 1044,01	2000 - 1500	C - O	Alkohol, eter Asam karboksilat

B. Pembahasan

Radikal bebas adalah atom yang memiliki satu atau lebih electron tidak berpasangan. Meskipun suatu radikal bebas tidak bermuatan positif atau negatif, spesis macam ini sangat reaktif karena adanya elektron tidak berpasangan. Suatu radikal bebas biasanya dijumpai sebagai zat antara yang sangat reaktif dan berenergi tinggi (Fessenden, 1992: 241).

Untuk meredam aktivitas radikal bebas diperlukan senyawa yang dapat menunda atau mencegah oksidasi atau disebut antioksidan. Salah satu golongan senyawa yang bersifat antioksidan yaitu golongan flavonoid. Senyawa-senyawa golongan flavonoid berpotensi sebagai antioksidan karena dapat mendonorkan elektron yang dimiliki untuk menstabilkan radikal dengan adanya gugus -OH yang terikat pada karbon cincin aromatik, produk radikal bebas terstabilkan secara resonansi dan tidak reaktif dengan kebanyakan radikal bebas lain.

Pengujian aktivitas peredaman radikal bebas senyawa-senyawa bahan alam atau sintetis dapat dilakukan secara reaksi kimia dengan menggunakan DPPH sebagai senyawa radikal bebas yang stabil dengan melihat proses peredaman panjang gelombang maksimumnya pada spektrofotometer UV-Vis. Peredaman warna ungu merah (absorbansi pada 517 nm) dikaitkan dengan kemampuan sebagai antiradikal bebas (*free radical scavenger*).

Sampel yang diujikan aktivitas peredaman radikal bebasnya yaitu Daun Pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang diekstraksi dengan metode maserasi bertingkat menggunakan pelarut Etil Asetat, n-Heksan, etanol 96% dan Air.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi bertingkat dengan menggunakan pelarut n-Heksan, etil asetat, etanol, dan air. Metode maserasi merupakan metode penyarian yang sederhana, mudah, dan tanpa melalui proses pemanasan, sehingga kemungkinan rusaknya komponen senyawa kimia dapat diminimalisir.

Setelah didapatkan ekstrak dari masing-masing pelarut selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi ekstrak daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.). pertama dilakukan pembuatan larutan stok DPPH, dengan menimbang DPPH sebanyak 15,77 mg dan dilarutkan dengan metanol p.a 100 ml, dipepet masing-masing larutan stok ekstrak sebanyak 0,1 ml, selanjutnya ditambahkan DPPH 1 ml, dan dicukupkan volumenya sampai 5 ml, hingga kadar masing-masing ekstrak 20 ppm, kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-VIS, Pengerjaan dilakukan dengan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat, Pengerjaan pun dilakukan dalam ruangan yang terhindar dari cahaya matahari langsung agar larutan sampel dan DPPH tetap stabil dikarenakan cahaya matahari dapat menguraikan larutan dan mempengaruhi hasil pengukuran. Setelah didapat ekstrak yang aktif atau yang memiliki antioksidan yang bagus, selanjutnya dilakukan proses fraksinasi dengan melakukan kromatografi kolom.

Fraksinasi dilakukan dengan kromatografi kolom, pertama ditimbang ekstrak etanol sebanyak 15 gram, selanjutnya kolom dibilas dengan pelarut metanol dan disiapkan vial sebanyak 400 vial, adapun perbandingan pelarut yang digunakan yaitu

kloroform:metanol (10:1), (5:1), (3:1) dan (1:1). setelah di peroleh hasil fraksi selanjutnya ditotol vial dengan diambil dari kelipatan lima, selanjutnya vial yang memiliki nilai Rf yang sama digabungkan dan dipeloleh hasil fraksi

Selanjutnya Dilakukan pengukuran absorbansi hasil fraksi daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) dengan spektrofotometri UV-VIS, dipepet masing-masing larutan stok ekstrak sebanyak 0,1 ml, selanjutnya ditambahkan DPPH 1 ml, dan dicukupkan volumenya sampai 5 ml, hingga kadar masing-masing ekstrak 20 ppm, kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-VIS, Pengerjaan dilakukan dengan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat, Pengerjaan pun dilakukan dalam ruangan yang terhindar dari cahaya matahari langsung agar larutan sampel dan DPPH tetap stabil dikarenakan cahaya matahari dapat menguraikan larutan dan mempengaruhi hasil pengukuran. Setelah diperoleh hasil fraksi yang aktif selanjutnya dilakukann kembali kromatografi kolom ke-2 untuk didapatkan senyawa isolat

Fraksinasi kolom kedua, pertama ditimbang hasil fraksi 500 mg, kolom dibilas dengan pelarut metanol dan disiapkan vial sebanyak 100 vial, adapun perbandingan pelarut yang digunakan yaitu kloroform:metanol (5:1). Setelah di peroleh hasil fraksi selanjutnya ditotol vial, dapat diamati baik secara langsung maupun dibawah sinar UV 254 nm dan UV 366 nm, untuk melihat adanya noda tunggal atau isolat dan dipeloleh hasil fraksi kolom kedua.

Hasil identifikasi dengan spektrofotometri IR terhadap isolat daun pedada adalah terdapat daerah panjang gelombang diantaranya pada panjang gelombang $3427,70\text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan adanya serapan melebar sebagai vibrasi regang O-H terikat yang khas untuk gugus hidroksil. Pada bilangan gelombang $2928,22\text{ cm}^{-1}$

memberi petunjuk adanya C-H. Serapan untuk gugus fungsi C=O terletak pada bilangan gelombang $1692,69\text{ cm}^{-1}$ sedangkan vibrasi yang tajam pada daerah bilangan gelombang $1168,77\text{ cm}^{-1}$ menandakan adanya vibrasi dari gugus C-H.

Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi hasil isolat, pertama dilakukan pembuatan larutan stok DPPH, dengan menimbang DPPH sebanyak 15,77 mg dan dilarutkan dengan metanol p.a 100 ml, dipepet masing-masing larutan stok sampel 0,25 ml, 0,5 ml dan 0,75 ml, ditambahkan DPPH 1 ml, dan dicukupkan volumenya sampai 5 ml, hingga kadarnya 50 ppm, 100 dan 150 ppm, selanjutnya diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37°C , kemudian dianalisis dengan spektrofotometri UV-VIS, dan dilakukan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Pengerjaan pun dilakukan dalam ruangan yang terhindar dari cahaya matahari langsung agar larutan sampel dan DPPH tetap stabil.

Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi Vit C (Asam askorbat) sebagai pembanding pertama dilakukan pembuatan larutan stok vit c, dengan menimbang vit c sebanyak 10 mg dan dilarutkan dengan metanol p.a 100 ml hingga kadar larutan stok 100 ppm, dipepet masing-masing larutan stok 0,15 ml, 0,45 ml, dan 0,75 ml, ditambahkan DPPH 1 ml, selanjutnya dicukupkan volumenya sampai 5 ml, hingga kadarnya 3 ppm, 9 ppm, dan 15 ppm. selanjutnya diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37°C , kemudian dianalisis dengan spektrofotometri UV-VIS. dan dilakukan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Pengerjaan pun dilakukan dalam ruangan yang terhindar dari cahaya matahari langsung agar larutan sampel dan DPPH tetap stabil.

Hasil menunjukkan bahwa ekstrak etanol dan air daun pedada (*Sonneratia caseolari* L.) memiliki aktivitas dalam meredam radikal bebas. Nilai IC_{50} dari hasil

isolat sebesar 45,85 ppm, dan nilai IC_{50} dari vit C adalah 3,4024 ppm. Menurut Cockell dan Knowland (1999) suatu senyawa dikatakan sebagai peredaman radikal bebas atau antioksidan yang sangat kuat jika nilai IC_{50} kurang dari 50 ppm, kuat (50 ppm-100 ppm), sedang (100 ppm-150 ppm), dan lemah (150 ppm-200 ppm).

Berdasarkan hasil yang diperoleh, ekstrak etanol daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Potensi aktivitas peredaman radikal bebas dari daun pedada (*Sonneratia caseolari* L.) adalah dasar untuk mengembangkan penggunaan antioksidan alami yang dapat digunakan dalam berbagai sediaan farmasetik guna menunjang kebutuhan antioksidan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) memiliki potensi Aktivitas peredaman radikal bebas yang sangat kuat , dibandingkan ekstrak n-Heksan, Etil asetat dan Air dengan metode DPPH.
2. Isolat daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) memiliki potensi Aktivitas peredaman radikal bebas yang sangat kuat dengan metode DPPH.
3. Isolat daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) memiliki potensi Aktivitas peredaman radikal bebas dengan metode DPPH, dengan nilai IC50 sebesar 45,85 ppm.
4. Hasil identifikasi senyawa daun pedada diduga mengandung senyawa flavonoid.
5. Dalam islam allah swt senantiasa memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada dimuka bumi, salah satunya adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, seperti daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.) yang dimanfaatkan sebagai obat antioksidan alami yang dapat menghambat radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia.

B. Implikasi Penelitian

Diharapkan pula adanya peneliti selanjutnya yang membuat formulasi sediaan ekstrak dan hasil isolat dari daun pedada (*Sonneratia caseolaris* L.).


DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementrian Agama RI. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013.
- Atun, Sri. *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam*. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur. Volume 8 No.2, 2014.
- Aveindo, P .and Serrano,A.E. *Effects of the apple mangrove (Sonneratia caseolaris) on growth, nutrient utilization and digestive enzyme activities of the black tiger shrimp Penaeus monodon postlarvae*. European Journal of Experimental Biology, 2012.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Depkes RI, 1979.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Depkes RI, 1995.
- Fajriah, dkk. *Isolasi Senyawa Antioksidan dari Ekstrak Etil Asetat Daun Benalu*. Jurnal Kimia Indonesia, 2007.
- Gordon, M.H. "The Mechanism of Antioxidants Action In Vitro". Di dalam Hudson, B.J.F. (Ed.). *Food Antioxidants. Elsevier Applied Science*. London-New York, 1990.
- Halliwell, B. and J.M.C. Gutteridge. *Role of free radical and catalytic logam ions in humans disease : An overview*. Meth. Enzymol, 1990. Langseth, L. Oxidants, "Antioxidants and Disease Prevention". *ILSI Europe, Belgium*, 1995.
- Herwinda, Muh. Amir M. *Aktivias Ekstrak dan Fraksi Dan Pidada Merah (sonneratia caseolaris L.) Sebagai Antioksidan*. Prosiding Seminar Nasional Kimia, 2013.


- Langseth, L. Oxidants, “*Antioxidants and Disease Prevention*”. ILSI Europe, Belgium, 1995.
- Middleton, E. C. Kandaswami, TC Theodorides. “*The Effect of Plant Flavonoids on Mammalian Cells: Implications for Inflammation, Heart Disease, and Cancer*”. *Pharmacological Reviews* 52, 1998.
- Prakash, Aruna, Fred Rigelhof and Eugene Miller. *Antioksidant Activity*. Medallion Laboratories, 2011.
- Reynertson, K.A. *Phytochemical Analysis of Bioactive Constituents from Edible Myrtaceae Fruit*. The City University of New York: New York, 2007.
- Rohman, A., Sugeng, R. dan Diah, U. “*Antioxidant Activities, Total Phenolic and Flavonoid Contents of Ethyl Acetate Extract of Mengkudu (Morinda citrifolia, L.) Fruit and Its Fractions*”. Fakultas Farmasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2005.
- Rubiyanto, Dwiwarso. *Teknik Dasar Kromatografi*. Yogyakarta: Depublish, 2016.
- Siburian, Robert. *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sukmadi, dkk. *Etiologi Tumbuhan Pedada (Sonneratia caseolaris (L) Engler 1997) Pada Kawasan Muara Angke Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*. Jurnal KKMN, 2008.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 12. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 3. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009
- Sayuti, Kesuma, M.S. *Antioksidan Alami dan Sintetik*. Padang: Andalas University Press, 2015.

- Tomlinson. *The Botany of Mangrove*. Cambridge U.K:Cambridge University Press, 1986.
- Widyastuti, N. “*Pengukuran Aktivitas Antioksidan Dengan Metode CUPRAC, DPPH dan FRAP Serta Korelasinya Dengan Fenol dan Flavonoid Pada Enam Tanaman*”. *Skripsi*. Bogor: Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Yulianis, dkk. *Isolasi senyawa dari Fraksi Eil Asetat Daun Pedada (Sonneratia caseolaris L.) dan Uji Aktifitas Antioksidan*. Prosiding Seminar Nasional dan Workshop “Perkembangan Sains Farmasin dan Klinik 5”, 2015.
- Zuhra, C.F, Tarigan, J. & Sihotang, H. *Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid dari Daun Katuk (Sauropus androgunus(L) Merr.)*. *Jurnal Biologi Sumatera*. ISSN : 1907-5537-3(1) : 7-10, 2008.

Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel dan Ekstraksi sampel (Maserasi Bertingkat).






Lampiran 2. Skema Fraksinasi Kromatografi Kolom


Lampiran 3. Skema Penyiapan larutan

a. Pembuatan larutan stok


1. Pembuatan larutan stok Ekstrak



b. Pembuatan larutan control (Vitamin C)




c. Pembuatan larutan uji DPPH




Lampiran 4. Skema Pengukuran Absorbansi perendaman radikal menggunakan Spektrofotometri UV-VIS


a. Untuk Uji Ekstrak




b. Untuk uji Fraksi




c. Untuk Uji Isolat



d. Untuk Uji Larutan Control



Lampiran 5. Identifikasi Golongan Senyawa



Lampiran 6. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Isolat

Dik : 10 mg (10 x 1000) = 10.000 μ L

10 ml metanol p.a

$$\text{Ppm} = \frac{\mu\text{L}}{\text{mL}} = \frac{10.000 \mu\text{L}}{10 \text{ mL}} = 1000 \text{ ppm}$$

Untuk 50 ppm \longrightarrow $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 50 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{75 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,25 \text{ ml} = 250 \mu\text{L}$$

Untuk 100 ppm \longrightarrow $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{125 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,5 \text{ ml} = 500 \mu\text{L}$$

Untuk 150 ppm \longrightarrow $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 150 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{125 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,75 \text{ ml} = 750 \mu\text{L}$$

Lampiran 7. Perhitungan Konsetrasi dan Pengenceran Vit. C

Dik : 10 mg (10 x 1000) = 10.000 μ L

100 ml metanol p.a

$$\text{Ppm} = \frac{\mu\text{L}}{\text{mL}} = \frac{10.000 \mu\text{L}}{100 \text{ mL}} = 100 \text{ ppm}$$

Untuk 3 ppm \longrightarrow $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$
 $V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 3 \text{ ppm}$
 $V_1 = \frac{15 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,15 \text{ ml} = 150 \mu\text{L}$

Untuk 9 ppm \longrightarrow $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$
 $V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 9 \text{ ppm}$
 $V_1 = \frac{45 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,45 \text{ ml} = 450 \mu\text{L}$

Untuk 15 ppm \longrightarrow $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$
 $V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 15 \text{ ppm}$
 $V_1 = \frac{75 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,75 \text{ ml} = 750 \mu\text{L}$

Lampiran 8. Perhitungan penyiapan larutan

1. DPPH

$$\begin{aligned}
 0,4\text{mM} &= \frac{4 \times 10^{-4} \text{mol}}{L} \\
 &= \frac{4 \times 10^{-7} \text{mol}}{\text{ml}} \\
 4 \times 10^{-7} \text{mol} &= \frac{g}{BM} \\
 4 \times 10^{-7} \text{mol} &= \frac{g}{394,32 \frac{g}{BM}} \\
 \text{Massa} &= 4 \times 10^{-7} \text{mol} \cdot (394,32 \text{ g/mol}) \\
 \text{Massa/mL} &= 0,0001577 \text{ g} \\
 \text{Massa/100 mL} &= 0,01577 \text{ g} \\
 &= 15,77 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

DPPH diambil sebanyak 15,77 mg dan dicukupkan volumenya hingga 100 ml Menggunakan metanol p.a.

Lampiran 9. Perhitungan % penghambatan untuk uji antioksidan pada ekstrak dan isolat dengan menggunakan DPPH

1. Ekstrak

$$\text{n- Heksan} = \frac{0,0361-0,0057}{0,0361} \times 100 = 84\%$$

$$\text{Etil Asetat} = \frac{0,0361-0,0035}{0,0361} \times 100 = 90\%$$

$$\text{Etanol} = \frac{0,0361-0,0022}{0,0361} \times 100 = 93\%$$

$$\text{Air} = \frac{0,0361-0,0015}{0,0361} \times 100 = 95\%$$

2. Isolat

$$\text{Konsentrasi 50 bpj} = \frac{0,719-0,3743}{0,719} \times 100 = 47,942\%$$

$$\text{Konsentrasi 100 bpj} = \frac{0,719-0,1583}{0,719} \times 100 = 77,983\%$$

$$\text{Konsentrasi 150 bpj} = \frac{0,719-0,1128}{0,719} \times 100 = 84,312\%$$

3. Vit C

$$\text{Konsentrasi 3 bpj} = \frac{0,719-0,433}{0,719} \times 100 = 39,77\%$$

$$\text{Konsentrasi 9 bpj} = \frac{0,719-0,051}{0,719} \times 100 = 92,90\%$$

$$\text{Konsentrasi 15 bpj} = \frac{0,719-0,029}{0,719} \times 100 = 95,96\%$$


Lampiran 10. Perhitungan Absorbansi

a. Pengukuran absorbansi ekstrak daun pedada

Ekstrak	n- Heksan	Etil Asetat	Etanol	Air
Absorbansi	0,0057	0,0029	0,0021	0,0016
	0,0057	0,0038	0,0023	0,0015
	0,0058	0,0039	0,0022	0,0015
Rata – rata	0,0057	0,0035	0,0022	0,0015

b. Pengukuran absorbansi Isolat daun pedada


Konsentrasi	50	100	150
Absorbansi	0,4240	0,2170	0,0997
	0,3790	0,1320	0,0997
	0,3203	0,1260	0,0997
Rata-rata	0,37433	0,15833	0,0997



Gambar % Penghambatan Isolat

c. Pengukuran Absorbansi Vit C

Konsentrasi	3	9	15
Absorbansi	0,4340	0,0470	0,0270
	0,4420	0,0520	0,0290
	0,4520	0,0550	0,0310
Rata-rata	0,4430	0,0510	0,0290



Gambar kurva % Penghambatan VIT C

Lampiran 11. Perhitungan Nilai IC₅₀1. Nilai IC₅₀ Isolat

$$y = 0,382 + 32,486x$$

$$50 = 0,382 + 32,486x$$

$$X = \frac{50 - 32,486}{0,382}$$

$$X = 45,84$$

$$IC_{50} = 45,84 \text{ ppm}$$

2. Nilai IC₅₀ Vit C

$$y = 4,6825x + 34,068$$

$$50 = 4,6825x + 34,068$$

$$X = \frac{50 - 34,068}{4,6825}$$

$$X = 3,4024$$


$$IC_{50} = 3,4024 \text{ ppm}$$

Lampiran 12. Gambar**Gambar 1. Tumbuhan pedada (*Sonneratia caseolaris*)**

Keterangan : Morfologi tumbuhan pedada

**Gambar 2. Ekstrak daun pedada**

- 1 : Ekstrak n-heksan
- 2 : Ekstrak etanol
- 3 : Ekstrak etil asetat
- 4 : Ekstrak air



Gambar 5. Kromatografi lapis tipis

Keterangan :

A : Proses pencarian profil KLT


B : Profil KLT dilihat pada UV 366 nm

C : Profil KLT setelah disemprot serum sulfat

D : Profil KLT dilihat pada UV 254 nm

Fase Gerak : Kloroform : Metanol (10 : 1)



Fase Diam : Silika Gel GF₂₅₄




Gambar 6. Proses koromatografi kolom

1 : Proses fraksinasi menggunakan kromatografi kolom

2 : Hasil fraksinasi







Gambar 6. Penggabungan hasil fraksi

Keterangan

- 1 : Profil KLT fraksi dilihat pada UV 254 nm
 2 : Profil KLT fraksi dilihat pada UV 366 nm
 3 : Profil KLT setelah disemprot serum sulfat

4 : Hasil penggabungan fraksi



Gambar 6. Alat instrumen

Keterangan

1 : Hasil identifikasi spektrofotometri IR isolat daun pedada

2 : Alat spektrofotometri UV-VIS

3 : Alat spektrofotometri IR

RIWAYAT HIDUP



NURDIA. Dilahirkan Di sinjai pada tanggal 04 Juli 1995 anak ke-dua dari dua bersaudara, yang merupakan buah kasih dari pasangan Amrullah dan ST.Sudarmi.,S.Pd.

Pada Tahun 2001 mulai masuk pada pendidikan dasar tepatnya SD Negeri 30 sinjai timur dan berhasil tamat pada tahun 2007. Pada Tahun yang sama (2007) melanjutkan pendidikan Di SMP Negeri 2 Sinjai timur dan berhasil tamat pada tahun 2010. Pada Tahun yang sama (2010) melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 sinjai dan berhasil tamat pada tahun 2013. Pada Tahun 2013 .Mendaftarkan diri diperguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) melalui jalur Mandiri dengan pilihan Jurusan Farmasi.