

**EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BELUNTAS (*Pluchea indica* Linn)
SEBAGAI LARVASIDA *Aedes aegypti* INSTAR III**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*

OLEH:

NUR AFIATY MURSALIM

70200111055

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea Indica Linn*) Sebagai Larvasida *Aedes Aegypti* Instar III” yang disusun oleh **Nur Afiaty Mursalim, NIM: 70200111055**, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 28 Februari 2017 M bertepatan pada 1 Jumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu kesehatan, jurusan kesehatan masyarakat.

Makassar, 28 Februari 2017 M
1 Jumadil Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes (.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Susilawaty, M.Kes (.....)

Pembimbing II : Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes (.....)

Penguji I : Muhammad Saleh Jastam, SKM.,M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

M A K A S S A R

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Sesungguhnya, segala puji hanya bagi Allah, karena atas kuasa-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga tak lupa pula shalawat dan salam terhanturkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah yang gelap menuju tempat yang terang benderang.

Telah banyak suka mau pun duka yang penulis alami untuk merampungkan tugas akhir guna menggapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. Suka dan duka yang dialami kemudian menjadi kenangan untuk di masa mendatang.

Terkhusus dan teristimewa setelah Allah dan Rasul-Nya, penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua. Kepada Ibunda Dra. Hj. St. Suarni S yang banyak memberikan tindakan nyata untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi yang tidak mudah dan penuh hambatan ini, serta Ayahanda tercinta Drs. Mursalim, M.Si yang tidak pernah lupa menyelipkan nama penulis dalam doa beliau. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada mereka.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan dengan hormat oleh penulis terhadap semua pihak, terutama :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si, selaku Rektor terpilih UIN Alauddin Makassar serta jajarannya wakil rektor I, II, dan III.
2. Dr. dr. Armyn Nurdin M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta jajarannya wakil dekan I, II, dan III

3. Muh. Hasbi, SKM, M.Kes selaku ketua jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Andi Susilawaty, M.Kes dan Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis sehingga rampung skripsi ini.
5. Muhammad Saleh Jastam, SKM.,M.Kes selaku penguji akademik dan Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag selaku penguji integrasi agama yang telah memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Para dosen fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat khususnya peminatan Kesehatan Lingkungan. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin yang telah membantu penulis dalam administrasi.
7. Laboran dan Asisten laboran jurusan Farmasi yang telah membantu penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Saudara-saudaraku Muh. Afdhal Mursalim, Muh. Abrar Mursalim, dan Nur Afifah Mursalim yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan tenaga dan pikirannya yang diberikan kepada penulis sampai skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Seluruh tentor LBB Gadjahmada khususnya Tim Motivator G21H, Wanda Wulandari, Firman Rizaldy, Tri Endar Yogi, Maghfirah, Akbar Djafar, Janhar Marsus, dan Sakinah yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

10. Sahabat-sahabat terbaik yang penulis miliki Syahrini Sarmin, Aswarin Prastiani, Sukraeni, Sukarni, Nirwana, yang tiada henti menghibur ketika penulis kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman tercinta angkatan 2011 jurusan kesehatan masyarakat UIN Alauddin Makassar khususnya peminatan Kesehatan Lingkungan yang telah menjadi teman seperjuangan.
12. Senior-senior dan junior-junior di jurusan Kesehatan Masyarakat fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini bisa dirampungkan, karena tanpa bantuan mereka penulis tidaklah mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, Februari 2017

Penulis,

Nur Afiaty Mursalim
NIM. 70200111055

DAFTAR ISI

Sampul	i
Penyataan Keaslian Skripsi	ii
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii-v
Daftar Isi.....	vi-vii
Daftar Tabel	viii-ix
Daftar Gambar.....	x-xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional & Ruang Lingkup Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14-50
A. Daun Beluntas	13
B. Nyamuk <i>Aedes sp</i>	24
C. Peran Nyamuk dalam Penularan DBD.....	36
D. Pengendalian Vektor	39
E. Larvasida sebagai Insektisida Pengendali Nyamuk	44
F. Ekstraksi.....	47
G. Kerangka Teori.....	50
H. Kerangka Konsep.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51-59
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Populasi, Sampel, & Teknik Pengambilan Sampel.....	53

D. Variabel Penelitian	53
E. Instrumen Penelitian	54
F. Metode Pengumpulan Data	57
G. Validitas & Reliabilitas	57
H. Rancangan Penelitian	58
I. Analisis Data	59
J. Alur Penelitian	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61-93
A. Hasil Penelitian	61
B. Pembahasan	80
BAB V PENUTUP.....	94-95
A. Kesimpulan	94
B. Implikasi Penelitian	95
KEPUSTAKAAN	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>)	61
Tabel 2	Hasil Pengukuran Suhu Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) Sebelum Perlakuan	62
Tabel 3	Hasil Pengukuran pH Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) Sebelum Perlakuan	62
Tabel 4	Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Berbagai Konsentrasi selama 60 Menit	63
Tabel 5	Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Berbagai Konsentrasi selama 120 Menit	65
Tabel 6	Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Berbagai Konsentrasi selama 240 Menit	66
Tabel 7	Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Berbagai Konsentrasi selama 480 Menit	68
Tabel 8	Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Berbagai Konsentrasi selama 1440 Menit	70
Tabel 9	Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> dengan Berbagai Konsentrasi Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) Berdasarkan Lama Pajanan	71
Tabel 10	Hasil <i>Model Summary</i> Uji Regresi Linier Hubungan Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Kematian Larva <i>Aedes sp</i>	74

Tabel 11	Hasil <i>Anova</i> Uji Regresi Linier Hubungan Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Kematian Larva <i>Aedes sp</i>	74
Tabel 12	Hasil <i>Coefficient</i> Uji Regresi Linier Hubungan Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Kematian Larva <i>Aedes sp</i>	75
Tabel 13	Hasil <i>Model Summary</i> Uji Regresi Linier Hubungan Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Kematian Larva <i>Aedes sp</i>	76
Tabel 14	Hasil <i>Anova</i> Uji Regresi Linier Hubungan Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Kematian Larva <i>Aedes sp</i>	77
Tabel 15	Hasil <i>Coefficient</i> Uji Regresi Linier Hubungan Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) dengan Kematian Larva <i>Aedes sp</i>	78
Tabel 16	Hasil Uji Probit Lethal Concentration 50% dan Lethal Concentration 90% Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) selama 1440 menit	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Daun Beluntas (<i>Pluchea indica</i> Linn)	14
Gambar 2	<i>Aedes aegypti</i>	24
Gambar 3	<i>Aedes albopictus</i>	24
Gambar 4	Siklus Hidup <i>Aedes sp</i>	25
Gambar 5	Telur <i>Aedes sp</i>	27
Gambar 6	Larva <i>Aedes sp</i>	28
Gambar 7	Pupa <i>Aedes sp</i>	30
Gambar 8	Nyamuk Dewasa <i>Aedes sp</i>	31
Gambar 9	Skema Kerangka Teori.....	50
Gambar 10	Kerangka Konsep	50
Gambar 11	Desain Penelitian.....	51
Gambar 12	Alur Penelitian	60
Gambar 13	Grafik Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Konsentrasi selama 60 menit.....	64
Gambar 14	Grafik Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica</i> Linn) dalam Berbagai Konsentrasi selama 120 menit.....	66
Gambar 15	Grafik Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica</i> Linn) dalam Berbagai Konsentrasi selama 240 menit.....	67
Gambar 16	Grafik Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica</i> Linn) dalam Berbagai Konsentrasi selama 480 menit.....	69
Gambar 17	Grafik Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica</i> Linn) dalam Berbagai Konsentrasi selama 1440 menit.....	71

Gambar 18	Grafik Persentase Kematian Larva <i>Aedes sp</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>) Berdasarkan Lama Pajanan	72
-----------	--	----

ABSTRAK

Nama : Nur Afiaty Mursalim
NIM : 70200111055
Judul : **EFEKTIVITAS EKTRAK DAUN BELUNTAS (*Pluchea indica* Linn) SEBAGAI LARVASIDA *Aedes sp* INSTAR III**

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus *dengue* di kawasan Asia Tenggara pertama kali dijumpai di Filipina pada tahun 1953. Di Indonesia, DBD merupakan masalah kesehatan yang hingga saat ini belum dapat diatasi sejak 37 tahun yang lalu. Demam berdarah adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus *dengue*, yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes sp*. Penyakit ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis, dan menjangkit luas di banyak negara di Asia Tenggara. Terdapat empat jenis virus *dengue*, masing-masing dapat menyebabkan demam berdarah, baik ringan maupun fatal. Tanaman Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) merupakan tanaman yang diketahui memiliki kegunaan sebagai larvasida berdasarkan kandungan flavonoid, saponin, dan tanin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun beluntas (*Pluchea indica* Linn) terhadap kematian larva *Aedes sp* instar III.

Penelitian ini menggunakan metode Eksperimental Laboratorium dengan Rancangan penelitian *Post Test Only Control Group Design*, menggunakan 450 larva *Aedes sp*. instar III dibagi menjadi 6 kelompok (kelompok kontrol positif, kontrol negatif, ekstrak 0,25%, ekstrak 0,50%, ekstrak 0,75%, ekstrak 1,00%, dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Pengamatan dilakukan pada menit ke- 5, 10, 20, 40, 60, 120, 240, 480, 1440, 2880, dan 4230. Data dianalisis dengan *SPSS for Windows Release 21.0*.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan kuat antara peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas (*Pluchea indica* Linn) dan lama pajanan terhadap kematian larva *Aedes sp* instar III ditunjukkan dengan nilai $p=0,000<0,05$. Peningkatan konsentrasi dan lama pajanan ekstrak menyebabkan persentase kematian larva *Aedes sp* meningkat. Hasil uji probit menunjukkan estimasi nilai LC50 pada konsentrasi 0,975% dan nilai LC90 pada konsentrasi 12,779%.

Berdasarkan hasil penelitian maka perlu dilakukan eksperimen lebih lanjut untuk penggunaan ekstrak daun beluntas (*Pluchea indica* Linn) yang lebih praktis dan mudah serta penelitian lebih mendalam tentang zat yang paling berpengaruh sebagai larvasida.

Kata Kunci: *Aedes sp*, Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn), *Lethal Concentration*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus *dengue* di kawasan Asia Tenggara pertama kali dijumpai di Filipina pada tahun 1953. Di Indonesia, DBD merupakan masalah kesehatan yang hingga saat ini belum dapat diatasi sejak 37 tahun yang lalu (Margo dan Utomo, 2015).

Demam berdarah adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus *dengue*, yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes sp.* Penyakit ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis, dan menjangkit luas di banyak negara di Asia Tenggara. Terdapat empat jenis virus *dengue*, masing-masing dapat menyebabkan demam berdarah, baik ringan maupun fatal.(Soegijanto, Soegeng, 2006).

Penyakit ini sangat umum ditemui di Indonesia. Lingkungan alam tropis, sanitasi buruk, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi alasan utama. Indonesia bahkan menempati posisi tertinggi dalam kasus penyakit *Dengue* di Asia Tenggara dengan lebih dari 10.000 kasus pada tahun 2011 (Tri dan Bondan, 2013).

WHO memperkirakan sebanyak 2.5 sampai 3 milyar penduduk dunia berisiko terinfeksi virus *dengue* dan setiap tahunnya terdapat 50-100 juta penduduk dunia terinfeksi *dengue*, 500 ribu diantaranya membutuhkan perawatan intensif di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tahun dilaporkan

21.000 anak meninggal karena DBD atau setiap 20 menit terdapat satu orang yang meninggal (Profil Kesehatan Kota Makassar, 2015).

Jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang terjangkit DBD pada tahun 2008 sekitar 355 kab/kota (71,72%), tahun 2009 sekitar 384 kab/kota (77,28%), tahun 2010 sekitar 400 kab/kota (80,48%) , tahun 2011 sekitar 374 kab/kota (76,25%), tahun 2013 sekitar 374 kab/kota (76,25%) dengan jumlah penderita DBD mencapai 65.432 kasus, sekitar 596 orang diantaranya meninggal dunia (Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2011 *dalam* Handayani dkk, 2013). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan DBD di Indonesia hingga saat ini belum optimal karena jumlah kasus cenderung meningkat setiap tahunnya (Handayani dkk, 2015).

Pada tahun 2015 angka kejadian DBD di Indonesia masih cukup tinggi, dari 497 kabupaten/kota yang terdapat di seluruh Indonesia masih terdapat kasus DBD pada 374 kabupaten/kota yang tersebar di pelbagai macam propinsi dengan jumlah kasus total 65.432 dan jumlah kasus meninggal 595 jiwa (Ditjen PP&PL,2014 *dalam* Raden dkk, 2015).

Menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2015, kasus demam berdarah terjadi di 32 provinsi di Indonesia dengan penderita 58.985 orang, 450 orang meninggal dunia (Kemenkes RI, 2015).

Dinas Kesehatan Provinsi Makassar juga melaporkan, jumlah penderita DBD di seluruh wilayah puskesmas di Kota Makassar, pada tahun 2014 sebanyak 304 kasus dengan Angka Kesakitan/IR = 19,6 per 100.000 penduduk diantaranya terdapat 15 kasus kematian karena DBD , jumlah

tersebut meningkat dibanding tahun 2013 sebanyak 90 kasus dengan Angka Kesakitan/IR 6,3 per 100.000 penduduk dan terdapat 6 kematian (Ditjen P2PL Kota Makassar, 2013 dalam Profil Kesehatan Kota Makassar, 2015).

Penggunaan insektisida kimiawi seperti DDT (*Dichloro Diphenyl Trichloroethane*), etilheksanol, temephos (abate), dan berbagai senyawa sintetik lainnya (Arif, 2011; Suwanbamrung, 2009, dalam Pratiwi, 2014), secara berulang akan menimbulkan dampak kontaminasi residu pestisida dalam air, terutama air minum. Selain itu, biaya yang tinggi dari penggunaan insektisida kimiawi dan munculnya resistensi dari berbagai macam spesies nyamuk yang menjadi vektor penyakit menjadi perhatian penting yang harus dicermati (Ndione RD, 2007 dalam Nanang, dkk, 2015).

Larvasida alami relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Larvasida alami bersifat *hit and run*, yaitu apabila diaplikasikan akan membunuh hama pada waktu itu dan setelah hamanya terbunuh akan cepat menghilang di alam (Amalia, 2008; Novizan, 2002 dalam Ameliana 2015).

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai larvasida alami adalah Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*). Dewasa ini, penelitian tentang ekstrak etanol Daun Beluntas yang berpotensi sebagai insektisida nabati telah banyak dilaporkan. Menurut Susanti (2008) ekstrak etanol beluntas (*Pluchea indica Linn*) dapat berfungsi sebagai antibakteri, sehingga dapat mencegah produk makanan dari kerusakan. Diyakini ekstrak beluntas yang dapat menyebabkan keracunan pada bakteri juga berpotensi menjadin racun bagi *Callosobruchus*

chinensis L. Biswas, *et al.*, (2007) menjelaskan ekstrak beluntas dapat bersifat antiamuba, karena dapat membunuh *Entamoeba histolytica*. Khasiat yang dimiliki oleh suatu tanaman dihasilkan dari kandungan bahan aktif yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Menurut Asimayu (2003), daun beluntas mengandung alkaloid, tanin, natrium, minyak atsiri, kalsium, flavonoid, magnesium, fosfor, asam amino (leusin, triptofan, treonin), vitamin A dan C (Asimayu, 2004 dalam Yana Sukaryana dan Y. Priabudiman 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti dan menguji apakah daun beluntas (*Pluchea indica* Linn) efektif dalam mematikan larva *Aedes aegypti*. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol beluntas (*Pluchea indica* Linn) terhadap kematian larva *Aedes aegypti* instar III.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah Apakah Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) Efektif sebagai Larvasida *Aedes aegypti* Instar III?

C. Hipotesis

H₀: Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) Tidak Efektif Sebagai Larvasida Nyamuk *Aedes aegypti* Instar III.

H_a : Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) Efektif Sebagai Larvasida Nyamuk *Aedes aegypti* Instar III.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Hasil Ukur	Skala
Efektivitas ekstrak	Keberhasilan Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica</i> Linn) mematikan larva ditunjukkan dengan nilai LC ₅₀ dan LC ₉₀	Numerik	Rasio
Kadar Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica</i> Linn)	Jumlah konsentrasi ekstraksi daun beluntas yang digunakan	Numerik	Rasio
Larva <i>Aedes sp</i> Instar III	Larva yang berukuran 4-5 mm	Numerik	Rasio
Mortalitas larva <i>Aedes sp</i> Instar III	Banyaknya larva <i>Aedes sp</i> yang dianggap mati dengan kriteria: larva tidak bergerak atau merespon terhadap rangsang	Numerik	Rasio
Lethal Concentration 50 (LC ₅₀)	Konsentrasi larvasida yang menyebabkan kematian 50% hewan Uji	Numerik	Rasio
Lethal Concentration 90 (LC ₉₀)	Konsentrasi larvasida yang menyebabkan kematian 90% hewan Uji	Numerik	Rasio
Lama pajanan	Lama waktu terpajan hewan uji terhadap ekstrak dalam satuan menit	Numerik	Rasio

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2016

b. Lingkup Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Farmasi UIN Alauddin Makassar.

E. Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Danang Setia Budi, et al (2014)	Saat Parasit Membasmi Parasit : Uji Efektivitas Ekstrak Benalu Sebagai Terapi Malaria Baru	Ekstrak Dendrophthoe pentandra	Eksperimental Quasi dengan rancangan percobaan postest only with non equivalent control group	Biakan <i>P. falciparum</i> strain FCR-3 dan sel Vero	<i>Dendrophthoe pentandra</i> memiliki aktivitas antiplasmodium yang baik terhadap <i>P. falciparum</i> FCR-3 dengan nilai IC50 sebesar 45,4 µg/mL untuk ekstrak air dan 169,7 µg/mL untuk ekstrak etanol
2	Eka Cania, et al (2014)	Uji Efektifitas Ekstrak Daun Legundi (<i>Vitex trifolia</i>) Terhadap Larva <i>Aedes aegypti</i>	Ekstrak Daun Legundi (<i>Vitex trifolia</i>) dan Larva <i>Aedes aegypti</i>	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	25 ekor larva instar III <i>Aedes aegypti</i>	Ekstrak daun legundi (<i>Vitex trifolia</i>) memiliki efektivitas larvasida terhadap larva <i>Aedes aegypti</i> instar III. Konsentrasi ekstrak daun legundi (<i>Vitex trifolia</i>) yang paling efektif dalam membunuh larva <i>Aedes aegypti</i> instar III adalah konsentrasi 1%.

3	Ismatullah A, et al (2015)	Uji Efektivitas Larvasida Ekstrak Daun Binahong (<i>Anredera Cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap Larva <i>Aedes Aegypti</i> Instar III	Ekstrak Daun Binahong (<i>Anredera Cordifolia</i> (Ten.) Steenis) dan Larva <i>Aedes Aegypti</i> Instar III	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	Larva instar III <i>Aedes aegypti</i>	Ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) memiliki efektivitas yang lebih rendah dalam membunuh larva <i>Aedes aegypti</i> instar III dibandingkan abate 1%.
4	Raden Adityo HPP, et al (2014)	Uji Efek Fraksi Ekstrak Batang Kecombrang (<i>Etilingera elatior</i>) Sebagai Larvasida Terhadap Larva Instar III <i>Aedes aegypti</i>	Fraksi <i>Metanol</i> Ekstrak Batang Kecombrang (<i>Etilingera elatior</i>) dan Terhadap Larva Instar III <i>Aedes aegypti</i>	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	20 ekor larva instar III <i>Aedes aegypti</i>	fraksi metanol ekstrak batang kecombrang (<i>Etilingera elatior</i>) memiliki efek sebagai larvasida terhadap larva <i>Aedes aegypti</i> instar III. Semakin tinggi konsentrasi semakin tinggi pula rerata kematian larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> .
5	Erwin Nofyan, et al (2014)	Ekspolrasia Dari Tumbuhan Untuk Pengendalian Larva Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i> di Sumatera Selatan	Biolarvasida Tumbuhan di Sumatera Selatan dan Larva Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i>	Survei dan Ekperimen	250 gram simpilisida tumbuhan dan 30 ekor larva instar III <i>Aedes aegypti</i>	3 jenis tumbuhan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber biolarvasida yaitu tumbuhan Babadotan, Bunga kenanga dan rimpang lengkuas putih.
6	Rofima Manurung, et al (2014)	Pengaruh Daya Tolak Perasan Serai Wangi (<i>Cymbopogon</i>) terhadap Larva Nyamuk	Serai Wangi (<i>Cymbopogon nardus</i>) dan Gigitan Nyamuk	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	240 ekor nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dewasa	konsentrasi yang efektif yang digunakan sebagai <i>repellent</i> adalah minimal konsentrasi 3%.

		<i>on nardus)</i> Terhadap Gigitan Nyamuk <i>Aedes</i> <i>aegypti</i>	<i>Aedes</i> <i>aegypti</i>			Semakin tinggi konsentrasi perasan serai wangi (<i>Cymbopogon nardus</i>) maka semakin baik digunakan sebagai <i>repellent</i> . Kepada masyarakat dianjurkan untuk menggunakan perasan serai wangi sebagai <i>repellent</i> dengan konsentrasi minimal 3%.
7	Sonja V.T. Lumowa (2013)	Pengaruh Mat Serbuk Bunga Sukun (<i>Artocarpus altilis</i> L.) Sebagai isi Ulang Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> .	Mat Serbuk Bunga Sukun (<i>Artocarpus altilis</i> L.) dan Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	20 ekor nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dewasa	Bunga sukun (<i>Artocarpus altilis</i> L.) berpengaruh terhadap pengendalian nyamuk <i>Aedes aegypti</i> yaitu dibuktikan dengan menggunakan dengan uji anava satu arah maka hasilnya Ftabel (198,26) > Fhitung (4,33) dan ditandai dengan kematian nyamuk <i>Aedes aegypti</i> saat dilakukan pengujian dengan kadar bunga sukun (0,5 gr, 1 gr, 1,5 gr, 2 gr). Kadar bunga sukun yang paling banyak membunuh nyamuk adalah kadar 2 gr yaitu membunuh nyamuk rata-rata 15,6 ekor dengan presentase kematian nyamuk sebesar 78%.
8	Handayani, et al (2014)	Efektivitas Ekstrak Daun Sirih (<i>Piper batle</i>	Ekstrak Daun Sirih (<i>Piper batle</i> L.)	Pre-Eksperimet dengan Rancangan <i>the</i>	Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Ekstrak daun sirih terbukti efektif sebagai bioinsektisida terhadap nyamuk

		L,)sebagai Bioinsektisi da Terhadap Kematian Nyamuk Aedes aegypti	danNyamuk Aedes aegypti	<i>static-group comparison</i>		<i>Aedes aegypti</i> mulai pada konsentrasi 1000 ppm, lama waktu kontak yang dibutuhkan agar dapat membunuh nyamuk <i>Aedes aegypti</i> yaitu selama 45 menit.
9	Roy Nusa Rahagus Edo Santya, et al (2014)	Daya Proteksi Ekstrak Kulit Jeruk Purut (Citrus hystrix) terhadap Nyamuk Demam Berdarah	Ekstrak Kulit Jeruk Purut (Citrus hystrix) dan Nyamuk Demam Berdarah	Eksperimen Murni	25 ekor nyamuk Ae.(Aedes) aegypti dan Ae. Albopictus betina kenyang gula	Kulit jeruk purut mampu menolak nyamuk <i>Ae. aegypti</i> maupun <i>Ae. albopictus</i> . Meskipun kemampuan daya tolak kulit jeruk ini tidak seefektif bahan kimia namun bahan alami ini diharapkan lebih aman untuk digunakan, khususnya pada individu yang peka terhadap DEET.
10	Mutiara Wildawati, et al (2015)	Analisis Pengaruh Ekstraksi Non-Polar Batang Pohon Tanjung (Mimusops Elengi L.) terhadap Larva Aedes aegypti	Ekstraksi Non-Polar Batang Pohon Tanjung (Mimusops Elengi L.) dan Larva Aedes aegypti	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	Larva <i>Aedes aegypti</i> instar 4	Adanya aktivitas ekstrak batang pohon Tanjung (<i>Mimusops elengi</i>) terhadap larva <i>Aedes aegypti</i> , sehingga tanaman ini mempunyai potensi sebagai larvasida.
11	Siti Aisah, et al (2015)	Potensi Ekstrak Biji Bengkuang (<i>Pachyrrhizus erosus urb.</i>) sebagai Larvasida Aedes aegypti L. Instar III	Ekstrak Biji Bengkuang (<i>Pachyrrhizus erosus urb.</i>) dan Aedes aegypti L. Instar III	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	20 ekor larva <i>Aedes aegypti</i> instar III	Ekstrak biji bengkuang (<i>P. erosus</i>) mengakibatkan adanya efek sublethal pada larva <i>A. aegypti</i> , terlihat dari adanya kerusakan morfologi larva berupa rusaknya kepala (cephal), dada (thorak), perut (abdomen), anal gill,

						dan hilangnya rambut-rambut yang terdapat pada sisi tubuhnya. Posisi larva yang mengalami kematian berada di dasar media. Gerakan larva mengalami penurunan dari tiap 6 jam sampai 24 jam.
12	Nanang Hidayatulloh, et al (2014)	Efektivitas Pemberian Ekstrak Ethanol 70% Akar Kecombrang (<i>Etlingera elatior</i>) Terhadap Larva Instar III <i>Aedes aegypti</i> sebagai Biolarvasida Potensial	Ekstrak Ethanol 70% Akar Kecombrang (<i>Etlingera elatior</i>) Terhadap Larva Instar III <i>Aedes aegypti</i> sebagai Biolarvasida Potensial	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	Larva <i>Aedes aegypti</i> Instar III.	Ekstrak akar Kecombrang (<i>Etlingera elatior</i>) mempunyai efek sebagai larvasida terhadap larva <i>Aedes aegypti</i> instar III dengan konsentrasi efektif sebesar 1%.
13	Lasmini Nangune, et al (2015)	Pengaruh Filtrat Daun Tanaman Bunga Pagoda (<i>Clerodendrum squamatum</i> Vahl) terhadap Mortalitas Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Filtrat Daun Tanaman Bunga Pagoda (<i>Clerodendrum squamatum</i> Vahl) dan Mortalitas Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	250 larva instar III <i>Aedes aegypti</i>	Filtrat daun tanaman bunga pagoda berpengaruh terhadap mortalitas larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dan Konsentrasi yang efektif terhadap mortalitas larva <i>Aedes aegypti</i> adalah 5 %.
14	Koeh Peter Kiplang, et al (2015)	Repellent Activities of Ocimum basilicum, Azadirachta indica and	Ekstrak basilicum, Azadirachta indica and Eucalyptus citriodora	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	50 nyamuk dewasa	<i>Ocimum basilicum</i> and <i>Eucalyptus citriodora</i> dapat menjadi alternatif ekstrak <i>Chrysanthemum</i>

		Eucalyptus citriodora Extracts on Rabbit Skin against Aedes aegypti	dan Aedes aegypti			<i>cinerariefolium</i> .
15	Hubullah Fuadzy, et al (2015)	Potensi Daun Dewa (<i>Gynurapse udochina L. DC</i>) Sebagai Larvasida	Daun Dewa (<i>Gynurapse udochina L. DC</i>) dan Larvasida <i>Aedes aegypti</i>	Eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)	450 larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> instar III	Ekstrak air daun dewa dapat membunuh larva <i>Aedes aegypti</i> dengan nilai LC50 adalah 6,271%.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari

1. Tujuan Umum

Diketahui bahwa Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) efektif sebagai larvasida *Aedes aegypti* Instar III.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui adanya senyawa pada Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) sehingga efektif sebagai larvasida *Aedes aegypti* Instar III.
- b. Diketahui nilai LC₅₀ Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap larva *Aedes aegypti* Instar III.
- c. Diketahui nilai LC₉₀ Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap larva *Aedes aegypti p* Instar III
- d. Diketahui adanya hubungan antara jumlah Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap mortalitas larva *Aedes aegypti* Instar III.

- e. Diketahui adanya hubungan antara lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap mortalitas larva *Aedes aegypti* Instar III.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai efektivitas Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti* instar III serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas dan lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan informasi ilmiah dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas tentang manfaat daun beluntas (*Pluchea indica Linn*) yang dapat dijadikan larvasida. Meningkatkan pemanfaatan daun beluntas (*Pluchea indica Linn*) dengan harapan bisa menurunkan angka kejadian DBD.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Daun Beluntas

1. Morfologi Daun Beluntas

Tumbuhan beluntas adalah tanaman perdu kecil, tumbuh tegak, tinggi mencapai 2 meter. Kingdom: *Plantae*. Tumbuhan ini berasal dari suku *Asteraceae* (*Compositae*). Namanya berbeda-beda, sesuai daerah tempat dia tumbuh. Di Sumatera, namanya beluntas (Melayu). Sedangkan di Sunda dikenal dengan nama baluntas, baruntas. Di Jawa namanya luntas, di Madura dikenal dengan nama baluntas. Lain lagi di Makasar, masyarakat sekitarnya menyebut tumbuhan ini dengan nama lamutasa'. Sedangkan di Timor disebut lenabou. Beluntas umumnya tumbuhan liar di daerah kering pada tanah yang keras dan berbatu, atau ditanam sebagai tanaman pagar. Tumbuhan ini memerlukan cukup cahaya matahari atau sedikit naungan, banyak ditemukan di daerah dekat pantai dekat laut sampai ketinggian 1 meter dari permukaan laut (Dalimartha, 1999 dalam Nanang Hidayatulloh, dkk 2011).



Sumber : <http://repository.usu.ac.id>

Gambar 1. Daun Beluntas

2. *Klasifikasi Ilmiah Daun Beluntas*

Klasifikasi tumbuhan jengkol yang digunakan dalam penelitian ini memiliki taksonomi sebagai berikut:

Super Divisi : *Spermatophyta*

Divisi : *Magnoliophyta*

Kelas : *Magnoliopsida*

Sub Kelas : *Asteridae*

Ordo : *Asterales*

Famili : *Asteraceae*

Genus : *Pluchea*

Spesies : *Pluchea indica (L.) Less.*

(Dalimartha, 1999 dalam Nanang Hidayatulloh, dkk 2011)

3. *Potensi Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica Linn)*

Insektisida alami memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh insektisida sintetik (Syahputra, 2001). Menurut Arnason dkk (1993) dan Isman (1997), di alam insektisida alami memiliki sifat yang tidak stabil sehingga memungkinkan dapat didegradasi secara alami. Selain dampak negatif yang ditimbulkan pestisida sintetik seperti resistensi, resurgensi dan terbunuhnya jasad bukan sasaran (Metcalf, 1986). Menurut Schumetterer (1995), alternatif yang dapat dikerjakan diantaranya adalah memanfaatkan tumbuhan yang

memiliki khasiat insektisida, khususnya yang mudah diperoleh dan dapat diramu sebagai sediaan insektisida. (Remy dan Rexy, 2013).

Beluntas sering digunakan sebagai tanaman pagar dan pembatas di perkebunan. Secara tradisional daunnya digunakan sebagai obat untuk menghilangkan bau badan, obat penurun panas, obat batuk, dan obat antidiare. Daun beluntas yang telah direbus sering pula digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Selain itu daun beluntas juga sering dikonsumsi oleh masyarakat sebagai lalapan (Winarno dan Sundari, 1998). Daun beluntas juga digunakan sebagai obat nyeri pada rheumatik, sakit pinggang. Ekstrak daun beluntas yang dikonsumsi bersama rumput laut dapat digunakan sebagai obat tuberkulosis kelenjar leher (Wijayakusuma, 1994 *dalam* Lasmini Nangune, dkk. 2011)

Dari berbagai manfaat di atas dalam berbagai penelitian dilakukan uji senyawa yang terkandung di dalam daun beluntas. Berdasarkan skrining fitokimia yang telah dilakukan, golongan senyawa aktif yang teridentifikasi dalam daun beluntas antara lain fenol hidrokuinon, tanin, alkaloid, steroid dan minyak atsiri (Ardiansyah dkk., 2002).

Menurut Ulfa (2010), senyawa bioaktif yang terdapat dalam tumbuhan biasanya merupakan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, saponin dan sebagainya. Tanaman beluntas merupakan salah satu tanaman berkhasiat obat, yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam daun beluntas mengandung beberapa senyawa aktif sebagai larvasida, yaitu: alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan minyak atsiri.

Pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan bunga kecombrang (*Nicolaia spesiosa*) diketahui efektif sebagai larva sidanyamuk *Culex* pada konsentrasi 61.000 ppm. pada bunga ini mengandung senyawa flavonoid, alkaloid dan saponin sebagai larvasida. (Astuti, 2011).

Daun beluntas mengandung alkaloid, flavonoida, saponin, tanin, minyak atsiri, asam chlorogenik, natrium, aluminium, kalsium, magnesium, dan fosfor (Sonja, 2012).

Berikut beberapa kandungan terbesar 3 kandungan terbesar dalam daun beluntas yang berpotensi sebagai larvasida yaitu Flavonoid, Saponin, dan Minyak Atsiri (Ismatullah, 2011)

a. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman hijau, kecuali alga. Flavonoid merupakan termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Beberapa fungsi flavonoid bagi tumbuhan adalah pengaturan tumbuh, pengaturan fotosintesis, kerja antimikroba dan antivirus, fitoaleksin merupakan komponen abnormal yang hanya dibentuk sebagai tanggapan terhadap infeksi atau luka dan kemudian menghambat fungus menyerangnya, mengimbas gen pembintilan dalam bakteri bintil nitrogen (Ismatullah, 2011).

Flavonoid dapat dikelompokkan berdasarkan rantai C3 yaitu :


1) Katekin dan proantosianidin

Katekin dan proantosianidin adalah dua golongan senyawa yang mempunyai banyak kesamaan, terdapat pada tumbuhan kayu. Katekin

ditemukan dalam paku-pakuan dan dua spesies Equisetum. Tiga jenis katekin yaitu katekin (+) dan katekin (-) hidrogen-2 dan hidrogen-3 nya trans. Beberapa katekin terdapat sebagai ester asam galat. Proantosianidin adalah senyawa yang membentuk antosianidin jika dipanaskan dengan asam.

2) Flavanon dan flavanonol

Berwarna kuning sedikit karena kosentrasinya rendah. Flavanon sering terjadi sebagai aglikon tetapi beberapa glikosidanya dikenal sebagai hesperidin dan naragin dari kulit jeruk. Flavonol merupakan flavonoid yang paling kurang dikenal, senyawa ini stabil dalam asam klorida panas tetapi terurai oleh basa hangat menjadi kalkon. Menurut Dinata (2009). Flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat bersifat menghambat makan serangga dan juga bersifat toksik.



Sumber: [http://: repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Gambar 2. Rumus bangun flavon dan flavonol

b. Saponin

Saponin merupakan senyawa glikosida triterpenoida atau glikosida Steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghemolisa sel darah merah (Harborne JB, 1996 dalam Lumowa, Sonja, 2012). Keberadaan saponin sangat dapat ditandai dengan pembentukan larutan

koloidal dengan air yang apabila dikocok menimbulkan buih yang stabil. Saponin merupakan senyawa berasa pahit menusuk dan dapat menyebabkan bersin dan bersifat racun bagi hewan berdarah dingin, banyak di antaranya digunakan sebagai racun ikan (Gunawan D dan Mulyani S, 2004). Menurut Nio (1989). Sifat-sifat saponin adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai rasa pahit.
2. Dalam larutan air membentuk busa yang stabil.
3. Menghemolisa eritrosit.
4. Merupakan racun kuat untuk ikan dan amfibi.
5. Membentuk persenyawaan dengan kolesterol dan hidroksisteroid lainnya.
6. Sulit untuk dimurnikan dan diidentifikasi.
7. Berat molekul relatif tinggi, dan analisis hanya menghasilkan formula empiris yang mendekati.

Berdasarkan struktur aglikonnya, saponin dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe steroida dan tipe triterpenoida.


a) Steroida

Saponin steroida terdapat pada tumbuhan monokotil maupun dikotil, contohnya diosgenin yang terdapat pada *Dioscorea hispida* dan hecogenin yang terdapat pada *Agave Americana* (Gunawan dan Mulyani, 2004).

b) Triterpenoida

Saponin triterpenoida banyak terdapat pada tumbuhan dikotil seperti: gipsogenin terdapat pada *Gypsophylla sp.* dan asam glisiretat terdapat pada *Glycyrrhiza glabra* (Sonja, 2012).

Saponin memiliki aksi sebagai insektida dan larvasida. Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan selaput mukosa traktus digestivus larva sehingga dinding traktus digestivus larva menjadi korosif (Aminah dkk, 2001). Saponin yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi serangga dapat menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan makanan (Dinata A, 2012).



Sumber: [http://: repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Gambar 3. Rumus bangun flavon dan flavonol

c) Tanin

Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, anti bakteri dan antioksidan. Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut (Desmiaty et al., 2008). Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks mulai dari pengendap protein hingga pengkkelat logam. Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis (Hagerman,

2002). Antioksidan dalam pengertian kimia, merupakan senyawa pemberi elektron. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa terhambat. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan menghambatterjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas (Winarsi, 2007). Salah satu metode yang digunakan untuk uji aktivitas antioksidan adalah metode 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH). Interaksi antioksidan dengan DPPH baik secara transfer elektron atau radikal hidrogen pada DPPH, akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH dan membentuk DPPH tereduksi. Jika semua elektron pada radikal bebas DPPH menjadi berpasangan, maka warna larutan berubah dari ungu tua menjadi kuning terang dan absorbansi pada panjang gelombang 517 nm akan hilang (Rohman *et al*, 2011).

d) Minyak Atsiri

Minyak atsiri merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang mudah menguap (volatil) dan bukan merupakan senyawa murni tetapi tersusun atas beberapa komponen yang mayoritas berasal dari golongan terpenoid (Guenther E, 2006). Minyak atsiri terdiri dari campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang berbeda beda. Minyak atsiri yang mudah menguap terdapat dalam kelenjar minyak khusus didalam kantung minyak atau di dalam ruang antar sel dalam jaringan tanaman. Minyak atrisi umumnya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia yang terbentuk

dari unsur carbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O) dan beberapa senyawa kimia yang mengandung unsur Nitrogen (N) dan Belerang (S) (Guenther E, 2012).

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Tahaa 20/53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجْنَا بِهَآءِ آزْوَآجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

....Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian Kami tumbuhkan dengan (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan, (Departemen Agama RI, 2002 : 251)

Dalam kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (2002) dijelaskan, bahwa dengan perantaraan hujan, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidup makhluk hidup (Shihab, 2002,7: 604-607).

Dalam kitab Tafsir Al Azhar karya Hamka dijelaskan, bahwa Tuhanku yang tidak lupa akan segala sesuatu itu adalah Tuhan yang menjadikan bumi untuk kalian dibuai dan menetap, maka kalian bangun, tidur, dan mengadakan perjalanan di atasnya. Dia menjadikan bagi kalian di bumi itu, jalan-jalan antara gunung dan lembah, tempat kalian berjalan dan mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, untuk memenuhi kebutuhan kalian dan memanfaatkan kekayaannya. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan

air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, seperti palawija dan buah-buahan, baik yang masam maupun yang manis. Juga mengeluarkannya dengan berbagai manfaat, warna, aroma, dan bentuk; sebagiannya cocok untuk manusia dan sebagiannya cocok untuk hewan. (Hamka,1999)

Dalam kitab Tafsir Al Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dijelaskan bahwa mengapa mereka berani menentang Rasul dan mendustakan kitabnya, sedang Tuhannyalah yang telah menciptakan bumi dan menumbuhkan di dalamnya tanaman dan buah-buahan dengan berbagai macam dan bentuknya yang membelalakkan mata orang-orang yang memandangnya dan menggugah pandangan orang-orang yang lengah? Selanjutnya bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa mereka adalah kaum yang kehilangan sarana berpikir, sehingga tidak berpikir tentang alam. Oleh karena itu mereka ingkar (Mustafa, 2000: 80-81).

Dari tafsiran-tafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam telah diciptakan Allah SWT tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia seperti daun beluntas (*Pluchea indica Linninn*), sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan dalam meningkatkan kesehatan manusia, sehingga hal itu menimbulkan rasa

syukur dan semakin yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan perumpamaan orang yang memperhatikan gejala-gejala alam bagaikan air hujan yang mengguyur tanah yang kemudian memberikan manfaat bagi lingkungannya.

B. Nyamuk *Aedes sp*

Nyamuk *Aedes sp* merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah. *Aedes sp* tersebar luas di wilayah tropis dan subtropis Asia Tenggara, terutama di sebagian besar wilayah perkotaan. Penyebaran *Aedes sp* di pedesaan akhir-akhir ini relatif sering terjadi yang dikaitkan dengan pembangunan sistem persediaan air pedesaan dan perbaikan sistem transportasi.

1. Taksonomi Nyamuk *Aedes sp*


Klasifikasi *Aedes sp* adalah sebagai berikut:

Domain	: <i>Eukaryota</i>
Kingdom	: <i>Animalia</i>
Filum	: <i>Arthropoda</i>
Kelas	: <i>Insecta</i>
Ordo	: <i>Diptera</i>
Subordo	: <i>Nematocera</i>
Famili	: <i>Culicidae</i>
Genus	: <i>Aedes</i>
Spesies	: <i>Aedes sp</i>

(Gandahusada, dkk, 2000 dalam Siti Aisah, *et al.* 2011)

2. Morfologi Nyamuk *Aedes sp*

Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna, yaitu mengalami perubahan bentuk morfologi selama hidupnya dari stadium telur berubah menjadi stadium larva kemudian menjadi stadium pupa dan menjadi stadium dewasa.



Sumber: Ismatullah, *et al.* 2011

Gambar 4. Daur Hidup *Aedes aegypti*

Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk rumah (*Culex quinquefasciatus*), mempunyai warna dasar yang hitam dengan bintik putih pada bagian badannya terutama pada bagian kakinya (Depkes RI, 2007 dalam Yana S, Y. Priabudiman, 2012). Telur *Aedes sp* mempunyai dinding bergaris-garis dan membentuk bangunan menyerupai gambaran kain kasa. Nyamuk *Aedes sp* dewasa memiliki ukuran sedang, dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan seperti gambar:



Sumber : <http://repository.usu.ac.id>

Gambar 5. *Aedes Aegypti*

Gambar 6. *Aedes albopictus*

Di bagian punggung tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri dari spesies ini. Sisik-sisik pada tubuh nyamuk pada umumnya mudah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk tua. Ukuran dan warna nyamuk ini sering kali berbeda antar populasi, tergantung dari kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh nyamuk selama perkembangan. Nyamuk jantan umumnya lebih kecil dari nyamuk betina dan terdapat rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan. Kedua ciri ini dapat diamati dengan mata telanjang (Gandahusada, dkk, 2000 dalam Hubullah dkk, 2012).

3. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes sp*

Spesies ini mengalami metamorfosis yang sempurna. Nyamuk betina dewasa yang menghisap darah manusia, tiga hari sesudahnya dapat bertelur sebanyak 100 butir. Nyamuk betina meletakkan telur di atas permukaan air dalam keadaan menempel pada dinding tempat permukaannya. Dua puluh empat jam kemudian menghisap darah lagi dan siap untuk bertelur kembali. Telur dapat bertahan berbulan-bulan pada suhu -2°C sampai 42°C . Setelah 1-2 hari telur ini akan

menetas menjadi larva kemudian akan mengalami pengelupasan kulit sebanyak 4 kali, tumbuh menjadi pupa, dan akhirnya menjadi dewasa memerlukan waktu kira-kira 7-14 hari (Hubullah, 2012).

a. Telur



Sumber: [http://: repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Gambar 7. Telur *Aedes sp*

Telur *Aedes sp* berbentuk lonjong, panjangnya $\pm 0,6$ mm dan beratnya 0,0113 mg. Pada waktu diletakkan telur berwarna putih, 15 menit kemudian telur menjadi abu-abu dan setelah 40 menit menjadi hitam. Pada dindingnya terdapat garis-garis menyerupai kawat kasa atau sarang tawon (WHO, 2004 2012).

Telur tersebut diletakkan secara terpisah di permukaan air untuk memudahkannya menyebar dan berkembang menjadi larva di dalam media air. Media air yang dipilih untuk tempat peneluran itu adalah air bersih yang tidak mengalir (Supartha, 2012).

b. Larva



Sumber: [http://: repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Gambar 8. Larva *Aedes sp*

Larva nyamuk *Aedes sp* tampak muncul ke permukaan selama 6-7 jam. Kehidupan larva akan lebih baik pada pH air mendekati normal yaitu berdasarkan Achmadi (2009) berkisar 4 sampai 9, suhu berdasarkan Depkes RI tahun 2001 pada umumnya nyamuk pembawa demam berdarah hidup pada suhu kisaran antara 25°C - 27°C dan larva akan mati ketika berada pada suhu dibawah 10°C dan diatas 40°C (Ariyanti, Tukiran. 2012).

Larva *Aedes sp* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai alat pernapasan berupa siphon
- b. Pada siphon terdapat sebuah *pecten*
- c. Tidak mempunyai bulus kipas dan utar-utar
- d. Posisi istirahat menggantung dan membentuk sudut pada permukaan air
- e. Pangkal *thorax* terdapat satu pasang kait yang bentuknya menonjol dan ujung meruncing (Iskandar, 1985 dalam Aradilla, 2009).

Larva nyamuk *Aedes sp* tubuhnya memanjang tanpa kaki dengan bulu-bulu sederhana yang tersusun bilateral simetris. Larva ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami 4 kali pergantian kulit dan larva yang terbentuk berturut-turut disebut larva instar I, II, III, dan IV. Larva instar I, tubuhnya sangat kecil, warna transparan, panjang 1- 2 mm, duri-duri (*spinae*) pada dada (*thorax*) belum begitu jelas, dan corong pernapasan (*siphon*) belum menghitam. Larva instar II bertambah besar, ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada belum jelas, dan corong pernapasan sudah berwarna hitam. Larva instar III berukuran 4-5 mm, duri-duri dada mulai jelas dan corong pernapasan berwarna coklat kehitaman. Larva instar IV telah lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh dapat dibagi menjadi bagian kepala (*caput*), dada (*thorax*), dan perut (*abdomen*). Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk, sepasang antena tanpa duri-duri, dan alat-alat mulut tipe pengunyah (*chewing*). Bagian dada tampak paling besar dan terdapat bulu-bulu yang simetris. Perut tersusun atas 8 ruas. Ruas perut ke-8, ada alat untuk bernapas yang disebut corong pernapasan. Corong pernapasan tanpa duri-duri, berwarna hitam, dan ada seberkas bulu-bulu (*tuft*). Ruas ke-8 juga dilengkapi dengan seberkas bulu-bulu sikat (*brush*) di bagian ventral dan gigi-gigi sisir (*comb*) yang berjumlah 15-19 gigi yang tersusun dalam satu baris. Gigi-gigi sisir dengan lekukan yang jelas membentuk gerigi. Larva ini tubuhnya langsing dan bergerak sangat lincah, bersifat fototaksis negatif, dan waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang permukaan air (Utomo, Margo 2010).

c. Pupa



Sumber: [http:// repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Gambar 9. Pupa *Aedes sp.*

Pupa nyamuk *Aedes sp* bentuk tubuhnya bengkak, dengan bagian kepala-dada (*cephalotorax*) lebih besar bila dibandingkan dengan bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda baca “koma”. Pada bagian punggung (*dorsal*) dada terdapat alat bernafas seperti terompet. Pupa adalah bentuk tidak makan, waktu istirahat posisi pupa sejajar dengan bidang permukaan air (Kurniawan, 2012).

d. Nyamuk dewasa



Sumber: [http:// repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Gambar 10. Nyamuk dewasa *Aedes sp.*

Secara umum nyamuk *Aedes sp* sebagaimana serangga lainnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terdiri dari tiga bagian, yaitu : kepala, dada, dan perut
2. Pada kepala terdapat sepasang antena yang berbulu dan moncong yang panjang (*proboscis*) untuk menusuk kulit hewan/manusia dan menghisap darahnya.
3. Pada dada ada 3 pasang kaki yang beruas serta sepasang sayap depan dan sayap belakang yang mengecil yang berfungsi sebagai penyeimbang (*halter*).

Aedes sp dewasa berukuran kecil dengan warna dasar hitam. Pada bagian dada, perut, dan kaki terdapat bercak-bercak putih yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada bagian kepala terdapat pula probocis yang pada nyamuk betina berfungsi untuk menghisap darah, sementara pada nyamuk jantan berfungsi untuk menghisap bunga. Terdapat pula palpus maksilaris yang terdiri dari empat ruas yang berujung hitam dengan sisik berwarna putih keperakan. Pada palpus maksilaris *Aedes sp* tidak tampak tanda-tanda pembesaran, ukuran palpus maksilaris ini lebih pendek dibandingkan dengan *proboscis*. Sepanjang antena terdapat diantara sepasang dua bola mata, yang pada nyamuk jantan berbulu lebat (*Plumose*) dan pada nyamuk betina berbulu jarang (*pilose*) (Sudarto, 2012).

Dada nyamuk *Aedes sp* agak membongkok dan terdapat *scutelum* yang berbentuk tiga lobus. Bagian dada ini kaku, ditutupi oleh *scutum* pada punggung (dorsal), berwarna gelap keabu-abuan yang ditandai dengan

bentukan menyerupai huruf Y yang ditengahnya terdapat sepasang garis membujur berwarna putih keperakan. Pada bagian dada ini terdapat dua macam sayap, sepasang sayap kuat pada bagian mesotorak dan sepasang sayap pengimbang (*halter*) pada metatorak. Pada sayap terdapat saluran *trachea* longitudinal yang terdiri dari *chitin* yang disebut *venasi*. *Venasi* pada *Aedes sp* terdiri dari vena costa, vena subcosta, dan vena longitudinal (Ahmad, 2012).

Terdapat tiga pasang kaki yang masing-masing terdiri dari coxae, trochanter, femur, tibia dan lima tarsus yang berakhir sebagai cakar. Pada pembatas antara prothorax dan mesothorax, dan antara mesothorax dengan metathorax terdapat *stigma* yang merupakan alat pernafasan (Pratiwi, 2012).

Bagian perut nyamuk *Aedes sp* berbentuk panjang ramping, tetapi pada nyamuk gravid (kenyang) perut mengembang. Perut terdiri dari sepuluh ruas dengan ruas terakhir menjadi alat kelamin. Pada nyamuk betina alat kelamin disebut *cerci* sedang pada nyamuk jantan alat kelamin disebut *hypopigidium*. Bagian dorsal perut *Aedes sp* berwarna hitam bergaris-garis putih, sedang pada bagian ventral serta lateral berwarna hitam dengan bintik-bintik putih keperakan (Mutiara, 2012).

4. Bionomik Nyamuk *Aedes sp*.

Telur, larva dan pupa nyamuk *Aedes sp* tumbuh dan berkembang di dalam air. Genangan yang disukai sebagai tempat perindukan nyamuk ini berupa genangan air yang tertampung di suatu wadah yang biasanya kontainer atau tempat penampungan air bukan genangan air di tanah. Kontainer tempat perindukan ini dibedakan sebagai berikut:

- a. Tempat penampungan air, yaitu tempat untuk menampung air guna keperluan sehari-hari, seperti tempayan, bak mandi, bak WC, bak penampungan air ember, dan lain-lain.
- b. Bukan tempat penampungan air, seperti tempat minum hewan peliharaan (tempat minum burung, ayam, dan lain-lain), barang-barang bekas (ban bekas, kaleng bekas, botol, pecahan piring/gelas), vas/pot kembang, dan lain-lain.
- c. Tempat penampungan air buatan/alami, seperti lubang pohon, lubang batu, pelapah daun, tempurung kelapa, kulit kerang, kulit cokelat, potongan bambu, dan lain-lain. Kontainer ini umumnya ditemukan di luar rumah (Depkes RI, 1992 *dalam* Ismatullah A. *et al*, 2011).

Survey yang telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa tempat perindukan yang paling potensial adalah tempat penampungan air yang digunakan sehari-hari seperti drum, tempayan, bak mandi, bak WC, ember dan sejenisnya. Tempat perindukan tambahan adalah seperti tempat minuman hewan, barang bekas, vas bunga, perangkap semut dan lain-lainnya, sedangkan tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, kulit kerang, pangkal pohon pisang, potongan bambu dan lain-lainnya. Nyamuk *Aedes sp* lebih tertarik untuk meletakkan telurnya pada tempat penampungan air yang berwarna gelap, paling menyukai warna hitam, terbuka lebar, dan terutama yang terletak ditempat-tempat terlindung sinar matahari langsung (Wibowo H.A., 2007 *dalam* Ismatullah A. *et al*, 2011).

Tempat perkembangbiakan nyamuk pada umumnya dapat diamati di tempat-tempat yang terdapat genangan air. Tempat yang terdapat air tergenang menjadi tempat bertelurnya nyamuk hingga telurnya menjadi dewasa.

Nyamuk *Aedes sp* hidup domestik, lebih menyukai tinggal di dalam rumah dari pada luar rumah. Waktu mencari makanan, selain terdorong oleh rasa lapar, nyamuk *Aedes sp* juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bau yang dipancarkan oleh inang, temperatur, kelembaban, kadar karbon dioksida, dan warna. Untuk jarak yang lebih jauh, faktor bau memiliki peranan penting bila dibandingkan dengan faktor lainnya. Kebiasaan istirahat lebih banyak di dalam rumah pada benda-benda yang bergantung, berwarna gelap dan di tempat-tempat lain yang terlindung (Soegijanto, 2004 dalam Ismatullah A. *et al*, 2011).

Aedes sp bersifat *diurnal* atau aktif pada pagi hingga sore hari. Penularan penyakit dilakukan oleh nyamuk betina karena hanya nyamuk betina yang mengisap darah. Hal itu dilakukannya untuk memperoleh asupan protein yang diperlukannya untuk memproduksi telur. Nyamuk jantan tidak membutuhkan darah, dan memperoleh energi dari nektar bunga. Setelah menghisap darah, nyamuk ini beristirahat di dalam atau kadang-kadang di luar rumah berdekatan dengan tempat perkembangbiakannya. Biasanya di tempat yang agak gelap dan lembab. Boleh dikatakan bahwa nyamuk *Aedes aegypti* betina sangat menyukai darah manusia (antropofilik), sedangkan *Aedes albopictus* lebih menyukai darah hewan (zoofilik). Protein darah diperlukan untuk mematangkan telur agar jika dibuahi oleh sperma nyamuk jantan dapat menetas. Waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan perkembangan telur mulai dari nyamuk menghisap darah sampai telur dikeluarkan biasanya bervariasi antara 3-4 hari. Jangka waktu tersebut disebut satu siklus gonotropik (*gonotropic cycle*). Biasanya nyamuk betina mencari mangsanya pada siang hari. Aktifitas nyamuk betina menggigit dan menghisap darah lebih banyak pagi atau sore hari antara pukul 08.00 sampai dengan 12.00 dan 15.00 sampai dengan 17.00. Tidak seperti nyamuk lain, *Aedes sp* mempunyai kebiasaan menghisap darah berulang kali (*multiple bites*) dalam satu siklus gonotropik, untuk memenuhi lambungnya dengan darah. Dengan demikian nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit (Gandahusada, 2011).

Kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 meter, maksimal 100 meter. Namun secara pasif misalnya karena angin atau terbang terbawa kendaraan nyamuk ini dapat berpindah lebih jauh. *Aedes sp* dapat hidup dan berkembang biak sampai ketinggian daerah +1.000 m dari permukaan air laut, apabila berada di atas ketinggian + 1.000 m nyamuk tidak dapat berkembang biak, karena pada ketinggian tersebut suhu udara terlalu rendah (Depkes RI, 2011).

C. Peran Nyamuk Aedes sp Dalam Penularan Penyakit DBD

Di negara-negara di Asia Tenggara, epidemi DBD terutama terjadi pada musim penghujan. Di Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina epidemi DBD terjadi beberapa minggu setelah datangnya musim penghujan. Periode epidemi yang terutama berlangsung selama musim penghujan erat kaitannya dengan kelembaban tinggi pada musim penghujan yang memberikan lingkungan optimal bagi masa inkubasi dan peningkatan aktivitas vektor dalam menggigit.

Kedua faktor tersebut meningkatkan aktivitas vektor dalam mentransmisikan infeksi virus dengue.

Virus-virus dengue ditularkan ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes* yang terinfeksi, terutama *Aedes aegypti*, dan karenanya dianggap sebagai arbovirus (virus yang ditularkan melalui artropoda). Bila terinfeksi, nyamuk tetap akan terinfeksi sepanjang hidupnya, menularkan virus ke individu rentan selama menggigit dan menghisap darah. Nyamuk betina terinfeksi juga dapat menurunkan virus ke generasi nyamuk dengan penularan transovarian, tetapi ini jarang terjadi dan kemungkinan tidak memperberat penularan yang signifikan pada manusia.

Manusia adalah penjamu utama yang dikenai virus, meskipun studi telah menunjukkan bahwa monyet pada beberapa bagian dunia dapat terinfeksi dan mungkin bertindak sebagai sumber untuk nyamuk menggigit. Virus bersirkulasi dalam darah manusia terinfeksi pada kurang lebih waktu dimana mereka mengalami demam, dan nyamuk tak terinfeksi mungkin mendapatkan virus bila mereka menggigit individu saat ia dalam keadaan viraemik. Virus kemudian berkembang di dalam nyamuk selama periode 8-10 hari sebelum ini dapat ditularkan ke manusia lain selama menggigit atau menghisap darah berikutnya. Lama waktu yang diperlukan untuk inkubasi ekstrinsik ini tergantung pada kondisi lingkungan, khususnya suhu sekitar.

Di dalam tubuh nyamuk, virus dengue akan berkembang biak dengan cara membelah diri dan menyebar di seluruh bagian tubuh nyamuk. Sebagian besar virus itu berada dalam kelenjar liur nyamuk. Dalam tempo 1 minggu

jumlahnya dapat mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu sehingga siap untuk ditularkan/dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada waktu nyamuk itu menggigit orang lain, maka setelah alat tusuk nyamuk (probosis) menemukan kapiler darah, sebelum darah orang itu diserap, terlebih dahulu dikeluarkan air liur dari kelenjar liurnya agar darah yang dihisap tidak membeku.

Bersama dengan liur nyamuk inilah, virus dengue dipindahkan kepada orang lain. Tidak semua orang yang digigit nyamuk *Aedes sp* yang membawa virus dengue itu, akan terserang penyakit demam berdarah. Orang yang mempunyai kekebalan yang cukup terhadap virus dengue, tidak akan terserang penyakit ini, meskipun dalam darahnya terdapat virus itu. Sebaliknya pada orang yang tidak mempunyai kekebalan yang cukup terhadap virus dengue, dia akan sakit demam ringan atau bahkan sakit berat, yaitu demam tinggi disertai pendarahan bahkan syok, tergantung dari tingkat kekebalan tubuh yang dimilikinya. Penyakit DBD disebabkan 4 serotipe virus dengue di Indonesia, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4. Virus tersebut termasuk group B Arthropoda borne viruses (arboviruses).

D. Pengendalian Vektor

Pemberantasan demam berdarah dengue (DBD) seperti penyakit menular lain, didasarkan atas pemutusan rantai penularan. Dalam hal DBD, komponen penularan terdiri dari virus, *Aedes sp*, dan manusia. Pemberantasan demam berdarah dengue (DBD) ditujukan pada manusia dan terutama pada vektornya.

Dengan demikian, pengetahuan mengenai ekologi vektor dan manusia sangat penting (Gratz, 2011).

Hubungan penularan dengue alam terbukti dari penelitian bahwa beberapa bulan setelah musim hujan berhenti, biasanya pada saat cuaca kering dan sejuk, jarang dijumpai kasus DBD. Berkurangnya penularan dengue dalam hubungan dengan musim tidak diketahui sebabnya, mungkin sekali karena berkurangnya aktivitas, umum nyamuk betina yang lebih pendek atau keduanya, dan mungkin pula oleh berkurangnya kepadatan vektor. Namun apa pun sebabnya keadaan ini memang terjadi (WHO, 2011).

Dengan demikian, diharapkan dapat dicegah epidemik DBD apabila dapat dibuat *natural declines in dengue transmission* secara artefisial. Prinsip yang tepat dalam pencegahan DBD (Dit.Jen.P3M., Depkes. RI., 1976 Lasmini Nangune, *et al.* 2011) ialah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan perubahan keadaan nyamuk akibat pengaruh alamiah dengan melaksanakan pemberantasan vektor pada saat sedikit terdapatnya kasus DBD.
2. Memutuskan rantai penularan dengan menahan kepadatan vektor pada tingkat sangat rendah untuk memberikan kesempatan penderita viremi sembuh.
3. Mengusahakan pemberantasan vektor di pusat daerah penyebaran.
4. Mengusahakan pemberantasan vektor di semua daerah berpotensi penularan tinggi (Sumarmo, 2011).

Daerah dengan risiko tinggi ialah daerah berpenduduk padat dengan kepadatan *Aedes sp* yang tinggi.

Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan secara fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya dan/atau perubahan perilaku masyarakat serta dapat mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai alternatif (Permenkes 374 tahun 2010).

Beberapa metode pengendalian vektor DBD, yaitu:

1. Kimiawi

Pengendalian vektor cara kimiawi dengan menggunakan insektisida merupakan salah satu metode pengendalian yang lebih populer di masyarakat dibandingkan cara pengendalian lain. Sasaran insektisida adalah stadium dewasa dan pra dewasa. Karena insektisida adalah racun, maka penggunaannya harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan organisme bukan sasaran termasuk mamalia. Disamping itu penentuan jenis insektisida, dosis, dan metode aplikasi merupakan syarat yang penting untuk dipahami dalam kebijakan pengendalian vektor. Aplikasi insektisida yang berulang di satuan ekosistem akan menimbulkan terjadinya resistensi serangga sasaran (Departemen Kesehatan RI, 2011).

Dalam usaha pemutusan rantai penularan penyakit ini telah dilakukan pengendalian baik terhadap stadium larva yaitu abatisasi dengan menggunakan insektisida golongan organofosfat temefos dan foging terhadap nyamuk dewasa dengan malathion yang dilaksanakan secara rutin setiap 1-2 bulan sekali,

sampai saat ini dinyatakan bahwa kedua macam insektisida tersebut mulai resisten terhadap *Aedes sp.* Oleh karena itu untuk mengatasi masalah resistensi vektor terhadap suatu insektisida, WHO telah merekomendasikan piretroid sintetik yaitu permetrin sebagai suatu insektisida untuk digunakan dalam pengendalian vektor, karena insektisida ini selain lebih aman dan tidak berbahaya terhadap mamalia dan organisme non target, juga mempunyai daya bunuh cepat dan mempunyai efikasi lebih lama (Zulhasril, 2011).

a. Fogging

Nyamuk *Aedes sp* dapat diberantas dengan fogging (pengasapan) racun serangga, termasuk racun serangga yang dipergunakan sehari-hari di rumah tangga (Putri, 2010)

Golongan insektisida kimiawi untuk pengendalian DBD:

- 1) Sasaran dewasa (nyamuk) adalah organophospat (*malathion, methyl pirimiphos*), pyrethroid (*Cypermethrin, lamda-cyhalotrine, cyflutrine, permethrine dan S-Bioalethrine*). Yang ditujukan untuk stadium dewasa yang diaplikasikan dengan cara pengebutan panas/fogging dan pengabutan dingin/ULV.
- 2) Sasaran pra dewasa (jentik) : Organophosfat (*Temephos*).

b. Larvasida

Larvasida adalah menaburkan bubuk pembunuh jentik ke dalam tempat-tempat penampungan air bila menggunakan abate disebut abatisasi (Departemen Kesehatan RI, 2011).

Pencegahan demam berdarah dengue terutama ditujukan kepada upaya untuk memberantas vektor penularnya yaitu nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Pemberantasan dengan insektisida ditujukan baik terhadap nyamuk dewasa maupun terhadap larva nyamuk sebaiknya menggunakan organofosfat untuk menghindari pencemaran lingkungan (Soedarto, 2011)

1. Biologi

Pengendalian vektor biologi menggunakan agent biologi seperti: predator/pemangsa, parasit, bakteri, sebagai musuh alami stadium pra dewasa vektor DBD. Jenis predator yang digunakan adalah ikan pemakan jentik (cupang, tampalo, gabus, guppy dll), sedangkan larva capung, *Toxoryncites*, *Mesocyclops* dapat juga berperan sebagai predator walau bukan sebagai metode yang lazim untuk pengendalian vektor DBD. Golongan insektisida biologi untuk pengendalian DBD (*Insect Growth Regulator/IGR* dan *Bacillus thuringensis israelensis*), ditujukan untuk stadium pra dewasa yang diaplikasikan ke dalam habitat perkembangbiakan vektor (Cania, 2011).

2. Manajemen Lingkungan

Lingkungan fisik seperti tipe pemukiman, sarana-prasarana penyediaan air, vegetasi dan musim sangat berpengaruh terhadap tersedianya habitat perkembangan dan pertumbuhan vektor DBD. Nyamuk *Aedes sp.* sebagai nyamuk pemukiman mempunyai habitat utama di kontainer buatan yang berada di daerah pemukiman. Manajemen lingkungan adalah upaya pengelolaan lingkungan sehingga tidak kondusif sebagai habitat perkembangbiakan atau dikenal sebagai *source reduction* seperti 3M plus

(menguras, menutup, mengubur dan plus menyemprot, memelihara ikan predator, menabur larvasida dll); dan menghambat pertumbuhan vektor (menjaga kebersihan lingkungan rumah; mengurangi tempat-tempat yang gelap dan lembab di lingkungan rumah dll) (Setyaningrum 2011)

3. Pemberantasan sarang nyamuk / PSN

Pengendalian vektor DBD yang paling efisien dan efektif adalah dengan memutus rantai penularan melalui pemberantasan jentik. (Departemen Kesehatan RI, 2011).

PSN DBD dilakukan dengan cara 3M, yaitu:

- a. Menguras tempat-tempat penampungan air secara teratur paling sedikit seminggu sekali atau menaburkan bubuk temephos ke dalamnya.
- b. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air

Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng-kaleng bekas dan plastik (Departemen Kesehatan RI, 2007 *dalam dalam* Lasmini Nangune, *et al*, 2011).

E. Larvasida sebagai Insektisida Pengendali Nyamuk

Hingga saat ini cara pencegahan atau pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dapat dilaksanakan dengan memberantas vektor untuk memutuskan rantai penularan. Salah satu pemberantasan ditujukan pada larva *Aedes sp.* Cara yang biasa digunakan untuk membunuh larva adalah dengan menggunakan larvasida. Larvasida yang termasuk insektisida biologis, seperti larvasida mikroba yaitu *Bacillus sphaericus* dan *Bacillus thuringiensis*. Larvasida yang termasuk pestisida, seperti abate (temephos), methoprene,

minyak, dan *monomolecular film*. Nyamuk membutuhkan air untuk berkembang biak. Larvasida meliputi pemakaian pestisida pada habitat perkembangbiakan untuk membunuh larva nyamuk. Penggunaan larvasida dapat mengurangi penggunaan keseluruhan pestisida dalam program pengendalian nyamuk. Membunuh larva nyamuk sebelum berkembang menjadi dewasa dapat mengurangi atau menghapus kebutuhan penggunaan pestisida untuk membunuh nyamuk dewasa (Warta, 2006 *dalam* Mutiara dkk, 2012).

a. *Larvasida Mikroba*

Larvasida mikroba yang digunakan untuk mengendalikan nyamuk, yaitu *Bacillus sphaericus* dan *Bacillus thuringiensis* (U.S. Environmental Protection Agency, 2007 *dalam* Mutiara dkk, 2012).

b. *Metophrene*

Bekerja menyerupai hormon pertumbuhan pada serangga dan mencegah maturasi normal dari larva. Digunakan di air untuk membunuh larva nyamuk (U.S. Environmental Protection Agency, 2007 *dalam* Mutiara dkk, 2012).

c. *Temephos* (Abate)

Abate merupakan nama dagang dari temephos (*O-O-O-O-Tetramethyl O-O-thiodi-p, -phenylenephosphorothioate*), merupakan pestisida golongan organofosfat. Penggunaannya pada tempat penampungan air minum telah dinyatakan aman oleh WHO dan DepKes RI (Warta, *dalam* Mutiara dkk. 2012). Dengan formula molekuler Abate merupakan pestisida yang digunakan secara umum, mengandung produk yang sedikit beracun (*EPA toxicity class III*) (Raharjo, 2006 *dalam* Mutiara dkk. 2012). *Temephos* adalah insektisida

organofosfat non sistemik yang digunakan untuk mengontrol nyamuk, larva *black fly* (*Simulidae*), dan lain-lain. Biasa digunakan di kolam, danau, dan rawa-rawa. Juga biasa digunakan untuk membasmi kutu pada anjing dan kucing dan membasmi kutu pada manusia. *Temephos* tersedia dalam sediaan mencapai 50% emulsi konsentrat, 50% serbuk basah, dan bentuk granuler yang mencapai 5% (Raharjo, 2006 *dalam* Mutiara dkk, 2012).

Temephos merupakan senyawa murni berupa kristalin putih padat, dengan titik lebur $30^{\circ}\text{C} - 30.5^{\circ}\text{C}$, produknya berupa cairan kental berwarna coklat. Tidak larut dalam air pada suhu 20°C (kurang dari 1 ppm). Larut dalam aseton, aseronitril, eter dan kebanyakan aromatik dan klorinasi hidrokarbon. Tidak larut dalam heksana, mudah terdegradasi bila terkena sinar matahari, sehingga kemampuan membunuh larva tergantung dari degradasi tersebut (WHO, 1975 *dalam* Mutiara dkk, 2012:).

Pestisida-pestisida yang tergolong di dalam senyawa fosfat organik kerjanya menghambat enzim *cholinesterase*, sehingga menimbulkan gangguan pada aktivitas syaraf karena tertimbunnya *acetylcholin* pada ujung syaraf tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan kematian (O'Brian, 1967 *dalam* Mutiara dkk, 2012). Jadi, seperti senyawa-senyawa organofosfat lainnya, maka temephos juga bersifat *anticholinesterase*. Keracunan fosfat organik pada serangga diikuti oleh ketidaktenangan, hipereksitasi, tremor dan konvulsi, kemudian kelumpuhan otot (paralise). Namun demikian penyebab utama kematian pada serangga sukar ditunjukkan, kecuali pada larva nyamuk

kematiannya disebabkan oleh karena tidak dapat mengambil udara untuk bernafas (Mutiara dkk, 2012).

Metabolisme temephos yaitu gugus *phosphorothioat* (P=S) dalam tubuh binatang diubah menjadi fosfat (P=O) yang lebih potensial sebagai *anticholineesterase*. Larva *Aedes sp.* mampu mengubah P=S menjadi P=O ester lebih cepat dibandingkan lalat rumah, begitu pula penetrasi temephos ke dalam larva berlangsung cepat dimana lebih dari 99% temephos dalam medium diabsorpsi dalam waktu satu jam setelah perlakuan. Setelah diabsorpsi, abate diubah menjadi produk-produk metabolisme, sebagian dari produk metabolik tersebut diekskresikan ke dalam air (Daniel, 2008 *dalam* Aradilla, 2010: 30). Dosis Abate yang dibutuhkan untuk membunuh jentik nyamuk dalam air minum adalah 10 gr untuk 100 liter air (Warta, 2006 *dalam* Mutiara dkk, 2012).

d. *Monomolecular Film*

Monomolecular film adalah pestisida dengan toksisitas rendah yang menyebar sebagai lapisan tipis dipermukaan air yang membuat larva nyamuk, pupa, dan nyamuk yang hampir dewasa untuk menempel pada permukaan air, dan menyebabkan nyamuk-nyamuk tersebut tenggelam (Warta, 2006 *dalam* Mutiara dkk, 2012).

e. Minyak

Minyak, seperti film, adalah pestisida yang digunakan untuk membentuk lapisan penutup pada permukaan air untuk menenggelamkan larva, pupa, dan nyamuk yang hampir dewasa (Warta, 2006 *dalam* Aradilla, 2009).

F. Ekstraksi


Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstrak senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Utami, 2009 *dalam* Mutiara dkk, 2012).

Ada beberapa cara metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut (Hamdani, 2009 *dalam* Mutiara dkk. 2012), yaitu: (1) Cara Dingin: (a) Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya, (b) Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru, yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan.

Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahapan maserasi antara, tahap perlokasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat yang tidak meninggalkan sisa bila 500 mg perkolat terakhir diuapkan pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$); (2) Cara Panas: (a) Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama


sampai 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna, (b) *Soxhlet* adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstrak kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik, (c) Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C, dan (d) Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 96-98°C selama 15-20 menit.

G. Kerangka Teori



Gambar 11. Skema Kerangka Teori

H. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian


Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen quasi. Lokasi penelitian dilakukan pada;

1. Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Uji Larvasida
2. Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) dan Uji Fitokimia

B. Pendekatan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan *Post Test Only Control Group Design*. Desain ini dipilih karena telah dilakukan randomisasi baik pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. (Notoatmodjo, 2005)

Desain ini memungkinkan dilakukan (intervensi) pada kelompok eksperimen yang satu dengan cara membandingkannya dengan kelompok kontrol.



Keterangan:

S : Sampel

R : Randomisasi

K+: Kelompok larva uji tanpa perlakuan (kontrol +/-abate)

K-: Kelompok larva uji tanpa perlakuan (kontrol -/air)

K1: Kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 0,25%

K2: Kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 0,50%

K3 : Kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 0,75%

K4 : Kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 1,00%

O+: Hasil pengamatan kelompok larva uji tanpa perlakuan (kontrol+/-abate)

O-: Hasil pengamatan kelompok larva uji tanpa perlakuan (kontrol-/air)

O1: Hasil pengamatan kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 0,25%

O2: Hasil pengamatan kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 0,50%

O3: Hasil pengamatan kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 0,75%

O4: Hasil pengamatan kelompok larva uji dengan pemberian Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada konsentrasi 1,00%

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah larva instar III *Aedes aegypti* Larva hasil biakan laboratorium rearing nyamuk Laboratorium Entomologi Fakultas Kedokteran UNHAS, yang diperoleh peneliti dalam bentuk instar III.

2. Sampel

Besar sampel 25 ekor larva *Aedes aegypti* instar III. Diletakkan dalam 6 wadah, yang masing-masing wadah berisi 25 ekor larva. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali pada tiap bahan uji. Dosis ini sesuai dengan Panduan WHO (2005) tentang penelitian larvasida. Jumlah seluruh sampel yang dibutuhkan sebanyak 450 larva *Aedes aegypti*.instar III.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Simple Random Sampling* terhadap larva *Aedes aegypti*.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Variabel bebas atau independent penelitian ini adalah Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*), lama pajanan dan larva *Aedes aegypti* instar III.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat atau dependent dalam penelitian ini adalah Lethal Concentration₅₀ (LC₅₀), Lethal Concentration₉₀ (LC₉₀), dan mortalitas larva *Aedes aegypti* instar III.

E. Instrumen Penelitian

1. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*)

a) Alat

Alat yang digunakan antara lain, toples (wadah maserasi), kain, oven merek Mermet, *rotavapor* merek Heidolph, wadah penyimpanan, blender, pisau, neraca analitik merek Kern.

b) Bahan

Bahan yang digunakan antara lain, Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) dan etanol 96%.

2. Uji Fitokimia (metode Harborne)

Uji fitokimia dilakukan di Laboratorium Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terdiri atas uji alkaloid, uji saponin dan flavonoid, uji tanin, dan uji triterpenoid dan steroid pada Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*).

3. Uji Larvasida

a) Alat

Alat yang digunakan adalah gelas ukur 250 ml, wadah plastik bervolume 200 ml, pipet ukur, neraca analitik merek Kern, kertas label, *stopwatch*, *pH test kit* dan termometer.

b) Bahan

Bahan yang digunakan antara lain, aquades, Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*), dan larva *Aedes aegypti*.

4. Prosedur Uji

a) Pembuatan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*)

Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) yang akan diekstraksi diperoleh dari pekarangan warga. Daun dipilih secara random. Setelah itu daun beluntas tersebut dicuci dengan air bersih yang mengalir, lalu dikeringkan dengan oven dengan suhu 30-45⁰C. Kemudian disimpan dalam wadah bersih dan tertutup rapat.

Daun Beluntas ditimbang sebanyak 600 gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 96% secukupnya (hingga terlarut). Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan selama 3 × 24 jam. Filtrat etanol diperoleh kemudian dikumpulkan dan

diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotavapor* sampai diperoleh ekstrak etanol kental sampai di peroleh Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*).

b) Pemeliharaan dan penyiapan larva *Aedes sp.*

Larva nyamuk yang didapat dari Laboratorium Entomologi Universitas Hasanuddin, dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan yang berisi air dan dipelihara hingga menjadi pupa di laboratorium. Selama pemeliharaan, larva diberi makan berupa *fish food*. Setelah menjadi dewasa, ke dalam kandang pemeliharaan dimasukkan ovitrap sebagai tempat nyamuk meletakkan telurnya. Kemudian telur yang telah diletakkan oleh nyamuk betina dimasukkan kembali ke dalam wadah pemeliharaan larva hingga menetas. Setelah menetas, larva dipelihara hingga mencapai instar III. Larva instar III ini diuji terhadap Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*).

c) Uji Larvasida

- 1) Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) diambil dan ditimbang sesuai dengan konsentrasi yang akan dipakai lalu dimasukkan dalam gelas ukur. Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas yang dipakai adalah 0,25%, 0,5%, 0,75% 0,1%, satu wadah diisi 1% *temephos* (abate) sebagai kontrol positif, serta 1 wadah diisi air sebagai kontrol negatif .
- 2) Air ditambahkan ke dalam gelas ukur yang telah dimasukkan ekstrak sesuai dengan konsentrasinya hingga volume 100 ml kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing wadah plastik yang bervolume 200 ml.

- 3) Pada masing-masing wadah plastik 200 ml tersebut dimasukkan 25 ekor larva *Aedes aegypti* instar III, termasuk kontrol dan diberi makanan seperti remahan hati ayam.
- 4) Lakukan pengukuran suhu dan pH air dengan menggunakan termometer dan pH test, pada tiap wadah.
- 5) Jumlah larva yang mati dihitung pada menit ke 5, 10, 20, 40, 60, 120, 240, 480, 1440, 2880, dan 4320 sejak diberi perlakuan.
- 6) Perlakuan terhadap sampel uji dilakukan 3 kali replikasi.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari jumlah larva yang mati setiap jam pada setiap konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn). Data yang dikumpulkan dicatat dalam bentuk tabel. Replikasi diulangi sebanyak 3 (tiga) kali

G. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dijaga dengan :

1. *Matching*, yaitu dengan menyamakan kondisi larva nyamuk (menyamakan usia nyamuk, yaitu Larva *Aedes aegypti* instar III)
2. Mengambil sampel secara acak
3. Menggunakan kriteria standar dalam menilai kematian larva nyamuk (larva tidak menunjukkan pergerakan) dan menggunakan alat ukur yang sama.
4. Reliabilitas data dijaga dengan replikasi 3 kali pada setiap kelompok uji.

H. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian seperti terlihat pada tabel berikut:

Jumlah mortalitas larva *Aedes sp* yang diberi Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*)

Waktu (menit)	Konsentrasi Etanol Ekstrak Daun Beluntas (<i>Pluchea indica Linn</i>)																	
	0.25%			50%			0.75%			1%			1% (abate)			Air		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A ₁	A ₂	A ₃
5																		
10																		
20																		
40																		
60																		
120																		
240																		
480																		
1440																		
2880																		
4320																		

Tabel 1. Pencatatan Jumlah Mortalitas Larva *Aedes sp*

Keterangan : A1 : Replikasi Satu

A2 : Replikasi Dua

A3 : Replikasi Tiga

I. Analisis Data

Setelah diperoleh data jumlah larva yang hidup dan yang mati, maka dilakukan uji statistik menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows Release 21.0*, yaitu:


1. Regresi Linier

Analisis regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kenaikan konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap kematian larva *Aedes sp* dan pengaruh waktu pajanan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap kecepatan kematian larva *Aedes aegypti*

2. Analisis Probit

Untuk mengetahui daya bunuh Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap larva *Aedes aegypti* yang dinyatakan dengan LC (*Lethal Concentration*).

J. Alur Penelitian



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan selama 1 bulan 3 hari pada tanggal 01 Februari-03 April 2016 di Laboratorium Laboratorium Kesehatan Lingkungan & Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta Laboratorium Entomologi Universitas Hasanuddin didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengukuran Suhu Ekstrak Daun Beluntas
Sebelum Perlakuan

Konsentrasi Ekstrak (%)	Suhu (⁰ C)		
	Replikasi		
	I	II	III
Kontrol +	28	27	28.5
Kontrol -	28	27	28.5
0,25	28	27	28.5
0,50	28	27	28.5
0,75	28	27	28.5
1,00	28	27	28.5

Sumber: Data primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 1 diketahui suhu larutan ekstrak daun beluntas menggunakan thermometer dari berbagai konsentrasi dan replikasi sebelum perlakuan terhadap larva *Aedes aegypti* berkisar antara 27⁰C – 28.5⁰C.

Tabel 2. Hasil Pengukuran pH Ekstrak Daun Beluntas Sebelum Perlakuan

Konsentrasi Ekstrak (%)	pH		
	Replikasi		
	I	II	III
Kontrol +	7	7	7
Kontrol -	7	7	7
0,25	7	7	7
0,50	7	7	7
0,75	7	7	7
1,00	7	7	7

Sumber: Data primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 2 diketahui pH larutan ekstrak daun beluntas dari berbagai konsentrasi dan replikasi sebelum perlakuan terhadap larva *Aedes aegypti* adalah 7 (netral).

Tabel 1. Senyawa Hasil Kualitatif Uji Fitokimia Ekstrak Daun Beluntas

Jenis Uji Fitokimia	Hasil Uji
Alkaloid	++
Saponin	+++
Tanin	+++
Flavonoid	++
Triterpenoid	+
Steroid	+

Keterangan : + Positif lemah, ++ Positif, +++ Positif Kuat


Berdasarkan data tabel 1, menunjukkan bahwa pada ekstrak daun beluntas (*Pluchea indica Linn*) terkandung semua senyawa fitokimia yang berfungsi sebagai larvasida. Kandungan senyawa terbanyak yaitu Saponin dan Tanin, dan yang terendah yaitu Triterpenoid dan Steroid.

Tabel 4. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas dengan Berbagai Konsentrasi selama 60 menit

Konsentrasi ekstrak (%)	Jumlah larva uji	Jumlah kematian larva			Jumlah	Rata-rata	Persentase (%)
		Replikasi					
		I	II	III			
Kontrol +	25	1	1	1	3	1	4%
Kontrol -	25	0	0	0	0	0	0,0
0,25	25	0	0	0	0	0	0,0
0,50	25	0	0	0	0	0	0,0
0,75	25	0	0	0	0	0	0,0
1,00	25	2	2	3	7	2.33	9.33%

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol negatif, tidak ditemukan adanya kematian larva *Aedes aegypti* pada semua replikasi. Begitu pula pada konsentrasi 0,25%, konsentrasi 0,50%, dan konsentrasi 0,75%, sedangkan pada kontrol positif (abate 1,00%) ditemukan rata-rata larva mati sebanyak (4%) dan konsentrasi 1,00% di temukan rata-rata larva mati sebanyak (9.33%) selama 60 menit perlakuan. Persentase kematian larva dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data primer, 2016

Grafik 1. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas Berdasarkan Konsentrasi Ekstrak selama 60 menit

Berdasarkan gambar grafik 12, diketahui bahwa persentase kematian larva *Aedes aegypti* setelah pemberian ekstrak daun beluntas selama 60 menit belum ditemukan kematian larva pada konsentrasi 0,25%, 0,50% dan 0,75% sedangkan kematian larva baru ditemukan pada kontrol positif (abate 1,00%) dan konsentrasi ekstrak 1,00%.


Tabel 5. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas dengan Berbagai Konsentrasi selama 120 menit

Konsentrasi ekstrak (%)	Jumlah larva uji	Jumlah kematian larva			Jumlah	Rata-rata	Persentase (%)
		Replikasi					
		I	II	III			
Kontrol +	25	5	5	5	15	5	20%
Kontrol -	25	0	0	0	0	0	0
0,25	25	0	1	1	2	0.67	2.67%
0,50	25	4	4	5	13	4.36	17.33%
0,75	25	5	6	6	17	5.67	22.67%
1,00	25	8	8	7	23	7.67	30.67%

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 5 dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol negatif, tidak ditemukan adanya kematian larva *Aedes aegypti* pada semua replikasi sedangkan pada kelompok kontrol positif (abate 1,00%) ditemukan persentase larva mati sebanyak 20%.. Pada kelompok yang diberi perlakuan dengan pemberian ekstrak daun beluntas persentase kematian larva terendah terdapat pada konsentrasi 0,25% yaitu 2,67% larva mati sedangkan persentase kematian larva tertinggi terdapat pada konsentrasi 1,00% yaitu 30,67% larva mati selama 120 menit.

Selain itu, dapat diketahui bahwa jumlah kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas. Persentase larva yang mati pada setiap konsentrasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data Primer, 2016

Grafik 2. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas Berdasarkan Konsentrasi Ekstrak selama 120 menit

Berdasarkan gambar grafik 13, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun beluntas semakin tinggi pula persentase kematian larva *Aedes aegypti* selama 120 menit perlakuan.


Tabel 6. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas dengan Berbagai Konsentrasi selama 240 menit

Konsentrasi ekstrak (%)	Jumlah larva uji	Jumlah kematian larva			Jumlah	Rata-rata	Persentase (%)
		Replikasi					
		I	II	III			
Kontrol +	25	8	9	9	26	8.67	34.67%
Kontrol -	25	0	0	0	0	0	0
0,25	25	5	7	7	19	6.33	25.33%
0,50	25	9	8	6	23	7.67	30.67%
0,75	25	10	11	10	31	10.33	41.33%
1,00	25	15	14	17	46	15.33	61.33%

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 6 dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol negatif tidak ditemukan adanya kematian larva *Aedes aegypti* pada semua replikasi. Pada kontrol positif (abate 1,00%) ditemukan kematian larva sebanyak 34,67%. Pada kelompok yang diberi perlakuan dengan pemberian ekstrak daun beluntas persentase kematian larva terendah terdapat pada konsentrasi 0,25% yaitu 25,33% larva mati sedangkan persentase kematian larva tertinggi terdapat pada konsentrasi 1,00% yaitu 61,33% larva mati selama 240 menit.

Selain itu, dapat diketahui bahwa jumlah kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas. Persentase larva yang mati pada setiap konsentrasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data Primer, 2016

Grafik 3. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas Berdasarkan Konsentrasi Ekstrak selama 240 menit

Berdasarkan gambar grafik 14, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun beluntas semakin tinggi pula persentase kematian larva *Aedes aegypti* selama 240 menit perlakuan.

Tabel 7. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas dengan Berbagai Konsentrasi selama 480 menit


Konsentrasi ekstrak (%)	Jumlah larva uji	Jumlah kematian larva			Jumlah	Rata-rata	Persentase (%)
		Replikasi					
		I	II	III			
Kontrol +	25	17	15	17	49	16.33	65.33%
Kontrol -	25	0	0	0	0	0	0
0,25	25	9	10	12	31	10.33	41.33%
0,50	25	15	15	14	44	14.67	58.67%

0,75	25	17	15	16	48	16	64%
1,00	25	19	19	20	58	19.33	77.33%

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 7 dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol tidak ditemukan adanya kematian larva *Aedes aegypti* pada semua replikasi. Pada kelompok kontrol negatif (abate 1,00%), ditemukan kematian larva sebanyak 65,33%. Pada kelompok yang diberi perlakuan dengan pemberian ekstrak daun beluntas persentase kematian larva terendah terdapat pada konsentrasi 0,25% yaitu 41,33% larva mati sedangkan persentase kematian larva tertinggi terdapat pada konsentrasi 1,00% yaitu 77,33% larva mati selama 480 menit.

Selain itu, dapat diketahui bahwa jumlah kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas. Persentase larva yang mati pada setiap konsentrasi dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Data Primer, 2016

Grafik 4. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas Berdasarkan Konsentrasi Ekstrak selama 480 menit

Berdasarkan gambar grafik 15, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun beluntas semakin tinggi pula persentase kematian larva *Aedes aegypti* selama 480 menit perlakuan.


Tabel 8. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas dalam Berbagai Konsentrasi selama 1440 menit

Konsentrasi ekstrak (%)	Jumlah larva uji	Jumlah kematian larva			Jumlah	Rata-rata	Persentase (%)
		Replikasi					
		I	II	III			
Kontrol +	25	22	23	22	67	22.3	89.33%
Kontrol -	25	0	0	0	0	0	0
0,25	25	16	17	15	48	16	64%
0,50	25	17	17	18	52	17.33	69.33%
0,75	25	17	19	20	56	18.67	74.67%
1,00	25	25	25	25	75	25	100%

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 8 dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol tidak ditemukan adanya kematian larva *Aedes aegypti* pada semua replikasi. Pada kelompok kontrol positif (abate 1,00%) ditemukan kematian larva sebanyak 89,33%. Pada kelompok yang diberi perlakuan dengan pemberian ekstrak daun beluntas rata-rata kematian larva terendah terdapat pada konsentrasi 0,25% yaitu 64% larva mati sedangkan rata-rata kematian larva tertinggi terdapat pada konsentrasi 1,00% yaitu 100% larva mati selama 1440 menit.

Selain itu, dapat diketahui bahwa jumlah kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas. Persentase larva yang mati pada setiap konsentrasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data Primer, 2016

Grafik 5. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas Berdasarkan Konsentrasi Ekstrak selama 1440 menit

Berdasarkan gambar grafik 16, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak semakin tinggi pula persentase kematian larva *Aedes aegypti*. Selain itu, semakin lama larva *Aedes aegypti* terpajan oleh ekstrak daun beluntas semakin banyak jumlah kematian larva.


Tabel 9. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* dengan Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas Berdasarkan Lama Pajanan

Waktu (menit)	Persentase Jumlah Larva Mati (%)					
	Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (<i>Plichea indica L</i>)					
	Kontrol -	Kontrol +	0,25%	0,50%	0,75%	1,00%
5	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0
60	0	4	0	0	0	9,33
120	0	20	0,67	17,33	22,67	30,67
240	0	34,67	25,33	30,67	41,33	61,33
480	0	65,33	41,33	58,67	64	77,33
1440	0	89,33	64	69,33	74,67	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 9, diketahui bahwa kematian larva uji pada masing-masing kelompok menunjukkan persentase kematian larva yang bertambah seiring lamanya waktu pajanan dan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 4 bahwa kematian larva baru terlihat pada menit ke-60 pada konsentrasi ekstrak 1,00% yang menunjukkan jumlah larva yang mati 13,75% sedangkan pada konsentrasi lain belum ditemukan adanya kematian larva. Kematian larva baru terlihat pada konsentrasi ekstrak lainnya setelah menit ke-120 yaitu pada konsentrasi 0,25% sebanyak 0,67% larva yang mati, konsentrasi 0,50% sebanyak 17,33%, konsentrasi 0,75% sebanyak 22,67% dan konsentrasi 1,00% sebanyak 30,67%. Perbedaan terlihat pada persentase larva yang mati pada menit ke 1440, yaitu konsentrasi 0,25 % sebanyak 64% larva mati, konsentrasi 0,50% sebanyak

69,33% larva mati, konsentrasi 0,75% sebanyak 74,67% larva mati, dan konsentrasi 1,00% sebanyak 100% larva mati.



Sumber: Data Primer, 2016

Grafik 6. Persentase Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Beluntas Berdasarkan Lama Pajanan

Berdasarkan gambar grafik 16 dapat diketahui bahwa semakin lama larva *Aedes aegypti* terpajan Ekstrak Daun Beluntas semakin tinggi pula persentase kematian larva *Aedes aegypti*.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan program analisis data *Statistic Product and Service Solution (SPSS) for Windows Release 21.0*. Analisis pertama yang dilakukan adalah menghitung apakah data hasil penelitian yang diperoleh memiliki distribusi yang normal atau

tidak. Hasil yang diperoleh dari uji normalisasi data yaitu $p > 0,05$ yang berarti distribusi data normal. Kemudian dilakukan analisis lanjutan sebagai berikut:

B. Pembahasan

1. Senyawa pada Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica Linn) sehingga efektif sebagai larvasida Aedes aegypti Instar III.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap kematian larva nyamuk *Aedes aegypti*. Pada penelitian ini digunakan Ekstrak Daun Beluntas yang telah diekstraksi dengan metode maserasi dengan menggunakan etanol 96%, yang dimaksudkan agar didapatkan kandungan flavonoid, saponin, dan tanin yang terkandung dalam Ekstrak Daun Beluntas yang diduga memiliki efek larvasida terhadap larva *Aedes aegypti*.

Pelarut etanol 96% yang digunakan dalam pembuatan Ekstrak Daun Beluntas adalah pelarut yang lebih selektif, dan memiliki sifat toksik yang rendah dari pada pelarut lainnya. Etanol 96% bersifat semipolar sehingga dapat melarutkan zat kimia yang bersifat polar maupun nonpolar (Ardianto, 2008 dalam Haditomo, 2015).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangbiakan larva nyamuk *Aedes aegypti*. Selama pemeliharaan, larva diberi makan dengan *fish food*. Air dalam wadah diganti selama pengulangan. Setelah larva menjadi pupa, wadah dipindahkan ke kandang pemeliharaan hingga menjadi nyamuk dewasa dan nyamuk tersebut bertelur. Telur dipelihara hingga menetas. Setelah menetas larva dipelihara hingga mencapai instar III untuk uji larvasida Ekstrak Daun Beluntas.

Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran suhu dan pH Ekstrak Daun Beluntas pada wadah sebelum larva dipindahkan. Hasil pengukuran menunjukkan suhu ekstrak yaitu 27⁰C-28,5⁰C dan pH yaitu 7. Hal ini masih sesuai dengan kriteria rata-rata suhu habitat optimum dan pH yang baik bagi spesies larva nyamuk *Aedes aegypti* agar hidup normal berdasarkan Achmadi (2009) bahwa larva masih bisa hidup pada pH 4 - 9 dan berdasarkan Depkes RI 2001 bahwa pada umumnya larva *Aedes aegypti* hidup pada suhu kisaran 25⁰C-27⁰C dan larva akan mati ketika berada pada suhu di bawah 10⁰C dan di atas 40⁰C (Dalimartha, 1999 dalam Nanang Hidayatulloh, dkk 2014).

Larva uji coba yang digunakan untuk penelitian ini adalah larva instar III karena pada stadium ini struktur tubuh larva sudah lengkap, ukuran lebih besar sehingga sistem pertahanan lebih kuat dari instar I dan instar II serta pada fase ini tubuh larva menyerap makanan paling banyak. Selama penelitian larva diberi makan agar larva tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sama halnya dengan habitat alaminya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan menunjukkan persentase rata-rata jumlah kematian larva selama 1440 menit (24 jam) pada kelompok kontrol negatif (tanpa perlakuan) tidak ditemukan larva yang mati (0%). Pada penelitian ini, kematian larva *Aedes aegypti*. ditemukan pada menit ke- 60 yaitu sebesar 9.33%. Kematian larva pada konsentrasi lain ditemukan pada menit ke- 120, jumlah kematian larva yaitu pada konsentrasi 2.67%

ditemukan larva mati sebesar 5,0%, pada konsentrasi 0,50% sebesar 17.33% larva mati, pada konsentrasi 0,75% sebesar 22.67% larva mati, sedangkan pada konsentrasi 1,00% sebesar 30.67% larva mati. Sedangkan pada abate 1% ditemukan kematian sebesar 4% pada menit ke-60 dan 20% pada menit ke 120. Pada menit ke-240 kematian larva pada konsentrasi 0,25% sebesar 25.33% larva mati, pada konsentrasi 0,50% sebesar 30.67% larva mati, pada konsentrasi 0,75% sebesar 41.33% larva mati dan pada konsentrasi 1,00% sebesar 61.33% larva mati. Persentase kematian larva terus meningkat pada setiap konsentrasi, serta pada konsentrasi abate 1% ditemukan kematian larva sebesar 34.67%. Setelah 480 menit perlakuan, ditemukan kematian larva pada konsentrasi 0,25% sebesar 41.33% larva mati, pada konsentrasi 0,50% sebesar 58.67% larva mati, pada konsentrasi 0,75% sebesar 64% larva mati dan pada konsentrasi 1,00% sebesar 77.33% larva mati. Dan pada persentase abate 1% ditemukan kematian sebesar 65.33%. Adapun persentase kematian larva setelah menit ke-1440 yaitu 64% pada konsentrasi ekstrak 0,25%, 69.33% larva mati pada konsentrasi ekstrak 0,50%, jumlah kematian larva sebesar 74.67% pada konsentrasi ekstrak 0,75% dan jumlah kematian larva 100% pada konsentrasi 1,00% serta pada kontrol positif (abate 1%) ditemukan kematian larva sebesar 89.33%. Hal ini menunjukkan bahwa Ekstrak Daun Beluntas memang memiliki efek larvasida terhadap larva *Aedes aegypti*. Gambar grafik 1,2,3,4,5 menunjukkan bahwa pada konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas yang berbeda mempunyai daya bunuh terhadap larva yang berbeda pula, dimana semakin tinggi

konsentrasinya, maka semakin banyak jumlah larva mati sampai tingkat konsentrasi tertentu.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi Utariningsih dan Dian Purwanti (2014) bahwa jeruk nipis efektif mematikan larva nyamuk *Aedes aegypti*. Daun Beluntas banyak mengandung senyawa aktif, seperti flavonoid dan tanin yang berperan menyebabkan *stomach poisoning* (mengganggu pencernaan) pada larva *Aedes aegypti*.

Flavonoid yang merupakan golongan fenol dapat menyebabkan penggumpalan protein. Denaturasi protein tersebut menyebabkan permeabilitas dinding sel dalam saluran pencernaan menurun. Hal ini akan mengakibatkan transport nutrisi terganggu sehingga pertumbuhan terhambat dan akhirnya larva nyamuk akan mati (Dalimartha, 1999 dalam Nanang Hidayatulloh, dkk 2011). Selain itu flavonoid juga menyerang sistem saraf pada beberapa organ vital sehingga menimbulkan suatu perlemahan saraf seperti pernapasan dan menyebabkan kematian (Remy dan Remy, 2013).

Uji flavonoid menunjukkan hasil positif dengan adanya perubahan warna kuning. Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenol yang memiliki banyak gugus -OH dengan adanya perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, sehingga sifatnya polar. Golongan senyawa ini mudah terekstrak dalam pelarut etanol yang memiliki sifat polar karena adanya gugus hidroksil, sehingga dapat terbentuk ikatan hidrogen (Sriwahyuni, 2010) Flavonoid adalah senyawa yang ditemukan pada buah-

buah, sayur-sayuran, dan beberapa minuman yang memiliki beragam manfaat biokimia dan efek antioksidan. Senyawa flavonoid memiliki efek antihipertensi. Flavonoid merupakan pigmen tanaman untuk memproduksi warna bunga merah atau biru pigmentasi kuning pada kelopak yang digunakan untuk menarik hewan penyerbuk (Worotikan, 2011). Flavonoid adalah golongan senyawa polifenol yang diketahui memiliki sifat sebagai penangkap radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif, dan bekerja sebagai antiinflamasi (Pourmourad *et al*, 2006). Menurut Robinson (1995), flavonoid berfungsi mengatur pertumbuhan, fotosintesis, antimikroba dan antivirus. Flavonoid bermanfaat untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, antiinflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik (Haris, 2011). Uji flavonoid menggunakan pereaksi wilstater dilakukan dengan menambah Mg dan HCl pekat pada sampel ekstrak etanol kulit batang kelor. Penambahan HCl pekat digunakan untuk menghidrolisis flavonoid menjadi aglikonnya, yaitu dengan menghidrolisis O-glikosil. Glikosil akan tergantikan oleh H⁺ dari asam karena sifatnya yang elektrofilik. Reduksi dengan Mg dan HCl pekat dapat menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah atau jingga pada flavonol, flavanon, flavanonol dan xanton (Robinson, 1995). Uji fitokimia fenol positif ditandai dengan perubahan warna hijau menjadi hijau kehitaman. Senyawa fenol sering digunakan sebagai antibakteri. Mekanisme fenol sebagai anti bakteri adalah karena fenol mengubah permeabilitas membran

sitoplasma yang menyebabkan kebocoran nutrisi dari dalam sel sehingga sel bakteri akan mati atau terhambat pertumbuhannya dan mengendapkan protein.

Tanin merupakan himpunan polihidroksi fenol yang dapat dibedakan dari fenol lain karena kemampuannya mengendapkan protein, hal ini bisa dibuktikan apabila tanin direaksikan dengan gelatin akan terbentuk endapan, karena gelatin merupakan salah satu jenis protein yang mampu diendapkan oleh tanin. Endapan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara tanin dan protein pada gelatin. Ikatan hidrogen yang terbentuk disebabkan oleh atom H yang terikat dengan 2 atom O ataupun terikat dengan atom O dan N dari struktur tanin dan gelatin (Sriwahyuni, 2010). Pada tumbuhan, tanin berfungsi sebagai pertahanan diri dari serangan bakteri, fungi, virus, insekta herbivora dan vertebrata herbivora. Selain itu, tanin juga penting untuk mencegah degradasi nutrisi yang berlebihan di dalam tanah. Dengan demikian simpanan nutrisi di dalam tanah untuk periode vegetasi berikutnya dari tumbuhan dapat terpenuhi (Leinmuller *et al*, 1991). Dalam bidang kesehatan, tanin juga memiliki aktivitas sebagai antibiotik. Prinsip kerja tanin sebagai antibiotik adalah dengan cara membentuk kompleks dengan enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh patogen atau dengan mengganggu proses metabolisme patogen tersebut. Ellagitanin dapat mencegah proses absorpsi virus HIV ke dalam sel dan menghambat aktivitas transkriptase kebalikan yang terdapat di dalam virus. Tanin terkondensasi memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan dapat melindungi kulit dari kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi ultraviolet (Cordoves *et al*, 2015).

Sebagai racun perut, flavonoid, saponin, dan tanin dapat masuk ke dalam tubuh larva *Aedes aegypti* melalui sistem pencernaan dan menyebabkan mekanisme penghambatan makan (Remy dan Remy, 2013). Saraf pusat pada larva *Aedes aegypti* terdiri dari sepasang rantai saraf yang terdapat disepanjang tubuh bagian ventral. Pada setiap segmen terjadi suatu pengumpulan saraf yang disebut ganglion. Limonoid dapat menyebar ke jaringan saraf dan mempengaruhi fungsi-fungsi saraf. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya aktivitas mendadak pada saraf pusat sehingga menyebabkan larva kejang.

Selain itu flavonoid, saponin, dan tanin dapat masuk ke dalam tubuh larva *Aedes aegypti* melalui kulit atau dinding tubuh dengan cara osmosis karena kulit atau dinding tubuh larva bersifat permeabel terhadap senyawa yang dilewati. Zat tersebut akan masuk ke sel-sel epidermis yang selalu mengalami pembelahan dalam proses pergantian kulit, sehingga sel-sel epidermis mengalami kelumpuhan (paralisis) dan akhirnya mati (Wijayakusuma, 1994 dalam Lasmini Nangune, dkk. 2051).

2. *LC₅₀ Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica Linn) terhadap larva Aedes aegypti Instar III.*

Penelitian diuji menggunakan analisis Probit dengan tingkat kepercayaan 95% untuk mendapatkan nilai LC_{50} dan LC_{90} . Dari hasil analisis Probit, dapat diestimasikan besar konsentrasi yang mengakibatkan kematian larva *Aedes aegypti* sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Probit *Lethal Concentration 50%* dan *Lethal Concentration 90%* Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) selama 1440 menit

No.	<i>Lethal Concentration</i>	Konsentrasi (%)	Interval konsentrasi (%)
1.	<i>Lethal Concentration 50%</i>	0,975	0,710 – 2,266
2.	<i>Lethal Concentration 90%</i>	12,779	4,019-855,326

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data tabel 16 menunjukkan *Lethal Concentration 50%* (LC_{50}) adalah konsentrasi 0,975% sedangkan *Lethal Concentration 90%* (LC_{90}) adalah konsentrasi 12,779% selama 1440 menit perlakuan.

Lethal Concentration (LC) 50% adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% larva uji. *Lethal Concentration* (LC) 90% adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian 90% larva uji. Pemilihan istilah *Lethal Concentration* (LC) lebih dipilih daripada istilah *Lethal Dose* (LD) karena pada penelitian ini sulit untuk menentukan dosis sehingga lebih dipilih istilah *Lethal Concentration* yang secara lebih tepat menggambarkan konsentrasi ekstrak pada media percobaan. Dalam penelitian ini estimasi nilai *Lethal Concentration 50%* (LC_{50}) dan nilai *Lethal Concentration 90%* (LC_{90}) dianalisis setelah pengamatan menit ke-1440.

Estimasi nilai *Lethal Concentration 50%* (LC_{50}) melalui uji analisis probit adalah pada konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas 0,975% dengan interval antara 0,710% dan 2,266% sedangkan nilai *Lethal Concentration 90%* (LC_{90}) adalah 12,779% dengan interval antara 4,019% dan 855,326%, setelah 1440 menit

perlakuan. Bila dikonversikan dengan satuan *part per million* (ppm) maka nilai LC_{50} adalah 9750 ppm dan nilai LC_{90} adalah 12.779 ppm.

Semakin rendah nilai LC_{50} dan LC_{90} suatu zat maka zat tersebut mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dalam membunuh hewan uji, karena zat tersebut perlu konsentrasi yang lebih rendah untuk mematikan hewan coba (Ardianto, 2008 dalam Haditomo, 2014).

3. *LC₉₀ Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica Linn) terhadap larva Aedes aegypti Instar III*

Nilai *Lethal Concentration* 90% (LC_{90}) adalah 12,779% dengan interval antara 4,019% dan 855,326%, setelah 1440 menit perlakuan. Nilai *Lethal Concentration* 90% menunjukkan jumlah kematian larva sebesar 90% setelah 1440 menit.

4. *Hubungan antara jumlah Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica Linn) terhadap mortalitas larva Aedes aegypti Instar III.*

Untuk membuktikan hipotesa bahwa memang ada hubungan antara peningkatan konsentrasi dan lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) dengan jumlah larva yang mati digunakan uji hipotesis regresi linier.

Berdasarkan data pada tabel 9, menunjukkan bahwa nilai R (nilai koefisien korelasi) adalah 0,958. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian larva ada di kategori kuat. Nilai koefisien determinan (KD) yang diperoleh adalah 91,8% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel peningkatan konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas memiliki pengaruh kontribusi

sebesar 91,8% terhadap variabel jumlah kematian larva *Aedes aegypti*. Artinya semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin banyak jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati.

Berdasarkan data tabel 10 diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa kita dapat menolak H_0 . Artinya ada hubungan linier antara peningkatan konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas dengan jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati.

Data diuji regresi linier sederhana untuk mencari hubungan antara kedua variabel. Hasil regresi linier diuraikan selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil *Model Summary* Uji Regresi Linier Hubungan Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) dengan Jumlah Kematian Larva *Aedes aegypti*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,958 ^a	0,918	0,912	0,10886

Sumber: Data primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 10, menunjukkan bahwa nilai R (nilai koefisien korelasi) adalah 0,958. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori kuat. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R *Square* atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa baik model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 91,8% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas memiliki pengaruh kontribusi sebesar 91,8% terhadap variabel jumlah kematian larva *Aedes aegypti* dan 8.2% lainnya

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas.

Tabel 11. Hasil *Anova* Uji Regresi Linier Hubungan Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) dengan Jumlah Kematian Larva *Aedes aegypti*

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,721	1	1,721	145,229	,000 ^b
Residual	0,154	13	0,012		
Total	1,875	14			

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data tabel 11 dapat ditentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.). Cara yang paling mudah dengan uji Sig., dengan ketentuan, jika nilai Sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai Sig. = 0,000 yang berarti < kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Tabel 12. Hasil *Coefficients* Uji Regresi Linier Hubungan Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) dengan Jumlah Kematian Larva *Aedes aegypti*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,083	0,056		-1,476	(Constant)
Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi	0,074	0,006	0,958	12,051	Jumlah Larva Mati Berdasarkan

					Konsentrasi
--	--	--	--	--	-------------

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data tabel 12, menunjukkan uji koefisien yang didapatkan nilai konstanta sebesar 0,083 dan nilai koefisien regresi sebesar +0,074. Sehingga didapatkan persamaan regresi yaitu $y=0,83+0,074x$. Y adalah variabel dependen yaitu jumlah larva yang mati sedangkan x adalah variabel independen yaitu konsentrasi ekstrak daun beluntas. Jadi persamaan linier dapat ditulis; Jumlah larva mati = $0,083+0,074*\text{konsentrasi ekstrak daun beluntas}$.

Arti persamaan regresi linier tersebut yaitu:

- 1) Konstanta sebesar 0,083 artinya tanpa pemberian ekstrak daun beluntas jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati sebesar 0,083 %.
- 2) Tanda positif artinya dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas maka jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati akan meningkat.
- 3) Koefisien 0,074 menunjukkan dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun beluntas sebesar 1 % akan meningkatkan jumlah larva yang mati sebesar 0,074 %.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas sebesar 1,00% merupakan konsentrasi yang paling efektif mematikan larva *Aedes aegypti* dibandingkan dengan konsentrasi ekstrak daun beluntas 0,25%, 0,50% dan 0,75%. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi ekstrak 1,00% mampu mematikan larva lebih cepat dan lebih banyak dari pada konsentrasi ekstrak 0,25%, 0,50% dan 0,75%. Hal ini dibuktikan dari data persentase kematian

larva dari berbagai pengamatan yang dilakukan, pada konsentrasi ekstrak 1,00% telah ditemukan kematian larva sebesar 9,33% selama 60 menit pajanan ekstrak terhadap larva *Aedes aegypti*, sedangkan pada konsentrasi ekstrak 0,25%, 0,50% dan 0,75% belum ada kematian larva *Aedes aegypti*. Begitu pula pada pengamatan selanjutnya pada menit ke-120, 240, 480, dan 1440 menunjukkan peningkatan persentase kematian larva *Aedes aegypti* seiring lamanya terpajan oleh Ekstrak Daun Beluntas, yang lebih banyak menyebabkan kematian larva dari pada konsentrasi ekstrak 0,25%, 0,50%, dan 0,75%. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin banyak jumlah larva yang mati dalam waktu tertentu. Semakin lama pajanan ekstrak, semakin banyak pula larva yang mati dalam konsentrasi tertentu. Sedangkan sebagai perbandingan pada kontrol positif (abate 1%) diperoleh kematian larva sebesar 4% dan selama 60 menit pajanan sedangkan 89,33% setelah 1440 menit pajanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Ekstrak Daun Beluntas efektif mematikan larva *Aedes aegypti* dan memiliki hubungan korelasi yang kuat dimana setiap penambahan konsentrasi larva berpengaruh terhadap jumlah kematian larva. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka semakin tinggi pula kandungan bahan aktif yang ada pada Ekstrak Daun Beluntas yaitu kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan triterpenoid.

5. Hubungan antara lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) terhadap mortalitas larva *Aedes aegypti* Instar III.

Lama pajanan ekstrak dengan jumlah kematian larva menunjukkan hubungan yang signifikan. Berdasarkan data pada tabel 12, menunjukkan bahwa nilai R. (nilai koefisien korelasi) adalah 0,862. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori kuat. Nilai koefisien determinan (KD) yang diperoleh adalah 74,2% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas memiliki pengaruh kontribusi sebesar 74,2% terhadap variabel jumlah kematian larva *Aedes aegypti*. Artinya semakin lama larva *Aedes aegypti* terpajan Ekstrak Daun Beluntas semakin banyak jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati.

Uji regresi linier untuk mencari hubungan antara variabel lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas dengan jumlah kematian larva. Hasil regresi linier diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil *Model Summary* Uji Regresi Linier Hubungan Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) dengan Jumlah Kematian Larva *Aedes aegypti*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.862 ^a	0.742	0.722	3.695

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 13, menunjukkan bahwa nilai R (nilai koefisien korelasi) adalah 0,862. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua

variabel penelitian ada di kategori kuat. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 74,2% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas memiliki pengaruh kontribusi sebesar 74,2% terhadap variabel jumlah kematian larva *Aedes aegypti* dan 25.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel lama pajanan ekstrak daun beluntas

Tabel 14. Hasil *Anova* Uji Regresi Linier Hubungan Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) dengan Jumlah Kematian Larva *Aedes aegypti*

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	511,446	1	511,446	37,450	,000 ^b
Residual	177,537	13	13,657		
Total	688,983	14			

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data tabel 14 dapat ditentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.). Cara yang paling mudah dengan uji Sig., dengan ketentuan, jika Nilai Sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai Sig. = 0,000 yang berarti < kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Tabel 15. Hasil *Coefficients* Uji Regresi Linier Hubungan Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* Linn) dengan Jumlah Kematian Larva *Aedes aegypti*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,492	1,299		1
	Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji	0,012	0,002	0,862	

Sumber: Data primer, 2016

Berdasarkan data tabel 15, menunjukkan uji koefisien yang didapatkan nilai konstanta sebesar 4,492 dan nilai koefisien regresi sebesar +0,012. Sehingga didapatkan persamaan regresi yaitu $y=4,492+0,012x$. Y adalah variabel dependen yaitu jumlah larva yang mati sedangkan x adalah variabel independen yaitu lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas. Jadi persamaan linier dapat ditulis; Jumlah larva mati = $4,492+0,012 \cdot \text{lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas}$.

Arti persamaan regresi linier tersebut yaitu:

- 1) Konstanta sebesar 4,492 artinya tanpa penambahan waktu pajanan Ekstrak Daun Beluntas jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati sebesar 4,492%.
- 2) Tanda positif artinya dengan semakin lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas maka jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati akan meningkat.
- 3) Koefisien 0,012 menunjukkan dengan penambahan lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas sebesar 1 menit akan meningkatkan jumlah larva yang mati sebesar 0,012 %.

Berdasarkan data tabel 13 diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa kita dapat menolak H_0 . Artinya ada hubungan linier antara lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas dengan jumlah larva *Aedes aegypti* yang mati.

Hasil persamaan regresi untuk hubungan antara peningkatan konsentrasi terhadap kematian larva yaitu $y=0,83+0,74x$ dan hubungan lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas terhadap kematian larva yaitu $y=4,492+0,012x$.

Kekuatan hubungan antara konsentrasi dan lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas dengan jumlah larva *Aedes aegypti* mati diketahui dengan menggunakan uji hipotesa korelasi *Pearson*. Dengan uji ini didapatkan nilai korelasi sebesar 0,958 dan 0,862. Angka 0,958 dan 0,862 menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan nilai positif menunjukkan hubungan antara peningkatan konsentrasi dan lama pajanan Ekstrak Daun Beluntas dengan jumlah kematian larva *Aedes aegypti* mati berbanding lurus.

Pengendalian vektor dengan menggunakan racun Ekstrak Daun Beluntas termasuk salah satu pengendalian vektor secara kimiawi, karena racun ini mempunyai daya toksisitas melalui senyawa-senyawa kimia penyusunnya.

Sungguh Maha Besar Allah SWT yang telah menciptakan makhluk hidup dengan berbagai macam. Setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, artinya setiap makhluk hidup memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dan binatang merupakan ciptaan Allah swt. yang tak sederhana yang kita pikirkan. Dalam pertumbuhannya sebuah tumbuhan atau

binatang mengalami proses-proses yang amat sangat rumit, yang tidak mudah kita nalar secara sederhana. Oleh karena itu, manusia perlu memperhatikan hal tersebut. Seperti halnya nyamuk yang dipandang merugikan karena menyebabkan penyakit, sebenarnya ada keuntungannya pula.

Sebagaimana yang telah disebutkan, dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam dan melihat "tanda-tanda" di dalamnya. Semua makhluk hidup dan tak hidup di alam semesta diliputi oleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka semua "diciptakan", bahwa mereka menunjukkan kekuasaan, ilmu, dan seni dari "Pencipta" mereka. Manusia bertanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda ini dengan menggunakan akal budinya, untuk memuliakan Allah swt. Walau semua makhluk hidup memiliki tanda-tanda ini, beberapa tanda dirujuk Allah swt. secara khusus dalam al-Qur'an.

Nyamuk adalah salah satunya. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2:26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya

petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.”. (Departemen Agama RI, 2010: 12)

Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk hidup yang biasa dan tidak penting. Namun, ternyata nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti dan dipikirkan sebab di dalamnya terdapat tanda kebesaran Allah. Inilah sebanya “Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu”.

Dalam syariat islam dibangun di atas pondasi *jalbul mashalih* (menciptakan dan mendatangkan kemaslahatan) dan *dar’ul mafasid* (menghapus semua bahaya dan kerusakan). Semua yang merusak dan mengganggu boleh dihilangkan sesuai dengan tingkatan kerusakan dan gangguan yang timbul. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya:

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan (HR. Ibu Majah)

Masalah membunuh serangga yang sering ada di dalam rumah seperti kecoak, dan sejenisnya pernah ditanyakan kepada Syaikh Bin Baz rahimahullah dan beliau menjawab: “*serangga-serangga tersebut apabila menimbulkan gangguan, maka boleh dibunuh namun tidak boleh dilakukan dengan menggunakan api (dibakar)*. Dalam sebuah hadist telah dijelaskan hukum membunuh binatang secara sengaja, salah satunya yaitu, binatang yang boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan adalah setiap hewan atau binatang yang memiliki tabiat yang membahayakan dan menyakiti

manusia maka boleh dibunuh baik di tanah suci maupun di tempat yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Terjemahnya:

“Lima hewan yang semuanya jahat, boleh dibunuh walau di tanah suci; burung gagak, burung rajawali, anjing yang suka melukai, kalajengking dan tikus.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad saw. Telah memberitahukan bahwa bahwa sifat pengganggu melekat pada hewan-hewan tersebut. Dalam bahasa rasulullah, binatang-binatang pengganggu itu disebut *fawasiq*. Nabi Muhammad saw. Pun mengizinkan untuk membunuhnya. Demikian juga serangga diperbolehkan membunuhnya di tanah suci dan di luar tanah suci apabila binatang-binatang tersebut menimbulkan gangguan seperti kecoak, nyamuk dan lain yang menimbulkan gangguan (*Majmû' Fatâwa wa Maqâlât Mutanawwi'ah* 5/301-302).

Dalam kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (2002) dijelaskan, bahwa Allah SWT tidak malu memberi perumpamaan tentang kutu kecil/nyamuk yang diremehkan oleh kaum musyrik (yakni walau yang tidak bermutu darinya), atau lebih kecil dari kutu itu pada nilai kerendahannya dalam pandangan kaum musyrik (yakni walau yang tidak bermutu darinya), atau lebih kecil dari kutu itu pada bentuk badannya atau bagian dari bentuk badannya. Misalnya, hanya sayapnya saja. makhluk hidup. Hal ini seperti disabdakan Nabi saw. : “Seandainya dunia ini memiliki dunia sebesar sayap kutu di sisi Allah, niscaya Dia tidak menganugerahkan

setetes air pun kepada orang kafir.” Ini karena tujuan memberi perumpamaan adalah menjelaskan yang abstrak dalam bentuk konkret sehingga menjadi jelas adanya.(Shihab, 2002,3: 161-162).

Dalam kitab Tafsir Al Azhar karya Hamka dijelaskan, bahwa Allah SWT membuat berbagai perumpamaan. Tuhan pernah mengumpamakan, orang yang mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain laksana laba-laba membuat sarang. Sarang laba-laba sangat rapuh. Tuhanpun pernah mengambil perumpamaan dengan lalat. Bahwa apa-apa yang dipersekutukan orang-orang musyirikin dengan Allah itu, jangankan membuat alam, membuat lalatpun mereka tidak bisa.Orang-orang munafik tidak memperhatikan, tetapi hendak mencari kelemahan. Seperti meremehkan. Peremehan itu dibantah dengan, “Allah tidaklah malu membuat perumpamaan apa saja; nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya”. Artinya, kalau perumpamaan itu tidak penting, tidaklah Tuhan akan mengambilnya menjadi perumpamaan. Maka, dengan turunnya Al-Qur’an, semakin menambah keimanan seorang mukmin. Bahwa, diturunkan untuk seluruh masa dan untuk orang yang berpikir dan mencintai ilmu pengetahuan.

Dalam kitab Tafsir Al Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah Yang Maha Kuasa memandang bahwa mendatangkan contoh dengan sesuatu sebesar nyamuk bahkan lebih kecil dari itu, bukan sebagai sebuah kekurangan. Sebab, Allah-lah yang menciptakan semuanya itu baik yang kecil maupun yang besar. Kaum beriman mengatakan bahwa tidak sekali-kali Allah

mendatangkan misal seperti itu selain hikmah dan maslahat yang terkandung di dalamnya. Yaitu menetapkan semua yang benar dan mengamalkan kebenaran itu. Orang kafir yakni Kaum Yahudi dan orang musyrik. Mereka telah terbiasa menentang kebenaran yang ada. Mereka mempertanyakan apa yang dikehendaki Allah dengan mendatangkan misal yang “rendah” ini yakni dengan memasukkan hal-hal remeh seperti lalat dan nyamuk? Jika mereka menyadari hikmah yang terkandung dalam perumpamaan tersebut, maka mereka tidak akan berpaling atau menentang.

Dari tafsiran-tafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan perumpamaan yang diciptakan Allah SWT. Baik perumpamaan berupa nyamuk, dan yang lebih kecil daripada itu. Kemudian harus disadari bahwa perumpamaan yang telah diciptakan Allah SWT yaitu nyamuk *Aedes aegypti* tentunya sangat penting bagi manusia misalnya dalam penularan penyakit demam berdarah, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan dan kajian mendalam, sehingga hal itu menimbulkan rasa syukur dan semakin yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Pada umumnya, nyamuk dikenal sebagai pengisap dan pemakan darah. Hal ini ternyata tidak terlalu tepat, karena yang mengisap darah hanya nyamuk betina. Selain itu, nyamuk betina tidak membutuhkan darah untuk makan. Baik nyamuk jantan maupun betina hidup dari nektar bunga. Nyamuk betina mengisap darah hanya karena ia membutuhkan protein dalam darah untuk membantu telurnya berkembang. Dengan kata lain, nyamuk betina mengisap darah hanya untuk memelihara kelangsungan spesiesnya.

Di dalam ayat-ayat al-Qur`an, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keberagaman dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya yang amat menakjubkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah memperkuat bukti-bukti kebenaran pernyataan-pernyataan al-Qur`an sesuai dengan fakta. Dalam al-Qur`an disebutkan beberapa tanaman yang memiliki manfaat bagi makhluk lain, salah satu manfaat tanaman yang menurut ilmu pengetahuan modern memiliki khasiat dalam menyembuhkan beberapa macam penyakit. Saat ini banyak tanaman sudah diketahui memiliki potensi farmakologi. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang memanfaatkan tumbuhan daun beluntas sebagai larvasida untuk pengendalian vektor penyakit Demam Berdarah.

Adapun keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan pengukuran suhu larutan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada setiap pengamatan larva *Aedes aegypti* yang mati.
2. Tidak dilakukan pengukuran pH larutan Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) pada setiap pengamatan larva *Aedes aegypti* yang mati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) untuk mematikan larva *Aedes aegypti* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya senyawa aktif pada ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) yang efektif sebagai larvasida *Aedes aegypti* instar III yaitu Saponin dan Tanin.
2. Estimasi nilai Lethal Concentration 50% (LC₅₀) yang dihitung pada menit 1440 yaitu 0.975% atau 9570 ppm setelah larva ekstrak daun beluntas selama 1440 menit.
3. Estimasi nilai *Lethal Consentration* 90% (LC₉₀) yaitu pada konsentrasi dengan interval konsentrasi 12,779% dengan interval konsentrasi antara 4,019% dan 85,5% setelah larva terpajan ekstrak daun beluntas selama 1440 menit.
4. Pengaruh peningkatan jumlah ekstrak Daun Beluntas dengan jumlah kematian larva menunjukkan hubungan yang signifikan dibuktikan dengan nilai $R \leq 1$ (0.862)
5. Lama pajanan ekstrak dengan jumlah kematian larva menunjukkan hubungan yang signifikan dibuktikan dengan nilai $R \leq 1$ (0.958).

B. Implikasi Penelitian

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan formulasi ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) yang lebih aplikatif sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan kandungan Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) yang paling berperan besar sebagai larvasida.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek larvasida ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica Linn*) terhadap genus nyamuk lainnya.

KEPUSTAKAAN

- Ariyanti. Tukiran. *Biolarvasida dari Tumbuhan Bakau Minyak (Rhizopora acipulata)*. Unesa Journal of Chemistry. Vol.1(1); 10.2012
- Danang Setia Budi, *et al.* *Saat Parasit Membasmi Parasit: Uji Efektivitas Ekstrak Benalu sebagai Terapi Malaria Baru*. Fakultas Kedokteran UGM. Yogyakarta. 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Semarang. PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djunaedi, Joni. *Demam Berdarah Dengue DBD*. Malang : UMM Press. 2006.
- Eka Cania, Endah Setyaningrum. *Uji Efektivitas Ekstrak Daun Legundi (Vitex Trifolia) terhadap Larvasida Aedes aegypti*. Fakultas Kedokteran Unlam. Lampung. ISSN: 2337-3776. 2015.
- Erwin Nofyan, *et al.* *Eksplorasi Biolarvasida dari Tumbuhan untuk Pengendalian Larva Nyamuk Aedes aegypti di Sumatera Selatan*. Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung. 2015.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar Juzu' XIX*. Yayasan Latimojong: Surabaya. 1999.
- Handayani, Hasanuddin Ishak, Anwar, *Efektivitas Ektrak Daun Sirih (Piper Batle L.) sebagai Bioinsektisida terhadap Kematian Nyamuk Aedes aegypti*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Unhas. Makassar. 2015.
- Hubullah Fuadzy, Rina Marina. *Potensi Daun Dewa (Gynurapse udochina L. DC) sebagai Larvasida Aedes aegypti (Linn.)*. Lokalitbang P2B2 Ciamis. ASPIRATOR Vol. 4(1); 7-13. 2015.
- Ismatullah A. *et al.* *Uji Efektivitas Larvasida Ekstrak Daun Binahong (Anredera Cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap Larvasida Aedes aegypti Instar III*. Fakultas Kedokteran Unlam. Lampung. ISSN: 2337-3776. 2015.
- Jamaluddin, Moh. *Efektivitas Ekstrak Daun Sambang Colok (Aerva sanguinolenta) sebagai Larvasida Nyamuk Aedes aegypti dan Culex quinquefasciatus*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2013.
- Kemenkes RI. *Informasi Umum DBD 2013*. Subirektorat Pengendalian Arbovirus, Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan. Jakarta. 2015.

- Kemenkes RI. *Survei Entomologi DBD*. Ditjen P2PL Kemenkes RI. Jakarta. 2015.
- Koech Pieter Kiplang, *et al.* *Repellent Activities of Ocimum basilicum, Azadirachta indica and Eucalyptus citriodora Extracts on Rabbit Skin against Aedes aegypti*. *Journal of Entomology and Zoology Studies*. Vol. 1(5): 84-91. 2014.
- Lasmini Nangune, *et al.* *Pengaruh Filtrat Tanaman Daun Pagoda (Clerodendrum squamatum Vahl) terhadap Mortalitas Larva Nyamuk Aedes aegypti*. Universitas Negeri Gorontalo. 2015.
- Lumowa, Sonja. *Pengaruh Mat Sebuk Bunga Sukun (Artocarpus altilis L) sebagai Isi Ulang Nyamuk Aedes aegypti*. Universitas Mulawarman. Samarinda. 2015.
- Margo Utomo, Siti Amaliah, Febria Ari, *Daya Bunuh Bahan Nabati Biji Pepaya terhadap Kematian Larva Aedes aegypti*. Isolat Laboratorium B2P2VRP Salatiga. Prosiding Seminar Nasional Unimus 2010. ISBN: 978.979.704.883.9. 2015.
- Mutiara Widawati, Lurda Almierza. *Analisis Pengaruh Ekstraksi Non-Polar Batang Pohon Tanjung (Mimusops Elengi L) terhadap Larva Aedes aegypti*. Lokalitbang P2B2 Ciamis. ASPIRATOR Vol. 4(2); 59-63. 2012.
- Mushthafa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. CV. Toha Putra: Semarang. 2000.
- Nanang Hidayatulloh, Betta Kurniawan, Ari Wahyuni. *Efektivitas Pemberian Ekstrak Ethanol 70% Akar Kecombrang (Etlingera elatior) terhadap Larva Instar III Aedes aegypti sebagai Biolarvasida Potensial*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. ISSN: 2337-3776. 2015.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Pratiwi, Ameliana. *Penerimaan Masyarakat terhadap Larvasida Alami*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. KEMAS 8(1); 88-89. 2015.
- Profil Kesehatan Kota Makassar. Dinkes Kota Makassar. Makassar. 2015.
- Raden Adityo, Betta Kurniawan, Syazili Mustofa. *Uji Efek Fraksi Metanol Ekstrak Batang Kecombrang (Etlingera elatior) sebagai Larvasida terhadap Larva Instar III Aedes Aegypti*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. ISSN: 2337-3776. 2015.

- Remy E.P. Mangindaan, Remy Y. Taroreh. *Pengujian Aktivitas Larvasida dari Ekstrak Ascidian Lissoclinum patella terhadap Larva Nyamuk Aedes Aegypti*. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. Vol 3(1): 13. 2015.
- Rofirma Manurung, et al. 2013. *Pengaruh Daya Tolak Perasan Serai Wangi (Cymbopogon nardus) terhadap Gigitan Nyamuk Aedes aegypti*. Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Medan
- Roy Nusa Rahagus Edo Santya, et al. *Daya Proteksi Ekstrak Kulit Jeruk Purut (Citrus hystrix) terhadap Nyamuk Demam Berdarah*. Lokalitbang P2B2 Ciamis. ASPIRATOR Vol. 5(2); 61-66. 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*. Vol. 7. Cet: 1 ; Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Siti Aisah, et al. *Potensi Ekstrak Biji Bengkuang (Pachyrrhizus erosus urb.) sebagai Larvasida Aedes aegypti Instar III*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2015.
- Soegijanto, Soegeng. *Demam Berdarah Dengue Edisi Kedua*. Surabaya: Airlangga University Press. 2006.
- Tri Ramadhani, Bonda Fajar Wahyudi. *Pengaruh Penggunaan Lethal Ovitrap terhadap Populasi Nyamuk Aedes sp sebagai Vektor Demam Berdarah Dengue*. Balai Litbang P2B2. Banjarnegara. 2015.
- World Health Organization.. *Guidelines for Laboratory and Field Testing of Mosquito Larvasides*. Geneva. 2005
- World Health Organization. *Comperhensive Gideline for Prevention and Control of Dengue Haemorrhagiz Fever*. World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. Pp. 67. 2015.
- Yana S, Y. Priabudiman, *Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica L) terhadap Total Kolesterol Darah Broiler*. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 14 (3): 152-157. 2015.
- Yanuar, Firda. *Indeks Pertumbuhan Larva Aedes aegypti L yang Terdedah dalam Ekstrak Air Kulit Jengkol (Pithecellobium lobatum)*. 2013.

Lampiran 8 : Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Daun Beluntas



Daun Beluntas



Daun Beluntas setelah Pencucian



Persiapan Pengeringan Daun Beluntas




Daun Beluntas setelah dikeringkan



Melarutkan Daun Beluntas dengan Etanol




Mengekstraksikan Daun Beluntas



Ekstrak Daun Beluntas

Lampiran 9 : Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Daun Beluntas dengan berbagai Konsentrasi



Larva Aedes sp Instar III



Menimbang Ekstrak sesuai Konsentrasi



Melarutkan Ekstrak



Ekstrak Daun Beluntas

Lampiran 10 : Dokumentasi Uji Toksisitas



Ekstrak dan Wadah



Mengisi Wadah dengan Ekstrak



Pengukuran pH dan Suhu



Mengamati Kematian Larva *Aedes sp*

Lampiran 1 : Variabel View dan Data View

Variable View

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	KONSENTR...	Numeric	8	2	Konsentrasi	None	None	8	Right	Nominal	Input
2	LARVA	Numeric	8	0	Jumlah Larva M...	None	None	8	Right	Scale	Input
3	WAKTU	Numeric	8	0	Lama Pajanan ... {1, 5 menit}...	None	None	8	Right	Nominal	Input
4	LARVAMATI	Numeric	8	0	Larva yang Mati...	None	None	8	Right	Scale	Input
5	LARVAUJI	Numeric	8	0	Larva Uji	None	None	8	Right	Scale	Input

Data View

	KONSENTRA SI	LARVA	WAKTU	LARVAMATI	LARVAUJI	var
1	,00	0	60	1	25	
2	,25	6	120	4	25	
3	,50	9	240	10	25	
4	,75	10	480	15	25	
5	1,00	14	1440	19	25	
6	,00	0	60	1	25	
7	,25	7	120	5	25	
8	,50	9	240	10	25	
9	,75	10	480	15	25	
10	1,00	14	1440	20	25	
11	,00	0	60	1	25	
12	,25	7	120	5	25	
13	,50	9	240	10	25	
14	,75	10	480	16	25	
15	1,00	14	1440	20	25	
16	-	-	-	-	-	

Lampiran 2 : Uji Normalisasi Data

Case Processing Summary

	Konsentrasi	Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
	,00	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
Jumlah Larva	,25	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
Mati Berdasarkan	,50	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
Konsentrasi	,75	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
	1,00	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%

Descriptives^a

	Konsentrasi	Statistic	Std. Error
Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi	Mean	6,67	,333
	95% Confidence Interval for Lower Bound	5,23	
	Mean Upper Bound	8,10	
	5% Trimmed Mean	.	
	Median	7,00	
	Variance	,333	
	,25 Std. Deviation	,577	
	Minimum	6	
	Maximum	7	
	Range	1	
	Interquartile Range	.	
	Skewness	-1,732	1,225
	Kurtosis	.	.
	Mean	8,80	,115
95% Confidence Interval for Lower Bound	8,30		
Mean Upper Bound	9,30		
5% Trimmed Mean	.		
Median	8,80		
Variance	,040		
,50 Std. Deviation	,200		
Minimum	9		
Maximum	9		
Range	0		
Interquartile Range	.		

	Skewness		,000	1,225
	Kurtosis		.	.
	Mean		10,00	,115
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	9,50	
		Upper Bound	10,50	
	5% Trimmed Mean		.	
	Median		10,00	
	Variance		,040	
,75	Std. Deviation		,200	
	Minimum		10	
	Maximum		10	
	Range		0	
	Interquartile Range		.	
	Skewness		,000	1,225
	Kurtosis		.	.
	Mean		13,80	,115
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	13,30	
		Upper Bound	14,30	
	5% Trimmed Mean		.	
	Median		13,80	
	Variance		,040	
1,00	Std. Deviation		,200	
	Minimum		14	
	Maximum		14	
	Range		0	
	Interquartile Range		.	
	Skewness		,000	1,225
	Kurtosis		.	.

a. Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi is constant when Konsentrasi = ,00. It has been omitted.

Tests of Normality^a

	Konsentrasi	Kolmogorov-Smirnov ^b			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi	,25	,385	3	.	,750	3	,000
	,50	,175	3	.	1,000	3	1,000
	,75	,175	3	.	1,000	3	1,000
	1,00	,175	3	.	1,000	3	1,000

a. Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi is constant when Konsentrasi = ,00. It has been omitted.

b. Lilliefors Significance Correction

Case Processing Summary

	Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji	Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
	60	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
	120	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
Larva yang Mati Berdasarkan Lama Pajanan	240	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
	480	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
	1440	3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%

Descriptives

	Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji	Statistic	Std. Error
	Mean	,58	,083
	95% Confidence Interval for Lower Bound	,22	
	Mean Upper Bound	,94	
	5% Trimmed Mean	.	
	Median	,50	
	Variance	,021	
	60 Std. Deviation	,144	
	Minimum	1	
	Maximum	1	
	Range	0	
	Interquartile Range	.	
Larva yang Mati Berdasarkan Lama Pajanan	Skewness	1,732	1,225
	Kurtosis	.	.
	Mean	4,58	,167
	95% Confidence Interval for Lower Bound	3,87	
	Mean Upper Bound	5,30	
	5% Trimmed Mean	.	
	Median	4,75	
	120 Variance	,083	
	Std. Deviation	,289	
		4	
	Minimum		

		Maximum		5	
		Range		1	
		Interquartile Range		.	
		Skewness		-1,732	1,225
		Kurtosis		.	.
		Mean		9,92	,083
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	9,56	
		Mean	Upper Bound	10,28	
		5% Trimmed Mean		.	
		Median		10,00	
		Variance		,021	
	240	Std. Deviation		,144	
		Minimum		10	
		Maximum		10	
		Range		0	
		Interquartile Range		.	
		Skewness		-1,732	1,225
		Kurtosis		.	.
		Mean		15,08	,220
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	14,13	
		Mean	Upper Bound	16,03	
		5% Trimmed Mean		.	
		Median		15,00	
		Variance		,146	
	480	Std. Deviation		,382	
		Minimum		15	
		Maximum		16	
		Range		1	
		Interquartile Range		.	
		Skewness		,935	1,225
		Kurtosis		.	.
		Mean		19,25	,250
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	18,17	
		Mean	Upper Bound	20,33	
	1440	5% Trimmed Mean		.	
		Median		19,50	
		Variance		,188	
		Std. Deviation		,433	

Lampiran 3 : Uji Korelasi Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas

		Correlations	
		Konsentrasi	Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi
Konsentrasi	Pearson Correlation	1	,958**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	15	15
Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi	Pearson Correlation	,958**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 : Uji Korelasi Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas

		Correlations	
		Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji	Larva yang Mati Berdasarkan Lama Pajanan
Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji	Pearson Correlation	1	,862**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	15	15
Larva yang Mati Berdasarkan Lama Pajanan	Pearson Correlation	,862**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 : Uji Regresi Linier Sederhana Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,958 ^a	,918	,912	,10886

a. Predictors: (Constant), Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,721	1	1,721	145,229	,000 ^b
	Residual	,154	13	,012		
	Total	1,875	14			

a. Dependent Variable: Konsentrasi

b. Predictors: (Constant), Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,083	,056		-1,476	,164
	Jumlah Larva Mati Berdasarkan Konsentrasi	,074	,006	,958	12,051	,000

a. Dependent Variable: Konsentrasi

Lampiran 6 : Uji Regresi Linier Sederhana Lama Pajanan Ekstrak Daun Beluntas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,862 ^a	,742	,722	3,695

a. Predictors: (Constant), Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	511,446	1	511,446	37,450	,000 ^b
	Residual	177,537	13	13,657		
	Total	688,983	14			

a. Dependent Variable: Larva yang Mati Berdasarkan Lama Pajanan

b. Predictors: (Constant), Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,492	1,299		3,459	,004
	Lama Pajanan Ekstrak terhadap Larva Uji	,012	,002	,862	6,120	,000

a. Dependent Variable: Larva yang Mati Berdasarkan Lama Pajanan

Lampiran 7 : Analisis Probit

Parameter Estimates

	Parameter	Estimate	Std. Error	Z	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
PROBIT ^a	Konsentrasi	1,147	,336	3,418	,001	,489	1,805
	Intercept	,012	,110	,113	,910	-,098	,123

a. PROBIT model: $PROBIT(p) = \text{Intercept} + BX$ (Covariates X are transformed using the base 10,000 logarithm.)

Chi-Square Tests

		Chi-Square	df ^b	Sig.
PROBIT	Pearson Goodness-of-Fit Test	1,770	10	,998 ^a

a. Since the significance level is greater than ,150, no heterogeneity factor is used in the calculation of confidence limits.

b. Statistics based on individual cases differ from statistics based on aggregated cases.

Cell Counts and Residuals

	Number	Konsentrasi	Number of Subjects	Observed Responses	Expected Responses	Residual	Probability
PROBIT	1	-,602	25	6	6,221	-,221	,249
	2	-,301	25	9	9,241	-,241	,370
	3	-,125	25	10	11,199	-1,399	,448
	4	,000	25	14	12,624	1,176	,505
	5	-,602	25	7	6,221	,779	,249
	6	-,301	25	9	9,241	-,441	,370
	7	-,125	25	10	11,199	-,999	,448
	8	,000	25	14	12,624	,976	,505
	9	-,602	25	7	6,221	,779	,249
	10	-,301	25	9	9,241	-,641	,370
	11	-,125	25	10	11,199	-1,199	,448
	12	,000	25	14	12,624	1,376	,505

Confidence Limits

	Probability	95% Confidence Limits for Konsentrasi			95% Confidence Limits for log(Konsentrasi) ^a		
		Estimate	Lower Bound	Upper Bound	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
PROBIT	,010	,009	,000	,042	-2,039	-4,461	-1,377
	,020	,016	,000	,060	-1,801	-3,905	-1,225

,030	,022	,000	,074	-1,651	-3,553	-1,128
,040	,029	,001	,088	-1,537	-3,288	-1,055
,050	,036	,001	,101	-1,445	-3,072	-,995
,060	,043	,001	,114	-1,366	-2,889	-,945
,070	,050	,002	,126	-1,298	-2,728	-,900
,080	,058	,003	,138	-1,236	-2,584	-,860
,090	,066	,004	,150	-1,180	-2,454	-,824
,100	,074	,005	,162	-1,128	-2,333	-,790
,150	,122	,015	,224	-,914	-1,837	-,649
,200	,180	,036	,292	-,745	-1,446	-,535
,250	,252	,077	,370	-,599	-1,114	-,432
,300	,340	,150	,466	-,468	-,825	-,332
,350	,450	,266	,604	-,347	-,576	-,219
,400	,586	,416	,850	-,232	-,381	-,071
,450	,758	,566	1,340	-,120	-,247	,127
,500	,975	,710	2,266	-,011	-,149	,355
,550	1,255	,862	3,957	,099	-,065	,597
,600	1,622	1,035	7,075	,210	,015	,850
,650	2,114	1,241	12,995	,325	,094	1,114
,700	2,795	1,496	24,774	,446	,175	1,394
,750	3,778	1,825	49,855	,577	,261	1,698
,800	5,284	2,271	108,858	,723	,356	2,037
,850	7,813	2,927	271,006	,893	,466	2,433
,900	12,779	4,019	855,326	1,107	,604	2,932
,910	14,392	4,338	1129,221	1,158	,637	3,053
,920	16,376	4,713	1527,130	1,214	,673	3,184
,930	18,874	5,163	2128,414	1,276	,713	3,328
,940	22,117	5,715	3084,025	1,345	,757	3,489
,950	26,501	6,418	4708,140	1,423	,807	3,673
,960	32,775	7,353	7740,284	1,516	,866	3,889
,970	42,558	8,690	14264,170	1,629	,939	4,154
,980	60,225	10,850	32155,218	1,780	1,035	4,507
,990	104,101	15,389	115819,186	2,017	1,187	5,064

a. Logarithm base = 10.