


**HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP
KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA USIA SUBUR (WUS)
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2016**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Epidemiologi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURMAGHFIRAWATI AS

70200112025

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmaghfirawati As
NIM : 70200112025
Tempat/Tgl. Lahir : Mamuju/ 20 Mei 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/S1 Reguler
Judul : Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Terhadap
Kejadian Hipertensi Pada Wanita Usia Subur (WUS) di
Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2016.

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Gowa, Maret 2017

Penyusun,

Nurmaghfirawati As
NIM: 70200112025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi yang disusun oleh **Nurmaghfirawati AS NIM 70200112025** ini telah kami setujui untuk diajukan pada **Ujian Skripsi** Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Samata-Gowa, Maret 2017


Tim Pembimbing

Pembimbing I



Emmi Bujawati, SKM., M.Kes

Pembimbing II



Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes

Mengetahui:
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat



Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes
NIP. 19790525 200901 1 019

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia dan kekuatan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Terhadap Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2016”, sebagai syarat dalam penyelesaian pendidikan di Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Asyidrat dan Ibunda Asriani untuk cintanya, dukungan, kesabaran, perhatian, bimbingan dan doanya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk saudara-saudara yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Terselesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku wakil rektor bidang akademik pengembangan lembaga.
3. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., selaku wakil rektor bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan.
4. Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D., selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
5. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

6. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes. Sebagai ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Azriful SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes. selaku pembimbing I dan Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes. selaku pembimbing II yang telah begitu tulus meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
8. Habibi, SKM., M.Kes, dan Dr. H. A Darussalam, M.Ag. selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak memberi tuntunan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Para Dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Dr. H. Mariathy Jassin selaku Kepala puskesmas Kassi-Kassi dan seluruh staf Puskesmas Kassi-Kassi yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian di Puskesmas Kassi-Kassi utamanya Bidan Marniati, Bidan Uni, Bidan Misna, Bidan Fita, Pak Haji Dedi dan Kak yaya. Terima Kasih sebesar-besarnya.
12. Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk para Kepala dan staf BTKL-PP Kelas I Makassar utamanya Dr. Irawati Kesumaningsih, Pak Mustaman dan Ibu Muhasirah yang telah memudahkan peneliti meminjam Alat Tensimeter dari balai dan juga terima kasih doa dan dukungannya.

13. Teman-teman dari Akbid Yapma, Poltekkes Kemenkes Makassar, dan Stikes Mega Rezky utamanya Eno', Sari, Santi, Irma, Ima', Ilma, Reski, Jannah, Christie, Yuli dan semuanya yang magang praktek di bagian KB, Imunisasi dan Pemeriksaan ibu hamil. Syukron Atas bantuan dan semangat yang diberikan selama peneliti meneliti di puskesmas Kassi-Kassi.
14. Teman-Teman Seperjuangan dan sahabatku, Eka Wisudawati, Hardianti Tabah, Mardia, Siti Khodidah dan Hapsah. Syukron doa dan *support* kalian. Kalian yang terbaik. Terima Kasih sudah mau mendengarkan ocehan, keluhan dan curhatan sahabatmu ini. Uhibbukifillah.
15. Kakak, Adek dan Ukhtifillah ku semuanya dari SC Al-'Aafiyah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, MPM UIN Alauddin Makassar dan FSRN Raudhatunnisa. Uhibbukifillah wa Syukron Jazakunallah Khairan Katsiran atas ilmu, motivasi, ukhuwah, kebersamaan dan do'a-do'a di setiap sujud Kalian.
16. Teman-teman peminatan Epidemiologi 2012 yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Teman angkatan 2012 atas Kebersamaan, Ilmu dan motivasinya selama berada di Jurusan Kesehatan Masyarakat.
18. Kepada guru-guru dan kawan-kawan seperjuangan di SMA Negeri 1 Mamuju utamanya Exacta4 yang tidak henti hentinya memberi semangat kepada penulis.
19. Serta semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih telah banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun.

Semoga skripsi ini dapat memberi suatu manfaat kepada semua pihak yang sempat membaca serta membutuhkannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Maret 2017

Penyusun

Nurmaghfirawati As

NIM: 70200112025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-15
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Definisi Operasional	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian	14
1. Tujuan Umum	14
2. Tujuan Khusus	14
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	16-65
A. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Oral	16
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntik	24

D. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Implan	35
E. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi.....	39
F. Keterkaitan Kontrasepsi Hormonal dan Hipertensi	51
G. Integrasi Keislaman Tentang Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi dan Hipertensi	52
H. Kerangka Teori	63
I. Kerangka Konsep	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66-83
A. Jenis Penelitian	66
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	66
C. Pendekatan Penelitian	66
D. Populasi dan Sampel	67
E. Bagan Alur Penelitian	71
F. Prosedur Penelitian.....	72
G. Uji Validitas dan Uji Realibilitas	75
1. Uji Validitas	75
2. Uji Reliabilitas	76
H. Metode Pengumpulan data.....	77
I. Instrumen Penelitian.....	78
J. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	79
K. Penyajian Data	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84-113
A. Gambaran Lokasi Penelitian	84
B. Hasil Penelitian	86
1. Hasil Univariat	86
2. Hasil Bivariat	93

C. Pembahasan.....	100
D. Keterbatasan Penelitian	112
BAB V PENUTUP.....	114-116
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pencapaian Tertinggi Peserta KB Aktif Permix Kontrasepsi Hormonal Provinsi Sulawesi Selatan	3
Tabel 2.1	Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC (<i>Joint National Comitte on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Of Blood Preassure</i>)	41
Tabel 2.2	Klasifikasi Hipertensi Menurut Perhimpunan Hipertensi Indonesia	42
Tabel 3.1	Jumlah Sampel Pengguna Kontrasepsi Hormonal Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Hormonal	71
Tabel 3.2	Formula Perhitungan Ratio Prevalens (RP)	82
Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah RW/RT Menurut Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2015	85
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2015	86
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	87
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	88
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	89
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Anak yang dimiliki Responden Pengguna Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	89

Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Hormonal yang digunakan Responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	90
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	91
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal yang digunakan Responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	91
Tabel 4.10	Gambaran Keluhan Selama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	92
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kejadian Hipertensi pada Responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	93
Tabel 4.12	Hubungan Kelompok Umur dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	93
Tabel 4.13	Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	94
Tabel 4.14	Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	95
Tabel 4.15	Hubungan Jenis Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	96

Tabel 4.16	Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	97
Tabel 4.17	Hubungan Keteraturan Penggunaan dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	98

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Teori
Gambar 2.2 Kerangka Konsep
Gambar 3.1 Alur Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Master Tabel
- Lampiran 4 Penilaian Skoring dan Penentuan Kriteria Objektif Variabel
Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal
- Lampiran 5 Output SPSS
- Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 7 Surat Pengantar Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 8 Surat Pengantar Izin Penelitian dari BKPM
- Lampiran 9 Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 10 Surat Pengantar Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota
Makassar
- Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari
Puskesmas Kassi-Kassi
- Lampiran 12 Sertifikat Uji Kalibrasi Tensimeter Raksa dari Kemenkes RI
- Lampiran 13 Biografi Peneliti

ABSTRAK

Nama : Nurmaghfirawati As

NIM : 70200112025

Judul : Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Terhadap Kejadian Hipertensi Pada wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2016

Kontrasepsi Hormonal merupakan kontrasepsi yang paling banyak diminati di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengguna kontrasepsi hormonal Kota Makassar mencapai 101.243 pengguna. Hal ini juga berbanding lurus dengan kejadian hipertensi yang semakin meningkat yang dimana penggunaan kontrasepsi hormonal akan mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi pada wanita usia subur (WUS) di puskesmas Kassi-Kassi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi dalam penelitian ini wanita usia subur yang berusia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi hormonal secara aktif di Puskesmas Kassi-Kassi. Teknik sampling yang digunakan adalah *Proportional Random Sampling* dengan total sampel sebanyak 386. Pengambilan data dilakukan secara langsung dan dilakukan pengukuran tekanan darah sesuai dengan prosedur penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi ($p=0,000$) dan wanita usia subur yang lama menggunakan kontrasepsi hormonal 2,759 Kali berisiko terkena hipertensi, terdapat hubungan antara keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi ($p=0,015$) dan wanita yang menggunakan secara teratur menggunakan kontrasepsi hormonal 1,392 kali berisiko terkena hipertensi, terdapat hubungan antara umur pengguna kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi ($p=0,014$) dan wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal diatas umur 35 tahun 1,403 kali berisiko terkena hipertensi dan tidak ada hubungan antara pendidikan akseptor, pekerjaan akseptor serta jenis kontrasepsi hormonal akseptor terhadap kejadian hipertensi. Saran penelitian agar melakukan pemeriksaan awal sebelum memilih alat kontrasepsi.

Kata kunci: *Kontrasepsi Hormonal, Hipertensi, Wanita Usia Subur.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang banyak diderita di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hipertensi adalah penyakit yang terjadi karena peningkatan tekanan darah dalam tubuh yang melewati batas normal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu (Pangaribuan, 2015).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) dilaporkan bahwa di beberapa negara termasuk Indonesia, Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan 52% penyebab kematian di dunia dan salah satunya adalah Hipertensi. Menurut *World Health Organization* (WHO), bahwa pada tahun 2012 sedikitnya 839 juta kasus hipertensi dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 1,15 Milyar atau sekitar 29% dari total penduduk dunia dan penderita wanita lebih banyak (30%) dibandingkan laki-laki (29%).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, menunjukkan adanya penurunan prevalensi hipertensi menjadi 25,8%. Pada perempuan 28,8% dan laki-laki 22,8%. Hipertensi pada perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki.

Berdasarkan data Penyakit Tidak Menular (PTM) yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2015 diperoleh bahwa penyakit hipertensi merupakan penyakit yang memiliki angka kejadian tertinggi pertama di kota Makassar yakni prevalensi kejadian Hipertensi pada laki-laki berjumlah 14.048 orang sedangkan perempuan yang menderita hipertensi berjumlah 21.271 orang dan berdasarkan data jumlah kasus baru hipertensi pada tahun 2015 diperoleh

Hipertensi pada laki-laki berjumlah 4326 orang, sedangkan pada perempuan sebanyak 7332 orang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Kassi-Kassi 3 bulan terakhir pada tahun 2016 diperoleh data bahwa angka insidensi penyakit hipertensi di puskesmas ini meningkat dari 123 kasus menjadi 507 kasus.

Faktor risiko Hipertensi yang tidak dapat diubah adalah umur, jenis kelamin dan genetik. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi obesitas/kegemukan, psikososial dan stress, merokok, olahraga yang kurang, konsumsi alkohol yang berlebihan, hiperlipidemia/hiperkolesterolemia, sedangkan penyebab sekunder hipertensi antara lain penyakit ginjal, gangguan endokrin dan penggunaan obat-obatan seperti kontrasepsi Oral dan alat kontrasepsi lainnya yang dapat memicu peningkatan tekanan darah (Martuti,2009).

Pada kontrasepsi hormonal seperti Oral, suntik dan implan mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena terjadi hipertropi jantung dan peningkatan respon presor angiotensi II dengan melibatkan jalur *Renin Angiotensin System*. Selain itu, Pada kontrasepsi hormonal juga terdapat kandungan etinilestradiol yang merupakan penyebab hipertensi, sedangkan Gestagen memiliki pengaruh minimal terhadap tekanan darah. Etinilestradiol dapat meningkatkan angiotensinogen 3-5 kali kadar normal (Baziad, 2008).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Septya S. Kaunang di kota Manado tahun 2014 bahwa pengguna kontrasepsi Oral berisiko 3,458 kali mengalami kejadian hipertensi pada wanita usia subur dibandingkan dengan Wanita Usia Subur (WUS) yang tidak menggunakan kontrasepsi Oral.

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Edi Cahyono (2013) di Desa Betek Kabupaten Blora untuk membuktikan pengaruh kontrasepsi suntik dan

kejadian hipertensi dimana diperoleh bahwa adanya hubungan antara kejadian hipertensi dengan lama penggunaan kontrasepsi suntik *Depo Medroxi Progesterone Asetat* (DMPA) pada wanita usia subur.

Menurut data *World Health Organization* (WHO) di tahun 2013, penggunaan kontrasepsi di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya Indonesia memang berada di atas rata-rata jumlah pengguna kontrasepsi lainnya yakni 61% dan yang tertinggi adalah Thailand dengan persentase sebesar 80%. Dan penggunaan terbanyak alat kontrasepsi sekaligus yang banyak diminati pada wanita usia subur adalah kontrasepsi pil atau Oral dan kontrasepsi suntik.

Tabel 1.1
Pencapaian Tertinggi Peserta KB Aktif Permix Kontrasepsi Hormonal
provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2014

No	Kab/kota	2013			Total	2014			Total
		Pil	Suntik	Implan		Pil	Suntik	Implan	
1	Makassar	32.822	48.635	11.682	93.139	34.133	53.684	13.426	101.243
2	Gowa	30.892	44.233	8.262	83.387	28.540	45.300	9.605	83.445
3	Bone	31.014	35.413	8.466	74.893	25.057	29.128	22.335	76.520
4	Wajo	19.830	16.210	6.442	42.482	19.067	16.646	5.990	41.703
5	Pinrang	14.848	14.598	7.862	37.308	16.571	14.599	3.799	34.969

Sumber: BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, 2014

Berdasarkan data Profil Kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 diperoleh data bahwa pada provinsi Sulawesi Selatan jumlah peserta KB aktif pada pengguna alat kontrasepsi suntik mengalami peningkatan terbukti dengan jumlah peserta aktif sebanyak 439.462 peserta di tahun 2013 dan 461.639 peserta pada tahun 2014, sedangkan jumlah peserta KB aktif pada pengguna alat kontrasepsi pil mengalami penurunan, yakni jumlah peserta aktif sebanyak 313.811 pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menurun menjadi 301.998 peserta.

Berdasarkan Data pengguna Alat Kontrasepsi Kota Makassar Tahun 2015 diperoleh bahwa dari 46 puskesmas yang terdapat di Kota Makassar, Puskesmas Kassi-Kassi merupakan Puskesmas dengan pengguna KB terbanyak yakni 11.525 pengguna, kemudian Tertinggi kedua adalah Sudiang Raya sebanyak 8056 pengguna dan yang terendah adalah Puskesmas Kodingareng sebanyak 642 pengguna. Puskesmas Kassi-Kassi memiliki pengguna kontrasepsi Hormonal tertinggi dan Alat Kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah kontrasepsi Suntik sebanyak 10.150 pengguna, Pil sebanyak 1041 pengguna dan implan sebanyak 195 pengguna (DINKES Kota Makassar, 2015).

Uraian diatas menjelaskan bahwa prevalensi dan insidensi hipertensi pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki dan jumlah pengguna kontrasepsi hormonal di kota Makassar juga terus meningkat khususnya pada Puskesmas Kassi-Kassi. Adapun alasan penelitian ini dilakukan di Kassi-Kassi karena angka kejadian Hipertensi yang cukup tinggi dan hal ini berbanding lurus dengan pengguna peserta alat kontrasepsi hormonal yang cenderung meningkat. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian ini untuk menganalisis hubungan penggunaan alat kontrasepsi hormonal tersebut terhadap kejadian Hipertensi.

B. Rumusan Masalah

Angka kejadian hipertensi pada wanita yang terus meningkat dan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penggunaan alat kontrasepsi Hormonal. Dengan demikian, yang telah dikemukakan di atas sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2016?

C. Hipotesis Penelitian

1. Ha : Ada Hubungan antara Umur Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
2. Ha : Ada hubungan antara Pendidikan Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
3. Ha : Ada Hubungan antara Pekerjaan Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
4. Ha : Ada Hubungan antara Jenis Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
5. Ha : Ada Hubungan antara Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
6. Ha : Ada Hubungan antara Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kesamaan dan menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian ini maka dibuat definisi operasional dari variabel-variabel sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

1) Hipertensi

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. (Kemenkes RI, 2014).

Kriteria Objektif:

- a) Hipertensi : Tekanan darah sistol ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastol ≥ 90 mmHg.
- b) Tidak hipertensi : Tekanan darah sistol < 140 mmHg dan tekanan darah diastol < 90 mmHg (Kemenkes RI, 2014).

b. Variabel Independen

1) Umur

Lamanya seseorang hidup sejak dilahirkan sampai pada saat sekarang dihitung dalam tahun (DEPKES RI, 1998). Umur responden dihitung dalam tahun.

Kriteria Objektif:

- a) Risiko Tinggi : Umur Responden > 35 tahun
- b) Risiko Rendah : Umur responden ≤ 35 tahun

2) Pendidikan

Jenjang sekolah yang formal tertinggi yang dicapai oleh seseorang (DIKNAS, 2003). Pendidikan responden dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir responden, yakni meliputi tidak sekolah/ tidak tamat SD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, Akademi/Diploma, dan Sarjana.

Kriteria Objektif:

- a) Pendidikan Tinggi : Pendidikan terakhir responden \geq SMA/ sederajat.
- b) Pendidikan Rendah : Pendidikan terakhir responden $<$ SMA/ sederajat
(Park Hyejin, 2013)

3) Pekerjaan

Bekerja adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam yang secara kontinu dalam seminggu yang lalu (seminggu sebelum pencacahan). Dengan demikian, pekerjaan keluarga yang tanpa upah yang membantu dalam satu usaha/kegiatan ekonomi, dimaksudkan sebagai pekerja (BPS.1976). Kategori pekerjaan pada penelitian ini meliputi PNS, IRT, wiraswasta, pegawai swasta, petani, nelayan, dan lain-lain

Kriteria Objektif:

- a) Tidak Bekerja : Responden seorang Ibu Rumah Tangga, Pensiunan, tidak Bekerja.
- b) Bekerja : Responden seorang PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta, petani dan nelayan (Pangaribuan, 2015)

4) Jenis kontrasepsi Hormonal

Jenis kontrasepsi Hormonal adalah jenis kontrasepsi yang digunakan responden.

Kriteria Objektif:

- a) Kontrasepsi Hanya-progestin : Jenis kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung progestin.
- b) Kontrasepsi Kombinasi : Jenis kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen dan progestin (kombinasi).

5) Lama penggunaan alat kontrasepsi

Lama penggunaan alat kontrasepsi adalah waktu penggunaan atau lama penggunaan alat kontrasepsi Hormonal yang dipakai oleh responden.

Kriteria Objektif:

- a) Lama : Lama penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang digunakan responden >3 tahun
- b) Baru : Lama penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang digunakan responden ≤ 3 tahun (Harini, 2010).

6) Keteraturan penggunaan Alat kontrasepsi

Keteraturan penggunaan Alat kontrasepsi adalah kegiatan yang dimana responden memiliki keteraturan dalam penggunaan alat kontrasepsi hormonal untuk memperoleh pil kontrasepsi, melakukan suntikan dan pemasangan susuk. Keteraturan penggunaan alat kontrasepsi dihitung berdasarkan perhitungan interval, untuk pertanyaan yang bersifat *favorable* jawaban Ya diberi skor 1, dan jawaban tidak diberi skor 0. Begitupun sebaliknya untuk pertanyaan yang bersifat *unfavorable*. Cara

penilaian dengan menjumlahkan keseluruhan nilai menjadi total skor dan diinterpretasikan dalam persen (Mardapi, 2008).

Kriteria Objektif:

- a) Teratur : Jika persentasi skor jawaban responden $> 55\%$
- b) Tidak Teratur : Jika persentasi skor jawaban responden $\leq 55\%$

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Kesehatan Masyarakat
- b. Masalah penelitian ini dibatasi pada Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal terhadap kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
- c. Jenis penelitian ini adalah Studi Analitik dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
- d. Lokasi penelitian di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Judul	Tahun	Jenis Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Edy cahyono, Machmudah, dan Sufiati Bintaha.	Hubungan Kejadian hipertensi, kenaikan berat badan, dan perubahan pola menstruasi dengan lama penggunaan kontrasepsi suntik Depo Medroksi Progesteron (DMPA) pada perempuan usia subur Desa Betek Kecamatan Jati Kabupaten Blora.	2011	<i>Cross sectional</i>	Variabel Terikat: - Kenaikan Berat badan - Perubahan Pola menstruasi - Kejadian Hipertensi Variabel Bebas: - Kontrasepsi suntik - Umur - Pekerjaan - Pendidikan - Lama penggunaan suntik	Ada hubungan yang signifikan antara peningkatan berat badan, pola menstruasi dan kejadian hipertensi terhadap penggunaan kontrasepsi suntik Depo Medroksi Progesteron (DMPA) dengan masing-masing <i>p-value</i> secara berurutan $p=0,013$, $p=0,002$ dan $p=0,000$
2.	Nengah Runiari, dan Ni ketut Kusmarjathi .	Hubungan antara lama pemakaian kontrasepsi suntikan progestin (depoprovera) dengan tekanan darah pada akseptor KB di Puskesmas II Denpasar Selatan.	2012	<i>Cross sectional</i>	Variabel terikat: - Peningkatan tekanan darah Variabel Bebas: - Kontrasepsi suntik - Lama pemakaian	Ada hubungan yang signifikan antara lama pemakaian kontrasepsi suntikan progestin (depoprovera) dengan tekanan darah dengan <i>p-value</i> = 0,018
3.	Hyejin Park dan Kisok Kim	<i>Association between oral contraceptive use and risks of hypertension and</i>	2013	<i>Cross sectional</i>	Variabel Terikat: - Kejadian hipertensi dan prehipertensi	Terdapat hubungan antara tekanan darah sistolik dan diastol terhadap penggunaan kontrasepsi oral dimana

		<i>prehypertension in a cross sectional study of Korean woman</i>			Variabel Bebas: - Kontrasepsi pil - Umur - IMT - Pendidikan - Pendapatan perbulan - Pekerjaan - Perilaku merokok - Konsumsi alkohol	nilai $p < 0,000$ dan kejadian hipertensi dengan lama penggunaan kontrasepsi oral memiliki OR sebesar 1,96 dengan Interval Kepercayaan 95%. Sedangkan pada prehipertensi memiliki OR sebesar 2,23.
4.	Septya S. Kaunang, Billy J. Kepel dan Nancy S.H. Malonda	Hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hipertensi pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Bahu, Kota Manado	2014	<i>Case control</i>	Variabel Terikat: - Kejadian Hipertensi Variabel Bebas: - Kontrasepsi pil - Umur - Status gizi - Tempat tinggal - Pekerjaan - Penghasilan rata-rata keluarga perbulan - Lama penggunaan pil	Diperoleh hasil bahwa penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hipertensi dengan nilai $P=0,001$; $OR=3,458$; $(CI (95\%)=1,613-7,413)$. Terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hipertensi wanita usia subur di wilayah kerja puskesmas Bahu dan penggunaan pil 3,458 kali lebih berisiko menderita hipertensi
5.	Ni Luh Ade Apriani, Agus Nurcholis, dan Sang Ayu Ketut	Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal pil dengan kejadian Hipertensi pada wanita usia subur di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I Kabupaten	2014	Studi deskriptif korelasional	Variabel Terikat: - Kejadian hipertensi Variabel Bebas: - Penggunaan Kontrasepsi pil - Umur	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara penggunaan Kontrasepsi Hormonal pil dengan kejadian Hipertensi pada wanita usia subur di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar dengan p-

	Candrawati	Gianyar Tahun 2014				value=0,000
6.	Keki Debby Kufitasari	Keteraturan penggunaan Kontrasepsi oral dengan perubahan siklus menstruasi di Polindes Tampung Rejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto	2014	<i>Cross sectional</i>	Variabel Terikat: - Perubahan siklus menstruasi Variabel Bebas: - Kontrasepsi pil - Keteraturan penggunaan - Pendidikan - Umur	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara keteraturan penggunaan kontrasepsi Oral dengan perubahan siklus menstruasi dengan $p=0,001$
7.	Lamria Pangaribuan dan Dina Bisara Lolong	Hubungan penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hipertensi pada wanita usia 15-49 tahun di Indonesia (analisis data Riskesdas 2013)	2015	<i>Cross sectional</i>	Variabel Terikat: - Kejadian hipertensi Variabel bebas: - Kontrasepsi pil - Umur - Pendidikan - Status pekerjaan - Konsumsi serat - Konsumsi makanan asin - Aktivitas fisik - IMT - Tempat tinggal - Lama penggunaan pil	Ada hubungan yang bermakna antara penggunaan kontrasepsi pil dan dengan kejadian hipertensi pada wanita 15-49 tahun dengan nilai PR 1,45 setelah di kontrol umur dan IMT.

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, yakni:

1. Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan 3 jenis variabel baru yakni jenis kontrasepsi hormonal, lama penggunaan kontrasepsi hormonal dan keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal.
2. Salah satu variabel penelitian ini yakni jenis kontrasepsi hormonal dan keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal adalah variabel baru yang ditambahkan oleh peneliti yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk melihat hubungan antara kejadian hipertensi dan keteraturan penggunaan dan jenis kontrasepsi hormonal yang digunakan oleh pengguna KB.
3. Pada penelitian ini mengkaji hubungan antara ketiga jenis alat kontrasepsi hormonal yakni suntik, pil, dan implan yang dikaitkan dengan kejadian hipertensi pada wanita usia subur di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
4. Penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda untuk melihat konsistensi dari penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2016.

b. Tujuan khusus

- 1) Mengetahui Hubungan antara Umur Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
- 2) Mengetahui Hubungan antara Pendidikan Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
- 3) Mengetahui Hubungan antara Pekerjaan Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
- 4) Mengetahui Hubungan Jenis Kontrasepsi Hormonal terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
- 5) Mengetahui Hubungan Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
- 6) Mengetahui Hubungan Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu kesehatan masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan diri dalam bidang penelitian khususnya tentang Penggunaan Kontrasepsi Hormonal, Hipertensi dan Hubungan kedua subjek penelitian tersebut.

b. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pemerintah setempat dalam rangka penentuan arah kebijakan terhadap kejadian hipertensi yang dipengaruhi oleh penggunaan alat kontrasepsi KB (Keluarga Berencana) khususnya pada alat kontrasepsi hormonal yang banyak diminati masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Kontrasepsi

Kontrasepsi berawal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dan sel sperma tersebut (BKKBN, 2011).

Menurut Siti Setiati dan Purwita W Laksmi yang ditulis dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam (2007). Kontrasepsi adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi adalah cara mencegah terjadinya konsepsi dengan alat atau obat-obatan. Tak ada satupun metode kontrasepsi yang ideal, meskipun semuanya lebih aman dibandingkan menjalani kehamilan itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Oral atau Pil

Pil kontrasepsi mencakup pil kombinasi yang berisi hormon estrogen dan progesteron, dan pil hanya progesteron. Semua pil kontrasepsi ini disingkat COC dan POP oleh tenaga kesehatan., dan pil kombinasi oleh wanita disebut “pil” sedangkan pil progesteron disebut “pil mini” (Everett, 2007).

Banyak wanita memilih alat kontrasepsi hormonal sebagai kontrasepsi mereka karena metode tersebut dapat diandalkan dan dengan mudah mereka dapat kembali subur. Di Inggris layanan kontrasepsi ini mencakup pil bebas biaya peresepan, yang memungkinkan metode ini mudah diakses oleh semua wanita (Sulityawati, 2012).

Adapun Pembagian Pil kontrasepsi menurut Sri Handayani (2010) dibagi menjadi 2 yakni:

1. Pil Oral Kombinasi

a. Pengertian

Pil kombinasi merupakan pil kontrasepsi yang berisi hormon sintesis estrogen dan progesteron (Handayani, 2010).

b. Jenis

- 1) Monofasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progestin, dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, jumlah dan porsi hormonnya konstan setiap hari.
- 2) Bifasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progestin dengan dua dosis berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi setiap hari.
- 3) Trifasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progestin dengan tiga dosis berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi setiap hari (Sulistiyawati, 2012).

c. Cara kerja

- 1) Menekan ovulasi.
- 2) Mencegah implantasi.
- 3) Mengentalkan lendir serviks.
- 4) Pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu (Handayani, 2010).

d. Efektivitas

Efektivitas tinggi, 1 kehamilan/1000 perempuan dalam tahun pertama penggunaan (Departemen Penyakit Dalam FKUI, 2007).

e. Keuntungan

- 1) Tidak mengganggu hubungan seksual
- 2) Siklus haid menjadi teratur (mencegah anemia)
- 3) Dapat digunakan sebagai metode jangka panjang
- 4) Dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause
- 5) Mudah dihentikan setiap saat
- 6) Kesuburan cepat kembali setelah penggunaan pil dihentikan
- 7) Membantu mencegah: kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, *acne* dan *dismenorrhoe* (Sulistyawati, 2012).

f. Kekurangan

- 1) Mahal dan membosankan karena digunakan setiap hari
- 2) Mual pada 3 bulan pertama
- 3) Pendarahan bercak atau pendarahan pada 3 bulan pertama
- 4) Pusing
- 5) Nyeri payudara
- 6) Kenaikan berat badan
- 7) Tidak mencegah PMS
- 8) Tidak boleh untuk ibu yang menyusui
- 9) Dapat meningkatkan tekanan darah sehingga risiko stroke (Handayani, 2010).

g. Indikasi

Pada prinsipnya ibu boleh menggunakan pil, seperti:

- 1) Usia reproduksi
- 2) Telah memiliki anak ataupun belum
- 3) Gemuk atau kurus
- 4) Setelah melahirkan dan tidak menyusui

- 5) Pasca keguguran
- 6) Anemia karena haid berlebihan
- 7) Riwayat kehamilan ektopik
- 8) Siklus haid tidak teratur
- 9) Kelainan payudara jinak
- 10) Kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata dan syaraf (Handayani,2010).

h. Kontraindikasi

- 1) Absolut
 - a) *Trombophlebitis, serebro vaskuler* (pernah dan sedang)
 - b) Jantung iskemik/arteri koroner
 - c) Karsinoma payudara
 - d) Kehamilan
 - e) Tumor hepar, ikterus/hepatitis
 - f) Pendarahan abnormal dari genitalia tanpa sebab.
 - g) Neoplasma dan hiperlipidemia (kongenital/familial).
- 2) Relatif kuat
 - a) Sakit kepala hebat (migrane)
 - b) Hipertensi
 - c) Diabetes mellitus
 - d) Penyakit kantong empedu yang aktif
 - e) Rencana operasi besar efektif dalam 4 mmg yad
 - f) Tungkai bawah di gips dalam waktu lama
 - g) Umur lebih dari 40 tahun disertai riwayat kardiovaskular
 - h) Umur 35 tahun perokok berat (>15 batang/hari)
 - i) Myoma uteri

j) Epilepsi (Handayani,2010).

i. Cara penggunaan

- 1) Sebaiknya pil diminum setiap hari, lebih baik dalam waktu yang sama
- 2) Pil pertama dimulai pada hari pertama siklus haid, hal ini sangat dianjurkan.
- 3) Bila paket 28 pil habis mulai minum dari paket yang baru. Paket 21 pil habis sebaiknya tunggu 1 minggu baru minum pil dari paket yang baru.
- 4) Bila muntah dalam waktu 2 jam, minum pil lain. Atau gunakan kontrasepsi lain.
- 5) Pil oral bukan *barrier* mekanis terhadap penularan PHS dan tidak melindungi akseptor terhadap virus HIV.
- 6) Bila lupa minum 1 pil setelah ingat segera minum pil yang lupa dan minumlah pil untuk hari ini seperti biasa
- 7) Bila lupa 2 pil setelah ingat segera minum 2 pil hari itu dan 2 pil lagi hari berikutnya, dampaknya *spotting* lebih besar. Gunakan kondom/abstinens sampai terjadi haid
- 8) Lupa minum 3 pil berturut/ lebih baik hentikan pemakaian, gunakan metode lain bila ingin menggunakan pil lagi tunggu menstruasi dan gunakan dari kemasan yang baru.
- 9) Waktu mulai minum pil:
 - a) Setiap saat asalkan ibu tidak hamil hari pertama sampai hari ke tujuh siklus haid
 - b) Boleh menggunakan pada hari ke delapan, perlu menggunakan metode kontrasepsi yang lain sampai hari ke empat belas atau tidak melakukan hubungan seksual

- c) Setelah melahirkan yakni setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif, setelah 3 bulan dan tidak menyusui dan pasca keguguran
- d) Bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi dan ingin menggantikan dengan pil kombinasi, pil dapat segera diberikan tanpa menunggu haid. (Sulistyawati, 2012).

j. Efek samping

- 1) Amenorrhoe
- 2) Mual, pusing dan muntah
- 3) Pendarahan pervaginam (Handayani, 2010).

2. Pil Progestin

a. Pengertian

Pil progestin merupakan pil kontasepsi yang berisi hormon sintesis dari progesteron (Handayani, 2010)

b. Jenis

- 1) Kemasan dengan isi 35 pil: 300 ig *levonorgestrel* atau 350 ig *noretindron*
- 2) Kemasan dengan isi 28 pil: 75 ig *norgestrel* (Handayani, 2010).

c. Cara kerja

- 1) Menghambat ovulasi
- 2) Mencegah implantasi
- 3) Memperlambat transpor gamet/ovum
- 4) *Luteolysis*
- 5) Mengentalkan lendir serviks yang kental (Sulistyawati, 2012).

d. Efektivitas

Sangat efektif 98,5% pengguna jangan sampai lupa 1-2 pil, jangan sampai muntah, diare, karena kemungkinan terjadinya kehamilan sangat besar (Departemen Penyakit Dalam FKUI, 2007).

e. Keuntungan

1) Keuntungan kontraseptif

- a) Sangat efektif bila digunakan secara benar
- b) Tidak mengganggu hubungan seksual
- c) Tidak terpengaruh dengan pemberian ASI
- d) Segera bisa kembali ke kondisi kesuburan bila dihentikan
- e) Tidak mengandung estrogen

2) Keuntungan non kontraseptif

- a) Bisa mengurangi kram haid
- b) Bisa mengurangi pendarahan haid
- c) Bisa memperbaiki kondisi anemia
- d) Memberi perlindungan terhadap kanker endometrial
- e) Mengurangi keganasan penyakit payudara
- f) Mengurangi kehamilan ektopik
- g) Memberi perlindungan terhadap beberapa penyakit Radang Panggul
(Handayani, 2010).

f. Kekurangan

- 1) Menyebabkan perubahan dalam pola pendarahan haid
- 2) Sedikit penambahan atau pengurangan berat badan bisa terjadi
- 3) Bergantung pada pemakai (memerlukan motivasi terus menerus dan pemakaian setiap hari)
- 4) Harus dimakan pada waktu yang sama setiap hari
- 5) Kebiasaan lupa akan menyebabkan kegagalan metoda
- 6) Pasokan ulang harus selalu tersedia
- 7) Berinteraksi dengan obat lain, seperti obat-obat epilepsi dan *tuberculose*
(Handayani, 2010).

g. Indikasi

- 1) Tekanan darah tinggi <180/110 mmHg, masalah pembekuan darah atau penyakit *sickcell*
- 2) Dengan nyeri haid tingkat sedang sampai berat
- 3) Perokok (semua usia, seberapa pun)
- 4) Yang lebih menyukai tidak atau tidak boleh menggunakan estrogen
- 5) Yang menginginkan kontrasepsi *progestin-only*, tetapi tidak mau injeksi ataupun susuk (Sulistyawati,2012).

h. Kontraindikasi

- 1) Hamil diduga hamil
- 2) Pendarahan pervaginam
- 3) Menggunakan obat tuberkulosis dan obat epilepsi
- 4) Kanker payudara
- 5) Miom uterus
- 6) Riwayat stroke (IBI,2010).

i. Cara Penggunaan

- 1) Makanlah pil pertama pada har pertama masa haid anda.
- 2) Jika anda memulai makan Pil *progestin-only* anda setelah hari pertama masa haid anda, tetapi sebelum hari ke tujuh, gunakan metoda penunjang untuk 48 jam berikutnya
- 3) Habiskanlah semua pil dalam kemasan tersebut mulai dengan kemasan baru lagi pada hari setelah anda memakan pil terakhir dari kemasan terdahulu
- 4) Jika anda akan berhubungan seks selama 48 jam berikutnya

- 5) Jika anda lupa makan 1 pil atau lebih, anda harus segera memakan pil berikutnya bila anda ingat. Gunakan metoda penunjang bila anda akan berhubungan seks selama 48 jam berikutnya.
 - 6) Jika anda tidak mengalami haid sebanyak dua kali atau lebih anda harus pergi ke klinik untuk pemeriksaan apakah anda hamil. Jangan berhenti makan pil kecuali jika anda sudah tahu bahwa anda sudah hamil
 - 7) Waktu minum pil:
 - a) Setiap saat anda merasa yakin klien tidak sedang hamil
 - b) Hari pertama sampai hari ke lima siklus menstruasi
 - c) Bila menggunakan setelah hari ke lima gunakan metode kontrasepsi lain untuk 2 hari atau tidak melakukan hubungan seksual selama 2 hari
 - d) Postpartum: 6 minggu dan 6 bulan
 - e) Pasca aborsi (segera)
 - f) Ganti cara (IBI,2010).
- j. Efek Samping**
- 1) *Amenorhea*
 - 2) *Spotting*
 - 3) Perubahan berat badan (Handayani,2010).

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntikan

Suntik pada awalnya adalah hasil penelitian setelah perang, ketika tahun 1953, Dr. Junkman menemukan bahwa suntikan aksi-lama terbentuk bila progesteron dan alkohol digabungkan (Everett, 2007)

Pada tahun 1957, penelitian mulai dilakukan pada *norigest* suntik, saat ini dikenal dengan *noristerat* yang dilisensi untuk pemakaian jangka pendek di Inggris, yaitu setelah pemberian vaksin *Rubella*. Pada tahun 1963, uji coba mulai

dilakukan dengan suntik *depoprovera* yang dilisensi di Inggris untuk pemakaian jangka panjang, pada tahun 1984 ketika metode lain tidak cocok. Sejak tahun 1990, metode ini telah dilisensi sebagai metode pilihan pertama (Hartanto,2010).

Kontrasepsi suntik mencegah kehamilan dengan berbagai cara. kontrasepsi ini menyebabkan lendir serviks mengental sehingga menghentikan daya tembus sperma, mengubah endometrium menjadi tidak cocok untuk implantasi dan mengurangi fungsi tuba fallopi. Namun, fungsi utama kontrasepsi adalah untuk mencegah kehamilan dan menekan ovulasi (Everett, 2007).

Suntikan diberikan melalui penyuntikkan intramuskular dalam di *regio gluteus* (atau kadang-kadang di *deltoid*, terutama orang yang sangat gemuk). Tempat penyuntikan ini jangan di pijat karena tindakan ini bisa menyebabkan depot menyebar sehingga kadar awal dalam darah lebih tinggi dan durasi kerja hormon menjadi lebih singkat (Uliyah,2010).

Adapun Pembagian kontrasepsi suntik menurut Sri Handayani (2010) dibagi menjadi 2 yakni:

1. Suntikan Kombinasi

a. Pengertian

Suntik kombinasi merupakan kontrasepsi suntik yang berisi hormon sintesis estrogen dan progesteron (Handayani,2010).

b. Jenis

- 1) 25 mg *Depomedroksiprogesteron Asetat* dan 5 mg *Estradiol Valerat*
- 2) 50 mg *Norentindron Enantat* dan 5 mg *Estradiol Valerat* (IBI,2010)

c. Cara kerja

- 1) Menekan ovulasi.
- 2) Menghambat transportasi gamet oleh tuba.
- 3) Mempertebal mukus serviks (mencegah penetrasi sperma).

- 4) Mengganggu pertumbuhan endometrium, sehingga menyulitkan proses implantasi (Sulistyawati, 2012).

d. Keuntungan

Manfaat kontrasepsi

- 1) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri
- 2) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam
- 3) Klien tidak perlu menyimpan obat
- 4) Risiko terhadap kesehatan kecil
- 5) Efek samping sangat kecil
- 6) Digunakan dalam Jangka panjang (Syuaib,2011).

Manfaat Non kontrasepsi

- 1) Mengurangi jumlah pendarahan sehingga mengurangi anemia
- 2) Mengurangi penyakit payudara jinak dan kista ovarium
- 3) Dapat diberikan pada perempuan usia perimenopause
- 4) Mencegah kanker ovarium dan kanker endometrium
- 5) Melindungi klien dari penyakit radang panggul
- 6) Mencegah kanker kehamilan ektopik
- 3) Mengurangi nyeri haid (IBI,2010).

e. Kekurangan

- 1) Perubahan pola haid: tidak teratur, pendarahan bercak, pendarahan sela sampai 10 hari.
- 2) Awal pemakaian : mual, pusing, nyeri payudara, dan keluhan ini akan menghilang setelah suntikan kedua atau ketiga.
- 3) Ketergantungan klien pada pelayanan kesehatan, klien harus kembali setiap 30 hari untuk mendapatkan suntikan.

- 4) Efektivitas turun jika interaksi dengan obat: epilepsi (fenitoin, barbiturat) dan rifamfisin.
- 5) Dapat terjadi efek samping yang serius, stroke, serangan jantung dan thrombosis paru.
- 6) Terlambatnya pemulihan kesuburan setelah berhenti.
- 7) Tidak terjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual
- 8) Penambahan berat badan (Sulistyawaty,2012).

f. Indikasi

- 1) Anemia
- 2) Haid teratur
- 3) Usia reproduksi
- 4) Nyeri haid hebat
- 5) Memberikan ASI > 6 bulan
- 6) Riwayat kehamilan ektopik
- 7) Pasca persalinan dan tidak menyusui
- 8) Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi
- 9) Telah memiliki anak ataupun belum memiliki anak
- 10) Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas tinggi (Handayani, 2010).

g. Kontraindikasi

- 1) Hamil atau diduga hamil
- 2) Pendarahan pervaginam tak jelas penyebabnya
- 3) Perokok usia >35 tahun yang merokok
- 4) Riwayat penyakit jantung dan tekanan darah tinggi (>180/110 mmHg)
- 5) Riwayat throemboli atau Diabetes Mellitus >20 tahun
- 6) Penyakit hati akut

- 7) Keganasan payudara
- 8) Menyusui dibawah 6 minggu pasca persalinan
- 9) Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migrain
(Handayani, 2010).

h. Waktu Injeksi

- 1) Suntikan pertama diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid
- 2) Bila suntikan pertama diberikan setelah 7 hari siklus haid, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau gunakan kontrasepsi lain
- 3) Bila klien tidak haid maka pastikan tidak hamil, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau gunakan kontrasepsi lain
- 4) Pasca salin 6 bulan, menyusui dan belum haid maka harus pastikan tidak hamil, suntikan dapat diberikan.
- 5) Pasca persalinan <6 bulan dan menyusui, menyusui serta telah mendapatkan haid, maka suntikan pertama diberikan pada siklus haid hari 1 dan hari 7
- 6) Pasca persalinan <6 bulan dan menyusui, jangan diberikan suntikan kombinasi
- 7) Pasca persalinan 3 minggu dan tidak menyusui, suntikan kombinasi dapat diberikan
- 8) Pasca keguguran suntikan kombinasi dapat segera diberikan dalam waktu tujuh hari
- 9) Ganti cara:
 - a) Suntikan lain diberikan sesuai jadwal

- b) Kontrasepsi Hormonal kombinasi lain yang dapat digunakan dengan benar, maka segera berikan. Jika dicurigai mengalami kehamilan maka segera lakukan tes kehamilan.
- c) Kontrasepsi Non hormonal dapat segera berikan asal tidak hamil, bila diberikan pada hari 1-7 siklus, maka tidak perlu kontrasepsi lain (Sulistyawati,2012).

i. Cara penggunaan

- 1) Intra muskular, setiap bulan
- 2) Diulang tiap 4 minggu
- 3) 7 hari lebih awal, terjadi risiko gangguan pendarahan
- 4) Setelah hari ke tujuh bila tidak berhubungan di hari ke tujuh kemudian gunakan kontrasepsi lain (Uliyah,2010).

j. Perlu perhatian khusus

- 1) Tekanan darah tinggi <180/110 mmHg dapat diberikan tetapi perlu pengawasan
- 2) Kencing manis (Diabetes Mellitus), dapat diberikan jika tidak ada komplikasi dan terjadi dibawah usia 20 tahun
- 3) Migrain, jika tidak ada kelainan neurologik dapat diberikan
- 4) Gunakan rifamfisin/obat epilepsi, pilih dosis *etinil estradiol* 50 mikrogram atau pilih kontrasepsi lain
- 5) Jangan diberikan pada penderita Anemia bulan sabit (Handayani,2010).

k. Efek samping

- 1) Amenorhea
- 2) Mual, pusing, muntah
- 3) *Spotting* (Handayani,2010).

l. Intruksi untuk klien

- 1) Harus kembali untuk suntik ulang tiap 4 minggu
- 2) Tidak haid 2 bulan maka pastikan tidak hamil
- 3) Harus menyampaikan obat lain yang sedang diminum
- 4) Mual, sakit kepala, nyeri ringan, payudara dan *spotting* sering ditemukan pada 2-3 kali suntikan pertama (IBI,2010).

2. Suntikan Progestin**a. Pengertian**

Suntik progestin merupakan kontrasepsi suntikan yang berisi hormon progesteron (Handayani,2010)

b. Jenis

- 1) *Depo Medroxyprogesterone Asetat, Depo-provera* (DMPA); 150 mg *Depo-Medroxyprogesterone Asetat* yang diberikan setiap 3 bulan
- 2) Noristerat® (NET-EN): 200 mg *Norithindrone Enanthate* yang diberikan setiap 2 bulan (Sulistyawati,2012)

c. Cara kerja

- 1) Menekan ovulasi
- 2) Lendir serviks menjadi kental dan sedikit, sehingga merupakan barrier terhadap spermatozoa
- 3) Membuat endometrium menjadi kurang baik/layak untuk implantasi dari ovum yang sudah dibuahi
- 4) Mungkin mempengaruhi kecepatan transpor ovum dan tuba fallopi (Hartanto,2010).

d. Keuntungan

Manfaat kontraseptif

- 1) Sangat efektif (0,3 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama penggunaan)
- 2) Cepat efektif (<24 jam) jika dimulai pada hari ke tujuh dari siklus haid
- 3) Metode jangka waktu menengah (*intermediate-term*) perlindungan untuk 2 atau 3 bulan per satu kali injeksi
- 4) Pemeriksaan panggul tidak diperlukan untuk memulai pemakaian
- 5) Tidak mengganggu hubungan seks
- 6) Tidak mempengaruhi pemberian ASI
- 7) Efek sampingnya sedikit
- 8) Klien tidak memerlukan suplai bahan
- 9) Bisa diberikan oleh petugas nonmedis yang sudah terlatih
- 10) Tidak mengandung estrogen (Syuaib,2011).

Manfaat Non kontraseptif

- 1) Mengurangi kehamilan ektopik
- 2) Bisa mengurangi nyeri haid
- 3) Bisa mengurangi pendarahan haid
- 4) Bisa memperbaiki anemia
- 5) Melindungi terhadap kanker endometrium
- 6) Mengurangi penyakit payudara ganas
- 7) Mengurangi krisis *sickle sel*
- 8) Memberikan perlindungan terhadap beberapa penyakit PID (penyakit inflamasi pelvik) (Handayani,2010).

e. Kekurangan

- 1) Perubahan dalam pola pendarahan haid, pendarahan bercak tak beraturan awal pada sebagian besar wanita
- 2) Penambahan berat badan ($\pm 2\text{kg}$) merupakan hal biasa
- 3) Meskipun kehamilan tidak mungkin, namun jika terjadi, lebih besar kemungkinannya berupa ektopik dibandingkan pada wanita yang bukan pemakai
- 4) Pasokan ulang harus tersedia
- 5) Harus kembali lagi untuk ulangan injeksi setiap 3 bulan untuk pengguna *Depo Medroxyprogesterone Asetat* (DMPA) atau 2 bulan *Norithindrone Enanthate* (NET-EN)
- 6) Pemulihan kesuburan bisa tertunda selama 7-9 bulan (secara rata-rata) setelah penghentian (Sulistyawati,2012).

f. Indikasi

- 1) Wanita dari semua usia subur atau paritas yang:
 - a) Menginginkan metode yang efektif dan bisa dikembalikan lagi
 - b) Sedang dalam masa nifas dan tidak sedang menyusui
 - c) Sedang menyusui (6 minggu atau lebih masa nifas)
 - d) Pasca aborsi
 - e) Perokok (dari semua umur sebanyak apapun)
 - f) Tidak peduli dengan pendarahan atau *amenorrhea* yang tidak teratur
- 2) Wanita dari kelompok usia subur atau paritas manapun yang:
 - a) Mengalami nyeri haid dari yang sedang hingga yang hebat
 - b) Makan obat untuk epilepsi atau tuberkulosis
 - c) Mengalami tekanan darah tinggi atau masalah pembekuan darah
 - d) Lebih menyukai untuk tidak atau tidak boleh menggunakan estrogen

- e) Tak bisa mengingat untuk makan pil setiap hari
- f) Lebih menyukai metode yang tidak berkaitan dengan hubungan seks (Handayani,2010).

g. Kontraindikasi

- 1) Sedang hamil (diketahui atau dicurigai)
- 2) Sedang mengalami pendarahan vaginal tanpa diketahui sebabnya (jika adanya masalah serius dicurigai)
- 3) Mengalami kanker payudara (Handayani,2010).

h. Kondisi yang memerlukan kehati-hatian (WHO class 3)

Metode tidak dianjurkan kecuali metode lain tidak tersedia atau tidak dapat diterima jika seorang wanita:

- 1) Sedang menyusui (<6 minggu pasca persalinan)
- 2) Mengalami sakit kuning (hepatitis virus simptomatik atau sirosis)
- 3) Menderita tekanan darah tinggi (180/110 mmHg)
- 4) Menderita penyakit jantung iskhemik (sedang atau sebelum sekarang ini)
- 5) Pernah mengalami stroke
- 6) Menderita tumor hati (adenoma atau hepatoma)
- 7) Menderita diabetes (selama > 20 tahun) (Handayani,2010).

i. Waktu injeksi

- 1) Injeksi awal:
 - a) Hari ke 1 sampai ke 7 siklus haid
 - b) Setiap saat selama siklus haid dimana anda merasa yakin bahwa pasien tersebut tidak hamil
- c) Post partum:
 - (1) Segera jika tidak sedang menyusui
 - (2) Setelah 6 bulan jika menggunakan LAM

(3) Pasca Aborsi: segera atau dalam waktu 7 hari

2) Injeksi ulang:

- a) *Depo medroxyprogesterone asetat* (DMPA) : hingga 4 minggu lebih awal atau terlambat
- b) *Norithindrone Enanthate* (NET-EN) : hingga 2 minggu lebih awal atau terlambat (Sulistyawati,2012).

j. Efek samping

- 1) *Amenorrhea*
- 2) Pendarahan hebat atau tidak teratur
- 3) Pertambahan atau kehilangan berat badan (perubahan nafsu makan) (Handayani,2010).

k. Intruksi untuk klien

- 1) Kembali ke klinik KB untuk injeksi ulang setiap 3 bulan sekali *Depo Medroxyprogesterone asetat* (DMPA) atau setiap 2 bulan *Norithindrone Enanthate* (NET-EN)
- 2) Perubahan dalam pola pendarahan haid (*amenorrhea*) merupakan hal biasa, terutama setelah 2 atau 3 kali injeksi.
- 3) Jika menggunakan *Depo Medroxyprogesterone asetat* (DMPA), pemulihan kondisi kesuburan akan tertunda untuk sementara, tetapi tidak mengurangi kesuburan dalam jangka panjang
- 4) Jika menggunakan *Depo Medroxyprogesterone asetat* (DMPA), 50% wanita akan berhenti mengalami pendarahan apapun pada akhir tahun pertama pemakaiannya.
- 5) Tidak memberi perlindungan kepada PMS seperti HIV, HBV (Sulistyawati,2012).

I. Tanda-tanda peringatan

- 1) Masa haid yang tertunda setelah beberapa bulan siklus teratur
- 2) Nyeri perut bagian bawah yang hebat
- 3) Pendarahan hebat
- 4) Abses atau pendarahan pada tempat suntikan
- 5) *Migraine* (vaskuler), sakit kepala yang berat dan terus berulang atau pandangan yang kabur (Uliyah,2010).

D. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Implan (susuk)

Susuk dikenal juga dengan Implan. Susuk KB terdiri dari 6 tabung. Implan dimasukkan ke bawah permukaan kulit di sebelah dalam lengan. Tabung-tabung yang sangat kecil dan lunak ini berisi hormon progesterin. Setelah dipasang, susuk KB tak perlu diapa-apakan lagi, sesudah dipasang, alat ini akan mencegah kehamilan selama 5 tahun (Uliyah,2010).

Kontrasepsi implan berisi progesterin masa kerja panjang yang dimasukkan ke dalam *Auto Delivery System* dan ditanam di bawah kulit. Saat ini yang beredar di Indonesia hanya *norplant* yang merupakan kontrasepsi yang paling tinggi daya gunanya (Departemen Penyakit Dalam FKUI, 2007).

Menurut Ari Sulistyawati (2012) dalam bukunya yang berjudul Pelayanan Keluarga Berencana mendeskripsikan kontrasepsi Implan sebagai berikut:

1. Profil

- a. Efektif lima tahun untuk *norplant* dan tiga tahun untuk jadena, indoplant, atau implanon
- b. Nyaman untuk digunakan
- c. Dapat digunakan oleh semua perempuan usia reproduksi
- d. Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan

- e. Kesuburan dapat segera kembali setelah implan dicabut
- f. Efek samping utama berupa pendarahan tidak teratur, pendarahan bercak dan amenore
- g. Aman dipakai pada masa laktasi (Sulistyawati, 2012).

2. Jenis

- a. *Norplant*. Terdiri atas enam batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg *levonorgestrel*. Lama kerjanya 5 tahun
- b. *Implanon*. Terdiri atas satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm, yang diisi dengan 68 mg *3-keto-desogestrel* dan lama kerjanya 3 tahun
- c. *Jadena* dan *Indoplant*. Terdiri atas dua batang yang berisi 75 mg *levonorgestrel* dengan lama kerja 3 tahun (Handayani, 2010).

3. Cara kerja

- a. Mengentalkan lendir serviks uteri sehingga menyulitkan penetrasi sperma.
- b. Menimbulkan perubahan-perubahan pada endometrium sehingga tidak cocok untuk implantasi zigot.
- c. Pada sebagian kasus dapat pula menghalangi terjadinya ovulasi (Syuaib, 2011).

4. Efektivitas

Sangat efektif (0,2-1 kehamilan per 100 perempuan) (Sulistyawaty, 2012).

5. Keuntungan

- a. Tidak menekan produksi ASI
- b. Praktis dan efektif
- c. Tidak ada faktor lupa

- d. Masa pakai jangka panjang (5 tahun)
- e. Membantu mencegah anemia
- f. Khasiat kontrasepsi susuk berakhir segera setelah pengangkatan implan (Suratun, 2013).

6. Kekurangan

Timbulnya keluhan-keluhan sebagai berikut:

- a. Nyeri kepala
- b. Peningkatan atau penurunan berat badan
- c. Nyeri payudara
- d. Perasaan mual
- e. Pening/pusing kepala
- f. Perubahan perasaan (*mood*) atau kegelisahan (*nervousness*)
- g. Membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan
- h. Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual termasuk AIDS
- i. Klien tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini sesuai dengan keinginan, akan tetapi harus pergi ke klinik untuk pencabutan
- j. Efektivitas menurun bila menggunakan obat-obatan tuberkulosis atau obat epilepsi
- k. Terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi (1,3 per 100.000 perempuan pertahun) (Sulistyawati,2012).

7. Indikasi

- a. Perempuan pada usia reproduksi
- b. Telah memiliki anak atau pun belum
- c. Menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegah kehamilan jangka panjang

- d. Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi
- e. Pasca persalinan dan tidak menyusui
- f. Pasca keguguran
- g. Tidak menginginkan anak lagi
- h. Riwayat kehamilan ektopik
- i. Tekanan darah dibawah 180/110 mmHg
- j. Perempuan yang sering lupa menggunakan pil (Sulistyawati,2012).

8. Kontraindikasi

- a. Hamil atau diduga hamil
- b. Perempuan dengan pendarahan
- c. Memiliki riwayat kanker payudara
- d. Perempuan yang tidak dapat menerima pola haid
- e. Memiliki miom uterus dan kanker payudara
- f. Mengalami gangguan toleransi glukosa

9. Jadwal kunjungan kembali ke klinik

Klien tidak perlu kembali ke klinik, kecuali jika ada masalah kesehatan atau klien ingin mencabut implan. Klien dianjurkan kembali ke klinik tempat implan di pasang bila ditemukan hal-hal berikut.

- a. Amenore disertai nyeri perut
- b. Pendarahan dalam jumlah yang banyak
- c. Rasa nyeri pada lengan
- d. Luka bekas insersi mengeluarkan darah atau nanah
- e. Ekspulsi dari batang implan
- f. Sakit kepala hebat atau penglihatan menjadi kabur
- g. Nyeri dada hebat
- h. Dugaan adanya kehamilan (Sulistyawati, 2012).

10. Efek samping

- a. Efek samping paling utama dari norplant adalah perubahan pola haid, yang terjadi kira-kira 60% akseptor dalam tahun pertama setelah insersi
- b. Yang paling sering terjadi adalah:
 - 1) Bertambahnya hari-hari pendarahan dalam 1 siklus
 - 2) Pendarahan bercak (*spotting*)
 - 3) Berkurangnya panjang siklus haid
 - 4) Amenore
- c. Umumnya perubahan-perubahan haid tersebut tidak mempunyai efek yang membahayakan diri akseptor, meskipun terjadi pendarahan lebih sering dari biasanya, volume darah yang hilang tetap tidak berubah
- d. Pendarahan yang hebat jarang terjadi (Hartanto,2010).

E. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi

1. Pengertian hipertensi

Definisi Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 80 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai. Banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat (Kemenkes RI, 2014).

Dalam buku *At a Glance Medicine* (2005) dinyatakan bahwa tekanan darah (TD) didistribusikan terus menerus. Insidensi terjadinya komplikasi

berbanding lurus dengan tekanan darah, jadi tidak ada definisi absolut untuk hipertensi. Terapi biasanya bermanfaat untuk Tekanan darah $>140/90$ mmHg yang menetap.

Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang akan berlanjut ke suatu organ target seperti stroke untuk otak, penyakit jantung koroner untuk pembuluh darah jantung dan hipertrofi ventrikel kanan (untuk otot jantung). Dengan target organ di otak yang berupa stroke, hipertensi menjadi penyebab utama stroke yang membawa kematian yang tinggi (Martuti, 2009).

Banyak yang menderita hipertensi diperkirakan sekitar 15 juta bangsa Indonesia tetapi hanya 4% yang *controlled hypertension*, yang dimaksud dengan hipertensi terkendali adalah mereka yang menderita hipertensi dan tahu bahwa mereka sedang menderita hipertensi dan sedang berobat untuk itu (Bustan, 2007).

Menurut *American Heart Association* (AHA), penduduk Amerika yang berusia diatas 20 tahun menderita hipertensi telah mencapai angka hingga 74,5 juta jiwa, namun hampir sekitar 90-95% kasus tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi merupakan *silent killer* dimana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya itu adalah sakit kepala/rasa berat di tengkuk, mumet (*vertigo*), jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging (*tinnitus*), dan mimisan (Kemenkes RI, 2014).

Faktor risiko Hipertensi adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik (faktor risiko yang tidak dapat diubah/dikontrol), kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan konsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, stres, penggunaan estrogen (Kemenkes RI, 2014)

2. Klasifikasi Hipertensi

a. Klasifikasi Menurut *Join National Commite (JNC) VII*

Komite eksekutif dari *National High Blood Pressure Education Programe* merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari 46 professional sukarelawan, dan agen federal. Mereka mencanangkan klasifikasi JNC (*Joint Committe on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure*) pada tabel 2.2, yang dikaji oleh 33 ahli hipertensi nasional Amerika Serikat (Handayani, 2013).

Tabel 2.1
Klasifikasi Menurut JNC (*Joint National Committe on Prevention, Detection, Evaluatin, and Treatment of High Blood Pressure*)

Kategori Tekanan Darah menurut JNC 7	Kategori Tekanan Darah menurut JNC 6	Tekanan Darah Sistol (mmHg)	dan/ atau	Tekanan Darah Diastol (mmHg)
Normal	Optimal	< 120	dan	< 80
Pra-Hipertensi		120-139	atau	80-89
-	Normal	< 130	dan	< 85
-	Normal-Tinggi	130-139	atau	85-89
Hipertensi:	Hipertensi:			
Tahap 1	Tahap 1	140-159	atau	90-99
Tahap 2	-	≥ 160	atau	≥ 100
-	Tahap 2	160-179	atau	100-109
	Tahap 3	≥ 180	atau	≥ 110

Sumber: Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, dkk. 2003

Data terbaru menunjukkan bahwa nilai tekanan darah yang sebelumnya dipertimbangkan normal ternyata menyebabkan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskuler.

b. Klasifikasi berdasarkan hasil Konsensus Perhimpunan Hipertensi Indonesia

Pada pertemuan ilmiah Nasional pertama perhimpunan hipertensi Indonesia 13-14 Januari 2007 di Jakarta, telah diluncurkan suatu konsensus mengenai pedoman penanganan hipertensi di Indonesia yang ditujukan bagi mereka yang melayani masyarakat umum:

- 1) Pedoman yang disepakati para pakar berdasarkan prosedur standar dan ditujukan untuk meningkatkan hasil penanggulangan ini kebanyakan diambil dari pedoman Negara maju dan Negara tetangga, dikarenakan data penelitian hipertensi di Indonesia yang berskala Nasional dan meliputi jumlah penderita yang banyak masih jarang.
- 2) Tingkatan hipertensi ditentukan berdasarkan ukuran tekanan darah sistolik dan diastolik dengan merujuk hasil JNC dan WHO.
- 3) Penentuan stratifikasi risiko hipertensi dilakukan berdasarkan tingginya tekanan darah, adanya faktor risiko lain, kerusakan organ target dan penyakit penyerta tertentu. (Martuti,2009).

Tabel 2.2
Klasifikasi Hipertensi Menurut Perhimpunan Hipertensi Indonesia

Kategori	Tekanan Darah Sistol (mmHg)	dan/atau	Tekanan Darah Diastol (mmHg)
Normal	<120	Dan	<80
Prehipertensi	120-139	Atau	80-89
Hipertensi Tahap 1	140-159	Atau	90-99
Hipertensi Tahap 2	≥160-179	Atau	≥100
Hipertensi terisolasi Sistol	≥140	Dan	<90

Sumber: Martuti, 2009

Adapun jenis hipertensi berdasarkan penyebab dan bentuknya terbagi menjadi:

a. Berdasarkan penyebab

1) Hipertensi primer/Hipertensi Esensial

Hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui (idiopatik), walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak (inaktivitas) dan pola makan. Terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi. Tekanan darah meningkat disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus seperti keturunan, perubahan pada jantung dan pembuluh darah, bertambahnya umur juga stress psikologis. (Martuti,2009)

2) Hipertensi sekunder/Hipertensi Non Esensial

Hipertensi yang diketahui penyebabnya. Pada sekitar 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal yang mengganggu regulasi volume dan/atau mengaktifasi sistem renin-angiotensin-aldosteron. Pada sekitar 1-2%, penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu (misalnya pil KB) yang dapat menaikkan ABP melalui aktivitas *renin-angiotensin-aldosteron* dan hiperinsulinemia. (Philip I. Aarosan dan Jeremy PT Ward, 2010)

Selain itu, dapat juga disebabkan oleh Kortikosteroid, siklosporin, eritropoietin, kokain dan penyalagunaan alkohol (Martuti,2009)

b. Berdasarkan bentuk hipertensi

Hipertensi diastolik (*diastolic hypertension*), Hipertensi campuran (sistol dan diastol yang meninggi), Hipertensi sistolik (*isolated systolic hypertension*). (Kemenkes RI, 2014).

1) Tekanan darah sistolik

Tekanan yang terjadi bila otot jantung berdenyut memompa untuk mendorong darah keluar melalui arteri. Angka itu menunjukkan seberapa kuat jantung memompa untuk mendorong darah melalui pembuluh darah. Tekanan sistolik merupakan angka pertama yang terbaca pada alat ukur tekanan darah. Sebagai contoh, tekanan darah pada angka 120 / 80 menunjukkan tekanan sistolik pada nilai 120 mmHg

2) Tekanan darah diastolik

Tekanan diastolik yaitu saat otot jantung beristirahat membiarkan darah kembali masuk ke jantung. Tekanan diastolik merupakan angka kedua yang terbaca pada alat ukur tekanan darah. Sebagai contoh, tekanan darah pada angka 120 / 80 menunjukkan tekanan diastolik pada nilai 80 mmHg

3. Epidemiologi

Hipertensi di Amerika Serikat lebih banyak diderita oleh perempuan dibandingkan dengan pria karena angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dan tingginya prevalensi hipertensi pada kelompok yang lebih tua. Hipertensi sistolik yang terisolasi terjadi pada 30% perempuan berusia lebih dari 60 tahun. Hormon seks mempengaruhi tekanan darah baik pada perempuan yang hipertensi maupun tekanan darah yang tekanannya normal. Memiliki tekanan darah yang lebih tinggi selama fase folikular dibandingkan dengan fase luteal (Aarson dan Jeremy, 2010).

Penelitian *Nurse Health Study* mendapatkan risiko relatif terjadinya hipertensi pada kontrasepsi oral sebesar 1,8 namun risiko ini lebih rendah dengan menggunakan preparat kontrasepsi dosis rendah yang baru, sedangkan TSH tidak berkaitan dengan hipertensi diantara penyebab hipertensi sekunder, terdapat

kecenderungan displasi fibromuskular arteri renalis pada perempuan. Efektivitas berbagai hipertensi sebanding antara perempuan dan pria, namun efek samping lebih cenderung dialami oleh perempuan. Sebagai contoh batuk akibat antihipertensi penghambat enzim konversi angiotensin (*angiotensin-converting enzyme inhibitor*) lebih cenderung terjadi pada perempuan (Departemen Penyakit Dalam FKUI, 2007).

Sampai saat ini, data hipertensi yang lengkap sebagian besar berasal dari negara-negara yang sudah maju. Data dari *The National Health and Nutrition Examination Survey* (NHNES) menunjukkan bahwa dari tahun 1999-2000, insiden hipertensi pada orang dewasa adalah sekitar 29-31%, yang berarti 58-65 juta orang hipertensi di Amerika dan terjadi peningkatan 15 juta dari data NHANES III tahun 1988-1991 (Departemen Penyakit Dalam FKUI, 2007)

4. Patofisiologi

Hipertensi terjadi melalui terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I oleh *Angiotensin-Converting Enzyme* (ACE). Angiotensin dalam kamus kedokteran Dorland (2010) adalah setiap anggota famili hormon vasopresor polipeptida yang dibentuk oleh kerja katalitik renin pada angiotensinogen (angiotonin).

Angiotensin I adalah dekaeptida yang dipecah dari angiotensinogen oleh renin, mempunyai aktivitas biologik, tetapi berperan utama dalam rekusor bagi angiotensin II, sedangkan Angiotensin II adalah suatu hormon oktapeptida yang dibentuk oleh kerja *Angiotensin-Converting Enzyme* (ACE) (*peptidil-dipeptidase*) pada angiotensin I terutama pada paru, tetapi juga pada tempat yang lain, termasuk dinding pembuluh darah, uterus dan otak. Hormon ini merupakan vasopresor kuat dan perangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal dan juga berfungsi sebagai neurotransmitter. Aksi vasopresor meningkatkan tekanan darah

dan mengurangi kehilangan cairan pada ginjal dengan membatasi aliran darah (Dorland, 2010).

Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) memegang peran fisiologis yang mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya, oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin I. *Angiotensin-Converting Enzyme* (ACE) yang terdapat di paru-paru, mengubah angiotensin I menjadi Angiotensin II. Angiotensin inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama (Aarosan dan Jeremy, 2010).

Pertama, dengan meningkatkan sekresi hormon antidiuretik (ADH) dan meningkatkan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar pituitari) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urine yang dieksresikan ke luar tubuh sangat sedikit (antidiuresis), sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya. Untuk mengencerkannya. Volume cairan ekstra seluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Kemudian terjadi peningkatan volume darah, sehingga tekanan darah meningkat (Davey, 2005).

Kedua, dengan menstimulasi sekresi aldosteron (hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal) dari korteks adrenal. Pengaturan volume cairan ekstraseluler oleh aldosteron dilakukan dengan mengurangi ekskresi NaCl (garam) dengan cara mereabsorbsinya dari tubulus ginjal. Pengurangan ekskresi NaCl menyebabkan naiknya konsentrasi NaCl, yang kemudian diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler. Maka terjadilah peningkatan volume dan tekanan darah (Davey, 2005).

5. Diagnosis Hipertensi dan Gejala Klinis

a. Diagnosis Hipertensi

Diagnosis yang akurat merupakan langkah awal dalam penatalaksanaan hipertensi. Akurasi cara pengukuran tekanan darah dan alat ukur yang digunakan, serta ketepatan waktu pengukuran. Pengukuran tekanan darah dianjurkan dilakukan pada posisi duduk setelah beristirahat 5 menit dan 30 menit bebas rokok dan kafein.

Pengukuran tekanan darah posisi berdiri atau berbaring dapat dilakukan pada keadaan tertentu. Sebaiknya alat ukur yang dipilih adalah sfigmomanometer air raksa dengan ukuran *cuff* yang sesuai. Balon di pompa sampai 20-30 mmHg di atas tekanan sistolik yaitu saat pulsasi nadi tidak teraba lagi, kemudian dibuka secara perlahan-lahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari *auscultatory gap* yaitu hilangnya bunyi setelah bunyi pertama terdengar yang disebabkan oleh kekakuan arteri (Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI, 2007).

Pengukuran ulang hampir selalu diperlukan untuk menilai apakah peninggian tekanan darah menetap sehingga memerlukan intervensi segera atau kembali ke normal sehingga hanya memerlukan kontrol yang periodik. Selain itu diperlukan pemeriksaan penunjang untuk menilai faktor risiko kardiovaskuler lain seperti hiperglikemi atau hiperlipidemi yang dapat dimodifikasi dan menemukan kerusakan organ target akibat tingginya tekanan darah seperti hipertrofi ventrikel kiri atau retinopati hipertensi pada funduskopi. Tentu saja sebelum melakukan pemeriksaan fisik diperlukan anamnesis yang baik untuk menilai riwayat hipertensi dalam keluarga, riwayat penggunaan obat antihipertensi atau obat lain, gejala yang

berhubungan dengan gangguan organ target, kebiasaan dan gaya hidup serta faktor psikososial (Handayani, 2013).

b. Gejala Klinis

Individu yang menderita hipertensi kadang tidak menunjukkan gejala sampai bertahun-tahun. Oleh karena itulah hipertensi dikenal sebagai *silent killer*. Pada pemeriksaan fisik, tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina, seperti pendarahan, eksudat (kumpulan cairan), penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat akan mengalami edema pupil. sebagian besar gejala klinis timbul setelah mengalami hipertensi bertahun-tahun :

- 1) Nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah, akibat peningkatan tekanan darah intrakranial
- 2) Penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi.
- 3) Ayunan langkah yang tidak mantap akibat susunan saraf pusat telah rusak
- 4) Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus
- 5) Edema dependen dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler (Palmer, 2007) .

Gejala lainnya yang umumnya terjadi pada penderita hipertensi yaitu pusing, muka merah, sakit kepala, keluarnya darah dari hidung secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal dan lain-lain.

6. Faktor risiko hipertensi

Penyebab pasti dari hipertensi esensial sampai saat ini masih belum dapat diketahui. Kurang dari 90% penderita hipertensi tergolong hipertensi esensial sedangkan 10% nya tergolong hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder disebabkan oleh faktor primer yang diketahui yaitu seperti kerusakan ginjal,

gangguan obat tertentu, stres akut, kerusakan vaskuler dan lain-lain. Risiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi stres, obesitas dan nutrisi. Adapun faktor risiko Hipertensi sebagai berikut:

a. Usia

Usia mempengaruhi faktor risiko terkena Hipertensi dengan kejadian paling tinggi pada usia 30–40 tahun. Kejadian 2 kali lebih besar pada orang kulit hitam, dengan 3 kali lebih besar pada laki-laki kulit hitam, dan 5 kali lebih besar untuk wanita kulit hitam. Penyakit hipertensi berbanding lurus dengan usia seseorang (Ridwan,2009).

b. Jenis kelamin

Hipertensi meningkat pada seseorang dengan jenis kelamin perempuan. Hipertensi pada perempuan seringkali dipicu oleh perilaku tidak sehat, seperti merokok, kelebihan berat badan, depresi dan rendahnya status pekerjaan (Martuti,2009).

c. Riwayat keluarga

Riwayat keluarga dengan hipertensi memberikan risiko terkena hipertensi sebanyak 75%. Jika seseorang memiliki riwayat hipertensi di dalam keluarga maka kecenderungan untuk menderita hipertensi juga lebih besar ketimbang mereka yang tidak memiliki keluarga penderita hipertensi (Martuti, 2009).

Secara genetik, penyakit hipertensi memiliki hubungan yang signifikan dengan gen-gen pemicu hipertensi yang terdapat dalam kromosom manusia. Sekalipun gen-gen ini belum bisa diidentifikasi secara akurat namun faktor-faktor genetik pada gen manusia yang mempengaruhi sistem *rennin-*

angiotensin-aldosteron. Mekanisme ini sangat membantu dalam pengaturan tekanan darah melalui pengontrolan keseimbangan garam serta kelenturan dari arteri (Ridwan, 2009).

d. Obesitas

Meningkatnya berat badan pada masa anak-anak atau usia pertengahan risiko hipertensi meningkat. Predikat obesitas diberikan pada seseorang yang memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) lebih besar dari 30 kg/m^2 . Obesitas berhubungan erat dengan Obesitas karena daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita Obesitas dengan hipertensi lebih tinggi ketimbang mereka yang memiliki berat badan normal (Martuti,2009).

e. Stress pekerjaan

Hampir semua orang di dalam kehidupan mereka mengalami stress berhubungan dengan pekerjaan mereka. Stres dapat meningkatkan tekanan darah dalam waktu yang pendek, tetapi kemungkinan bukan penyebab meningkatnya tekanan darah dalam waktu yang panjang. Stress memicu naiknya tekanan darah sesaat dan jika stres berlalu, tekanan darah akan normal kembali (Martuti,2009).

f. Asupan garam

Konsumsi garam memiliki efek langsung terhadap tekanan darah. Terdapat bukti bahwa mereka yang memiliki kecenderungan menderita hipertensi secara keturunan memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya (Ridwan,2010).

F. Keterkaitan Hipertensi dan Kontrasepsi Hormonal

Hipertensi yang terjadi pada wanita kurang mendapat perhatian dibandingkan pada laki-laki. Padahal, dengan meningkatnya usia, kejadian hipertensi justru meningkat tajam (Hartanto,2010).

Kenaikan tekanan darah dapat terjadi pada wanita akibat stres, kurang istirahat, aktivitas kerja, kondisi pernafasan atau makanan, obesitas/kegemukan, psikososial dan stress, merokok, olahraga yang kurang, konsumsi alkohol yang berlebihan, hiperlipidemia/hiperkolesterolemia. Tetapi bisa juga disebabkan oleh penyakit atau kerusakan organ yang berhubungan dengan cairan tubuh, misalnya ginjal yang tidak berfungsi, pemakaian kontrasepsi hormonal, gangguan endokrin dan tergantung keseimbangan hormon yang merupakan pengatur tekanan darah.

Pada kontrasepsi hormonal seperti Oral, suntik dan implan memiliki kandungan hormon estrogen dan progesteron sintesis yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena terjadi hipertropi jantung dan peningkatan respon presor angiotensi II dengan melibatkan jalur *Renin Angiotensin System*. Selain itu, Pada kontrasepsi hormonal juga terdapat kandungan etinilestradiol yang merupakan penyebab hipertensi, sedangkan Gestagen memiliki pengaruh minimal terhadap tekanan darah. Etinilestradiol dapat meningkatkan angiotensinogen 3-5 kali kadar normal (Baziad, 2008).

Hipertensi atau tekanan darah $>140/90$ mmHg dijumpai pada 2-4% wanita pemakai kontrasepsi pil, terutama mengandung etilestradiol, keadaan ini erat kaitannya dengan usia wanita dan lama penggunaan, kejadian hipertensi meningkat sampai 2-3 kali lipat setelah 4 tahun penggunaan pil kontrasepsi yang mengandung estrogen. Jika tekanan darah $>160/95$ mmHg sebaiknya jangan diberikan pil kontrasepsi yang mengandung esterogen, bila tekanan darah $>220/120$ mmHg, semua jenis kontrasepsi hormonal merupakan kontraindikasi,

setelah penghentian pil kontrasepsi, biasanya tekanan darah akan normal kembali, tetapi bila hal ini tidak terjadi perlu diberi obat antihipertensi (Baziad,2008).

Estrogen dapat menyebabkan kanker ganas, serangan jantung, stroke dan penyakit lain. Estrogen yang berlebih dalam tubuh dapat menjadi racun bagi tubuh sehingga diperlukan hormon progesteron untuk menetralkan estrogen dominan dalam tubuh. Estrogen dapat merusak pembuluh darah sehingga estrogen dapat menyebabkan migraen, dalam penggunaan pil kontrasepsi beberapa dokter menyarankan untuk waspada terhadap tanda-tanda radang urat darah (phlebitis), yang merupakan radang pembuluh darah (Platt, 2010).

Pil KB mengandung dua hormon buatan estrogen dan progestin. Progestin adalah bentuk sintesis progesteron. Namun demikian, progestin merupakan bahan kimia yang tidak berhubungan dengan progesteron alami dan mempunyai efek samping yang sama dengan estrogen (Platt, 2010).

Selama penggunaan pil kontrasepsi terjadi peningkatan ringan tekanan darah sistolik dan diastolik, terutama 2 tahun penggunaannya (Handayani, 2010).

G. Integrasi Keislaman Tentang Kontrasepsi KB, Kesehatan Reproduksi dan Hipertensi

1. Integrasi keislaman Terhadap Keluarga Berencana

Tidak syak lagi bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan jenis manusia sedangkan kelangsungan jenis manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Islam sendiri sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dibalik itu islam juga memberi perkenan (*rukhsah*) kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila di dorong dengan alasan yang kuat (Qardhawi,2003).

Cara yang termahsyur yang biasa dilakukan oleh orang pada zaman Nabi untuk menyetop kehamilan atau memperkecil adalah dengan *azl* (mengeluarkan air mani di luar rahim ketika terasa akan keluar). Para sahabat banyak yang melakukan *azl* ketika nabi masih hidup dan wahyu pun masih terus turun. (Qardhawi,2003).

Pada zaman pemerintahan umar, dalam satu majelis orang-orang banyak berbincang masalah *azl*. Kemudian ada salah seorang laki-laki yang berkata, “orang-orang yahudi beranggapan bahwa *azl* itu berarti pembunuhan kecil”. Kemudian Ali *Radhiyallahu Anha* berkata, “tidak dinamakan pembunuhan sehingga mani itu berjalan tujuh tahap yaitu, mula-mula sari tanah, kemudian menjadi nutfah (mani), kemudian menjadi darah yang membeku, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian daging itu dilengkapi dengan tulang belulang, kemudian dililiti dengan daging dan terakhir menjadi manusia.” Lantas umar menjawab, “ betul engkau, ya Ali! Semoga Allah memanjangkan umurmu!”(‘Uwaidah,2013).

2. Hukum Azl

Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Jadzamah binti Wahab saudara perempuan Ukasyah, ia menceritakan aku pernah mendengar beberapa orang bertanya kepada Rasulullah mengenai *Al-‘Azl*, yaitu penarikan kemaluan suami dari kemaluan istrinya saat akan keluar mani dan mencegah keislaman dan beliau menjawab: “yang demikian itu adalah pembunuhan terhadap anak secara tersembunyi. Kemudian beliau membacakan firman Allah pada surah At-Takwir/81 : 8, yakni:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

Terjemahnya:

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya (Departemen Agama RI, 2012).

Para Ahli zhahir, ayat ini dijadikan sebagai dalil, bahwa mencegah kehamilan merupakan suatu hal yang diharamkan. Meskipun islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun islam tidak melarang pembatasan keturunan dalam keadaan tertentu ('Uwaidah,2013).

Dalam kitabnya, *Fiqhus-sunnah*, Sayyid Sabiq mengatakan: “diperbolehkan membatasi keturunan jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putra-putrinya secara baik. Demikian pula jika sang isteri dalam keadaan lemah atau secara terus menerus hamil. Sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi seperti ini, maka pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat, bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti itu bukan hanya diperbolehkan, akan tetapi disunnahkan.” (Qardhawi,2003).

Di samping itu banyak pula dari para ulama yang secara mutlak membolehkannya. Pendapat mereka didasarkan pada dalil-dalil berikut ini:

- a. Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan:

“Kami pernah melakukan ‘Azl pada masa Rasulullah dan hal itu terdengar oleh beliau, akan tetapi beliau tidak melarang kami.” (HR. Muslim)
- b. Masih dari jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Jabir ia berkata;

"Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha` Ia mendengar Jabir radliallahu 'anhu berkata; Kami melakukan 'Azl, sedangkan Al Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha` dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Al Qur'an juga turun." (HR.Bukhari. No.4808).

Kami telah meriwayatkan dari beberapa orang sahabat Rasulullah, dimana mereka memberikan keringanan dalam hal ini ('azl) dan mereka menganggap boleh-boleh saja. Demikian menurut pendapat Iman Syafi'i (Qardhawi,2003).

Salah satu metode KB yang dianjurkan oleh Tenaga Kesehatan adalah menggunakan Kondom. Sebagian orang menyangka bahwa kondom itu termasuk 'azl. ondom merupakan hal yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu ulama mengqiyaskan dengan 'azl yaitu mengeluarkan mani diluar. Ibnu Hajar Al-Asqalaniy rahimahullah menukil bab dalam shahih Bukhari menjelaskan tentang 'Azl.

باب العزل أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج

"Bab tentang Al-'Azl yaitu mencabut (penis) setelah penetrasi agar (air mani) tertumpah di luar farji/vagina" (Fathul-Bariy 9/305, Asy-Syamilah)

Hukum 'Azl ada perselisihan diantara ulama, namun pendapat terkuat adalah mubah. Dengan beberapa dalil. Perkataan sahabat Jabir Radhiallahu 'anhu,

كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

"Kami (para shahabat) melakukan 'azl di jaman Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam" (HR.Bukhari no. 5207/ 5208-5209, Muslim no. 1440).

Di riwayat lainnya,

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه

“Kami melakukan ‘azl di jaman Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan beliau tidak melarang kami darinya” (Shahih Muslim no. 1440, Musnad Abi Ya’laa no. 2255).

Jika ada yang mengatakan bahwa ‘Azl adalah pembunuhan terselubung/kecil-kecilan, maka kita jawab dengan hadits Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*,

عن أبي سعيد الخدري، قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقول إن العزل هو المؤودة الصغرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبت يهود، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أفضيت لم يكن إلا بقدر

Dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata : “Telah sampai kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bahwasannya orang Yahudi berkata : ‘Sesungguhnya ‘azl itu pembunuhan kecil-kecilan’. Maka Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : “Orang Yahudi telah berdusta. Seandainya engkau menyetubuhinya, tidaklah akan menghasilkan anak kecuali dengan takdir Allah” (HR.Ath-Thahawiy dalam *Syarh Ma’aanil-Aatsaar* 3/31-32 no. 4348 dengan sanad hasan, At-Tirmidzi no. 1136, Abu Dawud no. 2173, Ahmad no. 11110 dengan sanad yang shahih)

Kondom bisa kita *qiyas*-kan dengan ‘azl karena alasan/*illat* adalah mencegah tertumpahnya sperma ke dalam rahim. Maka hukumnya juga mubah. Karena penggunaan kondom bisa menggantikan ‘azl. Jika tidak bisa menahan saat akan ejakulasi dengan ‘azl, maka bisa menggunakan kondom. Kondom bisa digunakan pada rentang waktu yang tidak boleh menumpahkan sperma ke rahim.

3. Pandangan Al-Qur’an Tentang Keluarga Berencana

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya adalah QS. An-Nisa/4: 9 yakni,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Departemen Agama RI, 2012).

Selain ayat diatas masih banyak ayat yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan KB diantaranya ialah QS. al-Qashas/28: 77, QS. al-Baqarah/2: 233, QS. Lukman/31: 14, QS. al-Ahqaf/46: 15, QS. al-Anfal/8: 53, dan QS. at-Thalaq/65: 7.

Dari ayat-ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.

4. Pandangan Al-Hadits Tentang Keluarga Berencana

Dalam Hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* diriwayatkan:

إنك تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم عائلة تكفون الناس (متفق عليه)

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.” (Muttafaq “Alaihi).

Dari hadits ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.

5. Pandangan Ulama dan Fatwa MUI tentang keluarga Berencana

a. Ulama yang memperbolehkan

Diantara ulama' yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak.

Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada QS. al-Mu'minun/23: 12, 13, dan 14.

b. Ulama yang melarang

Selain ulama' yang memperbolehkan ada para ulama' yang melarang diantaranya ialah Prof. Dr. Madkour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yakni "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut (kemiskinan) kami akan memberi rizkqi kepadamu dan kepada mereka*".

6. Hukum Keluarga berencana dan alasan diperbolehkannya keluarga berencana

Diantara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kekhawatiran terhadap kehidupan atau kesehatan si Ibu apabila Hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan suatu penelitian atau *checking* oleh dokter yang dapat dipercaya. Karena firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 195.

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Departemen Agama RI, 2012).

- 2) Adanya kekhawatiran akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar ibadah sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, karena untuk kepentingan anak-anaknya.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (Departemen Agama RI, 2012).

- 3) Keharusan melakukan azl yang biasa dikenal dalam syara' ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang menyusui kala hamil dan melahirkan anak baru.

Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui dengan *ghilah* atau *Ghail* karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dan dinamakan *ghilah* atau *Ghail* karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang disusui. Oleh karena itu, sikap seperti ini dapat disamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia) (Qardhawi,2003).

Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* selalu berusaha demi kesejahteraan umatnya. Untuk itu, ia diperintahkan kepada umatnya ini supaya berbuat apa yang kiranya membawa bahaya (Dai,1998).

Beliau sendiri tidak memperkeras larangannya ini sampai ke tingkat haram sebab beliau juga banyak memperhatikan keadaan bangsa yang kuat pada zamannya yang melakukan *ghilah*, tetapi tidak membahayakan. Dengan demikian, bahaya disini suatu hal yang tidak dapat dielakkan sebab ada juga seorang suami yang kuatir berbuat zina kalau larangan menyetubuhi yang sedang menyusui itu dikukuhkan, sedangkan masa menyusui itu kadang-kadang berlangsung selama dua tahun bagi orang yang hendak menyempurnakan susuan (Qardhawi,2003).

عَنْ جَدَامَةِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ
أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ
مَالِكُ الْغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَرْضِعُ

Dari Judamah Al Asadiyyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Aku ingin melarang menyetubuhi istri yang masih menyusui, tetapi aku teringat dengan orang-orang Romawi dan Persia yang melakukan hal itu dan ternyata tidak membahayakan anak-anak mereka.*" Malik (perawinya) berkata, "*Al Ghilah* artinya; seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya yang masih menyusui (HR.Muslim).

Ibnu Qayyim dalam menerangkan hubungan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, dan mengatakan sebagai berikut. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memberitakan pada salah satu segi bahwa *ghail* itu berarti memperlakukan anak seperti orang-orang persi mengadu kudanya, dan ini salah satu hal yang menyebabkan bahaya, tetapi sifatnya bukan membunuh dan merusak anak sekalipun kadang-kadang membawa bahaya bagi anak kecil. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam membimbing mereka supaya meninggalkan *ghail* kendati bukan melarangnya.

Kemudian Beliau berazam untuk melarangnya guna membendung bahaya yang mungkin menimpa anak yang masih menyusui. Akan tetapi, menutup pintu bahaya ini tidak dapat menghindari *mafsadah* yang juga mungkin terjadi sebagai akibat tertahannya *jima’* selama dalam menyusui, lebih-lebih orang yang berusia muda dan syahwatnya masih sangat keras, yang tidak dapat diatasi melainkan dengan menyetubuhi istrinya. Itulah sebabnya beliau mengakui bahwa *masalahah* dalam masalah ini lebih kuat daripada menolak *mafsadah*. Kemudian beliau melihat dua bangsa yang besar dan kuat (romawi dan persi) yang mereka itu juga mengerjakan *ghilah* dan karena kekuatannya itu, mereka sama sekali tidak ada rasa kuatir apa yang mungkin terjadi sebab *ghilah*. Oleh karena itulah, Beliau tidak jadi melarangnya (‘Uwaidah,2013).

Pada zaman kita ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya dan *masalahah* itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alihi Wasallam yaitu melindungi anak yang masih menyusui dari mara bahaya termasuk menjauhi *mafsadah* yang lain pula, yaitu

tidak bersetubuh dengan isterinya selama menyusui. Hal ini sangat memberatkan. Dengan dasar inilah, kita dapat mengira jarak yang pantas antara dua anak, yaitu sekitar 30 atau 33 bulan, bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan. Hal ini sesuai dalam Surah Al-Baqarah/2: 233, yakni

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, 2012).

Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan merupakan makanan terbaik buat bayi hingga bayi usia dua tahun. Namun demikian tentunya, air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya.

Dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa ketika seorang ibu menyusui dapat menjadi metode untuk mengatur jarak kehamilan karena ketika bayi menyusu kepada ibunya, proses menyusu tersebut mengirimkan ransangan ke

kalejar pituitari untuk melepas hormon prolaktin yang dimana hormon ini berfungsi untuk mencegah kehamilan.

Metode ini merupakan salah satu metode alami yang disebut dengan Metode Amenore Laktasi (MAL), dimana menurut Dr. Mulya Tarmidzi yakni seorang dokter angkatan laut mengatakan bahwa selama ibu menyusui dengan frekuensi yang teratur, sebenarnya secara normal akan mengurangi kemungkinan terjadi kehamilan 99%, walaupun dilakukan senggama atau persetubuhan.

Imam Ahmad dan lain-lain mengikrarkan bahwa hal yang demikian itu diperkenankan apabila isteri mengizinkannya karena dialah yang lebih berhak terhadap anak, disamping dia pula yang berhak untuk bersenang-senang. Umar ibnul Khattab, dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa *azl* itu dilarang kecuali dengan izin isteri ('Uwaidah,2013).

Setelah kita mengetahui bahwa para ulama membolehkan penggunaan obat pencegah kehamilan dan alat kontrasepsi jika ada sebab yang dibenarkan dalam syariat, maka dalam menggunakannya harus memperhatikan beberapa hal berikut:


- 1) Sebelum menggunakan alat kontrasepsi/obat anti hamil hendaknya berkonsultasi dengan seorang dokter muslim yang dipercaya agamanya, sehingga dia tidak gampang membolehkan hal ini, karena hukum asalnya adalah haram, sebagaimana penjelasan yang lalu. Ini perlu ditekankan karena tidak semua dokter bisa dipercaya, dan banyak di antara mereka yang dengan mudah membolehkan pencegahan kehamilan (KB) karena ketidakpahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam, sebagaimana ucapan Syaikh Shaleh al-Fauzan.
- 2) Tidak membahayakan kesehatan, atau minimal yang lebih ringan efek sampingnya terhadap kesehatan.

- 3) Usahakanlah memilih alat kontrasepsi yang ketika memakai/memasangnya tidak mengharuskan terbukanya aurat besar (kemaluan dan dubur/anus) di hadapan orang yang tidak berhak melihatnya. Karena aurat besar wanita hukum asalnya hanya boleh dilihat oleh suaminya.

H. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dirangkum berdasarkan tinjauan teori yang ada dan dimodifikasi dengan mekanisme kejadian hipertensi yang bersumber pada buku *At a Glance* sistem kardiovaskular ditulis Oleh Philip I Aarson dan Jeremy P.T (2010) dan *At a Glance Medicine* ditulis Oleh Patrick Davey (2005) sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Teori


Sumber: Philip I Aarosan dan Jeremy P.T (2010) dan Patrick Davey (2005)

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori di atas, berikut adalah variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah :

- a. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kejadian Hipertensi
- b. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, jenis alat kontrasepsi hormonal, lama penggunaan kontrasepsi hormonal, dan keteraturan penggunaan alat kontrasepsi.

Berdasarkan pada konsep pemikiran tersebut di atas, maka disusunlah kerangka Konsep dari variabel yang diteliti sebagai berikut :



Keterangan:



: Variabel Dependen



: Variabel Independen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan menggunakan desain Penelitian Studi Analitik. Studi Analitik adalah suatu rancangan penelitian untuk melihat hubungan dua variabel atau lebih untuk melihat hubungan dua variabel atau lebih tanpa adanya perlakuan atau intervensi (Budiman, 2011).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. Tempat Penelitian ini dipilih karena Puskesmas Kassi-Kassi merupakan Puskesmas dengan pengguna kontrasepsi hormonal tertinggi di Kota Makassar dan memiliki angka kejadian hipertensi yang tinggi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan 01 Oktober- 30 November Tahun 2016.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Cross Sectional*. *Cross Sectional* adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*) (Notoatmodjo, 2005).

Penelitian dengan studi *Cross Sectional* adalah suatu rancangan penelitian observasional yang dilakukan dengan mengetahui hubungan variabel independen

dengan variabel dependen dimana pengukurannya dilakukan pada suatu saat (serentak) (Budiman, 2011).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi juga diartikan keseluruhan individu yang menjadi acuan hasil-hasil penelitian akan berlaku (Kasjono dan Yasril, 2009).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi Hormonal. Berdasarkan laporan pengguna aktif KB Puskesmas Kassi-Kassi pada bulan Januari 2016 diperoleh 11386 pengguna kontrasepsi Hormonal. Pada suntik pengguna berjumlah 10.150 orang, pada pil pengguna berjumlah 1041 orang dan pada implan berjumlah 195 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mana ciri-cirinya diselidiki atau diukur (Kasjono dan Yasril, 2009). Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil dengan menggunakan kriteria dan bersedia untuk melakukan wawancara. Kriteria sampel meliputi:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal (pil, suntik dan implan) pada usia 15-49 tahun.
- 2) Wanita yang sudah menikah.
- 3) Bersedia diukur tekanan darahnya.

- 4) Responden merupakan pengguna kontrasepsi hormonal yang mendapatkan pelayanan KB di Puskesmas Kassi-Kassi.
 - 5) Pengguna Kontrasepsi hormonal telah mendapatkan pelayanan kontrasepsi hormonal minimal 2 kali kunjungan.
 - 6) Bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan menandatangani *informed consent*.
 - 7) Bersedia untuk diwawancarai guna kepentingan pengumpulan data.
- b. Kriteria Eksklusi
- 1) Wanita hamil.
 - 2) Memiliki riwayat hipertensi.
 - 3) Mengonsumsi obat hipertensi.
 - 4) Menggunakan kontrasepsi non hormonal.
 - 5) Menggunakan kontrasepsi IUD hormonal.

3. Estimasi Besar Sampel

Besaran sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus dari Notoatmodjo (2010) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar Populasi

n = Besar Sampel

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan.

Dari rumus tersebut di atas diperoleh banyaknya sampel penelitian adalah sebagai berikut :

Diketahui: $N = 11.386$ Orang.

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{11.386}{1 + 11.386(0,05^2)}$$

$$n = \frac{11.386}{1 + 11.386(0,0025)}$$

$$n = \frac{11.386}{29,465} = 386,42 = 386$$

Jadi, sampel pada penelitian ini adalah 386 Orang.

Dari rumus di atas dengan jumlah populasi 11.386 pengguna kontrasepsi hormonal yang diperoleh dari gabungan jumlah pengguna pil, suntik dan implan, maka diperoleh sampel 386 pengguna kontrasepsi hormonal.

4. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel adalah metode yang peneliti lakukan untuk mengambil sampel di lapangan. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan metode *Proportional Random Sampling*. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subjek dari setiap *sampling frame* yang ditentukan seimbang dengan banyaknya subjek dalam masing-masing jenis subjek ditentukan oleh peneliti dengan menetapkan persen atau proporsi jumlah subjek (Dahlan,2013).

Adapun besar atau jumlah pembagian sampel masing-masing jenis alat kontrasepsi dengan menggunakan rumus menurut Kasjono dan Yasril (2009) sebagai berikut:

$$n = \frac{x}{N} \times N_1$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diinginkan pada tiap kelompok

N = Jumlah seluruh populasi pengguna kontrasepsi Hormonal

x = Jumlah Populasi pada setiap Kelompok

N_1 = Sampel

Berdasarkan rumus, jumlah sampel masing-masing kelompok pengguna kontrasepsi hormonal tersebut yaitu:

a. Pil

Diketahui:

$$N = 11.386$$

$$x = 1041$$

$$N_1 = 386$$

Sehingga,

$$n = \frac{x}{N} \times N^1$$

$$n = \frac{1041}{11.386} \times 386$$

$$n = 35,29 = 35$$

b. Suntik

Diketahui:

$$N = 11.386$$

$$x = 10.150$$

$$N_1 = 386$$

Sehingga,

$$n = \frac{x}{N} \times N^1$$

$$n = \frac{10.150}{11.386} \times 386$$

$$n = 344,09 = 344$$

c. Implan

Diketahui:

$$N = 11.386$$

$$x = 195$$

$$N_1 = 386$$

Sehingga,

$$n = \frac{x}{N} \times N^1$$

$$n = \frac{195}{11.386} \times 386$$

$$n = 6,6 = 7$$

Tabel 3.1
Jumlah Sampel Pengguna Kontrasepsi Hormonal Berdasarkan Jenis Kontrasepsi


No	Kontrasepsi Hormonal	Jumlah Pengguna	Sampel
1	Pil	1041	35
2	Suntik	10.150	344
3	Implan	195	7
Total		11.386	386

Sumber: Data Laporan pengguna Kontrasepsi Aktif di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.1 dan setelah dilakukan perhitungan jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar 386. Jumlah sampel masing-masing kelompok, pada pengguna pil sebanyak 35 orang, pengguna suntik sebanyak 344 orang dan pengguna implan sebanyak 7 orang.

E. Bagan Alur Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Alur penelitian Sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Penelitian

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Berdasarkan Alur Penelitian yang telah dibuat, detail cara kerja atau prosedur yang akan dilakukan selama penelitian sebagai berikut:

1. Persiapan Penelitian

a. Persiapan Penelitian

Persiapan Penelitian dimulai dengan peneliti yang menyiapkan beberapa perencanaan matang sebelum melakukan penelitian dilapangan yakni dengan membuat usulan judul, proposal penelitian, membaca beberapa jurnal terkait

tema penelitian yang akan diteliti dan mencari literatur yang sesuai dan mendukung Penelitian yang akan dilakukan peneliti.

b. Pengumpulan data Sekunder

Untuk melengkapi data yang dimiliki oleh peneliti, peneliti melakukan pengambilan data awal pada beberapa instansi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

c. Pengembangan Kuesioner

Untuk mengukur variabel keluaran penelitian, karena belum ada alat ukur yang valid dan reliabel, peneliti melakukan pengembangan alat ukur sendiri. Teknik Validasi dipelajari berdasarkan teori yang ada sebelumnya dan diuji cobakan kepada subjek yang mempunyai karakteristik yang sama dengan subjek penelitian. Validitas konstruk diuji dengan uji validitas dan reliabilitas terhadap 30 subjek. Suatu pernyataan dinyatakan valid jika mempunyai koefisien korelasi terkoreksi minimal 0,361. Dinyatakan reliabel apabila *Alfa Cronbach* minimal sebesar 0,60.

d. Pemilihan Alat pengukur tekanan darah

Untuk memilih Alat pengukur tekanan darah, peneliti menggunakan Stetoskop dan Tensimeter Raksa yang telah dikalibrasi sebelumnya, memiliki sertifikat kalibrasi dan dinyatakan layak untuk digunakan.

e. Perizinan penelitian

Perizinan Penelitian dilakukan oleh peneliti untuk meminta izin kepada instansi terkait agar diizinkan melakukan penelitian di tempat tersebut.

2. Identifikasi subjek yang berpotensi masuk ke dalam penelitian

Peneliti melakukan Identifikasi subjek yang berpotensi masuk ke dalam Penelitian, yakni para pengguna Kontrasepsi Hormonal.

3. *Informed Consent*

Peneliti meminta kesediaan dari para pasien atau Pengguna Kontrasepsi hormonal yang telah diidentifikasi untuk dijadikan sebagai responden. Kemudian Pada langkah ini, peneliti melakukan penilaian lebih lanjut terhadap pasien yang akan dijadikan sebagai responden penelitian. Dimana peneliti menyeleksi beberapa pasien yang memenuhi kriteria penelitian. Untuk pasien yang memenuhi kriteria akan melalui proses wawancara dan pengukuran tekanan darah, sedangkan Responden yang tidak memenuhi kriteria tidak akan melalui proses wawancara dan pengukuran tekanan darah, tetapi subjek akan menjalani prosedur yang sesuai dengan prosedur pelayanan Puskesmas.

4. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Peneliti dengan menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitas sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan responden.

5. Pemeriksaan Tekanan darah

Tekanan darah diukur oleh perawat/bidan yang terlatih dalam menggunakan Stetoskop dan Tensimeter Raksa yang telah dikalibrasi dan dinyatakan aman oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tekanan darah diukur dalam posisi duduk setelah pasien beristirahat selama lima menit. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali dengan jeda antar pengukuran selama satu menit. Hasil pengukuran adalah rata-rata dari dua kali pengukuran tersebut dengan satuan mmHg.

6. Pencatatan

Kegiatan pencatatan dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi lembar observasi terkait hasil pemeriksaan tekanan darah yang telah dilakukan dan pencatatan terhadap kartu kontrol KB pengguna Kontrasepsi hormonal (pil, implan, dan suntik).

7. Analisis Hasil

Analisis Hasil dilakukan oleh peneliti setelah kelengkapan data penelitian terpenuhi dan jumlah sampel terpenuhi.

G. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji validitas

Uji validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam hal ini digunakan beberapa item pertanyaan yang dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur tersebut. Uji ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing item pertanyaan dari setiap variabel. (Hidayat, 2008).

Sebelum Meneliti Terlebih dahulu dilakukan uji validitas terhadap kuesioner yang telah dibuat setelah itu, hasilnya dilakukan Uji validitas dengan menggunakan korelasi *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen dikatakan valid atau sah apabila tiap butiran memiliki nilai positif dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dimana N atau jumlah subjek sebanyak 30 responden sehingga nilai t tabel yang digunakan adalah 0,361. (Hidayat, 2008).

Berdasarkan Tabel hasil uji validitas dengan menggunakan *Alpha Cronbrach* yang diuji dengan menggunakan SPSS, variabel keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal bahwa dari 10 pertanyaan tertutup yang dibuat untuk pertanyaan variabel keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal, terdapat 9 pertanyaan yang valid karena nilai t hitung $>$ t tabel, dimana t tabel $n= 30$ adalah 0,361 (terlampir).

2. Uji Reliabilitas

Setelah mengukur validitas, maka perlu mengukur reliabilitas data, apakah alat ukur dapat digunakan atau tidak. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Pengukuran reliabilitas menggunakan bantuan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) dengan Uji *Alpha Cronbach*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* $>0,60$ (Hidayat, 2008).

Pada tabel uji reliabilitas (terlampir) nilai *cronbach alfa* lebih besar dari 0,6 yakni sebesar 0,960 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan untuk variabel keteraturan penggunaan adalah reliabel.

H. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan 2 cara:

1. Data primer

a. Pengumpulan data

Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan dalam lembar kuesioner kepada responden. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengukuran kepada responden yang meliputi pengukuran tekanan darah, Pengumpulan data ini didasari dengan Alur penelitian yang telah dibuat.

b. Prosedur Pengukuran tekanan darah

- 1) Siapkan alat dan Memastikan pengukur tekanan darah berfungsi dengan baik.
- 2) Meminta responden duduk dengan rileks.
- 3) Balutkan selubung tensimeter pada bagian tengah lengan sekitar 2-3 cm dari bagian lekuk siku bagian dalam atau yang sejajar dengan jantung.
- 4) Pastikan selubung telah dibalutkan dengan kencang namun tidak terlalu kencang.
- 5) Tutuplah katup pengatur udara pada pompa karet manset tensimeter dengan cara memutar ke kanan sampai habis.
- 6) Ambil stetoskop dan pasang di telinga anda, bagian pipih ditempelkan pada bagian dalam lipatan siku disebelah bawah lilitan manset.
- 7) Untuk menentukan tinggi memberikan tekanan pada manset, tentukan perkiraan sistolik dengan cara palpasi arteri radialis pasien, kemudian pompa tensi sampai pulsasi arteri tersebut hilang. Lihat tekanan pada manometer.

- 8) Turunkan tekanan manset secara perlahan. Perhatikan dimana terdengar denyutan arteri brachialis. Itulah nilai tekanan sistol.
- 9) Turunkan terus hingga bunyi menghilang. Perhatikan nilai tekanan manset, dan inilah yang disebut tekanan diastol
- 10) Lepaskan manset dari lengan pasien dan kempiskan sampai tekanan manset menunjukkan angka nol (0)
- 11) Pada tensimeter Raksa, usahakan posisi manometer selalu vertikal.
- 12) Menginformasikan hasil pengukuran kepada responden
- 13) Dan mencatat hasil pada lembar observasi

2. Data sekunder

Data penunjang lainnya diperoleh dari lembaga terkait dengan obyek penelitian yaitu

- a. Data Puskesmas Kassi-Kassi yang meliputi Profil Kesehatan Puskesmas Kassi-Kassi, Data Kejadian Hipertensi dan Data Pengguna Alat Kontrasepsi pil, Suntik, dan implan
- b. Data Dinas Kesehatan Kota Makassar mengenai pengguna kontrasepsi di seluruh puskesmas di Kota Makassar
- c. Data BKKBN nasional dan Data BKKBN provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pelayanan KB.

I. Instrument Penelitian

Instrumen adalah Alat yang digunakan untuk Penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner untuk memperoleh data terkait karakteristik dari variabel penelitian (terlampir).

2. Tensimeter Raksa untuk melakukan pengukuran tekanan darah responden.
3. Stetoskop, alat yang digunakan untuk mendengarkan bunyi lemah ke indera pendengaran seperti bunyi denyut jantung.
4. Lembar observasi yang digunakan untuk mencatat hasil pengukuran tensimeter.

J. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data primer yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung dengan menggunakan lembar observasi diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* dan *Microsoft Excel* .

Pengolahan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan mulai data tersebut disunting sampai data tersebut disajikan. Berikut langkah-langkah pengolahan data menurut Hidayat (2009):

a. *Editing Data*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Penyuntingan yang dilakukan secara langsung terhadap kuesioner maupun lembar hasil pemeriksaan untuk memastikan data pada kuesioner telah terisi semua dan dapat dibaca dengan baik.

b. *Coding Data*

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori. Pada penelitian ini setelah seluruh data terkumpul dan selesai diedit di lapangan, dilakukan pengkodean untuk menyederhanakan data berdasarkan kode yang telah disusun dan dipindahkan

ke format aplikasi program SPSS dan Adapun Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah Diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* dengan format yang telah disediakan.

c. *Entry Data*

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah di kumpulkan ke dalam master tabel atau data base komputer. Pada penelitian ini data diinput ke dalam lembar kerja SPSS untuk masing-masing variabel. diurut berdasarkan nomor responden dalam kuesioner dan *coding* yang sudah dilakukan. Dan Entri data pada program *Microsoft Excel* dilakukan dengan menginput Hasil Pengukuran tekanan sistole dan Diastole Pada Format yang telah disediakan. Setelah penginputan di *Microsoft Excel*, hasil pengukuran lalu di pindahkan ke file SPSS untuk selanjutnya di uji analisis.

d. *Cleaning Data*

Cleaning dilakukan pada semua lembar kerja untuk membersihkan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses input data. Proses ini dilakukan melalui proses analisis pada semua variabel. Data *missing* dibersihkan dengan menginput ulang data yang benar.

e. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan program analisis data yang telah tersedia pada program SPSS di komputer.

f. Penyajian data

Data yang telah diolah dan dianalisis lebih lanjut disajikan dalam bentuk tabel, yaitu dalam bentuk tabel untuk analisis univariat dan analisis bivariat yang disertai dengan narasi atau penjelasan terkait tabel yang berisi variabel yang diteliti.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan, yaitu analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sedangkan analisis bivariat dilakukan secara analitik dengan menggunakan uji *Chi-square Dua Sampel*. Berikut dijelaskan kedua analisis tersebut.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik umum penelitian dengan cara mendeskripsikan variabel yang dimasukkan ke dalam penelitian (Budiman, 2011).

Analisis univariat juga diperlukan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase secara deskriptif terkait dengan tujuan penelitian ini berdasarkan hasil data kuesioner yang telah diinput (Dahlan, 2014).

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui uji *chi-square* (Dahlan, 2014).

Uji ini digunakan karena sampel merupakan dua atau lebih kelompok berbeda yang tidak berpasangan atau independen yang umumnya digunakan pada penelitian berbasis survei seperti penelitian ini. Uji ini juga digunakan untuk data nominal dan sampelnya besar (Dahlan, 2014)

Kriteria pengujian didasarkan pada derajat signifikan (α) 0,05 sebagai berikut:

- 1) Hipotesis diterima jika diperoleh $p\text{-value} < \alpha$ (0,05)
- 2) Hipotesis ditolak jika diperoleh $p\text{-value} > \alpha$ (0,05)

Analisis data pada studi *cross sectional* dilakukan melalui uji statistik *chi square* untuk menjawab hipotesis dan analisis *Ratio Prevalence* (RP) digunakan untuk mengetahui besar risiko variabel independen terhadap variabel dependen.

Prevalens adalah perbandingan antara jumlah subjek dengan penyakit lama dan baru pada satu saat dengan seluruh subjek yang ada. Pengertian prevalens yang lain adalah suatu kejadian penyakit (penderita lama dan baru) yang dibandingkan dengan seluruh populasi yang berisiko terkena penyakit. Rasio Prevalens dihitung dengan cara sederhana, yakni dengan menggunakan tabel 2x2, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.2
Formula Perhitungan Ratio Prevalens (RP)

Variabel independen (faktor risiko)	Variabel dependen (efek)		Jumlah
	Ya	Tidak	
Ya	a	b	a+b
Tidak	c	d	c+d
Jumlah	a+c	b+d	a+b+c+d

Sumber: Budiman,2011

Keterangan :

a = subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek

b = subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek

c = subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek

d = subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek

Berdasarkan tabel diatas maka formula perhitungan rasio prevalens yang digunakan untuk mengetahui besar risiko pada studi *cross sectional* adalah sebagai berikut:

$$RP= a/(a+b) : c/(c+d)$$

Catatan:

$a/(a+b)$ = proporsi (prevalens) subjek yang mempunyai faktor risiko yang mengalami efek.

$c/(c+d)$ = proporsi (prevalens) subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek

Interpretasi hasil Rasio Prevalens dalam studi *cross sectional* selain didasarkan pada nilai *confidence interval* (CI) juga didasarkan pada nilai rasio prevalens (RP) dengan parameter sebagai berikut:

- a. Jika $RP=1$, artinya variabel independen bukan merupakan faktor risiko
- b. Jika $RP>1$ dan konfiden intervalnya tidak mencakup angka 1, artinya variabel independen merupakan faktor risiko
- c. Jika $RP<1$ dan konfiden intervalnya tidak mencakup angka 1, artinya variabel independen merupakan faktor protektif atau faktor pencegah.

K. Penyajian Data

Data yang diperoleh dan telah diolah disajikan dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan tabel dalam bentuk narasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Puskesmas Kassi-Kassi merupakan salah satu Puskesmas pemerintah Kota Makassar dan merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Makassar. Puskesmas Kassi-Kassi berdiri sejak tahun 1978/1979 merupakan Puskesmas Perawatan ke-VI (Rumah Sakit Pembantu VI) di Makassar/RSP-VI terletak di jalan Tamalate I no.43 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun letak atau batas-batas wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ballaparang Rappocini
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panaikang Tamangapa
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangasa Jongaya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Parangtambung

Puskesmas Kassi-Kassi terletak di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan luas wilayah kerja $\pm 5,2$ KHa. Dari 6 Kelurahan terdapat 58 RW dan 361 RT. Pemanfaatan potensi lahan dan alih fungsi lahan terjadi sedemikian rupa, yang akan membawa pengaruh terhadap kondisi dan perkembangan sosial ekonomi dan keamanan masyarakat. Lahan yang berbentuk rawa-rawa di beberapa bagian di Kecamatan Rappocini beralih fungsi menjadi pemukiman sementara atau darurat. Alih fungsi lahan juga banyak terjadi pada sektor pemukiman dan perumahan yang menjamur beberapa tahun terakhir sebagai akibat Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan tingginya urbanisasi yang akan membawa pengaruh pada pola perilaku, sanitasi kesehatan, status gizi, pola dan jenis penyakit serta kondisi lingkungan

Pemukiman yang sebagian besar daerahnya dilanda banjir pada musim hujan. Luas wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi seluruhnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Jumlah RW/RT Menurut Kelurahan
di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi
Tahun 2015

No	Kelurahan	Luas (KHa)	RW	RT
1	Tidung	0,89	8	42
2	Bonto makkio	0,20	6	31
3	Kassi-Kassi	0,82	14	93
4	Mappala	0,50	13	71
5	Banta-Bantaeng	1,27	8	83
6	Karunrung	1,52	9	47
Jumlah		5,2	58	361

Sumber: Kantor Kecamatan Rappocini 2015

Kependudukan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi dewasa ini, bukan hanya menyangkut jumlah penduduk tapi juga laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk serta arus urbanisasi dengan segala dampak sosial, ekonomi dan keamanan.

Dalam upaya menahan laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan angka kematian (bayi, anak balita dan ibu), dimana pertumbuhan yang tinggi akan menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi dapat disajikan pada tabel 4.2. Pada tabel tersebut, Jumlah penduduk terpadat ditemukan pada kelurahan tersebut dengan perbandingan hampir sama.

Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat khususnya kesejahteraan anak. Berdasarkan data yang diperoleh di Puskesmas Kassi-Kassi, kepadatan penduduknya adalah 11.342,27 jiwa per km², jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun 2014 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi adalah 16.393 KK. Melebihi jumlah rumah yang ada (15.452 Rumah) yang berarti ditemukan dalam 1 rumah terdapat 2-3 Kepala Keluarga.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi
Tahun 2015

No	Kelurahan	Jumlah per jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidung	7.186	7.814	15.000
2	Bonto makkio	2.061	1.813	3.874
3	Kassi-Kassi	8.715	8.838	17.553
4	Mappala	5.868	5.882	11.750
5	Banta-Bantaeng	10.246	10.113	20.359
6	Karunrung	6.812	6.300	13.112
Jumlah		40.888	40.760	81.648

Sumber: Kantor Kecamatan Rappocini 2015

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini diperoleh hasil pemeriksaan tekanan darah dan wawancara dengan menggunakan kuesioner sebanyak 386 responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016, pengumpulan data dilakukan pada 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2016 adapun hasil pengumpulan data adalah sebagai berikut.

1. Analisis Univariat

Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi frekuensi presentase tiap-tiap variabel tunggal dan karakteristik responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Karakteristik Responden

1) Umur

Pada Tabel 4.3, distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik umur responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, kelompok umur yang terbanyak adalah kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 101 orang (26,2%), sedangkan kelompok umur responden yang paling sedikit adalah rentang usia 15-19 tahun sebanyak 4 orang (1,0%), Kemudian untuk keperluan analisis bivariat kategori umur dibagi menjadi 2

berdasarkan kriteria objektif yakni kelompok berisiko tinggi (responden dengan usia >35 tahun) sebanyak 147 responden (38,1%) dan kelompok berisiko rendah (responden dengan usia \leq 35 tahun) sebanyak (61,9%).

Distribusi responden berdasarkan kelompok umur responden dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Responden
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Umur	n	%
15 – 19	4	1,0
20 – 24	35	9,1
25 – 29	79	20,5
30 – 34	96	24,9
35 – 39	101	26,2
40 – 44	49	12,7
45 – 49	22	5,7
Total	386	100

Sumber: Data Primer 2016

2) Pendidikan

Pada Tabel 4.4, distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, pendidikan yang terbanyak adalah tamat SMA/ sederajat sebanyak 194 responden (57,4%) sedangkan pendidikan responden yang paling sedikit adalah tamat Akademi/Diploma sebanyak 4 Responden (1,0%). Kemudian untuk analisis bivariat kategori pendidikan dibagi menjadi 2 berdasarkan kriteria objektif yakni pendidikan tinggi (responden dengan tingkat pendidikan \geq SMA/ sederajat) sebanyak 226 responden (58,5%) dan kelompok berisiko rendah (responden dengan tingkat pendidikan \geq SMA/ sederajat) sebanyak 160 responden (41,5%).

Distribusi responden berdasarkan pendidikan responden di puskesmas Kassi-Kassi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Pendidikan	n	%
Tidak Sekolah/Tidak tamat SD	20	5,2
SD	43	11,1
SMP	97	25,1
SMA	194	50,3
Akademi/Diploma	4	1,0
Sarjana	28	7,3
Total	386	100

Sumber: Data Primer 2016

3) Pekerjaan

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan responden di puskesmas Kassi-Kassi dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Pekerjaan	n	%
IRT	351	90,9
Wiraswasta	7	1,8
PNS	16	4,1
Karyawan Swasta	12	3,1
Total	386	100

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik pekerjaan responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh responden adalah IRT sebanyak 351 orang (90,9%), sedangkan pekerjaan responden yang paling sedikit adalah wiraswasta sebanyak 7 orang (1,8%). Kemudian untuk analisis bivariat kategori pekerjaan responden dibagi menjadi 2 berdasarkan kriteria objektif yakni bekerja dan tidak bekerja, untuk responden

dengan kategori bekerja sebanyak 35 responden (9,1%) dan untuk responden dengan kategori tidak bekerja sebanyak 351 responden (90,9%).

4) Jumlah Anak

Distribusi responden berdasarkan jumlah anak yang dimiliki responden pengguna kontrasepsi hormonal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Anak yang dimiliki
Responden Pengguna Kontrasepsi Hormonal
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Jumlah anak	n	%
1-2 Orang	230	59,6
3-4 Orang	130	33,7
5-6 Orang	24	6,2
7-8 Orang	2	0,5
Total	386	100

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, distribusi frekuensi berdasarkan jumlah anak yang dimiliki responden pengguna kontrasepsi hormonal responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, terdapat 230 responden (59,6%) yang memiliki jumlah anak 1-2 orang, sedangkan yang memiliki 7-8 orang anak sebanyak 2 responden (0,5%).

5) Jenis Alat Kontrasepsi Hormonal

Pada Tabel 4.7, distribusi frekuensi berdasarkan jenis alat kontrasepsi hormonal yang digunakan responden yang mendapatkan pelayanan KB di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, terdapat 269 responden (69,7%) yang menggunakan suntik 3 bulan dan 7 responden (1,8%) yang menggunakan implan.

Distribusi responden berdasarkan jenis kontrasepsi hormonal yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi Hormonal
yang digunakan Responden di Puskesmas
Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Jenis Alat Kontrasepsi Hormonal	n	%
Pil kombinasi	35	9,1
Suntik 1 bulan	75	19,4
Suntik 3 bulan	269	69,7
Implan	7	1,8
Total	386	100

Sumber: Data Primer 2016

6) Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal

Distribusi responden berdasarkan lama penggunaan kontrasepsi hormonal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Penggunaan Alat
Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Lama penggunaan kontrasepsi hormonal	n	%
≤3 Tahun	249	64,5
>3 Tahun	137	35,5
Total	386	100

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, distribusi frekuensi berdasarkan lama penggunaan kontrasepsi hormonal di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, terdapat 249 responden (64,5%) yang menggunakan kontrasepsi hormonal ≤3 tahun, sedangkan responden yang menggunakan >3 tahun sebanyak 137 orang (35,5%).

b. Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal

Distribusi responden berdasarkan keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keteraturan Penggunaan
Kontrasepsi Hormonal yang digunakan Responden
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal	n	%
Teratur	137	35,5
Tidak Teratur	249	64,5
Total	386	100

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, distribusi frekuensi berdasarkan keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal yang digunakan responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, terdapat 249 responden (64,5%) yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal secara tidak teratur, sedangkan yang menggunakan secara teratur sebanyak 137 responden (35,5%).

c. Efek Samping (Keluhan) Responden Selama penggunaan Kontrasepsi Hormonal

Pada Tabel 4.10, distribusi frekuensi berdasarkan gambaran keluhan yang dirasakan responden selama Penggunaan alat kontrasepsi hormonal di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, terdapat 287 responden (74,4%) yang mengalami gangguan siklus haid, terdapat 157 responden (40,7%) yang mengalami pusing-pusing, terdapat 22 responden (5,7%) yang mengalami nyeri perut.

Distribusi responden berdasarkan keluhan selama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Gambaran Keluhan Selama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Keluhan selama penggunaan Kontrasepsi Hormonal	Ya		Tidak	
	n	%	n	%
Mual/Muntah	23	6,0	363	94,0
Nyeri Perut	22	5,7	364	94,3
Migraen	54	14,0	332	86,0
Nyeri payudara	35	9,1	351	90,9
Sakit kepala	94	24,4	292	75,6
Bercak-bercak darah/ <i>Spotting</i>	72	18,7	314	81,3
Penglihatan Kabur	27	7,0	359	93,0
Jantung berdebar-debar	42	10,9	344	89,1
Pusing	157	40,7	229	59,3
Gangguan Siklus Haid	287	74,4	99	25,6

Sumber: Data Primer 2016

d. Kejadian Hipertensi

Distribusi responden berdasarkan kejadian hipertensi pada responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi berdasarkan kejadian Hipertensi
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Hipertensi	n	%
Hipertensi	136	35,2
Tidak hipertensi	250	64,8
Total	386	100

Sumber: Data primer 2016

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, distribusi frekuensi kejadian hipertensi pada responden di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 386 responden, yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 240 responden (62,2%) dan yang mengalami hipertensi sebanyak 136 responden (35,2%).

2. Analisis Bivariat

Pada analisis ini dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut, yang diuraikan pada tabel berikut:

a. Hubungan Kelompok Umur dengan Kejadian Hipertensi

Hubungan kelompok umur dengan kejadian hipertensi dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut :

Tabel 4.12
Hubungan Kelompok Umur dengan Kejadian Hipertensi
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Kelompok Umur	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>	RP
	Ya		Tidak		n	%		
	n	%	n	%				
Risiko Tinggi (>35 tahun)	63	42,9	84	57,1	147	100	0,014	1,403
Risiko Rendah (\leq 35 tahun)	73	30,5	166	69,5	239	100		
Total	136	35,2	250	64,8	386	100		

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 4.12, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara kelompok umur dan kejadian hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yakni dari 386 responden, terdapat 147 responden yang memiliki usia berisiko tinggi (>35 tahun) dan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 84 responden (57,1%) dan yang mengalami hipertensi sebanyak 63 responden (42,9%) sedangkan, yang memiliki usia berisiko rendah (\leq 35 tahun) berjumlah 239 responden dan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 166 responden (69,5%) dan yang mengalami hipertensi sebanyak 73 responden (30,5%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan kelompok umur dan kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji statistic *Chi Square*,

diperoleh nilai $p=0,014$ ($p<0,05$) dan rasio prevalensinya 1,403 ($RP>1$), maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara umur pengguna kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi hormonal yang memiliki umur diatas 35 tahun memiliki peluang 1,4 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding usia dibawah 35 tahun.

b. Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Hipertensi

Hubungan pendidikan dengan kejadian Hipertensi dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut :

Tabel 4.13
Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Hipertensi
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Pendidikan	Kejadian Hipertensi				Total		p-value	RP
	Ya		Tidak		n	%		
	n	%	n	%				
Tinggi	73	32,3	153	67,7	226	100	0,152	0,820
Rendah	63	39,4	97	60,6	160	100		
Total	136	35,2	250	64,8	386	100		

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara pendidikan dan kejadian hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yakni dari 386 responden, terdapat 226 responden yang memiliki kategori tingkat pendidikan yang tinggi, yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 153 responden (67,7%) dan yang mengalami hipertensi sebanyak 73 responden (32,3%), sedangkan sebanyak 160 responden memiliki kategori tingkat pendidikan rendah, yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 97 responden (60,6%), dan yang mengalami hipertensi sebanyak 63 responden (39,4%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan pendidikan pengguna kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji

statistic *Chi Square*, diperoleh nilai $p=0,152$ ($p>0,05$) dan rasio prevalensinya 0,820 ($RP<1$), maka dapat diinterpretasikan bahwa Tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan pengguna kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki responden bukan merupakan faktor risiko kejadian hipertensi pada wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi hormonal.

c. Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Hipertensi

Hubungan pekerjaan dengan kejadian hipertensi dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut :

Tabel 4.14
Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian hipertensi
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Pekerjaan	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>	RP
	Ya		Tidak		n	%		
	n	%	n	%				
Tidak Bekerja	127	36,2	224	63,8	351	100	0,293	1,407
Bekerja	9	25,7	26	74,3	35	100		
Total	136	35,2	250	64,8	386	100		

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara pekerjaan dan kejadian hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yakni dari 386 responden, terdapat 351 responden yang masuk kategori tidak bekerja, sebanyak 224 responden (63,8%) tidak mengalami hipertensi dan sebanyak 127 responden (36,2%) yang mengalami hipertensi, sedangkan yang masuk kategori bekerja berjumlah 35 responden dan sebanyak 26 responden (74,3%) yang tidak mengalami hipertensi dan sebanyak 9 responden (25,7%) yang mengalami hipertensi.

Hasil analisis untuk melihat hubungan pekerjaan pengguna kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji statistic *Chi Square*, diperoleh nilai $p=0,293$ ($p>0,05$) dan rasio prevalensinya 1,407 ($RP>1$), maka dapat diinterpretasikan bahwa Tidak ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan pengguna kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa ada tidaknya pekerjaan yang dimiliki responden menjadi faktor risiko kejadian hipertensi pada wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi hormonal.

d. Hubungan Jenis Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi

Hubungan jenis alat kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut :

Tabel 4.15
Hubungan Jenis Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Jenis Kontrasepsi Hormonal	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>	RP
	Ya		Tidak		n	%		
	n	%	n	%				
Hanya progestin	103	37,3	173	62,7	276	100	0,174	1,244
Kombinasi	33	30,0	77	70,0	110	100		
Total	136	35,2	250	64,8	386	100		

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara jenis Kontrasepsi Hormonal dan kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yakni dari 386 responden, terdapat 276 responden yang menggunakan kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung progestin dan sebanyak 173 responden (62,7%) yang tidak mengalami hipertensi dan sebanyak 103 responden (37,3%) yang mengalami hipertensi, sedangkan yang

menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung kombinasi estrogen dan progestin sebanyak 110 responden yang yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 77 responden (70.0%) dan yang mengalami hipertensi sebanyak 33 responden (30,0%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan jenis kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji statistic *Chi Square*, diperoleh nilai $p=0,174$ ($p>0,05$) dan rasio prevalensinya 1,244 ($RP>1$), maka dapat diinterpretasikan bahwa Tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa jenis kontrasepsi hormonal yang dimiliki responden menjadi faktor risiko kejadian hipertensi pada wanita usia subur yang menggunakan kontrasesi hormonal.

e. Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi

Hubungan lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut :

Tabel 4.16
Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Lama Penggunaan	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>	RP
	Ya		Tidak		n	%		
	n	%	n	%				
Lama (>3 Tahun)	82	59,9	55	40,1	137	100	0,000	2,759
Baru (\leq 3 Tahun)	54	21,7	195	78,3	249	100		
Total	136	35,2	250	64,8	386	100		

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 4.16, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi hormonal dan kejadian hipetensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yakni dari 386 responden, terdapat 137 responden

yang telah lama (>3 Tahun) menggunakan kontrasepsi hormonal dan yang mengalami hipertensi sebanyak 82 responden (59,9%) dan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 55 responden (40,1%), sedangkan sebanyak 249 responden yang baru (≤ 3 Tahun) menggunakan kontrasepsi hormonal dan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 195 responden (78,3%) dan yang mengalami hipertensi sebanyak 54 responden (21,7%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan lama penggunaan kontrasepsi hormonal dan kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji statistic *Chi Square*, diperoleh nilai $p=0,000$ ($p<0,05$) dan rasio prevalensinya 2,759 ($RP>1$), maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lama penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi hormonal yang menggunakan kontrasepsi hormonal diatas 3 tahun memiliki peluang 2,759 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding yang menggunakan kurang dari 3 tahun pemakaian.

f. Hubungan Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi

Hubungan Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan kejadian Hipertensi dapat dilihat pada tabel cross tabulasi berikut :

Tabel 4.17
Hubungan Keteraturan Penggunaan kontrasepsi Hormonal
dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016

Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal	Kejadian Hipertensi				Total		<i>p-value</i>	RP
	Ya		Tidak		n	%		
	n	%	n	%				
Teratur	59	43,1	78	56,9	137	100	0,017	1,392
Tidak Teratur	77	30,9	172	69,1	249	100		
Total	136	35,2	250	64,8	386	100		

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara kondisi lingkungan dan kejadian Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yakni dari 386 responden, terdapat 137 responden yang menggunakan kontrasepsi hormonal secara teratur, yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 78 responden (56,9%) dan yang mengalami hipertensi sebanyak 59 responden (43,1%), sedangkan yang menggunakan kontrasepsi hormonal secara tidak teratur sebanyak 249 responden, yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 172 responden (69,1%), dan yang mengalami hipertensi sebanyak 77 responden (30,9%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal dan kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji statistic *Chi Square*, diperoleh nilai $p=0,017$ ($p<0,05$) dan rasio prevalensinya 1,392 ($RP>1$), maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi hormonal yang menggunakan kontrasepsi hormonal secara teratur memiliki peluang 1,392 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding yang menggunakan secara tidak teratur.

C. Pembahasan

1. Hubungan Kelompok Umur dengan Kejadian Hipertensi

Umur merupakan periode terhadap pola-pola kehidupan yang baru semakin bertambahnya umur maka individu akan mencapai usia reproduksi, termasuk diantaranya pertumbuhan dan perkembangan pada umur tertentu akan sangat dan akan sangat berkurang sejalan dengan bertambahnya grafik umur (Suparyanto 2010, dalam sari priyanti jurnal hospital majapahit vol 5 no 2 nopember 2013).

Hasil analisis untuk melihat hubungan kelompok umur dan kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji statistic *Chi Square*, diperoleh nilai $p=0,014$ ($p<0,05$) dan rasio prevalensinya 1,403 (RP>1), maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara umur pengguna kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi hormonal yang memiliki umur diatas 35 tahun memiliki peluang 1,4 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding usia dibawah 35 tahun.

Hal ini disebabkan karena pengguna Kontrasepsi hormonal yang berusia >35 tahun banyak yang menggunakan kontrasepsi hormonal dengan durasi >3 tahun.

Pada penelitian ini yang tidak mengalami Hipertensi lebih banyak ditemukan pada usia di bawah 35 tahun dikarenakan banyak pengguna dengan usia dibawah 35 tahun yang menggunakan kontrasepsi hormonal, berdasarkan tabulasi silang antara umur pengguna KB dan jenis kontrasepsi hormonal yang digunakan diperoleh bahwa pengguna kontrasepsi hormonal yang berusia dibawah 35 tahun sebanyak 239 responden.

Adapun pada penelitian ini diperoleh bahwa hipertensi berisiko tinggi pada umur >35 tahun karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liao (2014) bahwa semakin meningkat umur seorang wanita, maka reseptor estrogen beta (ER- β) dalam tubuh juga akan meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan zeinab issa, dkk (2014) tentang *hormone therapy and blood preassure* dikatakan bahwa wanita yang menggunakan esteriol secara oral maupun injeksi akan meningkatkan tekanan darah sistol dikarenakan tubuh akan memproduksi reseptor estrogen ER- β (*Estrogen Receptor-Beta*) lebih dominan. Ketika estrogen dalam tubuh meningkat tubuh secara otomatis akan memproduksi reseptor estrogen ER- β (*Estrogen Receptor-Beta*) yang lebih dominan untuk memetabolis estrogen dalam tubuh dan estrogen yang termetabolis akan meningkatkan kekentalan darah.

Kedua bentuk reseptor estrogen ini dikode oleh gen yang berbeda, yaitu ESR1 dan ESR2 pada kromosom 6 dan 14 (6q25 dan 14q). Kedua reseptor ini diekspresikan secara luas pada berbagai jaringan, yang berbeda, dengan pola ekspresi yang berbeda pula. Er α ditemukan pada endometrium, sel stroma ovarium, dan di hipotalamus. Er β ditemukan pada ginjal, otak, tulang, jantung, mukosa usus, prostat, dan sel-sel endotel. ER dalam fase unligand merupakan reseptor sitoplasma, namun penelitian menunjukkan adanya fraksi ER yang bergeser ke dalam inti (Levin ER, 2005).

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh lamria pangaribuan (2015) dimana pada penelitian tersebut diperoleh bahwa ada hubungan antara umur pengguna kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi yakni dengan p-value= 0,00 dan RP= 1,73.

Hal ini juga didukung dengan banyaknya pengguna dengan usia 35 tahun ke atas yang masih menggunakan kontrasepsi hormonal. Dalam buku pelayanan

keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi dikatakan bahwa terdapat 3 pola dasar penggunaan kontrasepsi yang rasional yakni, masa mencegah kehamilan (berusia <20 tahun), masa menjarangkan kehamilan (berusia 20-35 tahun), dan Masa mengakhiri kehamilan/kesuburan (berusia >35 tahun) (Suratun,2013). Seharusnya pengguna KB yang telah berusia >35 tahun berganti KB dengan Kontrasepsi yang dianjurkan seperti implan dan AKDR, namun yang ada diperoleh selama penelitian adalah masih adanya wanita yang berusia >35 tahun yang masih menggunakan kontrasepsi seperti: pil kombinasi, suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan.

Banyaknya pengguna yang berusia >35 tahun yang masih menggunakan kontrasepsi seperti pil kombinasi, suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan dikarenakan beberapa wanita beralasan telah merasa cocok dengan kontrasepsi KB yang mereka gunakan sehingga tidak ingin berganti-ganti kontrasepsi, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka takut melakukan pemasangan implan dan AKDR karena terasa sakit menurut tetangga mereka yang sudah pernah menggunakan.

2. Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Hipertensi

Pendidikan merupakan suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih dewasa dan lebih matang dari individu. Kelompok dan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan maka semakin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang atau cenderung rendah akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai baru yang diperkenalkan (Rianti,2012 dalam sari priyanti jurnal hospital majapahit vol 5 no 2 nopember 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa nilai $p=0,152$ ($p>0,05$) dan rasio prevalensinya 0,820 (RP<1), sehingga dapat

diinterpretasikan bahwa Tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan pengguna kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi dan nilai rasio prevalensi menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki responden bukan merupakan faktor risiko kejadian hipertensi pada wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi hormonal.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden yang berpendidikan tinggi pada penelitian ini yakni sebanyak 150 responden menggunakan kontrasepsi hormonal ≤ 3 tahun dan sebanyak 148 responden yang berpendidikan tinggi tidak teratur menggunakan kontrasepsi hormonal dan 151 responden yang berpendidikan tinggi masih berumur ≤ 35 tahun.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh lamria pangaribuan (2015) dimana pada penelitian tersebut diperoleh bahwa ada hubungan antara pendidikan pengguna kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi yakni dengan $p\text{-value} = 0,00$ dan $RP = 1,23$ dan juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hyejin Park (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian hipertensi pada pengguna kontrasepsi oral.

Dalam penelitian ini pendidikan pengguna kontrasepsi hormonal bukan merupakan faktor risiko kejadian hipertensi pada wanita usia subur, karena hal ini mempengaruhi pilihan WUS dalam memilih alat kontrasepsi yang tepat sesuai dengan usia dan kebutuhannya. WUS yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung mengkonsultasikan jenis KB dan keluhan-keluhan yang dirasakan saat menggunakan KB pada Bidan atau tenaga Kesehatan sehingga risiko untuk mengalami hipertensi menjadi berkurang, sedangkan pada WUS yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah lebih cenderung memilih alat

kontrasepsi berdasarkan pengalaman dari tetangga atau keluarga yang menggunakan KB yang sama.

3. Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Hipertensi

Bekerja adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam yang secara kontinu dalam seminggu yang lalu (seminggu sebelum pencacahan). Dengan demikian, pekerjaan keluarga yang tanpa upah yang membantu dalam satu usaha/kegiatan ekonomi, dimaksudkan sebagai pekerja (BPS.1976).

Pekerjaan merupakan pencarian barang yang terjadi untuk sesuatu pokok penghidupan yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah (BKKBN, 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki profesi sebagai IRT (ibu rumah Tangga) yakni sebanyak 351 orang (90,9%).

Berdasarkan hasil bivariat yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh bahwa secara statistik nilai $p=0,293$ ($p>0,05$) dan rasio prevalensinya 1,407 ($RP>1$), sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara statistik Tidak ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan pengguna kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden yang tidak bekerja pada penelitian ini yakni sebanyak 230 responden menggunakan kontrasepsi hormonal ≤ 3 tahun dan sebanyak 217 responden masih berumur ≤ 35 tahun.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Septya S. Kaunang, dkk (2014) yang menyatakan bahwa secara statistik pekerjaan pengguna kontrasepsi hormonal tidak memiliki pengaruh terhadap kejadian hipertensi.

Akan Tetapi, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lamria Pangaribuan (2015) dimana pada penelitian tersebut diperoleh bahwa secara

statistik ada hubungan antara status pekerjaan pengguna kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi yakni dengan $p\text{-value} = 0,00$ dan diperoleh bahwa $RP = 1,12$ ($RP > 1$). Namun ketika dilakukan uji multivariat terhadap variabel independen (kontrasepsi pil, umur akseptor, pendidikan, status pekerjaan, konsumsi makanan Asin, aktivitas fisik, IMT, dan tempat tinggal). Variabel independen yang terdiri dari status pekerjaan, pendidikan, konsumsi makanan asin, aktivitas fisik, dan tempat tinggal menghilang dari model akhir multivariat hingga yang tersisa hanyalah variabel kontrasepsi pil, umur, dan IMT.

Dalam penelitian ini nilai $RP = 1,407$, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ada tidaknya pekerjaan yang dimiliki responden menjadi faktor risiko kejadian hipertensi pada wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Hal ini bisa saja disebabkan oleh pengaruh stress kerja yang dirasakan oleh pengguna kontrasepsi hormonal sehingga yang bekerja 1,407 kali lebih berisiko dibanding yang memiliki pekerjaan.

4. Hubungan Jenis Alat Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi

Hormon (dari bahasa Yunani, *hormon* berarti “merangsang”) adalah sinyal kimiawi yang disekresikan ke dalam cairan tubuh paling sering ke dalam darah, dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bersifat mengatur di dalam tubuh, tetapi jenis-jenis sel tertentu saja, yaitu sel-sel target yang memiliki kemampuan untuk memberikan respon terhadap sinyal tersebut. Dengan demikian, hormon tertentu yang bersirkulasi dalam aliran darah akan menimbulkan respon spesifik-suatu perubahan dalam metabolisme misalnya dari sel-sel target terseleksi, sementara jenis sel-sel lain akan mengabaikan hormon tersebut (Campbell, 2004).

Kontrasepsi hormonal pada umumnya mengandung 2 hormon sintesis yakni estradiol dan progestin. Berdasarkan jenis kandungan hormon sintesis yang

dikandung, kontrasepsi hormonal ada yang hanya mengandung progestin seperti suntik 3 bulan (*Depo Medroxyprogesterone Acetat*), mini pil, implan (*Levonogestrel*) dan ada pula kontrasepsi hormonal yang merupakan kombinasi dua hormon sintesis (Estradiol dan progestin) yakni pil kombinasi dan suntik 1 bulan.

Dalam jurnalnya Deborah Morkowitz (2006) menyebutkan bahwa jenis estrogen *nonbioidentical* terdiri dari *Ethinyl Estradiol*, *Esterified Estrogens*, *Conjugated Equine Estrogens (CEE)* dan *Dienestrol*, sedangkan jenis Progesteron *nonbioidentical* terdiri dari *Medroxyprogesterone Acetat*, *Norethindrone Acetat*, *Norethindrone*, *Norgestrel*, *Norgestimate*, *Levo-Norgestrel*, *Desogestrel*, dan *Megestrol Acetate*. Adapun jenis estrogen dan progesteron sintesis ini juga memiliki nama lainnya tergantung dari pihak farmasi.

Pada Penelitian ini peneliti memperoleh hasil bahwa nilai $p=0,174$ ($p>0,05$) dan rasio prevalensinya 1,244 ($RP>1$), maka dapat diinterpretasikan bahwa Tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kontrasepsi hormonal terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Kassi-Kassi akan tetapi, nilai rasio prevalens yang diperoleh lebih dari satu sehingga walaupun tidak bermakna secara statistik namun bermakna berdasarkan perhitungan prevalens dengan kekuatan yang sangat lemah sebagai faktor risiko

Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden yang menggunakan kontrasepsi hormonal pada penelitian ini yakni sebanyak 249 responden menggunakan kontrasepsi hormonal ≤ 3 tahun, sebanyak 249 responden yang tidak menggunakan kontrasepsi hormonal secara teratur, dan sebanyak 239 responden masih berumur ≤ 35 tahun.

Hasil Penelitian ini didukung dengan penelitian Dewi Nafisah (2014) yang berjudul faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada akseptor pil

KB di kelurahan sumber sari kabupaten Jember yang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis pil KB dengan kejadian hipertensi dan dalam penelitian yang lain juga dilakukan oleh Efi Sriwahyuni (2012), dimana Efi Sriwahyuni meneliti jenis kontrasepsi hormonal namun dengan variabel dependen yang berbeda yakni peningkatan berat badan dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kontrasepsi hormonal dengan peningkatan Berat badan.

Dalam penelitian yang lain yang dilakukan pada berbagai jenis kontrasepsi hormonal baik jenis kontrasepsi oral, maupun jenis kontrasepsi suntik telah dilakukan dan kedua jenis alat kontrasepsi ini sama-sama dapat meningkatkan tekanan darah seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hyejin Park (2013) mengenai *association between oral contraceptive use and risk of hypertension and prehypertension in a cross sectional study of korean women* diperoleh hasil bahwa secara statistik terdapat hubungan antara kontrasepsi oral dan hipertensi pada wanita korea dengan $p < 0,001$ dan memiliki nilai OR= 1,96.

Penelitian Viola Belivia Tripuspita (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan kontrasepsi Depovera (suntik 3 bulan) terhadap angka kejadian hipertensi di Puskesmas Ngoresan Surakarta dengan nilai $p = 0,009$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik itu jenis kontrasepsi yang mengandung kombinasi hormon sintesis estrodiol dan progestin maupun hanya mengandung hormon sintesis progestin. Hal ini dapat mempengaruhi kejadian hipertensi tidak melihat dari jenis kandungan kontrasepsi hormonal yang digunakan oleh akseptor KB hormonal.

Dan juga berdasarkan data yang tersedia menyatakan adanya korelasi antara dosis estrogen dengan progestin terhadap tekanan darah. Data terbaru menyatakan kontrasepsi oral dosis rendah estrogen dapat meningkatkan risiko

terjadi hipertensi dan risiko tersebut meningkat seiring dengan lama penggunaan dan dengan peningkatan potensi progestin (E. Sanif, 2014. Dalam jurnal Lamria Pangaribuan, 2015).

5. Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi

Definisi Lama penggunaan kontrasepsi hormonal dalam penelitian ini adalah waktu, durasi, atau lama penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang dipakai pengguna kontrasepsi hormonal.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka $p < 0,05$ ($p = 0,000$) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka waktu yang lama dapat memicu meningkatnya tekanan darah. Dalam penelitian ini tekanan darah yang paling banyak meningkat adalah tekanan darah sistol yakni sebanyak 136 responden.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lamria Pangaribuan (2015) Bahwa kenaikan tekanan darah yang tinggi adalah tekanan darah sistol yang berkorelasi langsung dengan bertambahnya umur dan peningkatan indeks massa tubuh.

Dalam penelitian yang dilakukan Zeinab Issa (2014) tentang *hormone therapy and blood preassure* dikatakan bahwa wanita yang menggunakan esteriol secara oral maupun injeksi akan meningkatkan tekanan darah sistol dikarenakan tubuh akan memproduksi reseptor estrogen ER- β (*Estrogen Receptor-Beta*) lebih dominan. Ketika estrogen dalam tubuh meningkat tubuh secara otomatis akan memproduksi reseptor estrogen ER- β (*Estrogen Receptor-Beta*) yang lebih dominan untuk memetabolis estrogen dalam tubuh dan estrogen yang termetabolis akan meningkatkan kekentalan darah.

Hipertensi atau tekanan darah $>140/90$ mmHg dijumpai pada 2-4% wanita pemakai kontrasepsi pil, terutama mengandung etilestradiol, keadaan ini erat kaitannya dengan usia wanita dan lama penggunaan, kejadian hipertensi meningkat sampai 2-3 kali lipat setelah 4 tahun penggunaan pil kontrasepsi yang mengandung estrogen (Baziad, 2008).

Dalam literatur lainnya juga disebutkan bahwa kontrasepsi pil dapat meningkatkan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah pada pengguna kontrasepsi pil dihubungkan dengan hipertropi jantung dan peningkatan respon presor angiotensin II dengan melibatkan jalur *Renin Angiotensin System* (Olatunji, 2008).

Hasil ini juga didukung dengan Penelitian Indah Putri Lestari (2013) yang berjudul hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi dan berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara lama penggunaan metode kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi di RW 02 Kelurahan Ngaliyan Semarang $p=0,034$ dan ibu yang lama menggunakan metode kontrasepsi hormonal 2,954 kali berisiko terkena hipertensii dibanding kan dengan ibu yang tidak lama menggunakan kontrasepsi hormonal (OR=2,954).

Teori menyebutkan metode kontrasepsi hormonal dapat mempengaruhi tekanan darah baik estrogen maupun progesteron. Estrogen merupakan salah satu hormon yang dapat meningkatkan retensi elektrolit dalam ginjal sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi natrium dan air yang menyebabkan hipervolemi kemudian curah jantung meningkat dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah Sedangkan, Progesteron dapat merendahkan kadar HDL-kolesterol serta meninggikan kadar LDL-Kolesterol sehingga terjadi aterosklerosis Kadar LDL-kolesterol tinggi dalam darah yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh

darah dan retensi perifer pembuluh darah kemudian mengakibatkan peningkatan tekanan darah (Hartanto, 2010).

Peningkatan kadar LDL-kolesterol dan penurunan kadar HDL- Kolesterol ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emokpae (2010), yang memperoleh hasil bahwa lama durasi penggunaan kontrasepsi oral berhubungan dengan total lemak dan lipoprotein pada wanita di Nigeria. Pada penelitian Amokpae menampakkan perbandingan LDL-kolesterol dan HDL-Kolesterol berdasarkan urutan tahun lama pemakaian dan semakin lama wanita menggunakan kontrasepsi Oral maka kadar LDL-kolesterol dalam darah akan meningkat ditahun ke-3 dan ke-4 pemakaian sebaliknya HDL-Kolesterol mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Edi Cahyono (2013), yang meneliti hubungan kejadian hipertensi, kenaikan berat badan, dan perubahan pola menstruasi dengan lama penggunaan kontrasepsi suntik depo medroxi progesteron asetat (DMPA) pada perempuan usia subur desa betek kecamatan jati kabupaten Blora dan memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama penggunaan kontrasepsi suntik Depo Medroksi progesteron asetat (DMPA) pada perempuan Usia subur dengan nilai p-value = 0,000.

Penelitian Dewi Nafisah (2014) yang berjudul faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada akseptor pil KB di kelurahan sumber sari kabupaten Jember yang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara lama penggunaan pil KB dengan kejadian hipertensi.

6. Hubungan Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi

Untuk memperhatikan sejauh mana keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal pada Akseptor, di setiap tempat pelayanan KB disediakan Kartu kontrol KB (foto terlampir). Kartu kontrol KB diberikan kepada akseptor dan kartu kontrol di bawah kembali ketika ingin melakukan kunjungan dan mendapatkan pelayanan KB di puskesmas. Kartu kontrol KB diberikan, untuk mencatat tanggal berkunjung, tanggal kembali melakukan pelayanan, hasil pemeriksaan tekanan darah dan pengukuran berat badan saat berkunjung.

Keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal adalah variabel baru yang ditambahkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan pemeriksaan kartu kontrol pengguna KB dan diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi dengan nilai $p=0,017$ ($P<0,05$) dan wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi hormonal secara teratur lebih berisiko mengalami hipertensi dengan $RP= 1,392$.

Dalam penelitian ini, pengguna yang mengalami hipertensi sebanyak 136 responden dan terdapat 59 responden (43,1%) yang menggunakan kontrasepsi hormonal secara teratur dan 77 responden (30,9%) yang tidak teratur menggunakan kontrasepsi hormonal.

Pada literatur Ali Baziad (2008) dikatakan bahwa semua jenis kontrasepsi hormonal merupakan kontraindikasi yang dimana setelah penghentian kontrasepsi pil, biasanya tekanan darah akan normal kembali, tetapi bila hal ini tidak terjadi perlu diberi obat antihipertensinya, dengan kata lain WUS yang menggunakan kontrasepsi secara teratur tanpa berhenti akan meningkat tekanan darahnya dan ketika tidak teratur atau berhenti pemakaian kontrasepsi hormonal akan membuat tekanan darahnya normal kembali, akan tetapi ada juga yang tidak teratur

menggunakan kontrasepsi hormonal dan tetap mengalami hipertensi sehingga perlu diberi obat antihipertensi.

Pada beberapa responden yang diwawancarai, mengungkapkan alasan bahwasanya mereka tidak teratur menggunakan kontrasepsi karena lupa dengan jadwal kunjungan, sedang mengadakan perjalanan keluar kota, suami yang jarang pulang ke rumah karena merantau ke daerah lain, ataupun hanya menggunakan kontrasepsi saat akan melakukan hubungan intim dengan suami, tapi dari 249 responden yang menggunakan kontrasepsi secara tidak teratur, rata-rata menjawab karena lupa. Namun pada pengguna yang menggunakan secara teratur mengungkapkan bahwa mereka teratur menggunakan karena tidak ingin punya anak lagi dan tidak ingin hamil lagi.

Keteraturan penggunaan kontrasepsi sebelumnya pernah diteliti oleh Keki Debby Kufitasari (2014) namun hanya melihat keteraturan penggunaan kontrasepsi Oral dengan Perubahan siklus menstruasi di Kabupaten Mojokerto dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar yang mengkonsumsi kontrasepsi oral secara teratur mengalami perubahan siklus menstruasi. Hasil Chi-Square yang didapatkan $p\text{-value} = 0,001$ dimana nilai $P < 0,05$, sehingga H_1 diterima, berarti ada hubungan keteraturan penggunaan kontrasepsi oral dengan perubahan siklus menstruasi.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya melihat hubungan kontrasepsi hormonal secara umum dan menyeluruh terhadap kejadian hipertensi tanpa melihat pengaruh kejadian hipertensi dari segi perbandingan antara ketiga jenis alat kontrasepsi hormonal yakni pil, suntik, dan implan.

2. Peneliti hanya meneliti hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi saja tanpa memperhatikan adanya faktor resiko lain yang mempengaruhi kejadian hipertensi seperti stress, perilaku merokok, riwayat keluarga, IMT, konsumsi garam, komplikasi penyakit ginjal dan faktor resiko lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada Hubungan antara Umur Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
2. Tidak Ada hubungan antara Pendidikan Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
3. Tidak Ada Hubungan antara Pekerjaan Pengguna Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
4. Tidak Ada Hubungan antara Jenis Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi- Kassi Kota Makassar.
5. Ada Hubungan antara Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
6. Ada Hubungan antara Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

B. Saran

1. Bagi petugas kesehatan/bidan/perawat
 - a. Lebih meningkatkan penyuluhan dan konsultasi pada akseptor pengguna KB khususnya pada pengguna KB yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang mengenai kontrasepsi yang tepat.
 - b. Untuk lebih memperhatikan peningkatan tekanan darah yang terjadi pada akseptor KB yang telah lama menggunakan kontrasepsi hormonal dan hendaknya menyarankan kepada akseptor KB untuk menghentikan pemakaian kontrasepsi hormonal apabila dijumpai peningkatan tekanan darah pada akseptor utamanya, pada akseptor yang memiliki durasi penggunaan kontrasepsi hormonal yang lama atau lebih dari 3 tahun dan menyarankan untuk beralih ke metode kontrasepsi yang lain selain hormonal.
 - c. Sebaiknya petugas kesehatan atau Bidan menyarankan dan mengenalkan kontrasepsi nonhormonal kepada akseptor untuk menurunkan angka kejadian peningkatan tekanan darah dan memberikan penyuluhan mengenai kontrasepsi hormonal dan efek sampingnya.
2. Bagi pengguna/aksptor kontrasepsi hormonal
 - a. Hendaknya memilih kontrasepsi hormonal yang sesuai dengan kondisinya saat itu, yakni jika memiliki anak yang menyusui atau dalam masa nifas sebaiknya menggunakan kontrasepsi MAL (Metode Amenore Laktasi) dan tidak menggunakan alat kontrasepsi yang dapat menghambat pengeluaran ASI.
 - b. Untuk wanita usia subur yang tidak menyusui sebaiknya menggunakan Alat kontrasepsi setelah melakukan pemeriksaan

- berupa tes alergi, tidak sedang hamil, pemeriksaan Tekanan darah dan pemeriksaan fisik lainnya yang dapat mempengaruhi selama penggunaan kontrasepsi hormonal
- c. Untuk wanita usia subur yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dan berusia diatas 40 tahun disarankan untuk sebaiknya menggunakan kontrasepsi nonhormonal seperti IUD/spiral.
 - d. Bagi pengguna/Akseptor KB sebaiknya melakukan konsultasi lebih sering terhadap efek samping yang dialaminya sehingga bidan atau petugas kesehatan dapat memberikan informasi dan pelayanan kontrasepsi yang tepat bagi pengguna KB.
3. Agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini dan dilakukan lebih spesifik pada masing-masing jenis kontrasepsi hormonal untuk melihat perbandingan peningkatan tekanan darah pada tiap-tiap jenis kontrasepsi hormonal dan juga ikut memperhatikan variabel lain yang merupakan faktor risiko hipertensi lainnya seperti riwayat hipertensi keluarga, hiperkolesterolemia, kebiasaan minum kopi, konsumsi serat, konsumsi makanan asin, IMT, stres dan kebiasaan berolahraga.

DAFTAR PUSTAKA

- AAAS. *High blood Pressure; The Science Inside*. Washington DC, 2004.
- Aarosan, Philip I dan Jeremy P.T. *At a Glance Edisi Ketiga; Sistem Kardiovaskular*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Abdullah, Sayyid Abdul Hakim. *Resep Hidup Sehat Cara Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Solo : Kiswah, 2011.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari* Jilid XI. Kairo: Musthafa al-Babil Halabi, 1959.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al Imam Al Hafizh (Penerjemah; Ghazirah Abdi Ummah). *Faatul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*. Surabaya: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Bayan (Tim Penyusun). *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung : Jabal, 2008.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ali, Zaidin. *Agama, Kesehatan dan Keperawatan*. Jakarta:TIM, 2010.
- Apriani, Ni Luh Ade. Dkk. *Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Pil dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Wilayah Kerja UPT. Kesmas Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 2014*. Jurnal STIKes Wira Medika PPNI Bali, 2014.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Asiah, dkk. *Faktor Determinan Mulainya Usia Menopause. Pada Pengguna Kontrasepsi Oral dan Dampaknya terhadap Hipertensi di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013*. Jurnal FKM Universitas Hasanuddin, 2013.
- Baziad, Ali. *Kontrasepsi Hormonal*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008.
- BKKBN. *Umpan Balik Laporan Pencapaian Program KB Nasional Provinsi Sulawesi Selatan*. <http://www.bkkbn.go.id>, 2011.
- Budiman. *Penelitian Kesehatan*. Bandung: Refika Pratama, 2011.
- Bustan, M.N. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Cahyono, Edy, dkk. *Hubungan Kejadian Hipertensi, Kenaikan Berat Badan, Perubahan Pola Menstruasi dengan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) pada Perempuan Usia Subur di Desa Betek, Kecamatan Jati Kabupaten Blora*, 2013.

- Campbell, Neil A, dkk. *Biologi Edisi Kelima –Jilid 3*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, dkk. *Seventh Report of The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension*;42(6):1206–1252, 2003.
- Dahlan, Sopiudin. *Seri 1 Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Epidemiologi Indonesia, 2014.
- Dahlan, Sopiudin. *Seri 2 Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Dahlan, Sopiudin. *Seri 3 Langkah-Langkah Membuat Proposal Penelitian Bidang Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Sagung Seto, 2014.
- Dahlan, Sopiudin. *Seri 8 Penelitian Prognostik dan Sistem Skoring: disertai Praktik dengan Program Stata dan Spss*. Sumedang: Alqaprint Jatinagor, 2011.
- Dahlan, Sopiudin. *Seri 13 Metode MSD(Multiaksial Sopiudin Dahlan)*. Jakarta: Sagung Seto, 2014.
- Dahlan, Sopiudin. *Seri 14 Epidemiologi Seni Melacak Sebab Akibat*. Jakarta: Sagung Seto, 2014.
- Dahlan, Sopiudin. *Seri 19 Menelaah Validitas Penelitian Observasional*. Jakarta: Sagung Seto, 2014.
- Dai, Athian Ali Moh, *Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013*. Jakarta: Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Republik Indonesia, 2013.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Penemuan dan Tatalaksana Penyakit Hipertensi*. Jakarta: Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Direktorat Jenderal PP & PL Depkes RI, 2006.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Panduan Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2007-2011*. Jakarta: Pusat Data Dan Informasi Departemen Kesehatan, Republik Indonesia, 2009.
- Davey, Patrick. *At a Glance Medicine*. Jakarta:Penerbit Erlangga, 2005.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: penerbit Diponegoro, 2012.
- Departemen Ilmu penyakit Dalam FKUI. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: pusat penerbitan departemen ilmu penyakit dalam, 2007.
- Dorland, W.A Newman. *Kamus Kedokteran Dorland*. Jakarta: EGC, 2010.

- Ekawati, Desi. *Pengaruh KB Suntik DMPA terhadap Peningkatan Berat Badan di BPS Siti Syamsiah Wonokarto Wonogiri*. Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Emokpae, dkk. *Effect of Duration of Use of Hormonal Contraceptive Pills on Total Lipid and Lipoproteins in Nigerian Women*. International Journal of Pharma and Bio Sciences Vol.1/issue-3/jul-sep, 2010.
- Everett, Suzanne. *Buku Saku Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi*. Jakarta: EGC, 2007.
- Flack, John M, dkk. *Manajemen of High Blood Pressure in Blacks: An Update Of the International Society on Hypertension In Black consensus Statement*. Journal of American Heart Association, 2010
- Handayani, Gemy Nastity. *Kontrasepsi Dalam Kajian Islam*. Artikel/jurnal Al-Fikr volume 17. Nomor 1 Tahun 2013. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Handayani, Gemy Nastity. *Farmakologi Toksikologi "Hipertensi"*. Makassar: UINAM press, 2013.
- Handayani, Sri. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010.
- Harini, ririn. *Perbedaan Pengaruh Pemakaian Kontrasepsi Suntik (Cyclofem dan Depo Progestin) terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Pakisaji Malang*, 2010.
- Hartanto, Hanafi. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Hartanto, Hanafi. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Hidayat, A.Aziz Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2007.
- Hidayat, A.Aziz Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Hidayat, A.Aziz Alimul. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- IBI,dkk. *Buku panduan Praktis Pelayan Kontrasepsi*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2010.
- Imron, Moch. *Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan*. Jakarta: CV Sagung Seto, 2014.
- Issa, Zeinab, dkk. "Review Article: Effect Of Hormone Therapy on Blood Pressure". The Journal Of The North American Menopause Society, 2014.

- Kaharuddin, Andi tihardimanto. *Sistem Reproduksi Wanita Fisiologi dan Integrasinya Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*. Makassar: UINAM press, 2012.
- Kasjono, Heru Subaris dan Yusril. *Teknik Sampling untuk Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009.
- Kaunang, Septya S.dkk. *Hubungan antara Penggunaan Kontrasepsi Pil dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Bahu, Kota Manado*. Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, 2014.
- Kawulur, Liani, dkk. *Gambaran Penggunaan Pil KB pada Wanita Usia Subur dengan Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Tanawangko Kecamatan Tombariri*. e-journal keperawatan Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- KEMENKES RI. *Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang Hipertensi*. Jakarta: Pusat data KEMENKES RI, 2014.
- Kufitasari, Keki Debbi. *Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Oral dengan Perubahan Siklus Menstruasi di Polindes Tampung Rejo Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto*, 2014.
- Lestari, Indah Putri, dkk. *Hubungan Antara Lama Penggunaan Metode Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi*. Semarang: Keperawatan Stikes Telogorejo, 2013.
- Levin ER. *Integration of The Extranuclear and Nuclear Actions of Estrogen*. Mol. Endocrinol. 19(8):p1951-9, 2005.
- Liao, X.H., Lu, D.L., Wang, N., dkk. *Estrogen Receptor α Mediates Proliferation of Breast Cancer MCF-7 Cells via a p21/PCNA/E2F1-dependent Pathway*. The FEBS Journal, 281 (2014), 927-942, 2014.
- Maloko, Thahir. *Ar-Radha'ah sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*. Makassar: UINAM press, 2013.
- Martuti. A. *Hipertensi: Merawat dan Menyembuhkan Penyakit Tekanan Darah Tinggi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2009.
- Mancia, Giuseppe, dkk. *ESH/ESC Guidelines for Management of Arterial Hypertension*. Journal Of Hypertension, 2013.
- Mardapi, Djemari. *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2008.
- Masi, Cristopher M, dkk. *Estrogen Metabolic and Systolic Blood Pressure Population-Based Sample of Postmenopausal Women*. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91 (3). USA, 2006.

- Morkowitz, Deborah. "A Comprehensive Review of The Safety and Efficacy of Bioidentical Hormones for the Management of Menopause and Related Health Risks". *Alternative Medicine Review* volume 11, number 3, 2006.
- Muhyiddin, "Fatwa MUI tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)". *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 24, Nomor 1, 2014.
- Nafisah, Dewi. *Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Akseptor Pil KB di Kelurahan Sumber Sari Kabupaten Jember*. Jember: Departemen Epidemiologi, Biostatistik dan Kependudukan FKM Universitas Jember, 2014.
- Nappi Rossella E, dkk. *Hormonal Contraception in Women with Migrane: is Progesteron-Only Contraception a Better choice*. *The journal of Headache and Pain*, 2013.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Olatunji dan A O Soladoye. *Oral contraceptive-Induced High Blood Pressure is Prevented by Renin-Angiotensin Suppression in Female Rats but not by Sympathetic Nervous System Blockade*. *Department of Physiology. College of Health Sciences. University of Ilorin*. *Indian Journal of Experimental Biology* 46 november 2008, pp 749-754. Nigeria, 2008.
- Palmer, Anna dan Bryan Williams. *Simple Guide Tekanan Darah Tinggi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Pangaribuan, Lamria dan Dina Bisara lolong. *Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Pil dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia 15-49 tahun di Indonesia Tahun 2013 (Analisis Data Riskesdas 2013)*. *Jurnal Media Litbangkes* vol.25. No.2, Juni 2015 Kemenkes RI Jakarta Pusat, 2015.
- Park, Hyejin dan Kisok Kim. *Association Between Oral Contraceptive Use and Risks of Hypertension and Prehypertension in a Cross Sectional Study of Korean Woman*. *Journal BMC women's Health*, 2013.
- Pendit, Brahm U. *Ragam Metode Kontrasepsi*. Jakarta: EGC, 2006.
- Pharm D, Kayce Bell. *Hypertension: The Silent Killer: Updated JNC-8 GuideLine recommendation*, 2015.
- Pitoyo. Agus Joko dan Pande Made Kutanegara. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: UGM, 2010.
- Platt, Michael E. *The Miracle of Bio-Identical Hormones* penerjemah Dwi Prabantini. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

- Priyanti, Sari. *Konsumsi Pil KB di Polindes Desa Kembang Sari Kecamatan Jati Banteng Situbondo*. Jurnal Hospital Majapahit Vol 5. No. 2 Nopember, 2013.
- Pudiasuti, Ratna Dewi. *Penyakit-Penyakit Mematikan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Purwoastuti, Endang dan Elisabeth Siwi Walyani. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2003.
- Ridwan, Muhammad. *Mengenal, Mencegah, Mengatasi Silent Killer "HIPERTENSI"*. Semarang: Pustaka Widyamara, 2009.
- Runiari, Nengah, dkk. *Hubungan Lama pemakaian Kontrasepsi Suntikan progestin (Depoprovera) dengan tekanan darah pada akseptor KB di Puskesmas II Denpasar Selatan*, 2012.
- R, Sabatini, dkk. *Adverse effect of Hormonal Contraception*. Journal fur Reproduktionsmedizin und Endokrinologie (Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology), 2011.
- Santoso, Djoko. *Membonsai Hipertensi*. Surabaya: Jaring Pena, 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan Prosedur SPSS)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Sastroasmoro, Sudigdo dan Sofyan Ismael. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis* Edisi ke-4. Jakarta: Sagung Seto, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Volume 1). Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Volume 7). Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Volume 10). Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Volume 12). Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soernarta, Ariessa Ann, dkk. *Pedoman Tatalaksana Hipertensi Pada Kardiovaskular*. Jakarta: PERKI, 2015.
- Sriwahyuni, Efi dan Chaterina Umbul Wahyuni. *Hubungan Antara Jenis dan Lama Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal dengan Peningkatan Berat Badan akseptor*. Surabaya: Departemen Epidemiologi FKM Universitas Airlangga. *The Indonesian Journal Of Public Health*. Vol 8. No.3, 2012.
- Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.

- Sunyoto, Danang. *Validitas dan Reliabilitas*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Suratun,dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Syuaib, Miswani Mukani. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Makassar: UINAM press, 2011.
- Thalbah, Hisham, dkk. *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis (Jilid 2)*. Bekasi: Sapta Sentosa, 2009.
- Thalbah, Hisham, dkk. *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis (Jilid 8)*. Bekasi: Sapta Sentosa, 2009.
- Tiro, Muhammad Arif. *Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Andira Publisher, 2009.
- Tripuspita, Viola Belivia. *Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Depo-Provera terhadap Kejadian Hipertensi di Puskesmas Ngoresan Surakarta*. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2013.
- UINAM. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Uliyah, Mar'atul. *Awas KB! Panduan Aman dan Sehat Memilih Alat KB*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2010.
- Ulum, Khoizanul. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. AKADEMIKA volume 8 nomor 2, 2014.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Welling, Lisa L. *Psychobehavioural Effect of Hormonal Contraceptive Use*. Psychology department. Oakland University, Rochester. Michigan. USA, 2013.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits (Jilid 5-6)*. Jakarta; Widya Cahaya, 2009.

Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP
KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI
PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2016

Oleh :
NURMAGHFIRAWATI AS

Saya adalah mahasiswa Program sarjana (S-1) UIN Alauddin Makassar dengan Peminatan Epidemiologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal yang digunakan oleh wanita usia subur terhadap kejadian hipertensi di puskesmas kassi-kassi.

Saya mengharapkan kesediaan ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kami akan menjamin kerahasiaan identitas ibu. Informasi yang ibu berikan hanya akan digunakan untuk penelitian ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain.

Partisipasi ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga ibu bebas untuk ikut menjadi responden penelitian atau menolak tanpa sanksi apapun. Terima kasih atas partisipasi ibu dalam penelitian ini.

Jika ibu bersedia menjadi peserta penelitian ini, maka silahkan menandatangani formulir persetujuan ini.

Nama :
Alamat :
Nomor Handphone :
No. Responden :
Tanda Tangan :

**KUESIONER DAN LEMBAR OBSERVASI
HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL
TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA USIA
SUBUR (WUS) DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2016**

No. Responden :
Tanggal Wawancara :
Nama :
Alamat :

A. Karakteristik Responden

1. Umur Responden :..... Tahun
2. Jumlah Anak :..... orang
3. Lama penggunaan alat kontrasepsi saat ini :..... bulan/tahun
4. Pekerjaan Responden:
 - a. Tidak bekerja
 - b. IRT
 - c. Petani
 - d. Wiraswasta
 - e. Buruh
 - f. PNS
 - g. Lainnya,.....
5. Pendidikan Terakhir:
 - a. Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD
 - b. Tamat SD/ sederajat
 - c. Tamat SMP/ sederajat
 - d. Tamat SMA/ sederajat
 - e. Tamat Akademi/ diploma
 - f. Sarjana
6. Jenis Kontrasepsi Hormonal Apa yang anda gunakan saat ini?
 - a. Pil
 - b. Suntik
 - c. Implan/ susuk
7. Pernahkah anda menggunakan alat kontrasepsi yang lain, selain alat kontrasepsi yang anda gunakan saat ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Jika ya, alat kontrasepsi apa yang pernah anda gunakan?
 - a. Pil
 - b. Suntik
 - c. Implan
 - d. IUD
 - e. MOP
 - f. MOW
 - g. Kondom
 - h. Lainnya,....

B. Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda pernah lupa (mengambil pil KB/melakukan suntik KB/mengganti Implan) di puskesmas?		
2	Apakah anda pernah terlambat menggunakan alat kontrasepsi yang anda gunakan saat ini?		
3	Pernahkah anda berhenti beberapa saat menggunakan alat kontrasepsi saat ini?		
4	Apakah anda Pernah Konsultasi mengenai alat kontrasepsi yang anda gunakan saat ini?		
5	Apakah anda menggunakan alat kontrasepsi hormonal sesuai dengan aturan atau petunjuk tenaga kesehatan di Puskesmas?		
6	Apakah anda menggunakan alat kontrasepsi hormonal Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Tenaga Kesehatan/Bidan di Puskesmas?		
7	Apakah anda memiliki keluhan atau pernah merasakan efek samping selama penggunaan alat kontrasepsi yang anda gunakan saat ini? Jika ya, sebutkan.... (boleh lebih dari satu) a. Muntah b. Nyeri Perut c. Migraen d. Nyeri Payudara e. Sakit Kepala f. Pendarahan g. Penglihatan kabur h. Jantung berdebar-debar i. Pusing j. Gangguan siklus haid (haid tidak teratur)		
8	Apakah anda terganggu dengan keluhan yang anda rasakan?		
9	Apakah anda melakukan pemeriksaan diri ke tenaga kesehatan di Puskesmas terhadap keluhan yang anda rasakan?		

C. Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah

Pengukuran 1		Pengukuran 2		Rata-Rata Hasil pengukuran
Sistole	Diastole	Sistole	Diastole	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 Ruang KB dan KIA



Gambar 2 Kartu Peserta KB



Gambar 3 Pengukuran Tekanan Darah



Gambar 4 Wawancara dengan Responden KB



Gambar 5 Wawancara dengan Responden KB



Gambar 6 Responden yang Melakukan Kontrol Pemasangan dan Pencabutan Implan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 7 Konsultasi dan Penyuluhan KB kepada Responden oleh Bidan



Gambar 8 Pemberian Suntik KB oleh Bidan



Gambar 9 Pemberian Suntik KB



Gambar 10 Mengukur Tekanan Darah Responden KB



Gambar 11 Penandatanganan *Informed Consent* oleh responden KB



Gambar 12 Wawancara dengan Responden KB

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 13 Kunjungan pasien KB suntik dan Implan



Gambar 14 Persiapan untuk pemasangan implan



Gambar 15 Pemasangan Implan oleh Bidan



Gambar 16 Memasukkan batang implan



Gambar 17 Pemasangan Implan oleh Bidan



Gambar 18 Pencatatan kartu kunjungan pasien pengguna pil KB

Lampiran 4

PENILAIAN SKORING KETERATURAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL

Variabel Keteraturan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal

Keteraturan penggunaan alat kontrasepsi dihitung berdasarkan perhitungan interval, untuk pertanyaan yang bersifat *favorable* jawaban Ya diberi skor 1, dan jawaban tidak diberi skor 0. Begitupun sebaliknya untuk pertanyaan yang bersifat *unfavorable*. Cara penilaian dengan menjumlahkan keseluruhan nilai menjadi total skor dan diinterpretasikan dalam persen (Mardapi, 2008).

- a. Jumlah pertanyaan = 9
- b. Skor tertinggi = Jumlah pertanyaan × Skor jawaban tertinggi
= 9 × 1
= 9 (100%)
- c. Skor terendah = Jumlah pertanyaan × Skor jawaban terendah
= 9 × 0
= 0 (0%)
- d. Range (R) = Nilai skor tertinggi – nilai skor terendah
= 9 – 0
= 9
- e. Kategori (K) = 2
- f. Interval = $1 + \frac{\text{Range (R)}}{\text{Kategori (K)}} \times 100\%$
= $1 + \frac{9}{2} \times 100\%$
= $5,5 \times 100\%$
= 55%

Maka, kriteria objektifnya adalah:

Teratur = jika persentasi skor jawaban responden >55%

Tidak Teratur = jika persentasi skor jawaban responden ≤55%

OUTPUT HASIL SPSS

HASIL UNIVARIAT

kelompok umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 15-19 Tahun	4	1,0	1,0	1,0
20-24 tahun	35	9,1	9,1	10,1
25-29 tahun	79	20,5	20,5	30,6
30-34 tahun	96	24,9	24,9	55,4
34-39 tahun	101	26,2	26,2	81,6
40-44 tahun	49	12,7	12,7	94,3
45-49 tahun	22	5,7	5,7	100,0
Total	386	100,0	100,0	

pendidikan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak sekolah/tidak tamat SD	20	5,2	5,2	5,2
tamat SD/ sederajat	43	11,1	11,1	16,3
tamat SMP/ sederajat	97	25,1	25,1	41,5
tamat SMA/ sederajat	194	50,3	50,3	91,7
tamat Akademi/ diploma	4	1,0	1,0	92,7
sarjana	28	7,3	7,3	100,0
Total	386	100,0	100,0	

pekerjaan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IRT	351	90,9	90,9	90,9
wiraswasta	7	1,8	1,8	92,7
PNS	16	4,1	4,1	96,9
lainnya	12	3,1	3,1	100,0
Total	386	100,0	100,0	

pekerjaan lainnya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid karyawan swasta	12	3,1	100,0	100,0
Total	386	100,0	100,0	

JUMLAH ANAK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1-2 orang anak	230	59,6	59,6	59,6
3-4 orang anak	130	33,7	33,7	93,3
Valid 5-6 orang anak	24	6,2	6,2	99,5
>6 orang anak	2	,5	,5	100,0
Total	386	100,0	100,0	

lama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<= 3 tahun	249	64,5	64,5	64,5
Valid > 3 tahun	137	35,5	35,5	100,0
Total	386	100,0	100,0	

Jenis kontrasepsi hormonal yang digunakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
pil	35	9,1	9,1	9,1
suntik 1 Bulan	75	19,4	19,4	28,5
Valid suntik 3 bulan	269	69,7	69,7	98,2
implan	7	1,8	1,8	100,0
Total	386	100,0	100,0	

KATEGORI KETERATURAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
teratur	137	35,5	35,5	35,5
Valid tidak teratur	249	64,5	64,5	100,0
Total	386	100,0	100,0	

jika YA, Muntah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	23	6,0	6,0	6,0
Valid Tidak	363	94,0	94,0	100,0
Total	386	100,0	100,0	

NYERI PERUT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	22	5,7	5,7	5,7
Tidak	364	94,3	94,3	100,0
Total	386	100,0	100,0	

migraen

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	54	14,0	14,0	14,0
Tidak	332	86,0	86,0	100,0
Total	386	100,0	100,0	

nyeri payudara

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	35	9,1	9,1	9,1
Tidak	351	90,9	90,9	100,0
Total	386	100,0	100,0	

sakit kepala

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	94	24,4	24,4	24,4
Tidak	292	75,6	75,6	100,0
Total	386	100,0	100,0	

pendarahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	72	18,7	18,7	18,7
Tidak	314	81,3	81,3	100,0
Total	386	100,0	100,0	

penglihatan kabur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	27	7,0	7,0	7,0
Tidak	359	93,0	93,0	100,0
Total	386	100,0	100,0	

jantung berdebar-debar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	42	10,9	10,9	10,9
Tidak	344	89,1	89,1	100,0
Total	386	100,0	100,0	

pusing

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	157	40,7	40,7	40,7
Tidak	229	59,3	59,3	100,0
Total	386	100,0	100,0	

gangguan siklus haid

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	287	74,4	74,4	74,4
Tidak	99	25,6	25,6	100,0
Total	386	100,0	100,0	

kategori hipertensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid hipertensi	136	35,2	35,2	35,2
tidak hipertensi	250	64,8	64,8	100,0
Total	386	100,0	100,0	

HASIL BIVARIAT

kelompok umur 2 * kategori tekanan darah

Crosstab

		kategori tekanan darah		Total	
		hipertensi	tidak hipertensi		
kelompok umur 2	Count	73	166	239	
	<= 35 tahun	Expected Count	84,2	154,8	239,0
	% within kelompok umur 2	30,5%	69,5%	100,0%	
	Count	63	84	147	
	>35 tahun	Expected Count	51,8	95,2	147,0
	% within kelompok umur 2	42,9%	57,1%	100,0%	
Total	Count	136	250	386	
	Expected Count	136,0	250,0	386,0	
	% within kelompok umur 2	35,2%	64,8%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,047 ^a	1	,014		
Continuity Correction ^b	5,520	1	,019		
Likelihood Ratio	5,996	1	,014		
Fisher's Exact Test				,016	,010
Linear-by-Linear Association	6,032	1	,014		
N of Valid Cases	386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 51,79.

b. Computed only for a 2x2 table

KERJA * kategori tekanan darah

Crosstab

		kategori tekanan darah		Total	
		hipertensi	tidak hipertensi		
KERJA	bekerja	Count	9	26	35
	Expected Count	12,3	22,7	35,0	
	% within KERJA	25,7%	74,3%	100,0%	
tidak bekerja	Count	127	224	351	
	Expected Count	123,7	227,3	351,0	
	% within KERJA	36,2%	63,8%	100,0%	
Total	Count	136	250	386	
	Expected Count	136,0	250,0	386,0	
	% within KERJA	35,2%	64,8%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,528 ^a	1	,216		
Continuity Correction ^b	1,104	1	,293		
Likelihood Ratio	1,600	1	,206		
Fisher's Exact Test				,267	,146
Linear-by-Linear Association	1,524	1	,217		
N of Valid Cases	386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,33.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori pendidikan * kategori tekanan darah

Crosstab

			kategori tekanan darah		Total
			hipertensi	tidak hipertensi	
kategori pendidikan	rendah	Count	63	97	160
		Expected Count	56,4	103,6	160,0
		% within kategori pendidikan	39,4%	60,6%	100,0%
	tinggi	Count	73	153	226
		Expected Count	79,6	146,4	226,0
		% within kategori pendidikan	32,3%	67,7%	100,0%
Total	Count	136	250	386	
	Expected Count	136,0	250,0	386,0	
	% within kategori pendidikan	35,2%	64,8%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,054 ^a	1	,152		
Continuity Correction ^b	1,756	1	,185		
Likelihood Ratio	2,046	1	,153		
Fisher's Exact Test				,161	,093
Linear-by-Linear Association	2,049	1	,152		
N of Valid Cases	386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,37.

b. Computed only for a 2x2 table

lama * kategori tekanan darah

Crosstab

		kategori tekanan darah		Total
		hipertensi	tidak hipertensi	
lama	Count	54	195	249
	<= 3 tahun Expected Count	87,7	161,3	249,0
	% within lama	21,7%	78,3%	100,0%
	Count	82	55	137
	> 3 tahun Expected Count	48,3	88,7	137,0
	% within lama	59,9%	40,1%	100,0%
Total	Count	136	250	386
	Expected Count	136,0	250,0	386,0
	% within lama	35,2%	64,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	56,417 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	54,757	1	,000		
Likelihood Ratio	55,956	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	56,271	1	,000		
N of Valid Cases	386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,27.

b. Computed only for a 2x2 table

jenis kandungan hormonal * kategori tekanan darah

Crosstab

		kategori tekanan darah	
		hipertensi	
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count	33
		Expected Count	38,8
		% within jenis kandungan hormonal	30,0%
	hanya progesteron	Count	103
		Expected Count	97,2
		% within jenis kandungan hormonal	37,3%
Total	Count	136	
	Expected Count	136,0	
	% within jenis kandungan hormonal	35,2%	

Crosstab

			kategori tekanan darah
			tidak hipertensi
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count	77
		Expected Count	71,2
		% within jenis kandungan hormonal	70,0%
	hanya progesteron	Count	173
		Expected Count	178,8
		% within jenis kandungan hormonal	62,7%
Total	Count	250	
	Expected Count	250,0	
		% within jenis kandungan hormonal	64,8%

Crosstab

			Total
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count	110
		Expected Count	110,0
		% within jenis kandungan hormonal	100,0%
	hanya progesteron	Count	276
		Expected Count	276,0
		% within jenis kandungan hormonal	100,0%
Total	Count	386	
	Expected Count	386,0	
		% within jenis kandungan hormonal	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,846 ^a	1	,174		
Continuity Correction ^b	1,539	1	,215		
Likelihood Ratio	1,876	1	,171		
Fisher's Exact Test				,195	,107
Linear-by-Linear Association	1,841	1	,175		
N of Valid Cases	386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,76.

b. Computed only for a 2x2 table

KATEGORI KETERATURAN * kategori tekanan darah

Crosstab

		kategori tekanan darah		
		hipertensi	tidak hipertensi	
KATEGORI KETERATURAN	teratur	Count Expected Count % within KATEGORI KETERATURAN	59 48,3 43,1%	78 88,7 56,9%
	tidak teratur	Count Expected Count % within KATEGORI KETERATURAN	77 87,7 30,9%	172 161,3 69,1%
	Total	Count Expected Count % within KATEGORI KETERATURAN	136 136,0 35,2%	250 250,0 64,8%

Crosstab

			Total
KATEGORI KETERATURAN	teratur	Count Expected Count % within KATEGORI KETERATURAN	137 137,0 100,0%
	tidak teratur	Count Expected Count % within KATEGORI KETERATURAN	249 249,0 100,0%
	Total	Count Expected Count % within KATEGORI KETERATURAN	386 386,0 100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,710 ^a	1	,017		
Continuity Correction ^b	5,190	1	,023		
Likelihood Ratio	5,648	1	,017		
Fisher's Exact Test				,019	,012
Linear-by-Linear Association	5,695	1	,017		
N of Valid Cases	386				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,27.

b. Computed only for a 2x2 table

CROSS TABULASI ANTAR VARIABEL

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KATEGORI KETERATURAN * lama	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%

KATEGORI KETERATURAN * lama Crosstabulation

			lama	
			<= 3 tahun	> 3 tahun
KATEGORI KETERATURAN	teratur	Count % within KATEGORI KETERATURAN	87 63,5%	50 36,5%
	tidak teratur	Count % within KATEGORI KETERATURAN	162 65,1%	87 34,9%
Total		Count % within KATEGORI KETERATURAN	249 64,5%	137 35,5%

KATEGORI KETERATURAN * lama Crosstabulation

			Total
KATEGORI KETERATURAN	teratur	Count % within KATEGORI KETERATURAN	137 100,0%
	tidak teratur	Count % within KATEGORI KETERATURAN	249 100,0%
Total		Count % within KATEGORI KETERATURAN	386 100,0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jenis kandungan hormonal * lama	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
jenis kandungan hormonal * KATEGORI KETERATURAN	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
jenis kandungan hormonal * kelompok umur 2	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%

jenis kandungan hormonal * lama Crosstabulation

			lama	
			<= 3 tahun	> 3 tahun
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	78 70,9%	171 62,0%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	171 62,0%	249 64,5%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	249 64,5%	171 62,0%

jenis kandungan hormonal * lama Crosstabulation

			lama
			> 3 tahun
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	32 29,1%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	105 38,0%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	137 35,5%

jenis kandungan hormonal * lama Crosstabulation

			Total
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	110 100,0%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	276 100,0%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	386 100,0%

jenis kandungan hormonal * KATEGORI KETERATURAN Crosstabulation

			KATEGORI KETERATURAN
			AN
			teratur
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	32 29,1%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	105 38,0%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	137 35,5%

jenis kandungan hormonal * KATEGORI KETERATURAN Crosstabulation

			KATEGORI KETERATURAN
			AN
			tidak teratur
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	78 70,9%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	171 62,0%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	249 64,5%

jenis kandungan hormonal * KATEGORI KETERATURAN Crosstabulation

			Total
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	110 100,0%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	276 100,0%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	386 100,0%

jenis kandungan hormonal * kelompok umur 2 Crosstabulation

			kelompok umur 2
			<= 35 tahun
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	66 60,0%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	173 62,7%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	239 61,9%

jenis kandungan hormonal * kelompok umur 2 Crosstabulation

			kelompok umur 2
			>35 tahun
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	44 40,0%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	103 37,3%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	147 38,1%

jenis kandungan hormonal * kelompok umur 2 Crosstabulation

			Total
jenis kandungan hormonal	kombinasi estrogen dan progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	110 100,0%
	hanya progesteron	Count % within jenis kandungan hormonal	276 100,0%
Total		Count % within jenis kandungan hormonal	386 100,0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kategori pendidikan * lama	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
kategori pendidikan * KATEGORI KETERATURAN	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
kategori pendidikan * kelompok umur 2	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
KERJA * lama	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
KERJA * KATEGORI KETERATURAN	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
KERJA * kelompok umur 2	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%

kategori pendidikan * lama Crosstabulation

			lama		Total
			<= 3 tahun	> 3 tahun	
kategori pendidikan	rendah	Count	99	61	160
		% within kategori pendidikan	61,9%	38,1%	100,0%
	tinggi	Count	150	76	226
		% within kategori pendidikan	66,4%	33,6%	100,0%
Total		Count	249	137	386
		% within kategori pendidikan	64,5%	35,5%	100,0%

kategori pendidikan * KATEGORI KETERATURAN Crosstabulation

			KATEGORI KETERATURAN		Total
			teratur	tidak teratur	
kategori pendidikan	rendah	Count	59	101	160
		% within kategori pendidikan	36,9%	63,1%	100,0%
	tinggi	Count	78	148	226
		% within kategori pendidikan	34,5%	65,5%	100,0%
Total		Count	137	249	386
		% within kategori pendidikan	35,5%	64,5%	100,0%

kategori pendidikan * kelompok umur 2 Crosstabulation

			kelompok umur 2		Total
			<= 35 tahun	>35 tahun	
kategori pendidikan	rendah	Count	88	72	160
		% within kategori pendidikan	55,0%	45,0%	100,0%
	tinggi	Count	151	75	226
		% within kategori pendidikan	66,8%	33,2%	100,0%
Total		Count	239	147	386
		% within kategori pendidikan	61,9%	38,1%	100,0%

KERJA * lama Crosstabulation

			lama		Total
			<= 3 tahun	> 3 tahun	
KERJA	bekerja	Count	19	16	35
		% within KERJA	54,3%	45,7%	100,0%
	tidak bekerja	Count	230	121	351
		% within KERJA	65,5%	34,5%	100,0%
Total		Count	249	137	386
		% within KERJA	64,5%	35,5%	100,0%

KERJA * KATEGORI KETERATURAN Crosstabulation

			KATEGORI KETERATURAN		Total
			teratur	tidak teratur	
KERJA	bekerja	Count	13	22	35
		% within KERJA	37,1%	62,9%	100,0%
	tidak bekerja	Count	124	227	351
		% within KERJA	35,3%	64,7%	100,0%
Total		Count	137	249	386
		% within KERJA	35,5%	64,5%	100,0%

KERJA * kelompok umur 2 Crosstabulation

			kelompok umur 2		Total
			<= 35 tahun	>35 tahun	
KERJA	bekerja	Count	22	13	35
		% within KERJA	62,9%	37,1%	100,0%
	tidak bekerja	Count	217	134	351
		% within KERJA	61,8%	38,2%	100,0%
Total		Count	239	147	386
		% within KERJA	61,9%	38,1%	100,0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jenis kontrasepsi hormonal * lama	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
jenis kontrasepsi hormonal * KATEGORI KETERATURAN	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
jenis kontrasepsi hormonal * kelompok umur 2	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%

jenis kontrasepsi hormonal * lama Crosstabulation

			lama		Total
			<= 3 tahun	> 3 tahun	
pil		Count	27	8	35
		% within jenis kontrasepsi hormonal	77,1%	22,9%	100,0%
jenis kontrasepsi hormonal	suntik	Count	222	122	344
		% within jenis kontrasepsi hormonal	64,5%	35,5%	100,0%
implan		Count	0	7	7
		% within jenis kontrasepsi hormonal	0,0%	100,0%	100,0%
Total		Count	249	137	386
		% within jenis kontrasepsi hormonal	64,5%	35,5%	100,0%

jenis kontrasepsi hormonal * KATEGORI KETERATURAN Crosstabulation

			KATEGORI KETERATURAN	
			teratur	tidak teratur
jenis kontrasepsi hormonal	pil	Count	7	28
		% within jenis kontrasepsi hormonal	20,0%	80,0%
	suntik	Count	125	219
		% within jenis kontrasepsi hormonal	36,3%	63,7%
	implan	Count	5	2
		% within jenis kontrasepsi hormonal	71,4%	28,6%
Total		Count	137	249
		% within jenis kontrasepsi hormonal	35,5%	64,5%

jenis kontrasepsi hormonal * KATEGORI KETERATURAN Crosstabulation

			Total
jenis kontrasepsi hormonal	pil	Count	35
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%
	suntik	Count	344
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%
	implan	Count	7
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%
Total		Count	386
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%

jenis kontrasepsi hormonal * kelompok umur 2 Crosstabulation

			kelompok umur 2	
			<= 35 tahun	>35 tahun
jenis kontrasepsi hormonal	pil	Count	22	13
		% within jenis kontrasepsi hormonal	62,9%	37,1%
	suntik	Count	215	129
		% within jenis kontrasepsi hormonal	62,5%	37,5%
	implan	Count	2	5
		% within jenis kontrasepsi hormonal	28,6%	71,4%
Total		Count	239	147
		% within jenis kontrasepsi hormonal	61,9%	38,1%

jenis kontrasepsi hormonal * kelompok umur 2 Crosstabulation

			Total
jenis kontrasepsi hormonal	pil	Count	35
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%
	suntik	Count	344
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%
	implan	Count	7
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%
Total		Count	386
		% within jenis kontrasepsi hormonal	100,0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
lama * kelompok umur 2	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%
KATEGORI KETERATURAN * kelompok umur 2	386	100,0%	0	0,0%	386	100,0%

lama * kelompok umur 2 Crosstabulation

		kelompok umur 2		Total
		<= 35 tahun	>35 tahun	
lama	<= 3 tahun	Count 179	70	249
		% within lama 71,9%	28,1%	100,0%
lama	> 3 tahun	Count 60	77	137
		% within lama 43,8%	56,2%	100,0%
Total		Count 239	147	386
		% within lama 61,9%	38,1%	100,0%

KATEGORI KETERATURAN * kelompok umur 2 Crosstabulation

		kelompok umur 2	
		<= 35 tahun	>35 tahun
KATEGORI KETERATURAN	teratur	Count 82	55
		% within KATEGORI KETERATURAN 59,9%	40,1%
KATEGORI KETERATURAN	tidak teratur	Count 157	92
		% within KATEGORI KETERATURAN 63,1%	36,9%
Total		Count 239	147
		% within KATEGORI KETERATURAN 61,9%	38,1%

KATEGORI KETERATURAN * kelompok umur 2 Crosstabulation

			Total
KATEGORI KETERATURAN	teratur	Count 137	100,0%
		% within KATEGORI KETERATURAN 100,0%	
KATEGORI KETERATURAN	tidak teratur	Count 249	100,0%
		% within KATEGORI KETERATURAN 100,0%	
Total		Count 386	100,0%
		% within KATEGORI KETERATURAN 100,0%	

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,960	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	1,27	,450	30
P2	1,27	,450	30
P3	1,33	,479	30
P5	1,30	,466	30
P6	1,37	,490	30
P7	1,37	,490	30
P8	1,23	,430	30
P9	1,50	,509	30
P10	1,50	,509	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	10,87	10,878	,931	,950
P2	10,87	10,878	,931	,950
P3	10,80	11,200	,752	,959
P5	10,83	10,764	,936	,950
P6	10,77	10,806	,868	,953
P7	10,77	10,806	,868	,953
P8	10,90	11,197	,855	,954
P9	10,63	11,206	,699	,962
P10	10,63	11,206	,699	,962

VALIDITAS

Berdasarkan data hasil uji validitas dengan menggunakan *Alfa Cronbrach*, **variabel keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal** bahwa dari 10 pertanyaan tertutup yang dibuat untuk pertanyaan variabel keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal, terdapat 9 pertanyaan yang valid karena nilai t hitung $>$ t tabel, dimana t tabel $n= 30$ adalah 0,361 sehingga jika digambarkan dalam tabel hasilnya akan menjadi sebagai berikut:

Tabel hasil uji validitas variabel keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal

Pertanyaan	T hitung	T tabel	Keterangan
P1	0,931	0,361	Valid
P2	0,931	0,361	Valid
P3	0,752	0,361	Valid
P5	0,936	0,361	Valid
P6	0,868	0,361	Valid
P7	0,868	0,361	Valid
P8	0,855	0,361	Valid
P9	0,699	0,361	Valid
P10	0,699	0,361	Valid

Kemudian dapat dilihat pada nilai signifikasinya korelasi variabel total sehingga dapat disimpulkan bahwa P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 adalah pertanyaan valid untuk variabel keteraturan penggunaan kontrasepsi hormonal dan pertanyaan tidak valid hanya P4.

RELIABILITAS

Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,960	9

Pada tabel diatas nilai *cronbach alfa* lebih besar dari 0,6 yakni sebesar 0,960 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan untuk variabel keteraturan penggunaan **adalah reliabel**.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata -Gowa Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : 2907/Un.06/FKIK/ PP.07.6/09/2016 Samata-Gowa, 16 September 2016
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel

di-
Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurmaghfirawati AS

NIM : 70200112025

Program Studi/Peminatan: Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi

Judul Penelitian : Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2016

Dosen Pembimbing : 1. Emmi Bujawati, SKM, M.Kes.
2. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes.

untuk melakukan penelitian.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

NIP. 19810405 2000604 2 003

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 12790/S.01P/P2T/09/2016
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 2787/Un.06/FKIK/PP.00.9/09/2016 tanggal 16 September 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURMAGHFIRAWATI AS**
Nomor Pokok : 70200112025
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA USIA SUBUR DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Oktober s/d 01 November 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 September 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111

Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 21 September 2016

K e p a d a

**Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR**

**Di -
MAKASSAR**

Nomor : 070 / 4066 -II/BKBP/IX/2016
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12790 /S.01.P/P2T/09/2016, Tanggal 19 September 2016, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **NURMAGHFIRAWATI AS**
NIM/Jurusan : 70200112025/ Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Gowa
Judul : **"HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA USIA SUBUR DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 "**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 01 Oktober s/d 01 November 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Jb. KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221



email: dinkeskotamakassar@yahoo.co.id

home page: dinkeskotamakassar.net

Nomor : 440/3161/PSDK/IX/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Ka. Puskesmas Kassi-Kassi
di-
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/4066-II/BKBP/IX/2016 Tanggal, 21 Septembar 2016 perihal tersebut diatas maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

N A M A : NURMAGHFIRAWATI AS
NIM/PROGRAM : 70200112025 / KESMAS
INTANSI : MAHASISWA (S1) UIN ALAUDDIN
J U D U L : "HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA USIA SUBUR DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR TAHUN 2016"

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja saudara, dalam rangka "Penyusunan Skripsi" sesuai dengan judul diatas yang akan dilaksanakan mulai tanggal 01 Oktober s/d 01 November 2016. Oleh karena itu, mohon kiranya dapat di berikan bantuan seperlunya.

Demikian di sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Makassar, 21 September 2016

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar,

DR. HJ. NAISYAH T. AZIKIN.M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601014 198902 2 001

Tembusan :
15. Yang Bersangkutan
16. Arsip



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS / RSP.VI KASSI KASSI
Jalan : Tamalate I No. 43 ☎ (0411) 863536 ~ 8213478
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

No: 10 /PKM/RSP.VI-KK/I/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUDI, SE, M.Si
NIP : 19641231 198603 1 237
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Kasubag. Tata Usaha Puskesmas/RSP.VI Kassi Kassi.

Menerangkan bahwa :

Nama : NURMAGHFIRAWATI AS
NIM/Jurusan : 70200112025/ S1 Kesmas
Pekerjaan : Universitas Islam Negeri Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar pada tanggal 01 Oktober s.d 30 November 2016 dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul "*Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita usia Subur di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2016*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Januari 2017

Kepala Puskesmas/RSP.VI Kassi Kassi
Kasubag. Tata Usaha,



WAHYUDI, SE, M.Si

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19641231 198603 1 237



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.11 Makassar 90245 | Tlp./Fax : 0411 - 582345
website : www.bpfk-makassar.com | e-mail : bpfk_makassar@yahoo.com.

Dasar Hukum : Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, Permenkes RI Nomor 363/Menkes/PER/IV/1998
dan Permenkes RI Nomor 530/Menkes/PER/IV/2007

SERTIFIKAT KALIBRASI

CERTIFICATE OF CALIBRATION

No. 6997 - 05

Identitas Alat:

Instrument Identification

Nama Alat
Instrument : **SPHYGMOMANOMETER**

Merek
Manufacturer : ABN

Model/Tipe
Model/Type : Desk Model

Nomor Seri
Serial Number : 625721

Nomor Registrasi
Register Number : **05.001.16.60029**

Identitas Pemilik:

Customer Identification

Pemilik
Customer : **NURMAGFIRAWATI AS**

Alamat
Address : Jl. Sultan Alauddin No. 45 A, Samata, Gowa

Sertifikat ini terdiri dari : 2 Halaman
This Certificate comprises of pages

Diterbitkan Tanggal : 6 Oktober 2016
Date of Issue

a.n. Kepala BPFK Makassar,
On behalf of Head of BPFK Makassar
Kepala Seksi Pelayanan Teknis,
Chief Technical Service Affair,



Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
Nip. 197302051999032002

Dilarang mengutip atau mempublikasikan sertifikat ini tanpa izin tertulis dari BPFK Makassar
This document shall not be reproduced except in full without written approval from BPFK Makassar

BIOGRAFI PENELITI

Nurmaghfirawati, lahir pada 20 Mei 1994 di RSUD Mamuju sebagai anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan hasil buah cinta dari pasangan Asydidrat dan Asriani.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN No.1 Unggulan Mamuju dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Mamuju dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Mamuju dan lulus di tahun 2012.

Alhamdulillah, pada tahun 2012 penulis tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan di jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Epidemiologi.

Syukur *Alhamdulillah* berkat pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui perjuangan keras, dan motivasi tinggi diiringi doa dari orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi ini. Penulis berharap setiap mahasiswa yang melakukan penyelesaian skripsi agar mengedepankan proses bukan hasil dan tidak hanya menargetkan cepat selesai tetapi skripsi tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain dengan menjadikannya sebagai salah satu wadah untuk menambah ilmu.