

HASIL PENELITIAN

**ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA
LANGKITANG (*Faunus ater*) DI PERAIRAN DESA MARONENG
KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG**



Oleh :

NURHAEDA PARALLUI
NIM. 60300109012

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

**ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL PADA
LANGKITANG (*Faunus ater*) DI PERAIRAN DESA MARONENG
KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURHAEDA PARALLUI
NIM. 60300109012

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Langkitang (*Faunus ater*) di Perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai sekarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi teknis penulisan maupun pada tataran ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, segala bentuk koreksi dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari pula bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah sehingga peran dan partisipasi dari berbagai pihak sangat berarti dan berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Parallui, Ibunda Hj. Kamia tercinta atas segala curahan kasih sayang, yang tak henti-hentinya mendoakan, dan senantiasa berusaha dan memotivasi

baik secara moril dan materil, semoga Allah Swt memberikan kebahagiaan dunia akhirat atas seluruh perjuangan ayah dan ibunda lakukan. Kakakku Hj. Nurma Parallui, Syukur Parallui, Amir Parallui, Hajjir Parallui dan keponakanku tersayang yang selalu memberikan Do'a, semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan studi perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Cut Muthiadin, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi.
5. Sitti Saenab S.Pd., M.Pd dan Cut Muthiadin S.Si., M.Si., selaku pembimbing I dan II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Hj. Ernawati S. Kaseng S.Pi., M.Si, Fatmawati Nur S.Si., M.Si, dan Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag., selaku penguji I, II, dan III, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.

8. Saudariku Nurlinda, senasib, sepenanggungan, dan seperjuangan dalam menyusun skripsi ini.
9. Special buat keluarga besar Biologi angkatan 2009, keluarga Nocturnalku Muh. Aldy Fachrial Fahmi, Sardi, Muchlis Rahman, Fatmawati, Nurjannah, Nurhidayah, Dian Hardiana, Widianingsih, Rezkiwati, Dewi Paramitasari, A. Wahdinir, Wahyudiana, Suciani, Mustainah, khususnya Ilham Ibnu Irwan terima kasih banyak atas segalanya, kebersamaan, kebahagiaan, bantuan dan dukungannya. Suka duka dalam solidaritas kalian tidak akan kulupakan.
10. Kanda Muh. Aryan R Suci, S.Si, Andi Nur Izmi S.Si, Sartika S.Si, St. Hasbiah S.Si dan Mustakim yang membimbing dan membantu penulis selama penelitian.
11. Adindaku Thyas Astuti, Wahdah, Eraa, Dhany, Bamha, Aqsah, Zul, Niar battala, Eni, Arun, Hajrah the gank, Iput the gank, terkhusus dindaku tersayang Indrawati Sahaba, terima kasih atas semua yang kalian berikan.
12. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi, keluarga besar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Angk. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012. Terima kasih atas segala kenangan yang kalian berikan selama perkuliahan.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amien.

Makassar, 03 Juli 2013.

Penulis

Nurhaeda Parallui
NIM. 60300109012

ABSTRAK

Nama : Nurhaeda Parallui
Nim : 60300109012
Jurusan : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi

Penelitian mengenai Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Langkitang (*Faunus ater*) di Perairan Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) pada langkitang (*Faunus ater*) di perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2013, pengambilan sampel dilakukan di dua titik stasiun yaitu stasiun 1 (area mangrove) dan stasiun 2 (area pantai). Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang menggambarkan kandungan logam berat timbal (Pb) pada langkitang (*Faunus ater*) di perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat timbal (Pb) dari kedua stasiun telah melampaui ambang batas. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) langkitang (*Faunus ater*) pada stasiun 1 sebesar 1,72 mg/kg dan stasiun 2 sebesar 1,92 mg/kg, sedangkan baku mutu untuk kelas Gastropoda yaitu sebesar 1,5 mg/kg. Kandungan logam berat timbal (Pb) dalam air pada stasiun 1 sebesar 3,58 ml/L dan stasiun 2 sebesar 3,93 ml/L, dimana kriteria baku mutu air laut untuk biota laut untuk timbal (Pb) yaitu sebesar 0,008 ml/L.

Kata kunci : Logam berat timbal (Pb), langkitang (Faunus ater), Perairan Maroneng.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Pinrang.....	9
B. Tinjauan Umum Gastropoda.....	11
C. Tinjauan Umum Langkitang (<i>Faunus ater</i>).....	21
D. Tinjauan Umum Logam Berat.....	25

E. Tinjauan Umum Timbal (Pb).....	47
F. Dampak Timbal (Pb) pada Kesehatan.....	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Variabel Penelitian.....	61
C. Defenisi Operasional Variabel.....	61
D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	62
E. Alat dan Bahan Penelitian.....	62
F. Prosedur Penelitian.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Hasil Penelitian.....	65
B. Pembahasan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap biota laut semakin meningkat dengan munculnya kesadaran dan minat setiap lapisan masyarakat akan pentingnya lautan. Laut sebagai penyedia sumber daya alam yang produktif, baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, kawasan rekreasi dan pariwisata. Karena itu, wilayah pesisir dan lautan merupakan tumpuan harapan manusia dalam pemenuhan kebutuhan di masa sekarang dan akan datang (Tomascik. 1997: 82).

Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Sebagai daerah perbatasan antara ekosistem laut dan ekosistem darat, hempasan gelombang dan hembusan angin maka pasir dari pantai membentuk gundukan ke arah darat. Setelah gundukan pasir itu biasanya terdapat hutan yang dinamakan hutan pantai. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, Mollusca, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai (Triatmodjo, Bambang. 1999: 24).

Kekayaan jumlah dan variasi jenis hewan mempunyai nilai yang lebih untuk dikembangkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik hewan vertebrata atau invertebrata. Disamping pemanfaatan perlu dipertimbangkan kewajiban untuk

menjaga kelestariannya, untuk dapat diketahui oleh generasi berikutnya. Salah satu dari hewan invertebrata yang penting adalah filum Mollusca, sesuai dengan namanya mempunyai tubuh lunak, tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari Kalsium Karbonat (CaCO_3) (Tedi, Priyatna. 1996: 19).

Mollusca dalam dunia hewan merupakan filum terbesar kedua setelah Arthropoda. Jumlah spesiesnya yaitu sekitar 50.000-110.000 spesies yang masih hidup dan 35.000 spesies fosil. Mollusca tersebar luas dalam habitat laut, air tawar, dan darat, tetapi lebih banyak terdapat dalam lautan. Umumnya Mollusca berselubung sebuah mantel yang merupakan batas ruang mantel itu sendiri. Secara internal, mantel itu bertaut dengan tubuh. Semua Mollusca selalu mempunyai massa muskular, disebut kaki yang bentuk dan fungsinya bervariasi menurut kelasnya. Salah satu kelas dari Mollusca yang bernilai ekonomis penting adalah Gastropoda (Mukayat. 1989: 110).

Gastropoda (dalam bahasa latin, *gaster* = perut, *podos* = kaki) adalah kelompok hewan yang menggunakan perut sebagai alat gerak atau kakinya. Misalnya, siput air (*Lymnaea* sp), remis (*Corbicula javanica*), dan bekicot (*Achatia fulica*). Hewan ini memiliki ciri khas berkaki lebar dan pipih pada bagian ventral tubuhnya. Gastropoda bergerak lambat menggunakan kakinya. Jumlah spesies diperkirakan lebih 50.000 jenis. Sebagian besar hidup di laut, tetapi banyak juga yang hidup di air tawar dan di darat. Habitat di daerah kutub, tropis, kedalaman 17.000 kaki di laut, dan ketinggian 18.000 kaki di pegunungan Himalaya. Cangkang berbentuk kerucut, makanan alga atau tumbuhan laut, dan bersifat predator (Budiati, Retno. 1998: 73).

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 45 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Terjemahnya:

“dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Departemen Agama. R. I. 365).

Berdasarkan ayat di atas, dalam tafsir Ibnu Katsier menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman tentang kerajaan-Nya yang besar dan kekuasaan-Nya yang meliputi segala sesuatu dan bahwasannya Dia telah menciptakan berbagai ragam makhluk yang berbeda-beda bentuk, rupa, gerak dan harakatnya dan bahwa Dia telah menciptakan semua jenis hewan air. Diantara banyak jenis hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular dan sebagainya, ada yang berjalan di atas dua kaki seperti manusia dan burung, adapula yang berjalan dengan empat kaki kebanyakan binatang ternak seperti lembu, domba, unta dan lain-lain. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki mustahil akan terjadi.

Dalam surah An-Nur ayat 45, menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan berbagai macam jenis makhluk hidup dan semuanya memiliki ciri masing-masing,

ayat tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa hewan ciptaan Allah berjalan dengan menggunakan perut yaitu ular, seperti halnya pada Gastropoda yang menggunakan perutnya untuk berjalan menggantikan fungsi kaki, karena kontraksi dari otot perutnyalah maka jenis Gastropoda ini dapat melakukan pergerakan. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia melainkan memiliki fungsinya tersendiri.

Pemanfaatan laut bagi kesejahteraan manusia semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya populasi manusia. Peningkatan jumlah penduduk dan berbagai aktivitas manusia di kawasan pantai menyebabkan wilayah ini sering digunakan sebagai tempat pembuangan akhir yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah limbah termasuk yang mengandung logam berat sehingga pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan biogeokimia perairan laut terutama di zona pantai (Sari Y.W. 2003: 12).

Kabupaten Pinrang yang merupakan wilayah berbatasan langsung dengan Selat Makassar, yang juga merupakan wilayah pesisir pantai, maka daerah ini sangat potensial pada bidang Perikanan, baik laut maupun darat. Tidak mengherankan jika sektor perikanan laut sebagai sektor andalan. Kabupaten Pinrang dikenal pula sebagai salah satu “Lumbung Pangan” di Sulawesi Selatan sekaligus penghasil udang, ikan bandeng, ikan laut, kakao, kopi, kemiri dan kelapa. Sebagai daerah pertanian yang memiliki sumberdaya alam yang cukup, Pinrang juga memiliki kekayaan laut yang membentang sekitar 93 Km dari Pare-Pare sampai ke Polewali Mandar (Pol Man)

Sulawesi Barat dan luas Kabupaten Pinrang yaitu 1.961,77 km² (Takdir, Sulhayat. 2012).

Perairan Maroneng merupakan salah satu muara yang ada di Desa Maroneng Kabupaten Pinrang. Para nelayan yang bermukim di sekitar pantai memanfaatkan daerah tersebut sebagai tempat pembudidayaan Gastropoda, contohnya yang dikonsumsi oleh manusia seperti langitang (*Faunus ater*) yang tergolong ke dalam kelas Gastropoda dan keberadaannya yang melimpah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nurlinda (2012) bahwa Gastropoda yang mendominasi adalah *Faunus ater* dengan indeks dominansi mencapai 0,82. Namun perairan ini telah terkontaminasi oleh logam berat akibat padatnya aktivitas domestik di sekitarnya. Dalam hal ini semakin tingginya pertumbuhan populasi manusia, maka kebutuhan akan pangan, bahan bakar, pemukiman dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain juga akan meningkat, sehingga akan meningkatkan limbah domestik. Meningkatnya jumlah limbah domestik yang masuk ke dalam perairan, mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas perairan.

Tingginya aktivitas di sepanjang daerah pesisir pantai tersebut menyebabkan Perairan Maroneng berfungsi sebagai tempat akhir pembuangan berbagai bahan pencemar yang datang dari darat, seperti pembuangan sampah yang berasal dari rumah tangga. Selain itu, aktivitas di laut seperti transportasi nelayan, penangkapan ikan, dan cat dari perahu nelayan juga turut menyumbang bahan pencemar di Perairan Maroneng. Adanya berbagai macam tekanan menyebabkan perairan tersebut telah terkontaminasi oleh logam berat akibat padatnya aktivitas domestik di sekitarnya.

Logam berat yang diduga terakumulasi di perairan tersebut adalah logam berat timbal.

Timbal (Pb) terdapat secara alami di dalam kerak bumi. Keberadaan timbal bisa juga berasal dari hasil aktivitas manusia, yang mana jumlahnya 300 kali lebih banyak dibandingkan Pb alami yang terdapat pada kerak bumi. Timbal (Pb) adalah logam yang mendapat perhatian khusus karena sifatnya yang toksik (beracun) terhadap manusia (Palar. 1994: 38). Tubuh dapat menyerap timbal melalui permukaan kulit dan mukosa, saluran pencernaan dan saluran nafas. Akumulasi pada jaringan tubuh dapat menimbulkan keracunan. Sejumlah sumber makanan, baik yang berasal dari laut seperti ikan, kerang, Gastropoda dan rumput laut serta dari tanaman dan produk turunannya dapat terkontaminasi logam berat timbal. Logam berat dapat memasuki tubuh dan mengakibatkan kerusakan pada berbagai jaringan tubuh melalui beberapa cara (Tolen, Hendra. 2001: 41).

Mekanisme pertama adalah berikatan dengan gugus sulfhidril, sehingga fungsi enzim pada jaringan tubuh akan terganggu kerjanya. Mekanisme yang kedua adalah berikatan dengan enzim pada siklus Krebs, sehingga proses oksidasi fosforilasi tidak terjadi. Mekanisme yang ketiga adalah dengan efek langsung pada jaringan yang terkena yang menyebabkan kematian (nekrosis) pada lambung dan saluran pencernaan, kerusakan pembuluh darah, perubahan degenerasi pada hati dan ginjal.

Penelitian yang telah dilakukan Meilanty H, Abd Wahid Wahab, dan Yusafir Hala tentang Analisis Kandungan Ion Timbal Dan Seng Pada Kerang Darah (*Anadara Granosa*) Di Perairan Pelabuhan Pare-Pare. Berdasarkan penelitian yang

telah dilakukan, maka diperoleh kandungan logam Pb pada kerang darah untuk tiga stasiun yang berbeda yaitu pada stasiun I sebesar 14,43 mg/kg, stasiun II sebesar 23,94 mg/kg, dan stasiun III sebesar 13,36 mg/kg. Tingginya kandungan logam Pb pada kerang darah yang berasal dari stasiun ini disebabkan oleh keberadaan kapal barang yang senantiasa aktif pada lokasi tersebut. Dengan demikian pelepasan logam Pb sebagai efek dari penggunaan bahan bakar serta pembuangan limbah bahan bakar mesinnya. Selain itu, dapat diakibatkan oleh aktivitas penduduk yang tinggal di sekitar pelabuhan yang menggunakan bahan-bahan yang mengandung logam Pb misalnya penggunaan cat sebagai pewarna pada kapal. Bahan-bahan tersebut mengandung logam Pb dalam bentuk persenyawaan, seperti PbCO_3 atau Pb putih dan Pb_3O_4 yang bermanfaat dalam pembuatan cat. Kandungan logam Pb pada kerang darah dari ketiga stasiun tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena sudah jauh dari kadar maksimal logam Pb yang telah ditetapkan oleh WHO dan FAO yaitu 2 mg/kg berat kering. Bila kandungan logam Pb dalam tubuh manusia melebihi ambang batas maksimum akan berdampak bagi kesehatan manusia yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit.

Mengingat banyaknya bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia yang berasal dari laut seperti langkitang (*Faunus ater*) yang tergolong ke dalam kelas Gastropoda maka dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui kandungan logam berat timbal pada *Faunus ater* tersebut. Makanan yang berasal dari daerah tercemar kemungkinan besar juga tercemar. Jika *Faunus ater* mengandung timbal dan dijadikan sebagai bahan makanan maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Analisis *Faunus ater* di perairan Maroneng belum pernah dilakukan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat di Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang yang menggunakan pesisir laut sebagai mata pencaharian dan *Faunus ater* dari kelas Gastropoda sebagai bahan makanan konsumsi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah kandungan logam berat timbal (Pb) pada langkitang (*Faunus ater*) yang terdapat di perairan Maroneng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) yang terakumulasi pada langkitang (*Faunus ater*) di perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang ada atau tidaknya kandungan logam berat timbal pada langkitang (*Faunus ater*) yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pesisir pantai Desa Maroneng dan mengetahui konsentrasi logam timbal tersebut.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan Perairan Maroneng, baik untuk kegiatan budidaya (*marine culture*) maupun kegiatan penangkapan, dalam rangka mewujudkan sumberdaya yang tidak tercemar logam berat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pinrang


Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu “Lumbung Pangan” di Sulawesi Selatan sekaligus penghasil udang, ikan bandeng, ikan laut, kakao, kopi, kemiri dan kelapa. Sebagai daerah pertanian yang memiliki sumberdaya alam yang cukup, Pinrang juga memiliki kekayaan laut yang membentang sekitar 93 Km dari Pare-Pare sampai ke Polewali Mandar (Pol Man) Sulawesi Barat dan luas Kabupaten Pinrang yaitu 1.961,77 km². Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pinrang terbagi atas 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Batulappa, Duampanua, Cempa, Patampanua, Tiroang, Paleteang, Watang Sawitto, Mattiro Bulu, Lanrisang, Mattiro Sompe dan Suppa. Dari 12 Kecamatan tersebut terdapat 6 (enam) kecamatan yang berada di Wilayah Pesisir dan Laut yaitu Kecamatan Lembang, Duampanua, Cempa, Mattiro Sompe, Lanrisang dan Suppa serta Kabupaten Pinrang memiliki 16 Desa pantai dan 5 Kelurahan pantai (Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2012).

Kabupaten Pinrang yang merupakan wilayah berbatasan langsung dengan Selat Makassar, yang juga merupakan wilayah pesisir pantai, maka daerah ini sangat potensial pada bidang Perikanan, baik laut maupun darat. Tidak mengherankan jika sektor perikanan laut sebagai sektor andalan, dengan produksi per tahun rata-rata berkisar 3.289,25 ton. Sedangkan untuk perikanan darat, produksi rata-rata setiap

tahun 18.665, 99 ton yang tersebar pada luas tambak ikan 15.735 ha (Takdir, Sulhayat. 2012).

Kabupaten Pinrang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Di daerah ini terdapat hutan seluas 72.831 ha yang terdiri dari hutan lindung (32.673 ha) dan hutan produksi terbatas (40.158 ha) yang banyak terdapat di kawasan lereng di kecamatan Lembang dan Duampanua (Takdir, Sulhayat. 2012). Di Kecamatan Duampanua pula tepatnya di desa Maroneng terdapat pesisir pantai terbentang luas yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat yang bermukim di sekitar daerah tersebut.

Pantai Maroneng terletak di desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang merupakan kota di bagian barat provinsi Sulawesi Selatan. Pantai Maroneng memiliki garis pantai yang panjangnya kurang lebih 2 km. Pantai Maroneng adalah pantai dengan daerah pasang surut atau zona intertidal yang memiliki substrat campuran yaitu berpasir campur lumpur. Hal ini memungkinkan Gastropoda yang bersifat karnivora, pemakan *dentritifus*, pemakan bangkai dan plankton dapat ditemukan. Sedangkan Gastropoda yang bersifat herbivora atau pemakan alga kemungkinan sedikit sekali dijumpai di pantai Maroneng. Gastropoda pemakan alga hanya dapat ditemukan di daerah yang bersubstrat karang (Prayetno, S. H. 2012).



Gambar 2. 1. Wilayah daerah Pantai Maroneng, Kecamatan Duampenua, Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Umum Gastropoda

Avertebrata dibagi atas beberapa filum atau golongan diantaranya adalah filum Mollusca dengan jumlah kedua terbanyak setelah Arthropoda. Filum Mollusca terdiri dari delapan kelas yaitu : Caudofoveata (*Chaetodermatorpha*), Aplacophora, Monoplacophora, Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, dan Cephalopoda. Gastropoda, Bivalvia dan Cephalopoda merupakan kelas Mollusca yang dominan. Gastropoda merupakan kelompok yang paling beragam dan

spesiesnya diperkirakan mencapai 74.000 spesies, diikuti oleh Bivalvia sekitar 31.000 spesies dan Cephalopoda sekitar 550 spesies. Pada umumnya Gastropoda hidup di laut, meskipun banyak juga yang ditemukan di perairan tawar dan di daratan (Brusca. 1990: 149).

Gastropoda berasal dari bahasa Latin *gastra* yang berarti perut dan kata *podus* yang berarti kaki. Jadi, gastropoda adalah hewan-hewan invertebrata yang menggunakan perutnya sebagai kaki. Kelas Gastropoda dimasukkan ke dalam filum Mollusca, dan merupakan kelas yang terbesar dan paling dikenal dalam filum ini. Gastropoda merupakan kelas yang paling berhasil dalam beradaptasi dengan lingkungan dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain dalam filum Mollusca, sehingga dapat ditemukan dimanapun, pegunungan, hutan, danau, laut, perairan sungai, bahkan di halaman kita sendiri. Kelas ini satu-satunya kelas dalam filum Mollusca yang telah beradaptasi sehingga dapat hidup di daratan (Barnes. 1994: 128).

Anggota kelas Gastropoda telah mengembangkan kakinya sehingga dapat meluncur secara efisien di daratan, mata yang dapat ditarik dan diulur kembali, dan telah mengembangkan sistem pernapasannya menjadi sistem pernapasan pulmonaris. Gastropoda menempati setiap niche di dalam lautan, mulai dari zona nefritik sampai dengan abisal. Lebih dari 15.000 macam bentuk fosil gastropoda telah dideskripsi oleh para ilmuwan dan jumlah Gastropoda yang tercatat pada zaman ini telah berkembang menjadi lebih dari 40.000 spesies, dan dapat disimpulkan bahwa kelas Gastropoda sedang mengalami puncak perkembangannya pada zaman ini (Aqilah, Zalfa. 2012).

Gastropoda merupakan kelompok Mollusca yang paling banyak, yaitu lebih dari 35.000 spesies. Kelompok ini memiliki variasi bentuk dan cara hidup dibandingkan dengan kelompok Mollusca lainnya. Ada yang hidup di laut dan ada yang hidup di air tawar. Selain itu, ada pula yang hidup di daratan. Gastropoda memiliki sistem pencernaan makanan yang lengkap dan mulut yang dilengkapi struktur gigi yang disebut radula. Gastropoda termasuk herbivora. Namun, tidak semua Gastropoda adalah herbivora. Beberapa Gastropoda bersifat karnivora, saprofit, dan parasit. Gastropoda memiliki sistem peredaran darah terbuka. Gastropoda air memiliki alat kelamin yang terpisah. Beberapa spesies melepaskan telur dan sperma langsung ke dalam air. Pada beberapa spesies, alat kelaminnya terpisah dan fertilisasi terjadi di dalam tubuh betina. Adapun pada beberapa spesies lainnya, perkembangan sel telur yang telah dibuahi terjadi di dalam induk betina. Contoh spesies Gastropoda adalah bekicot (*Achatina fulica*). Selain itu, terdapat Gastropoda yang tidak memiliki cangkang, antara lain Eubranchius dan Kimax (Ariani. 2004: 5).

Gastropoda termasuk golongan Mollusca yaitu hewan yang bertubuh lunak. Hewan-hewan yang tergolong dalam Gastropoda pada umumnya memiliki cangkang tunggal (univalvia) dimana tubuh hewan tersebut terlindung di bawah atau di dalam cangkang. Golongan Gastropoda bergerak dengan otot perut yang dikeluarkan dari cangkangnya dan berfungsi sebagai kaki. Pada permukaan atas kaki ini melekar operculum yang berfungsi sebagai pintu yang menutupi aperture cangkang. Operculum ini hanya terdapat pada spesies-spesies Gastropoda yang dapat menarik

masuk seluruh tubuhnya ke dalam cangkang sehingga yang nampak dari luar adalah operculum saja (Manuputty, Anna. 1980: 9).

Gerakan Gastropoda disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot seperti gelombang, dimulai dari belakang menjalar ke depan. Pada waktu bergerak, kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah berjalan, sehingga jalannya meninggalkan bekas. Hewan ini dapat bergerak secara mengagumkan, yaitu memanjat ke pohon tinggi (Tedi, Periyatna. 2006: 38).

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan yang melata, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Departemen Agama, 25).

Tafsir Ibnu Katsier menjelaskan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 164, Allah menunjukkan kejadian langit, tinggi, halus, luasnya di samping bintang, bulan dan mataharinya, kemudian bumi dan semua yang ada di atasnya, bukit dan gunung-Nya, sungai dan lautannya, kota dan dusunnya, hutan dan kebun ladangnya,

dan silih bergantinya malam dengan siang, lambat dan cepatnya atau panjang pendeknya. Juga bahtera yang berjalan di laut membawa segala kepentingan hidup manusia, dan turunnya hujan dari langit untuk menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dan tersebarnya berbagai binatang, mulai dari binatang melata sampai binatang ternak, dan datangnya angin menghalau awan sebagai bukti kekuasaan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal sehat.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 164 menjelaskan bahwa bagi kaum yang memikirkan maka akan mengetahui begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, diantaranya dengan menurunkan air dalam air hujan untuk membasuh kehidupan di bumi agar tidak mengalami kekeringan dan dimanfaatkan pula oleh tumbuhan. Silih bergantinya siang dan malam yang digunakan untuk melakukan aktivitas dan untuk beristirahat. Laut membawa segala kepentingan hidup manusia. Allah menciptakan berbagai macam hewan yang tersebar di muka bumi, mulai dari hewan melata yaitu menggunakan perutnya untuk berjalan maka dalam ayat ini mencakup pula Gastropoda karena hewan ini menggunakan otot perutnya untuk berjalan. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang menyadari.

Kecenderungan dan aktifitas Gastropoda sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut dan keberadaan makanan. Persebaran hewan didasarkan atas dua faktor. Pertama faktor makanan, hewan cenderung akan tinggal di suatu daerah dimana mereka dapat dengan mudah mendapatkan makanan. Faktor yang kedua adalah faktor *barrier*. Barrier sangat mempengaruhi persebaran suatu populasi karena

barrier atau rintangan ini akan menghambat kelangsungan hidup individu atau bahkan populasi tersebut. Gastropoda jantan akan menjaga betina ketika akan melakukan kopulasi. Gastropoda betina akan menghasilkan feromon seks yang akan dikenali oleh jantan. Dan gastropoda jantan mampu membedakan bekas jalur lendir atau mukus yang akan dihasilkan oleh betina atau jantan (Adhim, M. F. 2003: 34).

Gastropoda Mangrove memangsa hewan mikrofagus seperti detritus, sponge, alga, dan mikroorganisme tak bercangkang lainnya. Pada keadaan surut, mangsa-mangsa tersebut terdedah di permukaan substrat sehingga memudahkan gastropoda untuk memangsanya. Faktor kedua yang menstimulus hewan untuk berlokomosi adalah faktor *barrier*. Saat keadaan surut, predator gastropoda yang berupa kepiting sedang tidak aktif. Kepiting aktif pada sore dan malam hari, yaitu saat keadaan substrat berair karena kepiting adalah hewan yang berlokomosi dengan cara berenang dan berjalan (Aditya. 2006: 5).

Kelas Gastropoda (siput, keong, bekicot), rumahnya umumnya berbentuk special. Kaki untuk merayap, bentuk kepala jelas, dengan tentakel dan mata. Dalam ruang bukal (pipi) terdapat redula (pita bergigi). Pernapasan dengan insang, paru-paru, atau keduanya. Hidup di laut, air tawar, dan darat. Kelamin terpisah, atau hermafrodit, ovipar atau avovivipar. Perkembangan tipikal menyangkut larva trokopor dan larva veliger (larva trokofor bersilia). Contoh : bekicot (*Helix aspersa*, enak dimakan), siput laut (*Fissurella* sp, limpet, *Heleotis*, sp), siput air tawar (*Lymnaea javanica*, *Melania* sp) (Mukayat. 1989: 112).

Siput dan siput tak bercangkang termasuk dalam kelas ini. Siput bercangkang tunggal dan spiral. Siput dewasa tidak menunjukkan simetri bilateral tetapi larvanya simetri bilateral. Gastropoda mempunyai lidah yang panjang dan sempit yang ditutupi deretan gigi kecil. Lidahnya disebut radula. Hewan ini mempunyai kepala dan dua pasang tentakel. Pada ujung tentakel terdapat mata. Sebagian besar spesies Gastropoda hidup di laut tetapi beberapa hidup di air tawar bahkan ada yang hidup di darat. Yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru. Siput tak bercangkang dapat ditemukan di laut dan di darat. Warna siput darat sederhana namun siput tak bercangkang yang hidup di laut kebanyakan berwarna menyolok dan indah. Beberapa jenis Gastropoda dapat dimakan. Kebanyakan siput laut memakan pelecypoda. Bekicot termasuk Gastropoda yang merugikan pertanian. Berberapa siput merupakan inang perantara bagi cacing (Aidil, Iman. 2011: 98).

Sebagian besar struktur cangkang siput Gastropoda terbuat dari kalsium karbonat, dan sebagian lainnya terdiri dari phosphate, bahan organik Chorcholin dan air. Siput-siput gastropoda yang hidup di air laut umumnya berbentuk Dekstral. Gastropoda berupa suatu bangunan yang berputar spiral. Bangunan ini terbentuk dari tiga lapisan, dari luar ke dalam, ialah Periostrakum, dari bahan tanduk yang disebut Conchiolin, lapisan prismatic terdiri dari calcit atau arragonit, lapisan mutiara yang terdiri dari CaCO_3 , jernih dan mengkilap (Sembiring. 2012).

Gastropoda merupakan kelas yang terpenting dari filum Mollusca, karena sebagian diantaranya merupakan sumber protein dan bernilai ekonomis tinggi. Kelas Gastropoda terdiri dari tiga subkelas yaitu subkelas Prosobranchs, Opisthobranchs,

dan Pulmonates. Subkelas Prosobranchs dikelompokkan menjadi tiga ordo, yakni : Archeogastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Kelompok Archeogastropoda memiliki *bipectinate* (terdiri atas dua baris insang) dan terbanyak adalah kelompok limpet laut, cangkang kerucut dan narites yang biasanya pemakan lapisan alga. Mesogastropoda yang juga memiliki dua baris insang, terbanyak adalah siput pemangsa (*Littorine* sp. dan *Strombus* sp.) dan pemakan deposit (*deposit feeder*). Neogastropoda adalah kelompok spesialis pemangsa antara lain kelompok Muricidae, Buccinidae, Naticidae, Turridae dan Conidae (*cone shell*) (Eidman dan Yulianda. 1989: 131).

Gastropoda (keong) adalah salah satu kelas dari Mollusca yang diketahui berasosiasi dengan baik terhadap ekosistem lamun. Komunitas Gastropoda merupakan komponen yang penting dalam rantai makanan di padang lamun dimana Gastropoda merupakan hewan dasar pemakan detritus (*detritus feeder*) dan serasah dari daun lamun yang jatuh dan mensirkulasi zat-zat yang tersuspensi di dalam air guna mendapatkan makanan (Tomascik. 1997: 78).

Selain sebagai salah satu komponen yang penting dalam rantai makanan, beberapa jenis Gastropoda juga merupakan keong yang bernilai ekonomis tinggi karena cangkangnya diambil sebagai bahan untuk perhiasan dan cenderamata, sedangkan dagingnya merupakan makanan yang lezat, seperti beberapa jenis keong dari suku Strombidae, Cypraeidae, Olividae, Conidae, dan Tonnidae (Mudjiono dan Sudjoko. 1994: 41).

Bagi masyarakat yang lingkungan alamnya sebagian besar adalah lautan, sumber protein lebih banyak diperoleh dari hewan-hewan yang hidup di laut berupa beberapa jenis ikan, udang, dan beberapa jenis Mollusca. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai bahwa ikan merupakan salah satu pelengkap dalam makanan pokok sehari-hari. Sedangkan jenis Mollusca dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu misalnya pada saat produksi ikan menurun. Sumber protein dari Mollusca telah lama dimanfaatkan, disamping dapat pula disimpan lama jika telah dikeringkan. Cara memperolehnya pun lebih mudah dibanding cara memperoleh ikan (Manuputty, Anna. 1980: 10).

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (Departemen Agama, 124).

Dalam tafsir Al-Maragi menjelaskan air dimaksud adalah air yang di tempat tersebut terdapat ikan, seperti sungai, sumur, kolam, dan lain sebagainya. Binatang buruan yang biasanya hidup di laut dan apa yang dihempaskan oleh laut ke tepinya. Dalam ayat terdahulu Allah SWT telah melarang menghramkan perkara baik-baik yang telah dihalalkan oleh-Nya, kemudian mengecualikan khamr dan judi. Di dalam

ayat ini Allah mengecualikan perkara-perkara yang halal, memburu binatang buruan di waktu ihram dan mewajibkan suatu kewajiban sebagai balasan atas membunuhnya. Kemudian menjelaskan bahwa buruan dan makan laut adalah halal. Ayat ini turun pada tahun diberlakukannya perjanjian Hudaibiyah, pada tahun ketika mereka diuji tidak boleh berburu di waktu ihram. Padahal buruan itu banyak, sehingga meliputi perjalanan mereka dan memungkinkan mereka untuk memburunya, baik diperoleh dengan tangan maupun dipanah.

Surah Al-Maidah ayat 96 telah menjelaskan bahwa begitu banyak nikmat yang disediakan oleh Allah SWT bagi umatnya mulai dari darat sampai lautan, hanya bagaimana cara manusia untuk mencari nikmat tersebut. Sedangkan maksud dari binatang buruan laut yang diperoleh yaitu dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar di pantai.

Mollusca memiliki beberapa manfaat bagi manusia diantaranya sebagai sumber protein, bahan pakan ternak, bahan industri dan perhiasan, bahan pupuk serta bahan untuk obat-obatan. Tetapi, tingginya aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan perairan pantai dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan tersebut. Selain itu, kualitas ekosistem perairan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang berpengaruh diantaranya adalah produsen sebagai sumber makanan dan adanya predator. Sedangkan faktor abiotik adalah fisika kimia air diantaranya adalah suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD) dan kimia (COD), serta substrat.


Penelitian di berbagai tempat bahwa pencemaran yang berlangsung terus menerus mempunyai dampak terhadap biota yang terdapat di perairan. Hal ini terjadi jika laju pengeluaran bahan pencemar melebihi kapasitas pemulihan dari ekosistem perairan penerima (Setyobudiandi. 1996: 49).

C. Tinjauan Umum Langkitang (*Faunus ater*)

Faunus ater merupakan hewan dari kelas Gastropoda yang berjalan dengan bagian kaki perut, bercangkang tunggal yang terpilin membentuk spiral. Sebagian besar cangkangnya terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di bagian luarnya dilapisi periostrakum dan zat kapur. Cangkang *Faunus ater* yang berputar ke arah belakang searah dengan jarum jam disebut dekstral, sebaliknya bila cangkangnya berputar berlawanan arah dengan jarum jam disebut sinistral. *Faunus ater* yang hidup di laut umumnya berbentuk dekstral dan sedikit sekali ditemukan dalam bentuk sinistral (Aqilah, Zalfah. 2012).

Perut yang digunakan untuk berjalan berotot, disebut “kaki”. Kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir guna mempermudah gerakan. Jika hewan ini berjalan, akan meninggalkan bekas dari lendirnya yang mengering. Kepala terletak di depan. Di kepala terdapat sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek. Pada tentakel panjang terdapat bintik mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek berfungsi sebagai indera peraba dan pembau (Tedi, Periyatna. 2006: 54).

Faunus ater mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki *massa visceral* terdapat dalam tubuh, cangkangnya memanjang melengkung dan bentuk spiral, kepalanya dengan satu atau dua pasang tentakel dan pada ujung tentakel terdapat mata, kelaminnya satu (*monoceous*) gonad dengan satu saluran khusus, bersifat ovipar, dan ditemukan hidup di air tawar, air laut maupun di darat (Barnes. 1998: 868). Kepala jelas terlihat, mempunyai satu atau dua pasang tentakel, sepasang di antaranya bersifat retraktil dan dilengkapi sebuah mata pada ujungnya. Organ internal biasanya bersifat simetris dan terletak di dalam cangkangnya yang terpilin, dimana cangkangnya tunggal (Oemardjati dan Wardhana. 1990: 4).



Ketereangan:

1. Kepala (*Chepal*)
2. Mulut (*Radula*)
3. Lingkaran cangkang
4. Cangkang

Gambar 2. 2. Bentuk morfologi *Faunus ater* (Dharma. 1992).

1. Sistematika dari Langkitang (*Faunus ater*)

Menurut (Linnaeus. 1992) adapun klasifikasi dari *Faunus ater* adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Mollusca

Kelas : Gastropoda

Ordo : Discopoda

Family : Thiaridae

Genus : Faunus

Species : *Faunus ater*

2. Sistem Pencernaan

Sistem pencernaan dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk. Di dalam mulut terdapat lidah parut atau radula dengan gigi-gigi kecil dari kitin. Selanjutnya terdapat kerongkongan, kemudian lambung yang bulat, usus halus dan berakhir di anus. *Faunus ater* umumnya pemakan tumbuh-tumbuhan atau disebut hewan herbivore (Rusyana, Adun. 2011: 93).

3. Sistem peredaran darah

Jantung terdapat di dalam cavum pericardi, terdiri atas dua bagian yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Dari ujung ventrikel keluar aorta yang bercabang dua yaitu (1) cabang yang berjalan ke anterior, mensuplai darah bagian tubuh sebelah anterior (kepala) kemudian membelok ke arah ventral menjadi arteri pedalis yang mensuplai darah ke bagian kaki, (2) cabang yang berjalan ke arah posterior

mensuplai darah ke viscera terutama ke daerah pencernaan, ventrikel, dan ovotestes. Arteri bercabang-cabang yang langsung mencapai rongga-rongga darah atau hemocoelom (tidak membentuk kapiler-kapiler). Dari hemocoelom, dikumpulkan kembali melalui sirculus venosus (pembuluh darah yang berjalan melingkar). Sirculus venosus terdiri atas dua (masing-masing mengumpulkan darah dari daerah viscera, daerah kaki dan kepala, kemudian darah diteruskan ke paru-paru untuk melepaskan CO₂ dan menerima oksigen) selanjutnya masuk kembali ke atrium kemudian ke ventrikel. Darahnya mengandung pigmen pernapasan yang berwarna biru (*haemocyanin*) berfungsi untuk meningkatkan oksigen, zat-zat makanan, dan sisa metabolisme (Rusyana, Adun. 2011: 93).

4. Sistem pernapasan dan ekskresi

Faunus ater bernapas dengan paru-paru melalui lubang pada ruang mantel (apertura pulminalis). Jadi, *Faunus ater* bernapas menggunakan lapisan mantel yang berubah fungsi menjadi paru-paru sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Paru-paru ini merupakan modifikasi dari rongga mantel yang kaya akan kapiler-kapiler darah, Sistem pengeluaran (ekskresi) menggunakan alat pengeluaran cair yang disebut nephridia terdapat di dekat jantung dan saluran uretranya terletak di dekat anus (Rusyana, Adun. 2011: 93).

5. Sistem syaraf

Sistem saraf dan sensori pada *Faunus ater* berupa pasangan saraf ganglion dan serebral, saraf kaki, dan saraf organ dalam tubuh. Saraf dari ganglion berhubungan langsung ke seluruh sistem organ. Sensori terdapat pada kedua mata yang terletak

di ujung tentakel panjang. Selain itu, ada sepasang statokis yang terdapat di bawah kaki yang berfungsi untuk keseimbangan dan struktur peraba yang terdapat dalam lapisan epidermis kepala dan kaki (Aidil, Iman. 2011: 52).

6. Sistem Reproduksi

Faunus ater bersifat hermafrodit tetapi melakukan perkawinan silang. Maksudnya, *Faunus ater* ini tetap melakukan perkawinan dengan *Faunus ater* lainnya bukan hanya dengan dirinya sendiri. Sel telur dan spermatozoa dihasilkan oleh satu organ yaitu ovotesis. Jadi ovarium (penghasil ovum) dan testis (penghasil sperma) menjadi satu. Pemasakan sperma dan ovum tidak dalam waktu yang bersamaan. Pada saat kopulasi, sperma disalurkan ke vas deferens kemudian dimasukkan ke vagina pasangannya dengan perantaraan penis yang dikeluarkannya. Ovum yang dihasilkan ovotestes keluar ke saluran telur (oviduk) untuk di buahi sperma hewan lain (Elasani. 2011: 82).

D. Tinjauan Umum Logam Berat

Kelestarian lingkungan menjadi sebuah permasalahan yang global sehingga pabrik ataupun industri diharapkan memberi perhatian untuk meningkatkan teknologi yang tidak menyebabkan suatu pencemaran lingkungan. Tetapi beberapa jenis industri pada saat ini menggunakan logam berat sebagai bahan bakunya, karena logam berat memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat menghantarkan listrik dengan baik dan dapat membentuk alloy dengan logam lain. Namun logam berat selain memberikan manfaat dalam bidang industri, yang menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup terutama manusia. Mengingat resiko yang

ditimbulkan oleh logam berat, maka beberapa cara telah dilakukan untuk mengambil logam berat dari lingkungan perairan, misalnya yang umum digunakan untuk pengendapan logam sebagai hidroksida logam. Namun beberapa logam berat seperti Hg, Pb, Cd tidak dapat mengendap dengan sempurna (Husein, Harun. 1992: 62).

Pemanfaatan laut bagi kesejahteraan manusia semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya populasi manusia. Peningkatan jumlah penduduk dan berbagai aktivitas manusia di kawasan pantai menyebabkan wilayah ini sering digunakan sebagai tempat pembuangan akhir yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah limbah termasuk yang mengandung logam berat sehingga pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan biogeokimia perairan laut terutama di zona pantai. Masalah pencemaran logam berat semakin banyak mendapat perhatian masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini disebabkan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kasus keracunan logam berat (Yeni, W. 2012).

Allah berfirman dalam surah Al Hajj ayat 65 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Departemen Agama R. I. 320).

Dalam tafsir Ibnu Katsier menyatakan bahwa Allah SWT berfirman menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, bahwa Dia telah menundukkan bagi hamba-hamba-Nya, anak Adam di bumi, segala apa yang ada di permukaan maupun yang ada dalam perut bumi ini, dan menundukkan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya serta menhancurkan benda-benda yang ada di langit jatuh ke bumi melainkan dengan seizin-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada umat manusia.

Surah Al Hajj ayat 65 menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi sebagian besar terdiri dari lautan. Dengan kebesaran-Nya, Allah mengatur jarak bumi dari matahari, jarak yang akurat antara bumi dan bulan sedemikian rupa. Sehingga oleh sistem gravitasi bumi, memeluk tanah dan tertunduk di posisinya, serta bersuhu nyaman untuk segala kehidupan yang ada di permukaan maupun lingkungannya. Allah sangat menyayangi ummatnya, olehnya itu sebagai makhluknya kita harus menjaga ciptaan Allah dengan tidak melakukan berbagai macam kerusakan.

Kepadatan penduduk, limbah industri, tata ruang yang salah dan tingginya eksploitasi sumber daya air sangat berpengaruh pada kualitas air. Selain itu, banyak orang yang membuang sampah, kotoran maupun limbah ke sungai. Bahkan, ada cara lain membuang limbah berbahaya dengan menanam di kedalaman beberapa meter. Hal inilah yang menyebabkan semakin memburuknya kualitas air. indikator yang digunakan untuk mendeteksi pencemaran air adalah cemaran logam berat di dalamnya. Disebut logam berat berbahaya karena umumnya memiliki rapat massa tinggi (5 gr/cm^3) dan sejumlah konsentrasi kecil dapat bersifat racun dan berbahaya.

Di antara semua unsur logam berat, Hg menduduki urutan pertama dalam hal sifat racunnya, kemudian diikuti oleh logam berat antara lain Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, dan Zn (Adi. 2009: 7).

Mungkin istilah logam berat sudah tak asing bagi para kimiawan. Dari nomor atom sampai efek fisiologis telah secara rinci dibahas dalam buku-buku kimia terutama kimia anorganik dan kimia lingkungan. Tapi tak demikian dengan orang awam. Mungkin istilah logam berat masih terasa asing di telinga mereka dan didefinisikan secara sederhana saja yaitu logam yang berat (dalam artian ditimbang) seperti besi, baja, aluminium dan tembaga. Terlepas dari definisi di atas, biasanya dalam literatur kimia istilah “logam berat” digunakan untuk memberikan logam-logam yang memiliki sifat toksisitas (racun) pada makhluk hidup. Logam merupakan bahan pertama yang dikenal oleh manusia dan digunakan sebagai alat-alat yang berperan penting dalam sejarah peradaban manusia (Darmono. 1995: 28).

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan atau masuk ke dalam organisme hidup. Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulkan efek-efek khusus pada makhluk hidup. Tidak semua logam berat dapat mengakibatkan keracunan pada makhluk hidup, besi merupakan logam yang dibutuhkan dalam pembentukan pigmen darah dan zink merupakan kofaktor untuk aktifitas enzim. Keberadaan logam berat dalam lingkungan berasal dari dua sumber. Pertama dari proses alamiah seperti pelapukan

secara kimiawi dan kegiatan geokimiawi serta dari tumbuhan dan hewan yang membusuk. Kedua dari hasil aktivitas manusia terutama hasil limbah industri. Dalam neraca global sumber yang berasal dari alam sangat sedikit dibandingkan pembuangan limbah akhir di laut (Palar. 2009: 34).

Kenyataannya pencemaran logam berat memang sangat berbahaya, baik bagi tubuh ataupun lingkungan. Sebagai perhatian terutama bagi pelaku-pelaku industri dan pertambangan yang limbahnya berupa logam berat yang tidak dikelola dengan baik. Selain sebagian besar berasal dari proses industri dan pertambangan, ternyata pencemaran logam berat yang berasal dari alami pun bisa terjadi. Misalnya logam yang dibebaskan dari proses kimiawi dan aktivitas gunung berapi, logam yang ditransportasi oleh ikan dari atmosfer berupa partikel debu, serta dari abrasi pantai. Beberapa jenis logam berat antara lain sebagai berikut : Al (aluminium), Hg (merkuri), Pb (plumbum), Zn (zinc), Cr (chromium), Cu (cufrum), Cd (Cadmium), Co (Cobalt), dan lain sebagainya. Beberapa dari logam berat berdampak negatif terhadap tubuh manusia misalnya timbulnya beberapa penyakit berbahaya. Contohnya saja pada logam berat Merkuri (Hg) (Sastrawijaya. 1991: 98).

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Departemen Agama. R. I. 408).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan dari Ibnu Abbas, ‘Ikrimah, adh-Dhahhak, as-Suddi dan para ahli tafsir lainnya berkata, yang dimaksud dengan lafazh *al-barru* pada ayat 41 adalah padang pasir yang tandus, sedangkan yang dimaksud dengan *al-bahru* adalah kota-kota dan perkamungan. Dalam riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas dan ‘Ikrimah disebutkan, yang dimaksud dengan *al-bahru* dalam ayat ini adalah kota dan perkampungan yang terletak persis di pinggir sungai. Para ulama yang lain berkata, yang dimaksud dengan *al-barru* adalah darat dan *al-bahru* adalah lautan. Zaid bin Rafi’ berkata telah tampak kerusakan di darat dengan terhentinya hujan yang berakibat pada kemarau panjang. Dan juga telah tampak kerusakan di laut dengan kelangkaan hasilnya.

Jika dikaitkan dengan surah Ar-Rum ayat 41 maka dapat diketahui bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan telah mencakupi darat, laut, bahkan manusia, tumbuhan dan hewan. Manusia bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran ini karena polutan berbahaya yang diproduksinya. Masih ada kemungkinan untuk kembali ke ambang batas normal yaitu dengan mengambil tindakan yang tepat dan berhenti mencemari. Tidakkah ayat ini telah menunjukkan bahwa Al-Quran telah lebih dahulu, ribuan tahun sebelum para penggiat lingkungan hidup menyerukan himbauannya, membimbing kita untuk melestarikan lingkungan dan bukan untuk

membuat kerusakan di muka bumi dan mencemarinya setelah Allah menyediakannya bagi kita sebagai tempat hidup. Jika diamati maka sumber pencemar utama adalah transportasi, limbah rumah tangga, limbah tambang, dan limbah industri.

Logam berat akan lebih berbahaya apabila telah tercemar ke lingkungan, misalnya pencemaran logam berat terhadap air. Jenis logam berat yang bisa mencemari air itu salah satunya Cd (Cadmium), Cadmium tercemar dalam air akibat dari proses pertambangan, buangan industri, dan pengelasan logam. Air menjadi tidak layak konsumsi lagi karena sudah tercemar oleh logam berat, apabila dikonsumsi akan berakibat fatal terhadap tubuh misalnya timbul tekanan darah tinggi, kerusakan jaringan ginjal testibuler, dan kerusakan sel-sel darah merah. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan akan berdampak terhadap kehidupan air. Kehidupan air akan sangat terancam apabila logam berat tercemar di sungai, danau, atau laut. Terutama terhadap ikan-ikan yang hidup di sungai yang tercemar logam berat. pengaruh toksisitas Cd, Ni, dan Cr pada morfologi insang ikan salmon. Ikan akan mengalami hipoksia (karena kesulitan mengambil oksigen dari air), sehingga terjadi penebalan pada sel epitel insang dan berakibat ikan kurang mampu berenang (Sanjaya, Teddy. 2006: 69).

Logam berat yang masuk ke sistem perairan, baik di sungai maupun lautan akan dipindahkan dari badan airnya melalui tiga proses yaitu pengendapan, adsorpsi, dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan. Pada saat buangan limbah industri masuk ke dalam suatu perairan maka akan terjadi proses pengendapan dalam sedimen. Hal ini menyebabkan konsentrasi bahan pencemar dalam sedimen

meningkat. Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut. Pengendapan logam berat di suatu perairan terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil dan klorida. Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar perairan dan bersatu dengan sedimen sehingga kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibanding dalam air (Triatmodjo, Bambang. 1999: 47).

Adanya logam berat di perairan memiliki dampak yang berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat, yaitu :

1. Sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai (dihilangkan).
2. Dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan, dan akan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi organisme tersebut.
3. Mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya selalu lebih tinggi dari konsentrasi logam dalam air. Di samping itu sedimen mudah tersuspensi karena pergerakan masa air yang akan melarutkan kembali logam yang dikandungnya ke dalam air, sehingga sedimen menjadi sumber pencemar potensial dalam skala waktu tertentu.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat toksisitas logam berat antara lain suhu, salinitas, pH, dan kesadahan. Penurunan pH dan salinitas perairan menyebabkan toksisitas logam berat semakin besar. Peningkatan suhu menyebabkan

toksisitas logam berat meningkat. Sedangkan kesadahan yang tinggi dapat mengurangi toksisitas logam berat, karena logam berat dalam air dengan kesadahan tinggi membentuk senyawa kompleks yang mengendap dalam air. Tingkat toksisitas logam berat untuk biota perairan dipengaruhi oleh jenis logam, spesies biota, daya permeabilitas biota, dan mekanisme detoksikasi. Logam berat dapat mengumpul (terakumulasi) di dalam tubuh suatu biota dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun. Pada batas dan kadar tertentu semua logam berat dapat menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap biota perairan (Fachrul, Ferianita. 2002: 12).

Polutan yang masuk ke air akan diserap langsung oleh fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen dan sebagai tropik level pertama dalam rantai makanan. Kemudian fitoplankton dimakan zooplankton. Konsentrasi polutan dalam tubuh zooplankton lebih tinggi dibanding dalam tubuh fitoplankton karena zooplankton memangsa fitoplankton sebanyak-banyaknya. Fitoplankton dan zooplankton dimakan oleh ikan-ikan planktivores (pemakan plankton) sebagai tropik level kedua. Ikan planktivores dimangsa oleh ikan karnivores (pemakan ikan atau hewan) sebagai tropik level ketiga, selanjutnya dimangsa oleh ikan predator sebagai tropik level tertinggi (Wijaya, Krisna. 2009: 89).

Kerang juga mengandung logam berat yang tinggi karena cara makannya dengan menyaring air masuk ke dalam insangnya setiap saat dan fitoplankton ikut tertelan. Polutan ikut masuk ke dalam tubuhnya dan terakumulasi terus-menerus dan bahkan bisa melebihi konsentrasi yang di air. Polutan tersebut mengikuti rantai

makanan mulai dari fitoplankton sampai ikan predator dan pada akhirnya sampai ke manusia. Bila polutan ini berada dalam jaringan tubuh organisme laut tersebut dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian dijadikan sebagai bahan makanan maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Makanan yang berasal dari daerah tercemar kemungkinan besar juga tercemar. Demikian juga makanan laut (*seafood*) yang berasal dari pantai dan laut yang tercemar juga mengandung bahan polutan yang tinggi (Wulandari, Dewi. 2009: 6).

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Surah Al A'raf ayat 56-58 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
 مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا
 أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۗ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ
 كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۗ وَبِإِذْنِ
 رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُنصِيفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“(56) Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (57) Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (58) Dan tanah yang baik,

tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Departemen Agama. R. I. 257).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman-Nya, Allah melarang membuat kerusakan di muka bumi. Dan betapa bahayanya setelah sebelumnya Allah memperbaikinya. Sebab jika berbagai urusan telah berjalan dengan benar kemudian terjadi pengrusakan setelah itu maka sangat membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah melarang akan hal itu dan memerintahkan supaya beribadah, berdoa, dan merendah diri kepada-Nya dan tunduk di hadapan-Nya. Yakni takut terhadap apa yang ada di sisi-Nya berupa siksa yang menyakitkan, dan berharap apa yang ada di sisi-Nya berupa pahala yang besar. Dalam tafsir ini pula menjelaskan mula-mula Allah, Dia-lah pencipta langit dan bumi dan bahwa Dia-lah yang memiliki wewenang, yang memutuskan, yang mengatur dan yang menundukkannya. Lalu Dia membimbing para hamba-Nya supaya berdoa kepada-Nya karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu, Allah mengingatkan bahwa Dia-lah yang memberi rezki dan bahwa Dia akan menghidupkan kembali orang yang sudah matipada hari kiamat.


Dalam surah Al A'raf ayat 56-58 menjelaskan bahwa bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung, lembah, sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Hanya saja ada sebagian

kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliyah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi.

Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya. Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, Dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah. Sungguh tidak ada alasan untuk tidak bersyukur.

Unsur-unsur logam berat tersebut biasanya erat kaitannya dengan masalah pencemaran dan toksisitas. Pencemaran yang dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup, biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun (toksisitas) yang tinggi. Limbah industri merupakan salah satu sumber pencemaran logam berat yang potensial bagi perairan. Pembuangan

limbah industri secara terus menerus tidak hanya mencemari lingkungan perairan tetapi menyebabkan terkumpulnya logam berat dalam sedimen dan biota perairan, seperti yang terlihat pada Gambar 2. 3.



Gambar 2. 3. Skema proses alami yang terjadi jika polutan (logam berat) masuk ke lingkungan laut (Environmental Protection Agency, EPA 2005).

Dalam lingkungan perairan ada tiga media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam berat, yaitu air, sedimen dan organisme hidup. Pemakaian organisme laut sebagai indikator pencemaran didasarkan pada kenyataan bahwa alam atau lingkungan yang tidak tercemar akan ditandai oleh kondisi biologi yang seimbang dan mengandung kehidupan yang beranekaragam. Terdapat beberapa pengaruh toksisitas logam pada ikan, pertama pengaruh toksisitas logam pada insang. Insang selain sebagai alat pernafasan juga digunakan sebagai alat pengaturan tekanan antara air dan dalam tubuh ikan (osmoregulasi). Oleh sebab itu insang merupakan organ yang penting pada ikan dan sangat peka terhadap pengaruh toksisitas logam (Adi. 2009: 9).

a. Kandungan Logam Berat Dalam Air

Air merupakan elemen penting bagi kehidupan organisme perairan. Untuk menjaga kualitas perairan yang mendukung kehidupan berbagai organisme maka diperlukan suatu pengontrolan dari berbagai aktifitas manusia yang memanfaatkan perairan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kegiatan manusia yang memanfaatkan perairan adalah kegiatan industri. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa hasil buangan akhir dari sebuah pabrik atau kegiatan industri bermuara ke perairan disekitarnya, meskipun perusahaan atau pabrik tersebut telah memiliki IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Air buangan yang telah di olah tidak terlepas akan sisa atau residu yang mengandung bahan berbahaya bagi kehidupan perairan baik dalam kadar yang banyak atau sedikit (Mukono. 2001: 47).

Konsentrasi bahan pencemar yang masuk ke perairan bisa mempengaruhi kehidupan organisme terutama yang menjadi topik disini adalah spesies ikan. Salah satu jenis unsur kimia yang bisa menyebabkan terjadi kerusakan ekosistem perairan adalah unsur logam berat. Sebagaimana diketahui unsur logam berat yang masuk ke perairan berasal dari berbagai kegiatan industri selain bersumber dari alam sendiri. Untuk itu sangat diperlukan suatu kajian yang melihat seberapa besar pengaruh unsur-unsur logam berat tersebut bisa mempengaruhi ekosistem perairan terutama yang berhubungan langsung dengan kualitas airnya (Darmono. 2001: 49).

Tabel 2. 1. Standar baku mutu air terhadap logam berat (EPA. 2002).

Logam	Simbol	Standar Baku	
		Perikanan (mg/l) ¹	EPA (ppm) ²
Kadmium	Cd	0,01	0,0043
Krom	Cr	0,05	0,016
Timbal	Pb	0,01	0,065
Seng	Zn	0,02	0,12
Merkuri	Hg	0,002	0,0014

Keterangan :

1. PP No 82 tahun 2001
2. Environmental Protection Agency (EPA. 2002) Water Quality Criteria

Logam berat biasanya sangat sedikit dalam air secara ilmiah kurang dari 1 g/l. Menurut Palar (2009) kelarutan dari unsur-unsur logam dan logam berat dalam badan air dikontrol oleh : (1) pH badan air, (2) jenis dan konsentrasi logam (3) keadaan komponen mineral teroksida dan sistem berlingkungan redoks. Logam berat yang dilimpahkan ke perairan, baik di sungai ataupun laut akan dipindahkan dari badan airnya melalui beberapa proses yaitu : pengendapan, adsorpsi dan absorpsi oleh organisme perairan. Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan

organik dan mengendap di dasar perairan dan bersatu dengan sedimen sehingga kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan dalam air (Harahap. 1991). Berdasarkan peraturan pemerintah kandungan logam berat yang boleh masuk ke perairan laut mempunyai batasan.

Tabel 2. 2. Kriteria baku mutu air laut untuk biota laut (MENKLH. 2004)

Parameter	Satuan Baku	Mutu
Merkuri (Hg)	mg/l	0,01
Kadmium (Cd)	mg/l	0,001
Timbal (Pb)	mg/l	0,008

Sastrawijaya (1991) menyatakan walaupun terjadi peningkatan sumber logam berat, namun konsentrasinya dalam air dapat berubah setiap saat. Hal ini terkait dengan berbagai macam proses yang dialami oleh senyawa tersebut selama dalam kolom air. Parameter yang mempengaruhi konsentrasi logam berat di perairan adalah suhu, salinitas, arus, pH dan padatan tersuspensi total atau seston. Dengan sendirinya interaksi dari faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap fluktuasi konsentrasi logam berat dalam air, karena sebagian logam berat tersebut akan masuk ke dalam sedimen.

b. Kandungan Logam Berat Dalam Sedimen

Sedimen merupakan tempat tinggal tumbuhan dan hewan yang ada di dasar. Sedimen terdiri dari bahan organik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang membusuk kemudian tenggelam ke dasar dan bercampur dengan lumpur dan bahan anorganik yang umumnya berasal dari pelapukan batuan. Kebanyakan perairan pesisir didominasi oleh substrat lunak. Substrat lumpur berasal dari sedimen yang

terbawa oleh sungai ke perairan pesisir. Air sungai mengangkut partikel lumpur dalam bentuk suspensi, ketika partikel mencapai muara dan bercampur dengan air laut, partikel lumpur akan membentuk partikel yang lebih besar dan mengendap di dasar perairan (Desi, Natsar. 2006: 15).

Sedimen estuaria adalah secara fisiologis merupakan lingkungan yang kaku untuk kebanyakan invertebrata karena range kadar garamnya (14 ± 30 0/00), fluktuasi temperatur dan pasang surut. Banyak spesies yang umum digunakan dalam pengujian toksisitas di perairan laut dan tawar, tidak sesuai untuk mengukur toksisitas sedimen di estuaria karena toleransi kadar garam yang sempit atau tidak ada spesies endemik di estuaria. Karakteristik perbedaan sedimen ikut berperan pada pola penyebaran dari konsentrasi logam di dasar perairan. Sedimen laut menurut asalnya diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu *lythogenous*, *biogenous* dan *hydrogenous*. *Lythogenous* adalah sedimen yang berasal dari batuan, umumnya berupa mineral silikat yang berasal dari pelapukan batuan. *Biogenous* adalah sedimen yang berasal dari organisme berupa sisa-sisa tulang, gigi atau cangkang organisme, sedangkan *hydrogenous* merupakan sedimen yang terbentuk karena reaksi kimia yang terjadi di laut (Adrian. 2004: 13).

Karakteristik sedimen akan mempengaruhi morfologi, fungsional, tingkah laku serta nutrien hewan benthos. Hewan benthos seperti bivalva dan gastropoda beradaptasi sesuai dengan tipe substratnya. Adaptasi terhadap substrat ini akan menentukan morfologi, cara makan dan adaptasi fisiologis organisme terhadap suhu, salinitas serta faktor kimia lainnya. Disamping tipe substrat, ukuran partikel sedimen

juga berperan penting dalam menentukan jenis benthos laut. Partikel sedimen mempunyai ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kasar sampai halus (Adrian. 2004: 15).

Sedimen terdiri dari beberapa komponen bahkan tidak sedikit sedimen yang merupakan pencampuran dari komponen-komponen tersebut. Adapun komponen itu bervariasi, tergantung dari lokasi, kedalaman dan geologi dasar. Pada saat buangan limbah industri masuk ke dalam suatu perairan maka akan terjadi proses pengendapan dalam sedimen. Hal ini menyebabkan konsentrasi bahan pencemar dalam sedimen meningkat.

Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut. Pengendapan logam berat di suatu perairan terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil dan klorida. Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar perairan dan bersatu dengan sedimen sehingga kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibanding dalam air (Husein, Harun. 1992: 62).

Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat dan mengendap di dasar perairan dan bersatu dengan sedimen, oleh karena itu kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan dalam air (Wardhana. 1995: 41). Konsentrasi logam berat pada sedimen tergantung pada beberapa faktor yang berinteraksi. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Sumber dari mineral sedimen antara sumber alami atau hasil aktifitas manusia.
Melalui partikel pada lapisan permukaan atau lapisan dasar sedimen.
2. Melalui partikel yang terbawa sampai ke lapisan dasar.
3. Melalui penyerapan dari logam berat terlarut dari air yang bersentuhan.

Beberapa material yang terkonsentrasi di udara dan permukaan air mengalami oksidasi, radiasi ultraviolet, evaporasi dan polymerisasi. Jika tidak mengalami proses pelarutan, material ini akan saling berikatan dan bertambah berat sehingga tenggelam dan menyatu dalam sedimen. Logam berat yang diadsorpsi oleh partikel tersuspensi akan menuju dasar perairan, menyebabkan kandungan logam di air menjadi lebih rendah. Hal ini tidak menguntungkan bagi organisme yang hidup di dasar seperti *oyster* dan kepiting sebagai *filter feeder*, partikel sedimen ini akan masuk ke dalam sistem pencernaannya (Sugiharto. 1997: 38).

Logam berat yang masuk ke sistem perairan, baik di sungai maupun lautan akan dipindahkan dari badan airnya melalui tiga proses yaitu pengendapan, adsorpsi, dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan. Dalam lingkungan perairan, bentuk logam antara lain berupa ion-ion bebas, pasangan ion organik, dan ion kompleks. Kelarutan logam dalam air dikontrol oleh pH air. Kenaikan pH menurunkan kelarutan logam dalam air, karena kenaikan pH mengubah kestabilan dari bentuk karbonat menjadi hidroksida yang membentuk ikatan dengan partikel pada badan air, sehingga akan mengendap membentuk lumpur (Palar. 2004). Selain itu, kenaikan suhu air laut dan penurunan pH akan mengurangi adsorpsi senyawa logam berat pada partikulat. Suhu air laut yang lebih dingin akan meningkatkan adsorpsi logam berat ke partikulat

untuk mengendap di dasar laut. Sementara saat suhu air laut naik, senyawa logam berat akan melarut di air laut karena penurunan laju adsorpsi ke dalam partikulat. Logam yang memiliki kelarutan yang kecil akan ditemukan di permukaan air laut selanjutnya dengan perpindahan dan waktu tertentu akan mengendap hingga ke dasar laut, artinya logam tersebut hanya akan berada di dekat permukaan air laut dalam waktu yang sesaat saja untuk kemudian mengendap lagi. Hal ini ditentukan antara lain oleh massa jenis air laut, viskositas (kekentalan) air laut, temperatur air laut, arus serta faktor-faktor lainnya.

Daya larut logam berat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada kondisi lingkungan perairan. Pada daerah yang kekurangan oksigen, misalnya akibat kontaminasi bahan-bahan organik, daya larut logam berat akan menjadi lebih rendah dan mudah mengendap. Logam berat seperti Zn, Cu, Cd, Pb, Hg dan Ag akan sulit terlarut dalam kondisi perairan yang anoksik (Sandy. 1996: 29). Logam berat yang terlarut dalam air akan berpindah ke dalam sedimen jika berikatan dengan materi organik bebas atau materi organik yang melapisi permukaan sedimen, dan penyerapan langsung oleh permukaan partikel sedimen (Mukono. 2002: 36).

Kandungan logam berat pada sedimen umumnya rendah pada musim kemarau dan tinggi pada musim penghujan. Penyebab tingginya kadar logam berat dalam sedimen pada musim penghujan kemungkinan disebabkan oleh tingginya laju erosi pada permukaan tanah yang terbawa ke dalam badan sungai, sehingga sedimen dalam sungai yang diduga mengandung logam berat akan terbawa oleh arus sungai menuju muara dan pada akhirnya terjadi proses sedimentasi (Desi, Natsar. 2006: 18).

Mengendapnya logam berat bersama-sama dengan padatan tersuspensi akan mempengaruhi kualitas sedimen di dasar perairan dan juga perairan sekitarnya. Kekuatan ionik yang terdapat di air laut disebabkan adanya berbagai kandungan anion dan kation pada air laut, sehingga memungkinkan terjadinya proses koagulasi (penggumpalan) senyawa logam berat yang ada dan memungkinkan terjadinya proses sedimentasi (pengendapan). Jika kapasitas angkut sedimen cukup besar, maka sedimen di dasar perairan akan terangkat dan dipindahkan. Sesuai teori gravitasi, apabila partikulat memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air laut maka partikulat akan mengendap di dasar laut atau terjadi proses sedimentasi (Eidman. 1998: 52).

Menurut Natsari Desi (2006) konsentrasi logam berat tertinggi terdapat dalam sedimen yang berupa lumpur, tanah liat, pasir berlumpur dan campuran dari ketiganya dibandingkan dengan yang berupa pasir murni. Hal ini sebagai akibat dari adanya gaya tarik elektro kimia partikel sedimen dengan partikel mineral, pengikatan oleh partikel organik dan pengikatan oleh sekresi lendir organisme.

c. Kandungan Logam Berat Dalam Tubuh Organisme

Darmono (2001) logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu: saluran pernafasan, pencernaan dan penetrasi melalui kulit. Di dalam tubuh hewan logam diabsorpsi darah, berikatan dengan protein darah yang kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Akumulasi logam yang tertinggi biasanya dalam detoksikasi (hati) dan ekskresi (ginjal). Akumulasi logam

berat dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam berat dalam air/lingkungan, suhu, keadaan spesies dan aktifitas fisiologis.

Bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami tiga macam proses akumulasi yaitu fisik, kimia dan biologis. Buangan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dengan toksisitas yang tinggi dan kemampuan biota untuk menimbun logam bahan pencemar mengakibatkan bahan pencemar langsung terakumulasi secara fisik dan kimia lalu mengendap di dasar laut. Melalui rantai makanan terjadi metabolisme bahan berbahaya secara biologis dan akhirnya akan mempengaruhi kesehatan manusia. Akumulasi melalui proses biologis inilah yang disebut dengan bioakumulasi (Sugiharto. 1997:38).

Bahan Pencemar (racun) masuk ke tubuh organisme seperti pada *Faunus ater* melalui proses absorpsi. Absorpsi merupakan proses perpindahan racun dari tempat hidupnya atau tempat absorpsinya ke dalam sirkulasi darah. Absorpsi, distribusi dan ekskresi bahan pencemar tidak dapat terjadi tanpa transpor melintasi membran. Proses transportasi dapat berlangsung dengan 2 cara : transpor pasif (yaitu melalui proses difusi) dan transpor aktif (yaitu dengan sistem transport khusus, dalam hal ini zat lazimnya terikat pada molekul pengemban) (Hutagalung. 1998).

Peristiwa timbulnya pengaruh berbahaya atau efek toksik racun atas makhluk hidup, melalui beberapa proses. Pertama kali makhluk hidup mengalami pemejanan dengan racun. Berikutnya, setelah mengalami absorpsi dari tempat pemejanannya, racun atau metabolitnya kan terdistribusi ke tempat aksi (sel sasaran atau reseptor) tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Ditempat aksi ini, kemudian terjadi

interaksi antara racun atau metabolitnya dan komponen penyusun sel sasaran atau reseptor. Dan sebagai akibat sederetan peristiwa biokimia dan biofisika berikutnya, akhirnya timbul pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Ketoksikan racun ditentukan oleh keberadaan racun ditempat aksi, dan keadaan ini bergantung pada keefektifan absorpsi, distribusi dan eliminasi racun tersebut. Keefektifan absorpsi racun menentukan kecepatan dan kadar atau jumlah racun yang ada dalam sirkulasi darah. Keefektifan distribusi menentukan kecepatan dan kadar jumlah racun yang ada dalam tempat aksi tertentu. Dan keefektifan eliminasi, menentukan kadar atau jumlah racun dan lama tinggal racun di tempat aksinya (Sastrawijaya. 1991: 74).

E. Tinjauan Umum Timbal (Pb)

Timbal merupakan logam berat yang sangat beracun, dapat dideteksi secara praktis pada seluruh benda mati di lingkungan dan seluruh sistem biologis. Timbal adalah sejenis logam yang lunak dan berwarna coklat kehitaman, serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Dalam pertambangan, logam ini berbentuk sulfida logam (PbS), yang sering disebut *galena*. Di perairan alami timbal bersumber dari batuan kapur dan *galena* (Surani. 2002: 52).

Ada beberapa sifat-sifat timbal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki titik cair rendah sehingga jika digunakan dalam bentuk cair hanya membutuhkan teknik yang cukup sederhana dan tidak mahal.
2. Merupakan logam yang lunak sehingga mudah diubah menjadi berbagai bentuk.

3. Timbal dapat membentuk logam campuran (*alloy*) dengan logam lainnya, dan logam yang terbentuk mempunyai sifat yang berbeda dengan timbal murni.
4. Memiliki densitas yang tinggi dibanding logam lain kecuali emas dan merkuri, yaitu 11,34 gr/cm³ (Fardiaz. 1992: 39).

Sumber utama timbal yang digunakan sebagai bahan aditif bensin berasal dari komponen gugus alkil timbal, kurang lebih 75% timbal yang ditambahkan pada bahan bakar minyak akan diemisikan kembali ke atmosfer. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pencemaran udara disebabkan oleh timbal. Timbal ini dapat memasuki perairan melalui air hujan yang turun (Khopkar. 1990: 27).

Logam Pb yang terkandung dalam bensin ini sangatlah berbahaya, sebab pembakaran bensin akan mengemisikan 0,09 gram timbal tiap 1 km. Bila setiap harinya 1 juta unit kendaraan bermotor yang bergerak sejauh 15 km akan mengemisikan 1,35 ton Pb/hari. Efek yang ditimbulkan tidak main-main. Salah satunya yaitu kemunduran IQ dan kerusakan otak yang ditimbulkan dari emisi timbal ini. Pada orang dewasa umumnya ciri-ciri keracunan timbal adalah pusing, kehilangan selera, sakit kepala, anemia, sukar tidur, lemah, dan keguguran kandungan. Selain itu timbal berbahaya karena dapat mengakibatkan perubahan bentuk dan ukuran sel darah merah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi (Surani. 2002, 56).

Penggunaan timbal terbesar lainnya adalah dalam produksi baterai penyimpan untuk mobil. Selain itu timbal juga digunakan untuk produk-produk logam seperti amunisi, pelapis kabel, pipa, solder, bahan kimia dan pewarna. Timbal juga

digunakan sebagai pigmen timbal dalam cat. Timbal pada perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi. Timbal relatif dapat larut dalam air dengan pH < 5 dimana air yang bersentuhan dengan timah hitam dalam suatu periode waktu dapat mengandung > 1 µg Pb/l, sedangkan batas kandungan dalam air minum adalah 50 µg Pb/l. Kadar dan toksisitas timbal diperairan dipengaruhi oleh kesadahan, pH, alkalinitas, dan kadar oksigen (Lu, FC. 1995: 64).


Dinas Peternakan dan Kelautan DKI Jakarta (2004) melaporkan beberapa jenis makanan yang mengandung kadar timbal tinggi. Beberapa jenis makanan itu adalah makanan kaleng (50100 µg/kg) jeroan, hati, ginjal, dari hasil ternak (150 µg/kg) ikan (170 µg/kg) dan kelompok yang paling tinggi kadar timbalnya adalah kerang-kerangan (Mollusca) dan udang-udangan (250 µg/kg). Sedangkan jenis makanan yang tergolong rendah derajat kontaminasi timbal adalah susu sapi, buah-buahan, sayuran dan biji-bijian (1520 µg/kg). Konsumsi mingguan elemen timbal yang direkomendasikan oleh WHO toleransinya bagi orang dewasa adalah 50 µg/kg berat badan dan untuk bayi atau anak-anak 25 µg/kg berat badan (Noor. 2002: 58).

Pengaruh toksisitas akut timbal jarang ditemui, tetapi pengaruh toksisitas kronik paling sering ditemukan. Pengaruh toksisitas kronis sering dijumpai pada pekerja tambang dan pabrik pemurnian logam, pabrik mobil (proses pengecatan), penyimpanan baterai, percetakan, pelapisan logam dan pengecatan sistem semprot (Darmono. 1995: 41).

Dalam kaitan dengan cat, ada beberapa nama yang sering disebut-sebut, yaitu VOC dan timbal. Cat, sebagai material yang berfungsi sebagai pelapis, memang dibuat dari bahan-bahan yang berbahaya bila kandungannya melebihi nilai ambang batas yang diperbolehkan. Salah satu bahan yang berbahaya adalah VOC (volatile organic compound) atau kandungan senyawa organik yang mudah menguap. Yang termasuk dalam kategori VOC di antaranya solvent dan tiner. VOC ditandai dengan bau. Solvent yang ada dalam kandungan cat akan menguap setelah cat diaplikasikan. Setelah solvent menguap, cat akan mengering dan membentuk lapisan di permukaan benda. Karena itu cat yang sudah diaplikasikan pada dinding dan sudah mengering, sebenarnya sudah tidak lagi mengandung solvent (Hiyoto, Rajawali. 2012).

Tapi gas atau uap yang dihasilkan tersebut membutuhkan waktu untuk benar-benar hilang dari udara di dalam ruang yang baru dicat. Uap solvent yang menyebar di udara ini bisa mencemari lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan bila terhirup secara berlebihan. Selain VOC, bahan berbahaya lainnya yang terkandung dalam cat adalah timbal. Timbal sering digunakan dalam campuran cat untuk menghasilkan warna-warna cerah. Timbal ini terkandung di dalam pigmen, yaitu bahan untuk memberi warna pada cat. Biasanya penambahan timbal ini berlaku untuk cat minyak. Timbal bisa menyebabkan gangguan sistem saraf dan organ reproduksi. Pada tubuh anak-anak, timbal yang melebihi ambang batas akan memengaruhi tingkat kecerdasan dan perilaku (Hiyoto, Rajawali. 2012).

Mekanisme masuknya timbal ke dalam tubuh manusia dapat melalui sistem pernafasan, oral, ataupun langsung melalui permukaan kulit. Akumulasi Timbal dalam tubuh manusia dapat dilihat pada Gambar 2. 4.



Gambar 2. 4. Akumulasi Timbal dalam Tubuh Manusia (Riyadina. 1997).

Kira-kira 40% dari timbal yang masuk melalui pernafasan, diabsorbsi sampai ke saluran pernafasan. Sekitar 5-10% dari senyawa timbal yang masuk diserap oleh saluran gastrointestinal. Timbal yang masuk melalui makanan, masuk ke saluran cerna, dan dapat masuk ke dalam darah. Pada anak-anak, tingkat penyerapan timbal mencapai 53%. Hal ini jauh berbeda pada tingkat penyerapan orang dewasa, yaitu sekitar 10%. Defisiensi besi (Fe) dan Kalsium (Ca) serta diet lemak tinggi dapat meningkatkan absorpsi timbal gastrointestinal. Peningkatan asam lambung dapat meningkatkan absorpsi usus sehingga absorpsi timbal juga meningkat (Riyadina.1997).

Timbal yang diabsorpsi oleh tubuh akan mengikat gugus aktif dari enzim ALAD (*Amino Levulinic Acid Dehidratase*), dimana enzim ini berfungsi pada sintesa sel darah merah. Adanya senyawa timbal akan mengganggu kerja enzim ini sehingga sintesa sel darah merah menjadi terganggu (Palar. 1994). Timbal juga akan didistribusikan ke darah, cairan ekstraselular, dan beberapa tempat deposit. Tempat deposit timbal berada di jaringan lunak (hati, ginjal, dan syaraf) dan jaringan mineral (tulang dan gigi). Timbal yang terakumulasi dalam skeleton (tulang) diperkirakan sekitar 90% dari jumlah keseluruhan. Tulang berfungsi sebagai tempat penyimpanan karena sifat ion Pb^{2+} yang hampir sama dengan Ca^{2+} . Pb^{2+} yang berkumpul dalam skeleton kemungkinan dapat diremobilisasi ke bagian-bagian tubuh lainnya lama setelah absorpsi awal (Fardiaz. 2001).

Waktu paruh timbal secara biologi dalam tulang manusia diperkirakan 2-3 tahun. Timbal dalam darah akan dapat dideteksi dalam waktu paruh sekitar 20 hari, sedangkan ekskresi timbal dalam tubuh secara keseluruhan terjadi dalam waktu paruh sekitar 28 hari. Dari darah dan tempat deposit, timbal kemudian diekskresikan melalui *urine*, *faeces*, dan keringat (Riyadina. 1997).

Kadar maksimum Pb yang masih dianggap aman dalam darah anak-anak sesuai dengan yang diperkenankan WHO dalam Depkes (2001) adalah 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$ darah, sedangkan untuk orang dewasa adalah 10-25 $\mu\text{g}/\text{dl}$ darah. Tingkat keparahan akibat timbal pada orang dewasa digolongkan menjadi 4 kategori (lihat Tabel 2. 1).

Tabel 2. 3. Empat Kategori Timbal dalam Darah Orang Dewasa (Depkes, 2001)

Kategori	D (tingkat bahaya)	Deskripsi
A (normal)	< 40	Tidak terkena paparan atau tingkat paparan normal.
B (dapat ditoleransi)	40 – 80	Pertambahan penyerapan dari keadaan terpapar tetapi masih bisa ditoleransi.
C (berlebih)	80 – 120	Kenaikan penyerapan dari keterpaparan yang banyak dan mulai memperlihatkan tanda-tanda keracunan.
D (tingkat bahaya)	> 120	Penyerapan mencapai tingkat bahaya dengan tanda-tanda keracunan ringan sampai berat.

Masuknya timbal secara berlebihan ke dalam tubuh, dapat mengakibatkan keracunan. Keracunan oleh persenyawaan timbal disebut juga *plumbism* (Darmono, 2001, 49). Besarnya tingkat keracunan timbal menurut WHO (1998) dalam Naria (1999) dipengaruhi oleh:

1. Umur. Anak-anak mengabsorpsi timbal lebih banyak dari orang dewasa. Anak-anak juga lebih rentan sehingga dapat terjadi efek keracunan pada kandungan timbal yang rendah dalam darah.
2. Jenis kelamin. Wanita lebih rentan dibandingkan dengan pria.
3. Musim panas akan meningkatkan daya racun timbal.
4. Peningkatan asam lambung akan meningkatkan absorpsi timbal.
5. Peminum alkohol lebih rentan terhadap timbal.

Logam Pb secara alami tersebar luas pada batu-batuan dan lapisan kerak bumi. Logam ini termasuk ke dalam kelompok logam-logam golongan IV-A dengan nomor atom 82 dan bobot 207,2. Penyebaran logam Pb di bumi sangat sedikit yaitu 0,0002% dari seluruh lapisan bumi. Logam Pb terdapat di perairan baik secara alamiah ataupun sebagai dampak dari aktifitas manusia. Logam ini masuk ke perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Di samping itu, proses korosifikasi dari batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber Pb yang akan masuk ke dalam perairan (Palar, 2004, 62).

Timbal dan persenyawaannya digunakan dalam industri baterai sebagai bahan yang aktif dalam pengaliran arus elektron. Kemampuan timbal dalam membentuk alloy dengan logam lain telah dimanfaatkan untuk meningkatkan sifat metalurgi ini dalam penerapan yang sangat luas, contohnya digunakan untuk kabel listrik, konstruksi pabrik-pabrik kimia, kontainer dan memiliki kemampuan tinggi untuk tidak mengalami korosi (Palar, 2004). Selain itu, Pb dapat digunakan sebagai zat tambahan bahan bakar dan pigmen timbal dalam cat yang merupakan penyebab utama peningkatan kadar Pb di lingkungan (Darmono, 1995). Hampir 10 % dari total produksi tambang logam timbal digunakan untuk pembuatan *tetra ethyl lead* atau TEL yang dibutuhkan sebagai bahan penolong dalam proses produksi bahan bakar bensin karena dapat mendongkrak (*boosting*) nilai oktan bahan bakar sekaligus berfungsi sebagai *antiknocking* untuk mencegah terjadinya ledakan saat berlangsungnya pembakaran dalam mesin.

Konsentrasi Pb yang mencapai 188 mg/l, dapat membunuh ikan. Sedangkan Crustacea setelah 245 jam akan mengalami kematian, apabila pada badan air konsentrasi Pb adalah 2,75 - 49 mg/l (Palar, 2004). Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) No. 03725/B/SK/VII/89 membatasi kandungan logam berat Pb maksimum pada sumberdaya ikan dan olahannya adalah adalah 2,0 ppm atau 2.0 mg/kg. Untuk batas maksimum cemaran logam berat dalam makanan menurut Depkes RI (2001) pada Tabel 2. 2.

Tabel 2. 4. Batas maksimum cemaran logam berat dalam makanan (Depkes RI, 2001)

Parameter	Satuan	Batas Maksimum
Merkuri (Hg)	$\mu\text{g/kg}$	500
Kadmium (Cd)	$\mu\text{g/kg}$	1000
Timbal (Pb)	$\mu\text{g/kg}$	2000

Standar Nasional Indonesia (SNI) menetapkan istilah dan defenisi, persyaratan logam berat dalam pangan dan batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan tercemar adalah pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Pangan yang mengandung cemaran

yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia atau pangan yang kadaluwarsa. Cemaran adalah bahan yang keberadaannya dalam pangan tidak dikehendaki dan mungkin ada sebagai akibat dari berbagai tahapan sejak dari bahan baku, proses, produksi, pengemasan, transportasi atau dari kontaminasi lingkungan. Logam berat adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi dan bersifat beracun bagi makhluk hidup. Sedang batas maksimum adalah cemaran logam berat yang diizinkan atau direkomendasikan dapat diterima dalam pangan.

Tabel 2. 5. Batas maksimum cemaran timbal (Pb) dalam pangan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI, 2008).

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas maksimum
01.0	Produk susu	0.02 mg/kg
02.0	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	
	Lemak dan minyak nabati	0.1 mg/kg
	Lemak minyak hewani	0.1 mg/kg
	Mentega	0.1 mg/kg
	Margarin	0.1 mg/kg
	Minarin	0.1 mg/kg
04.0	Buah dan sayuran (termasuk jamur, umbi, kacang, termasuk kacang kedelai dan lidah buaya), rumput laut dan biji-bijian	
	Buah dan sayuran serta hasil olahannya	0.5 mg/kg
	Pasta tomat	1.0 mg/kg
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	
	Kembang gula/permen dan cokelat	1.0 mg/kg

06.0	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang dan empelur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2	
	Serealia dan produk serealia	0.3 mg/kg
	Tepung terigu	1.0 mg/kg
07.0	Produk bakeri	
	Produk bakeri	0.5 mg/kg
08.0	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	
	Daging dan hasil olahannya	1.0 mg/kg
	Jeroan sapi, babi, kambing, unggas	1.0 mg/kg
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk Mollusca, Crustacea, dan Echinodermata serta Amfibi dan Reptil	
	Ikan dan hasil olahannya	0.3 mg/kg
	Ikan predator misalnya cucut, tuna, marlin, dan lainnya	0.4 mg/kg
	Mollusca, Keckerangan (Bivalvia), Gastropoda dan teripang	1.5 mg/kg
	Crustacea dan Udang lainnya	0.5 mg/kg
	Terasi	1.0 mg/kg
11.0	Pemanis termasuk madu	
	Madu	2.0 mg/kg
12.0	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	
	Garam	10.0 mg/kg
	Rempah/bumbu	7.0 mg/kg
	Kecap	1.0 mg/kg
	Ragi	5.0 mg/kg
	Saus	1.0 mg/kg
13.0	Produk pangan untuk keperluan gizi khusus	
	Susu formula bayi	0.02 mg/kg
	Susu formula lanjutan	0.02 mg/kg
	Makanan pendamping ASI siap santap	0.3 mg/kg
	Makanan pendamping ASI biscuit	0.3 mg/kg
	Makanan pendamping ASI siap masak	1.14 mg/kg
	Makanan pendamping ASI bubuk instan	1.14 mg/kg
14.0	Minuman, tidak termasuk produk susu	
	Air mineral alami	0.01 mg/kg
	Air minum dalam kemasan	0.005 mg/kg
	Sari buah dan nectar buah	0.2 mg/kg
	Sari buah dan konsentrat	1.0 mg/kg
	Sirup	1.0 mg/kg

	Minuman ringan	0.2 mg/kg
	Minuman bubuk	1.0 mg/kg
	Minuman beralkhol	0.2 mg/kg
	Kopi bubuk	2.0 mg/kg
	Teh	2.0 mg/kg

F. Dampak Timbal (Pb) pada Kesehatan

Dampak keracunan timbal dapat mengakibatkan terhambatnya pembentukan hemoglobin, gangguan ginjal, otak, hati, sistem reproduksi, dan sistem saraf sentral. Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan mental pada anak-anak. Ketika unsur ini mengikat kuat sejumlah molekul asam amino, haemoglobin, enzim, RNA, dan DNA maka akan mengganggu saluran metabolik dalam tubuh. Keracunan Pb dapat juga mengakibatkan gangguan sintesis darah, hipertensi, hiperaktivitas, dan kerusakan otak (Darmono. 1995: 46).

Timbal merupakan racun syaraf (neuro toxin) yang bersifat kumulatif, destruktif dan kontinu pada sistem haemofilik, kardio-vaskuler dan ginjal. Anak yang telah menderita tokisisitas timbal cenderung menunjukkan gejala hiperaktif, mudah bosan, mudah terpengaruh, sulit ber-konsentrasi terhadap lingkungannya termasuk pada pelajaran, serta akan mengalami gangguan pada masa dewasanya nanti yaitu anak menjadi lamban dalam berfikir, biasanya orang akan mengalami keracunan timbal bila ia mengonsumsi timbal sekitar 0,2 sampai 2mg/hari (Winarno. 1993: 48).

Menurut (Darmono. 1995) berikut dampak logam Pb pada kesehatan:

a. Sistem Syaraf dan Kecerdasan

Efek Pb terhadap sistem syaraf telah diketahui, terutama dalam studi kesehatan kerja dimana pekerja yang terpajan kadar timbal yang tinggi dilaporkan menderita gejala kehilangan nafsu makan, depresi, kelelahan, sakit kepala, mudah lupa, dan pusing. Efek timbal terhadap kecerdasan anak memiliki efek menurunkan IQ bahkan pada tingkat pajanan rendah. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa kenaikan kadar timbal dalam darah di atas 20 µg/dl dapat mengakibatkan penurunan IQ sebesar 2-5 poin.

b. Efek Sistemik

Kandungan Pb dalam darah yang terlalu tinggi (toksitas timbal yakni di atas 30 µg/dl) dapat menyebabkan efek sistemik lainnya adalah gejala gastro-intestinal. Keracunan timbal dapat berakibat sakit perut, konstipasi, kram, mual, muntah, anoreksia, dan kehilangan berat badan. Pb juga dapat meningkatkan tekanan darah. Intinya timbal ini dapat merusak fungsi organ.

c. Efek Terhadap Reproduksi

Pajanan Pb pada wanita di masa kehamilan telah dilaporkan dapat memperbesar resiko keguguran, kematian bayi dalam kandungan, dan kelahiran prematur. Pada wanita hamil yang terpapar, timbal melewati plasenta wanita hamil tersebut yang dapat menyebabkan janin dalam kandungannya ikut terpapar sehingga dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), akan berdampak pada penurunan intelegensia, toksisitas dan bahkan kematian. Pada laki-

laki, efek Pb antara lain menurunkan jumlah sperma dan meningkatnya jumlah sperma abnormal.

Secara visual akan muncul gejala dari dampak keterpaparan timbal secara akut maupun kronis. Keterpaparan timbal secara akut melalui udara yang terhirup akan menimbulkan gejala rasa lemah, lelah, gangguan tidur, sakit kepala, nyeri otot dan tulang, sembelit, nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan sehingga dapat menyebabkan anemia. Pada beberapa kasus akut akibat terpapar timbal terjadi *oliguria* (urin sedikit) dan gagal ginjal yang akut dapat berkembang secara cepat (Naria, Evi. 2005: 70)

Dampak kronis dari keterpaparan timbal diawali dengan kelelahan, kelesuan, iritabilitas, dan gangguan gastrointestinal. Keterpaparan yang terus-menerus pada sistem syaraf pusat menunjukkan gejala insomnia (susah tidur), bingung atau pikiran kacau, konsentrasi berkurang, dan gangguan ingatan. Beberapa gejala lain yang diakibatkan keterpaparan timbal secara kronis di antaranya adalah kehilangan libido, infertilitas pada laki-laki, gangguan menstruasi, serta aborsi spontan pada wanita. Pada laki-laki telah terbukti adanya perubahan dalam spermatogenesis, baik dalam jumlah, gerakan, dan bentuk spermatozoa, semuanya mempunyai nilai yang lebih rendah dari standar normal (Naria, Evi. 2005: 71).

G. Tinjauan Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Spektrometri Serapan Atom (SSA) adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metalloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog et al., 2000). Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Teknik ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode spektroskopi emisi konvensional. Memang selain dengan metode serapan atom, unsur-unsur dengan energi eksitasi rendah dapat juga dianalisis dengan fotometri nyala, akan tetapi fotometri nyala tidak cocok untuk unsur-unsur dengan energi eksitasi tinggi. Fotometri nyala memiliki range ukur optimum pada panjang gelombang 400-800 nm, sedangkan AAS memiliki range ukur optimum pada panjang gelombang 200-300 nm (Skoog et al., 2000). Untuk analisis kualitatif, metode fotometri nyala lebih disukai dari AAS, karena AAS memerlukan lampu katoda spesifik (hallow cathode). Kemonokromatisasi dalam AAS merupakan syarat utama. Suatu perubahan temperatur nyala akan mengganggu proses eksitasi sehingga analisis dari fotometri nyala berfilter. Dapat dikatakan bahwa metode fotometri nyala dan AAS merupakan komplementer satu sama lainnya.

Prinsip dasar Spektrofotometri serapan atom adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Spektrofotometri serapan atom merupakan metode yang sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah (Khopkar, 1990). Teknik ini adalah teknik yang paling umum dipakai untuk analisis unsur. Teknik-

teknik ini didasarkan pada emisi dan absorbansi dari uap atom. Komponen kunci pada metode spektrofotometri Serapan Atom adalah sistem (alat) yang dipakai untuk menghasilkan uap atom dalam sampel. (Anonim, 2003)

Cara kerja Spektroskopi Serapan Atom ini adalah berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda (*Hollow Cathode Lamp*) yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya (Darmono,1995).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian *deskriptif* yang menggambarkan tentang kandungan logam berat timbal (Pb) pada *Faunus ater* di perairan Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah kandungan logam berat timbal (Pb) pada *Faunus ater* di perairan Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

C. Defenisi Operasional Variabel

1. Langkitang (*Faunus ater*) merupakan salah satu keong yang termasuk ke dalam kelas Gastropoda dan dikonsumsi masyarakat di sekitar pesisir pantai di Perairan Maroneng.
2. Kandungan logam berat timbal pada *Faunus ater* adalah ukuran kuantitas kadar timbal yang terkandung dalam *Faunus ater* yang dinyatakan dalam milligram per kilogram (mg/kg) berat kering dari *Faunus ater* di Perairan Maroneng yang dianalisis dengan menggunakan *Atomic Absorption Spectrophotometer* (AAS).

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

- a. Lokasi penelitian ini terletak pada Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan pada bulan April-Juni 2013. Sedang analisis kandungan logam berat timbal (Pb) pada sampel langkitang (*Faunus ater*) dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.
- b. Pengambilan *Faunus ater* dilakukan pada dua stasiun yaitu stasiun 1 (area mangrove) dan stasiun 2 (area pantai) di perairan Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- c. Parameter yang diukur meliputi parameter fisika adalah suhu dan parameter kimia adalah pH, salinitas, DO, BOD dan kandungan timbal pada air.

2. Batasan Penelitian

- a. Ukuran *Faunus ater* dengan panjang 6-7 cm.
- b. Pengambilan sampel hanya dilakukan pada dua titik stasiun, yaitu: stasiun 1 (area mangrove) dan stasiun 2 (area pantai). Pengambilan sampel dilakukan pada siang hari pada saat air surut.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan di lapangan dan laboratorium. Alat lapangan meliputi plot, meteran, pH meter, handrefraktometer, thermometer, GPS, kamera, *cool box*, tali rafia, kertas label, kantung plastik, dan alat tulis menulis. Sedangkan alat laboratorium meliputi

gelas kimia, labu ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, kaca arloji, corong, botol sampel, statif dan klem, timbangan digital, hot plate, lemari asam, Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) AA-7000 Shimadzu.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah langkitang (*Faunus ater*), kertas saring Whatman No. 41, aquadest, larutan asam nitrat pekat (HNO_3), dan larutan standar Pb.

F. Prosedur Penelitian

1. Tahap persiapan yaitu meliputi proses persiapan dari alat-alat yang akan digunakan pada penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel *Faunus ater* dilakukan dengan menggunakan transek yang berukuran 10 x 10 m pada dua titik stasiun yaitu stasiun 1 (area mangrove) dan stasiun 2 (area pantai) kemudian sampel disimpan dalam *cool box*. Kandungan logam berat timbal (Pb) pada *Faunus ater* dianalisis di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

- b. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Pengukuran parameter air seperti suhu, pH dan salinitas dilakukan secara *in situ* langsung di lokasi pengambilan sampel. Suhu air diukur menggunakan termometer, pH menggunakan pH meter, salinitas dengan menggunakan handrefraktometer. Sedangkan pengukuran DO, BOD, dan

analisis kandungan logam berat timbal pada air dilaksanakan di Laboratorium Uji Kualitas Air Universitas Hasanuddin Makassar.

c. Analisis logam berat timbal (Pb) pada *Faunus ater*

Analisis kandungan logam berat timbal (Pb) pada langkitang (*Faunus ater*) dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama mengumpulkan *Faunus ater* yang terdapat di lokasi penelitian. Mengeluarkan dari cangkang sehingga yang didapatkan hanya daging dari *Faunus ater*. Mencuci daging *Faunus ater* dengan air mengalir. Menimbang berat basah *Faunus ater* sebanyak 5 gr dan menambahkan asam nitrat pekat sebanyak 20 ml lalu dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 100°C sampai uap nitrat habis hingga terlihat jernih.

Jika sampel sudah jernih, dinginkan. Setelah itu, menetapkan volume sampel sebanyak 50 ml dengan aquadest dan menghomogenkan lalu meyaring dengan kertas saring Wattman no.41. Mengambil filtrat sampel yang diperoleh sebanyak 10 ml untuk dilakukan analisis logam Pb dengan menggunakan SSA pada panjang gelombang tertentu. Konsentrasi yang diperoleh dalam bentuk mg/L dikonversi ke dalam bentuk mg/kg berat kering (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar).

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel Gastropoda, aquadest, formalin, larutan HNO₃ 60 %, HCl 37%, H₂SO₄ (90%), H₂O₂ 5%, larutan standar Pb dan alkohol 70%. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, kerang darah yang diperoleh dari daerah sekitar perairan pelabuhan Pare-Pare yang dikumpulkan secara acak; Pb(NO₃)₂; Asam Nitrat (1:1); Asam klorida (1:1); HClO₄; HNO₃.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, kerang darah yang diperoleh dari daerah sekitar perairan pelabuhan Pare-Pare yang dikumpulkan secara acak; Pb(NO₃)₂; Asam Nitrat (1:1); Asam klorida (1:1); HClO₄ p.a.; HNO₃ p.a.; bubuk Zn; aquades yang diperoleh dari Laboratorium Instalasi Tanah Badan Pengkajian Teknologi Pangan (BPTP) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

1. Sampel yang telah di bersihkan dengan air laut, di cuci dengan air kerang, kemudian dibilas secara menyeluruh dengan aquadest dan dibedah menggunakan pisau bedah diambil seluruh jaringannya dan diberi label, Untuk analisa kadar air jaringan gastropoda dikeringkan dengan oven 60°C selama 2 hari, dimasukkan ke dalam deksikator lalu ditimbang untuk mengetahui kadar air.

Pengukuran logam berat pada jaringan gastropoda dilakukan dengan menambahkan HNO₃ pekat dan HClO₄, dipanaskan pada suhu 60-70°C selama 2-3 jam sampai larutan jernih . Sampel siap diukur dengan AAS menggunakan nyala udara-asetilen. Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran parameter kualitas air antara lain suhu, pH, salinitas, DO dan tipe sedimen, pH serta bahan organik.

Persamaan regresi linear dari serapan larutan blanko dengan konsentrasinya dibuat, kemudian serapan hasil pengukuran larutan contoh diplotkan ke dalam kurva larutan baku sehingga dapat diketahui konsentrasi logam yang dianalisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Adapun konsentrasi logam Pb yang terakumulasi pada *Faunus ater*, konsentrasi Pb pada air, suhu, salinitas, pH, DO dan BOD di perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4. 1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Konsentrasi Logam Pb pada *Faunus ater*, konsentrasi Pb pada air, suhu, salinitas, pH, DO dan BOD di perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang.

Stasiun	Berat Rata-rata <i>Faunus ater</i>	Konsentrasi Pb dalam bahan (mg/kg) berat kering	Konsentrasi Pb dalam air (ml/L)	Suhu (°C)	Salinitas (‰)	pH	DO (ppm)	BOD (ppm)
Mangrove	228,70 gr	1,72	3,58	28	20	7,27	6,9	5,9
Pantai	105,48 gr	1,92	3,93	31	27	7,21	5,3	5,3

Berikut adalah grafik perbandingan konsentrasi kandungan logam berat Pb yang terakumulasi pada *Faunus ater* dan konsentrasi Pb di air pada perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang.



Grafik 4.1 Konsentrasi kandungan logam berat Pb yang terakumulasi pada *Faunus ater* dan air di perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang.

Grafik di atas menunjukkan perbandingan konsentrasi kandungan logam berat Pb yang terakumulasi pada *Faunus ater* dan konsentrasi Pb di air pada perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang. Pada stasiun 2 (area pantai) konsentrasi logam berat Pb pada *Faunus ater* dan air lebih tinggi jika dibandingkan dengan stasiun 1 (area mangrove). Pada stasiun 2, Pb yang terkumulasi pada *Faunus ater* sebesar 1,92 mg/kg dan konsentrasi Pb pada air sebesar 3,93 ml/L. Sedangkan pada stasiun 1 konsentrasi Pb pada *Faunus ater* sebesar 1,72 mg/kg dan konsentrasi Pb pada air sebesar 3,58 ml/L.

B. Pembahasan

Logam berat secara alami memiliki konsentrasi yang rendah pada perairan (Hutagalung. 1994). Tinggi rendahnya konsentrasi logam berat disebabkan oleh jumlah masukan limbah logam berat ke perairan. Semakin besar limbah yang masuk ke dalam suatu perairan, semakin besar konsentrasi logam berat di perairan. Selain itu musim juga turut berpengaruh terhadap konsentrasi, dimana pada musim penghujan konsentrasi logam berat cenderung lebih rendah karena terencerkan oleh air hujan. Logam berat yang masuk perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di perairan. Pengendapan logam berat terjadi karena adanya anion karbonat, hidroksil dan klorida (Hutagalung. 2001). Logam-logam berat yang terlarut di perairan pada konsentrasi tertentu akan bersifat racun bagi organisme perairan.

Bahan-bahan kimia yang tidak dikehendaki seringkali terbawa ke dalam produk pangan, seperti terjadinya cemaran logam atau logam berat. Logam berat adalah istilah yang sering digunakan untuk logam yang bersifat toksik. Lingkungan yang tercemar dapat mempengaruhi produk pangan. Menurut BSN (2009) yang dimaksud dengan pangan tercemar di antaranya adalah pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Bahaya cemaran logam berat pada konsumen bersifat akumulatif, tidak langsung menimbulkan gejala dalam jumlah rendah namun dapat bersifat toksik jika kadarnya meningkat. Peningkatan kadar logam berat berkaitan dengan masuknya

limbah yang mengandung logam berat akibat kegiatan pertambangan, pembakaran atau bahan bakar, pertanian, dan sebagainya (Sastrawijaya. 1991).

1. Kandungan logam berat Pb Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang pada stasiun 1 (area mangrove).

Penelitian tentang kandungan logam berat timbal ini dilakukan terhadap satu jenis sampel Gastropoda yaitu *Faunus ater*, mengingat karena jenis ini merupakan hewan laut yang sering dikonsumsi oleh masyarakat setempat dan keberadaannya yang melimpah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nurlinda (2013) bahwa Gastropoda yang mendominasi adalah *Faunus ater* dengan indeks dominansi mencapai 0,82. Pada penelitian ini *Faunus ater* yang digunakan dengan ukuran tubuh yang sama yaitu sekitar 6-7 cm, bagian untuk dianalisis adalah dagingnya dengan pertimbangan bahwa ukuran dan bagian tersebut yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis kandungan Pb pada *Faunus ater* perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang menunjukkan nilai yang bervariasi pada setiap lokasi pengambilan. Nilai konsentrasi logam berat Pb pada *Faunus ater* di perairan tersebut cenderung memiliki konsentrasi yang besar. Dimana konsentrasi Pb *Faunus ater* untuk stasiun 1 sebesar 1,72 mg/kg, sedangkan jika dibandingkan dengan baku mutu untuk Gastropoda yang ditetapkan oleh SNI (2008) yaitu sebesar 1,5 mg/kg, dan kandungan logam berat timbal (Pb) dalam air pada stasiun 1 sebesar 3,58 ml/L dimana kriteria baku mutu air laut untuk biota laut menurut (MENKLH, 2004) untuk timbal yaitu sebesar 0,008 ml/L. Hal ini menandakan

bahwa logam berat timbal lebih banyak digunakan oleh manusia dan mencemari perairan. Menurut Hutagalung (1994) tinggi rendahnya konsentrasi logam berat disebabkan oleh jumlah masukan limbah logam berat ke perairan. Selain itu, Sorensen (1998) menyatakan bahwa semakin besar limbah yang masuk ke dalam suatu perairan, semakin besar konsentrasi logam berat di perairan dan akan terakumulasi pada tubuh organisme.

Keberadaan kandungan logam berat timbal dalam tubuh *Faunus ater* tersebut sebagai akibat dari proses bioakumulasi. Bioakumulasi merupakan akumulasi pencemar yang terus menerus dalam organ tubuh atau masuknya zat kimia dari lingkungan melalui rantai makanan yang pada akhirnya tingkat konsentrasi zat kimia di dalam organisme sangat tinggi. Akumulasi logam berat yang terjadi pada *Faunus ater* terutama melalui kebiasaan makannya yang memanfaatkan bahan organik di dasar perairan. Seperti yang dikemukakan oleh Adun Rusyana (2011) bahwa Gastropoda dianggap sebagai indikator yang baik untuk mengetahui kontaminasi logam berat pada sistem akuatik, karena Gastropoda memiliki daya mobilitas yang rendah.

Untuk lebih mendukung data penelitian maka dilakukan pula analisis dan pengukuran faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan *Faunus ater*. Adapun parameter yang diukur sebagai pendukung karena memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan daya dukung kehidupan *Faunus ater* diantaranya adalah suhu karena merupakan parameter yang penting dalam lingkungan laut dan berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan laut dan mempengaruhi

aktivitas, kecepatan laju metabolisme dan respirasi maupun perkembangbiakan organisme laut termasuk *Faunus ater*. Suhu air yang didapatkan pada stasiun 1 yaitu 28°C. Menurut Zakaria (1999) batas toleransi tertinggi untuk keseimbangan struktur populasi Gastropoda pada suhu 28°C-31°C, tetapi beberapa jenis dapat mentolerir suhu yang lebih tinggi. Salinitas atau kadar garam air laut juga memiliki pengaruh untuk kelangsungan hidup *Faunus ater* dimana kadar salinitas yang didapatkan pada stasiun 1 yaitu sebesar 20⁰/₀₀.. Kondisi salinitas air laut pada lokasi ini tergolong normal dan cukup baik untuk kelangsungan hidup Gastropoda. Derajat Keasaman (pH) karena menurut Barnes (1994) pH mempengaruhi produktivitas organisme dimana pH perairan yang dengan kisaran pH 6,5 – 7,5 termasuk produktif, dan setelah pengukuran didapatkan pada stasiun 1 memiliki pH 7,27.

Parameter lain yang diukur adalah kandungan *Dissolved Oxygen* (DO) karena menunjukkan tingkat pencemaran pada perairan tersebut. Menurut C. Adrian (2004) DO > 5 maka pada suatu perairan menunjukkan tingkat pencemarannya rendah, dan pada hasil penelitian menunjukkan DO pada stasiun 1 sebesar yaitu 6,9 ppm. Kandungan oksigen terlarut (DO) minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun (toksik). Jika kandungan DO di atas 6 ppm, air dikatakan tercemar. Kemudian kandungan *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) atau kebutuhan oksigen biologis, makin banyak bahan organik dalam air, makin besar BOD sedangkan DO akan makin rendah. Air yang bersih adalah memiliki kandungan BOD kurang dari 1 ppm, jika

kandungan BOD di atas 4 ppm, air dikatakan tercemar dan dapat membahayakan bagi kehidupan organisme dalam air. Berdasarkan hasil penelitian, BOD yang didapatkan pada stasiun 1 yaitu sebesar 5,9 ppm.

2. Kandungan logam berat Pb Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang pada stasiun 2 (area pantai).

Berdasarkan hasil analisis kandungan kandungan logam berat timbal (Pb) yang terakumulasi pada *Faunus ater* perairan desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang pada stasiun 2 yaitu sebesar 1,92 mg/kg dan kandungan logam berat timbal dalam air sebesar 3,93 ml/L. Hal ini sesuai dengan pendapat Sorensen (1998) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan logam berat pada perairan maka semakin tinggi pula konsentrasi logam berat yang terakumulasi pada tubuh organisme. Darmono (2001) menyatakan pula bahwa akumulasi logam berat dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam berat dalam air. Kandungan logam berat timbal tertinggi terdapat pada stasiun 2, perbedaan konsentrasi yang didapatkan pada stasiun 1 dan 2, dimana pada stasiun 2 konsentrasi kandungan Pb pada *Faunus ater* maupun air lebih tinggi dikarenakan aktivitas warga Maroneng di sepanjang pesisir pantai yang terlalu padat, seperti aktivitas transportasi laut berupa bahan bakar kapal warga. Adapun beberapa sumber utama logam berat timbal yang mencemari perairan Maroneng berasal dari bahan bakar kendaraan, aktivitas transportasi laut, pewarna cat, dan limbah domestik dari warga sekitar pantai yang menjadikan pantai sebagai tempat pembuangan sampah. Timbal yang berasal dari bahan bakar kendaraan kemudian

diemisikan ke udara dan jatuh di sekitar badan jalan. Tedy Sanjaya (2006) menyebut bahwa timbal yang bersal dari bahan bakar bertimbal merupakan sumber utama dari timbal di atmosfer dan daratan yang kemudian dapat masuk ke perairan alami. Menurut Perkins (1998) sekitar 75% timbal dalam bensin diemisikan dalam bentuk partikel, sedangkan 25% lainnya akan berada dalam kendaraan (saringan asap). Dari 75% timbal yang diemisikan dari kendaraan bermotor tersebut, sekitar 40% jatuh pada jarak dekat, 8% jatuh pada jarak agak jauh, 24% jatuh pada jarak jauh dan 3% tidak dapat diukur.

Menurut Palar (2008), secara alamiah Pb dapat masuk ke badan perairan melalui pengkristalan udara dengan bantuan air hujan. Jadi ketika hujan turun, air akan menggenangi badan jalan dan akhirnya masuk ke perairan. Konsentrasi logam berat timbal di perairan dipengaruhi pula oleh musim. Menurut Darmono (1995), pada musim hujan konsentrasi logam dalam air akan lebih kecil daripada konsentrasi logam dalam air pada musim kemarau karena pada musim hujan logam akan mengalami pelarutan sedangkan pada musim kemarau logam akan terkonsentrasi. Selanjutnya, Surani (2002) menyebut bahwa Gastropoda dapat melakukan mekanisme akumulasi Pb seiring dengan meningkatnya konsentrasi Pb di perairan dan sedimen namun *Faunus ater* juga dapat melakukan mekanisme eliminasi seiring dengan penurunan konsentrasi logam berat di perairan.

Akumulasi logam berat yang terjadi pada *Faunus ater* terutama melalui kebiasaan makannya yang memanfaatkan bahan organik di dasar perairan. Seperti yang dikemukakan oleh Sunarto (2008) pengakumulasian logam ini erat pula

kaitannya dengan jenis logamnya dan mekanisme detoksifikasi, karena logam berat Pb merupakan logam non-essensial dan bersifat racun sehingga tidak dapat digunakan dalam proses metabolisme sehingga menumpuk dalam jaringan tubuh organisme. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh *Faunus ater* dapat menyebabkan gangguan fisiologis sehingga *Faunus ater* akan berusaha mengeluarkan logam berat tersebut melalui mekanisme regulasi. *Faunus ater* dapat meregulasi logam berat yang ada dalam tubuhnya sehingga resiko toksisitas logam berat dalam tubuhnya dapat dihindari. Apabila mekanisme regulasi tidak mampu menyeimbangi penyerapan logam berat, maka resiko toksisitas dapat terjadi dimana terjadi kerusakan pada hati dan ginjal sebagai organ yang berperan dalam proses detoksifikasi dan ekskresi.

Dalam kondisi perairan yang stabil, senyawa logam berat mudah membentuk ikatan-ikatan permukaan dengan partikel-partikel yang terdapat pada badan perairan. Lama kelamaan persenyawaan yang terjadi dengan partikel-partikel yang ada akan mengendap membentuk lumpur semakin bertambah karena terjadi proses pengendapan pada perairan melalui penggunaan senyawa kimia berupa cat dan buangan bahan-bahan yang terbuat dari logam seperti kaleng. Sugiharto (1997) mengemukakan bahwa timbal juga digunakan sebagai bahan campuran dalam cat yang berguna untuk mempercepat proses pengeringan lapisan melalui oksidasi dan polimerisasi di dalam usaha perbaikan dan pembuatan kapal seperti yang dilakukan oleh masyarakat Maroneng. Rajawali Hiyoto (2011) menambahkan timbal sering digunakan dalam campuran cat untuk menghasilkan

warna-warna cerah. Timbal ini terkandung di dalam pigmen, yaitu bahan untuk memberi warna pada cat. Biasanya penambahan timbal ini berlaku untuk cat minyak. Selain itu, kandungan timbal yang terdapat di perairan Maroneng juga berasal dari limbah rumah tangga berupa sampah-sampah yang mengandung baterai, keramik, dan sisa zat lain yang mungkin mengandung timbal yang dibuang ke laut dan pesisir pantai. Perairan laut dapat mengakumulasi timbal baik secara alami maupun sebagai akibat perbuatan manusia.

Pada stasiun 2 diukur pula beberapa parameter untuk menjadi perbandingan pada stasiun 1 sehingga dapat diketahui pada stasiun mana yang memiliki tingkat pencemaran yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil analisis suhu pada stasiun 2 lebih tinggi yaitu 31°C. Peranan suhu terhadap akumulasi logam di jaringan sangat besar karena meningkatnya suhu dapat meningkatkan laju metabolisme organisme, sehingga bioakumulasi pada organisme lebih besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Sorensen (1991), menyatakan bahwa peningkatan suhu perairan cenderung meningkatkan akumulasi dan toksisitas logam berat, ini terjadi karena meningkatnya metabolisme dari organisme air. Salinitas sebesar 27⁰/₀₀, dan pH sebesar 7,2. Untuk DO pada stasiun 2 yaitu sebesar 5,3 ppm dan BOD pun sebesar 5,3 ppm. Maka dapat diketahui bahwa pada stasiun 2 tingkat pencemarannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan stasiun 1. Adrian (2004) dan Wahyu Sari Yeni (2008) melaporkan dalam penelitian yang berbeda bahwa akumulasi logam berat dalam jaringan kebanyakan dipengaruhi oleh konsentrasi logam berat di air dan lama pemaparan, walaupun beberapa faktor lingkungan

seperti pH, salinitas, dan temperatur mempunyai peran yang signifikan dalam akumulasi logam. Kebutuhan ekologis, umur, ukuran, dan kebiasaan makan, disamping kondisi biologis *Faunus ater* juga mempengaruhi akumulasi logam dalam jaringan.

Melimpahnya jenis *Faunus ater* menunjukkan bahwa organisme ini bersifat kosmopolit atau memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim (setiap waktu dapat berubah) sehingga dapat bertahan dengan jumlah yang besar. Penelitian yang telah dilakukan Nurlinda (2013) yang menyatakan bahwa *Faunus ater* melimpah dengan indeks Dominansi sebesar 0,82 pada area mangrove dan 0,80 pada area pantai. Melimpahnya *Faunus ater* dikarena spesies tersebut telah mampu beradaptasi dan cocok hidup pada lingkungan tersebut. Ini menunjukkan bahwa spesies tersebut mempunyai kisaran yang cukup luas terhadap faktor lingkungan, mampu berkembangbiak dengan cepat dan disebabkan oleh cara penyebaran yang luas serta mempunyai daerah jelajah yang digunakannya untuk mencari dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan.

Faunus ater yang mengandung logam berat timbal apabila dikonsumsi oleh manusia akan berdampak buruk bagi manusia tersebut karena logam berat timbal yang bersifat akumulatif. Keberadaan di dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan lagi sehingga makin lama jumlahnya semakin meningkat dan menumpuk di otak, syaraf, jantung, hati, dan ginjal yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang ditempatinya. Surani (2002)

mengemukakan bahwa timbal juga dapat mengikat enzim-enzim dan membuatnya tidak aktif. Timbal juga dapat menggantikan logam-logam penting seperti kalsium, zink, dan magnesium yang mengganggu beberapa reaksi kimia dalam tubuh. Palar (2009) menambahkan logam berat dapat memberi pengaruh merugikan karena mampu menghambat proses biokimia dalam tubuh. Timbal memiliki afinitas tinggi terhadap protein, sehingga dapat membentuk ikatan dengan hemoglobin dan protein plasma darah. Hal tersebut menyebabkan penghambatan sintesis sel darah merah yang sangat diperlukan untuk transportasi oksigen. Secara umum, meningkatnya kandungan timbal dalam tubuh dapat menyebabkan efek kontinu terutama pada hati, urat syaraf, ginjal, tulang, limpa, pankreas, serta paru-paru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan logam berat Pb *Faunus ater* pada perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang untuk stasiun 1 (area mangrove) sebesar 1,72 mg/kg dan stasiun 2 (area pantai) sebesar 1,92 mg/kg. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan logam berat Pb *Faunus ater* telah melebihi batas aman konsumsi, sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh SNI yaitu sebesar 1,5 mg/kg.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan setelah melaksanakan penelitian ini adalah

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan logam berat lainnya khususnya yang diperoleh di lokasi penelitian ini.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih mendukung keberadaan logam berat di perairan, sebaiknya dilakukan pula analisis sedimen perairan tempat pengambilan *Faunus ater*.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan korelasi antara ukuran tubuh dan lama terpapar logam berat pada *Faunus ater*.

4. Masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan lagi proses pengolahan limbah terutama yang bermukim di daerah sekitar pantai agar pantai tempat hidup *Faunus ater* dan organisme lainnya tidak tercemar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2009. *“Bahaya Pencemaran Logam Berat Dalam Air”*. (Jatinagor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran).
- Adrian, C. 2004. *“Evaluasi Kualitas Air Sungai Bekasi di Wilayah Bekasi dengan Pendekatan Pengukuran Parameter Fisika-Kimia dan Biologi (Bioindikator)”* [skripsi]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Aditya. 2006. *Struktur Komunitas dan Pola Asosiasi Makrozoobenthos pada Ekosistem Mangrove di Muara Sungai Limbangan Kabupaten Pangkep*. (Makassar : Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin).
- Aqilah, Zalfa. *“Morfologi Gastropoda”*, [http://zalfaaqilah-wordpress.com/2011/06/03/morfologi – gastropoda/](http://zalfaaqilah-wordpress.com/2011/06/03/morfologi-gastropoda/). (13 Januari 2013).
- Adhim, Mohammad Fauzil *“Gastropoda”* <http://www.WordPress.com> (30 November 2012).
- Aidil, Iman. 2011 *“Gastropoda Mollusca”*. Jakarta: Djambatan.
- Ariani, S.R. 2004. *“Studi Keanekaragaman dan Kelimpahan Gastropoda di Suaka Margasatwa Pulau Rambut DKI Jakarta”*. Bogor : Insitut Pertanian Bogor.
- Bambang Widigo. 2004. *Avertebrata Air Jilid I*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Barnes. 1994. *“Invetebrate Zoology”*. Philadelphia: Saunders Company.
- Brotowidjoyo, Mukayat Djarubito. 1989. *“Zoologi Dasar”*. Jakarta: Erlangga.
- Brusca, R. 1990. *“Invertebrates”*. Sunderland: Sinaver Associates, Inc.Publishers.
- Budiati, Retno, Sry Mulyani dkk. 1998. *“Analisis Keanekaragaman Gastropoda Pada Komunitas Mangrove di Perairan Muarareja Kota Tegal”*. Jakarta: Djambatan,
- Darmono. 1995. *“Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup”*. Jakarta: UI-Press.
- Darmono, 2001. *“Lingkungan Hidup dan Pencemaran”*. Jakarta: UI-Press.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. CV. Diponegoro, 2007.

- DepKes. 2001. *Kerangka Acuan Uji Petik Kadar Timbal (Pb) pada Spesimen Darah Kelompok Masyarakat Berisiko Tinggi Pencemaran Timbal*. Jakarta. Ditjen PPM dan PLP Departemen Kesehatan RI Jakarta.
- Desi, Natsar. “*Kualitas Air Sungai pada Penyediaan Air Minum*.” Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Dharma. “*Siput dan Kerang Indonesia*”. Jakarta : Sarana Graha. 1992.
- Eidman, M. dan Yulianda. 1989. “*Struktur Ekologis dan Penelaahan Dinamika Populasi Komunitas Dasar*”. Bogor: Fakultas Perikanan-IPB.
- Elasani. 2011. “*Umpil Si Keong Lezat*”. Bandung: Alfabet.
- Naria, Evi. 2005. “*Dampak Pencemaran Logam Berat*”. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fardiaz. 1992. “*Polusi Air dan Udara*”. Yogyakarta: Kanisius.
- Ferianita Fachrul, M. 2009. *Metode Ekologi untuk Penentuan Pencemaran Perairan*. Jakarta: Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti.
- Husein, Harun. 1992. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegaka Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutagalung. 1998. *Prinsip-prinsip Dasar Ekologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khopkar, M.S. 1990. “*Konsep Dasar Kimia Analitik*”. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Komunitas Atlas, “*Aktualisasi Tak Kenal Batas*”, <http://bone-geographical.blogspot.com/2010/11/kabupaten-pinrang.html> (5 Desember 2012).
- Lu, F. C. 1995. “*Toksikologi Dasar Edisi Kedua*”. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Manuputty, Anna. 1980. “*Majalah Semi Populer Lonawarta/Beberapa Jenis Gastropoda yang Dapat Dimakan*”. Ambon: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mudjiono dan Sudjoko. 1994. “*Fauna dan Molluska Padang Lamun*”. Lombok: Kiswara.

- Mukayat. 1989. "Zoologi Dasar". Jakarta: Erlangga.
- Mukono, 2002. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Air Langga University Press. Surabaya.
- Noor. 2002. "Monograf Kimia Analitik Unsur Runut Edisi II". Makassar: Yayasan Mitra Sains Indonesia.
- Nurlinda. 2013. "Studi Keanekaragaman Gastropoda di Perairan Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang" Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Oemardjati dan Wardhana. 1990. "Taksonomi Avertebrata". Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Palar, Heryandi. 2009. "Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat". Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Kabupaten Pinrang. "Bumi Lasinrang", <http://pinrangworld.blogspot.com/2010/05/bendungan-benteng-dan-sejarah.html> (30 November 2012).
- Prayetno, Suselo Hadi "Keanekaragaman Gastropoda di Perairan Pinrang" <http://www.suselo'blog-keanekaragaman-gastropoda>. (30 November 2012).
- Rahman al-Mubarakfuri, Abu Ihsan al-Atsari dan Abu Ahsan Sirojuddin. 2010. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Rusyana, Adun. 2011. "Zoologi Invertebrata". Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Tedy. 2006. "Pencemaran Logam Berat". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, "Gastropoda", <http://newsfhiseriess.forrums.com/2007/08/gastropoda.html> (19 Februari 2012).
- Sastrawijaya, AT. 1991. "Pencemaran Lingkungan". Bandung: Rineka Cipta.
- Sorensen. 1998. "Dampak Pencemaran Pantai Bagi Kesehatan". Dirjen Perlindungan dan Pelestarian Alam. Bogor.
- Sandy. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Jurusan Geografi FMIPA UI-PT Indograph Bakti, 1996.
- Sugiharto. 1997. "Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah". Jakarta: UI Press.

- Sunarto. 2008 “*Karakteristik Biologi dan Peranan Plankton bagi Ekosistem Laut*”. Jatinagor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran.
- Surani. 2002. “*Pencemaran dan Toksi-kologi Logam Berat*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Takdir, Sulhayat. “*Potensi SDA Peluang Investasi di Kabupaten Pinrang*” <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/> (30 November 2012).
- Tafsir Al-Maragi*. 1992. Semarang: CV. Toha Putra.
- T. Tomascik, A. Nontji and M. K. Moosa. 2002. “*The Ecology of The Indonesian Seas*”. Singapore: Periplus Editions.
- Tedi, Priyatna. 2006. “*Invertebrata Air*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Triatmodjo, Bambang. 1999. “*Teknik Pantai*”. Yogyakarta: Beta Offset.
- Wardhana, WA. 1995. “*Dampak Pencemaran Lingkungan*”. Yogyakarta: Andi Offset.
- Winarno. 1993. “*Pangan, Gizi, Tek-nologi dan Konsumen*”. Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama.
- Wijaya, Krisna. 2009. *Pengantar Limnologi Studi Tentang Ekosistem Air Daratan*. Medan: USU Press.
- Wulandari, Dewi. 2009. “*Keterikatan antara Kelimpahan Fitoplankton dengan Parameter Fisika Kimia di Estuari Sungai Brantas (Porong) Jawa timur*.” Skripsi Sarjana, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Yeni, Wahyu Sari. 2008. “*Pencemaran Logam Berat*” . (Makassar : Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin).
- Yeni, Wahyu Sari. “*Potensi Gastropoda Intertidal Sebagai Biomonitor Pencemaran Logam Berat Di Perairan Pantai Tropis*” <http://hdl.handle.net/wahyu's.blog> (2 Desember 2012).
- Zakaria. 1999. *Studi Tentang Komunitas Makrozoobentos pada Hutan Mangrove Alami dan Hasil Rehabilitasi*. Makassar : Tesis Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin.

Kusmarini, M. Syarif, Y. Hendriani, Kusniangsi, dan L. Sinulingga. 1996. *Ekosistem Lahan Basah Indonesia*. Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Bogor.

Ewusie, J. Y. *Ekologi Tropika*, terj. Usman Tanuwidjaja. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1990.

Nybakken, J. W. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

Odum, E. P. *Fundamentals of Ecology*, terj. Tjahjono, *Dasar-dasar Ekologi*. Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Romimohtarto Kasijan dan Sri Juwana. *Biologi Laut*. Cet. 3; Jakarta: Djambatan, 1995.

Wijaya, Krisna, Habib. “Komunitas Perifiton dan Fitoplankton serta Parameter Fisika Kimia Perairan sebagai Penentu Kualitas Air di Bagian Hulu Sungai Cisadane Jawa Barat.” Skripsi Sarjana, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009.

Mohammad Fauzil Adhim PT. Gramedia, 1982.