

**PENGARUH PENAMBAHAN MOLASE PADA MEDIA TANAM TERHADAP
PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM PUTIH (*Pleurotus Ostreatus*)**




Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh
BUHARIS
NIM: 60300111007

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015

KATA PENGANTAR



Tiada kalimat yang pantas terucap, selain kalimat *Alhamdulillah Rabbil alamin*, yang mana atas berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Molase Pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)” ini dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Shalawat dan salam semoga tetap tecurah kepada Baginda Rasulullah Saw yang telah mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan yang dijadikan lampu penerang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Rukaya tersayang yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan keikhlasan, yang tak henti-hentinya melantukan doa terbaik di setiap akhir sujud beliau bagi penulis serta rela mengorbankan segalanya demi tercapainya harapan dari sang anak tercinta yang tidak akan pernah mampu untuk dibalas. Semoga berkah dan rahmat Allah Swt. selalu menaungi mereka. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si, selaku Ketua Jurusan Biologi dan Ibu Hafsan, S.Si., M. Pd dan Ibu Cut Muthiadin, S.Si, M.Si selaku staf sekretaris jurusan Biologi.
4. Ibu Baiq Farhatul Wahidah S.Si., M.Si dan Bapak Hartono S.Si., S.Pd., M. Biotech selaku pembimbing I dan II dalam proses penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan sekaligus sebagai penasehat akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama aktif menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhiddin P,M.Pd, Ibu Nurlaila Mappangandro, S.P., M.P., Bapak Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed selaku penguji/pembahas I dan III

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, guna perbaikan ke depannya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, Amin.

Makassar, Mei 2015
Penulis

BUHARIS
60300111007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Mei 2015
Penyusun,




(BUHARIS)
NIM: 60300111007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh penambahan molase pada media tanam terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)" yang disusun oleh Buharis, NIM: 60300111007, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu tanggal 16 April 2015, bertepatan dengan **26 jumadil akhir 1436 H**. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains dalam ilmu Biologi Jurusan Biologi, dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 16 April 2015
26 Jumadil akhir 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muhammd Khalifah Mustami, M.Pd (.....)	
Sekretaris	: Hafsan., S.Si., M.Pd (.....)	
Peguji I	: Dr. Muhiddin., S.Pd., M.Pd. (.....)	
Peguji II	: Nurlaila Mappanganro., S.P., M.P. (.....)	
Peguji III	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed. (.....)	
Pembimbing I	: Baiq Farhatul Wahidah., S.Si., M.Si (.....)	
Pembimbing II	: Hartono, S.Si., S.Pd., M.Biotech (.....)	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar



Dr. Muhammd Khalifah Mustami, M.Pd

Nip. 19710412200003 1 001

PERSEMBAHAN

*Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kehadirat Illahi Rabbi
Yang Maha Penolong Lagi Maha Mengabulkan Do'a
Semoga ridha-Nya Selalu Menyertai Setiap Jengkal Langkahku
Sehingga Kesuksesan Dan kebahagiaan
Menjadi Akhir Dari Semua Perjuangan Yang Mesti Kutempuh
Atas Nama Cinta
Kupersembahkan Karya ini untuk.....*

- **Ayahanda Jamaluddin** dan **Ibunda Rukaya** tercinta yang telah memberi kasih sayang dan dorongan baik secara material maupun spiritual.
- Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat dalam perjuangan menempuh studi ini.
- Saudaraku Firmansyah, yang setia mendampingi dan banyak membantuku baik berupa materi maupun dukungan agar tetap semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- Saudara seperjuanganku, Irawan Prasetyo, Firman Adi Saputra dan Jamaluddin yang telah banyak memberikan masukan dan semangat satu sama lain, serta setia menemani penulis dalam suka dan duka hingga tercapainya harapan bersama.
- Teman-teman mahasiswa Jurusan Biologi terkhusus kepada keluarga besar **SINAPSIS (011)** (Nabil, ika dian, ichsan, ika, jusna, fika, Irma, ratih, dani, era, nunu, eka, ana, fitto, fitri, marwani, lilis dan mona) yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah selama kurang lebih 4 tahun bersama.
- Senior-seniorku yang telah mengajarkanku arti persaudaraan dan solidaritas dalam perjuangan selama 3 tahun lebih bersama teman-temanku hingga sampai sekarang. Beserta adik-adik junior angkatan 2012, 2013 dan 2014 yang selalu menyemangati dalam setiap aktivitas akademis dan non akademis yang telah membagi canda tawa pelibur lara bersama.
- Teman-teman KKNP-V di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, terkhusus kepada POSKO EMPAT (Fahru, rina, riska, intan dan ipha) kalian telah memberikan cerita indah, rasa persaudaraan dan pengalaman berharga selama kurang lebih 2 bulan.

*Almamaterku Tercinta “Kampus Hijau” UIN Alauddin Makassar”
Segenap Civitas Akademika Fakultas SainsTek
Tiada Kata Yang Bisa Terucap Selain Do'a
Semoga Segala Amal Kalian Semua Dibalas Oleh Allah SWT
Amin.....*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Jamur Tiram	8
B. Siklus Hidup Jamur	16
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur Tiram	19
D. Molase	27
E. Ayat dan Hadis	29
F. Hipotesa	31
G. Kerangka Pikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Desain Penelitian	34
D. Variabel Penelitian.....	35
E. Defenisi Operasional Penelitian.....	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Prosedur Kerja.....	37
H. Metode Pengumpulan Data.....	40
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Hasil analisis uji BNT terhadap kecepatan pertumbuhan miselium jamur tiram putih (<i>Pleurotuss ostreatus</i>).....	42
Tabel 4.2. Hasil analisis uji BNT terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	43
Tabel 4.3. Tabel 4.3 Hasil analisis uji BNT terhadap berat basah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Siklus hidup jamur tiram putih.....	19
Gambar 2.2. Alur skematis penelitian.....	33
Gambar 4.1. Rata-rata waktu penyebaran miselium hari setelah inokulasi (HSI) pada serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda.....	41
Gambar 4.2. Rata-rata jumlah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>) pada media tanam serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda.....	43
Gambar 4.3. Rata-rata berat basah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>) pada media tanam serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
Lampiran 1a. Waktu penyebaran Miselium pada media tanam jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>) (<i>Full Colony</i>).....	58
Lampiran 1b. Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)....	60
Lampiran 1c. Berat basah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	61
Lampiran 1a. Waktu penyebaran miselium jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	62
Lampiran 1b. Hasil analisis uji Anova waktu penyebaran miselium jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	62
Lampiran 1c. Hasil analisis BNT terhadap waktu penyebaran miselium jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	62
Lampiran 2a. Jumlah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	63
Lampiran 2b. Data transformasi jumlah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	63
Lampiran 2c. Hasil analisis uji anova terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	63
Lampiran 2d. Hasil analisis uji BNT terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	64
Lampiran 3a. Berat basah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)..	64
Lampiran 3b. Data transformasi berat basah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	64
Lampiran 3c. Hasil analisis uji Anova terhadap berat basah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	65
Lampiran 3d. Hasil analisis uji BNT terhadap berat basah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	65
Lampiran 4a. Grafik rata-rata waktu penyebaran miselium jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	66

Lampiran 1b. Grafik rata-rata jumlah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	66
Lampiran 1c. Grafik rata-rata berat basah tubuh buah jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	76

ABSTRAK

Nama Penyusun : Buharis
NIM : 60300111007
Judul Skripsi : “Pengaruh Penambahan Molase Pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian molase pada media tanam jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian eksperimental yaitu menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah konsentrasi molase. Sedangkan variabel terikat adalah pertumbuhan jamur tiram putih. Dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu penambahan molase yang terdiri dari empat perlakuan yakni tanpa molase, 10 ml/*baglog*, 15 ml/*baglog* dan 20 ml/*baglog*. Parameter yang diukur adalah waktu penyebaran miselium, jumlah tubuh buah, dan berat basah tubuh buah jamur tiram putih.

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik inferensial uji oneway Anova pada taraf kepercayaan α 0.05. selanjutnya dengan menggunakan uji BNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian molase dengan konsentrasi 20 ml/*baglog* memberikan hasil terbaik terhadap waktu penyebaran miselium, jumlah tubuh buah, dan berat basah tubuh buah.

Kata kunci: *Pleurotus ostreatus*, molase, miselium, jumlah tubuh buah, dan berat basah tubuh buah.

ABSTRAK

Compiler Name : Buharis
NIM : 60300111007
Title of Minithesis : "Effect of addition of molasses On Growing Media on Growth White Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*)"

This study was conducted to determine the effect of molasses on white oyster mushroom growing media (*Pleurotus ostreatus*). Research began in the laboratory of Botany Jurusan Biology Faculty of Science and Technology UIN Alauddin Makassar.

The type of research is experimental research that applies the principles of laboratory research. Variables consisted of independent variables and the dependent variable. The independent variable is the concentration of molasses. The dependent variable is the growth of white oyster mushroom. By using a completely randomized design (CRD) of the factor is the addition of molasses which consisted of four treatments ie without molasses, 10 ml / baglog, 15 ml / baglog and 20 ml / baglog. Parameters measured were mycelium deployment time, the number of fruiting bodies, and the wet weight of white oyster mushroom fruit body.

Data were analyzed by oneway ANOVA test inferential statistical confidence level α 0:05. further by using LSD. The results showed that administration of molasses with a concentration of 20 ml / baglog give the best results against the mycelium deployment time, the number of fruiting bodies, and the wet weight of white oyster mushroom fruit body (*Pleurotus streatus*).

Keywords: *Pleurotus ostreatus*, molasses, mycelium, the number of fruiting bodies, and the wet weight of the fruit body

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, jamur mulai dikenal dan dibudidayakan pada tahun 1950-an. Jamur mulai berkembang pesat sejak di era krisis ekonomi pada tahun 1998. Di antara jenis jamur yang dibudidayakan, jamur tiram merupakan jenis jamur yang cukup populer dan paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Budi daya terhadap jamur tiram telah dilakukan di berbagai tempat, bahkan sampai ke pelosok desa (Piryadi, 2013).

Jamur merupakan salah satu produk hortikultura yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat, salah satunya adalah jamur tiram. Jamur tiram memiliki khasiat kesehatan dan nilai gizi. Protein nabati yang terdapat dalam jamur tiram hampir sebanding dengan protein sayuran, dan memiliki kandungan lemak yang rendah dibandingkan daging sapi. Secara ekonomis, jamur tiram dapat dimanfaatkan menjadi makanan olahan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat (Wignyanto, 2012).

Penelitian ini menggunakan jamur tiram putih yaitu selain mudah di peroleh jamur tiram putih juga banyak mengandung manfaat, baik untuk dikonsumsi sebagai sayuran, dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dimana pada jamur tiram putih memiliki kandungan gizi yang tinggi dan banyak mengandung garam mineral dan kaya akan protein.

Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu, karena jamur tersebut tumbuh pada media kayu lapuk. Jamur ini tumbuh di daerah subtropis, daerah beriklim sedang dan daerah tropis dengan lingkungan yang sesuai. Jamur tiram putih banyak digemari oleh masyarakat karena cita rasanya yang khas. Kandungan di dalam jamur tiram putih pun banyak yang bermanfaat bagi tubuh kita diantaranya protein, fosfor, lemak, besi riboflavin dan lovastatin (penurun kolesterol). Jamur tiram putih dapat diolah menjadi beragam menu yang lezat dan nikmat antara lain : sup jamur, oseng jamur, orak-arik jamur, sate jamur dan lain-lain. Selain memiliki cita rasa yang enak jamur tiram putih juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita antara lain mengurangi kolesterol, sebagai zat antioksidan, mencegah hipertensi, beserat tinggi dan masih banyak manfaat yang lainnya.

Jamur tiram putih banyak digemari masyarakat dan memiliki manfaat yang banyak, jamur tersebut memiliki prospek usaha yang cukup bagus karena permintaan pasar yang tinggi. Prospek usaha jamur tiram putih ini akan menguntungkan jika produktivitas jamur tiram putih meningkat. Untuk membudidayakan jamur tiram putih ini diperlukan serbuk kayu sebagai media tanam, serbuk kayu yang digunakan adalah serbuk kayu sengon karena sengon memiliki struktur kayu yang keras dan banyak mengandung selulosa yang merupakan bahan yang diperlukan oleh jamur dalam jumlah banyak, selain serbuk kayu juga diperlukan baktul dan kapur. Baktul berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, karbon dan nitrogen. Karbon digunakan sebagai energi utama sedangkan nitrogen untuk membangun miselium. Kapur berfungsi untuk menjaga keasaman media dan sumber mineral, selain

menggunakan media tanam serbuk gergaji, bekatul dan kapur juga digunakan media tambahan tetes tebu atau molase sebagai penambah nutrisi jamur tiram putih (Suparti, 2013).

Budidaya jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada awalnya dilakukan dengan menggunakan media yang sederhana. Bahan baku media tanam yang sering digunakan adalah serbuk gergaji, bekatul, tepung jagung dan kapur. Kemudian karena media tanam serbuk gergaji sering kali dipakai oleh petani jamur dan hasil yang diperoleh tidak terlalu maksimal seperti jumlah tubuh buah yang sedikit maupun pada berat basah tubuh buah yang rendah maka dalam penelitian ini kami mencoba menggunakan molase pada media tanam yang dimana molase ini diketahui dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan miselium, banyak tubuh buah dan berpengaruh terhadap berat basah tubuh buah.

Pada saat sekarang ini belum banyak penelitian tentang pemanfaatan limbah industri seperti molase, padahal limbah industri ini sangat mudah didapatkan dan banyak mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh jamur tiram seperti kalsium dan magnesium yang berfungsi dalam pertumbuhan jamur tiram putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi untuk metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan miselium. Oleh karena itu perlu di upayakan penelitian mengenai pemanfaatan limbah industri seperti molase sebagai sumber komponen penyusun pertumbuhan jamur tiram putih.

Sebagaimana pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumiati dan Herbogiandono cit. Putranti (2003) yang menambahkan gula pasir 5% yang ternyata

sangat nyata dalam meningkatkan bobot segar jamur. Selain itu menurut penelitian Dewi (2009) pemberian blotong 0,04 kg yang sama-sama merupakan limbah pabrik gula seperti halnya molase dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Steivani (2011) yaitu dengan menggunakan media kayu sengong, akasia dan glugu dengan pemberian molase 5 ml, 10 ml, 15 ml dan 20 ml ternyata hasil yang yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian molase dengan konsentrasi 15 ml/baglog mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih yang baik.

Molases adalah hasil samping yang berasal dari pembuatan gula tebu (*Saccharum officinarum*. L). Molases berupa cairan kental dan diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula. Molases tidak dapat lagi dibentuk menjadi sukrosa namun masih mengandung gula dengan kadar tinggi 50-60%, asam amino dan mineral. Molases kaya akan biotin, asam pantotenat, tiamin, fosfor, dan sulfur. Selain itu juga mengandung gula yang terdiri dari sukrosa 30-40%, glukosa 4-9%, dan fruktosa 5-12%. Tetes tebu digunakan secara luas sebagai sumber karbon untuk denitrifikasi, fermentasi anaerobik, pengolahan limbah aerobik, dan diaplikasikan pada budidaya perairan. Karbohidrat dalam tetes tebu telah siap digunakan untuk fermentasi tanpa perlakuan pendahuluan karena sudah berbentuk gula (Nurul, 2013).

Alasan penggunaan molase sebagai bahan campuran pada berbagai serbuk gergaji dalam pembuatan media jamur adalah untuk memanfaatkan limbah perindustrian yang tidak terpakai dan mudah diperoleh. Meskipun hanya mengandung gula dalam jumlah sedikit, molase dapat meningkatkan berat segar jamur dan masa

periode panen. Adanya senyawa gula yang terkandung dalam molase, diharapkan dapat menyediakan energi yang dibutuhkan untuk metabolisme di dalam sel (Steviani, 2011).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penambahan molase pada berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan jamur tiram putih?
2. Pada konsentrasi berapakah molase dapat memberi pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan jamur tiram putih?

C. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sampel yang berupa Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) diperoleh pada pembudidayaan jamur tiram. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian jamur tiram putih di budidayakan.

2. Batas Penelitian

Pada penelitian ini hal yang di teliti yaitu pertumbuhan hifa, pertumbuhan miselium sampai jamur memperoleh tubuh buah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh putranti (2003), pemberian molase dan dedak berpengaruh terhadap saat munculnya miselium,

panjang penyebaran miselium, saat munculnya badan buah dan jumlah badan buah. Penambahan molase 68 cc/l dan 136 cc/l mempunyai pengaruh yang lebih baik dari pada penambahan molase 204 cc/l pada keseluruhan media. Selain itu, hasil komunikasi pribadi pada beberapa petani jamur yang telah menggunakan molase, mereka memperlakukan pada setiap 100 kg media ditambahkan molase sebanyak 1 liter.

Molase merupakan limbah dari pabrik gula yang tidak dapat dikristalkan lagi. Molase memiliki kandungan K, Ca, Cl, yang berfungsi dalam pertumbuhan jamur tiram putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi untuk metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan miselium. Molase juga memiliki kandungan unsur nitrogen berkisar 2-6% yang berfungsi untuk membangun miselium. Pemilihan media tambahan molase pada dosis yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih (Puspaningrum, 2013).

Pada saat ini banyak telah banyak dilakukan pemanfaatan molase sebagai pupuk dan campuran pakan ternak, akan tetapi bahwa bukan molase yang didalamnya terdapat kandungan zat organik dapat bebas dibuang ke lingkungan. Molase merupakan cairan kental (seperti pasta) yang berwarna coklat gelap dan masih mengandung sejumlah bahan organik seperti gula, karbohidrat, asam organik, senyawa nitrogen sebagai protein dan unsur abu (Steviani, 2011).

Budidaya jamur di Indonesia umumnya masih menggunakan bibit dari perbanyakan bibit impor, sulit didapat sehingga harganya mahal. Media utama yang

digunakan dalam budidaya jamur umumnya limbah serbuk gergaji kayu. Teknologi budidaya relatif sederhana sehingga mudah diserap oleh masyarakat, dan sangat cocok jika dikaitkan dengan program pelestarian lingkungan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati. Contoh, berdasarkan studi kelayakan ekonomi pada skala rumah tangga, budidaya jamur tiram dapat dikembangkan pada skala usaha tani kecil (Suprpti *et al*, 2009).

Jamur mengandung garam mineral lebih tinggi daripada yang terkandung pada daging sapi dan domba. Jumlah garam mineral yang terkandung dalam jamur ini bahkan hampir dua kali jumlah garam mineral dalam sayuran lain. Jumlah protein yang terdapat pada jamur sebanyak dua kali lipat protein yang terdapat pada asparagus, kol dan kentang (Steviani, 2011).

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan molase pada berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan jamur tiram putih.
2. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapakah molase dapat memberi pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan jamur tiram putih.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan para petani untuk mengembangkan manfaat dan kegunaan molase dalam mengembangkan budidaya jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jamur Tiram

Jamur dalam bahasa Indonesia disebut “cendawan” dan dalam istilah botani disebut “fungi” termasuk kedalam golongan tumbuhan sederhana karena tidak berklorofil. Tubuh jamur terdiri atas satu atau beberapa sel yang berbentuk tabung bersekat-sekat atau tidak bersekat, hidup pada bahan atau media tumbuh yang telah mengandung nutrisi yang dibutuhkannya (Autotropik). Secara sederhana pengertian jamur adalah tumbuhan sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau sejumlah sel dalam bentuk benang-benang (miselia) yang bercabang-cabang. Bakal tubuh buah atau primordia dari basidiomiset adalah gumpalan kecil yang terdiri dari kumpulan miselia yang berkembang menjadi tubuh buah. Diameter tubuh buah sekitar 1 mm. primordia berkembang dan pada tubuh buah muda terlihat bagian-bagian tubuh buah seperti tudung dan tangkai yang terletak tidak di tengah tudung (Maulana, 2012).

Jamur dalam kehidupan manusia dapat mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Manfaat langsung yang bisa kita rasakan adalah beberapa jamur dapat dijadikan bahan makanan, sedangkan manfaat tidak langsung yaitu banyak jamur yang menjadi bagian dalam pembuatan obat-obatan tradisional maupun modern. Selain mendatangkan keuntungan, beberapa jenis jamur juga dapat merugikan

misalnya sebagai penyebab penyakit pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Puspitasari, 2009).

Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah jamur memiliki tudung (pileus) dan tangkai (stipe). Pileus berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 5–15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Sedangkan tangkai berukuran 2–6 cm yang mana menyangga tudung agak lateral (di bagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah) (Yanuati, 2007).

Secara umum jamur tirm mempunyai tudung yang berdiameter 4-15 cm atau lebih, bentuk seperti tiram, cembung kemudiaan menjadi rata atau kadang membentuk corong; permukaan licin agak berminyak ketika lembab tetapi tidak lengket; warna bervariasi dari putih sampai abu-abu, coklat atau coklat tua (kadang-kadang kekuningan pada jamur dewasa), daging tebal, bewarna putih, kokoh tidak lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkai; bau dan rasa tidak merangsang. Tangkai tidak ada atau jika ada buasanya pendek, kokoh dan tidak dipusat atau lateral, panjang 0.5-4.0 cm, gemuk, padat, kuat, kering, umumnya berambut atau berbulu kapas. Cadar tidak ada, jejak spora putih sampai ungu muda atau abu-abu keunguan berukuran 7-9x3-4 mikron, bentuk lonjong sampai jorong, licin, nanamiliod (Sanjoyo, 2011).

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris sebenarnya telah lama membudidayakan aneka jenis jamur konsumsi, bahkan sejak perang dunia kedua.

Dari sekian banyak jenis jamur, jamur tiram merupakan jenis jamur yang paling banyak dibudidayakan. Seiring dengan berkembangnya zaman, orang mulai mengetahui khasiat dan manfaat dari jamur tiram, sehingga timbul dorongan untuk mulai membudidayakannya secara mandiri (Piryadi, 2013).

Jamur tiram biasanya diolah menjadi aneka makanan lezat. Secara sosial budaya, jamur tiram merupakan bahan pangan bergizi, berkhasiat obat yang lebih murah dibandingkon obat modern. Secara ekonomis merupakan komoditas yang tinggi harganya dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Adanya diversifikasi produk olahan jamur tiram diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah. Dikarenakan umur jamur tiram yang tidak tahan lama, maka salah satu bentuk diversifikasi yang mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan adalah mengolah jamur tiram sebagai sosis jamur tiram. Sosis secara umum adalah daging yang digiling sampai halus, diberi bumbu, berada dalam selongsong, dimasak dan kadang-kadang dengan pengasapan serta selalu disajikan dalam keadaan dingin. Jamur tiram dapat digunakan menjadi alternatif bahan pangan bagi para vegetarian yang ingin menikmati olahan pangan dalam bentuk sosis, dikarenakan jamur tiram dapat diolah menjadi sosis, dan dapat menjadikan solusi bagi para vegetarian sebagai pengganti daging (Wignyanto, 2012).

Jamur tiram dalam bahasa latin disebut *Pleurotus ostreatus* merupakan jenis jamur masuk pada kelas Basidiomycetes. Spesies jamur tiram, *Pleurotus ostreatus* dikenal oleh para petani jamur dengan sebutan jamur tiram putih karena bentuk tudungnya yang menyerupai cangkang tiram (cangkang kerang) dan jamur ini

berwarna putih. Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur kayu. Jamur tiram biasa disebut dengan jamur kayu karena banyak tumbuh pada media kayu yang sudah lapuk. Jamur ini disebut dengan jamur tiram karena memiliki bentuk tudung yang agak membulat, lonjong, dan melengkung hampir seperti cangkang tiram. Batang atau tangkai jamur ini tidak tepat berada pada tengah tudung, tetapi agak ke tepi (Steviani, 2011).

Jamur tiram disukai karena rasanya yang enak dan kandungan gizi yang tinggi, namun tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Ada beberapa jenis jamur yang mengandung racun dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Jamur beracun diberi istilah toadstool, sedangkan jamur konsumsi istilahnya *mushroom*. Tidak perlu khawatir, dua jenis jamur ini dapat dibedakan dari ciri-ciri fisiknya. Umumnya penampilan jamur beracun sangat menarik karena warnanya yang mencolok seperti orange, kuning terang, biru, merah darah dan tumbuh ditempat yang kotor. Ada juga jamur beracun yang warnanya hampir menyerupai jamur pangan, untuk membedakannya pada jamur beracun jika bagian batang dipotong akan tercium bau menyengat seperti telur busuk atau *amoniak*, bagian yang dipotong juga berubah warna menjadi lebih gelap seperti hitam atau biru. Bahkan ada beberapa jamur beracun mengeluarkan getah berwarna putih kental jika batangnya dipotong. Jamur beracun memiliki cincin atau cawan pada pangkal batang, meskipun jamur merang juga memiliki cawan pada batangnya tapi jamur ini aman dikonsumsi (Meinanda, 2013).

Permintaan terhadap jamur dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan. Permintaan jamur tidak hanya sebatas pasar dalam negeri, tetapi juga merambat hingga ke pasar internasional. Sayangnya, hingga saat ini jumlah produksi jamur yang ada belum bisa memenuhi angka permintaan. Padahal, kebutuhan jamur tidak hanya terbatas pada permintaan jamur segar, masih ada peluang besar pada beberapa segmen usaha yang berkaitan erat dengan bisnis jamur. Misalnya, bisnis bibit jamur (inokulan), bisnis penjualan media jamur (baglog), bisnis olahan jamur, bisnis jasa dan pelatihan budidaya jamur, serta bisnis bidang agrowisata jamur (Fauzi *et al*, 2013).

Jamur tiram merupakan kelompok *Thallophyta*. Meskipun tergolong tumbuhan yang rendah karena perkembangannya kurang sempurna, namun sejak 3000 tahun siam, jamur tiram sudah mulai di nikmati di negara-negara seperti japang, cina, korea dan mesir. Sebagian besar mereka meyakini bahwa mengonsumsi jamur ini dapat meningkatkan kekebalan (berumur panjang). Beberapa negara seperti rusia, yunani, dan meksiko sangat percaya bahwa memakan jamur tiram dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jamur ini sangat populer saat ini. Teksturnya lembut, penampilannya menarik, dan cita rasanya relatif netral, sehingga mudah dipadukan dengan berbagai masakan. Budidayanya juga relatif mudah dan murah hingga sangat potensial dikomersilkan (Wijaya, 2014).

Jamur tiram dari bahasa yunani disebut *Pleurotus*, artinya “bentuk samping atau posisi menyamping antar tangkai dengan tudung”, sedangkan sebutan lama “tiram”, karena bentuk atau tubuh buahnya menyerupai kulit tiram (cangkang kerang). Di

belahan amerika dan eropa, jamur ini lebih populer dengan sebutan *Oyster mushroom*, mempunyai tangkai tudung tidak tepat ditengah seperti jamur lainnya (Steivani, 2011).

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) merupakan salah satu jenis jamur kayu yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan sebagai diversifikasi bahan pangan karena kandungan gizinya setara dengan daging dan ikan. Jamur tiram putih dilihat dari segi ekonomi dapat memberikan keuntungan karena harganya cukup tinggi, per kilogram bisa mencapai sepuluh ribu rupiah bahkan bisa lebih. Permintaan pasar lokal dan ekspor terbuka lebar, waktu panennya singkat sekitar 1-3 bulan, bahan baku mudah didapat, dan tidak membutuhkan lahan yang luas, oleh karena itu jenis jamur ini mulai banyak dibudidayakan (Darliana, 2013).

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) merupakan salah satu jamur konsumsi yang saat ini cukup populer dan banyak digemari masyarakat karena rasanya lezat dan juga penuh kandungan nutrisi, tinggi protein, dan rendah lemak. Daya simpan jamur tiram sendiri mudah sekali rusak setelah dipanen. Hal ini disebabkan jamur tiram memiliki kadar air cukup tinggi yaitu 86,6% (Gita, 2013).

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) saat ini cukup populer dan banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya yang lezat dan juga penuh kandungan nutrisi, tinggi protein, dan rendah lemak. Jamur tiram putih mempunyai kemampuan meningkatkan metabolisme dan menurunkan kolesterol. Selain itu, manfaat lain yang dimiliki jamur tiram adalah sebagai anti-bakterial, dan anti-tumor sehingga jamur tiram juga banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit mulai

dari diabetes, lever, dan lainnya. Jamur tiram juga sangat baik dikonsumsi terutama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan karena memiliki kandungan serat pangan yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan pencernaan. Selain serat, setiap 100 gram jamur kering juga mengandung protein 10,5 - 30,4%, lemak 1,7 – 2,2%, karbohidrat 56,6%, tiamin 0,2 mg, riboflavin 4,7 – 4,9 mg, niasin 77,2 mg, kalsium 314 mg, dan kalori 367 (Suwito, 2006).

Jamur tiram putih mempunyai khasiat untuk kesehatan adalah menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka pada permukaan tubuh, mencegah penyakit diabetes melitus, menyempit pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, dan mencegah penyakit tumor atau kanker, kelenjar gondok, influenza, serta memperlancar buang air besar (Kalsum *et al*, 2011).

Jamur tiram putih mempunyai aroma yang khas karena mengandung muskorin, dan penting bagi kesehatan. Jamur tiram mempunyai kandungan protein sebanyak 5,4%, karbohidrat 59%, serat 1, 56%, lemak 0,17%, selain itu setiap 100 g jamur tiram mengandung kalsium 8,9 mg, besi 1,9 mg, fosfor 17,0 mg, vitamin B 0,15 mg, vitamin B2 0,75 mg, vitamin C 12,40 mg dan menghasilkan 45,65 kalori (Afina *et al*, 2012).

Agus (2006), menjelaskan bahwa jamur tiram putih (*Pleurotus oatreatus*) merupakan salah satu jenis jamur kayu yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan sebagai diversifikasi bahan pangan serta kandungan gizinya setara dengan daging dan ikan. Jamur tiram putih dilihat dari segi bisnis menguntungkan karena harganya cukup tinggi, per kilogram bisa mencapai sepuluh ribu bahkan bisa

lebih. Permintaan pasar lokal dan ekspor terbuka lebar, waktu panennya singkat sekitar 1-3 bulan, bahan baku mudah didapat, dan tidak membutuhkan bahan baku yang luas, oleh karena itu jamur tiram putih mulai di budidayakan (Mufarrihah, 2009).

Jamur tiram merupakan jamur pangan yang berasal dari kelompok *basidiomycetes*, disebut jamur tiram karena tudungnya berbentuk lingkaran seperti cangkang tiram. Warna tudungnya beragam dari mulai putih, putih kekuningan, kuning, abu-abu, abu kecokelatan, coklat bahkan ada yang berwarna merah dan biru. Permukaan tudungnya sedikit licin namun tidak lengket, berdiameter antara 3 sampai 15 sentimeter. Sebagian jamur ini memiliki tangkai yang bercabang, tubuh atau batangnya berwarna putih, pendek, dan menyamping. Pada umumnya jamur tiram tumbuh bergerombol, namun beberapa jenis ada yang tumbuh soliter. Jamur tiram berdaging tebal, berwarna putih, kenyal, dan teksturnya mirip daging ayam. Pada umumnya jamur tiram tumbuh pada kayu atau pohon yang sudah mulai melapuk di hutan yang sejuk, oleh sebab itu jamur tiram termasuk jenis jamur kayu (Meinanda, 2013).

Pertumbuhan jamur apabila spora yang sudah masak jatuh ditempat yang cocok, kemudian spora tersebut akan tumbuh menjadi miselium. Apabila lingkungan tempat miselium baik, dalam arti temperatur kelembaban, dan substrak tempat tumbuh memungkinkan maka kumpulan miselium akan tumbuh menjadi bakal buah jamur. Bakal buah jamur kemudian membesar dan pada akhirnya membentuk tubuh buah jamur. Tubuh buah jamur inilah yang akan dipanen untuk dikonsumsi. Berat

basah dari tubuh buah jamur inilah yang menentukan tinggi atau rendahnya produktivitas jamur tiram (Pradita, 2012).

Kasifikasi jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), menurut Wijaya (2014) adalah sebagai berikut:

Regnum	: Fungi
Devisio	: Basidiomycota
Classis	: Homobasidiomycetes
Ordo	: Agaricales
Familia	: Tricholomataceae
Genus	: <i>Pleurotus</i>
Species	: <i>Pleurotus ostreatus</i> .

1. Siklus Hidup Jamur

Jamur bereproduksi dengan cara melepaskan spora yang dihasilkan secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual hanya dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan yang kurang sesuai dengan jamur. Reproduksi seksual ini menghasilkan keturunan dengan keanekaragaman genetik yang lebih besar. Variasi individu pada keturunan ini dapat membantu mereka beradaptasi ketika terjadi perubahan lingkungan. Sedangkan reproduksi aseksual pada jamur menggunakan spora yang dihasilkan oleh hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan jamur memungkinkan, pertumbuhannya akan cepat, jamur mengklon diri mereka sendiri dengan cara menghasilkan banyak spora secara aseksual. Spora ini akan terbawa oleh angin dan berkecambah jika mendarat ditempat yang lembab

dan permukaan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Spora akan berkecambah membentuk benang-benang halus yang merupakan bagian dari dinding tubuler yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma yang disebut dengan hifa. Hifa membentuk suatu hamparan anyaman yang disebut miselium. Miselium merupakan jaringan “makan” dari jamur (Narwanti, 2013).

Menurut Meinanda (2013), siklus hidup jamur tiram adalah sebagai berikut:

a. Spora

Awal mula jamur berasal dari spora. Spora berukuran kecil dan berbobot ringan sehingga mudah berterbangan menyebar ke berbagai tempat dengan bantuan angin. Spora yang telah matang akan terlepas dari tubuh jamur dan jatuh atau menempel di berbagai tempat. Spora akan tumbuh jika kondisi lingkungan tempat ia menempel mendukung proses pertumbuhannya. Suhu, kelembaban, dan sumber makanan merupakan kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan spora untuk menjadi jamur. Jika spora jatuh pada tempat yang kurang mendukung pertumbuhannya, spora dapat bertahan cukup lama hingga kondisi tempat ia menempel dapat mendukung syarat pertumbuhannya.

b. Hifa

Ketika kondisi lingkungan sudah memadai untuk pertumbuhan, spora akan mulai berkecambah. Kecambah yang berbentuk spora berupa benang-benang tipis berwarna putih dan disebut dengan *hifa*. Fungsi *hifa* hampir sama dengan fungsi akar pada tumbuhan, yaitu untuk menyerap sumber makanan.

c. Miselium

Hifa akan terus tumbuh dan menyebar keseluruh media tumbuh. Pertumbuhan *hifa* memanjang, bercabang, dan saling tumpang tindih disebut dengan *miselium*. *Miselium* berwarna putih seperti kapas dan akan menutupi seluruh permukaan media tumbuh.

d. Pin Head

Pin head akan tumbuh dari miselium yang paling numpuk dan membentuk benjolan atau gumpalan kecil seperti kancing. *Pin head* ini nantinya akan berkembang menjadi jamur dewasa, dari tudung yang menguncup kemudian menjadi mekar membentuk setengah lingkaran seperti cangkang tiram.


e. Jamur dewasa

Dua sampai empat hari setelah kemunculan *pin head*, jamur memulai memasuki fase dewasanya. Jamur dewasa akan kembali menghasilkan spora. Spora dihasilkan oleh serat-serat halus dibawah tudung jamur yang disebut *lamela*. Disalam *lamela* ini terdapat *basidium*, yaitu sel-sel penghasil spora.

Berdasarkan fase perkembangannya, dikenal tiga macam miselia, yaitu fase miselium primer, sekunder dan tersier. Miselium primer terbentuk dari basidiospora yang jatuh pada media yang menguntungkan, miselium ini berinti satu haploid. Fase ini merupakan pertunasan dan fragmentasi hifa yang disebut pembiakan vegetatif. Fase vegetatif berakhir saat miselium primer mengadakan plasmogami antara dua hifa yang kompatibel dan membentuk miselium sekunder berinti dua. Fase selanjutnya, miselium sekunder akan berhimpun menjadi jaringan

tertutup dan membentuk tubuh buah (basidiocarp) yang menghasilkan basidiospora.

Fase ini disebut fase generatif atau fase reproduktif (Steviani, 2011).



Gambar 2.1. Siklus hidup jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur Tiram

1. Temperatur

Jamur dapat tumbuh pada kisaran temperatur yang lebih luas. Kebanyakan jamur tumbuh antara temperatur 0-35°C dengan suhu optimum untuk spesies saprofit 22-30°C. Diupayakan temperatur lingkungan sekitar tumbuh jamur selalu dalam keadaan stabil, supaya pertumbuhan dan perkembangan tidak terganggu. Untuk menjaga suhu agar tetap stabil jika suhu kumbung mulai panas, maka dapat dilakukan penyemprotan menggunakan air bersih hingga suhu kumbung menjadi sejuk kembali (Narwanti, 2013).

2. Kelembaban

Kelembaban udara berpengaruh pada pertumbuhan jamur tiram cepat atau lambat, sehat atau tidak sehatnya pertumbuhannya. Kelembaban yang bagus yaitu

berkisar 21-28°C. Kelembapan memegang peranan penting sehingga perlu diperhatikan kelembapan yang kurang memenuhi syarat dapat diperbaiki dengan menggunakan cara lain seperti untuk daerah panas ditempatkan pada lingkungan pepohonan besar, log, atau polibag selalu disiram (Narwanti, 2013).

3. Keasaman (pH)

Media yang terlalu asam atau basa dapat menyebabkan pertumbuhan miselium dan tubuh buah terhambat. Pertumbuhan miselium dan tumbuh buah jamur yang ideal pada pH maksimum 4 sampai 6. Bila pH di atas 6,0 pertumbuhannya kurang baik (Narwanti, 2013).

4. Cahaya

Jamur tidak membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya, namun demikian cahaya penting untuk merangsang sporulasi dan juga berguna dalam pemencaran spora karena organ-organ yang menghasilkan spora bersifat fototrofik dan memencarkan sporanya ke arah cahaya (Narwanti, 2013).

5. Kadar air

Kandungan air dalam media pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium maupun perkembangan tubuh buah. Jamur tiram memerlukan kandungan air tidak lebih dari 70% (Narwanti, 2013).

6. Kebutuhan nutrisi jamur

Seperti halnya tumbuhan lain jamur tiram juga memerlukan nutrisi dalam bentuk unsur hara seperti karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Besi

(Fe) dan Seng (Zn). Dalam media tanam, unsur tersebut harus dipersiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam budidaya jamur tersebut. Jamur tidak dapat menggunakan energi matahari seperti tanaman berklorofil untuk proses biologi tetapi menghasilkan sejumlah enzim ekstra yang dapat mendegradasi senyawa yang dapat larut dan kemudian diserap oleh jamur. Untuk nutrisi, unsur utama yang digunakan untuk budidaya adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin. Ukuran molekul nutrien bagi jamur harus cukup kecil sehingga mampu untuk melewati dinding sel dan membran. Oleh karena itu jamur harus terlebih dahulu merombak molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil untuk dapat diabsorpsi. Perombakan molekul ini dilakukan dengan mengeluarkan enzim ekstraseluler.

Pada umumnya jamur mensekresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan untuk mengurai substrat yang kompleks agar memperoleh nutrien-nutrien yang diperlukannya. Transportasi nutrien ke dalam sel jamur dapat berlangsung melalui beberapa cara, antara lain melalui transportasi aktif. Adanya pertumbuhan oleh jamur pada suatu substrat dapat diketahui karena proses metabolisme jamur menyebabkan perubahan pada substrat antara lain timbulnya perubahan warna pada substrat (Narwanti, 2013).

7. Serbuk gergaji kayu

Kualitas media tanam merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi keberhasilan budidaya jamur. Media tanam jamur biasanya menggunakan serbuk gergaji sebagai substrat dari berbagai jenis kayu seperti kalu sengono randu, karet, jati, mahoni dan jenis pohon lainnya. Kayu sengon digunakan sebagai

media produksi karena proses pelapukannya cepat sehingga masa tumbuh jamur cepat, tidak memerlukan perendaman dan pengeringan yang lama (Sanjoyo, 2011).

Kayu merupakan media utama jamur untuk tumbuh di alam sehingga serbuk gergaji kayu sangat cocok untuk media budidaya jamur tiram (Sunarmi dan Saparinto, 2010). Suriawiria (2002) menambahkan bahwa serbuk gergaji kayu merupakan tempat tumbuh jamur tiram yang tergolong sebagai jamur pengguna selulosa, hemiselulosa, dan lignin, yang dapat mengurai dan memanfaatkan komponen kayu sebagai sumber C (karbon).

Media serbuk gergaji sebagai media tumbuh jamur tiram ditambahkan dedak agar dapat mempercepat pertumbuhan miselium jamur. Sesuai dengan pernyataan Parjimo dan Andoko (2007), yang menyatakan bahwa dedak mampu mempercepat pertumbuhan miselium dan mendorong perkembangan tubuh buah jamur. Penambahan dedak dalam media serbuk gergaji dapat meningkatkan nutrisi media tanam, terutama sebagai sumber karbohidrat, karbon (C), serta nitrogen (N). pH merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur pada media tanam. Secara umum, hampir semua miselium jamur tumbuh optimal pada pH netral (antara 6,5-7,0) (Ramza, 2013).

8. Bekatul

Menurut Sutarja (2010), bekatul merupakan limbah penggilingan padi yang merupakan bagian luar atau kulit ari beras yang merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi. Walaupun bekatul merupakan limbah dari penggilingan

padi, tetapi mempunyai kandungan gizi, vitamin dan protein yang cukup tinggi (Narwanti, 2013).

Bekatul atau dedak padi merupakan hasil sisa penggilingan padi. Digunakan sebagai bahan tambahan media tanam yang berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, karbon dan nitrogen. Bekatul juga kaya akan vitamin B kompleks, merupakan bagian yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur serta berfungsi juga sebagai pemicu pertumbuhan tubuh buah. Media yang dibuat dari campuran beberapa macam bahan tersebut perlu diatur pH-nya. Kadar air media diatur hingga 50-65%. Air perlu ditambahkan agar miselia jamur dapat tumbuh dan menyerap makanan dari media dengan baik. Tingkat keasaman media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram. Apabila pH terlalu rendah atau tinggi, maka pertumbuhan jamur tiram akan terhambat. Bahkan akan kemungkinan akan tumbuh jamur lain yang akan mengganggu pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Selain itu juga digunakan bekatul yang merupakan bahan untuk pertumbuhan tubuh buah jamur, bekatul ini juga kaya vitamin, terutama vitamin B (Nurul, 2014).

Pada budidaya jamur kapur juga diperlukan karena berfungsi sebagai pengatur pH (Keasaman) media tanam dan sebagai sumber kalsium (Ca) yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Kapur yang digunakan sebagai campuran bahan media adalah kapur pertanian yaitu kalsium karbonat (CaCO_3) atau kapur bangunan (Warisno *et al*, 2010).

Substrat atau media adalah faktor utama bagi kehidupan jamur. Jamur akan hidup subur pada bahan-bahan yang melapuk atau terdekomposisi. Bahan organik yang mengandung selulosa dan lignin dalam jumlah besar akan mendukung pertumbuhan miselium dan perkembangan tubuh buah (Chang, 1978). Kayu atau serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat jamur menurut Parlindungan (2000) mengandung karbohidrat, serat, lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Zat yang terkandung dalam kayu tersebut ada yang berguna dan membantu pertumbuhan jamur, tetapi adapula yang menghambat. Kandungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram adalah karbohidrat, lignin dan serat, sedangkan faktor penghambat adalah getah dan zat ekstraktif (zat pengawet alami yang terdapat pada kayu). Oleh karena itu, serbuk kayu yang digunakan untuk budidaya jamur sebaiknya berasal dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet alami.

Jamur tiram memerlukan nutrisi yang relatif mudah diserap, media tumbuh yang kaya vitamin, mineral untuk memenuhi aktivitas metabolisme selnya. Suplemennya juga relatif mudah disediakan oleh pembudidayaan jamur. Sejauh ini pemanfaatan limbah pertanian yang potensial layak sebagai media untuk budidaya jamur pangan semakin terbatas karena teknologi pemanfaatan sudah semakin berkembang maju. Untuk itu, perlu dicari limbah pertanian potensial yang dapat digunakan sebagai alternatif media tumbuh (Nurul *et al*, 2014).

Media tanam untuk jamur tiram putih yang dapat memberi produk yang tinggi dengan kandungan protein yang tinggi pula adalah campuran jerami dan gambrang (pucuk jerami) dengan perbandingan 2:1. Kalau hanya jerami saja kandungan

proteinnya tinggi, tetapi produk jamurnya rendah. Sebaliknya kalau hanya gambrang saja, produksinya tinggi tetapi kandungan proteinnya rendah. Faktor terpenting pada pembudidayaan jamur tiram putih ini adalah ketelitian dan ketekunan serta kebersihan atau sterilisasi ruang tumbuh. Terdapat tiga macam kegiatan budidaya jamur tiram putih, yaitu pembibitan atau starter, pembuatan media tanam serta pemeliharaan dan pemanenan (Andayanie, 2013).

Dalam budi daya jamur tiram dengan media kayu bulat/glondong pemilihan kayu, kesegaran jenis, waktu tebang, fase tumbuh, dan umur tanaman perlu mendapat perhatian. Dalam pengadaan kayu bulat, pilih jenis tanaman yang berkayu keras. Usahakan satu jenis jika lebih dari satu jenis tiap jenis dipisahkan, umur lebih dari 10 tahun, fase tebang saat menggugurkan daun (misal kayu karet), dan penebangan dilakukan pada musim kemarau atau musim gugur di daerah subtropika (Maulana, 2012).

Kehidupan jamur berawal dari spora (basidiospora) yang kemudian akan berkecambah membentuk hifa yang berupa benang-benang halus. Hifa ini akan tumbuh keseluruh bagian media tumbuh. Kemudian dari kumpulan hifa atau miselium akan terbentuk gumpalan kecil seperti simpul benang yang menandakan bahwa tubuh buah mulai terbentuk. Simpul tersebut berbentuk bundar atau lonjong dan dikenal dengan radia kepala jamur (*pin head*) atau primordial. Simpul ini akan membesar dan disebut stadia kancing kecil (*small button*). Selanjutnya stadia kancing kecil akan terus membesar mencapai stadia kancing (*button*) dan stadia telur atau (*egg*). Pada stadia ini tangkai dan tudung yang tadinya tertutup selubung universal

mulai membesar. Selubung tercabik, kemudian diikuti stadia perpanjangan (*elongation*). Cawan (*volva*) pada stadia ini berpisah dengan tudung (*pileus*) karena perpanjangan tangkai (*stalk*). Stadia terakhir adalah stadia dewasa (tubuh buah) (Steviani, 2011).

Menurut (Piryadi, 2013), pelaksanaan budi daya jamur tiram secara terpadu membutuhkan perencanaan yang matang, karena beragam resiko yang dihadapi kedepannya. Resiko tersebut diantaranya gagal produksi akibat kontaminasi, gagal panen, dan kesulitan memasarkan. Karena itu, perencanaan yang matang dengan memperhitungkan hal-hal detail diperlukan untuk meminimalkan resiko tersebut seperti modal, sumber daya manusia, teknologi, bahan baku dan lokasi (Steviani, 2011).

Syarat pertumbuhan, secara alami jamur tiram ditemukan di hutan di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak, di tempat terlindung miselium jamur akan tumbuh lebih cepat dari pada di tempat yang terang dengan cahaya matahari yang berlimpah, kelembaban ruangan optimal 80–90 %, yang harus dipertahankan dengan menyemprot air secara teratur, suhu udara untuk pertumbuhan miselium adalah 25 - 30 °C dan untuk pertumbuhan tubuh buah adalah 18 – 20 °C. Miselium jamur tumbuh optimal dalam keadaan gelap dan kondisi asam (pH 5,5 – 6,5). Tetapi kondisi lingkungan atau substrat tempat tumbuh yang terlalu asam (pH rendah) atau pH terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan miselium. Sebaliknya, tubuh buah

jamur tidak tumbuh optimal pada lingkungan yang agak terang dan kondisi keasaman agak netral (pH 6,8 – 7,0) (Steviani, 2011).

Untuk meningkatkan produksi jamur tiram, maka dalam campuran bahan media tumbuh selain serbuk gergaji sebagai bahan utama, perlu bahan tambahan berupa bekatul dan tepung jagung. Dalam hal ini harus dipilih bekatul dan tepung jagung yang mutunya baik, masih baru sebab jika sudah lama disimpan kemungkinan telah menggumpal atau telah mengalami fermentasi serta tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Kegunaan penambahan bekatul dan tepung jagung merupakan sumber karbohidrat, lemak dan protein. Disamping itu perlu ditambahkan bahan-bahan lain seperti kapur (Calcium carbonat) sebagai sumber mineral dan pengatur pH meter (Suprapti, 2010).

Nutrisi sangat berperan dalam proses budidaya jamur tiram. Nutrisi bahan baku atau bahan yang ditambahkan harus sesuai dengan kebutuhan hidup jamur tiram. Bahan baku yang digunakan sebagai media dapat berupa batang kayu yang sudah kering, campuran antara serbuk kayu dan jerami atau bahkan alang-alang. Selain itu bahan baku tersebut harus ditambahkan beberapa bahan tambahan antara lain bekatul sebagai sumber karbohidrat, lemak dan protein; kapur sebagai sumber mineral dan pengatur pH media; gips sebagai bahan penambah mineral dan sebagai bahan pematat (Nurul, 2014).

Adapun karakteristik pertumbuhan jamur tiram pada baglog serbuk gergaji yaitu dalam jangka waktu antara 40-60 hari seluruh permukaan baglog sudah rata ditumbuhi oleh miselium berwarna putih. Satu sampai dua minggu setelah baglog

dibuka biasanya akan tumbuh tunas dalam 2-3 hari akan menjadi badan buah yang sempurna untuk dipanen. Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah menunjukkan lebar tudung antara 5-10 cm. produksi jamur dilakukan dengan memanen badan buah sebanyak 4-5 panen dengan rerata 100 g jamur setiap panen. Jarak selang waktu antara masing-masing panen adalah 1-2 minggu (Steviani, 2011).

C. Molase

Salah satu industri pangan yang menghasilkan limbah adalah industri gula tebu. Industri pengolahan gula tebu dari batang tebu menjadi gula pasir menghasilkan tetes tebu (molase). Molase diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula dan masih mengandung gula 50-60%, asam amino dan mineral yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan Mono Sodium Glutamat (MSG), gula cair, arak, spirtus dan alkohol (Steviani, 2011).

Molase adalah sejenis sirup yang merupakan sisa dari proses pengkristalan gula pasir. Molase tidak dapat dikristalkan karena mengandung glukosa dan fruktosa yang sulit untuk dikristalkan. Molase (*black strap*) merupakan limbah cair yang berasal dari sisa-sisa pengolahan tebu menjadi gula. Molase ternyata memiliki kandungan zat yang berguna. Zat tersebut antara lain kalsium, magnesium, potassium, dan besi. Molase memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi, karena terdiri dari glukosa dan fruktosa. Berbagai vitamin pun banyak terkandung didalamnya (Steviani, 2011).

Molase merupakan limbah dari pabrik gula yang tidak dapat dikristalkan lagi. Molase memiliki kandungan K (kalium), Ca (kalsium), Cl (klorida), yang berfungsi

dalam pertumbuhan jamur tiram putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi untuk metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan miselium. Molase juga memiliki kandungan unsur nitrogen berkisar 2-6% yang berfungsi untuk membangun miselium. Pemilihan media tambahan molase pada dosis yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih (Puspaningrum, 2013).

Pada saat ini banyak telah banyak dilakukan pemanfaatan molase sebagai pupuk dan campuran pakan ternak, akan tetapi bahwa bukan molase yang didalamnya terdapat kandungan zat organik dapat bebas dibuang ke lingkungan. Molase merupakan cairan kental (seperti pasta) yang berwarna cokelat gelap dan masih mengandung sejumlah bahan organik seperti gula, karbohidrat, asam organik, senyawa nitrogen sebagai protein dan unsur abu (Steviani, 2011).

D. Ayat dan Hadis

Tumbuhan seperti jamur tiram saat ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia, untuk itu dilakukannya penelitian ini agar bisa mengembangkan ilmu pembudidayaan dan memanfaatkan kembali jamur tiram yang kurang di perhatikan oleh masyarakat sekarang.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Luqman/31 ayat 10.

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِيًّا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾

Terjemahnya: “*Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik*”. (Q.S. Luqman ayat 10).

Dari ayat di atas menyifati Allah dengan dua dari asma’-Nya, yaitu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dalam rangka membuktikan kebenaran janji-Nya. Kini dilanjutkan dengan memaparkan kekuasaan dan kehebatan ciptaannya sekaligus sebagai bukti keperkasaannya. Ayat di atas menyatakan: *Dia menciptakan langit yang demikian tinggi dan besar tanpa tiang yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan dia meletakkan di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang sangat kukuh sehingga tertancap kuat supaya ia yakni bumi ini tidak goncang bersama kamu, kendati ia lonjong dan terus berputar; dan dia mengembangbiakan di sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melalat dan lain-lain, dan kami turunkan air hujan dari langit, baik yang cair maupun yang membeku, lalu kami tumbuhkan padanya setelaha percampuran tanah dengan air yang turun itu segala macam pasang tumbuh-tumbuhan yang baik.*

AyatNya; *(bi ghayri ‘amadin taraunaha) tanpa tiang yang kamu melihatnya dalam arti sebenarnya tiangnya ada tetapi kamu tidak melihatnya dengan mata*

kepala. Tiang tersebut adalah daya-daya yang diciptakan Allah, sehingga ini dapat meninggi dan tidak jatuh ke bumi. Tidak juga planet-planet yang ada di alam raya ini saling bertabrakan. Kata (*rawasiya*) terambil dari kata *ar-raws* atau *ar-rusuwwu* yakni *kemantapan pada satu tempat*. Dari sini, gunung-gunung, karena ia kekar tidak bergerak dari tempatnya, ditunjuk dengan kata *rawasi* yang merupakan bentuk jamak dari kata *rasin*. Kemudian kata (وَأَنْزَلْنَا) *wa anzalna/* kami turunkan air dari langit menggunakan bentuk personal pertama (*kami*), sedang redaksi sebelumnya yang berbunyi; (وَبَثَّ فِيهَا) *wa batstsa fiha/* dan dia mengembangbiakan di sana segala jenis binatang menggunakan personal ketiga (*Dia*). Pengalihan bentuk ini, agaknya untuk menggaris bawahi pentingnya air sebagai sumber hidup manusia. Bukan saja manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya, seperti pada penelitian ini yaitu jamur tiram putih juga memerlukan air sebagai sumber kehidupannya.

Kata (كَرِيمٍ) *Karim* digunakan untuk menyifati segala sesuatu yang baik sebagai objeknya. *Rizq* yang *karim* adalah yang banyak, halal dan bermanfaat. Pasangan tumbuhan yang *karim* adalah yang tumbuh subur dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya.

E. Hipotesa

Adapun pengaruh positif dan signifikan antara pemberian molase atau tanpa pemberian molase pada media untuk pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

$$H_1 : \mu A_0 = \mu A_1$$

Dimana:

H₁ = Ada pengaruh antara pemberian Molase terhadap rata-rata pertumbuhan jamur tiram putih.

F. Kerangka Pikir

Jamur tiram dengan cara mengambil zat-zat makanan yang dihasilkan oleh organisme lain. Oleh karena itu media tanam jamur bukanlah tanah. Dalam pertumbuhannya jamur memerlukan selulosa, glukosa, lignin, protein dan senyawa pati. Selain unsur tersebut jamur juga memerlukan elemen non logam seperti karbon, nitrogen, hidrogen dan oksigen yang digunakan untuk membentuk dinding sel jamur, dan semua elemen tersebut memiliki fungsi penting terhadap kelangsungan metabolisme di protoplasma. Media tanam yang sering digunakan untuk jamur tiram adalah batangan kayu atau bagian tubuh tanaman yang sudah mati. Di tempat seperti itulah terkandung selulosa, glukosa, lignin, protein dan senyawa pati yang merupakan bahan makanan bagi jamur dengan penambahan kapur sebagai penyeimbang pH media tanam dan bekatul sebagai sumber karbon dan nitrogen yang tinggi. Namun belakangan ini penggunaan kayu batang sudah diganti dengan menggunakan serbuk gergaji kayu. Untuk mengantisipasi apabila sulit untuk di padatkannya serbuk gergaji di daerah yang akan dilakukan pembudidayaan jamur tiram, maka dalam pembudidayaan jamur tiram dapat menggunakan sekam padi sebagai pengganti media tanamnya (Sutarja, 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada tanggal 05 Januari sampai tanggal 18 Februari 2015.

B. Pendekatan Penelitian

1. Penelitian Kuantitatif Eksperimental

Penelitian bersifat Eksperimental yaitu menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam mengontrol hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

Metode ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu variabel atau lebih terhadap variabel lainnya. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*Independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi yaitu sebagai variabel terikat (*Dependent variables*).

C. Desain Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yang diambil di Pallangga Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga terdapat 12 *baglog*.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah konsentrasi molase. Sedangkan variabel terikat adalah pertumbuhan jamur tiram putih. Adapun pada penelitian ini yaitu empat perlakuan dengan tiga kali pengulangan. Parameter pengamatan yaitu waktu penyebaran miselia, jumlah tubuh buah dan berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

E. Definisi Operasional Penelitian

1. Molase adalah sejenis sirup yang merupakan sisa dari proses pengkristalan gula pasir. Molase tidak dapat dikristalkan karena mengandung glukosa dan fruktosa yang sulit untuk dikristalkan. Molase (*black strap*) merupakan limbah cair yang berasal dari sisa-sisa pengolahan tebu menjadi gula. Dalam penelitian ini pemberian molase di bagi menjadi 3 konsentrasi yaitu 10 %, 15 %, dan 20 %.
2. Pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) didefinisikan sebagai bertambahnya jumlah ukuran sel yang diukur dengan waktu penyebaran miselium (Hari), jumlah tubuh buah, berat basah tubuh buah (gram).

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan).

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan duduk berskala, ayakan, ember, terpal, skop, kantong plastik, autoklav, lamina air flow (LAF), pinset, pipa paralon, karet gelang, rak pemeliharaan, hand sprayer, dan timbangan.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit jamur tiram F₂ yang di ambil dari tempat pembudidayaan jamur tiram Kec. Palangga, serbuk gergaji, bekatul, tepung jagung dan dolomite. Molase serta air bersih sebagai bahan untuk media tanam jamur atau baglog. Adapun bahan lain yang digunakan adalah spiritus, kapas, karet gelang dan bahan bakar.

G. Prosedur Kerja

1. Media

Semua bahan ditimbang sesuai dengan formulasi serbuk gergaji kayu 80%, bekatul 15%, tepung jagung 3% dan kapur 2% (Priyadi, 2013). Serbuk gergaji ditambahkan air dengan kelembaban kira-kira 50-65%. Kemudian dicampur dengan dedak jagung dan kapur sampai rata.

2. Pengomposan

Proses pengomposan dilakukan dengan mencampur bahan-bahan yang sudah disediakan dan di timbang, kemudian mencampur pada tarpal campuran sampai bahan merata untuk menghindari agar bahan tersebut tidak terlalu lembab. Kemudian pengomposan di simpan dalam waktu 1 minggu dan ditutupi tarpal, dalam selang waktu 3 hari bahan yang di tutupi tarpal harus di aduk sehingga merata agar bahan tersebut tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah.

3. Pengemasan Media

Bahan media yang sudah tercampur rata dimasukkan dalam plastik baglog dengan memberikan molase pada setiap perlakuan dengan 3 perlakuan

yaitu A₁ sebanyak 10 ml, A₂ sebanyak 15 ml, dan A₃ sebanyak 20 ml. Media kemudian dipres dengan rapat namum pada mulut plastiknya di beri cincin yang fungsinya untuk memasukkan bibit jamur. Kemudian menutup ujung media dengan kapas agar tidak terkena uap.

4. Sterilisasi

Memasukan spatula yang akan di gunakan untuk menyebarkan bibit agar tidak merepotkan saat sterilisasi alat. Membungkus spatula dengan plastik dan ditiup agar lebih aman. Memasukkan media dalam autoklav untuk proses sterilisasi. Memanaskan media hingga suhunya mencapai 25°. Setelah di sterilisasi media di dinginkan selama 24 jam.

5. Inokulasi Bibit Jamur

Membersihkan tangan dengan sabun anti kuman dan semprot dengan alkohol 96% untuk meminimalisir kontaminasi. Mengangkat dan mengeluarkan spatula dari plastik yang sudah di sterilisasi. Menyebarkan bibit jamur sebanyak 6 atau 7 biji pada media kemudian menutup kembali media dan memasang pipa paralon pada bagian mulut media dan menutupinya dengan kapas.

6. Cara Inokubasi

Meletakkan media yanag sudah di beri bibit pada rak penyimpanan kemudian di inokubasi selama 45 hari dengan suhu optimal 22 hingga 28 °C.

7. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar suhu dan kelembaban ruang penumbuhan tetap sesuai untuk perkembangan badan buah sehingga produksi

jamur tinggi. Hal ini bisa dilakukan dengan menyiram lantai ruang penumbuhan dan pengkabutan atau penyemprotan air dengan hand sprayer pada ruang penumbuhan. Air yang disemprotkan diusahakan tidak mengenai bagian dalam baglog karena bisa menyebabkan kebusukan media. Penyiraman air pada lantai dilakukan setiap hari, sedangkan untuk pengkabutan dilakukan jika media tanam dirasakan terlalu kering.

8. Penyiraman

Kegiatan penyiraman rutin dilakukan terhadap baglog untuk menjaga kebutuhan jamur terhadap sumber air. Selain itu, intensitas penyiraman juga terkait dengan kelembapan udara dalam kubung. Jika suhu udara berubah penyiraman dilakukan untuk menjaga baglog jamur tetap lembab sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

9. Pemanenan

Tubuh buah jamur yang telah berkembang optimal (3 hari setelah pin head mulai tumbuh) dan memiliki tepi yang lebih tipis, kemudian dipanen. Pemanenan dilakukan dengan mencabut semua bagian dari jamur hingga pangkalnya. Bagian jamur yang tertinggal pada media bisa menyebabkan kebusukan pada media. Sehingga tidak bisa berproduksi lagi. Pemanenan dilakukan pagi atau sore hari untuk menjaga kesegaran jamur tersebut.

H. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Pertumbuhan miselium yang diamati dengan cara mengamati pertumbuhan miselium hari setelah inokulasi (HSI) sampai pada penyebaran miselium secara keseluruhan pada media tanam (*full colony*), kemudian mencatat pada hari keberapa setelah inokulasi pertumbuhan miselium memenuhi media tanam untuk masing-masing baglog.
2. Jumlah tubuh buah yaitu dengan menghitung jumlah tubuh buah jamur yang sudah di panen (3 hari setelah tumbuhnya bakal tubuh buah) pada masing-masing baglog.
3. Berat basah tubuh buah yaitu dengan cara menimbang tubuh buah jamur yang sudah dipanen dengan menggunakan timbangan analitik.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan statistik SPSS 17.0 dengan Uji Oneway Anova dan melanjutkan dengan Uji BNT, untuk mengetahui perbandingan pengaruh penggunaan Molase sebagai media yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jamur tiram putih (*Pleurotus Ostreatus*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh data sebagai berikut:

Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan yaitu waktu lama penyebaran miselium, jumlah tubuh buah dan berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

1. Rata-rata waktu penyebaran miselium pada media tanam/*full colony*.

Hasil pengamatan waktu penyebaran miselium hari setelah inokulasi (HSI) sampai *full colony*, pada serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Rata-rata waktu penyebaran miselium hari setelah inokulasi (HSI) pada serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda.

Berdasarkan gambar 4.1 pada pengamatan kecepatan pertumbuhan miselium terlihat bahwa pada perlakuan dengan penambahan molase merupakan pengamatan yang memiliki waktu tercepat *full colony* sesuai dengan perbedaan konsentrasi molase.

Tabel 4.1. Hasil uji BNT terhadap kecepatan pertumbuhan miselium jamur tiram putih (*Pleurotuss ostreatus*).


Perlakuan	Rata-rata	NP BNT _{0,05}	Tabel t _{0,05}	Tabel t _{0,01}	SY
A ₀	27.33 a	1.2896	2.447	3.707	0.52705
A ₁	26.33 ab				
A ₂	25.33 b				
A ₃	23.66 c				

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT.

Berdasarkan uji BNT, dimana $P < 0.05$, sedangkan pada pengamatan ini nilai signifikansi 0.01 sehingga pada perlakuan dengan pemberian molase terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kecepatan pertumbuhan miselium.

2. Jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Hasil pengamatan jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada media tanam serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2. Rata-rata jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada media tanam serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda.

Berdasarkan gambar 4.2 pada pengamatan jumlah tubuh buah jamur tiram putih terlihat bahwa pada perlakuan A3 merupakan jumlah tubuh buah terbanyak dari perlakuan lainnya.

Tabel 4.2. Hasil analisis uji BNT terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan	Rata-rata	NP BNT _{0,05}	Tabel t _{0,05}	Tabel t _{0,01}	SY
A ₀	1.66 b	0.4209	2.447	3.707	0.17201
A ₁	0.71 c				
A ₂	0.71 c				
A ₃	2.53 a				


Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT.

Berdasarkan uji BNT, dimana $P < 0.05$. Sedangkan pada pengamatan ini, nilai signifikansi 0.01 sehingga pada perlakuan dengan pemberian molase

terdapat pengaruh secara signifikan terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

3. Berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Hasil pengamatan berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada media tanam serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3. Rata-rata berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada media tanam serbuk gergaji dengan pemberian molase pada konsentrasi yang berbeda.

Berdasarkan gambar 4.3 pada pengamatan berat basah tubuh buah jamur tiram putih terlihat bahwa pada perlakuan A3 merupakan perlakuan dengan berat basah tertinggi diantara perlakuan lainnya.

Tabel 4.3. Hasil analisis uji BNT terhadap berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan	Rata-rata	NP BNT _{0,05}	Tabel t _{0,05}	Tabel t _{0,01}	SY
A ₀	6.05 b	1.0344	2.447	3.707	0.42273
A ₁	0.71 c				
A ₂	0.71 c				
A ₃	7.98 a				

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT.

Berdasarkan uji BNT, dimana $P < 0.05$. Sedangkan pada pengamatan ini, nilai signifikansi 0.01 sehingga pada perlakuan dengan pemberian molase terdapat pengaruh secara signifikan terhadap berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

B. Pembahasan

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) adalah salah satu jenis jamur kayu yang banyak di konsumsi oleh masyarakat dengan gizi yang baik, di dalamnya terkandung 9 asam amino esensial dengan kadar protein 19-35%. Jadi jamur ini dapat dijadikan sumber protein nabati di samping kacang-kacangan. Jenis vitamin di dalam jamur adalah vitamin B1, B2, niasin, biotin dan vitamin C. Selain itu di dalamnya terdapat mineral K, P, Ca, Na, Mg dan Cu. Jamur tiram putih sudah banyak dikenal oleh konsumen sehingga telah memiliki pasar yang baik. Dibandingkan dengan jamur yang dapat di makan (*edible mushroom*) lainnya, jamur tiram putih memiliki harga yang lebih terjangkau oleh konsumen. Jamur tiram putih ini memiliki sifat menetralkan racun dan zat radioaktif dalam tanah.

Khasiat kesehatan adalah menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka pada permukaan tubuh, mencegah penyakit diabetes militus, menambah vitalitas dan memperlancar buang air besar. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengkonsumsi jamur tiram putih ini (Indah, 2007).

Pertumbuhan jamur dimulai apabila spora yang sudah masak jatuh di tempat yang cocok, kemudian spora tersebut akan tumbuh menjadi miselium. Apabila lingkungan tempat miselium baik, dalam arti temperatur, kelembapan, dan substrat tempat tumbuh memungkinkan maka kumpulan miselium akan tumbuh menjadi bakal tubuh buah jamur. Bakal tubuh buah jamur kemudian membesar dan pada akhirnya membentuk tubuh buah jamur. Tubuh buah jamur inilah yang kemudian dipanen untuk dikonsumsi. Berat basah dari tubuh buah jamur inilah yang menentukan tinggi atau rendahnya produktivitas jamur tiram (Kirana, 2012).

Pada penelitian ini yaitu menggunakan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), parameter utama yang dilakukan adalah lama waktu miselium mencapai permukaan *baglog* atau *full colony*, jumlah tubuh buah dan berat basah tubuh buah.

1. Pengamatan penyebaran miselium.

Hifa akan terus tumbuh dan menyebar keseluruh media tumbuh. Pertumbuhan *hifa* memanjang, bercabang, dan saling tumpang tindih disebut dengan *miselium*. *Miselium* berwarna putih seperti kapas dan akan menutupi seluruh permukaan media tumbuh (Meinanda, 2013).

Lama penyebaran miselium dipengaruhi oleh suhu, kelembaban tempat inkubasi, dan kualitas benih jamur yang digunakan. Guna menunjang pertumbuhan miselium jamur tiram, idealnya ruang inkubasi memiliki suhu 24-29 °C dan kelembaban 90-100 % IpuK dan Suparinto (2010). Selain itu tingkat kepadatan masing-masing *baglog* juga mempengaruhi pada penyebaran miselium. Karena apabila *baglog* terlalu padat maka miselium akan sulit untuk menyebar keseluruh permukaan *baglog*. Oleh karena itu dalam pengisian *baglog* supaya diusahakan untuk tidak terlalu padat dan tidak terlalu renggang akan tetapi yang sedang-sedang saja (Steviani, 2011).

Pada pengamatan yaitu dengan melihat perbedaan antara beberapa perlakuan yang paling cepat penyebaran medium *full colony*, dimana pada pengamatannya yaitu dengan menghitung hari setelah inokulasi (HSI) pada *baglog* yang sudah *full colony*. Dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan antara pemberian molase dan tanpa pemberian molase, dimana pada perlakuan A₀₁ yaitu 28 HSI, A₀₂ yaitu 27 HSI dan A₀₃ yaitu 27 HSI, dengan rata-rata 27 hari. Pada perlakuan A₁₁ yaitu 26 HSI, A₁₂ 26 HIS dan A₁₃ yaitu 27 HIS, dengan jumlah rata-rata 26 hari. Pada perlakuan A₂₁ yaitu 26 HIS, A₂₂ yaitu 25 HSI dan A₂₃ yaitu 25 HIS, dengan jumlah rata-rata 25 hari. Sedangkan pada perlakuan A₃₁ yaitu 23 HIS, A₃₂ yaitu 24 HIS, dan A₃₃ yaitu 24 HIS, dengan rata-rata 23 hari.

Pemenuhan miselium diamati sejak munculnya miselium sampai miselium memenuhi *baglog*. Salah satu indikator keberhasilan inokulasi yaitu

munculnya miselium. Apabila *baglog* tidak ditumbuhi miselium maka pelaksanaan inokulasi dinyatakan gagal. Pada hasil pengamatan waktu penyebaran miselium perlakuan yang memberikan pengaruh paling cepat dalam merangsang pemenuhan miselium adalah A3 penambahan molase 20 ml/*baglog* yaitu dengan rata-rata 23 hari setelah inokulasi (HSI). Hal ini karena molase memiliki kandungan gula, dan gula sendiri merupakan sumber karbohidrat. Komponen karbohidrat memberikan nutrisi pada cendawan. Benang-benang hifa (miselium) mengeluarkan enzim yang memecahkan bahan-bahan karbohidrat kedalam senyawa sederhana seperti gula yang dapat digunakan sebagai energi untuk dimetabolisasi (Rahayu dalam Susiana, 2010) yang mengakibatkan miselium dapat cepat tumbuh atau muncul pada *baglog*.

Sedangkan pada perlakuan A1 (molase 10 ml) dan A2 (molase 15 ml) menunjukkan tercepat kedua, hal ini disebabkan karena pemberian molase dengan konsentrasi lebih rendah dari pada perlakuan A3. Kemudian pada perlakuan A0 (tanpa molase) adalah perlakuan yang paling lambat terjadi *full colony*, hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan nutrisi dalam bentuk molase sehingga jamur kurang mendapatkan nutrisi dan mengakibatkan lambatnya pemenuhan miselium jamur. Perlakuan dengan penambahan molase berbeda nyata dengan perlakuan tanpa penambahan molase. Hal ini sesuai dengan penelitian Steivani (2011), bahwa perlakuan kombinasi serbuk sengon dengan pemberian molase 20 ml/*baglog* memberikan waktu tercepat pertumbuhan miselium dibandingkan dengan pemberian molase 15 ml, dan 10

ml/baglog. Selain itu dalam penelitian Dewi (2009), 0,04 kg yang sama-sama merupakan limbah pabrik gula seperti halnya molase dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih. Dengan demikian maka nutrisi yang terdapat pada molase juga mampu membantu proses pertumbuhan jamur tiram putih dan meningkatkan produktivitasnya.

Pemberian molase sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Hal ini sesuai dengan rekomendasi Prayitno (2010) yang menyatakan bahwa molase berfungsi dalam pertumbuhan jamur tiram putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi untuk metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan miselium. Molase juga memiliki kandungan unsure nitrogen berkisar 2-6% yang berfungsi untuk membangun miselium. Pemilihan media tambahan molase pada dosis yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih.

Hal ini karena molase memiliki kandungan gula, dan gula sendiri merupakan sumber karbohidrat. Komponen karbohidrat memberikan nutrisi pada cendawan. Benang-benang hifa (miselium) mengeluarkan enzim yang memecahkan bahan-bahan karbohidrat kedalam senyawa sederhana seperti gula yang dapat digunakan sebagai energi untuk dimetabolisasi yang mengakibatkan miselium dapat cepat tumbuh atau muncul pada *baglog* (Indah dalam Susiana, 2013).

2. Pengamatan jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Pada pengamatan jumlah tubuh buah yaitu dengan menghitung jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yang tumbuh pada *baglog*. Pengamatan dilakukan setelah tubuh buah berusia tiga hari setelah *pin head* muncul pada bagian atas *baglog* yaitu dengan menghitung jumlah tubuh buah jamur tiram.

Dua sampai empat hari setelah kemunculan *pin head*, jamur memulai memasuki fase dewasanya. Jamur dewasa akan kembali menghasilkan spora. Spora dihasilkan oleh serat-serat halus di bawah tudung jamur yang disebut *lamella*. Dimana *lamella* ini terdapat *basidium*, yaitu sel-sel penghasil spora (Meinanda, 2013).

Dalam penelitian ini pengamatan jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), pada perlakuan A₀₁ yaitu 3 buah, A₀₂ yaitu 3 buah dan A₀₃ yaitu 1 buah, dengan jumlah rata-rata 2,3. Pada perlakuan A₁ dan A₂ yaitu tidak terdapat tubuh buah yang tumbuh, sedangkan pada perlakuan A₃₁ yaitu 7 buah, A₃₂ yaitu 7 buah dan A₃₃ yaitu 4 buah, dengan jumlah rata-rata 6. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rata-rata tubuh buah terbanyak yaitu pada perlakuan A₃. Hal ini di sebabkan karena pada perlakuan A₃ yaitu dengan pemberian molase 20 ml, sebagai mana dalam pernyataan Ipuk dan Suparinto (2010), formulasi media dan penambahan unsur-unsur lain yang dibutuhkan oleh jamur secara tetap bisa meningkatkan produktivitas, pertimbangan efisiensi dan efektifitas produksi. Sedangkan jumlah terbanyak kedua yaitu

pada perlakuan A0. Kemudian pada perlakuan A1 dan A2 dengan melakukan pengamatan selama 45 hari yaitu tidak terlihat tumbuh tubuh buah yang kemungkinan di sebabkan oleh faktor kesuburan pada media, proses penyiraman yang tidak begitu bagus sehingga *pin head* yang akan tumbuh menjadi tubuh buah lama muncul atau terhambat pada waktu pengamatan. Hal ini bukan berarti pada perlakuan A1 dan A2 tidak tumbuh, tetapi kemungkinan karena medianya tidak terlalu subur baik dipengaruhi oleh penyiraman ataupun memerlukan waktu yang cukup lama.

Pada pengamatan jumlah tubuh buah jamur bisa kita simpulkan bahwa perlakuan yang memberikan pengaruh paling baik adalah A3 yaitu dengan jumlah rata-rata 6. Sesuai dengan pernyataan Soenanto (2000), bahwa nitrogen berfungsi untuk membangun miselium, pembentukan protein, dan membangun enzim-enzim yang disimpan dalam tubuhnya dan di dalam molase memiliki kandungan unsur nitrogen dengan kisaran 2-6%. Perlakuan yang memberikan pengaruh jumlah tubuh buah kurang baik adalah perlakuan A0 tanpa penambahan molase dengan rata-rata 2,3 buah, hal ini dikarenakan adanya kekurangan nutrisi untuk mencukupi kebutuhan tumbuh jamur tiram putih.

Pada pengamatan ini terdapat pengaruh yang sangat nyata antara perlakuan dengan pemberian molase dan tanpa pemberian molase. Hal ini dikarenakan pemberian molase pada media tanam memiliki kandungan fosfat, selulosa, gula, nitrogen dan bahan organik yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, sehingga menghasilkan jumlah tubuh buah paling

banyak. Pertumbuhan jamur tiram putih dapat berlangsung dengan optimal jika media tanam banyak mengandung unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh jamur, Dewi (2009).

3. Pengamatan berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Selain tubuh buah jamur, berat basah tubuh buah jamur pun dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih. Berat tubuh jamur dapat dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu kumbung jamur (Djarajah, 2001). Bila kumbung jamur terlalu kering (suhu kumbung terlalu rendah) maka tubuh buah jamur akan mengalami penguapan lebih dan menjadikan permukaan tubuh buah jamur mengkerut dan kering.

Jamur yang telah dipanen, dibersihkan dari sisa-sisa media tanam yang masih menempel pada ujung tangkai jamur kemudian ditimbang untuk mengetahui berat basah tubuh buah. Penimbangan dilakukan pada semua badan buah jamur per media tanam.

Pada pengamatan berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yaitu dengan mengukur berat basah tubuh buah jamur yang sudah dipanen dengan menggunakan timbangan analitik, pada pengamatan ini hasil yang didapatkan yaitu pada perlakuan A1 (tanpa molase) dimana pada A01 yaitu 30 gram, A02 yaitu 30 gram, dan A03 yaitu 50 gram, dengan jumlah rata-rata 36,6 gram. Pada perlakuan A1 dan A2 tidak terdapat tubuh buah. Sedangkan pada perlakuan A3 dimana pada A31 yaitu 70 gram, A32 yaitu 60

gram, A₃₃ yaitu 60 gram, dengan jumlah rata-rata 63.3 gram. Hal ini membuktikan bahwa adanya senyawa gula yang terkandung didalam molase, maka diharapkan molase dapat menyediakan energi yang dibutuhkan untuk metabolisme didalam sel.

Jamur tiram putih merupakan tumbuhan yang tidak mengandung klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu jamur memerlukan zat-zat makanan dari organisme lain khususnya dari molase Hal ini sesuai dengan penelitian putranti dkk (2003) yang menambahkan gula pasir 5% yang ternyata sangat nyata dalam meningkatkan bobot segar jamur.

Pada hasil pengamatan ini dapat menunjukkan bahwa pemberian molase dengan konsentrasi 20 ml/*baglog* sangat berpengaruh terhadap berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Karena pada perlakuan ini yaitu dengan penambahan molase sebanyak 20 ml sebagai mana telah diketahui semakin banyak unsur hara yang terdapat pada media tanam maka akan semakin bagus pula untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih, sebagai mana unsur hara yang terdapat pada molase yaitu kalium, kalsium, klorida, yang berfungsi dalam pertumbuhan jamur tiram putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi dan metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan miselium pada jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian molase pada media tanam jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan pertumbuhan miselium, jumlah tubuh buah jamur, dan berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
2. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pemberian molase dengan konsentrasi 20 ml/*baglog* merupakan perlakuan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dibandingkan perlakuan lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu perlunya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan molase sebagai tambahan nutrisi pada pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) untuk melihat perbedaan lebih nyata lagi tentang penggunaan molase dan untuk memanfaatkan limbah industri yang tidak digunakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurul ,F Et Al. *Pengaruh Penambahan Molases Terhadap Kandungan Protein Kasar Dan Serat Kasar Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio*. Universitas Brawijaya : Malang, 2013.
- Afina Shifriyah *et al*, “*Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) Pada Penambahan Dua Sumber Nutrisi*”. Dosen Jurusan Agroekoteknologi FP UTM : Bangkalan, (Maret 2012).
- Dra. Darliana Ina M, Si. *Pengaruh Penambahan Bekatul Dan Limbah Cair Tahu Untuk Media Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Universitas Bandung Raya : Bandung, (Februari 2013).
- Erie Maulana Sy. *Panen Jamur Tiap Musim*. Yogyakarta : Perpustakaan Nasional, 2012.
- Eka Ely Narwanti. *Perbedaan Pengaruh Media Sekam Padi dan Serbuk Gergaji Sengon Terhadap Berat Basah, Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih dan Efficiency Biology Rate*. IKIP PGRI Semarang: Semarang, 2013.
- Gita, *et al.*”*Pemanfaatan Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus) Sebagai Tepung, Kajian Pengaruh Suhu dan Lama Pengeringan*”. Alumni Jurusan Teknologi Industri Pertanian FTP-Universitas Brawijaya: FTP-Universitas Brawijaya (Oktober, 2013).
- Indah Nur Tarini Yanuati. *Kajian Perbedaan Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus Florida)*. Universitas Brawijaya : Malang. 2007.
- Indah Puspaningrum *et al*. *Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus) Pada Media Tambahan Molase Dengan Dosis Yang Berbeda*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Januari 2013).
- Ika Puspitasari. *Pengaruh Level Penggunaan Limbah Media Tanam Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus) Sebagai Sumber Serat Di Dalam Pakan Lengkap Terhadap Kecernaan Secara In Vitro*. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang: Malang, (Februari 2009).
- Ica Meinanda. *Panen Cepat Budidaya Jamur*. Bandung : Penerbit Padi. 2013.

- Kirana pradika. “*Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Pemberian Pupuk Hayati Terhadap Pertumbuhan Dan Produktivitas Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus)*”. Prodi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi : Universitas Erlangga (Maret, 2012).
- Mahdi Fauzi et al. *Pengaruh Tiga Media Tanam Serbuk Kayu dan Pemberian Pupuk Pada Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Fakultas Pertanian USU Medan 20155 : Medan, Vol. 1 no 2 (Maret 2013).
- Mufarrihah, Lailaatul. “*Pengaruh Penambahan Bekatul dan Ampas Tahu Pada Media Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)*”. Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islaam Negeri (UIN) : Malang, (Oktober, 2010).
- Nurul Istiqomah et al.” *Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Pada Berbagai Komposisi Media Tanam*”. Program Studi Agroteknologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai : Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai (Oktober, 2014).
- Priyadi Triono Untung. *Bisnis Jamur Tiram*. Jakarta : Agromedia Pustaka, 2013.
- Sanjoyo. Dkk.” *Pengaruh Penggunaan Slugde Sebagai Pengganti Dedak Pada Media Tanam Terhadap Produksi Jamur Kuping Hitam*”. Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto: Purwokerto (April 2011).
- Seswati Ramza, et al.” *Pengaruh Pengaturan Keasaman Media Serbuk Gergaji Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Cokelat (Pleurotus cystidiosus O.K. Miller)*”. Jurnal Biologi Universitas Andalas (*J. Bio. UA.*): FMIPA Universitas Andalas (Maret, 2013).
- Shihab, M. Quraish. “*Tafsir Al-Misbahbah*” Penerbit lentera hati: Jakarta (Oktober 2004).
- Susi Steivani. *Pengaruh Penambahan Molase Dalam Berbagai Media Pada Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Surakarta: Universitas Sebelas (Maret 2011).
- Suprapti, et al. “*Pengaruh Sumber Bibit Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan : Bogor, (April, 2010).
- Suwito, M.”*Resep Masakan Jamur dari Chef Ternama*”. PT. Agromedia Pustaka: Jakarta (Oktober, 2006).

- Ummu Kalsum *et al.* *Efektivitas Pemberian Air Leri Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura : Madura, Vol 4 no 2 (September 2011).
- Warisno, *et al.* “*Menabur Jamur Tiram Menuai Rupiah*”. PT Gramedia Pustaka Umum : Jakarta (Oktober, 2014).
- Wignyanto, *et al.* “*Analisis Kelayakan Teknis Dan Finansial Produksi Sosis Jamur Tiram Pada Skala Industri Kecil (Studi Kasus Di Budidaya Jamur Tiram ‘Wahyu’ Kota Mojokerto)*”. Alumni Jurusan Teknologi Industri Pertanian FTP-Univ. Brawijaya: Universitas Brawijaya Malang (Maret, 2012).
- Wuye Ria Andayanie. *Penambahan EM4 dan Lama Pengomposan Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Fakultas Pertanian, Universitas Merdeka Madiun. Vol 14 no 1 (Maret 2013).

Gambar Lampiran 1a. Pengamatan Miselium (*Full Colony*).



Perlakuan A0



Perlakuan A1



Perlakuan A2



Perlakuan A3

Gambar Lampiran 1b. Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan A0




Perlakuan A3




Gambar Lampiran 1c. Berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan A0



Perlakuan A3



Tabel lampiran 1a. Waktu penyebaran miselium jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan	Kelompok			Total	Rata-rata
	I	II	III		
A ₀	28.00	27.00	27.00	82.00	27.33
A ₁	26.00	26.00	27.00	79.00	26.33
A ₂	26.00	25.00	25.00	76.00	25.33
A ₃	23.00	24.00	24.00	71.00	23.66
Total	103.00	102.00	103.00	308.00	25.67

Tabel lampiran 1b. Hasil analisis uji Anova waktu penyebaran miselium jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

SK	db	JK	KT	F _{Hitung}		F _{Tabel}	
						0.05	0.01
Kelompok	2	0.166667	0.083333	0.20	tn	5.14	10.92
Perlakuan	3	22.000000	7.333333	17.60	**	4.76	9.78
Galat	6	2.500000	0.416667				
Total	11	24.666667					

KK = 2.51%
 FK = 7905.3333

Tabel lampiran 1c. Hasil analisis BNT terhadap waktu penyebaran miselium jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

	Perlakuan	Rata-rata	NP BNT _{0,05}	Tabel t _{0,05}	Tabel t _{0,01}	SY
a	A ₀	27.33	1.2896	2.447	3.707	0.52705
ab	A ₁	26.33				
b	A ₂	25.33				
c	A ₃	23.66				

A ₀ - A ₁	1.0000	A ₁ - A ₂	1.0000	A ₂ - A ₃	1.6667
A ₀ - A ₂	2.0000	A ₁ - A ₃	2.6667		
A ₀ - A ₃	3.6667				

Tabel lampiran 2a. Jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan	Kelompok			Total	Rata-rata
	I	II	III		
A ₀	3.00	3.00	1.00	7.00	2.33
A ₁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A ₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A ₃	7.00	7.00	4.00	18.00	6.00
Total	10.00	10.00	5.00	25.00	2.08

Tabel lampiran 2b. Data transformasi jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan	Kelompok			Total	Rata-rata
	I	II	III		
A ₀	1.87	1.87	1.22	4.97	1.66
A ₁	0.71	0.71	0.71	2.12	0.71
A ₂	0.71	0.71	0.71	2.12	0.71
A ₃	2.74	2.74	2.12	7.60	2.53
Total	6.02	6.02	4.76	16.81	1.40

Tabel lampiran 2c. Hasil analisis uji anova terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

SK	db	JK	KT	F _{Hitung}		F _{Tabel}	
						0.05	0.01
Kelompok	2	0.266020	0.133010	3.00	tn	5.14	10.92
Perlakuan	3	6.926430	2.308810	52.02	**	4.76	9.78
Galat	6	0.266296	0.044383				
Total	11	7.45875					

KK = 15.04%

FK = 23.541254

Tabel lampiran 2d. Hasil analisis uji BNT terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

	Perlakuan	Rata-rata	NP BNT _{0,05}	Tabel t _{0,05}	Tabel t _{0,01}	SY
b	A ₀	1.66	0.4209	2.447	3.707	0.17201
c	A ₁	0.71				
c	A ₂	0.71				
a	A ₃	2.53				

A0 - A1 0.9484 A1 - A2 0.0000 A2 - A3 1.8257
 A0 - A2 0.9484 A1 - A3 1.8257
 A0 - A3 0.8774

Tabel lampiran 3a. Berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan	Kelompok			Total	Rata-rata
	I	II	III		
A ₀	30.00	30.00	50.00	110.00	36.66
A ₁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A ₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A ₃	70.00	60.00	60.00	190.00	63.33
Total	100.00	90.00	110.00	300.00	25.00

Tabel lampiran 3b. Data transformasi berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perlakuan	Kelompok			Total	Rata-rata
	I	II	III		
A ₀	5.52	5.52	7.11	18.15	6.05
A ₁	0.71	0.71	0.71	2.12	0.71
A ₂	0.71	0.71	0.71	2.12	0.71
A ₃	8.40	7.78	7.78	23.95	7.98
Total	15.33	14.72	16.30	46.35	3.86

Tabel lampiran 3c. Hasil analisis uji Anova terhadap berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

SK	db	JK	KT	F _{Hitung}		F _{Tabel}	
						0.05	0.01
Kelompok	2	0.318517	0.159258	0.59	tn	5.14	10.92
Perlakuan	3	125.068620	41.689540	155.5	**	4.76	9.78
Galat	6	1.608283	0.268047				
Total	11	126.99542					

KK = 13.40%

FK = 179.00458

Tabel lampiran 3d. Hasil analisis uji BNT terhadap berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

	Perlakuan	Rata-rata	NP BNT _{0,05}	Tabel t _{0,05}	Tabel t _{0,01}	SY
b	A ₀	6.05	1.0344	2.447	3.707	0.42273
c	A ₁	0.71				
c	A ₂	0.71				
a	A ₃	7.98				

A0 - A1 5.3435 A1 - A2 0.0000 A2 - A3 7.2772

A0 - A2 5.3435 A1 - A3 7.2772

A0 - A3 1.9337

Tabel lampiran A1. Analisis Uji Anova waktu penyebaran miselium jamur tiram putih.

	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	22.000	3	7.333	22.000	.000
Within Groups	2.667	8	.333		
Total	24.667	11			

Multiple Comparisons

Hasil

LSD

		Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
A0	A1	1.00000	.47140	.067	-.0871	2.0871
	A2	2.00000*	.47140	.003	.9129	3.0871
	A3	3.66667*	.47140	.000	2.5796	4.7537
A1	A0	-1.00000	.47140	.067	-2.0871	.0871
	A2	1.00000	.47140	.067	-.0871	2.0871
	A3	2.66667*	.47140	.000	1.5796	3.7537
A2	A0	-2.00000*	.47140	.003	-3.0871	-.9129
	A1	-1.00000	.47140	.067	-2.0871	.0871
	A3	1.66667*	.47140	.008	.5796	2.7537
A3	A0	-3.66667*	.47140	.000	-4.7537	-2.5796
	A1	-2.66667*	.47140	.000	-3.7537	-1.5796
	A2	-1.66667*	.47140	.008	-2.7537	-.5796

Tabel lampiran A2. Analisis Uji Anova jumlah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	64.667	3	21.556	12.933	.002
Within Groups	13.333	8	1.667		
Total	78.000	11			

Multiple Comparisons

Hasil
LSD

(I) Jumlah Buah	(J) Jumlah Buah	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
A0	A1	2.33333	1.05409	.058	-.0974	4.7641
	A2	2.33333	1.05409	.058	-.0974	4.7641
	A3	-3.33333*	1.05409	.013	-5.7641	-.9026
A1	A0	-2.33333	1.05409	.058	-4.7641	.0974
	A2	.00000	1.05409	1.000	-2.4307	2.4307
	A3	-5.66667*	1.05409	.001	-8.0974	-3.2359
A2	A0	-2.33333	1.05409	.058	-4.7641	.0974
	A1	.00000	1.05409	1.000	-2.4307	2.4307
	A3	-5.66667*	1.05409	.001	-8.0974	-3.2359
A3	A0	3.33333*	1.05409	.013	.9026	5.7641
	A1	5.66667*	1.05409	.001	3.2359	8.0974
	A2	5.66667*	1.05409	.001	3.2359	8.0974

Tabel lampiran A3. Analisis Uji Anova berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8566.667	3	2855.556	68.533	.000
Within Groups	333.333	8	41.667		
Total	8900.000	11			

Multiple Comparisons

Hasil

LSD

(I) Berat Basah	(J) Berat Basah	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
A0	A1	36.66667*	5.27046	.000	24.5130	48.8204
	A2	36.66667*	5.27046	.000	24.5130	48.8204
	A3	-26.66667*	5.27046	.001	-38.8204	-14.5130
A1	A0	-36.66667*	5.27046	.000	-48.8204	-24.5130
	A2	.00000	5.27046	1.000	-12.1537	12.1537
	A3	-63.33333*	5.27046	.000	-75.4870	-51.1796
A2	A0	-36.66667*	5.27046	.000	-48.8204	-24.5130
	A1	.00000	5.27046	1.000	-12.1537	12.1537
	A3	-63.33333*	5.27046	.000	-75.4870	-51.1796
A3	A0	26.66667*	5.27046	.001	14.5130	38.8204
	A1	63.33333*	5.27046	.000	51.1796	75.4870
	A2	63.33333*	5.27046	.000	51.1796	75.4870

Gambar lampiran 1a. Prosedur penelitian dan mengomposan.



Pengemasan media kedalam baglog.



Molases



Penambahan Molases



Sterilisasi



RIWAYAT HIDUP



Buharis, lahir di Bima Desa punti kecamatan Soromandi Kabupaten Bima pada tanggal 20 September 1994. Dari ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Rukaya. Penulis menempuh pendidikan formal pada tahun 1995-2005 di SDN Impres Punti kecamatan soromandi Kabupaten Bima, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Punti pada tahun 2005- 2008. Pada tahun 2008-2011 penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Muthmainnah. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur SNMPTN dan diterima di fakultas Sains dan Teknologi di Jurusan Biologi. Selama menjalani sebagai Mahasiswa penulis pernah menjadi asisten di laboratorium biologi sains. Penulis pernah PKL di Balai Benih Ikan (BBI) Bulukumba pada tahun 2013. Terakhir penulis membuat skripsi dengan judul “Pengaruh penambahan molase pada media tanam terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)”.