

**RESISTENSI ANTIBIOTIK BAKTERI GRAM NEGATIF  
YANG DITEMUKAN DI UDARA RUANG RSUD  
H. PADJONGA DAENG NGALLE  
KABUPATEN TAKLAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**SRI WIRASTUTI**  
NIM. 60300112081

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
2016

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wirastuti  
NIM : 60300112081  
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar/ 06 Mei 1994  
Jur/Prodi : Biologi  
Fakultas : Sains Dan Teknologi  
Alamat : Takalar  
Judul : Resistensi Antibiotik Bakteri Gram Negatif Yang Ditemukan  
Di Udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle  
Kabupaten Takalar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,  
Penyusun,

Sri Wirastuti  
NIM: 60300112081

## ABSTRAK

**Nama** : Sri Wirastuti  
**NIM** : 60300112081  
**Judul Skripsi** : **Resistensi Antibiotik Bakteri Gram Negatif Yang Ditemukan Di Udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.**

---

---

Resistensi antibiotik adalah ketahanan suatu bakteri terhadap antibiotik yang digunakan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle. Resistensi dapat terjadi karena penggunaan antibiotik yang irrasional, tidak sesuai dosis dan pemberian terapi yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bakteri Gram negatif yang resisten terhadap antibiotik dari udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar dan menemukan bakteri *Multi Drug resistency* (MDR). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana sampel diperoleh dari udara Ruang Perawatan inap H. Padjonga Daeng Ngalle dengan menggunakan cawan petri lalu diisolasi dan diidentifikasi sampai karakteristik bakteri. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri Gram negatif yang resisten terhadap antibiotik sebanyak 52 dari 23 isolat bakteri, sensitif sebanyak 43 dan intermedit sebanyak 20 dan bakteri Gram negatif yang MDR sebanyak 13 dari 13 isolat bakteri. Hasil dari penelitian ini menemukan bakteri Gram negatif yang resisten terhadap antibiotik dan terjadi MDR sehingga disarankan kepada pihak Rumah Sakit menggunakan antibiotik secara rasional, sesuai dosis dan pemilihan antibiotik yang tepat.

Kata kunci: Resistensi, Antibiotik, Bakteri Gram Negetif, RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle. Kab Takalar.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudari **Sri Wirastuti, NIM: 60300112081**, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama proposal skripsi berjudul, “**Resistensi Antibiotik Bakteri Gram Negatif Yang Di Temukan Di Udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, .....

Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si  
Pembimbing II

Syamsuar Manyullei, S.Km., M.Kes., M.Sc., PH  
Pembimbing I

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Resistensi Antibiotik Bakteri Gram Negatif Yang Di Temukan Di Udara RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar”, yang disusun oleh Sri Wirastuti, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 30 Maret 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, Maret 2016

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqasyah I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes	(.....)
Munaqasyah II	: St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes	(.....)
Munaqasyah III	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Syamsuar Manyullei, S.Km., M.Kes., M.Sc., PH	(.....)
Pembimbing II	: Eka Sukmawaty, S.Si., M, Si	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. H .Arifuddin Ahmad, M.Ag  
NIP. 19710412 200003 1 001

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-7</b>
A. Latar Belakang .....	1-5
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II    TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8-26</b>
A. Tinjauan Resistensi Antibiotik.....	8-12
B. Tinjauan Umum Antibiotik.....	12-16
C. Tinjauan Umum Gram Negatif .....	16-18
D. Tinjauan Umum Udara.....	19-22
E. Tinjauan Umum Rumah Sakit.....	22-24
F. Tinjauan Islam Tentnag Ayat Dan Hadist yang relevan .....	25
1. Ayat yang berkaitan tentang udara .....	21-22
2. Ayat yang berkaitan tentang lingkungan udara .....	25
G. Kerangka Fikir .....	26
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27-32</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	27
D. Variabel Penelitian .....	28
E. Definisi Operasional Variabel.....	28
F. Metode Pengumpulan Data.....	29

	G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan) .....	29-30
	H. Prosedur Kerja.....	30-32
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	33-47
	A. Hasil Penelitian .....	33-42
	B. Pembahasan .....	42-47
BAB V	PENUTUP .....	40-45
	A. Kesimpulan .....	49
	B. Saran .....	49

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## KATA PENGANTAR



Segala puji atas kebesaran Sang Khalik yang telah menciptakan alam semesta dalam suatu keteraturan hingga dari lisan terpercik berjuta rasa syukur kehadiran Allah swt karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nyalah sehingga saya diberikan kekuatan, kesempatan dan kemudahan kepada hamba-Nya untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul **“Resistensi Antibiotik Bakteri Gram Negatif Yang Di Temukan Di Udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman ini yang di utus ke permukaan bumi ini untuk menuntun manusia dari lembah kebidaban menjadi kebaikan seperti sekarang ini yang menjadi suri tauladan/uswatun hasanah bagi kita semua.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Namun berkat kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Olehnya itu, secara mendalam saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi



membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.

2. Bapak Prof Dr. Arifuddin, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri M.Si, selaku Ketua Jurusan Biologi sekaligus sebagai penguji/pembahas I dan ibu Baiq Farhatul S.Si, M.Si selaku sekretaris jurusan Biologi
4. St. Aisyah S. S.Pd, M.Kes selaku pembahas I yang begitu tegas dan disiplin selama menyelesaikan skripsi serta saran dan nasehat yang begitu bermanfaat untuk saya.
5. Bapak Syamsuar Manyullei,S,Km, M.Kes, M.Sc, PH, selaku pembimbing I yang begitu bijaksana dalam membimbing saya selama menyelesaikan skripsi serta kesabarannya dalam membimbing saya.
6. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si, M.Si selaku Penasehat Akademik dan pembimbing II dalam proses penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.
8. Bapak dan Ibu pegawai yang bersangkutan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar memberikan rekomendasi untuk penelitian di laksanakan di

Rumah Sakit dan selama ini telah mendidik penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.

9. Ayahanda Nurdin dan Ibunda Hj. Syamsiar yang dengan tulus senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan cinta kasihnya, serta semangat yang tak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.
10. Saudara perempuanku Nurdiana dan Hildawati, S.Pd dan keluarga besar saya yang dengan tulus senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan cinta kasihnya, serta semangat yang tak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.
11. Saudara seperjuanganku, Putri, Jumriani, Sri, Asriaani, Selfi, Kiya, Venny dan Baim telah banyak memberikan masukan dan semangat satu sama lain, serta setia menemani penulis dalam suka dan duka hingga tercapainya harapan bersama.
12. Sahabat yang seperti keluargaku Sarah, Qurais, Irma, Akbar dan Hilda yang telah memberikan semangat dan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah.
13. Sahabat **“A2KT”** yang telah memberikan motivasi dan menghiburku di saat duka dan memberikan cerita indah
14. Teman-teman **“RANVIER”**, (Biologi Angkatan 2012) yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah selama kurang lebih 3 tahun bersama.
15. Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2013, 2014, dan 2015.

16. Teman-teman Kerja Praktek (KP) di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), (Asriani, Tuti, Tiara dan Baim).
17. Serta Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu..

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya menyadari bahwa hanya kepada ALLAH SWT saya menyerahkan segalanya. Semoga kita semua mendapat curahan & Rihdo dari-Nya, Aamiin.

Makassar, Maret 2016

Penulis

Sri Wirastuti  
Nim : 60300112081





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Bakteri yang resisten terhadap antibiotik menjadi masalah kesehatan yang penting, terutama di rumah sakit dan sarana kesehatan. Bakteri yang resisten terhadap antibiotik dapat menyebabkan penyakit yang serius, mengancam jiwa dan sulit untuk diatasi karena terbatasnya pilihan sebagai terapi sehingga dapat menyebabkan terjadinya infeksi (Sitti Fauziah *at al*, 2012).

Penyakit infeksi adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri, biasanya banyak terdapat di daerah tropis seperti Indonesia bahkan ada yang bersifat endemik (Radji, 2002). Infeksi yang didapat di rumah sakit terjadi angka kejadian cukup tinggi. Misalnya, di AS, ditemukan 20.000 kematian setiap tahun akibat infeksi nosokomial. Di seluruh dunia, 10 % pasien rawat inap di rumah sakit mengalami infeksi baru selama dirawat, sebanyak 1,4 juta infeksi setiap tahun. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan di 11 rumah sakit di DKI Jakarta menunjukkan bahwa 9,8% pasien rawat inap mendapat infeksi yang baru selama dirawat (Wesetian, 2006).

Penanggulangan penyakit infeksi yang menggunakan antibiotik dalam manajemennya hendaklah mempunyai suatu program untuk mengontrol infeksi, seperti pengawasan terhadap bakteri yang resisten, Pengawasan terhadap penggunaan antibiotik di rumah sakit, membuat suatu pedoman yang baru secara berkesinambungan untuk pemakaian antibiotika dan profilaksis, serta memonitor

penggunaan antibiotika di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional (World Health Organization, 2001). Penggunaan antibiotik di Indonesia yang cukup dominan adalah turunan tetrasiklin, penisilin, kloramfenikol, eritromisin dan streptomisin. Seperti juga di negara lain, pola penggunaan antibiotika tersebut telah mencapai tingkat yang berlebihan dan banyak diantaranya digunakan secara tidak tepat sehingga menimbulkan terjadinya resistensi dan menghilangkan potensi efektifitas suatu antibiotik (Kadarwati, 1989).

Hilangnya efektifitas antibiotik sudah dilaporkan semenjak telah ditemukannya penicillin. Sejak penicillin ditemukan pada tahun 1940, banyak laporan mengenai resistensi terhadap antibiotik ini, dimulai oleh bakteri *Staphylococcus aureus*. Sekarang, masalah ini kembali menjadi perhatian karena mulai meningkatnya resistensi bakteri terhadap berbagai macam antibiotik (*Multi Drug Resistance*). Organisme yang sering ditemukan yaitu *Enterococcus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *S. aureus*, dan *Streptococcus pneumoniae*. Resistensi antibiotik pada strain bakteri ini akan sulit diterapi karena terbatasnya antibiotik yang dapat diberikan (Wesetian, 2010).

Hampir 25-40% pasien di rumah sakit mendapatkan antibiotik selama perawatan. Penelitian yang dilakukan sistem *The National Nosocomial Infection Surveillance* (NNIS) dan beberapa penelitian lain di bangsal Non-ICU dan ICU mendapatkan hubungan langsung antara penggunaan antibiotik yang tinggi terhadap insiden terjadinya resistensi obat. Studi ini menemukan tingginya bakteri yang resisten terhadap antibiotik di ICU, salah satunya bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

yang resisten terhadap ciprofloxacin. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya pemberian terapi yang tidak sesuai atau tidak seharusnya, dosis yang tidak adekuat, serta durasi pemberian antibiotik yang tidak benar di rumah sakit. Hal ini akan dapat berakibat pada perubahan pola bakteri penyebab infeksi dan pola resistensinya terhadap berbagai antibiotik (Ducel, 2002).

Perkembangan resistensi bakteri terhadap antibiotik sangat dipengaruhi oleh intensitas pemaparan antibiotik di suatu wilayah. Tidak terkendalinya penggunaan antibiotika cenderung akan meningkatkan resistensi bakteri yang semula sensitif. Beberapa survai resep didalam dan luar negeri menemukan bahwa antibiotik Betalaktam masih merupakan antibiotika yang paling banyak diresepkan sehingga bakteri telah resisten terhadap antibiotika tersebut (Kadarwati, 1989).

Resistensi antibiotik sebagai akibat dari penggunaan antibiotik pada pasien rawat jalan sulit untuk diperkirakan, karena pencatatan tidak selengkap pada perawatan selama di rumah sakit. Selain itu media diagnostik pada kebanyakan infeksi pada pasien rawat jalan masih dirasakan kurang memadai. Tetapi yang diketahui jelas bahwa tetap terdapat hubungan yang jelas antara tingginya penggunaan obat antibiotik akan disertai dengan peningkatan terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik (Yulika, 2009).

Peningkatan resistensi terhadap antibiotik di rumah sakit mempengaruhi perawatan pasien selama dirumah sakit. Hal-hal yang mempengaruhinya antara lain, terjadi peningkatan mortalitas dan morbiditas, misalnya pasien harus dirawat lebih lama, sehingga kemungkinan terjadinya komplikasi selama perawatan. Hal lain



adalah meningkatnya biaya yang digunakan untuk mencapai kesembuhan. Misalnya pada pasien dengan infeksi *Methicillin Resistant S. aureus* (MRSA) membutuhkan perawatan 2 hari lebih lama daripada pasien *Methicillin Sensitive S. aureus* (MSSA). Sama halnya dengan pasien yang terinfeksi *K. pneumonia* yang resisten terhadap antibiotik  $\beta$ -lactam dan *P. aeruginosa* yang resisten terhadap Carbapenem yang diketahui disebabkan karena pemberian terapi yang tidak adekuat. Perpanjangan masa perawatan tentunya juga meningkatkan biaya, dibutuhkan ruangan isolasi untuk pasien pada kasus-kasus tersebut, biaya antibiotik yang lebih mahal, uji laboratorium sebagai diagnostik dan upaya untuk mengontrol penyebaran lebih lanjut, seperti pembelian sabun antiseptik, sarung tangan dan jas pelindung (Yulika, 2009).

Di tingkat rumah sakit, patogen nosokomial adalah bakteri Gram negatif yang lebih menonjol dari pada bakteri Gram positif dan cendawan. Mikroorganisme yang sering ditemukan resisten antara lain adalah *Methicillin Resistant Staphylococcus aureus* (MRSA), *Coagulase negative, Staphylococcus, Vancomycin resistant, Enterococcus faecalis* dan *Enterococcus faecium* (VRE), *Enterobacteriaceae* dengan plasmid *Encoded Extende Spectrum Beta Lactamases* (ESBL), dan strain *Multi Drug Resistant* dari *Streptococcus pneumoniae* dan *Pseudomonas aeruginosa* (Chun-min-lee, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian terhadap resistensi antibiotik bakteri Gram negatif yang ditemukan di udara ruang perawatan inap RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle, yang sangat penting sebagai pertimbangan

dalam pedoman pemberian antibiotik secara rasional, sesuai dengan diagnosis penyebab penyakit infeksi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan kali ini adalah :

1. Apakah ditemukan bakteri Gram negatif yang resisten terhadap antibiotik dari udara RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle ?
2. Apakah ditemukan bakteri *Multi Drug Resistency* (MDR) di udara RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Isolasi bakteri udara yang digunakan merupakan hasil isolasi bakteri udara dari RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle yang diperoleh Laboratorium Uin Alauddin Makassar.
2. Ruang RSUD yang menjadi tempat penelitian adalah Ruang Perawatan yaitu Ruang Perawatan Flamboyan, Ruang Perawatan Asoka dan Ruang Perawatan Palembang
3. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dilakukan dilaboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Pada penelitian sebelumnya Pola Bakteri dan Resistensinya Terhadap Antibiotik Yang Ditemukan Pada Air Dan Udara Ruang Instalasi Rawat Khusus RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Sitti Fauziah, 2012).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Victor D, dkk, untuk *International Nosocomial Infection Control Consortium* selama 2002-2007 di 98 Instalasi Perawatan Intensif di Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Eropa, (Victor *at al*, 2008).
3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Faisal yaitu Uji Kepekaan Bakteri Yang Diisolasi Dan Diidentifikasi Dari Rsup Prof Dr. R. D. Kandou Manado Terhadap Antibiotik Golongan Sefalosporin (Sefiksim), Penisilin (Amoksisilin) Dan Tetrasiklin (Tetrasiklin) (Faisal, 2015)
4. Peneitian yang dilakukan Fani Ade Irma yang berjudul Profil Resistensi Antimikroba Terhadap Flora Normal Dicavum Nasi Pada Petugas Dikamar Operasi Bedah Jantung Dan Petugas *Post Operasi Intensive Care Unit* Jantung Rsup H. Adam Malik Medan (Fani, 2012)
5. Paul H. Krumperman Juga Meneliti *Multiple Antibiotic Resistance Indexing Of Escherichia Coli To Identify High-Risk Sources Of Fecal Contamination Of Foods* (Paul, 1983).

**E. Tujuan Penelitian**

1. Menemukan bakteri Gram negatif yang resisten terhadap antibiotik dari udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.
2. Menemukan bakteri *Multi-Drug Resistency* (MDR) di udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.

**F. Kegunaan Penelitian**

Berikut ini adalah kegunaan dari pelaksanaan penelitian diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang Penggunaan antibiotik yang dapat meminimalkan terjadinya resistensi bakteri.
2. Sebagai informasi bagi rumah sakit RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan Tentang Resistensi Antibiotik*

Sejarah resistensi bakteri terhadap antibiotika diawali dari ditemukannya *Staphylococcus* yang resisten terhadap penicillin pada awal 1940-an. Sejak itu resistensi tunggal maupun multiple (*Multi Drug Resistance*) yang dimediasi oleh plasmid yang dapat dipindahkan dari satu ke lain mikroorganisme juga dilaporkan sekitar tahun 1950-an. Pada pertengahan 1970-an gen-gen resisten ditemukan semakin menyebar di berbagai pelayanan kesehatan dan bahkan melibatkan organisme-organisme yang bersifat komensal yang dirawat di rumah sakit. Penyebaran bakteri resisten semakin dramatik di pertengahan tahun 1990-an (Dwiprahasto, 2005).

Resistensi antibiotik didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik secara sistemik dengan dosis normal atau kadar hambat minimalnya. Antibiotik adalah obat yang dikenal, baik oleh kalangan medis, maupun masyarakat. Sayangnya, hampir semuanya mengenal antibiotik secara salah (*misused*). Masalah *inappropriate use of Antibiotic Editorial* merupakan masalah *irrational prescribing* yang paling besar di dunia, dari dahulu sampai sekarang, di rumah sakit maupun di komunitas. Hasil penelitian pada tahun 2003, Kejadian resistensi terhadap penicilin dan tetrasiklin oleh bakteri patogen diare

dan *Neisseria gonorrhoeae* telah hampir mencapai 100% di seluruh area di Indonesia (Hadi, 2008).

Resistensi terhadap antibiotik bisa didapat atau bawaan. Pada resistensi bawaan, semua spesies bakteri bisa resisten terhadap suatu obat sebelum bakteri kontak dengan obat tersebut. Yang serius secara klinis adalah resistensi yang didapat, dimana bakteri yang pernah sensitif terhadap suatu obat menjadi resisten. Resistensi silang juga dapat terjadi antara obat-obat antibiotik yang mempunyai kerja yang serupa seperti penisilin dan sefalosporin. Mekanisme yang bertanggung jawab untuk resistensi terhadap suatu antibiotika adalah menginaktivasi enzim yang merusak obat, Mengurangi akumulasi obat, Perubahan tempat ikatan, Perkembangan jalur alternatif metabolik (Febiana, 2012).

Populasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang berkembang dengan beberapa cara (Neal, 2006) :

- a. Seleksi Dalam suatu populasi akan terdapat beberapa bakteri dengan resistensi didapat. Kemudian obat mengeliminasi organisme yang sensitif, sedangkan bakteri yang resisten mengalami proliferasi
- b. Resistensi yang ditransfer gen yang mengkode mekanisme resistensi ditransfer dari satu organisme ke organisme lain.

Akumulasi dari penggunaan antibiotik pada suatu komunitas yang terlalu sering dapat memicu terjadinya resistensi bakteri yang di dapat terhadap suatu antibiotik Berikut ini merupakan faktor-faktor yang memudahkan berkembangnya resistensi di rumah sakit yaitu Penggunaan antibiotik yang sering, penggunaan

antibiotik yang irasional, penggunaan antibiotik baru yang berlebihan, penggunaan antibiotik untuk jangka waktu yang lama pemberian antibiotik dalam waktu lama memberi kesempatan bertumbuhnya kuman yang lebih resisten (*first step mutant*). Beberapa faktor lain yang berperan terhadap berkembangnya resistensi ialah kemudahan sanitasi buruk dan kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat (Guillemot, 1999).

Dua faktor penting ikut berperan dalam penyebaran resistensi yaitu kemampuan organisme untuk mentransfer, memperoleh dan merekayasa gena resisten, serta penekanan selektif bakteri akibat penggunaan antibiotika spektrum luas (*Broad Spectrum*) secara berlebihan. Hal ini pula yang menjadikan AS butuh perhatian karena peningkatan resistensi antimikroba di rumah sakit cukup tinggi. Dari catatan yang di dapatkan, proporsi isolat *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap methicillin, oksasilin, atau nafsilin terus meningkat dan hampir 60% yang resisten dan telah terjadi peningkatan hampir 50% di isolat *Klebsiella pneumoniae* terhadap sefalosporin antara tahun 2002 dan 2003. Dari ke dua faktor tersebut dapat dikatakan jika Interaksi antara dua komponen utama inilah (yang lebih dikenal sebagai *Drug Resistance Equation*) yang hingga saat ini menjadi bagian dari masalah resistensi bakteri yang tak pernah terpecahkan secara tuntas (NNIS system, 2004).

Resistensi antimikroba dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan kesehatan dan juga Salah satu dampak dari resistensi bakteri ini adalah semakin terbatasnya pilihan antibiotika untuk mengatasi infeksi-infeksi yang berat. Berbagai penelitian melaporkan bahwa pasien-pasien yang terinfeksi oleh

bakteri yang resisten umumnya memiliki outcome yang buruk serta terpaksa harus dirawat lebih lama di rumah sakit daripada pasien penderita infeksi lainnya. Untuk itu perlu Pencegahan jika terjadi resistensi dan penyebaran mikroorganisme resisten sehingga dapat mengurangi efek samping serta penggunaan antimikroba yang tepat yang meliputi pilihan yang optimal, dosis dan durasi pengobatan, serta pengendalian penggunaan antibiotik, akan mencegah atau memperlambat munculnya perlawanan antara mikroorganisme (Shlaes, 1997).

Resistensi bakteri terhadap antimikroba terjadi melalui banyak mekanisme genetik yang berfungsi untuk melawan antimikroba, sehingga bakteri yang resisten cenderung semakin rumit pendeteksiannya. Berbagai mekanisme genetik ikut terlibat, termasuk di antaranya mutasi kromosom, ekspresi gena-gena resisten kromosom laten, didaptnya resistensi genetik baru melalui pertukaran langsung DNA (oleh konjugasi), melalui bakteriofag (transduksi), atau plasmid DNA ekstrakromosom, ataupun didaptnya DNA melalui mekanisme transformasi. Informasi yang dikodekan dalam materi genetik ini memungkinkan bakteri untuk mengembangkan resistensi melalui tiga mekanisme utama : Produksi enzim yang akan menonaktifkan atau menghancurkan antibiotik, perubahan dari situs target antibiotik untuk menghindari aksi antibiotik atau pencegahan akses antibiotik ke situs target. (Shlaes, 1997).

Meskipun pada kenyataannya penggunaan antibiotika relatif lebih ekstensif di komunitas tetapi reservoir mikroorganisme resisten terbesar adalah rumah sakit, karena hampir sebagian besar pasien akan mendapat antibiotika profilaksi ataupun



terapi yang polanya sangat beragam dan cenderung sulit dikendalikan melalui regulasi biasa. Penyebaran bakteri resisten melalui kontaminasi silang umumnya lebih mudah di antara pasien-pasien penderita infeksi yang dirawat di rumah sakit (Bhavnani, 1999).

### ***B. Tinjauan Tentang Antibiotik***

Antibiotik adalah agen yang digunakan untuk mencegah dan mengobati suatu infeksi karena bakteri (Mitrea, 2008). Akan tetapi, istilah antibiotik sebenarnya mengacu pada zat kimia yang dihasilkan oleh satu macam organisme, terutama fungi, yang menghambat pertumbuhan atau membunuh organisme yang lain (Neal *at al*, 2006).

Berdasarkan struktur kimianya, antibiotik dikelompokkan sebagai berikut (Febiana, 2012) :

- a. Golongan Aminoglikosida, antara lain Amikasin, Dibekasin, Gentamisin, Kanamisin, Neomisin, Netilmisin, Paromomisin, Sisomisin, Streptomisin, Tobramisin.
- b. Golongan Beta-Laktam, antara lain golongan Karbapenem (Ertapenem, Imipenem, Meropenem), golongan Sefalosporin (Sefalekssin, Sefazolin, Sefuroksim, Sefadroksil, Seftazidim), golongan Beta-Laktam Monosiklik, dan golongan Penisilin (Penisilin, Amoksisilin). Penisilin adalah suatu agen antibakterial alami yang dihasilkan dari jamur jenis *Penicillium chrysognum*.

- c. Golongan Glikopeptida, antara lain Vankomisin, Teikoplanin, Ramoplanin dan Dekaplanin.
- d. Golongan Poliketida, antara lain golongan Makrolida (Eritromisin, Azitromisin, Klaritromisin, Roksitromisin), golongan Ketolida (Telitromisin), golongan Tetrasiklin (Doksisiklin, Oksitetrasiklin, Klortetrasiklin).
- e. Golongan Polimiksin, antara lain polimiksin dan kolistin.
- f. Golongan Kinolon (Fluorokinolon), antara lain Asam Nalidiksat, Siprofloksasin, Ofloksasin, Norfloksasin, Levofloksasin, dan Trovafloksasin.
- g. Golongan Streptogramin, antara lain Pristinamycin, Virginiamycin, Mikamycin, dan Kinupristin-Dalfopristin.
- h. Golongan Oksazolidinon, anatarain Linezolid.
- i. Golongan Sulfonamida, antara lain Kotrimoksazol dan Trimetoprim.
- j. Antibiotik lain yang penting, seperti Kloramfenikol, Klindamisin dan Asam Fusidat.

Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan ada yang bersifat bakterisid. Agen bakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri (Ozkurt, 2005). Sedangkan agen bakterisida membunuh bakteri. Perbedaan ini biasanya tidak penting secara klinis selama mekanisme pertahanan pejamu terlibat dalam eliminasi akhir patogen bakteri. (Neal, 2006)

Berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap bakteri, antibiotik dikelompokkan sebagai berikut (Stringer *at al*, 2006) :

- a. Inhibitor sintesis dinding sel bakteri memiliki efek bakterisidal dengan cara memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintesis dinding sel. Contohnya antara lain golongan  $\beta$ -Laktam seperti penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam, dan inhibitor sintesis dinding sel lainnya seperti vancomysin, basitrasin, fosfomysin, dan daptomysin.
- b. Inhibitor sintesis protein bakteri memiliki efek bakterisidal atau bakteriostatik dengan cara mengganggu sintesis protein tanpa mengganggu sel-sel normal dan menghambat tahap tahap sintesis protein. Obat- obat yang aktivitasnya menginhibitor sintesis protein bakteri seperti Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Streptogamin, Klindamisin, Oksazolidinon, Kloramfenikol.
- c. Menghambat sintesa folat mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti Sulfonamida Dan Trimetoprim. Bakteri tidak dapat mengabsorpsi asam folat, tetapi harus membuat asam folat dari PABA (Asam Paraaminobenzoat), pteridin, dan glutamat. Sedangkan pada manusia, asam folat merupakan vitamin dan kita tidak dapat menyintesis asam folat. Hal ini menjadi suatu target yang baik dan selektif untuk senyawa-senyawa antimikroba.
- d. Mengubah permeabilitas membran sel memiliki efek bakteriostatik dan bakteriostatik dengan menghilangkan permeabilitas membran dan oleh karena hilangnya substansi seluler menyebabkan sel menjadi lisis. Obat- obat yang memiliki aktivitas ini antara lain Polimiksin, Amfoterisin B, Gramisidin, Nistatin, Kolistin.

- e. Mengganggu sintesis DNA mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti Metronidasol, Kinolon, Novobiosin. Obat-obat ini menghambat Asam Deoksiribonukleat (DNA) girase sehingga menghambat sintesis DNA. DNA girase adalah enzim yang terdapat pada bakteri yang menyebabkan terbukanya dan terbentuknya superheliks pada DNA sehingga menghambat replikasi DNA.
- f. Mengganggu sintesa RNA, seperti Rifampisin.

Berdasarkan aktivitasnya, antibiotik dikelompokkan sebagai berikut (Kee JL, 1996) :

- a. Antibiotika spektrum luas (*broad spectrum*) Contohnya seperti Tetrasiklin dan Sefalosporin efektif terhadap organisme baik Gram positif maupun Gram negatif. Antibiotik berspektrum luas sering kali dipakai untuk mengobati penyakit infeksi yang menyerang belum diidentifikasi dengan pembiakan dan sensitifitas.
- b. Antibiotika spektrum sempit (*narrow spectrum*) Golongan ini terutama efektif untuk melawan satu jenis organisme. Contohnya Penisilin dan Eritromisin dipakai untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri Gram positif. Karena antibiotik berspektrum sempit bersifat selektif, maka obat-obat ini lebih aktif dalam melawan organisme tunggal tersebut daripada antibiotik berspektrum luas

Terdapat 2 pola bunuh antibiotik terhadap kuman yaitu (Rudolph, 2003):

- a. *Time dependent killing*. Pada pola ini antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya dipertahankan cukup lama di atas Kadar Hambat

Minimal kuman. Contohnya pada antibiotik Penisilin, Sefalosporin, Linezolid, dan Eritromisin.

- b. *Concentration dependent killing*. Pada pola ini antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya relatif tinggi atau dalam dosis besar, tapi tidak perlu mempertahankan kadar tinggi ini dalam waktu lama. Contohnya pada antibiotik Aminoglikosida, Fluorokuinolon, dan Ketolid.

### ***C. Tinjauan Tentang Bakteri Gram Negatif***

Bakteri merupakan organisme prokariot. Umumnya ukuran bakteri sangat kecil, bentuk tubuh bakteri baru dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 1.000x atau lebih (Waluyo, 2004). Sel bakteri memiliki panjang yang beragam, sel beberapa spesies dapat berukuran 100 kali lebih panjang daripada sel spesies yang lain. Bakteri merupakan makhluk hidup dengan ukuran antara 0,1 sampai 0,3  $\mu\text{m}$ . Bentuk bakteri bermacam-macam yaitu elips, bulat, batang dan spiral. Bakteri lebih sering diamati dalam olesan terwarnai dengan suatu zat pewarna kimia agar mudah diamati atau dilihat dengan jelas dalam hal ukuran, bentuk, susunan dan keadaan struktur internal dan butiran. Sel individu bakteri dapat berbentuk seperti bola/elips, batang (silindris) atau spiral (heliks) (Pelczar & Chan, 2007).

Gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri Gram positif akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri Gram negatif

tidak. Pada uji pewarnaan Gram, suatu pewarna (counterstain) ditambahkan setelah metil ungu yang membuat semua bakteri Gram negatif menjadi berwarna merah atau merah muda. Pengujian ini berguna untuk mengklasifikasikan kedua tipe bakteri ini berdasarkan perbedaan struktur dinding sel. Banyak spesies bakteri Gram negatif yang bersifat patogen, yang berarti berbahaya bagi organisme inang. Sifat patogen ini umumnya berkaitan dengan komponen tertentu pada dinding sel Gram negatif, terutama lapisan lipopolisakarida (dikenal juga dengan LPS atau endotoksin) (Edwin, 2011).

Patogenitas bakteri Gram negatif dipengaruhi oleh faktor sifat. Faktor sifat yang memungkinkan organisme mengatasi pertahanan tubuh normal dan menimbulkan penyakit ialah: pili, yang melekat dan merusak membran basalis sel, polisakarida simpai, yang meningkatkan perlekatan pada jaringan tetapi tidak menekan fagositosis, suatu hemolisin yang memiliki aktivitas fosfolipasa, kolagenasa dan elastasa dan flagel untuk membantu pergerakan. Sedangkan faktor yang menentukan daya patogen adalah LPS mirip dengan yang ada pada *Enterobacteriaceae*; eksotoksin A, suatu transferasa ADP-ribosa mirip dengan toksin difteri yang menghentikan sintesis protein dan menyebabkan nekrosis di dalam hati; eksotoksin S yang juga merupakan transferasa ADP-ribosa yang mampu menghambat sintesis protein eukariota (Boel, 2004).

Produksi enzim-enzim dan toksin-toksin yang merusak barrier tubuh dan sel-sel inang menentukan kemampuan bakteri Gram negatif menyerang jaringan. Salah satu contoh bakteri Gram negatif adalah *Endotoksin P. aeruginosa* seperti yang

dihasilkan bakteri Gram negatif lain menyebabkan gejala sepsis dan syok septik. Eksotoksin A menghambat sintesis protein eukariotik dengan cara kerja yang sama dengan cara kerja toksin difteria (walaupun struktur kedua toksin ini tidak sama) yaitu katalisis pemindahan sebagian ADP-ribosil dari NAD kepada EF-2 (Jawetz, 1996). Hasil dari kompleks ADP-ribosil-EF-2 adalah inaktivasi sintesis protein sehingga mengacaukan fungsi fisiologik sel normal. Enzim-enzim ekstraseluler, seperti elastase dan protease mempunyai efek hidrotoksik dan mempermudah invasi organisme ini ke dalam pembuluh darah.

Antitoksin terhadap eksotoksin A ditemukan dalam beberapa serum manusia, termasuk serum penderita yang telah sembuh dari infeksi yang berat. Psiosianin merusak silia dan sel mukosa pada saluran pernafasan. Lipopolisakarida mempunyai peranan penting sebagai penyebab timbulnya demam, syok, oliguria, leukositosis, dan leukopenia, koagulasi intravaskular diseminata, dan sindroma gagal pernafasan pada orang dewasa. Strain *Pseudomonas aeruginosa* yang punya sistem sekresi tipe III. Secara signifikan lebih virulen dibandingkan dengan yang tidak punya sistem sekresi tersebut. Sistem sekresi tipe III adalah sistem yang dijumpai pada bakteri Gram negatif, terdiri dari sekitar 30 protein yang terbentang dari bagian dalam hingga luar membran sel bakteri, berfungsi seperti jarum suntik yang menginjeksi toksin-toksin secara langsung ke dalam sel inang sehingga memungkinkan toksin mencegah netralisasi antibodi (Mayasari, 2006).

#### ***D. Tinjauan Tentang Udara***

Udara bukanlah merupakan medium tempat mikroorganisme tumbuh, melainkan sebagai pembawa partikulat, debu dan tetesan cairan yang dapat dimuati oleh mikroorganisme. Udara dalam ruang tertutup mengandung lebih sedikit mikroorganisme dari jenis yang sama dibandingkan yang ditemukan di udara terbuka. Mikroorganisme tersebut sebagian besar adalah saprofit dan bersifat nonpatogenik. Akan tetapi dengan bertambahnya mikroorganisme nonpatogenik dalam jumlah yang relatif besar dapat membuatnya mempunyai potensi yang sama seperti mikroorganisme patogenik (Setyaningsih, 1988).

Jenis alga, protozoa, ragi jamur dan bakteri merupakan jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan di udara dekat permukaan bumi. Spora jamur merupakan bagian terbesar dari mikroorganisme yang ditemukan di udara. Bakteri yang ditemukan pada umumnya dari jenis Gram positif, baik spora maupun nonspora. Selain itu juga ditemukan kokus Gram positif dan basil Gram negatif (Pelczar, 1988).

Udara bukanlah habitat alamiah mikroorganisme, oleh karenanya kuman tidak dapat bertahan lama di dalam udara. Keberadaannya di udara tak bebas dimungkinkan karena aliran udara tidak terlalu besar, sehingga kuman dapat berada di udara dalam waktu yang relatif lama. Dengan demikian kemungkinan untuk memasuki tubuh pun menjadi semakin besar. Hal ini dibantu pula oleh taraf kepadatan penghuni ruangan, sehingga penularan penyakit infeksi lewat udara sebagian besar terlaksana lewat udara tak bebas (Soemirat, 1994).



Penyakit dapat dipindahkan melalui udara dengan melewati jalan pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trakhea, bronkhi dan paru-paru. Salah satu ciri khas penyakit yang dapat ditularkan lewat udara adalah kecenderungannya untuk berjangkit secara epidemik dan menyerang banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Contoh khas infeksi bakterial yang ditularkan lewat udara adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan streptokokal. Sedangkan penyakit yang khas disebabkan oleh virus dan disebarkan melalui jalan pernapasan antara lain influenza dan salesma. Penyakit yang disebabkan oleh jamur dan cendawan juga merupakan infeksi yang ditularkan lewat udara (Nurmaini, 2005).

Kelembaban turut mempengaruhi jumlah bakteri udara. Udara pada musim panas/kering membawa bakteri lebih banyak dari pada musim dingin atau hujan. Beberapa mikroorganisme udara termasuk dalam golongan mikroorganisme yang patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, terutama bila berada di suasana udara tidak bebas seperti di dalam perumahan penduduk, rumah sakit, gedung-gedung umum dan perkantoran, pabrik serta gedung-gedung lainnya. Golongan ini terdiri atas berbagai jenis mikroorganisme patogen, baik jamur, protozoa, bakteri maupun virus. Penyakit yang disebabkan sering diklasifikasikan sebagai penyakit yang menyebar lewat udara (*air borne diseases*) (Budiarti, 2007).

Seperti yang dijelaskan dalam Qs. Surah Ar-Rum/ 30 : 48 tentang pentingnya angin sebagai kebutuhan manusia.

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ  
 يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَيْفَ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ  
 بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya :

*Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa udara merupakan pembauran gas yang mengisi ruang bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru. Udara adalah salah satu dari empat unsur yang seluruh alam bergantung kepadanya. Empat unsur tersebut ialah tanah, air, udara dan api. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa keempat unsur ini bukanlah zat yang sederhana, akan tetapi merupakan persenyawaan dari berbagai macam unsur.

Air misalnya, terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Demikian juga tanah yang terbentuk dari belasan unsur berbeda. Adapun udara, ia terbentuk dari sekian ratus unsur, dengan dua unsur yang paling dominan, yaitu nitrogen yang mencapai sekitar 78,084 persen dan oksigen sebanyak 20,946 persen. Satu persen sisanya adalah unsur-unsur lain.

Termasuk hikmah kekuasaan Tuhan dalam penciptaan alam ini, bahwa Dia menciptakan udara dengan nitrogen dan sifatnya yang pasif sebagai kandungan mayoritasnya, yaitu 78 persen dari udara. Kalau saja kandungan udara akan gas

nitrogen kurang dari itu, niscaya akan berjatuhan bunga-bunga api dari angkasa luar karena mudahnya menembus lapisan bumi (hal itu yang kerap kali terjadi) dan terbakarlah segala sesuatu yang ada pada permukaan bumi (Ibnu Katsir, 2002).

Sebagai manusia terkadang muncul ketika datang angin topan yang sangat kencang dengan membawa debu dan hawa panas, yang akan membuat sebagian manusia sakit, mereka lupa bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah dan berjalan sesuai dengan hukum alam Nya yang tidak dapat dirubah. Sebab itulah Nabi saw, melarang pencelaan terhadap angin, beliau bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنْ  
سَلُّوا اللَّهَ < مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوُّدُوا مِنْ شَرِّهَا

Artinya :

*Rasulullah saw bersabda : Janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia berasal dari ruh Allah Ta'ala yang datang membawa rahmat dan azab, akan tetapi mohonlah kepada Allah dari kebaikan angin tersebut dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).*

Maksud hadist di atas menjelaskan bahwa Sungguh, nikmat udara merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dengan demikian, manusia dituntut untuk memanfaatkannya sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, dengan melestarikannya bukan dengan mencemarinya dan merusaknya, yang akan membawa mudharat bagi dirinya dan makhluk ciptaan Allah SWT, lainnya. Sebagai contoh pencemaran udara akibat mikroorganisme udara yang

dapat mengganggu kesehatan manusia, karena pada udara juga terdapat bakteri patogen yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit infeksi.

#### ***E. Tinjauan Tentang Rumah sakit***

Rumah sakit merupakan sarana umum dan sebagai tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, Hal ini memungkinkan untuk terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan atau dapat menjadi tempat penularan penyakit (Adikoesoemo, 2010). Sanitasi lingkungan merupakan salah satu usaha untuk mencapai lingkungan yang sehat melalui pengendalian faktor lingkungan fisik terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan lingkungan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia.

Pemerintah Indonesia telah mengatur persyaratan kualitas udara di rumah sakit dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1204/MENKES/SK/X/2004. Sebagai suatu institusi, rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka mengobati dan menyembuhkan penderita, sehingga didapatkan kondisi yang sehat dan terbebas dari penyakit. Dalam kegiatannya terjadi interaksi antara pasien, pengunjung, petugas, peralatan medik, penunjang medik dan non medik, obat-obatan serta bahan lain. Kegiatan di rumah sakit memungkinkan untuk terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan atau dapat menjadi tempat penularan penyakit, yang disebut dengan infeksi nosokomial (Adikoesoemo, 2010).

Kualitas lingkungan di rumah sakit menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena beberapa cara transmisi kuman penyebab infeksi dapat terjadi melalui *droplet*, *airborne* maupun kontak langsung. Dengan demikian penyebab penyakit

dapat berada di udara, lantai, dinding maupun peralatan medis. Lingkungan yang terkontaminasi mempunyai peran cukup besar sebagai tempat penularan penyakit yang dapat menimbulkan infeksi nosokomial (Suryawati, 2004).

Penyebaran infeksi nosokomial di rumah sakit dapat terjadi pada fasilitas yang ada di rumah sakit seperti pada ruang pembedahan atau operasi, ruang gawat darurat, instalasi rawat jalan, dan ruang rawat inap. Mengingat manusia rata-rata melewati 80-95% aktivitasnya di dalam ruangan (Utama, 2003). Ruang rawat inap berperan sebagai rumah kedua bagi pasien yang sedang menjalani masa pemulihan, ruang rawat inap menjadi penting diperhatikan sanitasinya dibandingkan dengan fasilitas lain di rumah sakit yang juga menjadi sumber infeksi nosokomial. Ruang rawat inap juga memberikan peluang besar bagi pengunjung, pekerja medis, pekerja non medis, serta pasien pada jam-jam tertentu untuk berinteraksi di dalamnya. Melihat faktor pemeliharaan ruangan di rumah sakit seperti kebersihan pada ruang rawat inap berbeda dengan ruang operasi dan isolasi yang menggunakan sterilisasi yang ketat, akses untuk masuk ke ruang rawat inap lebih mudah mengingat kepentingan berkunjung ke ruang rawat inap lebih tinggi dibandingkan dengan ruang cuci atau dapur. Penyebab polusi udara dalam ruangan juga berhubungan dengan bangunan itu sendiri, perlengkapan dalam ruangan (karpas, AC, dan sebagainya), kondisi bangunan, suhu, kelembaban, pertukaran udara, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada di dalam ruangan (Depkes, 2001).

### F. Ayat dan Hadist yang Relevan

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah udara, dalam hal ini udara yang mengandung oksigen yang diperlukan manusia untuk pernafasan. Tanpa oksigen, manusia tidak dapat hidup. Tuhan beberapa kali menyebut angin (udara) dan fungsinya dalam proses daur air dan hujan. Firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf/ 7 :


31



Terjemahnya :

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki mesjid [534], makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan [535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.*

Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas berkata bahwa makna yang dimaksud ialah “Makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selagi kau hindari dua pekerti, yaitu berlebih-lebihan dan sombong.” Maksud berlebih-lebihan adalah janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Seperti dalam penggunaan antibiotik untuk terapi penyembuhan diharapkan menggunakan antibiotik sesuai dosis dan tidak berlebihan karena jika tidak antibiotik yang awalnya dapat menghambat berubah menjadi resisten terhadap tubuh akibat perlakuan manusia itu sendiri (Ibnu Katsir, 2002)

**G. Kerangka fikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dilakukan pada Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah semua bakteri Gram negatif yang ada di udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle yang telah di isolasi dan diidentifikasi.

##### **2. Sampel**

Sampel pada penelitian ini adalah bakteri Gram negatif yang ditemukan udara ruang rumah sakit.



#### **D. Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat adalah antibiotik dan variabel bebas adalah resistensi bakteri.

#### **E. Defenisi Operasional Variabel**

1. Antibiotika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu .antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin Dan Oxytetrasiklin.
2. Resistensi antibiotik yaitu ketahanan bakteri terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin Dan Oxytetrasiklin yang digunakan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.
3. Bakteri Gram negatif yaitu bakteri yang sudah diambil dan ditumbuhkan di Laboratorium Uin Alauddin Makassar.
4. Ruang Perawatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle merupakan tempat pengambilan sampel udara.
5. Infeksi nosokomial yaitu infeksi baru yang tidak dalam masa inkubasi.
6. *Multi Drug Resistency* (MDR) merupakan resistensi terhadap lebih dari satu antibiotik
7. Resistensi merupakan sedikitnya zona bening yang dibentuk oleh antibiotik pada bakteri Gram negatif, yaitu Ampisilin resisten (R) bila besarnya zona hambatan 0-13 mm, Kloramfenikol dan Kanamisin resisten (R) bila besar zona hambatan 0-10 mm, Tetrasikin dan Oxytetrasiklin resisten (R) bila besar zona hambatan 0-14 mm.

8. Sensitif merupakan besarnya zona bening yang dibentuk oleh antibiotik pada bakteri Gram negatif, dimana Ampisilin sensitif (S) bila besar zona hambatan diatas 18 mm, Kloramfenikol dan Kanamisin (S) bila zona hambatan diatas 20 mm, Terasiklin Dan Oxytetrasiiklin sensitif (S) bila besar zona hambatan diatas 19 mm.
9. Intermedit merupakan zona yang tidak telalu besar dan juga tidak terlalu sedikit yang dibentuk oleh antibiotik, dimana Ampisilin Intermedit (I) bila besarnya zona hambatan 14-17 mm, Kloramfenikol dan Kanamisin intermedit (I) 11-19 mm, Tetrasiklin dan Oxytetrasiiklin intermedit (I) bila besar zona hambatan 15-18 mm.

#### ***F. Metode Pengumpulan Data***

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melihat resistensi antibiotik bakteri Gram negatif di udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle dengan melakukan tes uji kepekaan antibiotik.

#### ***G. Insrtumen Penelitian (Alat dan Bahan)***

##### ***1. Alat***

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jarum Ose Bulat, Cawan Petri, Bunsen, Tabung Reaksi, Rak Tabung, Pinset, Pipet Tetes, Laminar Air Flow, Autoklaf, Gelas Kimia, Hot Plate dan Stirrer, Neraca Analiti, Oven, Incubator Shaker, Gelas Ukur, Mikropipet, Erlenmeyer,

## **2. Bahan**

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini Yaitu isolat bakteri udara, kertas cakram, antibiotik Ampisilin 10 $\mu$ g/ml, Kloramfenikol 10 $\mu$ g/ml, Kanamisin 25 $\mu$ g/ml, Tetrasiklin 25 $\mu$ g/ml dan Oxytetrasiklin 25 $\mu$ g/ml, Aquades steril, Alkohol 70%, Media Nutrien Agar (NA), Media Nutrien Broth (NB),

## **H. Prosedur Kerja**

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Sterilisasi Alat**

Alat - alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu sebelum penelitian. Sterilisasi alat dilakukan menggunakan autoklaf dengan cara alat - alat gelas yang akan digunakan dalam penelitian dibungkus menggunakan aluminium foil kemudian dimasukkan kedalam autoklaf, kemudian autoklaf dihidupkan pada suhu 121<sup>0</sup>C selama 15-20 menit. Alat-alat yang sudah disterilkan kemudian ditunggu hingga mencapai suhu kamar dan kering (Mpila 2012). Selanjutnya sterilisasi alat-alat gelas menggunakan oven pada suhu 180<sup>0</sup>C selama 2 Jam

### **2. Pembuatan Media**

Medium yang digunakan dalam penelitian ini adalah medium nutrient agar (NA). Medium ini digunakan sebagai media agar miring untuk inokulasi bakteri, media dasar dan media pembedahan. Adapun cara pengerjaannya sebagai berikut :

- a. Nutrient Agar (NA) sebanyak 14 gram dilarutkan dalam 500 ml aquades menggunakan erlenmeyer. Setelah itu, dihomogenkan dengan stirrer diatas

pemanas air sampai mendidih. Media yang sudah homogen ini disterilkan dalam autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit, kemudian didinginkan sampai suhu  $45 - 50^{\circ}\text{C}$  (Mpila, 2012). Media pertumbuhan digunakan dalam pertumbuhan dan isolasi bakteri yang berasal dari udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.

- b. Lactosa Broth (LB) sebanyak 14 gram dilarutkan dalam 500 ml aquades menggunakan erlenmeyer. Setelah itu, dihomogenkan dengan stirrer diatas pemanas air sampai mendidih. Media yang sudah homogen ini disterilkan dalam autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit, kemudian didinginkan sampai suhu  $45 - 50^{\circ}\text{C}$  (Mpila, 2012). Media pertumbuhan digunakan dalam pertumbuhan dan isolasi bakteri yang berasal dari udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.

### 3. Peremajaan Bakteri

Bakteri yang digunakan merupakan hasil isolasi dari bakteri udara RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle masing-masing bakteri udara diambil sebanyak 1 ose kemudian ditumbuhkan atau diinokulasikan dengan cara digores pada medium Nutrient Agar (NA) miring. Kultur bakteri pada masing-masing agar miring diinkubasi pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$  selama 18-24 jam.

### 4. Uji kepekaan antibiotik

Pengujian dilakukan secara *in vitro* dengan metode difusi dengan menggunakan kertas cakram. Langkah pertama yang dilakukan yaitu medium NA (Nutrient Agar) yang telah disterilkan, didinginkan pada suhu  $40^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$ , lalu dituang ke dalam cawan petri secara aseptis di dalam *Laminary Air Flow* (LAF).

Setelah medium NA pada cawan petri memadat, selanjutnya suspensi bakteri dioleskan secara merata pada permukaan medium dengan menggunakan swab steril. Setelah pengolesan tersebut, kertas cakram yang telah direndam pada larutan antibiotik lalu ditempelkan pada permukaan medium NA yang telah diolesi suspensi bakteri. Letak kertas saring pada permukaan medium diatur sedemikian rupa dengan posisi kertas saring dengan larutan antibiotik yang berbeda.

Cawan petri kemudian diinkubasi dengan suhu 37<sup>0</sup>C selama 24 jam. Setelah masa inkubasi 24 jam, pertumbuhan bakteri dan zona hambat yang timbul di sekitar kertas saring selanjutnya diukur diameternya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

Resistensi antibiotik bakteri Gram negatif diuji dengan menggunakan empat macam antibiotik yaitu golongan Penisilin (Ampisilin), golongan Kloramfenikol (Kloramfenikol), golongan Aminoglikosida (Kanamisin) dan golongan Tetrasiklin (Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin). Pengujian kepekaan antibiotik bakteri Gram negatif menggunakan metode cakram yang telah diberi antibiotik sesuai konsentrasi potensinya.

Hasil uji kepekaan dari masing-masing antibiotik bakteri Gram negatif melalui metode cakram dengan berat konsentrasi 10 $\mu$ g/ml untuk antibiotik Ampisilin dan Kloramfenikol dan 25 $\mu$ g/ml untuk antibiotik Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin. Kemampuan setiap antibiotik dalam menghambat bakteri Gram negatif dapat dilihat dari besarnya zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Adapun uji kepekaan antibiotik terhadap bakteri Gram negatif menunjukkan hasil zona bening dan non zona bening, hal ini berarti antibiotik yang diperlakukan terhadap bakteri ada yang bekerja dengan baik dan ada juga yang tidak bekerja dengan baik (resistensi).

Pada uji kepekaan antibiotik pada bakteri Gram negatif merupakan teknik untuk mengetahui potensi suatu antibiotik dalam menghambat atau membunuh suatu bakteri dengan memakai konsentrasi tertentu yang digolongkan kedalam tiga kriteria

sesuai dengan *National Committee for Clinical Laboratory Standards* (NCCLS), yaitu Ampisilin resisten (R) bila besarnya zona hambatan 0-13 mm, intermedit (I) bila besarnya zona hambatan 14-17 mm dan sensitif (S) bila besar zona hambatan diatas 18 mm, Kloramfenikol dan Kanamisin resisten (R) bila besar zona hambatan 0-10 mm, intermedit (I) 11-19 mm, sensitif (S) bila besar zona hambatan di atas 20 mm, Tetrasikin dan Oxytetrasiklin resisten (R) bila besar zona hambatan 0-14 mm, intermedit (I) bila besar zona hambatan 15-18 mm, sensitif (S) bila besar zona hambatan diatas 19 mm.

Bakteri yang digunakan pada penelitian ini adalah bakteri yang telah diisolasi dan diidentifikasi hanya sampai pada segi karakteristik bakteri sehingga hanya mengambil bakteri Gram negatif karena bakteri Gram negatif memiliki patogenitas yang lebih tinggi dari pada bakteri Gram positif. Sehingga dalam pengujian kepekaan antibiotik hanya mengambil bakteri Gram negatif yang ada di udara Ruang Perawatan Inap RSUD. H. Padjonga Daeng Ngalle.

Hasil uji kepekaan antibiotik terhadap bakteri Gram negatif yang ditemukan di udara Ruang Asoka (RA) kelas I, II dan III, Ruang Palem (RP) kelas III dan Ruang Flamboyan (RF) kelas I, II dan III di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar hdpapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dalam pengujian kepekaan antibiotik di Ruang Perawatan Inap Asoka kelas I dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.1 Uji Kepekaan Antibiotik Bakteri Gram Negatif Ruang RA Kelas I**

Kode Isolat	Zona Bening (mm)									
	Amp	Ket	Klor	Ket	Knm	Ket	Tetra	Ket	Oxy	Ket
01	29	S	30	S	25	S	25	S	15	I
02	28	S	30	S	32	S	28	S	16	I
24	13	R	29	S	25	S	28	S	22	S

Sumber : Data primer, 2016

Keterangan :

Amp : Antibiotik Ampisilin                      S : Sensitif

Klor : Antibiotik Kloramfenikol              R : Resisten

Knm : Antibiotik Kanamisin                  I : Intermedit

Tetra : Antibiotik Tetrasiklin

Oxy : Antibiotik Oxytetrasiklin

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.1 memperlihatkan zona hambat yang dihasilkan antibiotik terhadap ketiga isolat bakteri Gram negatif Ruang Asoka (RA) kelas I, dimana isolat RA 1 (01) dan (02) sensitif terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin dan Tetrasiklin serta intermedit terhadap antibiotik Oxytetrasiklin. Isolat RA I (24) intermedit terhadap antibiotik Ampisilin, serta sensitif terhadap antibiotik Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin. Dari kelima antibiotik yang digunakan yang paling sensitif terhadap bakteri Gram negatif adalah antibiotik Kanamisin dengan besar zona bening 32 mm



pada kode isolat bakteri 02 dan antibiotik yang paling resisten terhadap bakteri Gram negatif adalah antibiotik Ampisilin dengan zona bening sebesar 13 mm pada kode isolat bakteri 24 serta antibiotik yang intermedit pada bakteri Gram negatif adalah antibiotik Oxytetrasiiklin dengan besar zona bening 16 mm pada kode isolat bakteri 02.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam pengujian kepekaan antibiotik di Ruangan Asoka kelas II dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Uji Kepekaan Antibiotik Bakteri Gram Negatif Ruang RA Kelas II**

Kode Isolat	Zona Bening (mm)									
	Amp	Ket	Klor	Ket	Knm	Ket	Tetra	Ket	Oxy	Ket
01	12	R	26	S	25	S	25	S	15	I
05	26	S	25	S	30	S	28	S	15	I
10	25	S	33	S	25	S	25	S	19	S
17	13	R	30	S	22	S	27	S	13	R

*Sumber : Data primer, 2016*

Pada tabel 4.2 menunjukkan zona hambat yang dihasilkan antibiotik terhadap keempat isolat bakteri Gram negatif Ruang Asoka (RA) kelas II. Pada isolat RA II (01) resisten terhadap antibiotik Ampisilin dan Oxytetrasiiklin serta sensitif terhadap antibiotik Kloramfenikol, Kanamisin dan Tetrasiklin. Isolat RA II (05) sensitif terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin dan Tetrasiklin serta intermedit terhadap antibiotik Oxytetrasiiklin. Isolat RA II (10) sensitif terhadap

Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin. Isolat RA II (17) sensitif terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin dan Tetrasiklin serta resisten terhadap antibiotik Oxytetrasiklin. Dari kelima antibiotik yang digunakan yang paling sensitif terhadap bakteri Gram negatif adalah antibiotik Kloramfenikol dengan besar zona hambatan 33 mm pada kode isolat bakteri 10 dan antibiotik yang paling resisten terhadap bakteri gram negatif adalah oxytetrasiklin dengan besar zona hambatan 15 mm serta antibiotik yang intermedit terhadap bakteri gram negatif adalah oxytetrasiklin dengan besar zona hambatan 15 mm pada kode isolat bakteri 01 dan 05.

Berdasarkan hasil pengamatan Uji kepekaan antibiotik di Ruang Perawatan Inap Asoka kelas III sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Uji Kepekaan Antibiotik Bakteri Gram Negatif Ruang RA Kelas III**

Kode Isolat	Zona Bening (mm)									
	Amp	Ket	Klor	Ket	Knm	Ket	Tetra	Ket	Oxy	Ket
05	20	S	18	I	15	I	18	I	21	S
12	12	R	18	I	16	I	20	S	21	S
16	12	R	24	S	10	R	25	S	11	R
19	13	R	20	S	12	I	27	S	13	R
22	12	R	14	I	19	I	18	I	15	I
30	12	R	17	I	22	S	21	S	20	S

*Sumber : Data primer, 2016*

Pada tabel 4.3 menunjukkan zona hambat yang dihasilkan antibiotik terhadap keenam isolat bakteri Gram negatif Ruang Asoka (RA) kelas III. pada isolat Ruang RA III (05) sensitif terhadap antibiotik ampisilin dan oxytetrasiklin, resistensi terhadap antibiotik Kloramfenikol serta intermedit terhadap antibiotik Kanamisin dan Tetrasiklin, isolat RA III (12) intermedit terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol dan Kanamisin serta sensitif terhadap antibiotik Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin, isolat RA III (16) intermedit terhadap antibiotik Ampisilin, sensitif terhadap antibiotik Kloramfenikol dan Tetrasiklin serta resisten terhadap antibiotik Kanamisin dan Oxytetrasiklin, isolat RA III (19) sensitif terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol dan Tetrasiklin serta intermedit terhadap antibiotik Kanamisin dan resistensi terhadap antibiotik Oxytetrasiklin, isolat RA III (22) Intermedit terhadap intermedit terhadap Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, tetrasiklin dan Oxytetrasiklin dan isolat RA III (30) sensitif terhadap antibiotik Ampisilin, Kanamisin dan Tetrasiklin serta intermedit terhadap antibiotik Kloramfenikol dan Oxytetrasiklin.

Kelima antibiotik yang digunakan yang paling sensitif terhadap bakteri Gram negatif adalah antibiotik Tetrasiklin dengan besar zona hambat 27 mm pada kode isolat bakteri 19 dan antibiotik yang paling resisten adalah antibiotik Ampisilin dan Oxytetrasiklin dengan besar zona hambatan 13 mm pada kode isolat bakteri 19. Banyaknya Bakteri Gram negatif yang resisten terhadap antibiotik dapat dihubungkan dengan keadaan ruang perawatan Asoka kelas III yang ada di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle, Ruang Perawatan Asoka kelas III memiliki aktivitas pengunjung yang

lebih banyak dari Ruang Asoka kelas I dan Ruang Asoka kelas II, sehingga memungkinkan banyak bakteri yang tumbuh dan berkembang dan menjadi resistensi terhadap antibiotik.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dalam pengujian kepekaan antibiotik pada Ruang Perawatan Inap Palembang kelas III dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4 Uji Kepekaan Antibiotik Bakteri Gram Negatif Ruang RP Kelas III**

Kode Isolat	Zona Bening (mm)									
	Amp	Ket	Klor	Ket	Knm	Ket	Tetra	Ket	Oxy	Ket
04	10	R	7	R	11	R	23	S	20	S
07	0	R	10	R	12	R	10	R	12	R
17	0	R	0	R	12	R	0	R	17	I
19	13	R	0	R	20	S	8	R	20	S
27	0	R	8	R	5	R	1	R	14	R
32	5	R	7	R	12	R	0	R	14	R

*Sumber : Data primer, 2016*

Pada tabel 4.4 menunjukkan zona hambat yang dihasilkan antibiotik terhadap keenam isolat bakteri Gram negatif Ruang Palembang (RP) kelas III, dimana isolat RP III (04) resisten terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol dan Kanamisin serta sensitif terhadap antibiotik Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin, isolat RP III (07) resisten terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin dan Oxytetrasiklin serta sensitif terhadap antibiotik Tetrasiklin, isolat RP III (17) resisten terhadap antibiotik ampisilin, kloramfenikol, kanamisin dan tetrasiklin serta

intermedit terhadap antibiotik Oxytetrasiklin, isolat RP (19) intermedit terhadap antibiotik Ampisilin, resistensi terhadap Kloramfenikol dan Tetrasiklin serta sensitif terhadap antibiotik Kanamisin dan Oxytetrasiklin, isolat RP III (27) dan (32) resisten terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin. Dari kelima antibiotik yang digunakan yang paling sensitif terhadap bakteri Gram negatif adalah antibiotik Tetrasiklin dengan besar zona hambat 23 mm pada kode isolat bakteri 04 dan antibiotik yang paling resisten adalah antibiotik Oxytetrasiklin Dengan besar zona hambatan 14 mm pada kode isolat bakteri 27 dan 32.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dalam pengujian kepekaan antibiotik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5 Uji Kepekaan Antibiotik Bakteri Gram Negatif Ruang RF Kelas I, II, III**

Kode Isolat	Zona Bening (mm)									
	Amp	Ket	Klor	Ket	Knm	Ket	Tetra	Ket	Oxy	Ket
09	8	R	6	R	11	R	0	R	11	R
10	0	R	0	R	9	R	8	R	18	I
13	0	R	0	R	2	R	0	R	18	I
22	0	R	0	R	18	I	16	I	20	S

*Sumber : Data Primer, 2016*

Pada Pengamatan 4.5 menunjukkan zona hambat yang dihasilkan antibiotik terhadap keempat isolat bakteri Gram negatif Ruang Flamboyan (RF) kelas I, II dan III, dimana isolat RF (09) resisten terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol,

Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin, isolat RF (10) dan (13) resisten terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin dan Tetrasiklin serta intermedit terhadap antibiotik Oxytetrasiklin, isolat bakteri RF (22) resisten terhadap antibiotik Ampisilin dan Kloramfenikol serta intermedit terhadap antibiotik Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin. Dari kelima antibiotik yang digunakan yang paling sensitif terhadap bakteri Gram negatif adalah antibiotik Oxytetrasiklin dengan besar zona hambat 20 mm pada kode isolat bakteri (22) dan antibiotik yang paling resisten adalah antibiotik Kanamisin dan Oxytetrasiklin dengan besar zona hambatan 11 mm pada kode isolat bakteri (09).

Berdasarkan hasil persentase yang di dapatkan dalam pengujian kepekaan antibiotik di Ruang Perawatan H. Padjonga Daeng Ngalle dapat dilihat pada tabel

**Tabel 4.6 Persentase Uji Kepekaan Antibiotik Bakteri Gram Negatif Di Ruang Perawatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar**

Antibiotik	S	I	R	Persentase %		
				S	I	R
Ampisilin	5	-	18	22%	-	78%
Kloramfenikol	9	4	10	39%	17%	44%
Kanamisin	9	5	9	39%	22%	39%
Tetrasiklin	12	3	8	52%	13%	35%
Oxytetrasiklin	8	8	7	35%	35%	30%

*Sumber : Data Primer 2016'*

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan Hasil pengujian kepekaan bakteri dari isolasi bakteri udara terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin,

Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin pada tabel 4.6 menunjukkan antibiotik Ampisilin memiliki tingkat sensitifitas sebesar 22% dan tingkat resistensi sebesar 78%. Antibiotik Kloramfenikol memiliki tingkat sensitifitas 39%, intermedit 17% dan resistensi 44%. Antibiotik Kanamisin memiliki tingkat sensitifitas 39%, tingkat intermedit 22% dan tingkat resistensi 39%. Antibiotik Tetrasiklin memiliki tingkat sensitifitas 52%, intermedit 13%, resistensi 35% sedangkan antibiotik oxytetrasiklin memiliki tingkat sensitivitas 35%, intermedit 35% dan resisten 30%. Dari hasil persentase kelima antibiotik terhadap bakteri Gram negatif yang memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi adalah antibiotik tetrasiklin sebanyak 52% dan antibiotik yang memiliki tingkat resistensi yang tinggi adalah Ampisilin sebanyak 78% serta intermedit yang tinggi sebanyak 35%.

## **B. Pembahasan**

Resistensi antibiotik merupakan kemampuan bakteri atau mikroorganisme lain untuk menahan ataupun menekan efek antibiotik. Pengujian kepekaan antibiotik dilakukan pada isolat bakteri Gram negatif yang didapat di udara Ruang Perawatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle, penentuan efektifitas suatu antibiotik dalam menghambat bakteri dapat dilihat berdasarkan diameter zona hambat yang muncul di sekitar kertas cakram (*paper disk*) yang telah diberikan zat antimikroba berupa antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin sesuai dengan konsentrasi yang diberikan sebesar 10 $\mu$ g/ml dan 25 $\mu$ g/ml.

Pengukuran diameter zona bening pada antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin dapat sensitif terhadap antibiotik bakteri Gram negatif dan dapat menjadi resisten terhadap bakteri Gram negatif. Pengukuran zona bening pada antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin menghasilkan presentase kepekaan antibiotik yang berbeda-beda.

Resistensi yang terjadi pada antibiotik ampisilin sebesar 78%, Kloramfenikol 44%, Kanamisin 39%, Tetrasiklin 35% dan Oxytetrasiklin 30% dari hasil persentase uji kepekaan resistensi yang di dapatkan antibiotik Ampisilin merupakan antibiotik yang paling tinggi tingkat resistensinya terhadap bakteri Gram negatif yang diisolasi daru ruang perawatan inap H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan (Faisal 2015) pada Uji Kepekaan Bakteri Yang Diisolasi Dan Diidentifikasi Di Rsup Prof Dr. R. D. Kandou Manado Terhadap Antibiotik Golongan Sefalosporin (Sefiksim), Penisilin (Ampisilin) dan Tetrasiklin (Tetrasiklin) yang menunjukkan antibiotik ampisilin memiliki tingkat resistensi yang tidak jauh berbeda yaitu 100%. Resistensi terhadap antibiotik ini disebabkan karena antibiotika ini merupakan antibiotik lini pertama. Antibiotik lini pertama merupakan antibiotik yang pertama kali dipakai untuk mengobati suatu infeksi. Pemakaian antibiotik yang irasional juga menyebabkan tingginya tingkat resistensi terhadap antibiotik ini (Depkes RI, 2005).

Pada hasil persentase tingkat sensitif pada antibiotik Ampisilin sebesar 22%, Kloramfenikol 39%, Kanamisin 39%, Tetrasiklin 52% dan Oxytetrasiklin 35%.



Dari hasil yang diperoleh didapatkan Kloramfenikol dan Kanamisin yang memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fani, 2012), dimana didapati antimikroba yang mengalami resisten adalah first line drug yaitu Ampicillin, Amoxicillin, Sulfametoxazole, kanamicin, penicillin, Kloramfenikol dan Eritromycin. Yaitu dengan rentang 44,4% - 100%. Tetapi memiliki tingkat resisten yang sama yaitu antibiotik Kloramfenikol 44% dan Kanamisin 39%.

Pada antibiotik ampisilin tidak memiliki diameter zona intermedit, Kloramfenikol 17%, Kanamisin 22%, Tetrasiklin 13% dan Oxytetrasiklin 35%. Zona intermedit yang tertinggi terdapat pada antibiotik Oxytetrasiklin yang menunjukkan bahwa antibiotik tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram negatif dan dapat pula resisten terhadap bakteri Gram negatif.

Pengujian kepekaan antibiotik menggunakan Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin. Ampisilin merupakan derivat Penisilin yang merupakan kelompok antibiotik  $\beta$ -Laktam yang memiliki spektrum antimikroba yang luas. Ampisilin efektif terhadap mikroba Gram positif dan Gram negatif. Mekanisme kerja Ampisilin yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara menghambat pembentukan mikropeptida, karena sintesis dinding sel terganggu, maka bakteri tersebut tidak mampu mengatasi perbedaan tekanan osmosis di luar dan di dalam sel yang mengakibatkan bakteri mati. Pada uji kepekaan antibiotik bakteri Gram negatif antibiotik Kloramfenikol dilarutkan dalam aquadest steril dengan perbandingan 10 $\mu$ g/ml. Kloramfenikol digunakan sebagai antibiotik bersifat

bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas dan aktivitas antibakterinya bekerja dengan menghambat sintesis protein dengan jalan meningkatkan ribosom subunit 50S yang merupakan langkah penting dalam pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol termasuk dalam golongan antibiotik kloramfenikol.

Kanamisin merupakan golongan antibiotik aminoglikosida yang bersifat bakteriosidal yang dapat menghambat sintesis protein bakteri dengan aktivitas kerjanya yang sempit khususnya pada bakteri Gram negatif. Tetrasiklin merupakan agen antimikrobal yang memiliki spektrum aktivitas luas. Mekanisme kerjanya yaitu blokade terikatnya asam amino ke ribosom bakteri (sub unit 30). Aksi yang ditimbulkan adalah bakterostatik yang termasuk golongan antibiotik poliketida. Oxytetrasiklin termasuk dalam turunan Tetrasiklin yang bersifat bakteriostatik dan bakteriosidal dalam dosis yang tinggi serta dapat menghambat sintesis protein pada bakteri yang juga memiliki spektrum aktivitas kerja yang luas.

Mekanisme antibiotik Ampisilin golongan  $\beta$ -laktam merupakan salah satu mekanisme timbulnya resisten terhadap bakteri Gram negatif dengan memproduksi enzim  $\beta$ -laktamase. Enzim ini dapat memecah cincin  $\beta$ -laktam, sehingga antibiotik tersebut menjadi tidak aktif.

Resistensi terhadap antibiotik Kloramfenikol mayoritas disebabkan oleh adanya enzim yang menambahkan gugus asetil kedalam antibiotik. Kloramfenikol yang terasetilasi tidak akan dapat terikat pada subunit 50s ribosom bakteri, sehingga tidak mampu menghambat sintesis protein. Bakteri yang resisten terhadap kloramfenikol memiliki plasmid dengan sebuah gen yang mengkode Kloramfenikol

asetiltransferase. Enzim ini menginaktivasi Kloramfenikol yang telah melewati membran plasma dan memasuki sel. Kloramfenikol asetiltransferase diproduksi secara terus menerus oleh kebanyakan bakteri Gram negatif.

Resistensi terhadap antibiotik Kanamisin yang termasuk kedalam golongan antibiotik Aminoglikosida menginaktivkan antibiotik dengan menambah group fosforil adenil atau asetil pada antibiotik. Pada bakteri Gram negatif modifikasi enzim Aminoglikosida berada di luar membran sitoplasma. Modifikasi dari antibiotik tersebut akan mengurangi transpor antibiotik ke dalam sel sehingga fungsi antibiotik akan terganggu.

Tipe resistensi yang penting terhadap Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin ini adalah perlindungan terhadap ribosom. Perlindungan ini diberikan oleh protein sitoplasma, bila protein sitoplasma ini muncul pada sitoplasma bakteri maka Tetrasiklin tidak akan mengikat pada ribosom. Tipe resistensi ini sekarang sudah diketahui secara luas pada beberapa bakteri patogen, termasuk bakteri-bakteri Gram-positif *mycoplasma* dan beberapa bakteri Gram-negatif seperti *Neisseria*, *Haemophilus*, dan *Bacteroides*. Tiga jenis kode genetik untuk tipe resisten ini adalah tetM, tetO, tetQ.

Bakteri yang resisten terhadap antibiotik merupakan masalah global, oleh karena itu penggunaan antibiotik yang tepat merupakan bagian dari pencegahan resistensi. Hasil penelitian (Suriaman, 2010) uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik yang berasal dari hasil kultur bakteri air dan udara ruang terhadap berbagai jenis antibiotik mengalami resistensi pada semua bakteri yang ditemukan dan telah terjadi

multidrug resistency (MDR) terhadap semua antibiotik yang digunakan, karena resistensi ini terjadi lebih dari satu antibiotik.

Pemberian antibiotik yang berlebihan merupakan faktor resiko yang akan membuat bakteri mengalami mutasi dan menjadi resistensi. Menurut Peleg dan Hooper (2010) terdapat beberapa mekanisme resistensi antibiotika dari bakteri Gram negatif yang digunakan sebagai perlawanan terhadap antibiotik. Mekanisme tersebut adalah resistensi melalui penutupan celah atau pori (loss of porins) pada dinding sel bakteri sehingga menunjukkan jumlah obat yang melintasi membran sel, peningkatan produksi betalaktamase dalam periplasmik sehingga merusak struktur betalaktam, peningkatan aktivasi pompa keluaran (efflux pump) dalam trans membrane, sehingga bakteri akan membawa obat keluar sebelum memberikan efek, modifikasi enzim-enzim, sehingga antibiotika tidak dapat berinteraksi dengan tempat target, mutasi tempat target sehingga menghambat bergabungnya antibiotik dengan tempat aksi, modifikasi atau mutasi ribosomal sehingga mencegah bergabungnya antibiotik yang menghambat sintesis protein bakteri, mekanisme langsung terhadap metabolik (*metabolicbypass mechanism*), yang merupakan enzim alternative untuk melintasi efek penghambatan antibiotik (Syahrurahman, 2010).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bakteri Gram negatif yang resisten terhadap antibiotik Ampisilin, Kloramfenikol, Kanamisin, Tetrasiklin dan Oxytetrasiklin terdapat pada semua ruang perawatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle seperti Ruang Perawatan Asoka, Palembang dan Flamboyan.
2. Penelitian ini menunjukkan adanya *Multy Drug Resistency* (MDR) pada Ruang Perawatan Asoka kelas II, Asoka kelas III, Ruang Perawatan Palembang dan Ruang Perawatan Flamboyan tetapi tidak terdapat pada Ruang Perawatan Asoka kelas I.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak Rumah Sakit agar menggunakan antibiotik secara berhati-hati dan sesuai dosis serta dalam penanganan medis karena resistensi antibiotik tidak hanya resistensi terhadap satu antibiotik tetapi lebih dari satu antibiotik dan mengakibatkan terjadinya *Multy Drug Resistency* (MDR).
2. Kepada penelitian selanjutnya mengidentifikasi genus bakteri agar dapat diketahui jenis bakteri yang resisten terhadap antibiotik dan menggunakan antibiotik yang lebih banyak serta tidak menggunakan antibiotik yang sudah diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Tahir. “*Lingkungan Fisik dan Angka Kuman Udara Ruangan di Rumah Sakit Umum Haji Makassar, Sulawesi Selatan*”. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 5, No. 5. 2011
- Ade, Feni. “*Profil Resistensi Antimikroba Terhadap Flora Normal Dicavum Nasi Pada Petugas Dikamar Operasi Bedah Jantung Dan Petugas Post Operasi Intensive Care Unit Jantung Rsup H. Adam Malik Medan*”. Program Magister Kedokteran Klinik Ilmu Patologi Klinik Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Usu. 2012
- Adikoesoemo. “*Manajemen Rumah Sakit*”, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2010
- Ambrose, P.G., Owens, R.C. *Quintiliani, R. Antibiotic Use in the Critical Care Unit. Critical Care Clinics. 14:283-308. 1998*
- Andif. “*Gunakan Antibiotika dengan Bijak agar Tidak Resisten*”. DagusibObat. 2013
- Bhavnani, S.M. *Antimicrobial Use and Resistance: Need for Continuing Surveillance. Pharmaguide to Clinical Medicine. 11(5):1-7. 1999*
- Boel, Trelia, *Pseudomonas aeruginosa*, [http:// library.usu.ac.id](http://library.usu.ac.id). 2004
- Budiarti, Y.L., Noormuthmainah dan Rahmiati. *Jenis Bakteri dan Jamur Kontaminan Udara di Ruang Perawatan Sub Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru. Jurnal Kedokteran. 15(1): 41-48. 2007*
- Ducel G, Fabry J, Nicolle L, penyunting. *Prevention of hospital-acquired infections, a practical guide. Edisi ke-2. Malta : World Health Organization; 2002. h. 1-3. [disitasi 21 Januari 2009]. Tersedia dari : www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph2002.pf.*
- Chun, min lee. *High Prevalence Rate Of Multidrug Resistance Among Nosocomial Pathogens In The Respiratory Care Center Of A Tertiary Hospital. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. 2009*

- Depkes RI. *Buku Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit (Konsep Dasar dan Prinsip)*. Direkur Jendral Pelayanan Medik. Jakarta. 2001
- Dwiprahasto, iwan. *Kebijakan Untuk Meminimalkan Risiko Terjadinya Resistensi Bakteri Di Unit Perawatan Intensif Rumah Sakit*. JMPK Vol. 08/No.04. 2005
- Edwin. *Materi Kuliah Mikrobiologi*. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru. Kalimantan Selatan. 2011
- Faisal, Myhammad. Uji Kepekaan Bakteri Yang Diisolasi Dan Diidentifikasi Dari Rsup Prof Dr. R. D. Kandou Manado Terhadap Antibiotik Golongan Sefalosporin (Sefiksim), Penisilin (Amoksisilin) Dan Tetrasiklin (Tetrasiklin). *Jurnal Ilmiah Farmasi*. Vol : 4. 2015
- Fauziah, Sitti. “*Pola Bakteri Dan Resistensinya Terhadap Antibiotik Yang Ditemukan Pada Air Dan Udara Ruang Instalasi Rawat Khusus Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*”. *Jurnal Farmasi dan Farmakologi* Vol.16, No.2 – ,hlm. 73 – 78. 2012
- Febiana, Tia. “*Kajian Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Di Bangsal Anak Rsup Dr. Kariadi Semarang Periode Agustus-Desember 2011*”. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro : 2012
- Fridkin, S.K., Gaynes, R.P. *Antimicrobial resistance in intensive care units*. *Clin Chest Med*. 20:303-16. 1999
- Guillemot, Didier. *Antibiotic use in humans and bacterial resistance*. *Current Opinion in Microbiology*. 2:494–498. 1999
- Hospital Infections Program. *National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control. Intensive Care Antimicrobial Resistance Epidemiology (ICARE) surveillance report, data summary fro January 1996 through December 1997*. *Am J Infect Control*. 27:279-84. 1999
- Jawetz. *Mikrobiologi Kedokteran*. EGC. Jakarta. 1996

- Mikrobiologi Kedokteran. Penerjemah dan editor bagian Mikrobiologi FK Universitas Airlangga, Salemba Medika, Jakarta. 2005
- Kadarwati U. *Pola resistensi kuman kokus terhadap enam jenis antibiotika di wilayah Jakarta Timur*. Cermin Dunia Kedokteran. Jakarta, 1989; 56: 45–48.
- Kee JL, Hayes ER. *Pharmacology: a Nursing Process Approach*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. h. 324-327. 1996
- Krumperman, Paul. “Meneliti Multiple Antibiotic Resistance Indexing Of Escherichia Coli To Identify High-Risk Sources Of Fecal Contamination Of Foods. *Applied And Environmental Microbiology* : Vol 46 : 1983
- Mayasari, Evita, *Pseudomonas aeruginosa; Karakteristik, Infeksi, dan Penanganan*, <http://library.usu.ac.id>. 2006
- Mitrea, LS. *Pharmacology*. Canada: Natural Medicine Books. 2008. h. 53.
- Mpila, Deby. Afriani. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Mayana ( Coleus atropurpureus [L] Benth) terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa Secara In Vitro*. [Skripsi]. Universitas Sam Ratulangi, Manado. 2012
- National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS). “*Data Summary From January 1992 Through June 2004, Issued October 2004*. AJIC special article NNIS report
- Neal, Michael J. *Medical Pharmacology At a Glance*. Edisi 5. Penerbit Erlangga. h. 81 : 2006
- Nurmaini, S.C.I. *Faktor-Faktor Kesehatan Lingkungan Perumahan Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita di Perumahan Nasional (Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. *Majalah Kedokteran Nusantara*. 38(3): 230-234. 2005



- Ozkurt Z, dkk. *Changes in antibiotic use, cost and consumption after an antibiotic restriction policy applied by infectious disease specialists*. Jpn J Infect Dis. 2005 ; 58:338-43.
- Pelczar, M. J., Chan, E.C.S. *Elements of Microbiology*. Mc Graw Hill Book Company. New York. 2007
- , *Dasar-dasar Mikrobiologi Jilid 2*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1988
- Polk, R. *Optimal Use of Modern Antibiotics: Emerging Trends*. Clin Infect Dis. 29:264- 74. 1999
- Radji, Maksum, dkk. “*Pola Kepekaan Kuman Terhadap Antibiotika Di Ruang Rawat Intensif Rumah Sakit Fatmawati Jakarta*”. Jurnal Makara, Kesehatan, Vol. 8, No. 2 : 41-48. 2014
- Rapani, A. *Kejadian Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit*. [serial on Internet]. [diakses 21 Desember 2006]. Available from: <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/104>. 2010
- Rudolph AM. *Rudolph's Pediatrics, 21st edition*. New York: McGraw-Hill. 2003
- Schiappa, D.A., Hayden, M.K., Matushek, M.G. *Ceftazidime-Resistant Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli Bloodstream Infection: a Case-Control and Molecular Epidemiologic Investigation*. J Infect Dis ; 174:529-36. 1996
- Sareong, Wasti. *Uji Efektivitas Ekstrak Kasar Alga Merah Eucheuma Cottonii Sebagai Antibakteri Terhadap Bakteri Patoge*. Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Makassar. 2005
- Setiabudy, A. *Antimikroba : Dalam Farmakologi dan Terapi*, Edisi 5(cetak Ulang Dengan Perbaikan, 2008). Balai penerbit FKUI, Jakarta. 2009

- Setyaningsih, Yuliani. “*Inventarisasi mikroorganisme udara dalam ruangan dengan sistem pendingin sentral*”. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Januari : 1998
- Shlaes, david. *Society for Healthcare Epidemiology of America and Infectious Diseases Society of America Joint Committee on the Prevention of Antimicrobial Resistance: Guidelines for the Prevention of Antimicrobial Resistance in Hospitals*. University of Chicago. 1997
- Soemirat, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1994
- Stringer, Janet L. *Basic Concepts in Pharmacology: a Student’s Survival Guide*. Edisi 3. (diterjemahkan oleh: dr. Huriawati Hartanto). Jakarta: Buku Kedokteran EGC. h. 186 – 199. 2006.
- Suriaman, E. Dan Juwita. *Uji Kualitas Air*, [diakses 17 April 2010].[http://www.icel.or.id/ uji\\_kualitas\\_air](http://www.icel.or.id/ uji_kualitas_air). 2008
- Suryawati, C. *Kepuasan Pasien Rumah Sakit (Tinjauan Teoritis dan Penerapannya Pada Penelitian)*. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang. 2004
- Syahrurahman, A., Chatim, A., Soebandrio, A., Santoso, Harun, H. Bela, B., dan Sujudi, *Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Penerbit Binarupa Aksara. 123-185. 2010
- U. Hadi, DO. Deurink, ES. Lestari, NJ. Nagelkerke, S. Werter, M. Keuter, et al. *Survey of antibiotic use of individual visiting public healthcare facilities in Indonesia* [internet]. 2008 [cited 2011 November 5]. Available from <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13821/03.pdf;jsessionid=DBED9A1D38747EBF2D64A500F2183E37?sequence=8>.
- Utama, Surya. “*Memahami Fenomena Kepuasan Pasien Rumah Sakit Referensi Pendukung Untuk Mahasiswa, Akademik, Pimpinan, Organisasi, Dan Praktisi Kesehatan*”.USU Digital Library : 2003
- Victor,D., Dennis, G.M., Ajita, M., Carlos, A. M., Hakan, L.,Francisco, H. 2008. *International Nosocomial Infection Control Consortium report, data*

*summery for 2002-2007, American Journal of Infection Control* [serial on the Internet], [diakses 09 Juni 2008]. Available from: <http://D:/Journal/abstractINICC, Victor, D, dkk.htm>

Vincent, J.L., Bihari, D.J., Suter, P.M. *The Prevalence of Nosocomial Infection in Intensive Care Units in Europe*. JAMA. 274: 639–44. 1995

Waluyo, L. *Mikrobiologi Umum*. Universitas Muhammadiyah Malang Press Malang. 2007

Wesetian, *Kewaspadaan Nosokomial, Yayasan Spritia*, [diakses pada tanggal 24 Desember 2006]. Available from: <http://Spritia.or.id/est/dok/kol.pdf>. 2006


-----, *Mikroorganisme di Udara* [monograph on the Internet], [diakses pada 20 Maret 2011]. Available from: <http://blog.unila.ac.id/wesetian>. 2010

World Health Organization. *WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance*. World Health Organization, 2001: 1–55

Yulika. “*Pola Resistensi Bakteri dan Mekanisme Resistensi Bakteri*”. Jurnal Kedokteran. Universitas Indonesia. 2009.

HASIL PENGAMATAN

KODE ISOLAT 01



KODE ISOLAT 02



KODE ISOLAT 24

RESISTEN : AM

RA KELAS II




KODE ISOLAT 01

KODE ISOLAT 10



KODE ISOLAT 05

KODE ISOLAT 17



RA KELAS III


KODE ISOLAT 05



KODE ISOLAT 12



KODE ISOLAT 1



KODE ISOLAT 19



KODE ISOLAT 22



RP KELAS III


KODE ISOLAT 04




KODE ISOLAT 07



KODE ISOLAT 17




KODE ISOLAT 19



KODE ISOLAT 27



KODE ISOLAT 32




RF KELAS I. II DAN III


KODE ISOLAT 9



KODE ISOLAT 10



KODE ISOLAT 13



RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar



Pengambilan Sampel



## Alat dan Bahan

### 1. Alat Penelitian



(Cawan Petri)



(Bunsen)



Gelas Kimia



*(Laminar Air Flow)*



(Hot Plate and Stirrer)



Autoklaf



Oven



Ose Bulat



Tabung Reaksi



Rak Tabung



Pipet Tetes



Pinset



Neraca Analitik



Gelas UKur



Inkubator Shaker





Mikro Pipet



Erlenmeyer



Isolat Bakteri Udara RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle



Paper Disk





Antibiotik Kloramfenikol



Antibiotik Kanamisin



Antibiotik Tetrasiklin



Antibiotik Oxytetrasiklin



Media NA



Aquadest

Alkohol 70





Media NB



Media NA bubuk

## BIOGRAFI



Penulis bernama lengkap Sri Wirastuti, lahir di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 06 Mei 1994 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu Hj. Syamsiar. Penulis bertempat tinggal di Jl. Poros Pa'bentengang Kab. Takalar Kec. Polut. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Panrannuangku 109 Kab. Takalar lulus pada tahun 2006, SMP Negeri 2 Takalar Kab. Takalar lulus pada tahun 2009, SMA Negeri 3 Takalar lulus pada tahun 2012 dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi tempatku untuk mendalami tentang kehidupan dalam Jurusan Sains Biologi.

Penulis juga aktif di dunia akademisi, penulis terlibat secara aktif di Program Asisten Praktikum Jurusan Biologi seperti Koordinator Praktikum Biologi Dasar, Asisten Praktikum biokimia, Asisten Praktikum Botani Lanjut di Jurusan Biologi.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia penelitian.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Resistensi Antibiotik Bakteri Gram Negatif Yang Di Temukan Di Udara Ruang RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar”**.