

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST SECTIO SESAREA PADA
NY'A' DI RSIA BAHAGIA
TAHUN 2016**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan]
Prodi Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

DINIATUL MUNAWARAH

70400113009

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 November 2016

Penulis



DINIATUL MUNAWARAH

NIM : 70400113009

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Diniatul Munawarah
Nim : 70400113009
Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan Post Sectio Sesarea pada
Ny' A di RSIA Bahagia Tahun 2016.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, November 2016

Pembimbing



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb
NIP : 19760126 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Sectio Sesarea pada Ny’A di RSIA Bahagia Tahun 2016”, yang disusun oleh Diniatul Munawarah, NIM: 70400113009, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 16 November 2016
15 Safar 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb (.....)

Pembimbing : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb (.....)

Penguji I : Rifqah Azizah As, S.Keb, Bd (.....)

Penguji II : Dra. Hj. Hartini, M.Hi (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukurku limpahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani serta akal fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Sectio Sesarea pada Ny'A " di RSIA Bahagia Tahun 2016".

salam serta shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammada SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, yang senantiasa menjadi suri tauladan dan membawa ajaran yang beitu sempurna. San penyebar kebaikan di muka bumi dengan kesabaran, usaha dan ketaatan Beliau kepada Allah SWT. Sehingga beliau bias membawa umat Islam ke masa yang penuh dengan cahaya ini. Beliau yang tidak pernah meninggalkan umatnya bahkan sampai ajal menjemput Beliau.

Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan arahan yang tak henti-hentinya dari dosen pembimbing yaitu ibu Dr. Hj. Sitti Saleha S,Si.T.,SKM.,M.Keb. oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, dan juga kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Musafir Pababbari, M.Si Selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.
2. Bapak Dr.dr.H Andi Armyn Nurdin, M.Sc Selaku dekan fakultas ilmu kesehatan beserta staf-stafnya.
3. Bunda Dr.Hj.Sitti Saleha,S,Si.T.,SKM.,M.Keb, selaku pembimbing KTI dan Ketua Prodi Kebidanan alauddin Makassar.
4. Bapak Drs.H.A Sumange Alam, Msi, selaku direktur RSIA BAHAGIA beserta staf-stafnya yang memberikan ijin dalam penelitian hingga akhir.
5. Ibu Rifkah Azizah As. S.keb Bd selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bunda Dra. Hj. Hartini, M.Hi selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama pendidikan.
8. Bapak Rusnainin dan Ibu Jumriati tersayang, terimakasih atas kasih sayang serta doa tulus ikhlas yang kalian berikan kepadaku. Tak pernah sedikitpun kata keluhan dan sesalan terucap di bibir manis kalian dalam mencukupi semua kebutuhanku, baru ini yang bisa

saya persembahkan buat semua yang telah kalian berikan dan korbankan untukku.

9. Keluarga besarku yang selalu memberi nasehat dan harapan besar yang ditanam dalam diriku menjadi semangat buatku.
10. Sahabatku, sekaligus teman sperjuanganku, Umrah, Fatma, Erni, Anggun, Sri Ratu, kanda Rahmat Hidayat, kanda Agus Salim, yang slalu mendukungku, dan semua sahabat-sahabat kebidanan Kelas A.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmia ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah. Semoga apa yang dikerjakan penulis selama ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Gowa, 16 November 2016

Penulis

Diniatul Munawarah
Nim: 70400113009

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PNGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	1
C. Tujuan Penulisan.....	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas.....	11
1. Pengertian Masa Nifas.....	11
2. Tujuan Masa Nifas dan Menyusui.....	11
3. Periode Masa Nifas	12
4. Peran Bidan Pada Masa Nifas	13
5. Perubahan fisiologis Masa Nifas post sectio searea	14
6. Perubahan Psikologis Masa Nifas	17
7. Kebutuhan dasar ibu masa nifas	22
8. Program Tinadak Lanjut Asuhan Masa Nifas	29

9. Tinjauan al-quran dan hadist tentang nifas	30
B. Tinjauan Tentang Air Ketuban	35
1. Fisiologi air ketuban	35
2. Fungsi air ketuban	37
3. Keadaan normal air ketuban	38
C. Tinjauan tentang Ketuban Pecah Dini	38
1. Pengertian KPD	38
2. Macam-macam KPD	40
3. Etiologi	40
4. Mekanisme pecahnya selaput ketuban	41
5. Tanda dan gejala	42
6. Diagnosa	43
7. Pemeriksaan penunjang	45
8. Komplikasi	46
9. Pengaruh Ketuban Pecah Dini	47
10. Penatalaksanaan KPD	48
11. Tinjauan islam tentang ketuban Pecah Dini	50
D. Sectio sesarea.....	55
1. Definisi sectio sesarea.....	55
2. Jenis-jenis sectio sesarea.....	56
3. Indikasi sectio sesarea.....	56
4. Kontraksi indiksi sectio sesarea.....	59
5. Tehnik sectio sesarea.....	60
6. Komplikasi.....	62
7. Faktor resiko persalinan sectio sesarea.....	63

8. Perawatan post operasi.....	65
E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	70
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	70
2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan	70
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)	88
BAB III. STUDI KASUS.....	90
Langkah I. Identifikasi data dasar	90
Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual.....	97
Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah potensial	104
Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi.....	104
Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	105
Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan.....	108
Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	110
Pendokumentasian.....	112
BAB IV: PEMBAHASAN.....	126
BAB V: PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa nifas atau masa puerperium adalah periode waktu selama 6-8 minggu setelah persalinan. Proses ini dimulai setelah selesainya persalinan dan berakhir setelah alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil/tidak hamil sebagai akibat dari adanya perubahan fisiologi dan psikologi karena proses persalinan (Saleha, 2013 hal:4)

Menurut World Health Organization (WHO) memperkirakan setiap tahun terjadi 210 juta kehamilan diseluruh dunia. Dari jumlah ini 20 juta perempuan mengalami kesakitan sebagai akibat kehamilan, sekitar 8 juta mengalami komplikasi yang mengancam jiwa dan lebih dari 50% terjadi di negara-negara Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia. Dari data ini disebutkan bahwa kematian ibu disebabkan karena komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas misalnya infeksi, eklamsi, perdarahan, emboli air ketuban, trauma anestesi, trauma operasi dan lain-lain. Infeksi yang banyak dialami oleh ibu sebagian besar merupakan akibat dari adanya komplikasi atau penyulit kehamilan seperti demam (24%), infeksi saluran kemih (31%), dan ketuban pecah dini (45%) (BKKBN, 2013).

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan merupakan masalah yang menjadi prioritas dibidang kesehatan. Menurut Survey Demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 kembali mencatat

Angka Kematian Ibu (AKI) yang signifikan yaitu dari 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kematian maternal telah lama digunakan sebagai indikator penting yang memberikan petunjuk mengenai tingkat kesehatan wanita yang berhubungan dengan perilaku reproduksi. Diperkirakan setiap tahunnya kematian maternal 99% diantaranya terjadi di negara sedang berkembang (Kemenkes.RI,2013).

Data yang didapatkan dari profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011, jumlah angka kematian ibu (AKI) berkisar 116 orang yang disebabkan oleh perdarahan 55 orang (47,41%) hipertensi dalam kehamilan 25 orang (21,55%) infeksi 2 orang (1,72), abortus 3 orang (2,58%), dan penyebab lainnya 31 orang (26,72%). Angka kematian bayi (AKB) mencapai 678 orang, yang disebabkan oleh BBLR 208 orang (30,68%). Asfiksia 234 orang (34,51%), tetanus 4 orang (0,59%), infeksi 22 orang (3,24%), dan lain-lain 210 orang (30,97%) (profil Kesehatan Sulawesi Selatan, 2011).

Ketuban Pecah Dini (KPD) yakni mulai pecahnya ketuban sampai 1 jam setelah ketuban pecah dini terjadi di atas usia kehamilan 37 minggu, sedangkan di bawah 36 minggu tidak terlalu banyak. Ketuban pecah dini merupakan masalah yang kontroversi dalam obstetri yang berkaitan dengan penyebabnya. Kejadian KPD biasanya terjadi secara mendadak sehingga kemungkinan dapat berisiko infeksi pada ibu dan kematian janin. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi KPD adalah

dengan cara operasi caesar. Dalam hal ini komplikasi dapat terjadi pada post sectio caesaria diantaranya: perdarahan, infeksi dan tromboemboli, kematian ibu, kerusakan organ seperti vesika urinaria, solusio plasenta, plasenta previa, dan ruptur uteri.

Sectio sesarea merupakan cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding depan uterus melalui dinding depan perut. Sectio sesarea juga di artikan sebagai pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus atau insisi transabdominal uterus(Umi Solikhah, 2011).

Menurut WHO (World Health Organization), standar rata-rata Sectio sesarea di sebuah negara adalah sekitar 5–15%. namun di Inggris tahun 2008 sampai 2009 angka sectio sesarea mengalami peningkatan sebesar 24,6 % yang pada tahun 2004 sekitar 24,5 % dan di Australia tahun 2007 terjadi peningkatan 31% yang pada tahun 1980 hanya sebesar 21% (Afriani, 2012)

Di Indonesia sectio sesarea umumnya dilakukan bila ada indikasi medis tertentu, sebagai tindakan mengakhiri kehamilan dengan komplikasi. Selain itu sectio sesarea juga menjadi alternative persalinan tanpa indikasi medis karena dianggap lebih mudah dan nyaman. Sectio sesarea sebanyak 25% dari jumlah kelahiran yang ada dilakukan pada ibu-ibu yang tidak memiliki resiko tinggi untuk melahirkan secara normal maupun komplikasi persalinan lain (Depkes, 2012).

Di Indonesia angka kejadian *sectio sesarea* mengalami peningkatan pada tahun 2000 jumlah ibu bersalin dengan *sectio sesarea* 47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19%, tahun 2002 sebesar 47,13%, tahun 2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 53,2%, tahun 2005 sebesar 51,59%, dan tahun 2006 sebesar 53,68% dan tahun 2007 belum terdapat data yang signifikan, tahun 2009 sebesar sekitar 22,8% (Karundeng dkk, 2014). Survei Nasional pada tahun 2009, 921.000 persalinan dengan *secti* dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluruh persalinan (Karundeng dkk 2014).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Suryati Tati (2012) bahwa angka tindakan operasi *sesarea* di Indonesia sudah melewati batas maksimal standar WHO yaitu 5-15%. Berdasarkan data RIKESDAS tahun 2010 tingkat persalinan *sectio sesarea* di Indonesia 15,3% sampel dari 20.591 ibu yang melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang diwawancarai di 33 provinsi. Gambaran adanya faktor resiko ibu saat melahirkan atau di operasi *sesarea* adalah 13,4%, karena ketuban pecah dini 5,49%, preeklampsia 5,14%, perdarahan 4,40% karena jalan lahir tertutup 2,3% karena rahim sobek (Karundeng dkk, 2014).

Data yang diperoleh dari rekam medik RSIA Bahagia pada tahun 2014 jumlah ibu nifas 423 orang dan jumlah ibu yang mengalami *Sectio Sesarea* dengan indikasi ketuban pecah dini adalah 13 orang. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah ibu nifas adalah 814 orang dan yang mengalami *Sectio Sesarea* dengan indikasi ketuban pecah dini 43 orang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dan termotivasi untuk menyusun laporan karya tulis ilmiah berjudul Manajemen Asuhan Kebidanan post Sectio Sesarea pada Ny'A' di RSIA Bahagia di ruang nifas

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam penulisan proposal KTI meliputi: Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Sectio Sesarea pada Ny'A' di RSIA Bahagia

C. Tujuan Penulis

1. Tujuan umum

Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu post section sesarea pada Ny'A' berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan di RSIA Bahagia sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a) Melaksanakan pengkajian dan analisa data dasar pada ibu post section sesarea pada Ny'A' di RSIA Bahagia
- b) Mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial pada ibu post sectio sesarea pada Ny'A' di RSIA Bahagia
- c) Melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi pada ibu post sectio sesarea di RSIA Bahagia
- d) Menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu post sectio pada Ny'A' di RSIA Bahagia.

- e) Melaksanakan asuhan tindakan asuhan kebidanan pada ibu post sectio sesarea pada Ny'A' di RSIA Bahagia
- f) Mengevaluasi asuhan kebidanan pada ibu post section sesarea pada Ny'A' di RSIA Bahagia
- g) Mendokumentasikan asuhan kebidanan pada ibu post sectio sesarea Pada Ny'A' di RSIA Bahagia

D. Manfaat Penulisan

1. Instansi

Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Intitusi

Sebagai bahan ilmiah atau bahan bacaan untuk penulisan berikutnya.

3. Penulis

Dapat memperluas wawasan keilmuan dan menjadi sarana pengembangan diri melalui penulisan karya tulis ilmiah dan merupakan pengalaman berharga bagi penulis.

E. Metode Penulisan

Metode yang di gunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini adalah

1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan membaca buku buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan Sectio Sesarea dan ketuban pecah dini

2. Studi kasus

Dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam asuhan kebidanan yang meliputi: pengkajian data dan analisa data dasar, mengidentifikasi diagnosa/masalah aktual, mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera kolaborasi, menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan, mengevaluasi asuhan kebidanan serta mendokumentasikan asuhan kebidanan serta mendokumentasikan asuhan kebidanan, untuk menghimpun data dan informasi dan pengkajian di lakukan dengan menggunakan tehnik:

a. Anamnesa

Mengadakan tanya jawab dengan ibu dan petugas di ruang post natal yang berhubungan dengan ketuban pecah dini

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik di lakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

c. Studi dokumentasi

Dengan membaca dan mempelajari serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan, baik bersumber dari catatan dokter, bidan maupun sumber lain yang menunjang.

- d. Diskusi dengan tenaga kesehatan yakni dokter, bidan maupun pembimbing karya tulis ilmiah serta sumber lain yang menunjang.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Ruang Lingkup Pembahasan

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum
2. Tujuan Khusus

D. Manfaat Penulisan

E. Metode Penulisan

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian Masa Nifas
2. Tujuan Asuhan Masa Nifas
3. Periode Masa Nifas
4. Peran Bidan Pada Masa Nifas
5. Perubahan Fisiologis Masa Nifas
6. Perubahan Psikologis Masa Nifas

7. Kebutuhan Dasar Ibu Masa Nifas
 8. Kebijakan Program Nasional Masa Nifas
 9. Tinjauan Al-qurqan dan Hadist Tentang Nifas
- B. TinjaunTentang Air Ketuban
1. Fisiologi Air Ketuban
 2. Fungsi Air Ketuban
 3. Keadaan Normal Air Ketuban
- C. Tinjauan tentang Ketuban Pecah Dini
1. Pengertian KPD
 2. Macam-Macam KPD
 3. Etiologi
 4. Mekanisme Pecahnya Selaput Ketuban
 5. Tanda dan Gejala
 6. Diagnosa
 7. Pemeriksaan Penunjang
 8. Komplikasi
 9. Pengaruh Ketuban Pecah Dini
 10. Penatalaksanaan KPD
 11. Tinjauan Islam Tentang Ketuban Pecah Dini
- D. Sectio Sesarea
- E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

BAB III STUDI KASUS

- A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar
- B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual
- C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial
- D. Langkah IV : Tindakan Emergency / Kolaborasi
- E. Langkah V : Rencana Tindakan / Intervensi
- F. Langkah VI : Implementasi
- G. Langkah VII : Evaluasi
- H. Pendokumentasian (SOAP)

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab ini membandingkan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan dan praktek yang di laksanakan di RSIA Bahagia dalam menangani post sectio sesarea dengan kasus ketuban pecah dini

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas (puerperium) adalah masa nifas setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Saleha, 2013 hlm : 4).

Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu. Masa nifas merupakan masa setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali keadan tidak hamil yang normal(Marmi,2012).

2. Tujuan Masa Nifas Dan Menyusui

1. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis.
2. Melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi.
3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari.
 - 1) Memberikan pelayanan Keluarga Berencana(KB).

- 2) Mendapatkan kesehatan emosi (Dewi Maritalia, 2012:hal 12).

3. Periode Masa Nifas

- 1) Periode immediate postpartum

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan karena atonia uteri, oleh karena itu, bidan dengan teratur harus melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lochia, tekanan darah, dan suhu.

- 2) Periode early postpartum (24 jam-1 minggu)

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lochia tidak berbau busuk, tidak demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik.

- 3) Periode late postpartum (1 minggu – 5 minggu)

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB (Sitti Saleha, 2013 : 6). Sedangkan periode masa nifas dalam buku Bahiyatun 2013 di bagi dalam tiga periode yaitu:

- 1) Puerperium dini, yaitu kepulihan ketika ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan.
- 2) Puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia.

- 3) Remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna mungkin beberapa minggu, bulan, atau tahun.

4. Peran Bidan pada Masa Nifas

Bidan memiliki peran sangat penting dalam pemberian asuhan post partum. Adapun peran dan tanggung jawab dalam masa nifas antara lain:

- 1) Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas.
- 2) Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga.
- 3) Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman.
- 4) Membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi.
- 5) Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
- 6) Memberikan koseling untuk ibu dan keluarganya cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik serta mempraktekan kebersihan yang aman.
- 7) Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta untuk melaksankannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah

komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas.

8) Memberikan asuhan secara profesional (Reni Haryani, 2012, hal 5).

5. Perubahan-Perubahan Masa Nifas Post Sectio Sesarea

a. Tanda vital

Perubahan fisiologis pada tanda-tanda vital adalah :

1) Suhu badan

Suhu rektal pada suhu 24 jam pertama setelah melahirkan 37,5- 38 °C, pada hari kedua atau ketiga dapat terjadi kenaikan suhu, namun tidak lebih dari 24 jam. Pemeriksaan suhu badan post Sectio sesarea dilakukan tiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit sekali pada jam selanjutnya.

2) Denyut nadi

Nadi berkisar antara 60-80 kali permenit. Pada masa nifas umumnya denyut nadi lebih labil dibandingkan dengan suhu badan. Frekuensi denyut nadi pada pasien post Sectio sesarea dicatat setiap setengah jam untuk 2 jam pertama, lalu setiap jam untuk 2 jam berikutnya dan kemudian setiap 4 jam (Medforth, 2012). Denyut nadi yang cepat dapat disebabkan oleh infeksi.

3) Tekanan darah

Tekanan darah pada post Sectio Caesar harus diperhatikan, tekanan darah normal antara 110-120 mmHg. Pemeriksaan

tekanan darah post sectio sesarea pada pasien post sectio sesarea dicatat setiap setengah jam untuk 2 jam pertama, lalu setiap jam untuk 2 jam berikutnya dan kemudian setiap 4 jam (Medforth, 2012).

4) Suhu tubuh

Suhu tubuh normalnya 35,5 C - 37 C pada pasien post sectio sesarea dicatat setiap setengah jam untuk 2 jam pertama, lalu setiap jam untuk 2 jam berikutnya dan kemudian setiap 4 jam (Medforth, 2012).

5) Respirasi

Pemeriksaan respirasi yang pertama adalah pastikan jalan nafas bersih dan cukup ventilasi. Respirasi padawanita post sectio sesarea, selama tidak memiliki penyakit pernafasan akan kembali normal dengan cepat berkisar 18-20x/menit (Mochtar, 2012). Observasi setiap setengah jam pada dua jam pertama. Bila tanda vital stabil observasi dilanjutkan setiap satu jam (Rasjidi, 2009).

b. Alat reproduksi

Perubahan-perubahan fisiologis pada alat-alat reproduksi yaitu :

1) Uterus

Selama 12 jam pertama paska partum, kontraksi uterus kuat dan teratur, ini berlanjut 2-3 hari berikutnya, meskipun frekuensinya dan

intensitasnya dikurangi faktor-faktor yang memperberat nyeri penyerta meliputi multipa, *overdstersi uterus* (Jotowiyono, 2010).

Pengeluaran lokea antara lain :

- a) Lochea rubra (*cruenta*) : berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel decidua, vernik caseosa, dan mekonium, selama 2 hari pasca persalinan.
- b) Lochea sanguelenta : berwarna merah kuning berisi darah dan lendir, hari ke 3-7 pasca persalinan.
- c) Lochea serosa : berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi pada hari ke 7-14 pasca persalinan.
- d) Loche alba : cairan putih, setelah 2 minggu.
- e) Lochea purulenta : terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk.
- f) Locheostasis : lochea tidak keluar lancar.

c. Ligamen-ligamen

Ligamen, fasia dan diafragma pelvis yang meregang pada waktu persalinan, setelah bayi lahir, setelah berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali sehingga tidak jarang uterus jatuh kebelalang dan menjadi retrofleksi, karena ligamentum rotundum menjadi kendur. Untuk memulihkan kembali sebaiknya dengan latihan-latihan (mobilisasi) post Sectio sesarea.

6. Perubahan Psikologi pada Masa Nifas

Perubahan psikologis sebenarnya sudah terjadi pada saat kehamilan. Menjelang persalinan, perasaan senang dan cemas bercampur menjadi satu. Perasaan senang timbul karena akan berubah menjadi seorang ibu dan segera bertemu dengan bayi yang telah lama dinanti-nantikan. Timbulnya perasaan cemas karena khawatir terhadap calon bayi yang akan dilahirkan, apakah bayi akan lahir sempurna atau tidak (Maritalia, 2012 : 30).

1. Adaptasi psikologis ibu dalam masa nifas.

Wanita hamil akan mengalami perubahan psikologis yang nyata sehingga memerlukan adaptasi. Perubahan mood seperti sering menangis, lekas marah, dan sering sedih atau cepat berubah menjadi senang merupakan manifestasi dari emosi yang labil. Proses adaptasi berbeda-beda antara satu ibu dengan ibu yang lainnya. Pada awal kehamilan ibu beradaptasi menerima bayi yang di kandungnya sebagai bagian dari dirinya. Perasaan gembira bercampur dengan kekhawatiran dan kecemasan menghadapi perubahan peran yang sebentar lagi akan dijalani.

Beberapa faktor berperan dalam penyesuaian ibu antara lain :

- a. Dukungan keluarga dan teman.
- b. Pengalaman waktu melahirkan, harapan dan aspirasi.
- c. Pengalaman merawat dan membesarkan anak sebelumnya.

Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa nifas adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi yang memengaruhi untuk sukses dan lancarnya masa transisi menjadi orang tua.
- b. Respon dan dukungan dari keluarga dan teman dekat.
- c. Riwayat pengalaman hamil dan melahirkan sebelumnya.
- d. Harapan, keinginan dan aspirasi ibu saat hamil juga melahirkan (Saleha, 2013 : 63).

Fase-fase yang akan dialami ibu pada masa nifas yaitu:

1) Taking in period

Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat bergantung pada orang lain, fokus perhatian terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu makan meningkat.

2) Taking hold period

Berlangsung 3-4 hari postpartum, ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap bayi. Pada masa ini ibu menjadi sangat sensitif, sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat untuk mengatasi kritikan yang dialami ibu.

3) Letting go period

Dialami setelah ibu dan bayi tiba dirumah. Ibu mulai secara penuh menerima tanggung jawab sebagai "seorang ibu" dan menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya.

2. Postpartum blues (baby blues)

Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut dengan baby blues, yang disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil, sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan.

Penyebab yang menonjol adalah :

- a. Kekecewaan emosional yang mengikuti rasa puas dan takut yang dialami kebanyakan wanita selama kehamilan dan persalinan.
- b. Rasa sakit pada masa nifas.
- c. Kelelahan karena kurang tidur selama persalinan.
- d. Kecemasan ketidak mampuan merawat bayi setelah pulang dari rumah sakit.
- e. Rasa sakit tidak menarik lagi bagi suami (Heryani,2012 : 51).

Perubahan yang ibu alami akan kembali secara perlahan setelah beradaptasi dengan peran barunya.

Gejala *Baby Blues* antara lain :

1. Menangis
2. Perubahan perasaan
3. Cemas
4. Kesepian
5. Khawatir dengan bayinya
6. Penurunan libido
7. Kurang percaya diri (Nugroho dkk, 2014 : 118).

3. Depresi Postpartum

Depresi merupakan gangguan efeksi yang paling sering dijumpai pada masa postpartum. Walaupun insidensinya sulit untuk diketahui secara pasti, namun diyakini 10-15% ibu yang melahirkan mengalami gangguan ini (Green dan Adams, 1993). Angka kejadian depresi post partum di indonesia sendiri juga belum dapat diketahui secara pasti hingga kini, mengingat belum adanya lembaga terkait yang melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.

Gejala ini timbul seperti halnya wanita mengalami proses menstruasi, dimana perubahan hormon mempengaruhi perilaku sang ibu.

Tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum adalah sebagai berikut :

- a. Perasaan sedih dan kecewa.
- b. Sering menangis.

- c. Merasa gelisah dan cemas.
- d. Kehilangan keterkaitan terhadap hal-hal yang menyenangkan.
- e. Nafsu makan menurun.
- f. Kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu.
- g. Tidak bisa tidur (insomnia).
- h. Perasaan bersalah dan putus harapan (hopeless)
- i. Penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat diperjelas.
- j. Memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya.

Penyebab depresi postpartum sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa hal yang dicurigai sebagai faktor predisposisi terjadinya depresi postpartum adalah sebagai berikut.

- a) Perubahan hormonal yang cepat. Hormon yang terkait dengan terjadinya postpartum adalah prolaktin, steroid, progesteron dan estrogen.
- b) Masalah medis dalam kehamilan seperti PIH (Pregnancy-Induced Hypertension), diabetes melitus, atau disfungsi tiroid.
- c) Riwayat depresi, penyakit mental, dan alkoholik, baik dalam diri ibu maupun keluarga.

- d) Karakter pribadi seperti harga diri rendah ataupun ketidakdewasaan.
- e) *Marital dysfunction* ataupun ketidakmampuan membina hubungan dengan orang lain yang mengakibatkan kurangnya support system.
- f) Marah dengan kehamilannya (*unwanted pregnancy*).
- g) Merasa terisolasi.
- h) Kelemahan, gangguan tidur, ketakutan terhadap masalah keluarga, dan melahirkan anak dengan kecacatan atau penyakit (Saleha, 2013 : 65-66).

7. Kebutuhan Dasar Ibu Masa Nifas

1. Nutrisi dan cairan

Pada masa nifas masalah diet perlu mendapatkan perhatian yang serius karena, dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Pada ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan gizi sebagai berikut:

- a. Menkomsumsi tambahan 500 kalori tiap hari
- b. Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral dan vitamin dan mineral yang cukup.
- c. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari

d. Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

Sebagai mana seruan dalam al-quran tentang makan-makanan yang halal dan baik yang sangat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani AL-quran surah AL-baqarah ayat: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahannya

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (Departemen Agama RI)

Mereka disini di perintahkan untuk bersyukur disertai dengan dorongan kuat yang tercermin pada penutup ayat 172 ini , yaitu *bersyukurlah kepada allah jika hanya benar-benar kepadanya kamu menyembah. Syukur* adalah mengakui dengan tulus bahwa anugrah yang di peroleh semata-mata bersumber dari Allah sambil menggunakannya sesuai tujuan penganugerahanya atau menempatkannya pada tempat semestinya. Setelah menekan perlunya makan makanan yang baik-baik, dijelaskannya makanan yang buruk, dalam bentuk redaksi yang mengesankan bahwa hanya

yang disebut itu yang terlarang, walau pada hakikatnya tidak demikian.

Jenis makanan halal dan haram dan juga cara mengkonsumsinya dengan benar, merupakan salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan karena memiliki pengaruh pada jasmani, jiwa, dan sifat-sifat seseorang. Makanan dapat membuat badan manusia sehat atau bahkan sakit. Makanan juga dapat mengantar manusia menuju kebahagiaan atau kesengsaraan. Oleh karena itu, para ulama terdahulu, sangat memperhatikan dan menjaga masalah ini.

2. Ambulasi

Ambulasi dini (early) ialah kebijaksanaan agar cepat mungkin bidan membimbing bangun dari tempatnya dan membimbing ibu secepat mungkin untuk berjalan.

Keuntungan early ambulasi adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan early ambulation
- 2) Faal usus dan kandung kemih lebih baik
- 3) Early ambulation memungkinkan kita mengajarkan ibu cara merawat anaknya selama ibu masih di rumah.
- 4) Menurut penelitian early amulation tidak mempunyai pengaruh yang buruk, tidak menyebabkan perdarahan yang abnormal, tidak memengaruhi penyembuhan luka episiotomi atau luka di

perut, serta tidak memperbesar kemungkinan prolaps atau retrotexto uteri.

3. Eliminasi

1) Buang air kecil

Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. Jika dalam 8 jam post partum belum dapat berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc maka dilakukan kateterisasi, akan tetapi kandung kemih penuh tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi. Sebab-sebab kesulitan berkemih:

- a) Berkurangnya tekanan intra abdominal
- b) Otot-otot perut lemah
- c) Edema dan uretra
- d) Dinding kandung kemih kurang sensitive

2) Buang air besar

Ibu post partum dapat buang air besar (defekasi) setelah hari kedua post partum. Jika hari ketiga belum juga BAB, maka perlu diberikan obat pencahar per oral atau per rektal. Jika setelah pemberian obat pencahar masih belum bisa BAB, maka dilakukan klisma (huknah).

3) Personal hygiene

Pada masa postpartum, seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, kebersihan diri sangat penting untuk mencegah

terjadinya infeksi. Kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sangat penting untuk tetap di jaga.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Kebersihan diri ibu postpartum adalah sebagai berikut:

- a. Anjurkan kebersihan seluruh tubuh, terutama perineum.
- b. Mengajarkan ibu bagaimana cara membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ibu mengerti untuk membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu dari depan kebelakang kemudian membersihkan di sekitar anus.
- c. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya dua kali sehari. Kain dapat di gunakan ulang jika di cuci dengan baik dan di keringkan dibawah matahari dan di setrika.
- d. Sarankan ibu untuk membersihkan tangan dengan sebelum dan sesudah membersihkan alat kelaminnya.
- e. jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah tersebut.

4. Istirahat dan tidur

- 1) Anjurkan ibu agar istirahat cepat untuk mencegah kelelahan berlebihan.

- 2) Sarankan kepada ibu untuk kembali pada kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur.
- 3) Kurang istirahat dapat memengaruhi ibu dalam beberapa hal:
 - a) Mengurangi jumlah ASI yang di produksi
 - b) Memperlambat involusi uteri dan memperbanyak perdarahan.
 - c) Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri.

5. Aktivitas seksual

Ibu post partum dapat melakukan hubungan seksual

- 1) Jika secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri dan ibu dapat memasukkan satu dua jari-jarinya kedalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai hubungan suami istri kapan saja ibu siap.
- 2) Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai masa waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Keputusan ibu bergantung pada pasangan yang bersangkutan.

6. Latihan dan Senam Nifas

Setelah persalinan terjadi involusi pada hampir seluruh organ tubuh wanita. Involusi ini sangat jelas terlihat pada alat-alat kandungan.

Sebagai akibat kehamilan dinding perut menjadi lembek dan lemas disertai adanya striae gravidarum yang membuat keindahan tubuh akan sangat terganggu. Oleh karena itu, mereka akan selalu berusaha untuk memulihkan dan mengencangkan keadaan dinding perut yang sudah tidak indah lagi. Cara untuk mengembalikan bentuk tubuh menjadi indah dan langsing seperti semula adalah dengan melakukan latihan dan senam nifas. Untuk itu beri penjelasan pada ibu tentang beberapa hal berikut ini.

- a. Diskusikan pentingnya otot-otot perut dan panggul agar kembali normal, karena hal ini akan membuat ibu merasa lebih kuat dan ini juga menjadikan otot perutnya menjadi kuat, sehingga mengurangi rasa sakit pada punggung.
- b. Jelaskan bahwa latihan tertentu beberapa setiap menit setiap hari sangat membantu.
- c. Dengan tidur terlentang dan lengan disamping, tarik otot perut selagi menarik napas, tahan napas dalam, angkat dagu ke dada, tahan mulai hitungan 1 sampai 5. Rileks dan ulangi sebanyak 10 kali.
- d. Untuk memperkuat tonus otot jalan lahir dan dasar panggul lakukanlah latihan keagel.
- e. Berdiri dengan tungkai dirapatkan. Kencangkan otot bokong dan pinggul, tahan sampai 5 hitungan. Relaksasi otot dan ulangi latihan sebanyak 5 kali.

- f. Mulai mengerjakan 5 kali latihan untuk setiap gerakan. Setiap minggu naikkan jumlah latihan 5 kali lebih banyak. Pada minggu ke 6 setelah persalinan ibu harus mengerjakan setiap gerakan sebanyak 30 kali (Sitti Saleha, 2013 : 73-76).

8. Program Tindak Lanjut Asuhan Masa Nifas di Rumah

Paling sedikit empat kali kunjungan masa nifas di lakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah yang terjadi(Juraida Roito, 2013).

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah perdarahan masa nifas karena atoni uteri. • Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. RUJUK bila pendarahan berlanjut. • Memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga mengenai bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. • Pemberian ASI awal. • Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir • mencegah bayi tetap dengan cara tetap mencegah hipotermia • jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal ibu dan bayi selama 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu dalam keadaan stabil

2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan involusio uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak perdarahan abnormal, dan tidak ada bau. • Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal • Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat. • Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-tanda penyulit. • Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, cara merawat tali pusat, dan bagaimana menjaga bayi agar tetap hangat.
3	2 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama seperti dengan 6 hari setelah persalinan
4	6 Minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> • Menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ibu atau bayi alami. • Memberikan konseling untuk KB secara dini

9. Tinjauan AL-Quran dan Hadist tentang Masa Nifas

Nifas secara bahasa menurut Madzhab Hanafi diambil dari akar kata tanaffus. Nafas (anak). Sedangkan dalam istilah, diartikan sebagai darah yang mengiringi kelahiran anak(Syahriar, 2012:5). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan “ Darah yang dilihat seorang wanita ketika merasa sakit adalah darah nifas “ Beliau tidak memberikan batasan dua atau tiga

hari. Istilah ‘sakit’ yang dimaksud yaitu rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan darah nifas. Jumhur ulama di dalamnya ada mazhab Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah dan sebagian dari pendapat ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa rentang waktu maksimal buat seorang wanita mengalami nifas adalah 40 hari.

Dalilnya adalah hadits berikut ini

يَوْمَ كَانَتْ النَّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَرْبَعِينَ

"Dari Ummu Slamah r.a berkata: para wanita yang mendapat nifas dimasa Rasulullah duduk selama empat puluh hari empat puluh malam (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy).

At-Tirmizi berkata setelah menjelaskan hadist ini : Bahwa para ahli ilmu dikalangan sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya sepakat bahwa wanita yang mendapat nifas harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari kecuali darahnya itu berhenti sebelum empat puluh hari. Bila demikian ia harus mandi dan sholat. Namun bila selama empat puluh hari darah masih tetap keluar kebanyakan ahli ilmu berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan sholatnya.

1. Pahala bagi wanita yang meninggal dunia dalam keadaan nifas

Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rosululloh Shalallohu Alaihi Wassalam bersabda “Apa saja yang kalian anggap mati syahid diantara kalian? ”para sahabat menjawab “Yaitu orang yang berperang dan terbunuh di jalan Allah Azza Wajallla, maka Rosululloh Shalallohu

Alaihi Wassalampun bersabda, “Jika demikian alangkah sedikitnya syuhada dari kalangan umatku, sesungguhnya orang yang mati terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati ditikam itu adalah syahid, orang yang mati karena sakit perut adalah syahid, dan wanita yang mati karena jam’u (wanita yang sedang nifas) adalah syahid”.

Dan dari Ubadah bin Shamit Radiyaallohu anhu, dari Nabi Shalallohu Alaihi Wassalam, bersabda :

“Terbunuh di jalan Allah adalah syahid, (mati) karena sakit perut adalah syahid, (mati) tenggelam adalah syahid, dan (wanita yang mati nifa)s adalah syahid “

Hukum-hukum yang bertalian dengan nifas

Larangan bagi wanita yang sedang nifas.

a) Berpuasa

Diharamkan bagi wanita nifas untuk berpuasa, meski ia memaksa untuk berpuasa maka sia-sia belaka puasanya. Dan jika pada bulan Ramadhan maka baginya untuk mengqadha puasanya sesuai dengan lamanya masa nifas tersebut.

b) Sholat

Wanita yang sedang nifas seperti halnya wanita haid haram untuk melakukan sholat tanpa harus meng-qadanya. Karena shalat tidak ada kewajiban untuk di qadha sebagai pengganti dari kesulitan yang dialaminya.

c) Bersenggama

Jika perempuan dalam keadaan nifas maka diharamkan melakukan jima' (bersenggama)

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat : 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahan :

Mereka bertanya kepadamu tentang mahidh. Katakanlah: "ia adalah gangguan". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri(Departemen Agama RI,2004).

Kata mahidh adalah tempat, atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Haid *adalah gangguan*. Maksudnya haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita. Juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit sering kali melihat perutnya akibat rahim berkontraksi. Disisi lain, kedatangan bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya

sering kali tidak terkontrol. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antara pasangan, apalagi dengan darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria, disamping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapaun disekeliling wanita. Sel telur pun, dengan datangnya haid, keluar serta belum ada gantinya sampai beberapa lama setelah wanita suci sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan seks tidak mungkin akan terjadi pada masa haid. *Oleh sebab itu* lanjut ayat diatas *hendaklah kamu menjauhkan diri wanita* dalam arti tidak bersetubuh, pada mereka mengalami haid; atau pada haid itu keluar. Ini berarti boleh mendekati asal bukan pada tempat haid. Nabi mengizinkan untuk bercumbu pada bagian atas, tidak di bagian bawah.

d) Memegang dan membaca mus'af Al Qur'an

Diharamkan bagi wanita yang sedang nifas memegang Al Qur'an. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT: "Tidak menyentuhnya (Al-Qur'an), kecuali hamba-hamba yang disucikan" (QS. Al Waqiah : 79)

e) Duduk dan berdiam di masjid

Pada hakekatnya hukum larangan bagi wanita nifas dan haid hampir sama. Dan wanita nifas dan haid dilarang berdiam diri di masjid.

(jangan pula kamu hampiri masjid) ketika kamu junub, kecuali sekedar lewat saja, sebelum kamu mandi” (Q.S. An-Nisa : 43)

f) Thalak

Seorang wanita yang sedang mengalami nifas atau haidh tidak boleh dicerai. Seseorang yang menceraikan istrinya yang sedang haidh atau nifas berarti ia telah melakukan perbuatan bid'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah :

“Dan cerailah mereka setelah mereka selesai masa iddahnya” (QS. Ath Thalaq : 1)

B. Tinjauan Tentang Air Ketuban

1. Fisiologi Air Ketuban

Ketuban merupakan ruangan yang di lapi selaput janin yang terdiri dari *amnion* dan *korion* yang merupakan selubung janin paling dalam. Selaput ketuban ini berfungsi membantu kelancaran serviks uteri dan menonjol melalui *ostium uteri ekseternum* pada saat persalinan

berlangsung. *Amnion* dan *korion* merupakan bagian dari cytotrophoblast yang memulai terbentuk pada hari ke 7-8 dari perkembangan mudigah.

Air ketuban disebut juga cairan amnion adalah cairan yang mengisi rongga amnion. Rongga amnion mulai terbentuk pada hari ke 10-12 setelah pembuahan. Volume cairan bias di taksir pada waktu pemeriksaan ultrasonografi sebagai normal, abnormal bertambah (*polihidromnion*), atau abnormal berkurang (*oligohidramnion*). Suatu cara semi-kuantitatif untuk menjelaskan volume cairan ketuban adalah dengan mempergunakan indeks cairan amnion. Indeks cairan ketuban dihitung dengan membagi rahim kedalam empat kuadran seperti yang dinyatakan oleh linea nigra dan pusat. Dalam setiap kuadran kantong vertical terbesar cairan ketuban yang bebas dari tali pusat dan bagian-bagian janin di ukur, dan keempat angka ini dijumlahkan. Sekalipun nilai normal cairan ketuban berbeda sesuai usia kehamilan, nilai-nilai 24 atau lebih besar dan 5 atau kurang selalu abnormal. Volume air ketuban pada kehamilan cukup bulan kira-kira 1000-1500ml, warna putih, agak keruh, agak amis, dan berasa manis. Reaksi agak alkalis atau netral, dengan berat jenis 1008 gram. Komposisinya terdiri atas 98% air, sisanya *albumin*, *urea*, *asam uric*, *kreatinin*, *sel-sel epitel*, *rambut lanugo* (rambut halus berasal dari bayi), *verniks kaseosa* (lemak yang meliputi kulit bayi), dan garam *anorganik*. Kadar protein kira-kira 2,6%

perliter, terutama *albumin*(Mulia, 2005 dalam penelitian Rismawati, 2011).

Dijumpainya lesitin dan sfingomielin dalam air ketuban amat berguna untuk mengetahui apakah paru-paru janin sudah matang, sebab peningkatan kadar lesitin merupakan tanda bahwa permukaan paru-paru (*alveolis*) diliputi oleh *zat surfaktan*. Ini merupakan syarat bagi paru-paru untuk berkembang dan bernafas. Cara penilaiannya adalah dengan jalan menghitung rasio L/S, bila persalinan berjalan lama atau gawat janin atau janin letak sungsang, maka akan kita warna air ketuban yang keruh kehijauan, karena telah tercampur dengan mekonium (kotoran pertama yang dikeluarkan bayi dan ymg mengandung empedu). Berat jenis likuor menurun dengan tuanya kehamilan berkisar antara 1025-1010 (Sofyan harahap, 2010 dalam penelitian Rismawati, 2011).

2. Fungsi Air Ketuban

- a. Proteksi: melindungi janin terhadap trauma dari luar.
- b. Mobilisasi: memungkinkan ruang gerak bagi janin.
- c. Homeostasis: menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan asam-basa (pH) dalam rongga amnion untuk suasana lingkungan yang optimal bagi janin.
- d. Mekanik: menjaga keseimbangan tekanan dalam seluruh ruangan intrauterine (terutama pada persalinan).

- e. Pada persalinan, membersihkan atau melicinkan jalan lahir dengan cairan steril sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi jalan lahir

3. Keadaan Normal Air Ketuban

- a. Pada usia kehamilan cukup bulan, volume 1000-1500 cc.
- b. Keadaan jernih agak keruh
- c. Steril
- d. Bau khas, agak manis dan amis
- e. Terdiri atas 98-99% garam;garam anorganik dan bahan organik (protein terutama albumin), runtunan rambut lanogo, verniks kaseosa, dan sel-sel epitel.
- f. Sirkulasi sekitar 500 cc/jam(Eni NUr Raahmawati, 2011 hal:127).

C. Tinjauan Tentang Ketuban Pecah Dini(KPD)

1. Pengertian

- a. ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan/sebelum inpartum, pada pembukaan <4 cm (fase laten). Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan(Taufan Nugroho, 2011 hal:1).
- b. Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) atau ketuban pecah dini (KPD) atau ketuban pecah premature (KPP) adalah keluarnya cairan

dari jalan lahir/vagina sebelum proses persalinan (Fadlu,2014 hal:113).

- c. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu di sebut ketuban pecah dini pada kehamilan premature. Dalam keadaan normal 8-10 % perempuan hamil aterm akan mengalami Ketuban pecah dini(Sarwono, 2014 hal:677).
- d. Ketuban pecah dini (KPD) atau ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) atau ketuban pecah premature (KPP) adalah keluarnya cairan dari jalan lahir/vagina sebelum proses persalinan(Eni Nur Rahmawati, 2011 hal :127).
- e. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan(Obstetrics,2013 hal:4).
- f. Ketuban pecah dini dapat diidefinisikan dengan keluarnya cairan mendadak disertai bau yang khas. Adanya kemungkinan infeksi dalam rahim dan persalinan prematuritas yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi(Nurul Jannah,2012 hal:189).
- g. Ketuban pecah dini adalah keluarnya cairan dari vagina setelah kehamilan berusia 22 minggu. Pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm(Saifuddin,2011 hal:M-112).

2. Macam-Macam KPD

- a. Ketuban pecah premature pada preterm yaitu pecahnya membrane chorio-amnionik sebelum onset persalinan pada kehamilan kurang dari 37 minggu(Eni Nur Rahmawati, 2011,hal :127).
- b. Ketuban pecah dini memanjang merupakan ketuban pecah dini yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan(dalam penelitian Muntoha,2013 hal:88).

3. Etiologi

Penyebab KPD masih belum diketahui dan tidak dapat di tentukan secara pasti. Beberapa laporan menyebutkan factor-faktor yang berhubungan erat dengan KPD, namun factor-faktor mana yang lebih berperan sulit di ketahui.

Kemungkinan yang menjadi factor predisposisinya adalah:

- 1) Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban biasa menyebabkan terjadinya KPD.
- 2) Serviks yang inkompetensi, kanalis servikalis yang selalu terbuka oleh karena kelainan pada serviks uteri (akibat persalinan, curetage)
- 3) Tekanan intra uterin yang meninggi atau meningkat secara berlebihan (overdistensi uterus) misalnya trauma, hidromnion, gemelli.

- 4) Trauma yang di dapat misalnya hubungan seksual, pemeriksaan dalam, maupun amniosintesis menyebabkan terjadinya KPD karena biasanya disertai infeksi
- 5) Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang dapat menghalangi tekanan terhadap membrane bagian bawah.
- 6) Keadaan social ekonomi
- 7) Factor lain:
 - a) Factor golongan darah, akibat golongan darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan
 - b) Termasuk kelemahan jaringan kulit ketuban.
 - c) Factor disproporsi antar kepala janin dan panggul ibu.
 - d) Faktor multi graviditas, merokok dan perdarahan antepartum.
 - e) Defisiensi gizi dari tembaga atau asam askorbat/vitamin c (Taufan Nugruho, 2011 hal:2).

4. Mekanisme Pecahnya Selaput Ketuban

Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh. Terdapat keseimbangan antara sintesis dan degradasi ekstraselular matriks. Perubahan struktur, jumlah sel, dan katabolisme kolagen

menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah.

Factor risiko untuk terjadinya ketuban pecah dini adalah:

- a. Berkurangnya asam askrobik sebagai komponen kolagen;
- b. Kekurangan tembaga dan asam askrobik yang berakibat pertumbuhan struktur abnormal karena antara lain merokok.

Degredasi kolagen dimediasi oleh matriks metaloproteinase (MMP) yang dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor protease. Mendekati waktu persalinan, keseimbangan antara MMP dan TIMP-1 mengarah pada degradasi proteolitik dari matriks ekstra seluler dan membrane janin. Aktivitas degradasi proteolitik ini meningkat menjelang persalinan. Pada penyakit periodontitis dimana terdapat peningkatan MMP, cenderung terjadi ketuban pecah dini. Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda. Pada trimester ketiga selaput ketuban mudah pecah. Melemahnya kekuatan selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Pada trimester akhir terjadi perubahan biokimia pada selaput ketuban. Pecahnya selaput ketuban pada kehamilan aterm merupakan hal yang fisiologis. Ketuban pecah dini pada premature disebabkan oleh adanya factor-faktor eksternal, misalnya infeksi yang menjalar dari vagina. Ketuban pecah dini premature sering terjadi pada

polihidromnion, inkompeten serviks, solusio plasenta(Sarwono,2014 hal: 678).

5. Tanda dan Gejala

- 1) Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina.
- 2) Aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah.
- 3) Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi bila anda atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “mengganjal”atau “menyumbat” kebocoran untuk sementara.
- 4) Demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi(Taufan Nugruho, 2011 hal:3).

6. Diagnosis

- 1) Secara klinik

Diagnosis ketuban pecah dini tidak sulit untuk di buat anamnesis. Pada klien dengan keluarnya air seperti urine dengan tanda-tanda yang khas sudah dapat menilai bahwa hal tersebut mengarah ke ketuban pecah dini. Untuk menentukan betul tidaknya ketuban pecah dini biasa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Adanya cairan yang berisi mekonium(kotoran janin), verniks kaseosa (lemak putih), rambut lanugo (bulu-bulu halus) dimana bila telah terinfeksi akan tercium bau.
 - b) Pemeriksaan inspekulo, lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban keluar dari kanalis servikalis pada bagian yang sudah pecah atau terdapat cairan ketuban pada fornix posterior.
 - c) USG volume cairan amnion berkurang/oligohomnion.
 - d) Terdapat infeksi genitalia (sistemik).
 - e) Gejala chorioamnionitis
- 2) Maternal
- Demam (dan Takikardia), uterin tenderness, cairan amnion yang keruh dan berbau, leukositis (peningkatan sel darah putih) meniggi, leukosit esterase (LEA) meningkat, kultur darah/urine.
- 3) Fetal
- Takikardia, kardiogram, profilbiofisik, volume cairan ketuban berkurang.
- 4) Cairan amnion
- Tes cairan amnion, di antaranya dengan *kultumgram stain*, fetal fibronectin, glukosa, leukosit esterase (LEA), dan sitokin. Jika terjadi chorioamnionitis, maka angka mortalitas neonatal 4x lebih besar, angka distress pernapasan, sepsis neonatal, dan perdarahan intravertikular 3x lebih besar.

a) Dilakukan tes valsava , tes nitrazin, dan tes fern.

Nilai normal pH cairan vagina adalah 4,5-5,5 dan normal pH cairan amnion 7,0-7,5.

b) Dilakukan uji kertas lakmus/tes nitrazine.

- Jadi biru (basa): air ketuban
- Jadi merah (asam) : urine (Fadlun, 2011 hal:114).

7. Pemeriksaan Penunjang

1. Pemeriksaan laboratorium

a) Cairan yang keluar dari vagina perlu di periksa: warna, konsentrasi, bau dan pH nya.

b) Cairan yang keluar dari vagina ini ada kemungkinan air ketuban, urine atau secret vagina.

c) Tes lakmus (tes nitrazin), jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban (alkalis). pH air ketuban 7-7,5, darah dan infeksi vagina dapat menghasilkan tes yang positif palsu.

d) Mikroskopik (tes pakis), dengan meneteskan air ketuban pada gelas objek dan di biarkan kering. Pemeriksaan mikroskopik menunjukkan gambaran daun pakis.

2. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

- a) Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum uteri.
- b) Pada kasus KPD terlihat jumlah cairan ketuban yang sedikit. Namun sering terjadi kesalahan pada penderita oligohidromnion (Taufan Nugruho, 2011 hal:6).

8. Komplikasi

- a. Komplikasi yang timbul akibat ketuban pecah dini bergantung pada usia kehamilan. Dapat terjadi infeksi maternal ataupun neonatal, persalinan premature, hipoksia karena kompresi tali pusat, deformitas janin, meningkatnya insiden seksio sesarea, atau gagalnya persalinan normal (Sarwono, 2014 hal:678)
- b. Komplikasi paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu adalah *sindrom distress* pernapasan, yang terjadi pada 10-40% bayi baru lahir.
- c. Resiko infeksi meningkat pada kejadian KPD
- d. Semua ibu hamil dengan KPD premature sebaiknya di evaluasi untuk kemungkinan terjadinya korioamnionitis (radang pada korion dan amnion).
- e. Selain itu kejadian prolaps atau keluarnya tali pusat dapat terjadi pada KPD
- f. Resiko dan kematian janin meningkat pada KPD preterm

g. *Hipoplasia* paru merupakan komplikasi fatal yang terjadi pada KPD preterm. Kejadiannya mencapai hampir 100% apabila KPD preterm ini terjadi pada usia kehamilan kurang dari 23 minggu(Nugroho, 2011 hal:7)

9. Pengaruh Ketuban Pecah Dini

Adapun pengaruh ketuban pecah dini terhadap ibu dan janin adalah:

1. Prognosis ibu

a) Infeksi intrapartal/dalam persalinan

Jika terjadi infeksi dan kontraksi ketuban pecah maka biasa menyebabkan sepsis yang selanjutnya dapat mengakibatkan meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas.

b) Infeksi puerperalis / masa nifas

c) Dry labour / partus lama

d) Perdarahan post partum

e) Meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya SC)

f) Morbiditas dan mortalitas maternal

2. Prognosis janin

a) Prematuritas

Masalah yang dapat terjadi pada persalinan premature diantaranya adalah respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of prematurity, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain

disorder (and risk of cerebral palsy), hyperbilirunemia, anemia, sepsis.

b) Prolaps funiculli/ penurunan tali pusat

c) Hipoksia dan asfiksia sekunder (kekurangan oksigen pada bayi).

Mengakibatkan kompresi tali puast, prolaps uteri, dry labour/partus lama, apgar score rendah, ensefalopaty, cerebral palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress.

d) Sindrom deformitas janin

Terjadi akibat oligohidromnion. Diantaranya terjadi hipoplasia paru, defomitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat (PJT).

e) Morbiditas dan mortalitas perinatal (Eni Nur Rahmawati,2011 hal:).

10. Penatalaksanaan KPD

Ketuban pecah dini termasuk dalam kehamilan berisiko tinggi. Kesalahan dalam mengelolah KPD akan membawa akibat meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayinya. Penatalaksanaan KPD masih dilema bagi sebagian besar ahli kebidanan. Kasus KPD yang cukup bulan, kalau segera mengakhiri kehamilan akan menaikkan insidensi bedah cesar, dan kalau menunggu persalianan spontan akan menaikkan insiden chorioamnionitis. Kasus KPD yang kurang bulan kalau menempuh cara-cara aktif harus di pastikan bahwa tidak akan

terjadi RDS, dan kalau menempuh cara konservatif dengan maksud memberikan waktu pematangan paru, harus bias memantau keadaan janin dan infeksi yang akan memperjelek prognosis janin. Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan tidak diketahui secara pasti segera dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk mengetahui umur kehamilan dan letak janin.

Resiko yang lebih sering pada KPD dengan janin kurang bulan adalah RDS dibandingkan dengan sepsis. Oleh karena itu pada kehamilan kurang bulan perlu evaluasi hati-hati untuk menentukan waktu yang optimal untuk persalinan. Pada umur kehamilan matang, choriamnionitis yang diikuti dengan sepsis pada janin merupakan sebab utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin.

Pada kehamilan cukup bulan, infeksi janin langsung berhubungan dengan lama pecahnya selaput ketuban atau lamanya periode laten.

Adapun penatalaksanaannya:

1. Konservatif:
 - a) Rawat di rumah sakit.
 - b) Beri antibiotik: bila ketuban pecah > 6 jam berupa: Ampisilin 4x 500 mg atau gentamycin 1x 80 mg.
 - c) Umur kehamilan < 32-34 minggu : di rawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi.

- d) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluar air ketuban, maka usia kehamilan 35 minggu di pertimbangkan untuk terminasi kehamilan 35 minggu di pertimbangkan untuk terminasi kehamilan (hal sanga tergantung pada kemampuan keperawatan bayi premature).
- e) Nilai tanda-tanda infeksi (suhu, lekosit,, tanda-tanda infeksi intrauterine).
- f) Pada usia kehamilan 32-34 minggu berikan steroid selama untuk memacu kematangan paru-paru janin.

2. Aktif:

- a) Kehamilan > 35 minggu : induksi oksitosin, bila gagal dilakukan seksio sesarea.

Cara induksi : 1 ampul syntocinon dalam Dektrose 5 %, dimulai 4 tetes sampai maksimum 40 tetes/menit.
- b) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan seksio sesarea.
- c) Bila ada tanda infeksi : beri antibiotika dosis tinggi dan persalian diakhiri(Taufan Nugroho, 2011 hal:8).

11. Tinjauan Islam Tentang Ketuban Pecah Dini

KPD merupakan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan kurang bulan, dan mempunyai kotribusi yang besar pada angka kematian perinatal pada bayi yang kurang bulan. Sebagaimana yang

tercantum dalam QS. Al-ahqaf(46) : 15, Bagaimana perjuangan seorang ibu hamil dengan susah payah untuk keselamatan bayi dan dirinya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ وَفَصَّلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
 أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي
 تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri"(Departemen Agama RI,2004).

Dari ayat tersebut di jelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapapun dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Ini antara lain karena ayah mencampakkan sperma kedalam rahim ibunya, sang ibu mengandungnya dengan susah payah, sambil mengalami aneka

kesulitan bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, dan *melahirkan dengan susah payah* setelah berlalu masa kehamilan. Masa *kandungan* dalam perut ibu dan penyapihannya yang paling sempurna adalah *tiga puluh bulan sehingga apabila ia*, yakni sang anak, telah dewasa, yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orang tuannya dan kebaktiannya berlanjut sampai ia *mencapai usia empat puluh tahun*, yakni masa kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak ia berdoa memohon agar pengabdianya kepada kedua orang tuanya semakin bertambah. Ia bermohon: *'tuhanku* yang selama ini selalu berbuat baik kepadaku, anugerahilah aku serta kemampuan serta dorongan yang selalu yang menghiasi jiwaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan yang benar-benar telah kunikmati dan nikmat yang Engkau anugerahkan *kepada ibu bapakku* sehingga mereka berhasil memelihara dan mendidikku da aku bermohon juga kiranya aku secara khusus dapat slalu melakukan amal yang shaleh, yakni yang baik lagi bermanfaat lagi yang *Engkau ridhai; berilah kebaikan pada anak cucukku*. Yakni jadikanlah kebaikan tertampung secara mantap dan bersinambungan pada anak cucukku, kebaikkan yang kuperoleh manfaatnya.

Firman-Nya:

hamalathu ummuhu kurban wa wadha'athu kurhanl

ibunya mengandungnya dengan susah payah melahirkannya dengan susah payah

menjelaskan betapa berat kandungan dan kelahiran itu di alami oleh ibu. Saiyyid Quthub menulis bahwa dengan kemajuan yang dicapai dalam embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besar pengorbanan ibu. Setelah terjadi pembuahan zat yang merupakan cikal bakal manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat ini dilengkapi dengan potensi menyerap makanan sehingga ia merobek rahim dimana ia berdempet dan memakannya sehingga darah ibu mengalir menuju zat itu dan ia pun senantiasa bagaikan berenang di dalam kolam darah ibu yang kaya dengan saripati makanan. Ia mengisapnya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang. Sedang sang ibu yang sungguh wajar dikasihani itu makan, minum, mengunyah, dan mengisap yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandungnya yang dengan amat lahap memakannya. Selanjutnya, pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin itu kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya sari pati tulang-tulangnya pada darah agar kerangka sang anak dapat terbentuk sempurna. Itu sedikit dari banyak sekali yang dianugerahkan oleh ibu saat kehamilan janinnya(Tafsir AL-MISHBAH)

Bukan hanya itu saja, saat proses persalinan ibu merasakan penderitaan dan kesakitan yang hebat dimana beliau rela mempertaruhkan

nyawanya demi dapat melahirkan buah hatinya, sebagai dinyatakan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي غَامِمٍ أَنْ
 أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat Baik) kepada skedua orang tua ibu bapaknya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukur kepadaku ibu bapakmu, hanya kepadaku kembalimu (Departemen Agama RI, 2004).

Kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya: karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan diatas kelemahan yakni kelemahan berganda dan dari saat kesaat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkan dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyukannya setiap saat, bahkan ditengah malam ketika saat manusia lain tertidurnya nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyampaikannya dan penyapiannya didalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan.

Ayat ini dapat dihubungkan dengan kasus KPD, karena ibu hamil yang di diagnosa KPD oleh dokter maupun bidan keadaanya sangat lemah. KPD ini mempunyai resiko terjadinya partus lama dan kelelahan yang dapat menyebabkan infeksi serta komplikasi pada saat persalinan dan

kelahiran yang dapat berakibat dapat dilakukannya persalinan secara normal melainkan dengan jalan section sesarea sehingga dapat meningkatkan morbiditas pada ibu. Selain pada ibu, KPD ini juga berpengaruh terhadap janin dimana resiko resusitasi, prolaps tali pusar, hipoplasia paru serta kecacatan dan kematian janin akan meningkat.

Pada masa menyusui seorang ibu mengalami penderitaan jasmani maupun rohani selama 2 tahun. Ketika anaknya sakit dia tidak tidur dan menyiapkan makanan, membersihkan dan memenuhi segala keperluan anak tanpa mengeluh dan rasa bosan. Pengorbanan sang ibu sangat besar terhadap anaknya, maka sepatutnya kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mentaati, menghormati, mencintai, menyayangi, membahagiakan dan menuruti semua perkataannya selama kita masih mampu dan tidak keluar dari ajaran agama islam.

D. Sectio Sesarea

1. Definisi sectio sesarea

- a. Sectio sesarea merupakan lahirnya janin melalui insisi di dinding abdomen (laparatomi) dan di dinding uterus (histerektomi).
- b. Section sesarea merupakan cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding depan uterus melalui dinding depan perut
- c. Sectio sesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus.

Sesuai pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan sectio sesarea adalah suatu pembedahan yang dapat melahirkan janin lewat insisi pada dinding depan perut dan uterus, atas indikasi tertentu bila persalinan pervaginam tidak memungkinkan.

2. Jenis-jenis Sectio sesarea

Ada beberapa jenis bedah sesar dikutip dari penelitian

- a. Jenis klasik yaitu dengan melakukan sayatan vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. Akan tetapi jenis ini sudah sangat jarang dilakukan karena sangat berisiko terhadap terjadinya komplikasi.
- b. Sayatan mendatar bagian atas dari kandung kemih sangat umum dilakukan pada masa sekarang ini. Metode ini meminimalkan risiko terjadinya perdarahan dan cepat penyembuhan .
- c. Histerektomi sesarea yaitu bedah sesarea diikuti dengan pengangkatan rahim.
- d. Bedah sesar berulang dilakukan ketika pasien sebelumnya telah pernah menjalani bedah sesarea. Umumnya sayatan dilakukan pada bekas lukopersi sebelumnya.

3. Indikasi sectio sesarea

a. Indikasi ibu

Dalam proses persalinaan terdapat tiga faktor penentu yaitu *power* (tenaga megejan dan kontraksi dinding otot perut dan dinding rahim),

passageway (keadaan jalan lahir), *passangger* (janin yang dilahirkan) dan psikis ibu.

Mula-mula indikasi sectio sesarea hanya ada kelainan *passageaway*, misalnya sempitnya panggul, dugaan akan terjadinya trauma persalinan pada jalan lahir atau pada anak, sehingga kelahirannya tidak bisa melalui jalan vagina. Namun, akhirnya merambat ke faktor *power* dan *passanger*. Kelainan *power* yang memungkinkan sectio sesarea, misalnya megejan lemah , ibu sakit jantung atau penyakit menahun lainnya mempengaruhi tenaga. Sedangkan kelainan *passanger* diantaranya makrosemia, anak kelainan letak jantung, primigravida > 35 menderita *fetal distress syndrome* (denyut jantung janin melemah).

Secara terperinci ada tujuh indikasi medis seorang ibu yang harus menjalani sectio sesarea yaitu:

- 1) Jika panggul sempit, sehingga besar anak tidak proporsional dengan indikasi ibu (*disporsi*). Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran pada waktu pemeriksaan apakah panggul masih dalam batas normal.
- 2) Pada kasus gawat janin akibat terinfeksi misalnya, kasus ketuban pecah dini (KPD) sehingga bayi terendam cairan ketuban yang busuk atau bayi ikut memikul demam tinggi. Pada kasus ibu mengalami preeklamsia / eklamsia, sehingga janin terpengaruh akibat komplikasi ibu.

- 3) Pada kasus plasenta terletak dibawah yang menutupi *ostium uteri internum (plasenta previa)*, biasanya plasenta melekat dibagian tengah rahim. Akan tetapi pada kasus plasenta previa menutupi *ostium uteri internum*.
- 4) Pada kasus kelainan letak. Jika posisi anak dalam kandungan letaknya melintang dan terlambat diperiksa selama kehamilan belum tua.
- 5) Jika terjadi kontraksi yang lemah dan tidak terkoordinasi, hal ini menyebabkan tidak ada lagi kekuatan untuk mendorong keluar dari rahim(*incoordinate uterine action*).
- 6) Jika ibu menderita preeklamsi, yaitu jika selama kehamilan muncul gejala darah tinggi, ada protein dalam air seni, penglihatan kabur dan juga melihat bayangan ganda. Pada eklamsi ada gejala kejang-kejang sampai tak sadarkan diri.
- 7) Jika ibu mempunyai riwayat persalinan sebelumnya seksio sesar maka persalianan berikutnya umumnya harus sectio cesarea karna takut terjadi robekan rahim. Namun sekarang, tehnik sectio sesar dilakukan dengan sayatan dibagian bawah rahim sehingga potongan pada otot rahim tidak membujur lagi. Dengan demikian bahaya rahim robek akan lebih kecil dibandingkan dengan tehnik sectio dulu yang sayatan dibagian tengah rahim dengan potongan yang bukan melintang.

8) Indikasi sosial

Selain indikasi medis terdapat indikasi nonmedis untuk melakukan sectio sesarea yang indikasi sosial. Persalinan sectio sesarea karena indikasi sosial muncul karena adanya permintaan pasien walaupun ada masalah atau kesulitan untuk melakukan persalinan normal. Indikasi sosial biasanya sudah direncanakan terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan sectio sesarea (Buku Cunningham, 2006 dalam penelitian Rezki Ramadhani, 2014).

4. kontra indikasi sectio sesarea

Kontra indikasi sectio sesar dilakukan baik untuk kepentingan ibu maupun untuk kepentingan anak, oleh sebab itu, sectio sesarea tidak dilakukan kecuali tidak dalam keadaan terpaksa. Sectio sesarea tidak boleh dilakukan pada kasus-kasus seperti ini :

- 1) Janin sudah mati dalam kandungan. Dalam hal ini dokter memastikan denyut jantung janin tidak ada lagi, tidak ada lagi gerakan janin anak dan dari pemeriksaan USG memastikan keadaan janin.
- 2) Janin terlalu kecil untuk mampu hidup diluar kandungan.
- 3) Terjadi infeksi dalam kehamilan
- 4) Anak dalam keadaan cacat seperti *Hidrocephalus* dan *anecephalus* (buku Cunningham, 2006 dalam penelitian Rezki Ramadhani, 2014).

5. Teknik seksio sesarea

1. Insisi abdomen

a. Insisi vertikal

Pembedahan ini dilakukan dengan insisi vertikal garis tengah intra umbilikus. Panjang insisi harus sesuai dengan taksiran ukuran janin.

b. Insisi Transversal/Lintang

Dengan insisi panenstiel modifikasi, kulit dan jaringan subkutan disayat dengan menggunakan insisi transversal rendah sedikit melengkung. Insisi dibuat setinggi garis rambut pubis dan diperluas sedikit melebihi batas lateral otot rektus. Insisi transversal ini jelas memiliki keunggulan kosmetik. Sebagian orang beranggapan bahwa insisi tersebut lebih kuat dan kecil kemungkinannya terlepas. Kerugian dari teknik ini adalah apabila diperlukan ruang lebih banyak, insisi vertikal dapat dengan cepat diperluas melingkari dan ke atas pusar, sedangkan insisi fannenstiel tidak dapat. Apabila wanita yang bersangkutan obes, lapangan operasi mungkin lebih terbatas lagi.

2. Insisi uterus

1. Insisi klasik

Pembedahan ini dilakukan dengan insisi vertikal ke dalam korpus uterus dan mencapai fundus uterus. Keunggulan tindakan ini

adalah mengeluarkan janin lebih cepat, tidak mengakibatkan komplikasi kandung kemih tertarik dan sayatan bisa diperpanjang proksimal dan distal. Kerugian yang dapat muncul adalah infeksi mudah menyebar secara intraabdominal dan lebih sering terjadi ruptur uteri spontan pada persalinan berikutnya.

2. Insisi profunda

Dikenal juga dengan sebutan *low cervical*, yaitu sayatan pada segmen bawah uterus. Keuntungannya adalah penjahitan luka lebih mudah, kemungkinan ruptur uteri spontan lebih kecil dibandingkan dengan seksio sesarea dengan cara klasik, sedangkan kekurangannya yaitu perdarahan yang banyak dan keluhan pada kandung kemih post operatif tinggi.

3. Insisi ekstraperitonealis

Pada awalnya, tindakan ini dilakukan untuk menangani kehamilan dengan infeksi isi uterus. Tekniknya dengan insisi dinding dan fasia abdomen sementara peritoneum dipotong ke arah kepala untuk memaparkan segmen bawah uterus sehingga uterus dapat dibuka secara ekstraperitoneum. Antusiasme terhadap prosedur ini hanya beralangsur singkat, sebagian besar mungkin karena tersedianya berbagai obat antimikroba yang efektif.

6. komplikasi

Menurut Wiknjastro (2006) dikutip dalam penelitian, kemungkinan yang setelah dilakukan operasi ini antara lain:

- 1) Infeksi puerperal (nifas):
 - a) Ringan, dengan suhu meningkat dalam beberapa hari
 - b) Sedang, suhu meningkat lebih tinggi dengan dehidrasi dan perut sedikit kembung.
 - c) Berat, peritonialis, sepsi dan usus paralitik.
- 2) Perdarahan
 - a) Banyak pembuluh darah yang terputus dan terbuka
 - b) Perdarahan pada plasenta bed
- 3) Luka kandung kemih, emboli paru dan keluhan kandung kemih bila peritonealisasi terlalu tinggi.
- 4) Kemungkinan ruptur tinggi spontan pada kehamilan berikutnya.

Komplikasi post sectio sesarea

Komplikasi post sectio sesarea yang timbul adalah nyeri pada daerah insisi, potensi terjadinya trombosis, potensi terjadinya penurunan kemampuan fungsional, penurunan elastisitas otot perut dan otot dasar panggul, perdarahan, luka kandung kemih, infeksi, bengkak pada ekstremitas bawah, dan gangguan laktasi (Kutipan dalam buku Kurniawati, 2008 dalam penelitian).

Dikutip dalam penelitian, tanda-tanda pasien yang post operasi *sectio sesarea* adalah adanya insisi (Pembedahan), nyeri, adanya infeksi luka, kelemahan fisik.

a. Nyeri berhubungan dengan insisi pembedahan *sectio sesarea*(Wilkinson,2011)

Nyeri adalah keadaan dimana mengalami dan melaporkan adanya rasa ketidaknyamanan yang sangat hebat, atau sensasi fisiologis dari tubuh yang menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan. Stimulus dari nyeri dapat berupa stimulus yang berupa fisik maupun mental.

b. Resiko infeksi berhubungan dengan adanya luka insisi pembedahan *sectio sesarea*(Wilkinson,2011).

Resiko infeksi merupakan suatu peningkatan resiko masuknya organisme patogen yang dapat berupa virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Bahwa resiko tinggi diantaranya pada tindakan pembedahan.

7. Faktor resiko persalinan *sectio sesarea*

Secara spesifik resiko *sectio sesarea* adalah sebagai berikut:

- a. Risiko pada ibu
 - 1. Risiko jangka pendek
 - a) Infeksi pada bekas jahitan

Luka persalinan sectio sesarea lebih besar dan berlapis-lapis. Bila penyembuhan tak sempurna, kuman lebih mudah menginfeksi sehingga luka jadi lebih parah.

b) Infeksi rahim

Infeksi rahim terjadi jika ibu sudah kena infeksi sebelumnya, misal mengalami pecah ketuban. Saat dilakukan operasi rahim pun terinfeksi . Apalagi jika antibiotik yang digunakan dalam operasi tak cukup kuat.

c) Keloid

Keloid atau jaringan parut muncul pada organ tertentu karena pertumbuhan berlebihan sel-sel pembentuk organ tersebut. Perempuan yang punya kecenderungan keloid tiap mengalami luka niscaya mengalami keloid pada sayatan bekas operasi.

d) Cedera pembuluh darah

Cedera terjadi pada penguraian pembuluh darah yang melengket. Ini adalah salah satu sebab mengapa darah yang keluar pada persalinan sesar lebih banyak dibandingkan persalinan normal.

e) Cedera pada kandung kemih

Kandung kemih melekat pada dinding rahim. Saat operasi sesarea dilakukan, organ ini bisa terpotong. Perlu dilakukan operasi lanjutan untuk memperbaiki kandung kemih yang cedera tersebut.

f) Perdarahan

Perdarahan tak bisa dihindari dalam proses persalinan. Namun darah yang hilang lewat operasi sesar dua kali lipat dibanding lewat persalinan normal.

g) Air ketuban masuk ke pembuluh darah

Selama operasi sesarea berlangsung pembuluh darah terbuka. Ini memungkinkan komplikasi berupa masuknya air ketuban kedalam pembuluh darah (embolus). Bila embolus mencapai paru-paru, terjadilah apa yang disebut *pulmonary embolism*. Jantung dan pernafasan ibu bisa terhenti secara tiba-tiba. Terjadilah kematian mendadak.

h) Pembekuan darah

Pembekuan darah bisa terjadi pada urat darah halus di bagian kaki atau organ panggul. Jika bekuan ini mengalir ke paru-paru, terjadilah embolus.

i) Kematian saat persalinan

Beberapa penelitian menunjukkan, angka kematian ibu pada operasi sesar lebih tinggi dibanding persalinan normal. Kematian umumnya disebabkan kesalahan pembiusan, atau perdarahan yang tak ditangani dengan cepat.

8. perawatan post operasi

1) Perawatan luka insisi/pasca operasi

Beberapa prinsip yang perlu di implementasikan antara lain:

- a) Balutan dari kamar operasi dapat dibuka pada hari pertama pasca operasi.
- b) Klien harus mandi shower bila memungkinkan.
- c) Luka harus dikaji setelah operasi dan kemudian setiap hari selama pasca operasi sampai ibu diperbolehkan pulang.
- d) Luka mengeluarkan aksudat cair atau tembus ke pakaian, pembalut luka harus di ulang sebab bila tidak memungkinkan luka terbuka.
- e) Bila luka perlu dibalut ulang, balutan yang digunakan harus sesuai dan tidak lengket.

2) Pemberian cairan

Karena selama 24 jam pertama penderita puasa operasi (POP), maka pemberian cairan perinfus harus cukup banyak akan mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh agar tidak terjadi hipertemia, dehidrai, dan komplikasi pada organ-organ lain.

Cairan yang diperlukan biasanya dekstrose 5-10 % , garam fisiologis, dan ringer lakta (RL) secara bergantian. Jumlah tetesan tergantung pada keadaan dan kebutuhan, biasanya kira-kira 20 tetes permenit. Bila kadar hemoglobin dalam darah rendah, berikan transfusi darah atau packed-cell sesuai dengan kebutuhan.

3) Diet

Pemberian cairan perinfus biasanya dihentikan setelah penderita platus, kemudian dimulailah pemberian minuman dan makana peroral. Sebenarnya pemberian sedikit minumuman sudah di bolehkan pada 6-10 jam pasca operasi berupa air putih atau air teh yang jumlahnya dapat dinaikkan pada hari pertama dan kedua pasca operasi. Setelah cairan infus dihentikan berikan makanan bubur saring (MI), minuman air, buah dan susu. Selanjutnya secara bertahab diperbolehkan makan bubur (MI) dan akhirnya makanan biasa (MB). Sejak boleh minum pada hari pertama, obat-obatan sudah boleh diberikan.

Pemberian makanan rutin tersebut diatas akan berubah bila dijumpai komplikasi pada saluran pencernaan seperti adanya kembung pada perut dan peristaltik usus yang kurang sempurna.

- 4) Nyeri sejak penderita sadar, dalam 24 jam pertama rasa nyeri tersebut dapat diberikan obat-obat anti sakit dan penenang seperti suntikan intramuskuler (IM) pethidin dengan dosis 100-150 mg atau morphin sebanyak 10-15 m,g secara perinfus atau dengan obat-obatan di atas penderita yang kurang tenang atau gelisah akan merasa lebih tenang.

5) Mobilisasi

Mobilisasi segera tahap demi tahap sangat berguna untuk penyembuhan penderita. Kemajuan mobilisasi tergantung pada jenis

operasi yang dilakukan dan komplikasi yang mungkin dijumpai secara psikologi hal ini memberikan pula kepercayaan pada klien bahwa mulai sembuh. Perubahan gerak dan posisi ini harus diterangkan pada penderita atau keluarga yang menunggunya.

Miring kekanan dan miring ke kiri sudah dapat dimulai 6-10 jam setelah penderita sadar. Latihan pernapasan dapat dilakukan penderita sambil tidur terlentang sedini mungkin setelah sadar. Pada hari kedua penderita dapat didudukkan selama 5 menit untuk bernapas dalam-dalam lalu untuk melonggarkan pernapasan sekaligus membutuhkan kepercayaan pada penderita bahwa ia mulai pulih. Kemudian posisi tidur terlentang di rubah menjadi posisi setengah duduk (semi fowler).

Selanjutnya secara berturut-turut demi hari penderita dianjurkan belajar duduk selama sehari, belajar berjalan sendiri kemudian berjalan sendiri pada hari ke 3-5 pasca operasi. Mobilisasi berguna untuk mencegah terjadinya trombositis dan emboli. Sebaiknya bila terlalu dini melakukan mobilisasi secara teratur dan bertahap diikuti dengan istirahat adalah yang paling dianjurkan.

- 6) Kandung kemih yang penuh dapat menimbulkan rasa nyeri dan rasa nyaman pada penderita serta dapat menyebabkan perdarahan.

Karena itu dianjurkan juga pemasangan kateter tetap (balon kateter) yang terangsang selama 24-48 jam atau lebih lama lagi, tergantung

jenis operasi dan keadaan penderita. Dengan cara urin dapat ditampung dan diukur dalam kantong plastik secara periodik. Bila tidak di pasangi kateter usng tetap. Dianjurkan kateterisasi kira-kira 12 jam pasca operasi kecuali bila penderita dapat berkemih sendiri sebanyak 100 cc.

7) Pemberian obat-obatan

a) Antibiotic, kemoterapi dan antiplasasi.

Cara pemilihan dan pemberian antibiotic sangat berbeda-beda di setiap institusi, masing-masing mempunyai cara dan pemilihan obat yang berlainan.

b) Obat-obatan pencegahan kembung

untuk mencegah perut kembung dan untuk memperklancar kerja saluran pencernaan dapat diberikan obat-obata secara suntikan dan peroral.

8) Perawatan rutin

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan dan pengukuran adalah:

- a. Tanda-tanda vital meliputi : tekanan dalam darah (TD), jumlah nadi permenit (N), frekuensi pernapasan permenit (P), dan suhu badan (S).
- b. Jumlah cairan yang masuk dan keluar (Uriene).
- c. Pemeriksaan lainnya menurut operasi dan kasus

- 9) Konsultasi pada keadaan dan kasus tertentu, selain kerja sama dengan unit unit anastesi, kadang kala diperlukan konsultasi dengan disiplin lainnya.

E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, ketrampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang terfokus pada klien. Manajemen kebidanan terdiri dari VII langkah yang berurutan, yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap dan bisa di aplikasikan dalam semua situasi.

2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

1) Langkah 1 pengkajian data

Adalah langkah pengumpulan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Langkah ini menentukan proses interpretasi data tahap selanjutnya sehingga harus komprehensif. Hasil pemeriksaan menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya atau valid (Varney, 2002).

a. Data subyektif

Adalah data yang di dapat dari klien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi data klien. Data tersebut tidak dapat ditentukan oleh perawat secara independen tetapi melalui suatu interaksi atau komunikasi(Ambarwati dan Wulandari, 2008).

a) Biodata.

Adalah identitas untuk mengetahui status klien secara lengkap sehingga sesuai dengan sasaran(Ambarwati dan Wulandari, 2008).Identitas meliputi :

- 1) Nama : untuk mengetahui dan mengenal pasien.
- 2) Umur : untuk mengetahui faktor resiko dan tingkat kesuburan.
- 3) Agama : untuk mengetahui kepercayaan yang dianut oleh pasien.
- 4) Suku bangsa : dikaji untuk mengetahui lebih jauh tentang sosial budaya pasien.
- 5) Pendidikan : untuk mengetahui tingkat pendidikan yang nanti nya penting dalam pemberian KIE.
- 6) Pekerjaan : untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi keluarga.
- 7) Alamat : dikaji untuk mengetahui keadaan sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal budaya.

b) Alasan masuk

Untuk mengetahui alasan yang membuat pasien datang yang berhubungan dengan persalinan(Ambarwati dan Wulandari). Keluhan utama

Untuk mengetahui masalah yang di hadapi yang berkaitan dengan masa nifas misalnya pasien merasa mules, pada kasus *post sectio caesarea* keluhan bisa muncul yaitu rasa nyeri pada perut, badan terasa lemah, pusing, sulit mobilisasi(Manuaba,2007).

c) Riwayat penyakit

1) Riwayat penyakit sekarang.

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit yang diderita pada saat ini yang ada hubungannya dengan masa nifas dan bayinya (Ambarwati dan Wulandari, 2008).

2) Riwayat kesehatan yang lalu.

Data ini di perlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat atau penyakit akut, kronis seperti jantung, DM, hipertensi, asma yang dapat mempengaruhi pada masa nifas ini(Ambarwati dan Wulandari,2008).

3) Riwayat kesehatan keluarga.

Data ini diperlukan untuk mengetahui apakah dalam keluarga ada yang menderita penyakit menurun seperti asma, hepatitis dan DM serta penyakit menular seperti TBC, Hepatitis (Ambarwati dan Wulandari, 2008).

d) Riwayat menstruasi.

Untuk mengetahui menarche, siklus haid, lamanya, jumlah dara yang dikeluarkan dan pernahkah disminorhoe (Ambarwati dan Wulandari 2008).

e) Riwayat perkawinan.

Untuk mengetahui status perkawinannya, lama perkawinan, syah atau tidak, sudah beberapa kali menikah, berapa jumlah anaknya (Wiknjastro, 2005).

f) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu.

Untuk mengetahui jumlah kehamilan dan kelahiran, riwayat persalinan yaitu jarak antara dua kelahiran, tempat kelahiran, lamanya melahirkan, dan cara melahirkan. Riwayat kelahiran anak mencakup berat badan bayi sewaktu lahir, adakah kelainan bawaan bayi, jenis kelamin bayi, keadaan bayi hidup/mati saat dilahirkan (Estiwidani dkk, 2008).

g) Riwayat KB

Untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut KB dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi serta rencana KB setelah masa nifas ini dan beralih kekontrasepsi apa (Anggriani, 2010).

h) Riwayat kehamilan sekarang.

Untuk mengetahui keadaan kesehatan ibu selama hamil ada atau tidak nya penyakit serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut(Wiknjosastro, 2005).

Dikutip dalam penelitian Menurut Saifuddin (2006), meliputi:

- a. Hari pertama, haid terakhir serta kapan taksiran persalinannya.
- b. Keluhan-keluhan pada trimester I, II, III
- c. Dimana ibu biasa memeriksakan kehamilannya.
- d. Selama hamil berapa kali ibu periksa kehamilan
- e. Penyulhan yang pernah ibu dapat selama kehamilan berapa minggu.
- f. Imunisasi TT : sudah/belum imunisasi, berapa kali telah dilakukan imunisasi TT selama Hamil.

i) Riwayat persalinan sekarang.

Untuk mengetahui tanggal persalinan, jenis persalinan, jenis kelainan anak, keadaan bayi meliputi PB, BB, penolong persalinan. Hal ini perlu dikaji untuk mengetahui apakah proses persalinan mengalami kelainan atau tidak yang bisa berpengaruh pada masa nifas saat ini (Anggriani, 2010).

j) Kebiasaan selama nifas.

1) Pola nutrisi.

Untuk mengetahui pola makan dan minum frekuensi, banyak nya jenis makanan, makanan pantangan (Ambarwati, 2008). Pada ibu nifas post sectio sesarea dengan riwayat ketuban pecah dini diet nutrisi sudah mendapatkan program dari bagian gizi seperti yang makanan yang mengandung protein, cukup kalori dan mengandung banyak cairan

2) Pola eliminasi

Menggambarkan pola fungsi sekresi yaitu kebiasaan buang air besar meliputi frekuensi, jumlah konsistensi dan bau serta kebiasaan buang air kecil meliputi frekuensi, warna, jumlah (Anggriani, 2010). Pada ibu nifas *post sectio sesarea* BAK melalui kateterisasi

pada ibu masih berbaring di tempat tidur untuk beberapa hari, sedangkan BAB menggunakan pispot (Ambarwati, 2008).

3) Pola istirahat.

Untuk mengetahui pola istirahat dan tidur pasien, berapa jam pasien tidur, kebiasaan tidur misalnya membaca, kebiasaan tidur siang, istirahat sangat penting bagi ibu masa nifas karena dengan istirahat yang cukup dapat mempercepat penyembuhan (Ambarwati, 2008). Pada kasus ini biasanya istirahat ibu sedikit terganggu sehubungan rasa nyeri yang dirasakan pada luka bekas operasi (Saifuddin, 2006).

4) Keadaan psikologis

Untuk mengetahui respons ibu dan keluarga terhadap bayinya. Wanita mengalami banyak perubahan emosi/ psikologis selama masa nifas sementara yang menyesuaikan diri menjadi seorang ibu (Anggriani, 2010). Keadaan mental ibu nifas *post sectio sesarea* adalah cemas, sulit tidur, merasa bersalah, mudah tersinggung, pikiran negatif terhadap bayinya (Manuaba, 2007).

5) Sosial budaya.

Untuk mengetahui bagaimana dukungan keluarga, status rumah tinggal, pantangan makanan, kebiasaan adat istiadat yang dilakukan (Manuaba, 2007).

6) Penggunaan obat – obatan/rokok.

Dikaji apakah ibu perokok dan pemakai obat – obatan selama hamil atau tidak (Manuaba, 2007). Pada kasus post scetio sesarea dengan riwayat ketuban pecah dini dapat dikaji tentang penggunaan obat-obatan atau perokok yang dapat mempengaruhi terjadinya ketuban pecah dini atau merupakan faktor lain dari penyebab terjadi ketuban pecah itu sendiri.

b. Data obyektif

Adalah menggambarkan pendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik pasien yang meliputi :

a. Pemeriksaan fisik.

1) Status generalis.

a) Keadaan umum : untuk mengetahui keadaan umum ibu apakah baik, sedang, buruk. Keadaan ibu setelah dilakukan *secio sesareo*, adalah sedang(Hacker, 2002). Berdasarkan tanda-tanda pasien post sectio sesarea yaitu adanya insisi (pembedahan), nyeri,

adanya infeksi luka, dan kelemahan fisik. Pada kasus ibu dengan riwayat ketuban pecah dini ibu dalam keadaan lemah karna sebelumnya ibu mengalami infeksi rahim karna ketuban pecah dini saat di operasi rahimpun terinfeksi.

b) Kesadaran : untuk mengetahui tingkat kesadaran yaitu apakah composmetis, apatis, samnolen atau koma (Alimul, 2006).

c) Tanda vital :

(1) Tekanan darah : untuk mengetahui atau mengukur batas normal tekanan darah antara 90/60 mmHg sampai 130/90 mmHg (Prawirohardjo, 2005).

Sedangkan tekanan darah ibu nifas *post secario sesarea* adalah 110/70–130/80 mmHg (Prawiroharjo, 2005).

(2) Suhu : untuk mengetahui suhu basal pada ibu, suhu badan yang normal 36°c sampai 37°c (Prawirohardjo, 2005).

(3) Nadi : untuk mengetahui denyut nadi pasien sehabis melahirkan biasanya denyut nadi akan lebih cepat (Ambarwati, 2008). Sedangkan denyut

nadi pada ibu nifas *post sectio sesarea* adalah 50 – 90 X/menit (Ambarwati, 2008).

(4) Respirasi : untuk mengetahui frekuensi pernafasan yang dihitung dalam menit (Prawirohardjo, 2005).

Sedangkan respirasi pada ibu nifas *post sectio sesarea* cenderung lebih cepat yaitu 16–26 X/menit (Prawirohardjo, 2005). Ketika ketuban pecah, kuman dapat bermigrasi kedalam kantung ketuban hingga menyebabkan infeksi dalam rahim. Pada kasus gawat janin akibat terinfeksi misalnya kasus ketuban pecah dini sehingga bayi terendam cairan ketuban yang busuk atau bayi ikut memikul demam tinggi. Gejalanya termasuk suhu tubuh naik, keputihan yang tidak biasa, vagina yang tidak berbau tidak enak, denyut nadi cepat, nyeri diperut bagian bawah.

d) Tinggi badan : untuk mengetahui tinggi badan pasien (Prawirohardjo, 2005).

e) Lingkar lengan : untuk mengetahui status gizi atas pasien (Prawirohardjo, 2005). Pada kasus *post sectio sesarea* dengan riwayat ketuban pecah dini indeks

masa tubuh rendah merupakan salah satu terjadinya ketuban pecah.

2) Inspeksi

Pemeriksaan klien dengan melihat ujung rambut sampai dengan ujung kaki (Ambarwati dan Wulandari, 2008).

Rambut: untuk mengetahui kebersihan rambutnya, kondisi kulit kepala dan karakteristik seperti rambut bersih, rontok atau tidak (Nursalam, 2001).

a) Muka : untuk mengetahui keadaan muka pucat atau tidak, ada *oedema* apa tidak, ada *cloasma gravidarum* (Wiknjosastro, 2006).

b) Mata : conjungtiva pucat atau tidak, sklera putih atau tidak dan mata cekung atau tidak (Wiknjosastro, 2006).

c) Mulut, gigi : untuk mengetahui keadaan mulut bersih dan gusi atau kotor, ada stomatitis apa tidak, pada gusi terdapat caries apa tidak dan pada gigi terdapat karang gigi atau tidak (Wiknjosastro, 2006).

d) Perut : untuk mengetahui ada bekas luka operasi atau tidak (Saifuddin, 2006). Pada kasus ibu nifas dengan post sectio sesarea terdapat bekas luka operasi (Saifuddin, 2006).

- e) Vulva : untuk mengetahui apakah ada luka perineum, apakah terdapat tanda – tanda infeksi dan apakah ada lochea sesuai dengan masa nifas pada ibu sectio sesarean(Saifuddin, 2006)
- f) Anus : untuk mengetahui apakah ada hemoroid(Ambarwati dan Wulandari, 2008).

3) Palpasi

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meraba.

- a) Leher : untuk mengetahui ada pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar gondok(Ambarwati dan Wulandari, 2008).
- b) Dada : untuk mengetahui ada benjolan pada payudara atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak, ada kelainan bentuk atau tidak, puting susu menonjol atau tidak dan pengeluaran ASI atau kolostrum(Farrer, 2004).
- c) Abdomen : untuk mengetahui keadaan kontraksi uterus, tinggi TFU berapa jari dibawah pusat(Alimul, 2006).

Tabel 2.1. perubahan ukuran masa nifas

Involusi	Tinggi fundus uteri	Berat uterus	Diameter uterus
Plasenta lahir	Setinggi pusat	100 gram	12,5 cm
7 hari (Minggu 1)	Pertengahanpusat dan simpisis	5.000 gram	7,5 cm
4 hari (Minggu 2)	Tidak teraba	350 gram	5 cm
6 minggu	Normal	60 gram	2,5 cm

d) Ekstremitas untuk mengetahui ada tidaknya varices(Alimul, 2006).

c. Data penunjang.

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendukung pencegahan diagnosa seperti pemeriksaan laboratorium, rontgen, ultrasonografi (varney,2004). Pada *post sectio sesarea* pemeriksaan haemoglobin sebanyak 2 gr% (Saifuddin, 2002).

2) Langkah 2. Interpretasi data dasar

Interpretasi data merupakan rangkaian menghubungkan data yang diperoleh dengan konsep teori, prinsip relevan untuk mengetahui kesehatan pasien. Pada langkah ini data interpretasikan menjadi diagnosa, masalah, kebutuhan(Prawirohardjo, 2005).

1) Diagnosa kebidanan.

Adakah diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan(Prawirohardjo, 2005). Diagnosa pada kasus ini

ditegakkan Ny. X P... A ... umur ... tahun nifas dengan *post sectio sesarea* hari ke berapa.

Dasar :

a) Data subyektif.

Menurut Prawirohardjo, 2005 data subyektif meliputi :

- (1) Ibu mengatakan keadaan setelah *post sectio sesarea*
- (2) Ibu mengatakan kecemasan atau rasa ketidaknyamanan setelah *post sectio sesarea*

b) Data obyektif.

Menurut prawirohardjo, 2005 data obyektif meliputi :

(1) Keadaan umum.

Keadaan umum ibu setelah dilakukan tindakan *sectio sesarea*, adalah sedang

(2) Kesadaran itu setelah dilakukan tindakan *sectio sesarea*, adalah sedang.

(3) Tanda – tanda vital.

(a) Tekanan darah.

Ibu nifas *post sectio sesarea* tekanan darahnya teratur apa tidak. Tekanan darah ibu *post sectio sesarea* 110/90–130/80 mmHg(Prawirohardjo, 2005).

(b) Suhu.

Ibu nifas post sectio sesarea suhu tubuhnya normal atau tidak. Suhu pada ibu post sectio sesarea 36°C – 38°C (Prawirohardjo, 2005).

(c) Nadi.

Ibu nifas post sectio sesarea nadinya normal atau tidak. Nadi pada ibu post sectio sesarea adalah 50–90 X/Menit (Prawirohardjo, 2005).

(d) Respirasi.

Ibu nifas post sectio sesarea respirasinya cenderung lebih cepat atau lambat. Respirasi ibu pada ibu post sectio sesarea 16–20 X/Menit (Prawirohardjo, 2005)

(4) TFU pada ibu nifas post sectio sesarea dalam 1 hari masih setinggi pusat (Ambarwati dan Wulandari, 2008).

(5) Perut terdapat luka jahitan berbentuk jelujur.

(6) Kontraksi uterus kuat, sedang, atau lemah. Kontraksi uterus kuat (Ladewig, dkk, 2006).

(7) Pemeriksaan haemaglobin perlu dilakukan karena biasanya setelah melakukan operasi terjadi penurunan haemoglobin sebanyak 2 gr% (Saifuddin, 2002)

2) Masalah.

Adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman klien dan hasil dari pengkajian (Varney, 2004). Dalam kasus ibu post sectio sesarea adalah cemas, sulit tidur, merasa bersalah, mudah tersinggung, pikiran negatif terhadap bayi (Manuaba 2007).

3) Kebutuhan.

Merupakan hal-hal yang dibutuhkan pasien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa dan masalah (Varney, 2004).

3) Langkah 3. Diagnosa potensial

Mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial yang sudah diidentifikasi (Varney, 2004). Diagnosa yang kemungkinan terjadi adalah infeksi nifas, perdarahan, jika kandung kemih (Wiknjastro, 2006).

4) Langkah 4. Antisipasi

Dalam langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Identifikasi dan menetapkan perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi pasien (Varney, 2004). Faktor yang berperan terhadap infeksi post operasi sectio sesarea adalah

terjadinya infeksi intrapartum karna ketuban pecah dini/ ketuban pecah terlalu lama, perdarahan karna banyak pembuluh darah yang terputus dan terbuka, atoni uteri, luka kandung kemih, emboli paru dll. Resiko infeksi rahim terjadi jika ibu sudah kena infeksi sebelumnya, saat dilakukan operasi rahimpun terinfeksi. Apalagi jika antibiotik yang digunakan dalam operasi tak cukup kuat. Antisipasi pertama yang dilakukan pada ibu post sectio caesarea antara lain kolaborasi dengan SpOG, pemberian antibiotic profilaksin (Wiknosastro, 2006). Pada pasien post operasi dengan riwayat ketuban pecah dini dapat diberikan antibiotik profilaksin seperti; Cefotoksime yang merupakan golongan antibiotik yang dapat membunuh mikroorganisme penyebab infeksi, asammefenamat merupakan golongan analgetik yang dapat mengurangi rasa nyeri, metronidazole dapat mencegah infeksi, membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah serta membantu regenerasi sel-sel dan jaringan yang rusak, dan transamin untuk mencegah perdarahan.

5) Langkah 5. Rencana Asuhan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diagnosa yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya atau diagnosa yang telah

diidentifikasi atau diantisipasi (Manuaba, 2002). Adapun rencana asuhan yang diberikan adalah:

a. Lakukan manajemen post operatif

Rasional: untuk mengetahui keadaan ibu dan sebagai petunjuk untuk melakukan pengawasan dan perawatan.

b. Anjurkan mobilisasi/aktifitas

Rasional: untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan memperlancar darah klien.

c. Lakukan perawatan luka

Rasional: untuk mencegah terjadinya luka infeksi serta memberikan aman dan nyaman pada pasien.

d. Lakukan kateterisasi dan observasi eliminasi

Rasional: Kandung kemih yang penuh menimbulkan rasa nyeri dan rasa tidak nyaman pada penderita dan pada eliminasi untuk mengetahui proses metabolisme tubuh dan pencernaan berjalan lancar.

e. Beri KIE tentang KB

Rasional: untuk mengatur jarak kehamilan yang terlalu dekat

6) Langkah 6. Pelaksanaan Asuhan

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan yang menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke lima dan dilakukan secara efisiensi dan aman (Saifuddin, 2002).

7) Langkah 7. Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan kebidanan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah dengan hasil keadaan umum dan tanda-tanda vital sing keadaan luka post sectio sesarea tidak ada tanda-tanda infeksi mobilisasi dengan baik (Saiffudin, 2002). Evaluasi asuhan kebidanan pada post sectio sesarea antara lain keadaan umum baik dan tanda-tanda vital normal, tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka post operasi (Saiffuddin, 2002).

F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Data perkembangan yang digunakan dalam laporan kasus ini adalah SOAP menurut Varney (2004) yang menurut Varney (2004) yang meliputi:

a) Subyektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis.

b) Obyektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assesment.

c) Assesment

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa interpretasi data subyektif dan obyektif dalam suatu identifikasi yang meliputi:

1. Diagnosa atau masalah.
2. Antisipasi diagnosa atau masalah potensial.

d) Planning

Menggambarkan pendokumentasian tindakan atau evaluasi dari perencanaan, berdasarkan assesment.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST SECTIO SESARE PADA
NY” A “ DI RSIA BAHAGIA
TANGGAL 19-Juni -2016

No rekam medis : xxxxx

Tanggal Masuk :18 juni 2016 jam: 06.30 Wita

Tanggal operasi :18 juni 2016 jam: 23.25 Wita

Tanggal pengkajian :19 juni 2016 jam :08.10 Wita

Nama pengkaji :Diniatul Munawarah

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “ A “ / Tn “ A “

Umur : 27 tahun / tahun

Nikah / lamanya : 1 kali ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SI / SI

Pekerjaan : IRT / wiraswasta

Alamat : BTN Ranggo Parmai xxxxx

2. Riwayat penyakit sekarang

1)Keluhan utama : Nyeri daerah perut akibat luka bekas operasi

2) Riwayat keluhan utama

- a. Nyeri dirasakan setelah operasi sejak tanggal 18 juni 2016
- b. Nyeri pada daerah perut dirasakan terutama melakukan pergerakan
- c. Sifat keluhan tidak menetap
- d. Lokasi keluhan pada daerah abdomen bagian bawah
- e. Usaha ibu ntuk mengatasi keluhan dengan istirahat

3. Riwayat kesehatan lalu dan sekarang

- 1) Ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, DM, hipertensi
- 2) Tidak ada riwayat penyakit keturunan dan menular seperti HIV/AIDS
- 3) Tidak ada riwayat ketergantungan terhadap obat- obatan, minuman alkohol dan rokok
- 4) Tidak ada riwayat alergi terhadap obat – obatan dan makanan

4. Riwayat reproduksi

1) Riwayat haid

- | | |
|-------------|----------------|
| Menarche | : 13 tahun |
| Siklus haid | : 28 – 30 hari |
| Lama haid | : 6 - 7 hari |
| Dismenorhea | : tidak ada |

2) Riwayat obstetri

a. Riwayat ginekologi

Ibu tidak pernah menderita penyakit kelamin ataupun di operasi karena tumor.

b. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB.

5. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 18-10-2015
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 25-06-2016
- 3) Umur kehamilan
- 4) Ibu mengatakan tidak ada keluhan selama hamil
- 5) Ibu mengatakan rutin melakukan pemeriksaan kehamilannya
- 6) Ibu mengatakan telah mendapatkan suntikan TT
- 7) Ibu mengatakan mendapatkan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan

6. Riwayat persalinan sekarang

Ibu di operasi tanggal 18 Juni 2016 jam 23. 25 wita dengan indikasi ketuban pecah dini

Nama : By. Ny'A

BBL : 3450 gr

PBL : 50 cm

JK : Laki-laki

A/S : 8/10

7. Riwayat psikologi sosial, ekonomi dan spiritual

- a. Ibu dan keluarga senang dengan kelahiran bayinya

- b. Interaksi ibu dan anak baik
- c. Hubungan ibu dan suami serta keluarga baik
- d. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
- e. Penghasilan suami dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- f. Ibu selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar masa nifasnya berjalan lancar dan normal

8. Riwayat kebutuhan dasar

a. Kebutuhan Nutrisi

a) Sebelum Operasi

Pola makan : nasi, sayur, ikan dan buah-buahan

Frekuensi : 3 kali sehari

Nafsu makan : Baik

Kebutuhan Minum : 7-8 Gelas

b) Setelah Operasi

Pola Makan : Bubur

Frekuensi : 3 Kali Sehari

Nafsu makan : Baik

Kebutuhan minum : 7-8 Gelas

b. Kebutuhan eliminasi

a) Sebelum operasi

BAK : 3-4 Kali/ Hari

BAB : 1 Kali sehari

b) Setelah oprasi

BAK : 2 kali

BAB : belum pernah

c. Personal Hygiene

a) Sebelum operasi

Mandi :2 Kali sehari

Keramas : 3 Kali seminggu

Gosok gigi : 2 Kali sehari

Ganti pakaian : setiap selesai mandi

b) Setelah operasi

Mandi : ibu mengatan belum pernah mandi

Keramas : belum pernah

Gosok gigi : belum pernah

Ganti pakaian : ganti pakean 1kali

d.Istrahat

a) Sebelum operasi

Tidur siang : 1 jam / hari

Tidur malam : 8 jam / hari

b) Setelah operasi

ibu mengatakan kurang tidur karena sering timbulnya nyeri pada luka bekas operasi

9. Pemeriksaan Fisik

1) Keadaan ibu baik

2) Kesadaran komposmentis

3) TTV

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36,6

Pernapasan : 22 x/i

4) Kepala

Inspeksi : kepala bersih, rambut hitam dan gelombang

Palpasi : tidak ada massa dan ada nyeri tekan

5) Wajah

Inspeksi : tidak ada oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : tidak teraba adanya oedema

6) Mata

Inspeksi : simetris kiri kanan conjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus)

7) Hidung

Inspeksi : tidak nampak adanya polip

8) Mulut dan gigi

Inspeksi : bibir merah muda, tidak ada karies pada gigi

9) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan tidak ada serumen dan peradangan

10) Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

11) Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan puting susu menonjol tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, colostrum ada saat areola di pencet, tidak ada nyeri tekan.

12) Abdomen

Inspeksi : tampak luka bekas operasi yang tertutupi oleh verband.

Palpasi : tfu setinggi pusat nyeri tekan pada luka operasi, kontraksi uterus teraba keras dan bundar

13) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varises pada
perineum, ada pengeluaran lochea rubra
Terpasang kateter

14) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : Terpasang infus RL pada tangan kanan

Palpasi : tidak teraba oedema dan varises

B. LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

1. Diagnosa : post sectio caesarea dengan riwayat ketuban pecah dini

a. Ds :

- a) Ibu di operasi tanggal 18 Juni 2016 jam 23.25 wita
- b) Ibu mengatakan badannya terasa masih terasa lemas dan cemas dengan keadaanya
- c) Ibu mengatkan masih merasa nyeri pada luka jahitan post sectio sesarea

b. Do:

- a) Pada status klien, klien dioperasi tanggal 18 juni 2016 jam 23.25
Wita

b) Riwayat persalinan

- 1) Subjektif

Ibu masuk rumah sakit pada tanggal 18 juni 2016 pukul 06.30 wita dengan keluhan nyeri perut bagian bawah tembus kebelakang sejak tadi malam disertai pelepasan lendir (+), darah (+). Dan ibu mengatakan keluar pelepasan air sejak jam 04.00 Wita tadi subuh sampai sekarang.

2) Objektif

Pada data obyektif dilakukan pemeriksaan fisik:

1) Ku: Baik

2) TTV

TD:110/80 mmHg S: 36,5 C°

N : 80x/i P: 20x/i

3) Pemeriksaan Leopold :

a. Leopold I : 3 jari bpx, 34 cm

b. Leopold II : Puki

c. Leopold III : Kepala

d. Leopold IV : BDP

e. TBJ : 3162 gram

f. DJJ : 140x/i

g. His :2x10 (25-30)

4) Pemeriksaan dalam pukul

1) Vulva dan vagina : Normal

2) Portio : Tebal

- 3) Pembukaan : 2 cm
- 4) Ketuban : Keruh
- 5) Presentase : UUK
- 6) Penurunan : Hodge I
- 7) Penumbungan : Tidak ada
- 8) Kesan panggul : normal
- 9) Pelepasan :Lendir, darah dan air ketuban

3) Assasment

GIPoAo, Gravid aterm, inpartu kala 1 fase laten

4) Planning

- 1) Observasi : DJJ, his dan kemajuan persalinan
- 2) Anjurkan ibu untuk jalan-jalan

Jam/wita	TD/mmHg	Nadi x/i	HIS	DJJx/i
07.00		80	2x110 (25-30)	140
07.30		80	2x110 (25-30)	140
08.00		80	2x10 (25-30)	143
08.30		80	2x10 (25-30)	142
09.00		82	2x10 (25-30)	142
09.30		80	2x10 (25-30)	140
10.00	110/80	80	2x10 (25-30)	140

3) Melakukan VT kontrol pukul 10.30 wita

- 1) Vulva dan vagina : Normal
- 2) Portio : Tebal
- 3) Pembukaan : 2 cm
- 4) Ketuban : Keruh
- 5) Presentase : UUK
- 6) Penurunan : Hodge I
- 7) Penumbungan : Tidak ada
- 8) Kesan panggul : normal
- 9) Pelepasan :Lendir, darah dan air ketuban

4) Melanjutkan pemantauan observasi DJJ, His

Jam/wita	TD/mmHg	Nadi x/i	His	Djjx/i
11.00		80	2x10 (25-30)	138
11.30		82	2x10 (25-30)	138
12.00		80	2x10 (25-30)	140
12.30		80	2x10 (25-30)	140
13.00		80	2x10 (25-30)	142
13.30		82	2x10 (25-30)	140
14.00		80	3x10 (25-30)	144
14.30	110/80	80	3x10 (25-30)	144
15.00		80	2x10 (25-30)	140
15.30		82	3x10	144

			(25-30)	
16.00		80	3x10 (25-30)	144

5) Melanjutkan VT kontrol pukul 16.30 wita

- 1) Vulva dan vagina : Normal
- 2) Portio : Tebal
- 3) Pembukaan : 2 cm
- 4) Ketuban : Keruh
- 5) Presentase : UUK
- 6) Penurunan : Hodge I
- 7) Penumbungan : Tidak ada
- 8) Kesan panggul : normal
- 9) Pelepasan :Lendir, darah dan air ketuban

DJJ: 148x/i His : 2x10 (30-35)

6) Pasien dioperasi pada pukul 23.25 wita dengan indikasi ketuban pecah dini dan partus lama dan bayi lahir pada pukul 23.30 wita.

7) Operasi selesai pada pukul 00.25 Wita dan Pasien di pindahkan keruang pemulihan pada pukul 00.28 Wita dengan keadaan umum baik.

c) Keadaan umum : Baik

d) Kesadaran : komposmentris

e) TTV

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36, 6

Pernapasan : 22 x/i

f) Pada perut terdapat luka jahitan post sectio sesarea dan luka jahitan tertutup kassa tidak ada perdarahan

g) TFU setinggi pusat

h) Kontraksi teraba keras dan bundar

i) ASI keluar tapi masih sedikit

j) Tampak pengeluaran lochea

2. Masalah aktual: nyeri bekas luka operasi

a.Ds:

a) ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi

b) ibu mengatakan sakitnya hilang timbul

b. Do :

a) Ekspresi wajah ibu tampak meringis bila bergerak

b) Tampak luka operasi yang tertutupi oleh verban

c) Nyeri tekan pada perut

d) Tingkat nyeri sedang

c. Analisa dan interpestasi data

Terputusnya kontinuitas jaringan akan melepaskan hormon vasinator yang merangsang sarafprifer ke hipotalamus sehingga terjadi feedback kedalam tubuh melalui efferen yang menimbulkan suatu rangsangan yang dipersepsikan sebagai nyeri (Rimawati, 2010).

3. Kecemasan

a. Ds:

a) Klien mengatakan merasa cemas dengan keadaan yang dialaminya.

b) Klien sering menanyakan keadaannya

b. Do:

Ekspresi wajah ibu tampak cemas dan meringis bila ditekan pada daerah perut

c. Analisa dan interprestasi data

Kurangnya pengetahuan tentang keadaannya menyebabkan timbul rasa takut yang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormon adrenalin serta kurangnya pengetahuan dan informasi dapat mempengaruhi mekanisme koping klien dalam menghadapi kondisinya sehingga cemas dipersepsikan (Rimawati, 2010).

C. LANGKAH III : ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

1. Masalah potensial: potensial terjadi infeksi luka bekas operasi

a. Ds:

a) Ibu mengatakan dioperasi tanggal 18 juni 2016 jam 23.25 wita

b) Klien mengatikan nyeri pada daerah operasi

b. Do:

a) Tampak luka bekas operasi tertutup kain kasa

b) TTV :

TD : 100 / 60 mmHg Suhu : 36,6

Nadi : 82x/i36, 6 Pernapasan : 22x/i

c. Analisa dan inteprestasi Data

Adanya luka operasi merupakan pintu masuknya kuman pathogen dan menjadi tempat untuk berkembangnya mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan infeksi (Rimawati, 2010).

D. LANGKAH IV:EVALUASI TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter. SpOG untuk memberikan terapi obat post sectio sesarea

- 1) Cefotoksim 1 gr/jam
- 2) Metronidazole 1 flakon
- 3) Injeksi Alinamin F 1 ampul/IV
- 4) Injeksi Transamin 1 ampul/IV
- 5) Keterolaks 1 ampul/IV
- 6) Ranitidin 1 ampul/IV
- 7) Injeksi Vitamin B Kompleks 2 cc/24 jam secara IM

E. LANGKAH V: RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Diagnosa : Post Sectio sesarea dengan riwayat ketuban pecah dini

Tujuan :

- a. Post operasi berlangsung normal
- b. Nyeri berkurang atau teratasi
- c. Kecemasan teratasi
- d. Tidak terjadi infeksi
- e. ASI lancar

Kriteria :

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Tanda-tanda vital
 - TD : (Sistole: 100-120 mmHg)
(Distole: 60-90 mmHg)
 - Nadi : 60-100x/i
 - Suhu : 36,5 C⁰-37,5 C⁰
 - Pernapasan : 16-28 x/i
- c. Post partum sectio sesarea berjalan normal di tandai dengan
 - a) TFU setinggi pusat
 - b) Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
 - c) Pengeluaran lochea fisiologi yaitu lochea rubra
 - d. Tidak ada keluhan rasa nyeri

- e. Ekspresi wajah ceria
- f. Luka bekas operasi sembuh
- g. Tidak ada tanda-tanda infeksi seperti merah, bengkak, dan panas.

Intervensi tanggal 19 juni 2016 jam 08.30 wita

1. Observasi keadaan umum ibu

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum ibu dan sebagai petunjuk untuk melakukan pengawasan dan perawatan

2. Observasi TTV, kontraksi uterus, TFU, lochea

Rrasional :

- a) dengan mengobservasi TTV maka dapat menilai keadaan umum ibu
- b) dengan mengobservasi kontraksi, TFU, dan lochea untuk menilai proses involusio uteri berjalan normal atau tidak

3. Jelaskan pada ibu mengenai keadaannya

Rasional : agar ibu mengerti keadaan masa nifasnya

4. Jelaskan penyebab nyeri

Rasional : dengan mengetahui penyebab nyeri, ibu dapat memahami dan mengerti nyeri yang dirasakan sehingga ibu mampu mengatasi nyeri

5. Anjurkan ibu istirahat yang cukup

Rasional : istirahat yang cukup memberikan kesempatan otot dan otak untuk relaksasi setelah mengalami proses operasi sehingga pemulihan tenaga serta stamina ibu dapat berlangsung dengan baik.

6. Beri penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian bila basah/kotor

Rasional :dengan melakukan kebersihan diri dapat memberikan rasa nyaman dan mencegah terjadinya infeksi terutama daerah bekas operasi.

7. Observasi pemberian cairan infus

Rasional :pemberian cairan infus mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya hipotermia, dehidrasi dan komplikasi pada organ-organ lainnya

8. Observasi pengeluaran urin

Rasional :Kandung kemih yang penuh menimbulkan rasa nyeri dan rasa tidak nyama pada penderita

9. Observasi tanda–tanda infeksi pada luka

Rasional : untuk mengetahui ada atau tidak tanda–tanda infeksi pada luka

10. Anjurkan ibu untuk tehnik relaksasi dan mobilisasi dini

Rasional : Mobilisasi dini untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan memperlancar darah klien

11. Lakukan perawatan luka secara steril dan ganti verban

Rasional : agar tidak terjadi infeksi pada luka tersebut

12. Penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik dan vitamin

Rasional : Cefotoksime merupakan golongan antibiotik yang dapat membunuh mikroorganisme penyebab infeksi, asamfenamat merupakan golongan analgetik yang dapat mengurangi rasa nyeri, metronidazole dapat mencegah infeksi, membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah serta membantu regenerasi sel-sel dan jaringan yang rusak, dan transamin untuk mencegah perdarahan.

F. LANGKAH VI: TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 19 juni 2016 jam 08.20 wita

1. Mengobservasi keadaan umum

Hasil :

- a. Ibu masih berbaring ditempat tidur dengan wajah meringis
- b. Kesadaran komposmentris

2. Mengobservasi TTV, kontraksi uterus, TFU, lochea

Hasil :

a. TTV

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36, 6

Pernapasan : 22 x/i

- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, lochea rubra

3. Menjelaskan pada ibu mengenai keadaannya berlangsung normal
4. Menjelaskan penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, kulit dan serabut dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.
5. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup:
 - a. Tidur siang 1-2 jam/hari
 - b. Tidur malam 7-8 jam/hari
6. Memberikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian basah/kotor.
7. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer Lakta: Dextrose 5 % dengan 28x/i
8. Mengobservasi pengeluaran urine: urine sebanyak 300 cc ml tertampung didalam urine bag
9. Menganjurkan ibu untuk tehnik relaksasi dan mobilisasi dini yaitu miring kanan atau kiri
10. Melakukan perawatan luka secara steril dan ganti verba untuk mencegah terjadinya infeksi
11. Penatalaksanaan pemberian obat yaitu Cefotaxime 1 gr/1 jam, drips metronidazole 0,5 gr/8 jam, ketorolaks 1 amp/8 jam, Ranitidin 1 amp/8 jam, Transamin 1 amp, diberikan secara intravena.

G. LANGKAH VII: EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 19 Juni 2016 08.20 wita

1. Keadaan umum ibu baik di tandai dengan TTV dalam batas normal

TTV :

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36,6 C°

Pernapasan : 22 x/i

2. Nyeri didaerah bekas operasi belum berkurang ditandai dengan :

- a. Ibu masih mengeluh nyeri pada daerah luka operasi
- b. Ekspresi wajah ibu masih meringis bila bergerak
- c. Nyeri tekan pada daerah luka operasi

3. Ibu merasa lega setelah diberitahu keadaannya

4. Ibu sudah diberitahu dan mengerti tentang fisiologis masa nifas dan tidak merasa cemas lagi dengan keadaannya

5. Post partum berjalan normal di tandai dengan

- a. TFU setinggi pusat
- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- c. Pengeluaran Lochea fisiologi yaitu lochea rubra

5. Infus terpasang dengan 20 tetes/menit

6. Cateter masih terpasang urine 300 cc

7. Ibu mengerti tentang pentingnya mobilisasi dini

8. Tidak terjadi infeksi pada luka bekas operasi di tandai dengan: tidak ada nanah, bengkak, berbau, merah, demam.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST SECTIO
SESAREA PADA NY” A “DI RSIA BAHAGIA
TANGGAL 19-Juni -2016**

No rekam medik : xxxxx

Tanggal Masuk : 18 juni 2016 jam: 16.30 Wita

Tanggal operasi : 18 juni 2016 jam: 23.25 Wita

Tanggal pengkajian : 19 juni 2016 jam :08.20 Wita

Nama pengkaji : Diniatul Munawarah

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu di operasi tanggal 18 Juni 2016 23. 25 wita
2. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi
3. Ibu mengatakan badan masih terasa lemas
4. ibu merasa cemas dengan keadaanya

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum Ibu Baik

- 1) Kesadaran Komposmentis
- 2) TTV

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36, 6 C°

Pernapasan : 22 x/i

2. Ekspresi wajah ibu meringis kesakitan saat bergerak

1) Kepala

Inspeksi : Kepala bersih, rambut hitam dan gelombang

Palpasi : tidak ada massa dan nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : Tidak ada oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : tidak teraba adanya oedema

3) Mata

Inspeksi : simetris kiri kanan conjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus)

4) Hidung

Inspeksi : tidak nampak adanya polip

5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bibir merah muda, tidak ada karies pada gigi

6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan tidak ada serumen dan peradangan

7) Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tyroid,
kelenjar limfe dan vena jugularis

8) Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan puting susu menonjol tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, colostrum ada saat areola di pencet, tidak ada nyeri tekan.

9) Abdomen

Inspeksi : tampak luka bekas operasi yang tertutupi oleh verband

Palpasi : tftu setinggi pusat nyeri tekan pada luka operasi, kontraksi uterus teraba keras dan bundar

10) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan dan varises pada perineum
pengeluaran lochea rubra

Terpasang kateter

11) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : terpasang infus RL pada tangan kanan simetris kiiri dan kanan

Palpasi : tidak teraba oedema dan varises

Perkusi : refleks patella (+) kiri dan kanan.

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : post sectio sesarea dengan riwayat ketuban pecah dini

Masalah aktual : nyeri luka bekas operasi

Masalah potensial : terjadi infeksi pada luka bekas operasi

D. PLANNING (P)

Tanggal 19 juni 2016 jam 08. 20 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum

Hasil :

- a. Ibu masih berbaring ditempat tidur dengan wajah meringis
- b. Kesadaran komposmentris

2. Mengobservasi TTV, kontraksi uterus, TFU, lochea

Hasil :

TTV :

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36, 6 C^o

Pernapasan : 22 x/i

- c. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, lochea rubra

3. Menjelaskan pada ibu mengenai keadaannya berlangsung normal
4. Menjelaskan penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, kulit dan serabut dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.
5. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup:
 - a. Tidur siang 1-2 jam/hari
 - b. Tidur malam 7-8 jam/hari
6. Memberikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian basah/kotor.
7. Menganjurkan ibu untuk tehnik relaksasi mobilisasi dini seperti meringkang kiri atau kanan
8. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer Laktat: Dextrose 5 % dengan 28x/i
9. Mengobservasi pengeluaran urin: urine sebanyak 300 cc ml tertampung didalam urine bag
10. Mengobservasi keadaan luka operasi: luka operasi masih basah
11. Penatalaksanaan pemberian obat yaitu Cefotaxime 1 gr/1 jam, drips metronidazole 0,5 gr/8 jam, ketorolaks 1 amp/8 jam, Ranitidin 1 amp/8 jam, Transamin 1 amp, diberikan secara intravena.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST SECTIO
SESAREA PADA NY” A “ DI RSIA BAHAGIA
TANGGAL 20-Juni -2016**

No rekam medik : xxxxx

Tanggal Masuk : 18 juni 2016 jam: 16.30 Wita

Tanggal operasi : 18 juni 2016 jam: 23.25 Wita

Tanggal pengkajian : 20 juni 2016 jam :09.30 Wita

Nama pengkaji : Diniatul Munawarah

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu di operasi tanggal 18 Juni 2016 23. 25 wita
2. Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi bila bergerak
3. Luka operasi masih basah
4. Ibu merasa cemas dengan keadaanya
5. Ibu mengatakan sudah platus belum BAB
6. Ibu mengatakan ASI masih sedikit
7. Infus dan kateter sudah di aff

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum Ibu Baik
 - a. Kesadaran Komposimentis
 - b. TTV :

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36, 6 C°

Pernapasan : 22 x/i

2. Ekspresi wajah meringis
3. Luka operasi masih basah
4. Nyeri tekan pada luka operasi

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : Post sectio sesarea hari pertama dengan riwayat ketuban pecah dini

Masalah aktual : nyeri luka bekas operasi

Masalah potensial : terjadi infeksi pada luka bekas operasi

D. PLANNING (P)

Tanggal 20 juni 2016 jam 09. 50 wita

1. Mengobservasi Keadaan Umum

Hasil :

- a. Ibu masih berbaring ditempat tidur dengan wajah meringis
- b. Kesadaran komposmentris

2. Mengobservasi TTV, kontraksi uterus, TFU, lochea

Hasil :

TTV :

TD : 100 / 60 mmHg

Nadi : 82 x/ i

Suhu : 36, 6 C°

Pernapasan : 22 x/i

Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU 1 jari bawah pusat, lochea rubra

3. Menjelaskan ulang penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, kulit dan serabut dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.
4. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup:
 - a. Tidur siang 1-2 jam
 - b. Tidur malam 7-8 jam
5. Memberikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian basah/kotor.
6. Menganjurkan ibu untuk ber KB dan ibu memilih KB suntik 3 bulan
7. Menganjurkan ibu untuk teknik relaksasi dan mobilisasi dini yaitu berjalan-jalan disekitar tempat tidu
8. Melakukan perawatan luka secara steril dan ganti verban untuk mencegah terjadinya infeksi
9. Penatalaksanaan pemberian obat yaitu Cefotaxime 1 gr/1 jam, metronidazole 0,5 gr/8 jam, ketorolaks 1 amp/8 jam, Ranitidin, Transamin

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST SECTIO
SESAREA PADA NY” A “ DI RSIA BAHAGIA
TANGGAL 21-Juni -2016**

No rekam medik : xxxxx

Tanggal Masuk : 18 juni 2016 jam: 16.30 Wita

Tanggal operasi : 18 juni 2016 jam: 23.25 Wita

Tanggal pengkajian : 21 juni 2016 jam :09.20 Wita

Nama pengkaji : Diniatul Munawarah

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan di operasi tanggal 18 Juni 2016 23. 25 wita
2. Ibu mengatakan masih nyeri pada luka bekas operasi bila bergerak
3. Ibu mengatakan tidak pusing
4. Ibu mengatakn sudah platus tapi belum BAB

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum baik
2. Ekspresi wajah ibu ceria
3. Tampak luka operasi yang tertutupi oleh verband
4. TFU 2 jari bawah pusat
5. Pengeluaran lochea rubra
6. TTV :

TD : 120 / 90 mmHg

Nadi : 80 x/ i

Suhu : 36,3 C°

Pernapasan : 20 x/i

C. ASSESMENT(A)

Diagnosa: post sectio sesarea hari kedua dengan riwayat ketuban pecah dini

Actual : nyeri bekas luka operasi

Potensial: terjadi infeksi luka operasi

D. PLANNING

Tanggal 21 juni 2016 pukul 09.50 Wita

1. Mengobservasi TTV

TD : 120 / 90 mmHg

Nadi : 80 x/ i

Suhu : 36,3 C°

Pernapasan : 20 x/i

2. Menjelaskan penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, kulit dan serabut dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.
3. Membantu ibu untuk mobilisasi yaitu miring kanan dan miring kiri
4. Memberitahu ibu untuk segera menyusui bayinya sedini mungkin

5. Memberikan pendidikan tentang perawatan payudara
6. Menganjurkan ibu agar tetap memperhatikan personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basah/kotor
7. Penatalaksanaan pemberian obat pada jam 10.00 wita yaitu Cefotaxime 1 gr/1 jam, ketorolaks 1 amp/8 jam.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST SECTIO
SESAREA PADA NY” A “ DI RSIA BAHAGIA
TANGGAL 22-Juni-2016**

No rekam medik : xxxxx

Tanggal Masuk : 18 juni 2016 jam: 16.30 Wita

Tanggal operasi : 18 juni 2016 jam: 23.30 Wita

Tanggal pengkajian : 22 juni 2016 jam : 10.00 Wita

Nama pengkaji : Diniatul Munawarah

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu sudah bisa miring ke kiri dan ke kanan
2. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang
3. Ibu mengatakan ASI sudah keluar banyak
4. Ibu mengatakn sudah minum teh dan makan nasi bubur porsi sedang dengan lauk dan sayur

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum baik
2. Ekspresi wajah cerah
3. Luka operasi mulai kering
4. Nyeri tekan sudah berkurang
5. TTV :

TD : 100 / 80 mmH

Nadi : 80 x/ i

Suhu : 36,6 C°

Pernapasan : 20 x/i

C. ASSESMENT(A)

Diagnosa: post sectio caesarea hari ketiga, nyeri luka operasi dengan riwayat ketuban pecah Dini

Potensial: Antisipasi terjadi infeksi luka operasi

D. PLANNING (P)

Tanggal 22 juni 2016 pada jam 10.00 Wita

1. Mengobservasi keadaan umum

2. Mengobservasi Tanda-tanda vital

TD :100/80 mmHg

P :20x/i

N :80x/i

S :36,6 C°

3. Memberikan motivasi pada klien untuk memenuhi sendiri kebutuhannya.

4. Memberikan penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobiliasi dini) dalam proses penyembuhan

5. Mengganti perban luka operasi dan ibu bersedia untuk diganti perban lukanya

6. Memberikan dukungan moril kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih dan merasa senang serta berterimakasih.

7. Memberikan penkes tentang pentingnya ASI eksklusif pada bayi

8. Memberi KIE tentang KB pada ibu
9. Menyiapkan ibu untuk pulang
10. Menganjurkan ibu untuk datang lagi kontrol 1 minggu kemudian
11. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan seluruhnya diganti oral yaitu
Asam mefenamat 500 gram, Fe 1x1, Vit C 1x 500 mg

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus pada pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan post section sesarea pada Ny'A' dengan riwayat ketuban pecah dini di RSIA Bahagia selama 3 hari mulai tanggal 19-07-2016 sampai 22-07-2016. Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah Varney uraian sebagai berikut:

A. Identifikasi Data Dasar

1. Pada pengumpulan data dasar merupakan dasar proses manajemen kebidanan yang kegiatannya ditujukan pada pengumpulan informasi mengenai kesehatan baik fisik, psikologis dan spritual melalui suatu pengumpulan data yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi) tanpa menemukan suatu hambatan yang berarti. Hal ini karena respon kooperatif ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan dan dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih berfokus sesuai keadaan klien. ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan/sebelum inpartum, pada pembukaan <4 cm (fase laten). Hal ini dapat terjadi pada

akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. Kondisi ini merupakan kondisi infeksi dalam kehamilan.

2. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi KPD adalah dengan cara operasi sesarea. Section sesarea merupakan cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding depan uterus melalui dinding depan perut. Operasi pembedahan ini akan menyebabkan nyeri pada daerah luka operasi seperti yang dialami Pada kasus Ny.A post sectio sesarea mengeluh nyeri pada luka jahitan yang di dapatkan dari data subjektif (identitas pasien, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalina, riwayat hamil sekarang, riwayat penyakit dan pola kebiasaan) dan data objektif (diambil dari keadaan umum ibu, kesadaran, TTV, keadaan luka jahitan, TFU. Kontraksi uterus dan pengeluaran darah pervaginam). Sehingga apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara keduanya.

B. Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Dalam pengkajian data dan masalah kebidanan dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung dan ditinjau dalam beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan. Dan berdasarkan tinjauan pustaka adalah:

1. Komplikasi yang timbul akibat ketuban pecah dini bergantung pada usia kehamilan. Dapat terjadi infeksi maternal atau neonatal, persalinan prematur, hipoksian karena kompresi tali pusat, deformitas janin, meningkatnya insiden seksio sesarea atau gagalnya persalinan normal.
2. Nyeri berhubungan dengan insisi pembedahan *sectio cesarea*. Nyeri adalah keadaan dimana mengalami dan melaporkan adanya rasa ketidaknyamanan yang sangat hebat, atau sensasi fisiologis dari tubuh yang menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan. Stimulus dari nyeri dapat berupa stimulus yang berupa fisik maupun mental.
3. Kurangnya pengetahuan tentang keadaannya menyebabkan timbulnya rasa takut yang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormon adrenalin serta kurangnya pengetahuan dan informasi dapat mempengaruhi mekanisme coping klien dalam menghadapi kondisinya sehingga cemas diprepsikan. Sehingga yang diidentifikasi pada klien Ny'A' adalah post operasi adalah nyeri pada luka operasi dan kecemasan. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus pada Ny'A' secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yang ditegaskan sehingga memperlihatkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek

C. Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen asuhan kebidanan adalah mengidentifikasi masalah potensial yaitu mengantisipasi jika memungkinkan dan mempersiapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa nyeri daerah luka operasi memungkinkan dapat terjadi infeksi apabila tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan data yang ada pada kasus Ny'A' dengan riwayat ketuban pecah dini dapat diidentifikasi masalah potensial yaitu masalah terjadi infeksi. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny.A nampak ada kesamaan.

D. Tindakan Emergency / Kolaborasi

Berdasarkan data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa ibu dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada ibu post sectio sesarea dengan riwayat ketuban pecah dini tindakan segera dilakukan apabila ada perdarahan post operasi, tetapi pada studi kasus Ny'A' tidak ditemukan indikasi untuk melakukan tindakan segera atau kolaborasi, mengingat keadaan ibu tidak mengalami perdarahan. Dengan demikian ada kesamaan antara tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada

studi kasus di lahan praktek dan ini berarti tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

E. Rencana Tindakan / Intervensi Asuhan Kebidanan

Pada manajemen kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien serta hubungannya dengan masalah yang dialami klien, dan juga meliputi antisipasi dengan bimbingan terhadap klien, serta konseling. Rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan, diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Pada Ny.A dengan post sectio sesarea dengan riwayat ketuban pecah dini, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah potensial yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu istirahat yang cukup, anjurkan ibu makan makanan yang bergizi, anjurkan ibu untuk mobilisasi dini, beri tentang penjelasan personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basah /kotor, jelaskan penyebab nyeri, observasi keadaan luka, observasi pemberian infus, observasi kandung kemih, dan penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik, dan vitamin.

Dari rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan pada kasus ini ada kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada.

F. Melaksanakan Tindakan Asuhan Kebidanan

Penatalaksanaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan

praktik pada perawatan luka post operasi caesarea, pelepasan jahitan, dan nyeri.

Pada studi kasus Ny'A' dengan post operasi riwayat ketuban pecah dini, semua tindakan yang direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang nifas di RSIA Bahagia.

1. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Pada tinjauan kebidanan evaluasi merupakan tingkat akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan. Mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan criteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan tercapai atau belum tercapai. Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: luka insisi/operasi kering, nyeri pada daerah bekas operasi berkurang, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan tanda-tanda infeksi tidak ditemukan seperti merah bengkak, nyeri, dan panas.

Berdasarkan studi kasus Ny'A' ibu post sectio sesarea dengan riwayat ketuban pecah dini tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny. A secara garis besar ada persamaan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan ibu post Sectio sesarea pada Ny'A" dengan riwayat ketuban pecah dini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Ketuban Pecah Dini (KPD) yakni mulai pecahnya ketuban sampai 1 jam setelah ketuban pecah dini terjadi di atas usia kehamilan 37 minggu, sedangkan di bawah 36 minggu tidak terlalu banyak. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi KPD adalah dengan cara operasi sesar.
2. Untuk mencegah timbulnya komplikasi pada ibu post sectio sesarea dapat dicegah dengan peningkatan mutu pelayanan baik itu masa kehamilan, persalinan dan nifas. Diantaranya observasi vital sign, observasi luka jahitan, optimal dalam pemberian nutrisi yang adekuat, pengobatan dan kolaborasi dengan petugas fisioterapi untuk pemeriksaan lanjut.
3. Pada ibu post sectio sesarea apabila tidak di tangani dengan baik akan mengakibatkan infeksi pada luka bekas operasi dan berbagai komplikasi lainnya.

4. Pada pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “A” mulai dari pengkajian sampai tahap akhir tidak ditemukan adanya hambatan karena adanya kerjasama antara pasien dengan petugas kesehatan sehingga semua tindakan dapat terlaksana dengan baik.
5. Pendokumentasian sangat penting dilakukan pada setiap tahap dalam manajemen kebidanan, karena merupakan bukti pertanggungjawaban bidan terhadap asuhan kebidanan yang telah diberikan terhadap pasien.

B. Saran

- a. Diperlukan keterlibatan keluarga untuk lebih memfokuskan perhatian pada pasien terhadap keluhan ibu, dan segera membawa ke rumah sakit terdekat.
- b. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan, diharapkan senantiasa berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional.
- c. Seorang bidan hendaknya menganggap semua ibu nifas mengalami resiko komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu. Jadi diharapkan bidan mampu mendeteksi dini adanya tanda bahaya dan menganjurkan ibu dan keluarga segera ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.
- d. Sebagai bidan diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas lain (dokter, perawat, dan sesama bidan) untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan yang lebih baik dan lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Thia. Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny. S PI A0 dengan Post Sectio Caesaria di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 2014. KTI.

A Note. *Obstetrics*. Edisi 2013.

Bahiyatun. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal (askeb 3)*. Yogyakarta: Nuha Medika 2014.

Fadlun ahmada feryanto. *Asuhan kebidanan patologis*. Jakarta: salemba medika, 2011.

Heriyani, Reni. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Dan Menyusui*. Jakarta: CV Trans Info Media, 2012.

Hidayat Rika Dewi. Asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada Ny. S post operasi sectio caesaria atas indikasi ketuban pecah dini di ruang kenanga RSUD Karanganya. Surakarta: 2012. KTI

Histriani, Lila. Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Pada Ny S PI A0 dengan Post Sectio Cesarea di Bangsal Dahlia RSUD Pandanarang Bayolu Tahun. Surakarta: 2012. KTI

Jannah Nurul, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Nan-Kehamilan yogyakarta: CV Offset Andy, 2012.

Kemenskes Kematian Ibu. <File:///C:/users/user/downloads/infodatin-ibu.pdf>. diakses pada tanggal 28 februari 2016.

Lutfiana, Nurul. Asuhan Keperawatan pada Ny. N dengan Post Operasi Sectio Caesaria Indikasi Ketuban Pecah Dini di sertai Presentasi Bokong di Ruang An-nisa RS. PKU Muhammadiyah. Surakarta. 2013. KTI.

Martalia, Dewi, *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Marmi. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Puerpureum Care*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1012.

- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Sayik. *Masa Haid Yang Penuh Pahala*. Solo: As-Salam, 2015.
- Muntoha, Suhartono, Nur Endah. *Hubungan Antara Riwayat Paparan Asap Rokok Dengan Kejadian Ketuban Dini*. <File:///C:/Users/User/Downloads/5966-12816-1-sm.pdf>. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2014).
- Nugroho Taufan. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (askeb 3)*. Yogyakarta: Nurha Medika, 2014.
- Nur Rahmawati, *Eni. Ilmu Praktis Kebidanan*. Victori Iinti cipta, 2011.
- Nugroho, Ttaufan. *Buku Ajar Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha. Medika, 2011.
- Wiradarma, Kardana I md. Darma Artana I Wyn. Resiko Asfiksia Pada Kebidanan Pada Ketuban Pecah Dini. <http://saripediatri.idai.or.id/pdfile/14-5-9.pdf>. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2016).
- Zulfan Arifin, Annisa. Asuhan Keperawatan Dengan Ppost Section Indikasi Ketuban Pecah Dini. <http://Eprinst.ums.ac.id/34136/7/bab%201.pdf> Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2016).
- Purwoastuti Endan, Elisabeth Eiwi Walyani. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan Jakarta*: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Raito, Juraida Dkk. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Dan Deteksi Dini Komplikasi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGGC, 2012s.
- Shihab M Quraish, *Tafsir AL-Mishbah*. Jakarta. Lenteran Hati. 2009.
- Syahriar, Alfa. *Kumpas Tuntas Dara Kebiasaan Wanita Haid Istihhadah Nifas* Solo: Zamzan, 2011.
- Saleha, Sitti. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika, 2013.m,
- Solikhah, Umi. *Asuhan keperawatan Gangguan Kehamilan Persalinan Dan Nifas*. Yogyakarta: nuhad medika, 2012.
- Siwi Walyani Elisabeth, Ending Purwoastuti. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2015.

System Reproduksi Fisiologi Dan Itegrasinya Berdasarkan Al-Quraan Dan Hadist. Makassar Alauddin University Press 2012.

Sumelung, Veibymiaty, dkk. *Faktor-faktor yang Berperan Meningkatkan Angka Kejadian Sectio Caesaria di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahunan.* Manado, 2014. KTI.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : FKIK/PP.00.9/ ²⁰¹⁷A /2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 29 Juni 2016

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Diniatul Munawarah
NIM : 70400113009
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Sectio Sesarea Dengan Ketuban Pecah Dini di RSIA Bahagia Tahun 2016.
Dosen Pembimbing : Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.

NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 9505/S.02.P/P2T/07/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Pengumpulan Data

KepadaYth.
Direktur RSIA Bahagia Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.0.9/3817A/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : DINIATUL MUNAWARAH
Nomor Pokok : 70400113009
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Laporan, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU POST SECTIO SESAREA DENGAN RIWAYAT KETUBAN PECAH DINI TAHUN 2016 "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Juli s/d 14 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Juli 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Peringgal

Nomor : FKIK/PP.00.9/2216/2016

Makassar, 14 Maret 2016

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Direktur RSIA Bahagia
di-

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Semester VI (Enam) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Diniatul Munawarah
NIM	: 70400113009
Judul	: Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Partum Dengan Ketuban Pecah Dini Post SC di RSIA Bahagia.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



Bahagia
rumah sakit ibu dan anak

SURAT KETERANGAN
Nomor : 301/RSIA-B/VIII/2016

Berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis-Pelayanan Perizinan Terpadu No. 9505/S.02.P/P2T/07/2016 Tanggal 13 Juli 2016, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bahagia, menerangkan bahwa :

Nama : Diniatul Munawarah
Nomor Pokok : 70400113009
Program Studi : Kebidanan
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Gowa
Judul : "Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Sectio
Sesarea Dengan Riwayat Ketuban Pecah Dini Tahun
2016"

telah melakukan Pengumpulan Data/Penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bahagia pada tanggal **14 Juli sampai dengan 14 Agustus 2016**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Agustus 2016

An Direktur RSIA Bahagia,
Wadir Umum dan SDM



Drs. H. A. Sumange Alam, Msi f.

Tembusan Yth :

1. Dekan Fak.Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864923. Makassar 90221

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400. Samata-Gowa 92113

WAKTU PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : Diniatul Munawarah
NIM : 70400113009
JUDUL : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Sectio Sesarea pada Ny'A di RSIA BAHAGIA Tahun 2016.

No	NAMA	JABATAN	HARI/ TANGGAL	WAKTU	TANDA TANGAN
1.	Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb	Pembimbing	Rabu 16-11-2016	14.00 Wita	
2.	Rifqah Azizah As, S.keb,Bd	Penguji I	Rabu 16-11-2016	14.00 Wita	
3	Dra. Hartini, M.Hi	Penguji II	Rabu 16-11-2016	14.00 wita	

Samata-Gowa, November 2016
Pembimbing

Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb
NIP. 19760126 200604 2 001

BIODATA PENELITI



A. Identitas Peneliti

Nama lengkap : Diniatul Munawarah
NIM : 70400113009
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : KORE, 13 Mei 1994
Agama : Islam
Alamat : Samata Gowa
No. Hp : 082340382423
Email : diniatul.munawarah13@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SDN 1 Piong Kecamatan Sanggar NTB
2. Tahun 2007-2010 : SMPN 1 Piong Kecamatan Sanggar NTB
3. Tahun 2010-2013 : SMAN 1 Sanggar NTB
4. Tahun 2013-2016 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sul-Sel.