

**UJI AKTIVITAS MUKOLITIK EKSTRAK ETANOL DAUN TEMBELEKAN
(*Lantana camara* Linn.) SECARA *IN VITRO***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MIFTAH ANNUR
NIM. 70100111043

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Annur
NIM : 70100111043
Tempat/Tanggal Lahir : Allu/ 19 September 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : BTN. Andi Tonro Permai Blok B3 No.9 Sungguminasa,
Gowa.
Judul : Uji Aktivitas Mukolitik Ekstrak Etanol Daun Tembelean
(*Lantana camara* Linn.) secara *In vitro*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi inibenar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Maret 2015

Penyusun,

MIFTAH ANNUR
NIM. 70100111043

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Mukolitik Ekstrak Etanol Daun Tembelean (*Lantana camara* Linn.) secara *In vitro*” yang disusun oleh Miftah Annur, NIM : 70100111043, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari tanggal 15 April 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, **15 April 2015 M**
25 Jumadil Tsaniyah 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Drs. Wahyudin G., M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. (.....)

Penguji I : Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., MA. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Uji Aktivitas Mukolitik Ekstrak Etanol Daun Tembelekan (*Lantana camara* Linn.) secara *In vitro*”** sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Strata 1 pada jurusan Farmasi fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada orang tua penulis, Bapak Hamzah Tamar, S.Pd. dan Ibu Sitti Hamsinah, S.Pd. atas kasih sayang dan dukungan baik itu moril maupun materil sehingga penulis dapat berada pada titik pencapaian saat ini.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A. selaku Pgs. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Dr. dr. H. Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
8. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. selaku pembimbing kedua atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
9. Ibu Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberi masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., MA. selaku penguji agama yang telah memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah Swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

12. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi dan Laboran Jurusan Kimia Sainstek UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.

13. Kepada Pak Abdul Kadir dan Pak Imam yang telah membantu dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis teman-teman farmasi angkatan 2011 (Effervescent) khususnya kelas Farmasi A, kakak-kakak angkatan 2005-2010, dan adik-adik angkatan 2012-2014 Farmasi UIN Alauddin Makassar.

15. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang memberikan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis disetiap waktu dan selalu menjadi penyemangat terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, 20 Maret 2015

Penulis,

Miftah Annur

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman Tembelekan.....	9
B. Sistem Pernapasan	10
C. Batuk.....	13
D. Ekstraksi.....	16
E. Mukus	19
F. Mukoaktif.....	21
G. Asetilsistein.....	24
H. Viskositas.....	25
I. Pandangan Islam tentang penelitian tanaman obat	31

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	40
	B. Pendekatan Penelitian	40
	C. Instrumen Penelitian	40
	D. Metode Pengumpulan Data.....	41
	E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Hasil.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	45
	B. Pembahasan	46
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	52
	B. Implikasi Penelitian	52
	KEPUSTAKAAN	53
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pelarut dalam proses ekstraksi	19
2. Hasil pengukuran waktu alir	45
3. Hasil pengukuran kerapatan	46
4. Hasil penentuan viskositas	46
5. Penentuan kerapatan dengan metode piknometer	61
6. Hubungan waktu alir dan kerapatan.....	62
7. Hubungan antara sampel uji dan viskositas	63
8. Analisis varians viskositas beserta F tabelnya	66
9. Analisis RAL, BNT hubungan viskositas dengan sampel uji	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja ekstraksi.....	57
2. Skema kerja penyiapan sampel uji.....	58
3. Skema kerja pengukuran waktu alir.....	59
4. Skema kerja pengukuran kerapatan	60
5. Pengukuran kerapatan sampel uji	61
6. Perhitungan viskositas.....	62
7. Analisis Statistik viskositas sampel uji dengan RAL.....	63
8. Analisis varians dengan F tabelnya.....	66
9. Analisis RAL, BNT Hubungan viskositas dengan sampel uji	68
10. Tanaman tembelekan (<i>Lantana camara</i>)	69
11. Ekstraksi dengan metode maserasi.....	70
12. Penyiapan sampel uji.....	71
13. Pengukuran waktu alir.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jenis-jenis ikatan pada mukus.....	23
2. Struktur asetilsistein.....	24
3. Mekanisme kerja asetilsistein	25
4. Kurva dari beberapa sifat aliran	27
5. Viskometer <i>Ostwald</i>	28
6. Tanaman tembelekan (<i>Lantana camara</i> Linn.).....	69
7. Proses ekstraksi dengan metode maserasi.....	70
8. Penyiapan sampel uji.....	71
9. Pengukuran waktu alir dengan viskometer <i>Ostwald</i>	72

ABSTRAK

Nama : Miftah Annur

Nim : 70100111043

Judul : Uji Aktivitas Mukolitik Ekstrak Etanol Daun Tembelean (*Lantana camara* Linn.) secara *in vitro*

Telah dilakukan penelitian mengenai uji aktivitas mukolitik ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.). Daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) secara tradisional telah digunakan masyarakat Indonesia sebagai obat batuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak dari daun tembelean sebagai mukolitik secara *in vitro* dan mengetahui kisaran konsentrasi yang memberikan efek setara dengan efek asetilsistein 0,1% serta pandangan Islam tentang pemanfaatan daun tembelean sebagai pengobatan. Penelitian ini meliputi maserasi dan uji aktivitas mukolitik dari ekstrak. Uji aktivitas mukolitik meliputi penentuan waktu alir menggunakan viskometer *Ostwald* dan penentuan kerapatan sampel uji menggunakan piknometer. Aktivitas mukolitik dilakukan secara *in vitro* terhadap penurunan viskositas mukus sapi. Larutan uji dibuat dengan konsentrasi ekstrak 0,1; 0,5; dan 1% b/b dicampur dengan larutan mukus-dapar fosfat pH 7 20:80 b/b. larutan uji diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit. Asetilsistein 0,1% digunakan sebagai kontrol positif. Kontrol negatif adalah larutan mukus tanpa ekstrak dan kontrol positif asetilsistein. Nilai viskositas yang diperoleh dianalisis statistik menggunakan uji ANAVA, dilanjutkan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95% dan 99% untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari daun tembelean dengan konsentrasi 0,1; 0,5; dan 1% telah menunjukkan aktivitas mukolitik secara *in vitro*. Ekstrak etanol dari daun tembelean konsentrasi 0,5% memiliki aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1% secara *in vitro*. Dalam Islam, pemanfaatan daun tembelean dianjurkan untuk pengobatan sebab Allah SWT. menciptakan segala sesuatu termasuk tumbuh-tumbuhan tidak sia-sia.

Kata Kunci : Daun tembelean (*Lantana camara* Linn.), ekstraksi, mukolitik.

ABSTRACT

Name : Miftah Annur

Nim : 70100111043

Title : Determination of Ethanol Extract Tembelekan Leaves (*Lantana camara* Linn.) to Mucolytics Activities *in vitro*

Ethanol extract of the tembelekan leaves mucolytic activity has been studied. Tembelekan leaves (*Lantana camara* Linn.) has been traditionally used by Indonesian people to treat cough. This study aimed to determine the effect of lantana leaves as mucolytic *in vitro*, determine the range of concentrations of the extract equivalent to acetylcysteine effect of 0,1 % and the perspective Islam of advantage of tembelekan leaves to treatment. This study included maceration and mucolytic activity test of extract. Mucolytic activity test included determination of flow time using viscometer Ostwald and determination of samples density using pycnometer. Mucolytic activity assay performed *in vitro* to decrease the viscosity of mucus cow. Test solutions were made with concentrations of extract 0,1; 0,5; and 1% b/b mixed with 20:80 b/b mucosephosphat buffer pH 7. The solution incubated at 37°C during 30 minute. Acetylcysteine 0,1 % was used as a positive control. Negative control was mucosa solution without extract and positive control was asetilsistein. Viscosity values were analyzed statistically using ANOVA test, followed by the LSD test level of 95% and 99% to determine differences between treatment groups.

The results showed that the ethanol extract of tembelekan leaves with a concentration of 0,1; 0,5; and 1% has been demonstrated *in vitro* mucolytic activity. Ethanol extract of tembelekan leaves with a concentration of 0,5% have mucolytic activity equivalent to 0,1% acetylcysteine *in vitro*. Islam sees utilizaton of leaf tembelekan recommended for treatment because Allah SWT. created everything including the plants are not in vain.

Keywords: Tembelekan Leaves (*Lantana camara* Linn.), extraction, mucolytic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zat yang diturunkan dari tanaman untuk dijadikan obat menarik perhatian sekarang ini. World Health Organization (WHO) yang merupakan badan PBB yang bergerak dibidang kesehatan mendorong, merekomendasikan, dan mempromosikan obat tradisional atau herbal dalam program perawatan kesehatan karena obat ini mudah tersedia dengan biaya rendah dan aman (Pandey dan Triphati, 2013: 115).

Data dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian RI tahun 2009-2010 menyatakan bahwa penyakit saluran pernapasan termasuk dalam 10 penyakit dengan pasien terbanyak baik rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan RI, 2010).

Faktor penyebab adanya gangguan pada sistem pernapasan adalah paparan polusi udara, penggunaan tembakau (merokok), alergen, umur, dan faktor genetik (WHO, 2007:37-38).

Sekresi mukus adalah bagian dari bentuk perlawanan dari saluran pernapasan dengan jumlah yang disekresi bervariasi. Mukus berfungsi untuk menahan bakteri, partikel asing, dan senyawa iritan. Hipersekreasi mukus dapat terjadi bila terdapat penyakit pada saluran pernapasan seperti bronkhitis, penyakit paru obstruktif kronis, dan asma sebagai bentuk respon inflamasi (Shale dan Lonescu, 2004: 797).

Mucus yang berlebihan terjadi akibat perubahan patologis sel-sel penghasil mukus di bronkus. Silia yang melapisi bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsi serta metaplasia. Perubahan pada sel penghasil mukus dan sel silia ini mengganggu pergerakan mukosiliaris dan menyebabkan akumulasi mukus kental dalam jumlah besar yang sulit dikeluarkan dari saluran napas. Mukus berfungsi sebagai tempat perkembangan mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. Proses inflamasi terjadi dan proses ekspirasi akan terhambat akibat mukus yang kental (Corwin, 2009: 572).

Batuk merupakan refleksi fisiologis baik waktu sehat maupun sakit yang bermanfaat untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran pernapasan dari dahak, zat-zat asing, dan unsur infeksi. Batuk yang disertai dengan peradangan pada saluran pernapasan biasanya karena penyakit asma dan bronkhitis akan menyulitkan pengeluarannya disebabkan mukus yang kental sehingga dibutuhkan obat pengencer dahak salah satunya obat mukolitik. Mukolitik ialah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan mencegah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum.

Tanaman tembelean (*Lantana camara* Linn.) digunakan sejak dahulu secara tradisional untuk mengobati luka, gatal, ulkus, bengkak, demam, katarak, reumatik, flu, sakit kepala, batuk berdahak, asma, bronkhitis, dan hipertensi (Seth *et al.*, 2012: S1407). Masyarakat menggunakan tanaman tembelean sebagai obat batuk berdahak dengan cara merebus daunnya sekitar 5-10 lembar dengan air satu gelas hingga air yang tersisa hanya setengah gelas. Diminum tiga kali sehari hingga batuk mereda.

Penelitian mengenai khasiat tanaman tembelakan telah dilakukan antara lain aktivitas antioksidan, antibakteri, antipiretik, larvasida, insektisida, antimikroba, luka bakar, dan antihiperqlikemik (Saxena *et al.*, 2012: 1551). Ekstrak daun tembelean telah diteliti memiliki aktivitas sebagai antifungi, antibakteri, nematisida, antelmentik, dan antikanker (Seth *et al.*, 2012: S1407).

Tanaman tembelean (*Lantana camara* Linn.) yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah salah satu jenis tumbuh-tumbuhan di bumi yang Allah SWT. ciptakan dan menunjukkan bukti kebesaran-Nya serta dapat menjadi sumber penelitian yang terus berkembang saat ini, salah satunya untuk pengobatan dari jenis penyakit baik yang bersifat ringan, maupun kronis.

Allah SWT. telah menjelaskan dalam QS Asy-syu‘arā’/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2013: 367).

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan tumbuh-tumbuhan di bumi dengan segala manfaatnya. Manfaat yang terkandung dalam berbagai macam tumbuh-tumbuhan dapat diketahui dengan melakukan penelitian, salah satunya daun tembelakan untuk pemanfaatan sebagai obat-obatan. Allah SWT. mengisyaratkan kepada manusia untuk memperhatikan dalam arti

melakukan penelitian, mengembangkan, dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam.

Daun tembelean telah digunakan secara tradisional untuk mengobati batuk, namun dasar ilmiah penggunaan tanaman tersebut untuk mengobati batuk belum banyak dikaji. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan pengujian aktivitas mukolitik ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) dengan menggunakan mukus usus sapi yang memiliki komposisi hampir sama dengan dahak manusia sehingga penurunan viskositas (pengenceran) mukosa usus sapi yang ditunjukkan dapat disamakan dengan pengenceran dahak pada manusia dan dibandingkan dengan aktivitas mukolitik sediaan asetilsistein.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ekstrak daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) memiliki aktivitas mukolitik?
2. Berapa konsentrasi ekstrak daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) memiliki aktivitas sebagai mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1%?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang pemanfaatan daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) sebagai bahan pengobatan?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Mukolitik adalah obat yang dapat menurunkan kekentalan sekret untuk memudahkan pembersihan saluran napas dengan cara memutus ikatan disulfida mukus.
- b. Mukus adalah sekret yang dihasilkan oleh sel-sel goblet pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Pada saluran pernapasan berfungsi untuk menangkap partikel asing yang masuk untuk dikeluarkan atau ditelan.
- c. Ekstraksi adalah proses penyarian untuk menarik senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman atau hewan
- d. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besarnya gaya gesek antarmolekul suatu zat cair, semakin besar gaya gesek antarmolekulnya, maka semakin besar viskositasnya.
- e. Metode maserasi adalah metode penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama beberapa hari pada suhu kamar.
- f. Etanol adalah salah satu jenis pelarut yang dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar. Etanol yang umum digunakan adalah etanol yang bercampur dengan air (etanol 70%) yang sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui aktivitas daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) sebagai mukolitik secara *in vitro* menggunakan mukus usus sapi dengan mengukur viskositas mukus yang telah diberi perlakuan.

D. Kajian Pustaka

1. Niswa (2009) dalam penelitiannya telah menguji aktivitas mukolitik infusa daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) secara *in vitro* menggunakan mukus usus sapi. Penyiapan infusa dilakukan dengan pemanasan pada suhu 90°C dan diperoleh hasil infusa daun tembelean pada konsentrasi 2,5%-55 memiliki aktivitas mukolitik yang setara dengan 5% asetilsistein.

2. Nurwahidah (2010) telah melakukan penelitian dengan menguji aktivitas antibakteri ekstrak daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* dan diperoleh hasil ekstrak daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) dapat menghambat bakteri pada konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%.

3. Gemini Alam, dkk. (2013) telah melakukan penelitian skrining komponen kimia dan uji aktivitas mukolitik ekstrak rimpang bangle (*Zingiber purpureum* Roxb.) terhadap mukosa usus sapi secara *in vitro*. Penelitian ini telah dilakukan hingga tahap skrining komponen kimia dan diketahui bahwa fraksi I memiliki aktivitas mukolitik yang paling baik dengan deteksi golongan senyawa terpenoid.

4. Chowdury, dkk. (2007) telah melakukan penelitian tentang kandungan kimia dari minyak atsiri daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) dengan analisis menggunakan

metode kromatografi gas (GC-MS) dan hasil analisis menunjukkan total identifikasi sebanyak 62 senyawa dari minyak atsiri daun tembelean (*Lantana camara* Linn.). senyawa utama yang teridentifikasi dari 95% total minyak antara lain caryophyllene (13,57%), α -caryophyllene (11,76%), germacrene D (10,88%), isocaryophyllene (9,59%), γ -muurolene 96,85%), γ -elemene (5,65%) yang merupakan senyawa turunan triterpenoid.

5. Ami Afiyati dan Mimiek Murrukihadi (2013) telah melakukan penelitian tentang aktivitas mukolitik dari bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) varietas merah tunduk pada fraksi yang mengandung alkaloid dan hasil pengukuran viskositas menunjukkan bahwa fraksi alkaloid konsentrasi 0,6% dan 0,8% memiliki aktivitas mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1%. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa senyawa alkaloid dapat memberikan efek mukolitik pada konsentrasi tertentu.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui aktivitas mukolitik ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) terhadap mukus usus sapi.
2. Menentukan konsentrasi ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) sebagai mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1%.
3. Mengetahui pandangan Islam tentang pemanfaatan daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) sebagai bahan pengobatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

1. Sebagai sumber rujukan untuk penelitian lanjutan dan peneliti lainnya tentang aktivitas ekstrak daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) sebagai mukolitik.
2. Sebagai data ilmiah kepada masyarakat maupun industri obat dalam penggunaan daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) yang memiliki aktivitas sebagai mukolitik.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Tembelekan

1. Klasifikasi (Sankaran, 2007)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Lamiales
Famili	: Verbenaceae
Genus	: Lantana
Spesies	: <i>Lantana camara</i> Linn.

2. Nama Daerah

Tahi ayam (Sumatera), Kembang telek (Jawa), Kembang satek (Sunda), Kamanco (Madura), dan Tai Jangang (Makassar) (Redaksi Agromedia, 2008: 240).

3. Morfologi

Lantana camara Linn. Merupakan tanaman perdu, tinggi \pm 2 m. tanaman ini dapat tumbuh 1-3 meter dan lebar tanaman hingga 2,5 meter.

- Batang berkayu, segi empat, berduri, bercabang, berambut, masih muda hijau setelah tua berwarna coklat, bau sangat kuat.
- Daun memiliki panjang 5 cm sampai 8 cm, lebar 3 cm sampai 5 cm, ujung daun runcing atau meruncing, pangkal daun tumpul atau meruncing, pinggir daun

bergerigi, tulang daun menyirip, jelas menonjol pada permukaan atas, permukaan atas berambut banyak, jika diraba terasa kasar dan permukaan bawah berambut jarang (Soesilo, *et.al.*, 1989: 102).

- c. Bunga tanaman tembelakan majemuk, bentuk bulir, daun pelindung lonjong panjang ± 5 mm, kelopak bentuk lonceng, mahkota bagian dalam berambut, bertaju empat sampai lima, ungu, benang sari empat, ujungnya melekuk ke bawah.
- d. Buah buni, bulat, tangkai berbulu, diameter $\pm 2,5$ cm, masih muda hijau setelah tua berwarna hitam, biji bulat, hitam.
- e. Akar tunggang, berwarna kuning kecokelatan (Heyne, 1987: 1096).

4. Kandungan Kimia

Tanaman tembelakan (*Lantana camara* Linn.) terutama setiap bagian tanaman telah dipelajari kandungan kimianya dan semua studi penelitian mengungkapkan adanya terpenoid, steroid dan alkaloid sebagai komponen utama (Seth, *et.al.*, 2012: S1407).

B. Sistem Pernapasan

1. Anatomi Sistem Pernapasan

Struktur utama sistem pernapasan adalah saluran udara pernapasan, terdiri dari saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah, serta paru. Jalan napas terdiri dari hidung bagian luar (*external nose*), hidung bagian dalam (*Internal nose*), sinus paranasal, faring, dan laring, sedangkan saluran napas meliputi trakea, bronki, dan bronkiolus. Udara masuk melalui hidung dan melewati faring. Faring dibagi menjadi dua yakni nasofaring dan orofaring. Pada nasofaring terdapat jaringan limfoid

yang membentuk lingkaran. Laring terdiri atas kartilago, pita suara, otot, dan ligamentum yang menjaga agar jalan napas terbuka selama bernapas dan menutup ketika menelan. Trakea yang panjangnya antara 10-12 cm, dibentuk oleh sekitar 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C dan berakhir ketika bercabang dua menjadi bronkus. Bronkus utama kanan lebih pendek dibandingkan bronkus utama kiri. Dinding bronkus besar dan bronkus kecil mengandung lendir mukosa. Diameter bronkus utama sekitar 2 cm sedangkan bronkiolus 1 mm (Djojodibroto, 2009: 6,10-11,15).

Paru-paru terbagi menjadi dua yaitu paru kanan dan paru kiri. Paru kanan mempunyai tiga lobus sedangkan paru kiri mempunyai dua lobus. Pada ujung paru, terdapat lebih kurang 300 juta gelembung alveoli dengan diameter setiap gelembung lebih kurang 0,3 mm (Djojodibroto, 2009: 15,20).

2. Mekanisme Pertahanan Sistem Pernapasan

Paru merupakan organ di dalam tubuh yang berhubungan langsung dengan udara atmosfer. Dalam 24 jam, alveoli akan menampung udara sebanyak 11.520 liter sehingga paru mempunyai kemungkinan terpapar bahan atau benda yang berbahaya, seperti partikel debu, gas toksik, dan kuman penyakit yang terdapat di udara. Oleh karena itu, paru memerlukan mekanisme pertahanan untuk melindunginya dari pengaruh buruk bahan yang mengenainya. Mekanisme pertahanan paru merupakan sebagian kecil dari keseluruhan mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi paru antara lain pembersihan mukosiliaris dan mekanisme imun pada saluran pernapasan (Djojodibroto, 2009: 46).

Bersihan mukosiliaris merupakan mekanisme pembersihan partikel asing oleh mukus dan silia agar partikel tersebut tidak mencapai alveolus. Mukus menangkap partikel asing tersebut dan dikeluarkan oleh gerakan silia, struktur seperti rambut halus yang melapisi saluran pernapasan. Silia mencambuk tanpa henti, secara perlahan menggerakkan lendir keluar dari paru. Lendir dan partikel yang terperangkap didalamnya kemudian akan ditelan atau dibatukkan keluar tubuh (WHO, 2002: 57).

Mekanisme pertahanan sistem pernapasan lainnya adalah respon imun. Dalam keadaan normal, ada beberapa polimorfonuklear (PMN) di saluran pernapasan dan alveoli. Jika mikroorganisme yang masuk tidak dapat diatasi oleh makrofag, mikroorganisme akan berkembang biak di alveoli dan menyebabkan pneumonia dan proses inflamasi yang dikeluarkan oleh makrofag, PMN ditarik untuk datang dan segera memfagositosis serta membunuh mikroorganisme. Ada pula zat yang sangat penting yang terdapat pada sekret sistem pernapasan, yaitu imunoglobulin dan antiprotease. Mekanisme imun humoral di dalam sistem pernapasan tampak dalam dua bentuk antibodi berupa imunoglobulin IgA dan IgG. Antibodi ini terutama IgA penting sebagai pertahanan di nasofaring dan saluran pernapasan bagian atas. IgG banyak ditemukan di bagian distal paru. IgG berperan dalam menggumpalkan partikel, menetralkan toksin yang diproduksi oleh virus dan bakteri, mengaktifkan komplemen, dan melisis bakteri gram negatif (Djojodibroto, 2009: 49-50).

C. Batuk

1. Mekanisme Batuk

Batuk merupakan mekanisme refleksi yang sangat penting untuk menjaga jalan napas tetap terbuka (paten) dengan cara menyingkirkan hasil sekresi lendir yang menumpuk pada jalan napas. Tidak hanya lendir yang akan disingkirkan oleh refleksi batuk tetapi juga gumpalan darah dan benda asing. Batuk juga merupakan gejala tersering penyakit pernapasan. Jalan napas dapat menjadi hiperaktif sehingga hanya dengan iritasi sedikit saja sudah dapat menyebabkan refleksi batuk. Daerah pada jalan napas yang peka terhadap rangsangan batuk adalah laring, trakea, dan bronkus utama (Djojodibroto, 2009: 54).

Mekanisme terjadinya refleksi batuk dimulai dari terangsangnya bagian-bagian yang peka pada saluran pernapasan. Rangsang ditangkap oleh sensor taktil dan kemoreseptor aferen melalui nervus vagus menuju pusat pernapasan (medula oblongata), misal rangsang yang berupa benda asing yang memasuki saluran pernapasan bawah. Selanjutnya pusat pernapasan memerintahkan tubuh untuk melakukan refleksi batuk agar benda asing tersebut dapat dikeluarkan. Tubuh merespon dengan menginspirasi udara ke paru-paru, menutup epiglotis, menutup pita suara agar udara inspirasi udara ke paru-paru. Udara yang tertahan menimbulkan tekanan dalam alveolus sehingga otot-otot abdomen dan interkostalis interna berkontraksi dengan kuat lalu secara mendadak terjadilah ekspirasi. Ekspirasi yang kuat mendadak membuat epiglotis dan pita suara terbuka yang menyebabkan udara dengan cepat melewati bronkus besar dan trakea sehingga benda-benda asing terbawa keluar (Somantri, 2007: 16).

Bronkus dan trakea sangat peka dengan benda asing ataupun iritasi lain, sehingga bisa menimbulkan refleksi batuk. Bronkiolus terminalis dan alveolus terutama peka terhadap rangsang kimia korosif seperti gas sulfur dioksida dan klor. Impuls aferen dari saluran pernapasan terutama berjalan melalui nervus vagus ke *medulla oblongata*. Di sana suatu rangkaian otomatis digerakkan oleh sirkuit neuron *medulla oblongata*, sehingga menyebabkan efek-efek sebagai berikut (Muluk, 2009: 57):

- a. Mula-mula 2,5 liter udara dihirup.
- b. Kemudian epiglotis menutup, dan pita suara menutup dengan erat-erat untuk menjerat udara di dalam paru-paru.
- c. Otot perut berkontraksi dengan kuat, yang mendorong diafragma, begitu juga otot ekspirasi berkontraksi kuat, sehingga tekanan di dalam paru-paru meningkat menjadi setinggi 100 mmHg atau lebih.
- d. Pita suara dan epiglotis tiba-tiba terbuka lebar sehingga udara bertekanan tinggi di dalam paru-paru 'meletus' ke luar. Kecepatan udara ini bisa 75–100 mil/jam. Udara yang mengalir cepat ini akan membawa serta benda asing apapun yang ada di dalam bronkus dan trakea.

Makrofag alveolar merupakan pertahanan yang paling akhir dan paling penting terhadap invasi benda asing ke dalam paru-paru. Partikel-partikel kecil yang berdiameter kurang 0,5 mikron bisa masuk ke alveolus contoh asap rokok yang berdiameter kira-kira 0,3 mikron. Walaupun biasanya 2/3 dikeluarkan kembali bersama-sama udara ekspirasi dan sisanya akan dikeluarkan oleh makrofag alveolar. Makrofag alveolar merupakan sel fagositik dengan ciri-ciri khas dapat bermigrasi dan

mempunyai sifat enzimatik. Sel ini bergerak bebas pada permukaan alveolus dan bisa meliputi serta menelan benda asing/mikroba. Setelah meliputi partikel mikroba maka enzim litik yang terdapat dalam makrofag akan membunuh dan mencernakan mikroorganisme tersebut tanpa menimbulkan reaksi peradangan yang nyata. Partikel benda asing ini pun kemudian ditranspor oleh makrofag ke pembuluh lymfe atau ke bronkiolus, dimana mereka dibuang oleh kerja mukus dan silia (Muluk, 2009: 58).

2. Jenis-Jenis Batuk

Jenis batuk dapat dibedakan menjadi dua yakni batuk produktif (dengan dahak) dan batuk non-produktif. Batuk produktif merupakan suatu mekanisme perlindungan dengan fungsi mengeluarkan zat-zat asing (kuman, debu, dsb.) dan dahak dari batang tenggorok. Sedangkan batuk non-produktif bersifat kering tanpa adanya dahak sehingga terasa menggelitik di tenggorokan (Tjay dan Rahardja, 2007: 660).

Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (UKK Respirologi IDAI) mengklasifikasikan batuk menjadi dua kelompok besar yaitu batuk kronik dan batuk akut. Batuk kronik adalah batuk yang berlangsung lebih dari atau sama dengan 2 minggu sedangkan batuk akut adalah batuk yang berlangsung kurang dari 2 minggu.

3. Penyebab batuk

Bronkokonstriksi, peradangan, dan hilangnya elastisitas paru adalah tiga proses paling sering yang mengakibatkan obstruksi bronkus. Bronkokonstriksi disebabkan oleh efek asetilkolin, histamin, dan mediator peradangan yang dilepaskan di dalam

dinding bronkus. Saraf vagus melepaskan asetilkolin sebagai respons terhadap perangsangan iritan pada mukosa saluran pernapasan atas. Asetilkolin juga memicu pelepasan dari sekresi paru yang kemudian mengurangi aliran darah dengan menyumbat jalan napas. Simpatomimetik (agonis adrenergik, antagonis kolinergik) xantin dan kortikosteroid menyembuhkan atau mengurangi bronkokonstriksi (Olson, 2003:107).

Peradangan kronis disebabkan oleh paparan terhadap iritan jalan napas seperti polusi dan asap rokok. Peradangan bronkiolus mengakibatkan penyempitan jalan napas, peningkatan sekresi, proliferasi epitel, hilangnya epitel bersilia dan fibrosis. Kortikosteroid menghambat respons peradangan, tetapi penggunaannya mempunyai efek samping sistemik (Olson, 2003: 107).

D. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

Metode ekstraksi yang digunakan melibatkan pemisahan bagian-bagian aktif sebagai obat dari jaringan atau komponen aktif tanaman dengan menggunakan pelarut selektif. Selama ekstraksi, pelarut berdifusi ke dalam bahan tanaman dan melarutkan senyawa dengan polaritas yang sama (Pandey dan Tripathi, 2013: 115).

Ada beberapa metode ekstraksi yang digunakan yaitu :

1. Cara dingin (Depkes RI, 2000: 82-84)

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama, dan seterusnya.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstrak dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

3. Cara panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

b. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu 40-50°C.

c. Infus

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 15 menit.

d. Dekok

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit.

e. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam sebuah alat ekstraksi dari gelas bekerja kontinu (Voight, 1995: 570).

Penarikan senyawa aktif pada tanaman tergantung pada jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Sifat pelarut yang baik dalam ekstraksi adalah toksisitas rendah, mudah menguap pada suhu rendah, memiliki aksi preservatif, mampu menarik senyawa target pada tanaman dan ketidakmampuan pelarut menyebabkan ekstrak membentuk kompleks (Tiwari, *et.al.*, 2011: 99).

Pelarut yang umum digunakan dalam proses ekstraksi (Pandey dan Tripathi, 2013: 117) :

Tabel 1. Pelarut yang umum digunakan dalam proses ekstraksi

Air	Etanol	Metanol	Kloroform	Eter	Aseton
Antosianin	Tanin	Antosianin	Terpenoid	Alkaloid	Fenol
Amilum	Polifenol	Terpenoid	Flavonoid	Terpenoid	Flavonol
Tanin	Poliasetilen	Saponin		Kumarin	

Saponin	Flavonol	Tanin		Asam-lemak	
Terpenoid	Terpenoid	Xanthoxyllin			
Polipeptida	Sterol	Totarol			
Lektin	Alkaloid	Quassinoid			
		Lakton			
		Flavon			
		Phenon			
		Polifenol			

E. Mukus

Orang dewasa normal menghasilkan mukus sekitar 100 mL dalam saluran napas setiap hari. Mukus ini diangkut menuju faring dengan gerakan pembersihan normal silia yang melapisi saluran pernapasan. Jika terbentuk mukus yang berlebihan, proses normal pembersihan tak efektif lagi sehingga akhirnya mukus tertimbun. Bila hal ini terjadi, membran mukosa akan terangsang, dan membentuk mukus yang berlebihan, mungkin disebabkan oleh gangguan fisik, kimiawi, atau infeksi pada membran mukosa (Price, 2006).

Sputum adalah bahan yang disekresi dalam trakheobronkial yang dikeluarkan dengan cara membatukkan. Walaupun kelenjar submukosa dan sel sekretorik lapisan mukosa dalam keadaan normal dapat mensekresi cairan viskoelastik sampai 100 mL perhari, orang sehat biasanya tidak memproduksi sputum. Sekresi mukus merupakan usaha normal untuk membersihkan trakus bronkopulmonal. Sekret membentuk lapisan setebal 5 μm yang melekat langsung pada lapisan epitel yang berbulu getar. Gerakan bulu getar menyebabkan lapisan cairan yang agak mudah melekat tersebut bergerak ke

arah orofaring dengan membawa serta butir-butir yang berhasil masuk ke dalam bronkioli respiratorik melalui pernapasan. Dari orofaring, sekret tadi ditelan sehingga orang normal tidak menyadari adanya bahan tersebut. Membatukkan atau megekspektorasikan sekret trakeobronkial merupakan hal yang abnormal dan jumlah sekret yang dikeluarkan secara kasar sesuai dengan beratnya kelainan (Widman dan Frances, 1989).

Sel penghasil mukus adalah sel goblet. sel-sel goblet terdapat pada jaringan epitel saluran pencernaan dan pernapasan. Sel-sel goblet membantu pencernaan dengan mensekresikan lendir untuk membantu proses absorpsi di usus dan pada saluran pernapasan, sel-sel goblet menambah kelembaban untuk udara yang dihirup (Anderson, 1996: 53).

Dahak bronchi terdiri dari persenyawaan *mucopolysaccharida* dan *glycoprotein*, yang saling terikat melalui jembatan sulfur. Kekentalannya tergantung dari jumlah air dan jembatan disulfida tersebut. Dalam keadaan sakit, produksi dahak bertambah dan kekentalannya meningkat sehingga sukar dikeluarkan (Tjay dan Rahardja, 2007: 660).

Mukus merupakan campuran kompleks antara 95% air, 5% karbohidrat, protein, lipid, dan bahan anorganik dimana biasanya dalam bentuk sejumlah glikoprotein dan derajat keasaman yang berbeda, sedangkan komposisi mukus intestinal mamalia adalah 97,5% air, 0,8% protein, 0,73% substansi organik lain, dan 0,88% garam organik (Jeffery, 1987: 5; Brain, *et.al.*, 1997).

Mukus dalam sistem pernapasan mengandung imunoglobulin (terutama IgA), PMN, interferon, dan antibodi spesifik yang membantu dalam menahan infeksi dan mempertahankan keutuhan mukosa. IgA merupakan imunoglobulin sekretorik yang mengandung polipeptida. IgA akan disekresikan saat terpapar antigen. Sel epitelium menghasilkan SC (*Secretory Component*) yang bekerja sebagai reseptor dan pengikat IgA (Ganong, 2002: 508,622,638; Muttaqin, 2008: 21).

Mukosa pada saluran pernapasan terdapat pada lapisan hidung, lapisan nasofaring, trakea, dan bronkus. Epitel terdiri dari sel-sel tinggi, beberapa diantaranya mengeluarkan mukus, tetapi sebagian besar dilengkapi dengan silia pada permukaan lumennya. Silia-silia ini bergetar seperti cambuk dengan gerakan yang mengarah mulut atau hidung. Sel-sel yang mengeluarkan mukus tersebut menghasilkan selimut lengket yang bergerak di atas silia dan meluncur secara kontinu ke atas. Jika terhirup, mikroba cenderung akan mengenai selimut mukosa tersebut, dan kemudian digerakkan keluar dengan cara dibatukkan atau ditelan. Antibodi yang terdapat dalam sekresi akan meningkatkan kerja perlindungan (Price, 2006: 112).

F. Mukoaktif

Adanya gangguan pada saluran pernapasan merangsang pengeluaran mukus sehingga mukus yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya fungsi saluran pernapasan. Obat-obat yang memiliki aktivitas mengubah kekentalan mukus untuk memudahkan pengeluaran dahak disebut obat mukoaktif (*mukoactive*). Menurut Raja Dhar (2013), Obat mukoaktif diklasifikasikan berdasarkan mekanisme aksinya antara lain mukolitik, mukoregulator, mukokinetik, dan ekspektoran.


1. Mukolitik

Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan mencegah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum (Alam, dkk., 2013). Mukolitik merupakan zat-zat yang berdaya merombak dan melarutkan dahak sehingga viskositasnya dikurangi dan pengeluarannya dipermudah. Mukolitik efektif untuk batuk dengan dahak yang sangat kental seperti pada bronkhitis, emfisema, dan *cystic fibrosis* (Tjay dan Rahardja, 2007: 660).

Asetilsistein dan bromheksin merupakan contoh obat yang bekerja sebagai mukolitik. Bromheksin bekerja menguraikan mukopolisakarida asam dengan memperbanyak produksi lisosom dan mengaktifkan enzim hidrolitik. Asetilsistein menurunkan viskositas lendir bronkhus dengan memutuskan jembatan disulfida protein dari molekul lendir (Mutschler, 1991: 519-520).

Pada mukus terdapat berbagai macam jenis ikatan antar molekul. Ikatan antarmolekul inilah yang menjadi target pengobatan mukolitik. Dengan memutuskan ikatan-ikatan antarmolekul maka dapat mengurangi viskositas mukus.

Types of Bonds Occurring in a Mucous Gel



Gambar 1. Jenis-jenis ikatan pada mukus (Zayas, *et.al.*, 2005).

2. Mukoregulator

Mukoregulator bekerja dengan mengganggu DNA atau jaringan F-aktin untuk mengatur sekresi mukus agar tidak berlebihan. Agen mukoregulator tidak secara langsung mengubah struktur mukus, tetapi bekerja pada sel yang mensekresikan mukus. Contoh obat yang bekerja sebagai mukoregulator adalah karbosistein, antikolinergik, glukokortikoid, dan antibiotik makrolida. Karbosistein berbeda dengan asetilsistein karena senyawa ini tidak mempunyai gugus sulfhidril, dan tidak dapat bereaksi langsung dengan molekul lendir (Dhar, 2013: 24).


3. Mukokinetik

Agen mukokinetik yang disebut pula sebagai promotor batuk yang bekerja dengan meningkatkan frekuensi denyut silia dan pembersihan mukosilia pada silia sehingga merangsang terjadinya batuk. Contoh obat yang bekerja sebagai mukokinetik adalah bronkodilator dan ambroksol. (Balsamo, 2010).

4. Ekspektoran


Ekspektoran adalah obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran napas. Mekanisme kerjanya berdasarkan stimulasi mukosa lambung dan selanjutnya secara refleks merangsang sekresi kelenjar saluran napas lewat *nervous vagus*. Zat-zat ini memperbanyak produksi dahak (yang encer) sehingga mengurangi kekentalan dan mempermudah pengeluarannya dengan batuk. Obat yang termasuk golongan ini adalah *ammonium klorida* dan *gliseril guaiakolat* (Estuningtyas dan Arif, 2011: 531, Tjay dan Rahardja, 2007: 660).

G. Asetilsistein



Gambar 2. Asetilsistein (Moffat, Anthony C., *et.al.*, 2011)

Asetilsistein adalah salah satu obat yang berdaya mukolitik. Asetilsistein merupakan derivat dari asam amino alamiah sistein berkhasiat mencairkan dahak, menurunkan viskositas sekret paru dengan aktivitas mukolitiknya langsung terhadap mukoprotein dengan melepaskan ikatan disulfidanya sehingga menurunkan viskositas sputum. Aktivitas mukolitik terbesar pada pH 7-9 (Estuningtyas dan Arif, 2011: 532; Tjay dan Rahardja, 2007: 664).



Gambar 3. Mekanisme kerja asetilsistein (Allen, 2011)

H. Viskositas

Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir; makin tinggi viskositas, akan makin besar tahananannya. Zat dibagi dalam dua kategori, yakni sistem Newton dan sistem non-Newton. Klasifikasi ini berdasarkan sifat alir yang sesuai dengan hukum Newton dan tidak sesuai dengan hukum Newton (Martin, *et.al.*, 1993: 1077).

1. Sistem Newton

Semakin besar viskositas suatu cairan, akan semakin besar pula gaya per satuan luas (tekanan geser) yang diperlukan untuk menghasilkan kecepatan geser tertentu. Oleh karena itu, kecepatan geser berbanding lurus dengan tekanan geser. Besarnya viskositas suatu cairan yang beraliran Newton berbanding lurus dengan gaya persatuan luas (*shearing stress*) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu *rate of shear* tertentu (Martin, *et.al.*, 1993: 1079).

$$F' = \eta \frac{dv}{dr}$$

Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai :

$$\eta = \frac{F}{G}$$

Dimana: η = Koefisien viskositas / viskositas

$$F = \frac{F'}{A} = \text{gaya per satuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran}$$

(*shearing stress*)


$$G = \frac{dv}{dr} = \text{kecepatan gesek (*shearing rate*)}$$

dv = Perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan

dr = Jarak yang kecil sekali yang memisahkan dua bidang cairan

2. Sistem non-Newton

Sistem non-Newton adalah zat yang tidak mengikuti persamaan aliran Newton seperti emulsi, suspensi cair, salep, dan produk serupa lainnya masuk dalam kelas ini. Jika bahan non-Newton dianalisis dalam suatu viskometer berputar dan hasilnya dibuat grafik, diperoleh berbagai kurva konsistensi yang menggambarkan adanya tiga kelas aliran, yaitu aliran plastik, pseudoplastik, dan dilatan.



Gambar 4. Kurva dari beberapa sifat aliran (Martin, *et.al.*, 1993: 1081).

a. Aliran plastik

Kurva gambar 4(b) di atas menunjukkan aliran plastik. Kurva aliran plastik tidak melalui titik nol tetapi agak memotong sumbu tekanan geser (atau akan memotong jika bagiannya yang lurus diekstrapolasikan terhadap sumbu tersebut) pada titik tertentu yang dinamakan *yield value*.

b. Aliran pseudoplastik

Aliran pseudoplastik ditunjukkan oleh polimer-polimer dalam larutan, kebalikan dari sistem plastik yang tersusun dari partikel suspensi dan terflokulasi. Kurva konsistensi untuk zat pseudoplastik mulai pada titik nol (atau paling sedikit


mendekatinya pada tekanan geser yang rendah). Di sini tidak ada *yield value* seperti zat-zat Bingham. Kurva di atas tidak linear sehingga viskositas zat pseudoplastik berkurang dengan bertambahnya kecepatan geser.

c. Aliran dilatan

Sifat alir dilatan ditunjukkan pada kurva 4(d) dikarakterisasikan dengan menaikkan viskositas seiring dengan kecepatan geser, karena itu juga disebut pepadatan aliran. Aliran ini merupakan kebalikan dari aliran pseudoplastik. Aliran pseudoplastik sering dikenal sebagai *shear-thinning system*, dan aliran dilatan diberi istilah *shear-thickening system*.

Berbagai tipe viskometer yang sering digunakan untuk mengukur viskositas antara lain (Martin, *et.al.*, 1993: 1098-1106):

1. Viskometer kapiler.



Gambar 5. Viskometer *Ostwald*

Viskositas dari cairan Newton bisa ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk lewat antara dua tanda (a) hingga tanda (b) ketika ia mengalir karena gravitasi melalui suatu tabung kapiler vertikal, yang dikenal sebagai

viskometer *Ostwald*. Sejumlah cairan yang akan diukur viskositasnya dimasukkan ke dalam viskometer. Cairan kemudian diisap dengan pompa sampai diatas batas (a). Cairan dibiarkan mengalir ke bawah dan waktu yang diperlukan dari (a) ke (b) dicatat menggunakan stopwatch. Viskositas dihitung menggunakan persamaan *Poiseulle*.

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 \times t_1}{\rho_2 \times t_2}$$

Di mana : η_1 : viskositas cairan yang tidak diketahui

η_2 : viskositas cairan standar

ρ_1 : kerapatan cairan yang tidak diketahui

ρ_2 : kerapatan cairan standar

2. Viskometer bola jatuh.

Dalam tipe viskometer ini, suatu bola gelas atau bola besi jatuh ke bawah dalam suatu tabung gelas yang hampir vertikal, mengandung cairan yang diuji pada temperatur konstan. Laju jatuhnya bola yang mempunyai kerapatan dan diameter tertentu adalah kebalikan fungsi viskositas sampel tersebut. Viskometer Hoesppler merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip bola jatuh. Sampel dan bola diletakkan dalam tabung gelas dalam dan dibiarkan mencapai temperatur keseimbangan dengan air yang berada dalam jaket sekelilingnya pada temperatur konstan. Tabung dan jaket air tersebut dibalik dan menyebabkan bola berada pada puncak tabung gelas. Waktu bagi bola tersebut untuk jatuh antara dua tanda diukur dengan teliti. Keragaman bola gelas dan bola besi akan memiliki diameter berbeda-beda pula. Alat ini dapat

digunakan untuk harga viskositas dari 0,5-200 poise. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, harus digunakan bola yang menghasilkan t tidak kurang dari 30 detik.

3. Viskometer “Cup” dan “Bob”

Dalam viskometer “cup” dan “bob”, sampel dalam ruang antara dinding luar “bob” (rotor) dan dinding dalam mangkuk “cup” yang pas dengan rotor tersebut. Pada viskometer tipe *Couette*, mangkuknya yang diputar. Tarikan kental pada rotor yang disebabkan oleh sampel menyebabkan mangkuk itu berputar. Hasil putarannya sebanding dengan viskositas sampel.

4. Viskometer Cone dan Plate

Cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan ditengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruang semitransparan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar (Moechtar, 1990).

5. Viskometer *Broockfield*

Salah satu jenis alat untuk mengukur viskositas suatu cairan adalah viskometer Brookfield. Prinsip kerja viskometer ini berdasarkan rotasi dan silinder. Pada viskometer rotasi, sampel yang diukur berada dalam celah cincin diantara dua silinder yang disusun konsentris, di mana salah satu silindernya dapat berputar. Adanya kekentalan dibagian dalamnya maka pada silinder sebelah dalam akan dihasilkan momen putar, yang harganya diukur dengan menggunakan sudut putaran melingkar (Voigt, 1995: 94).

I. Pandangan Islam tentang Penelitian Tanaman Obat

1. Ilmu Pengetahuan

Islam datang untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Segala petunjuk untuk menjalani kehidupan telah diatur oleh Islam. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan bumi beserta isinya dengan tujuan dan fungsi masing-masing dan tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan-Nya. Peradaban Islam telah menciptakan para ilmuwan muslim sebagai pencetus dibidang kesehatan khususnya di bidang farmasi yang berkembang saat ini.

Firman Allah SWT. dalam QS Al-A'raf/7: 52

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Kementerian Agama RI, 2013: 157).

Jangan kira bahwa siksaan yang menimpa orang-orang kafir secara umum yang tidak dibukakan buat mereka pintu-pintu surga sebagai siksaan yang sewenang-wenang dan tanpa peringatan terlebih dahulu. Dan sesungguhnya, demi keagungan Kami, *Kami benar-benar telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang agung, yaitu al-Qur'an, yang tidak pada tempatnya mereka tolak. Betapa tidak, Kami telah menjelaskannya, yakni kitab itu mengandung aneka penjelasan dan beragam buti lagi mudah buat mereka pahami. Penjelasan itu adalah atas dasar pengetahuan Kami yang*

luas, mantap, dan menyeluruh sehingga tidak ada kekurangan atau kelemahannya; dengan demikian *ia*, yakni kitab itu, benar-benar *menjadi petunjuk* bagi siapa pun yang ingin mendapat petunjuk *dan rahmat bagi* mereka yang menyambutnya, yaitu *orang-orang yang beriman* (Shihab, 2002: 129-130).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. Maha mengetahui segala sesuatu dan sumber dari pengetahuan berasal dari Al-Qur'an. Pengetahuan tentang segala sesuatu di dunia dan akhirat telah di jelaskan dalam Al-Qur'an sehingga menjadi petunjuk bagi hamba yang beriman untuk mencapai kemaslahatan.

Allah SWT. dalam Al-Qur'an telah menempatkan ilmu pengetahuan dan kewajiban menuntut ilmu dalam kedudukan yang demikian tinggi sebab banyaknya ayat yang menyeru orang-orang mukmin untuk berpikir, mempergunakan penalaran dengan sebaik-baiknya, melakukan intizar (penyelidikan sistematis dan mendalam) tentang rahasia-rahasia alam semesta ini, dan menjadikan kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat.

Firman Allah SWT. dalam QS Az-Zumar/39: 9

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“...Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran..” (Kementerian Agama RI, 2013: 459).

Quraish Shihab seorang mufasin kontemporer menjelaskan bahwa kata *ya'lamûn* (يَعْلَمُونَ) pada ayat di atas ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya, siapa yang memiliki pengetahuan apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja, jika makna ini yang Anda pilih, harus digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan mengamalkannya dengan pengetahuannya itu.

Kemudian kata (يَتَذَكَّرُ) *yatazzakkaru* terambil dari kata *dzikr*, yakni pelajaran/peringatan. Penambahan huruf *tâ'* pada kata yang digunakan ayat ini megisyaratkan banyaknya pelajaran yang diperoleh oleh Ulul Albâb. Ini berarti bahwa selain mereka pun dapat memperoleh pelajaran, tetapi tidak sebanyak ulul Albâb (Shihab, 2002: 454-455).

Oleh karena itu, untuk mengetahui hikmah dan manfaat segala ciptaan Allah SWT. di muka bumi ini, hendaknya ada upaya *tadabbur* atau perhatian yang serius agar manusia senantiasa memperoleh pelajaran.

2. Pengobatan dalam Islam

Perkembangan ilmu pengetahuan terus melaju di masa kejayaan Islam. Beragam temuan diberbagai bidang terungkap, salah satunya dibidang pengobatan. Para ilmuwan muslim yang pertama kali menemukan beberapa obat yang saat ini telah dikembangkan oleh dunia barat. Pengobatan yang disyariatkan dalam Islam adalah

pengobatan yang bisa diteliti secara ilmiah, tidak ada unsur syirik dan tentu harus berasal dari sumber yang halal dan baik. Setiap penyakit memiliki penawarnya, oleh karena itu Allah SWT. mengisyaratkan untuk melakukan penelitian sesuai petunjuk-Nya.

Berbagai bentuk pengobatan yang diciptakan oleh Allah SWT. baik melalui tumbuh-tumbuhan maupun makhluk lainnya sebagaimana yang terjadi pada doa nabi Ayyub AS. yang diuji kesabarannya.

Firman Allah SWT. dalam QS Al-Anbiyā'/21: 83-84

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا
لِّلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang". Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.” (Kementerian Agama RI, 2013: 329).

Ayat di atas menyebut keniscayaan adanya ujian bagi setiap anugerah-Nya. Hal itu dengan memberi contoh melalui kisah nabi Ayyub AS. yang juga memperoleh limpahan karunia, tetapi diuji dengan kebinasaan dan kehancuran anugerah itu, bahkan dengan penyakit yang beliau derita. Nabi Muhammad SAW. diperintahkan agar

mengingat dan mengingatkan pula tentang kisah nabi Ayyub AS. ketika ia menyeru, yakni mengadu dan berdoa, kepada Tuhan pemelihara dan pembimbing-Nya. Beliau tidak menggerutu, tidak pula mengadu kepada selain Allah (Shihab, 2002: 102-103).

Ulama tafsir dan sejarah mengatakan bahwa pada mulanya Ayyub AS. adalah seorang lelaki yang memiliki banyak harta, berupa tanah yang luas, hewan ternak dan kambing, yaitu pada sebuah belahan bumi yang bernama Tsaniyah, di Huran, yang terletak di negeri Syam. Kemudian Allah SWT. menguji dirinya dengan kehilangan semua harta tersebut, dia diuji dengan berbagai macam ujian yang menimpa tubuhnya, sehingga tidak ada sejenkalpun dari bagian tubuhnya yang tidak ditimpa oleh penyakit kecuali hati dan lisannya. Dia selalu berzikir dengan kedua indra tersebut, bertasbih kepada Allah SWT. siang dan malam, pagi dan sore. Penyakit tersebut juga membuat seluruh setiap orang merasa jijik dengannya. Akhirnya dia diasingkan pada sebuah tempat pembuangan sampah di luar kota tempat tinggalnya, dan tidak ada yang menemaninya kecuali seorang istrinya, yang selalu menjaga hak-haknya dan membalas budi baik yang pernah dilakukan terhadap dirinya serta dorongan rasa belas kasihan padanya, dia bekerja untuk mendapat upah dari orang lain, lalu dia membelikannya makanan dengan upah itu, dengan rasa sabar melepas semua harta dan anak, bersabar dengan penyakit suami setelah hidup dalam kenikmatan dan kehormatan yang pernah disandangnya (As-Syaqawi, 2010: 4).

Allah SWT. mendatangkan pertolongan-Nya kepadanya. Allah SWT. berfirman dalam QS Sād /38: 42

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

(Allah berfirman), “Hantamkanlah kakimu; Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.” (Kementerian Agama RI, 2013: 455).

Allah SWT. memerintahkan: Pukullah bumi ini dengan kakimu. Maka diapun melaksanakan perintah Tuhan-Nya, lalu Allah SWT. memancarkan mata air yang dingin, dan Dia memerintahkan kepadanya agar dia mandi dan minum dari air tersebut, kemudian Allah SWT. menghilangkan semua penyakit dan penderitaan yang menimpa tubuhnya baik yang lahir atau batin, dan Allah SWT. menggantikannya dengan kesehatan yang sempurna baik lahir dan batin serta harta yang banyak sehingga limpahan harta menghujani dirinya.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu obat yang dapat menyembuhkan penyakit fisik maupun penyakit jiwa adalah dengan memohon kesembuhan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika menghadapi suatu cobaan baik itu berupa penyakit ataupun cobaan lain juga harus disertai dengan kesabaran seperti yang dicontohkan oleh nabi Ayyub AS. Selain itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha dalam mencari kesembuhannya dengan jalan yang benar. Allah SWT. meninggikan derajat orang-orang yang berusaha.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir RA. dari Nabi Muhammad SAW. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (صحيح رواه مسلم)

Artinya :

“Setiap penyakit ada obatnya dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta’ala” (HR. Muslim: 1729).

Rasulullah SAW. memberikan penjelasan bagi umatnya bahwa setiap penyakit harus diobati dengan obat yang tepat untuk memperoleh kesembuhan. Allah SWT. menciptakan penyakit beserta dengan obatnya serta atas izin Allah SWT. pula kesembuhan dapat dicapai. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penelitian tentang pengobatan untuk setiap jenis penyakit agar dapat diperoleh obat yang memiliki efek menyembuhkan dan mengurangi efek samping dari obat tersebut.

3. Pemanfaatan Tumbuh-tumbuhan dalam Islam

Tumbuh-tumbuhan yang tersebar di muka bumi dengan berbagai macam jenisnya merupakan salah satu objek penelitian yang paling baik untuk meneliti khasiat obat yang terkandung di dalamnya. Dalam pengobatan Islam, beberapa tanaman telah dijelaskan dalam Al-Qur’an memiliki khasiat sebagai obat.

Firman Allah SWT. dalam QS Al-An’am/6: 99 disebutkan pula bahwa:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” Kementerian Agama RI, 2013: 140).

Ayat ini membuktikan kemahakuasaan Allah SWT. dan menegaskan tentang hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan biji dan benih, atau yang berkaitan dengan langit yakni Allah SWT. bukan hanya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak *dari langit, lalu Kami*, yakni Allah, *mengeluarkan* yakni menumbuhkan *disebabkan olehnya*, yakni akibat turunnya air itu, *segala macam tubuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya*, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, *tanaman yang menghijau* (Shihab, 2002: 573-574).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. tidak semata-mata menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di bumi tanpa alasan dan maksud tertentu. Tumbuhan merupakan ciptaan Allah yang tak sesederhana yang kita pikirkan.

Sebenarnya dalam pertumbuhan sebuah tumbuhan mengalami proses-proses yang amat sangat rumit, yang tidak mudah kita pahami secara sederhana. Allah SWT. menyeru kepada manusia untuk mempelajari lebih dalam proses-proses terbentuknya buah-buahan dari tumbuhan yang menghijau dan subur karena air yang turun dari langit hingga kita dapat mengetahui manfaat tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Proses dari terbentuknya tumbuhan itulah yang dapat menyadarkan kita atas kekuasaan dan kebesaran-Nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian di laboratorium kimia analisis farmasi, laboratorium biologi farmasi fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan laboratorium kimia fisika fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimentatif di laboratorium.

C. Instrumen Penelitian

1. Alat dan Bahan Penelitian

a. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk, bejana maserasi, cawan porselin, gelas erlenmeyer (*Pyrex*[®]), gelas kimia (*Pyrex*[®]), gelas ukur (*Pyrex*[®]), inkubator (*Memmert*[®]), kertas indikator pH (*Nesco*[®]), labu tentukur (*Pyrex*[®]), penangas (*Memmert*[®]), piknometer (*Pyrex*[®]), pipet tetes, stopwatch, termometer, timbangan analitik (*Kern*[®]), viskometer *Ostwald*.

b. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air bebas CO₂, asetilsistein 0,1%, buffer fosfat pH 7, daun tembelekan (*Lantana camara* Linn.), etanol 70%, kalium dihidrogenfosfat, mukus usus sapi, natrium hidroksida, tween 80.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) diambil dari kecamatan Galesong kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Daun diambil dari tanaman tembelean (*Lantana camara* Linn.).

b. Pengolahan sampel

Sampel daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) yang telah diambil dan dibersihkan dari kotoran dan dikeringkan tanpa terkena matahari langsung, kemudian diserbukkan dan sampel siap diekstraksi.

c. Ekstraksi sampel

Sampel daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) yang telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 225 gram dan dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian dituang cairan penyari etanol 70% sebanyak 2 liter hingga seluruh sampel terendam, ditutup dan dibiarkan selama 1 x 24 jam terlindung dari cahaya, sambil sekali-sekali diaduk. Selanjutnya disaring lalu dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol 70% sebanyak 2 liter yang baru didiamkan selama 1 x 24 jam. Hal ini dilakukan sampai 3 x 24 jam dengan menggunakan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Larutan ekstrak etanol cair dipekatkan dengan penguapan pelarut menggunakan penangas kemudian dikeringkan hingga diperoleh ekstrak kental sebesar 10,614 gram.

2. Pengumpulan usus sapi

Usus sapi yang diperoleh dibersihkan dari kotoran dan sisa-sisa makanan di bawah air mengalir. Pengumpulan mukus dilakukan dengan mengurut usus kemudian usus dipotong membujur. Selanjutnya lapisan mukosa dikerok secara perlahan. Mukus yang telah terkumpul diaduk perlahan sampai homogen. Mukus yang digunakan untuk uji mukolitik harus dalam keadaan masih segar.

3. Penyiapan larutan uji

a. Pembuatan larutan dapar fosfat pH 7

Dibuat kalium dihidrogenfosfat 0,2 M dengan cara: ditimbang 6,8045 gram kalium dihidrogenfosfat kemudian dilarutkan dengan air bebas CO₂ hingga 250 mL pada labu ukur. Dibuat natrium hidroksida 0,2 N dengan cara: ditimbang 1,6 gram natrium hidroksida dan dimasukkan dalam labu ukur 200 mL dan dilarutkan dengan air bebas CO₂ hingga batas tanda.

Larutan dapar fosfat pH 7 dibuat dengan cara: sebanyak 125 mL kalium dihidrogenfosfat 0,2 M dicampur dengan 72,75 mL natrium hidroksida 0,2 N dan dimasukkan dalam labu takar 500 mL kemudian pada campuran ditambah air bebas CO₂ sampai batas tanda.

b. Pembuatan larutan mukus-dapar fosfat 20% b/b

Pembuatan larutan mukus-dapar fosfat 20% b/b dibuat dengan cara mencampur mukus dan dapar fosfat pH 7 dengan perbandingan 20:80, diaduk hingga homogen.

c. Pembuatan larutan kontrol negatif

Dibuat larutan mukus-dapar fosfat 20% b/b tanpa penambahan ekstrak maupun obat standar (asetilsistein) dengan cara dicampurkan tween 80 sebanyak 0,5% b/b dari bobot total atau sebesar 0,25 gram dengan larutan mukus-dapar fosfat hingga diperoleh bobot total sebesar 50 gram dan diaduk hingga campuran homogen.

d. Pembuatan larutan kontrol positif

Larutan kontrol positif dibuat dengan mencampurkan asetilsistein 0,1% (0,05 gram) dengan tween 80 sebanyak 0,5% b/b dari bobot total atau sebesar 0,25 gram. Kemudian ditambahkan larutan mukus-dapar fosfat hingga diperoleh bobot total sebesar 50 gram dan diaduk hingga homogen.

e. Pembuatan larutan uji

Dibuat larutan uji dengan konsentrasi 0,1%, 0,5%, dan 1%. Setiap konsentrasi ekstrak daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) dicampurkan dengan tween 80 sebanyak 0,25 gram kemudian ditambahkan larutan mukus-dapar fosfat hingga bobot total mencapai 50 gram.

4. Penentuan aktivitas mukolitik secara *in vitro*

Uji aktivitas mukolitik dilakukan dengan melakukan pengukuran viskositas menggunakan viskometer *Ostwald*. Sampel uji diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit kemudian diisi larutan uji sebanyak 10 mL dimasukkan ke dalam viskometer *Ostwald*. Viskometer *Ostwald* diletakkan di *waterbath* sampai viskometer *Ostwald* tenggelam di dalam air hingga bagian yang menggelembung di atas batas garis atas viskometer *Ostwald*. Suhu sampel uji pada viskometer dijaga tetap konstan selama pengukuran pada 37°C Waktu yang diperlukan larutan uji untuk melewati batas garis

atas hingga batas garis bawah dicatat. Waktu yang tercatat merupakan waktu alir (dalam detik) dari sampel uji. Selanjutnya dilakukan pengukuran kerapatan menggunakan piknometer. Bobot sampel uji diperoleh dengan mengurangkan bobot sampel uji dan piknometer dengan bobot piknometer kosong. Kemudian dihitung viskositasnya dengan mengalikan waktu alir dan kerapatan. Larutan kontrol positif dan kontrol negatif diukur viskositasnya dengan cara yang sama seperti pengukuran pada larutan uji.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Hasil

Data penurunan viskositas mukus diuji dengan analisis variansi Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan taraf kepercayaan 95% dan 99% untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penentuan Waktu Alir

Penentuan waktu alir sampel uji dilakukan menggunakan viskometer *Ostwald*. 10 mL sampel uji dimasukkan ke dalam viskometer *Ostwald* dan dipompa hingga melewati batas atas. Hasil menunjukkan kontrol negatif memiliki waktu yang lama untuk mengalir melewati pipa kapiler dan ekstrak dengan konsentrasi tinggi memiliki waktu yang paling singkat. Hasil pengukuran waktu alir disajikan pada tabel 2.

Sampel Uji	Waktu Alir (detik)			Rata-Rata
	I	II	III	
Kontrol Negatif	1,37	1,35	1,41	1,3767
Kontrol Positif	1,05	1,13	1,03	1,0700
Ekstrak 0,1%	1,22	1,16	1,25	1,2100
Ekstrak 0,5%	1,15	1,16	1,12	1,1433
Ekstrak 1%	1,00	0,98	0,94	1,9733

2. Penentuan Kerapatan

Penentuan kerapatan (*density*) sampel uji dilakukan dengan menggunakan metode piknometer yang diperoleh dari selisih berat piknometer yang berisi sampel uji dan berat piknometer kosong. Berat yang diperoleh dibagi dengan volume piknometer. Hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel 3:

Sampel Uji	Kerapatan (g/mL)
Kontrol Negatif	0,9534
Kontrol Positif	1,0039
Ekstrak 0,1%	1,0047
Ekstrak 0,5%	0,9632
Ekstrak 1%	1,0451

3. Penentuan Viskositas

Penentuan viskositas sampel uji diperoleh dari perkalian antara waktu alir dengan kerapatan masing-masing sampel uji sehingga diperoleh viskositas yang berbeda-beda pada ekstrak dalam berbagai konsentrasi dan dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol positif. Hasil menunjukkan adanya penurunan viskositas pada ekstrak uji sejalan dengan peningkatan konsentrasi. Hasil disajikan pada tabel 4.

Sampel Uji	Viskositas (cps)			Rata-Rata
	I	II	III	
Kontrol Negatif	1,3062	1,2871	1,3443	1,3125
Kontrol Positif	1,0542	1,1345	1,0341	1,0742
Ekstrak 0,1%	1,2258	1,1655	1,2559	1,2157
Ekstrak 0,5%	1,1077	1,1173	1,0788	1,1013
Ekstrak 1%	1,0451	1,0242	0,9824	1,0172

B. Pembahasan

Tanaman tembelean (*Lantana camara* Linn.) merupakan tanaman yang secara empirik telah digunakan sebagai pengobatan untuk beberapa penyakit salah satunya

pada bagian daun digunakan oleh masyarakat untuk mengobati batuk berdahak, namun penelitian ilmiah penggunaan tanaman tersebut untuk mengobati batuk belum banyak dikaji. Pada penelitian ini dilakukan pengujian mukolitik karena gangguan saluran pernapasan merupakan salah satu gangguan yang paling sering dialami. Batuk merupakan mekanisme pengeluaran dahak yang seringkali sulit pengeluarannya karena dahak yang kental, sehingga pengujian efek mukolitik dari ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) dilakukan.

Penelitian ini dilakukan secara *in vitro* dengan menggunakan mukus usus sapi segar. Usus mamalia merupakan salah satu bagian yang menghasilkan mukus banyak karena memiliki luas permukaan yang besar dan mudah untuk diperoleh. Mukus usus sapi memiliki komposisi yang sama dengan mukus yang dihasilkan oleh trakeabronkial. Perbedaannya hanya pada kadar penyusunnya antara lain terdiri dari air, protein, karbohidrat, lipid, dan substansi organik lain.

Mukus merupakan cairan kompleks berupa selaput gel tersusun atas mukopolisakarida dan glikoprotein yang dihubungkan dengan jembatan disulfida. Adanya gangguan pada saluran pernapasan menyebabkan tubuh menstimulasi sel-sel goblet menghasilkan mukus lebih banyak dan kental sebagai respon pertahanan sistem pernapasan. Mukus bekerja secara fisik dengan cara menangkap partikel asing yang masuk dan juga dengan mengeluarkan antibodi IgA, PMN (polimorfonuklear), dan interferon sebagai respon imun. Peningkatan viskositas mukus menyebabkan sulitnya untuk dikeluarkan dan akan mengganggu proses pembersihan saluran pernapasan

sehingga perlu adanya zat yang dapat mengurangi viskositas dari mukus agar mudah untuk dikeluarkan.

Ekstraksi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode maserasi. Maserasi dilakukan beberapa kali agar penarikan senyawa lebih maksimal. Metode maserasi merupakan metode yang paling sederhana. Senyawa yang terdapat dalam daun tembelean dikhawatirkan mudah rusak jika dilakukan metode yang menggunakan pemanasan. Prinsip ekstraksi dengan metode maserasi adalah ketika sampel kontak dengan pelarut, senyawa yang terkandung dalam sampel akan berdifusi keluar untuk menyeimbangkan konsentrasi. Penarikan senyawa akan berhenti pada kondisi jenuh di mana konsentrasi di dalam sel dan pada pelarut sama. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Etanol ditemukan lebih mudah untuk menembus membran sel untuk mengekstrak bahan intraseluler dari bahan tanaman. Etanol 70% dapat menarik secara maksimal senyawa polar maupun nonpolar mengingat pengujian daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) sebagai mukolitik ini merupakan pengujian awal.

Sebanyak 225 gram serbuk kering dihasilkan dari hasil pengeringan. Serbuk kering tersebut yang telah dimaserasi dan dipekatkan menghasilkan 10,614 gram ekstrak kental, sehingga diperoleh rendemen ekstrak sebesar 4,717% b/b terhadap bobot simplisia kering.

Larutan mukus 20% dibuat dengan mengencerkannya dengan larutan dapar fosfat pH 7 perbandingan mukus dan dapar fosfat pH 7 20:80 dengan maksud untuk menjaga agar komposisi dari mukus tidak berubah dan karena aktivitas mukolitik dapat

berlangsung maksimal pada pH 7. Proses inkubasi dan pengujian dilakukan pada suhu 37°C agar diperoleh suatu kondisi reaksi antara sampel uji dengan mukus sesuai dengan kondisi fisiologis manusia. Saat pengukuran waktu alir dengan viskometer *Ostwald* berlangsung suhu dijaga agar tetap 37°C karena suhu mempengaruhi kecepatan alir, kekentalan akan menurun dengan naiknya suhu atau sebaliknya, sehingga pengukuran menjadi kurang tepat.

Kontrol positif yang digunakan adalah asetilsistein, yang mekanisme kerjanya sebagai mukolitik dengan memecah struktur mukoprotein yang terikat satu sama lain oleh rantai disulfida, ikatannya berupa ikatan $-S-S-$. Apabila ikatan ini diputuskan oleh aktivitas gugus sulfhidril bebas pada asetilsistein maka mukoprotein akan terurai, mukus akan lisis sehingga menurunkan viskositasnya. Asetilsistein langsung bekerja pada mukus sehingga dapat digunakan untuk pengujian secara *in vitro*.

Penambahan tween 80 sebagai surfaktan untuk membantu menghomogenkan campuran. Mukus yang tersusun atas air dan protein akan sulit untuk saling bercampur dengan sampel sehingga dibutuhkan suatu surfaktan untuk menghomogenkan. Tween 80 merupakan surfaktan non-ionik yang memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik sehingga mampu menyatukan dua fase yang tidak saling bercampur.

Waktu alir sampel uji ditentukan dengan menggunakan viskometer *Ostwald*. Penggunaan viskometer *Ostwald* untuk mengukur waktu (s) yang diperlukan untuk mengalirnya sampel uji pada pipa kapiler yang telah diberi tanda batas atas (a) sampai batas bawah (b). Viskositas dapat diketahui dengan menentukan pula kerapatan dari masing-masing sampel uji. Kerapatan (g/mL) diperoleh dengan menggunakan metode

piknometer. Piknometer dikeringkan dalam oven dan didiamkan dalam desikator agar proses pendinginan lebih cepat. Berat piknometer harus konstan karena berat yang berubah-ubah menandakan adanya zat yang menempel sehingga dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Berat sampel dibagi volume piknometer diperoleh kerapatan sampel. Hasil kali antara waktu alir dan kerapatan akan diperoleh nilai viskositas setiap sampel uji.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh viskositas kontrol negatif dan kontrol positif (asetilsistein 0,1%) sebesar 1,3125 cps dan 1,0742 cps. Viskositas yang diperoleh dari sampel yang mengandung ekstrak 0,1%, 0,5%, dan 1% berturut-turut adalah 1,2175 cps, 1,1013 cps dan 1,0172 cps. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan viskositas pada setiap peningkatan konsentrasi ekstrak. Sampel bebas perlakuan (kontrol negatif) memiliki viskositas paling tinggi dan sampel dengan ekstrak 1% memiliki viskositas paling rendah.

Perhitungan statistik ANAVA dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk mengetahui hubungan antara sampel uji dengan penurunan viskositas mukus menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) mempengaruhi viskositas mukus berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 99% dan 95% (tabel 8) yang artinya bahwa ada pengaruh konsentrasi ekstrak dengan penurunan viskositas mukus. Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) (tabel 9) menunjukkan bahwa kontrol negatif sangat berbeda nyata dengan sampel uji yang mengandung kontrol positif, ekstrak 0,1%; 0,5%; dan 1%. Sedangkan pada kontrol positif hasilnya sangat berbeda

nyata (sangat signifikan) dengan ekstrak 0,1% , tidak berbeda nyata (non-signifikan) terhadap ekstrak 0,5% dan berbeda nyata (signifikan) terhadap ekstrak 1%.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa ekstrak 0,1% telah memberikan efek mukolitik pada mukus, namun efek mukolitiknya tidak setara dengan kontrol positif asetilsistein 0,1%. Sedangkan yang memiliki efek mukolitik yang setara dengan kontrol positif asetilsistein 0,1% adalah ekstrak 0,5% karena tidak memiliki perbedaan yang nyata pada uji statistik dan ekstrak 1% memiliki efek mukolitik lebih baik dibandingkan asetilsistein 0,1%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) memiliki aktivitas mukolitik.
2. Ekstrak etanol daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) pada konsentrasi 0,5% memiliki aktivitas mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1%.
3. Islam menganjurkan untuk memanfaatkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang Allah SWT. ciptakan sebagai pengobatan karena Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia khususnya penelitian tentang pemanfaatan daun tembelean (*Lantana camara* Linn.) untuk pengobatan mukolitik.

B. Saran

Penulis berharap penelitian dilanjutkan pada tahap isolasi senyawa yang memiliki aktivitas mukolitik dari daun tembelean (*Lantana camara* Linn.).


KEPUSTAKAAN

- Afiyati, Ami, Mimiiek Murrukmihadi. "Efek Pemberian Fraksi yang Mengandung Alkaloid dari Bunga Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) Varietas Merah Tunduk terhadap Aktivitas Mukolitik secara *in vitro*". *Tradisional Medicine Journal*, Vol. 18(3). Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Alam, Gemini, dkk. "Skrining Komponen Kimia dan Uji Aktivitas Mukolitik Ekstrak Rimpang Bangle (*Zingiber purpureum* Roxb.) terhadap Mukosa Usus Sapi secara *In vitro*". *Jurnal Penelitian*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Anderson, Paul D. *Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia*. Terj. Yasmin Asih. Jakarta: EGC, 1996.
- Asy-Syaqawi, Amin bin Abdullah. *Kisah Nabi Ayyub As*. Terj. Muzaffar Sahidu. http://d1.islamhouse.com/data/id/ih_fatawa/single/id_Kisah_Nabi_Ayyub_as.pdf. (27 Januari 2015).
- Balsamo, R., L. Lantana, C.G. Egan. *European Respiratory Review: Mucoactive Drugs*. <http://err.ersjournals.com/content/19/116/127.full> (2 November 2014).
- Brain, J. D. Proctor, *et.al.*, *Respiratory Defense Mechanism*. Part I. New York: Marcel Dekker Inc, 1997.
- Chowdhury, Jasim Uddin, *et.al.* "Chemical Composition of Leaf Essential Oil of *Lantana camara* L. From Bangladesh". *Journal of Pharmacy*, Vol. 36(2). Bangladesh, 2007.
- Corwin, Elizabeth J. *Pathophysiology*. Terj. Nike Budhi Subekti. *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Depkes RI. *Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I)*, Jilid II. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan Kesejahteraan Sosial RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2000.
- Dhar, Raja. "Role of Mucolytics in Wet Cough". *Supplement to Journal of The Association of Physicians*, Vol. 61. India, 2013.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1995.

- Djojodibroto, Darmanto. *Respirologi (Respiratory Medicine)*. Jakarta: EGC, 2009.
- Estuningtyas, Ari, Azalia Arif. *Farmakologi dan Terapi*, Edisi V. Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011.
- Ganong, William F. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Edisi 20. Terj. Brahm U pendit dkk. Jakarta: EGC, 2002.
- Heyne, K. *Tumbuhan Berguna Indonesia*, Jilid 3. Jakarta: Departemen Kehutanan, 1987.
- Jeffery, Peter K. *Respiratory Tract Mucus*. New York: Ciba Foundation Symposium, 1978.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Departemen Kesehatan RI. "Data dan Informasi Kesehatan". 2010. <http://www.depkes.go.id/folder/view/01/stucture-web-content-publikasi-data.html>. (13 Oktober 2014).
- Martin, Alfred, *et.al.* *Farmasi Fisik: Dasar-Dasar Kimia Fisik dalam Ilmu Farmaseutik*, Edisi III. Diterjemahkan oleh Yoshita. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Moechtar, *Farmasi Fisik*. Yogyakarta: UGM Press, 1990.
- Moffat, Anthony C., *et.al.*, ed. *Clarke's Analysis of Drugs and poisons*, Fourth Edition. USA: Pharmaceutical Press, 2011.
- Muluk, Abdul. "Pertahanan Saluran Napas". *Majalah Kedokteran Nusantara*, Vol. 42(1). Sumatera Utara, 2009.
- Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim Juz 4*. Bairut: Dar Ihya Al-Turats, t.th.
- Mutschler, Ernst. *Dinamika Obat*, Edisi V. Terj. Mathilda B. Widiyanto dan Anna Setiadi Ranti. Bandung: Penerbit ITB, 1999.
- Muttaqin, Arif. *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Surabaya: Salemba Medika, 2008.
- Nurwahida. "Uji Aktivitas Anti Bakteri Ekstrak Daun Tembelean (*Lantana camara* Linn.)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2011.

- Olson, James. *Belajar Mudah Farmakologi*. Terj. Linda Chandranata. Jakarta: EGC, 2003.
- Pandey, Amita dan Shalini Tripathi. "Concept of Standardization, Extraction and Prephytochemical Scceering Strategies for Herbal Drug". *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*. India, 2013.
- Price, Sylvia S. dan Wilson Lorraine M. *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Edisi VI, Vol. I. Terj. Brahm U.P, huuriawati, H., Pita, W. Jakarta: EGC, 2006.
- Redaksi agromedia. *Buku Pintar Tanaman Obat*. Jakarta: Agromedia, 2008.
- Sankaran, K. V. "invasive Pest Fact Sheet of *Lantana camara*". *Jurnal Penelitian*. Kerala Forest Research Institute. India, 2007.
- Saxena, *et.al.*, "A brief review on: Therapeutical values of *Lantana camara* plant". *International Journal of Pharmacy and Life Science*. India, 2012.
- Seth, Richa, *et.al.*, "Chemical Composition and Antibacterial Properties of the Essential oil and Extracts of *Lantana camara* Linn. From Uttarakhand (India)". *Asian Pasific Journal of Tropical Biomedicine*. India, 2012.
- Shale, D. J., A.A. Lonescu. "Mucus Hypersecretion: a common symptom, a common mechanism?". *European Respiratory journal*. United Kingdom, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo, Slamet, *et.al.* *Materi Medika Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 1989.
- Somantri, Irman. *Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2007.
- Supriyatno, Bambang. "Batuk Kronik pada Anak". *Majalah Kedokteran Indonesia*, Vol. 60(6). Jakarta: Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UI, 2010.
- Tiwari, *et.al.* "Phytochemical Screening and Extraction: A Review". *Internationale Pharmaceutica Scientia*, Vol. I. India, 2011.

- Tjay, Tan Hoan, Rahardja, Kirana. *Obat-Obat Penting*, Edisi VI, Cet. I. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Terj. Soendani N.S. Yogyakarta: UGM Press, 1995.
- Widmann, Frances K., *Tinjauan Klinis atas Hasil Pemeriksaan Laboratorium*, Jakarta, 1989.
- World Health Organization. *Hazardous Chemicals in uman and Environmental Health*. Terj. Palupi Widyastuti. *Bahaya Bahan Kimia pada Kesehatan Manusia dan Lingkungan*. Jakarta: EGC, 2002.
- World Health Organization. "Risk Factors for Chronic Respiratory Diseases". www.who.int/gard/publications/Risk%20factors.pdf. 2007 (16 November 2014).
- Zayas G., *et.al. A New Paradigm in Respiratory Hygiene: Increasing The Cohesivity of Airway Secretions to Improve Cough Interaction and Reduce Aerosol Dispersion*, *BMC Pulmonary Medicine*, Vol. 5 Issue 1. Canada: University of Alberta, 2005.


Lampiran 1. Skema kerja ekstraksi


Lampiran 2. Skema kerja penyiapan sampel


1. Penyiapan mukus usus sapi



2. Penyiapan sampel uji



Lampiran 3. Skema kerja Pengukuran waktu alir

Lampiran 4. Skema kerja pengukuran kerapatan

Lampiran 5. Pengukuran kerapatan sampel Uji

Tabel 5. Penentuan kerapatan dengan metode piknometer

Sampel Uji	Berat pikno kosong (g)	Berat pikno + sampel (g)	Volume (mL)
Kontrol negatif	11,3435	35,1785	25
Kontrol positif	21,5593	46,6585	25
Ekstrak 0,1%	24,2801	49,3986	25
Ekstrak 0,5%	12,294	36,3739	25
Ekstrak 1%	11,9293	38,0059	25

Perhitungan Kerapatan

$$\text{Kerapatan} = \frac{\text{Berat pikno berisi sampel} - \text{Berat pikno kosong (g)}}{\text{Volume (mL)}}$$

$$\text{Kontrol Negatif} = \frac{35,1785 \text{ g} - 11,3435 \text{ g}}{25 \text{ ml}} = 0,9534$$

$$\text{Kontrol Positif} = \frac{46,6585 \text{ g} - 21,5593 \text{ g}}{25 \text{ ml}} = 1,0039$$

$$\text{Ekstrak 0,1\%} = \frac{49,3986 \text{ g} - 24,2801 \text{ g}}{25 \text{ ml}} = 1,0047$$

$$\text{Ekstrak 0,5\%} = \frac{36,3739 \text{ g} - 12,294 \text{ g}}{25 \text{ ml}} = 0,9632$$

$$\text{Ekstrak 1\%} = \frac{38,0059 \text{ g} - 11,9293 \text{ g}}{25 \text{ ml}} = 1,0451$$

Lampiran 6. Perhitungan viskositas

Tabel 6. Waktu alir dan Kerapatan

Sampel Uji	Waktu alir rata-rata (detik)	Kerapatan (g/mL)
Kontrol negatif	1,3767	0,9534
Kontrol positif	1,07	1,0039
Ekstrak 0,1%	1,21	1,0047
Ekstrak 0,5%	1,1433	0,9632
Ekstrak 1%	0,9733	1,0451

Viskositas (η) = Waktu alir x kerapatan

$$\text{Kontrol Negatif} = 1,3767 \times 0,9534 = 1,3125 \text{ cps}$$

$$\text{Kontrol Positif} = 1,0700 \times 1,0039 = 1,0742 \text{ cps}$$

$$\text{Ekstrak 0,1\%} = 1,21 \times 1,0047 = 1,2157 \text{ cps}$$

$$\text{Ekstrak 0,5\%} = 1,1433 \times 0,9632 = 1,1013 \text{ cps}$$

$$\text{Ekstrak 1\%} = 0,9733 \times 1,0451 = 1,0172 \text{ cps}$$

Lampiran 7. Analisis statistik viskositas sampel uji dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)

Tabel 7. Hubungan antara sampel uji dan viskositas

Sampel Uji	Viskositas (cps)			Jumlah	Rata-Rata
	I	II	III		
Kontrol Negatif	1,3062	1,2871	1,3443	3,9376	1,3125
Kontrol Positif	1,0542	1,1345	1,0341	3,2227	1,0742
Ekstrak 0,1%	1,2258	1,1655	1,2559	3,6472	1,2157
Ekstrak 0,5%	1,1077	1,1173	1,0788	3,3038	1,1013
Ekstrak 1%	1,0451	1,0242	0,9824	3,0517	1,0172
Jumlah	5,739	5,7286	5,6955	17,1631	5,721

$$\begin{aligned}
 \text{Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\
 &= \frac{(17,1631)^2}{5 \times 3} \\
 &= \frac{294,5720}{15} \\
 &= 19,6381
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum Y_{ij}^2 - \text{FK} \\
 &= [(1,0542)^2 + (1,1345)^2 + \dots + (0,9824)^2] - \text{FK} \\
 &= 19,8212 - 19,6381 \\
 &= 0,1831
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{Y_{ij}^2}{\text{Jumlah replikasi}} - FK \\
&= \frac{[(3,2227)^2 + \dots + (3,0517)^2]}{3} - 19,6381 \\
&= \frac{(10,3858 + \dots + 9,3129)}{3} - 19,6381 \\
&= \frac{(59,4205)}{3} - 19,6381 \\
&= 19,8068 - 19,6381 \\
&= 0,1687
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} \\
&= 0,1831 - 0,1687 \\
&= 0,0144
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Derajat Bebas total} &= (\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}) - 1 \\
&= (5 \times 3) - 1 \\
&= 15 - 1 \\
&= 14
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Derajat bebas perlakuan} &= \text{banyaknya perlakuan} - 1 \\
&= 5 - 1 \\
&= 4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Derajat bebas galat} &= \text{Derajat bebas total} - \text{Derajat bebas perlakuan} \\
&= 14 - 4 \\
&= 10
\end{aligned}$$

$$\text{Kuadrat tengah perlakuan} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{0,1687}{4} \\ &= 0,0422 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuadrat tengah galat} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}} \\ &= \frac{0,0144}{10} \\ &= 1,44 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{F Hitung Perlakuan (FH)} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\ &= \frac{0,0422}{1,44 \times 10^{-3}} \\ &= 29,2560 \end{aligned}$$

Lampiran 8. Analisis Varians beserta F tabelnya

Tabel 8. Analisis varians viskositas beserta F tabelnya

Sumber Keseragaman	DB	JK	KT	F hitung	F tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	0,1687	0,0422	29,2560**	3,48	5,99
Galat	10	0,0144	0,00144			
Total	14	0,1831	0,04364			

F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 95% dan 99% (sangat signifikan)

$$\begin{aligned}
 \text{Koefisien Keragaman} &= \frac{\sqrt{KTG}}{\gamma} \times 100\% \\
 &= \frac{\sqrt{0,00144}}{1,1442} \times 100\% \\
 &= \frac{0,0379}{1,1442} \times 100\% \\
 &= 3,3123\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan Nilai LSD/BNT 0,05

$$\text{LSD} = t(0,05); 10 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 1,812 \sqrt{\frac{0,00288}{3}}$$

$$= 1,812 \times 0,031$$

$$= 0,0562$$

Perhitungan Nilai LSD/BNT 0,01

$$\text{LSD} = t(0,01); 10 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 2,764 \sqrt{\frac{0,00288}{3}}$$

$$= 2,764 \times 0,031$$

$$= 0,0857$$

Lampiran 9. Analisis RAL, BNT Hubungan viskositas dengan sampel uji

Tabel 9. Analisis RAL, BNT Hubungan viskositas dengan sampel uji

Perlakuan		Kontrol negatif	Ekstrak 0,1%	Ekstrak 0,5%	Kontrol positif	Ekstrak 1%
	Rerata	1,3125	1,2157	1,1013	1,0742	1,0172
Kontrol negatif	1,3125	0	0,0968**	0,2112**	0,2383**	0,2953**
Ekstrak 0,1%	1,2157		0	0,1144**	0,1415**	0,1985**
Ekstrak 0,5%	1,1013			0	0,0271 ^{NS}	0,0841*
Kontrol positif	1,0742				0	0,057*
Ekstrak 1%	1,0172					0

BNT/LSD 0,05 : 0,0562**BNT/LSD 0,01 :0,0857**

Keterangan : * = Signifikan (Berbeda Nyata)

** = Sangat Signifikan (Sangat Berbeda Nyata)

NS = Non Signifikan (Tidak Berbeda Nyata)

Lampiran 10. Tanaman tembelekan (*Lantana camara* Linn)




Gambar 6. Tanaman tembelekan (*Lantana camara* Linn.)

Lampiran 11. Ekstraksi dengan metode maserasi



Gambar 7. Proses ekstraksi dengan metode maserasi

Lampiran 12. Penyiapan sampel uji

Gambar 8. Penyiapan sampel uji

Lampiran 13. Pengukuran waktu alir

Gambar 9. Pengukuran waktu alir dengan viskometer *Ostwald*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



MIFTAH ANNUR dilahirkan di Jeneponto 19 September 1992 merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri Hamzah Tamar dan Sitti Hamsinah. Pendidikan formal yang telah dilalui yaitu menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di SDN. No.13 Allu I pada tahun 2004. Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah menengah pertama di SMPN 1 Bangkala pada tahun 2004-2007. Kemudian menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atasnya di SMAN. 3 Takalar pada tahun 2010. Penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di jurusan Farmasi Fakultas Ilmu kesehatan