

**FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS LARUTAN
EKSTRAK DAUN BOTTO'-BOTTO' (*Chromolaena odorata L.*)
SEBAGAI PENGAWET BUAH.**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**DEWI RATIH DAHLAN
NIM. 70100112063**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ratih Dahlan
NIM : 70100112063
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 06 Oktober 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok E7 No. 12
Judul : Formulasi dan Uji Efektivitas Larutan Ekdtrak Daun Botto'-
Botto' (*Chromolaena odorata* L.) Sebagai Pengawet Buah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 23 Agustus 2016

Penyusun,

Dewi Ratih Dahlan

NIM. 70100112063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Formulasi dan Uji Efektivitas Larutan Ekdtrak Daun Botto’-Botto’ (*Chromolaena odorata L.*) Sebagai Pengawet Buah**” yang disusun oleh Dewi Ratih Dahlan, NIM: 70100112063, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 23 Agustus 2016 M
20 Dzulqaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. (.....)

Pembimbing I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)

Penguji I : Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. (.....)

Penguji II : Dr. Abdullah, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah swt. karena dengan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta salam dan shalawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kebaikan dan cahaya kepada umatnya.

Skripsi Dengan Judul “Formulasi Dan Uji Efektivitas Larutan Ekstrak Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata L.*) Sebagai Pengawet Buah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dibidang pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan selesainya skripsi ini, mudah-mudahan harapan dan keinginan penulis dapat tercapai.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari semua pihak. Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua, Bapak Dahlan dan Ibu Mildawati atas segala do'a, kesabaran, kegigihan, serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik hingga saat ini. Terima kasih AYAH DAN IBU yang penuh kasih sayang dan pengorbanan memberikan semangat, nasehat yang membangun, dan motivasi, semoga apa yang kalian lakukan mendapat tempat yang indah dihadapan Allah swt. Kepada saudara dan saudariku tercinta, Yadi Pratama Dahlan dan adek Nur Alyah Ramadhani Dahlan.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Bapak/ Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Sc., selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin. M. Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
9. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi sumbangan pemikiran demi terselesainya skripsi ini.
10. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt., selaku penguji kompetensi yang juga sudah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dr. Abdullah, M.Ag., selaku Penguji agama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
12. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf jurusan Farmasi dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas informasi yang diberikan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.

13. Keluarga besar jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar dan teman-teman Angkatan 2012 “ISOHIDRIS” serta sahabat-sahabat penulis Anny, Cica, Aswin, Amhar, Tantri, Eka, Dinda, Indah, Ugha, Rahmi, dan Oyha.
14. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.

Akhir kata, tiada harapan yang paling indah selain harapan bahwa apa yang penulis lakukan selama ini untuk penyusunan skripsi ini dapat bernilai positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah disisi Allah Swt. Amin.

Samata-Gowa, 23 Agustus 2016
Penulis,

Dewi Ratih Dahlan
Nim: 70100112063

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Definisi Operasional	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Zat Pengawet	11
B. Antimikroba	16
C. Sediaan Formulasi	20
1. Komposisi sediaan Larutan Pekat	20
a. Zat Aktif	20
b. Solvent	20
c. Co-solvent	22
D. Herba Botto ² -Botto ²	23

1. Klasifikasi Tanaman	24
2. Nama Daerah	25
3. Morfologi	25
4. Kandungan Kimia	26
5. Kegunaan	27
E. Penyarian.....	28
1. Ekstraksi.....	29
2. Maserasi	30
F. Pembusukan Sayuran	31
G. Tinjauan Islam.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
1. Populasi	37
2. Sampel	37
D. Instrument Penelitian.....	38
1. Alat	38
2. Bahan	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
1. Metode Pengumpulan Data.....	38
a. Pengambilan Sampel.....	38
b. Pengolahan Sampel.....	38
c. Ekstraksi Sampel	39
2. Rancangan Forulasi	40
a. Formulasi Sediaan.....	40
b. Uji Penghambatan Pembusukan Buah.....	41
c. Pengamatan Pembusukan Buah.....	42
F. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Hasil Penelitian	44
1. Hasil Formulasi Sediaan.....	44
2. Hasil Uji penghambatan Pembusukan Buah	45
3. Hasil Pengamatan Pembusukan Buah	45
B. Pembahasan	56
1. Hasil Uji Penghambatan Pembusukan Buah	56
2. Hasil Pengamatan Pembusukan Buah	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel sifat ekstrak daun botto'-botto'	19
Tabel Rancangan Formulasi	40
Tabel Uji Penghambatan Pembusukan Buah	41
Tabel Pengamatan Pembusukan Buah.....	42
Tabel Hasil Rancangan Formulasi	44
Tabel Hasil formula yang berefek	44
Tabel Hasil Pengamatan Pembusukan Buah Replika 1	45
Tabel Hasil Pengamatan Pembusukan Buah Replika 2.....	49
Tabel Hasil Pengamatan Pembusukan Buah Replika 3.....	52
Tabel Analisis Data Buah Anggur	83
Tabel Analisis Data Buah Tomat	89
Tabel Analisis Data Cabai	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Penyiapan Sampel	70
Ekstraksi Sampel.....	71
Formulasi	72
Uji penghambatan dan pengamatan pembusukan.....	73
Gambar Simplisia Daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L).....	74
Proses Maserasi.....	75
Proses Penguapan Sampel.....	76
Ekstrak Dibebas Etanolkan.....	77
Gambar bahan yang digunakan.....	78
Gambar hasil sediaan formulasi.....	79
Gambar Hasil Pengamatan Replika I.....	80
Gambar Hasil Pengamatan Replika II.....	81
Gambar Hasil Pengamatan Replika III	82
Analisis Data Buah Anggur	83
Analisis Data Buah Tomat	89
Analisis Data Cabai	95
Grafik Hasil Pengamatan	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Daun botto' -botto'	74
Simplisia belum dikeringkan.....	74
Simplisia setelah dikeringkan.....	74
Penimbangan simplisia.....	75
Penambahan pelarut etanol 70%.....	75
Proses perendaman simplisia.....	75
Penyaringan sampel.....	76
Proses rotary evaporator.....	76
Penguapan sampel di atas alat penangas	76
Penyiapan alat	77
Proses ekstrak dibebaskan etanolkan	77
Ekstrak daun botto' -botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	78
Tween 80.....	78
Aqua destilata.....	78
Sediaan Formula I	79
Sediaan Formula II.....	79
Sediaan Formula III.....	79
Sediaan Formula IV	79
Sediaan Formula V.....	79
Hasil Pengamatan Replikasi 1 pada hari ke-30	80
Hasil Pengamatan Replikasi 2 pada hari ke-30	81
Hasil Pengamatan Replikasi 3 pada hari ke-30	82
Grafik hasil pengamatan buah anggur	101
Grafik hasil pengamatan buah tomat	101
Grafik hasil pengamatan cabai	102

ABSTRAK

Nama Penulis : Dewi Ratih Dahlan
NIM : 70100112063
Judul Skripsi : Formulasi dan Uji Efektivitas Larutan Ekstrak Daun Botto'-
Botto' (*Chromolaena odorata* L.) Sebagai Pengawet Buah.

Telah dilakukan penelitian Formulasi dan Uji Efektivitas Larutan Ekstrak Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L.) Sebagai Pengawet Buah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek ekstrak daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L.) dalam sediaan pengawet pada buah anggur, buah tomat, dan cabai dalam bentuk larutan. Terdapat 5 kelompok perlakuan: Formula I (1% ekstrak daun botto'-botto'), Formula II (2% ekstrak daun botto'-botto'), Formula III (3% ekstrak daun botto'-botto'), Kelompok kontrol positif tween 80 3% dan kelompok kontrol negatif. Buah yang digunakan direndam kedalam larutan yang telah di formulasi, selama 5 menit kemudian ditiriskan dan diamati keadaan fisik buah selama 30 hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula I dengan konsentrasi 1% memiliki efektivitas yang paling baik dibandingkan dengan formula II dan III. Dari hasil pengamatan diperoleh data bahwa semakin rendah konsentrasi daun botto'-botto' yang digunakan sebagai pengawet, maka efek antimikroba yang dihasilkan akan semakin baik. Berdasarkan hasil tersebut ekstrak daun botto'-botto' termasuk pengawet alami untuk buah khususnya pada buah anggur, tomat, dan cabai.

Kata kunci: Anti mikroba, *Chromolaena odorata* L, pengawet, buah anggur, buah tomat dan cabai.

ABSTRACT

Author Name : Dewi Ratih Dahlan
NIM : 70100112063
Thesis title : Formulation and effectiveness test of the solution extract Botto'-Botto' leaf (*Chromolaena odorata* L.) as a preservative.

Research has been conducted on Formulation and effectiveness test of the solution extract Botto'-Botto' leaf (*Chromolaena odorata* L.) as a preservative. The purpose of this research is to know the effect of the extract Botto'-Botto' leaf (*Chromolaena odorata* l.) in preparations of the preservatives on the grapes, tomatoes, and chili peppers in the form of a solution. There are 5 groups: First formula (1% extract botto'- botto' leaf), Second Formula (2% extract botto'-botto' leaf), Third Formula (3% extract botto'-botto' leaf), a positive control group use tween 80 (3%) and negative control group. Fruit used soaked into the aqueous formulation that has been on for 5 minutes, then drained and observed the physical state of the fruit for 30 days.

The results showed that the first formula with a concentration of 1% has the most excellent effectiveness compared with second formula and the third formula. Based on the observations obtained data that the lower the concentration of botto' '-botto' ' leaf used as a preservative, antimicrobial effect thus generated will be getting better. Based on the results of the extract botto'-botto' leaf including natural preservative for fruit especially grapes, tomatoes, and chili peppers.

Keywords: Antimicrobial, Preservative, *Chromolaena odorata* L, grapes, tomatoes, chili.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia di samping pendidikan, kesehatan dan sandang lainnya. Kebutuhan bahan pangan ini akan terus meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Secara garis besar masalah pangan dan sistem pangan umumnya dibagi atas sub sistem produksi, pengadaan dan konsumsi. Bahan pangan tersebut akan mengalami perubahan-perubahan yang tidak diinginkan antara lain pembusukan dan ketengikan. Proses pembusukan dan ketengikan disebabkan oleh adanya reaksi kimia yang bersumber dari dalam dan dari luar bahan pangan tersebut. Dari segi ilmu kimia, komponen utama dari bahan pangan terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Kerusakan bahan pangan ini umumnya disebabkan oleh mikroorganisme melalui proses enzimatis dan oksidasi, terutama yang mengandung protein dan lemak sementara karbohidrat mengalami dekomposisi (Pina, 2009).

Hortikultura buah dan sayuran segar merupakan sub-sektor pertanian yang sepuluh tahun belakangan ini mendapatkan perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan manfaat nilai nutrisi buah dan sayuran segar bagi kesehatan. Kesadaran ini menuntut adanya rantai suplai yang mampu memberikan penanganan dan penampilan yang baik terkait dengan

mutu dan kesegaran suatu produk. Terlebih lagi adanya kecenderungan penyimpanan, transportasi, distribusi dan pemasaran yang memerlukan waktu relatif panjang, adanya waktu pemajangan pada pedagang-pedagang ritel, dan waktu penundaan penyimpanan atau pengolahan untuk dikonsumsi di tingkat rumah tangga, maka cara penanganan yang baik dan masukan teknologi untuk memperlambat penurunan mutu dan kesegaran sayuran sangatlah penting (Utama, 2007).

Cabai yang merupakan suatu komoditas sayuran yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Cabai rawit dianggap penting untuk dijadikan bahan ramuan industri makanan, minuman maupun farmasi (Setiadi, 2001). Cabai rawit sebagai salah satu komoditi pokok juga memiliki kelemahan yaitu mudah rusak (Setiadi, 2001).

Buah anggur adalah jenis buah-buahan asli sub tropis yang telah beradaptasi pada iklim tropis di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur. Luas panen anggur di Jawa Timur mencapai 1.422 ha dengan produksi 110 ton, namun produktivitasnya masih rendah, yaitu 77.36 kuintal per ha (Dinas pertanian Provinsi Jawa Timur, 2001).

Buah tomat merupakan tanaman subtropis yang memerlukan suhu dingin (22-24° C), lembap, dan cukup sinar matahari. Di Indonesia kondisi seperti itu biasanya terdapat di daerah berketinggian antara 1.200-1.500 m dpl, karena daerah penghasil buah tomat yang jauh dari konsumen (Anonim, 2008). Sehingga dibutuhkan penanganan khusus terhadap buah anggur, cabai dan buah tomat yang telah dipanen hingga sampai ke konsumen dalam keadaan segar.

Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L) adalah salah satu tanaman endemik Indonesia, yang kerap kali telah dianggap sebagai tanaman yang liar, tanaman ini pula dianggap sebagai gulma pada padang rumput dan perkebunan, bahkan telah dikategorikan sebagai gulma kelas 1 yang menjadi prioritas untuk dikendalikan (Miner and Water, 2006). Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) juga merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan biopestisida untuk menghambat perkembangan Organisme pengganggu tanaman (OPT) termasuk jamur *Phytophthora palmivora* yang menyebabkan penyakit busuk buah kakao (Panggabean, 2009).

Salah satu penyebab utama yang dapat mempengaruhi kesegaran sayuran dan buah adalah bakteri yang terdapat pada permukaan sayuran dan buah. Bakteri pembusuk, misalnya *Erwinia carotovora* (bakteri gram negatif) dan *Pseudomonas marginalis* (bakteri gram negatif) bakteri penyebab penyakit busuk lunak pada sayuran mampu menghasilkan enzim yang dapat melunakkan jaringan sehingga menyebabkan infeksi. Jadi jenis mikroorganisme ini tidak perlu menginfeksi lewat pelukaan, namun infeksi akan sangat jauh lebih mudah bila ada pelukaan-pelukaan (Utama, S, 2001). *Erwinia carotovora*, *Pseudomonas marginalis*, *Clostridium*, *Bacillus spp* merupakan bakteri busuk lunak (*Bacterial Soft Rot*) yang memiliki ciri-ciri bahan menjadi lunak, lembek dan berbau masam, komoditas yang diserang bawang merah, bawang putih, buah apel, buah pir, tomat, dan cabai (Balía, 2008).

Berdasarkan penelitian telah membuktikan bahwa ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) positif menghambat bakteri gram negatif (*Erwinia*

carotovora, *Pseudomonas marginalis*, *Escherechia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Vibrio sp*, *Shigella dysenteriae*) dan bakteri gram positif (*Basillus subtilis*, *Stapphylococcus aureus*, *Stapphylococcus epidermidis*, dan *Streptococcus mutans*). Daun botto'-botto' (*Chromoleana odorata* L.) dapat digolongkan sebagai antimikroba berspektrum luas karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif (Sadsyam, 2015).

Pengawetan pangan memiliki dua tujuan yaitu menghambat pembusukan dan menjamin mutu awal pangan agar tetap terjaga selama mungkin. Penggunaan pengawet dalam produk pangan dalam prakteknya berperan sebagai anti mikroba dan anti oksidan. Jamur, bakteri dan enzim sebagai penyebab pembusukan pangan perlu dihambat pertumbuhan maupun aktvitasnya. Pada saat ini penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintetis tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena diduga dapat menimbulkan penyakit kanker (*carcinogen agent*). Karena itu perlu dicari alternatif lain yaitu bahan pengawet dan antioksidan alami yang bersumber dari bahan alam. Bahan pengawet dan antioksidan alami ini hampir terdapat pada semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebar di seluruh tanah air (Pina, 2009).

Praformulasi merupakan langkah awal dalam proses pembuatan sediaan farmasi dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dasar tentang sifat kimia fisika dari zat aktif bila dikombinasikan dengan zat atau bahan tambahan menjadi suatu bentuk sediaan farmasi yang stabil, efektif dan aman. Contohnya pada sediaan larutan. Sediaan Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat

kimia yang terlarut, biasanya dilarutkan didalam air, yang karena bahannya, cara peraciknya atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam produk lain (Ansel, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan formulasi dan uji efektivitas sediaan larutan ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sebagai pengawet pada buah karena penelitian sebelumnya yaitu penelitian Skrining Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Ekstrak Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L.) didapatkan hasil bahwa daun botto'-botto' bisa menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, bakteri gram negatif dan senyawa-senyawa yang terdapat pada ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Sriyanti, 2015). Penggunaan ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sebagai bahan pengawet terhadap sayuran dan buah-buahan dapat digolongkan sebagai bahan pengawet alami yang dapat memberikan proteksi dari serangan mikrooeganisme pembusuk.

Di dalam firman Allah swt. dalam surah (QS.asy-Syu'araa/26:7)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ آلِٰرَٰثِ كَمْ ۗ أَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِنۢ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۙ

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan dibumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama, 2006).

Umat manusia sebagai khalifah diperintahkan oleh Allah swt. untuk memperhatikan bumi dan seisinya serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, tidak terkecuali tumbuhan. Tumbuhan atau herba mempunyai banyak manfaat karena

dapat digunakan sebagai penunjang bagi kehidupan manusia. Karenanya, manusia diperintahkan untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari berbagai macam tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang berbagai macam jenisnya juga digunakan sebagai bahan alami dalam makanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efek ekstrak daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L.) dalam sediaan pengawet pada buah anggur, buah tomat, dan cabai dalam bentuk larutan ?
2. Bagaimana formulasi sediaan pengawet yang efektif pada buah anggur, buah tomat, dan cabai dalam bentuk larutan ?
3. Bagaimana tinjauan syariat Islam terhadap implementasi manfaat tumbuh-tumbuhan dalam pengobatan ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

a) Ekstrak

Ekstraksi adalah suatu proses penarikan zat pokok dari suatu bahan alam menggunakan pelarut yang sesuai dengan kelarutan dari bahan tersebut. Etanol 70% adalah salah satu pelarut yang cukup baik dalam melarutkan zat pokok tumbuhan karena efektif dalam menghasilkan jumlah bahan yang optimal (Voigh, 1994).

b) Pengawet

Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan bahan pangan dari pembusukan (Khomnas.A, 2010).

c) Bahan pangan

Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia di samping pendidikan, kesehatan dan sandang lainnya. Kebutuhan bahan pangan ini akan terus meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Secara garis besar masalah pangan dan sistem pangan umumnya dibagi atas sub sistem produksi, pengadaan dan konsumsi. Bahan pangan tersebut akan mengalami perubahan-perubahan yang tidak diinginkan antara lain pembusukan dan ketengikan (Pina, 2009).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan Formulasi dan Uji Efektivitas larutan pekat pada ekstrak daun botto'-botto' (*Chromoleana odorata L.*) dengan menggunakan pelarut etanol 70% sebagai pengawet terhadap buah anggur, buah tomat, dan cabai.

D. Kajian Pustaka

Sudding, *Studi Awal Penggunaan Ekstrak Air Daun Gulma Siam Chromolaena odorata (L.) King and Robinson dalam Mencegah Pembusukan Sayuran*. 2012. Efek anti bakteri inilah yang dijadikan studi awal penggunaan ekstrak air daun *C. odorata* dalam mencegah pembusukan sayuran wortel dan buah tomat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air daun *C. odorata* mampu mencegah

pembusukan baik pada sayuran wortel bungkus maupun buah tomat baik yang dibungkus dan yang tidak dibungkus hingga hari ke-32. Berdasarkan hasil tersebut berarti ekstrak *C. odorata* termasuk pengawet alami untuk sayuran dan buah khususnya wortel dan buah tomat.

Radix Suharjo. *Eksplorasi Potensi Gulma Siam (Chromolaena Odorata) Sebagai Biofungisida Pengendali Phytophthora Palmivora Yang Diisolasi Dari Buah Kakao*. 2011. Eksplorasi potensi gulma siam (*Chromolaena odorata*) sebagai biofungisida pengendali *Phytophthora palmivora* yang diisolasi dari buah kakao. Hasil pengujian pengaruh ekstrak gulma siam secara *in vitro* menunjukkan bahwa ekstrak bagian pucuk (daun dan batang muda) lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan *P. palmivora* daripada ekstrak bagian akar. Ekstrak pucuk tersebut memberikan kemampuan penghambatan terbaik terhadap pertumbuhan *P. palmivora* secara *in vitro* pada tingkat konsentrasi 40%, menghambat gejala serangan *P. palmivora* pada buah kakao di laboratorium mulai pada tingkat konsentrasi 50%, dan menghambat gejala busuk buah kakao di lapangan pada tingkat konsentrasi 60%.

Rini Kartika et al. *Bioaktivitas Ekstrak Agertahum conyzoidesz, Chromolaena odorata, Aeglemarmelos dan Glirisida sepium Terhadap Penyakit Busuk Buah Phytophthora palmivora) Pada Tanaman Kakao Di Kabupaten Bantaeng*. 2015. Penelitian ini dilakukan setelah penyemprotan dari ekstrak bahan tanaman bandotan (*Agertahum conyzoidesz*), semak bunga putih (*Chromolaena odorata*), maja (*Aeglemarmelos*), dan gamal (*Glirisida sepium*) pada buah kakao dengan tambahan larutan air gula merah sebagai bahan perekat. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa intensitas serangan penyakit *P.palmivora* terendam masing-masing sebesar 3,26% (pada awal pengamatan) dan 22,08% (pada akhir pengamatan) diperoleh pada aplikasi bandotan (*Agertahum conyzoidesz*) dengan konsentrasi 2,5%.

Pina Barus, *Pemanfaatan Bahan Pangan dan Antioksidan Alami pada Industri Bahan Makanan*. 2009. Proses pembusukan dan ketengikan disebabkan oleh adanya reaksi kimia yang bersumber dari dalam dan dari luar bahan pangan tersebut. Dari segi ilmu kimia, komponen utama dari bahan pangan terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Kerusakan bahan pangan ini umumnya disebabkan oleh mikroorganisme melalui proses enzimatis dan oksidasi, terutama yang mengandung protein dan lemak sementara karbohidrat mengalami dekomposisi.

Utama, MS. *Penanganan Pasca panen Buah dan Sayuran*. 2001. Buah yang baru dipanen sebenarnya telah dilabui oleh berbagai macam mikroorganisme (mikroflora) dari yang tidak menyebabkan pembusukan sampai yang menyebabkan pembusukan. Mikroorganisme pembusuk dapat tumbuh bila kondisinya memungkinkan seperti adanya pelukaan-pelukaan, kondisi suhu dan kelembaban yang sesuai dan sebagainya.

Yuyun Fitriana et al. *Uji Efikasi Ekstrak Gulma Siam Terhadap Mortalitas Hama Pencucuk Buah Kakao (*Helopeltis Spp.*) Di Laboratorium*. 2012. Pengujian dilakukan pada 6 tingkat konsentrasi ekstrak gulma siam 0% (kontrol), 20%, 30%, 40%, 50% dan 60% dengan dan tanpa penambahan 0,3% pengemulsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak gulma siam mampu menyebabkan kematian nimfa dan imago *Helopeltis spp.* Tingkat mortalitas untuk nimfa berkisar

dari 26,6% hingga 50,0% tanpa pengemulsi dan 78,8% hingga 85,00% dengan pengemulsi, dan untuk imago dari 15,0% hingga 46,6% tanpa pengemulsi dan 31,67% hingga 71,67% dengan pengemulsi. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penambahan pengemulsi dapat meningkatkan daya racun ekstrak gulma siam terhadap *Helopeltis* spp. Semua tingkat konsentrasi ekstrak gulma siam yang diujikan tidak mengakibatkan perbedaan mortalitas hama pencucuk buah kakao yang nyata.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efek ekstrak daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L.) dalam sediaan pengawet pada buah anggur, buah tomat, dan cabai dalam bentuk larutan.
2. Untuk mengetahui formulasi sediaan pengawet yang efektif pada buah anggur, buah tomat, dan cabai dalam bentuk larutan.
3. Untuk mengetahui tinjauan syariat islam tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dalam pengobatan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah tentang manfaat daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat, petani dan ibu rumah tangga bahwa formulasi ekstrak tanaman daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dapat digunakan sebagai bahan pengawet pada sayuran dan buah-buahan yang alami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahan Pengawet

Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan bahan pangan dari pembusukan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/per/IX/19988 tentang bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Zat pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam dan garamnya. Zat pengawet organik mudah dibuat serta dapat terdegradasi dalam tubuh sehingga mudah diekskresikan, sebaliknya zat pengawet anorganik tidak mudah didegradasikan sehingga tidak mudah diekskresikan dalam tubuh (Khomsan.A, 2010).

Bahan pangan umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah busuk. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Akan tetapi tidak jarang produsen menggunakannya pada bahan pangan yang relative awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Penggunaan bahan pengawet dalam kaitan keamanan pangan telah diatur oleh badan

internasional seperti *The Joint FAO/WHO* sebagai bagian dari bahan pengawet benzoate dalam list kategori aman asalkan melebihi 0.1% (Lena, 2009).

Pemakaian bahan pengawet disatu sisi menguntungkan karena dengan bahan pengawet, bahan pangan dapat dibebaskan dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat pathogen yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya maupun mikrobial yang non pathogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan, misalnya pembusukan. Namun dari sisi lain bahan pengawet pada dasarnya adalah senyawa kimia yang merupakan bahan asing yang masuk bersama bahan pangan yang dikonsumsi. Apabila pemakaian bahan pangan dan dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung misalnya keracunan, maupun yang bersifat tdk langsung atau kumulatif, misalnya bahan pengawet yang digunakan bersifat karsinogenik (Khomsan.A, 2010).

Konsentrasi bahan pengawet yang diizinkan oleh peraturan bahan pangan sifatnya adalah menghambat dan bukannya mematikan organism-organisme pencemar. Oleh karena itu sangat penting bahwa populasi mikroorganisme dari bahan pangan yang akan diawetkan harus dipertahankan minimum dengan cara penanganan dan pengolahan secara higienis. Jumlah bahan pengawet yang diizinkan akan mengawetkan bahan pangan dengan muatan mikroorganisme yang normal untuk satu jangka waktu tertentu, tetapi kurang efektif jika dicampurkan kedalam bahan-bahan pangan yang membusuk atau terkontaminasi secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan penyakit terhadap konsumen. Untuk zat pengawet yang tidak diizinkan

seperti boraks dan formalin mempunyai efek negatif tertentu bagi kesehatan (Khomsan.A, 2003).

Keberadaan bahan tambahan makanan adalah untuk membuat makanan tampak lebih berkualitas, lebih menarik, serta rasa dan teksturnya lebih sempurna. Zat-zat itu ditambahkan dalam jumlah sedikit. Namun hasilnya sungguh menakjubkan. Bahan tambahan makanan ternyata sudah lama digunakan dalam pengawetan makanan. Orang romawi kuno menggunakan garam untuk mengawetkan daging dan sulfur untuk mencegah terjadinya oksidasi pada minuman anggur (Khomsan.A, 2003).

Tujuan bahan tambahan pangan. Menurut Cahyadi (2008), penggunaan bahan tambahan makanan pada prinsipnya ditujukan:

- a) Meningkatkan atau memperbaiki mutu gizi bahan pangan.
- b) Meningkatkan kepuasan terhadap bahan pangan berdasarkan sifat organoleptik.
- c) Memperpanjang masa simpan pangan olahan.
- d) Untuk mendukung kemajuan teknologi pangan yang semakin pesat.

Perbedaan antara bahan pengawet sintetis. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses degradasi bahan pangan terutama yang disebabkan oleh faktor biologi. Penggunaan pengawet dalam makanan harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan makanan tertentu, tetapi tidak efektif untuk mengawetkan makanan lainnya karena makanan mempunyai sifat yang berbeda-beda

sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya juga berbeda. Beberapa bahan pengawet yang umum digunakan adalah benzoat, propionat, nitrit, nitrat, sorbat dan sulfit (AI.Muhmudattusa'adah, 2006).

BTP (Bahan Tambahan Pangan) dapat berupa ekstrak bahan alami atau hasil sintesis kimia. Bahan yang berasal dari alam umumnya tidak berbahaya, sementara BTP artifisial atau sintetik mempunyai risiko terhadap kesehatan jika disalahgunakan pemakaiannya. Produsen pangan skala rumah tangga atau industri kecil memakai bahan tambahan yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan karena alasan biaya. Tidak jarang, produk pangan ditambahkan zat yang bukan untuk makanan tapi untuk industri lain, misalnya untuk tekstil, dan cat. Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) menemukan banyak produk-produk yang mengandung formalin. Formalin bersifat desinfektan, pembunuh hama, dan sering dipakai untuk mengawetkan mayat. Pewarna tekstil seperti Rhodamin B sering pula ditemukan pada kerupuk dan terasi. Mengonsumsi makanan yang mengandung formalin atau Rhodamin dapat menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh dan kanker. Bahan tambahan yang dilarang oleh BPOM, melalui Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/88 adalah : Asam borat, Asam salisilat, Dietilpirokarbonat, Dulsin, Kalium klorat, Kloramfenol, Minyak nabati yang dibrominasi, Nitrofurazon, dan Formalin (AI.Muhmudattusa'adah, 2006).

Penggunaan formalin pada produk makanan adalah melanggar peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan. Peraturan tersebut secara jelas mengatakan bahwa formalin sebagai bahan

kimia yang dilarang di gunakan dalam makanan. Formalin sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, dan tertelan. Akibat yang bisa ditimbulkan seperti luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernapasan, reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia (BPOM, 2003). Berdasarkan hasil pemantauan BPOM tahun 2007 dari 97 contoh makanan yang dijual dipasaran 75,8 % mengandung formalin (Yuliarti, 2007).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis, sehingga membuat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil buah-buahan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pertanian buah-buahan Indonesia. Namun karena populasi masyarakat Indonesia yang begitu besar sehingga buah-buahan yang dihasilkan oleh para petani Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah harus melakukan impor buah-buahan dari berbagai macam negara dan juga untuk melengkapi kebutuhan buahbuahan yang tidak bisa tumbuh di iklim tropis pemerintah juga harus melakukan impor pada beberapa jenis buah tersebut (Yuliarti, 2007).

B. Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Obat-obatan yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus sangat toksis terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksis terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2008).

Antimikroba dapat bersifat: (Djide, 2008)

1. Bakteriostatika, yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri)
2. Bakteriosida, yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri).

Tujuan penggunaan antiseptika pada kulit adalah untuk membasmi mikroorganisme yang kebetulan berada dipermukaan kulit, tetapi tidak memperbanyak diri ditempat itu dan pada umumnya akan mati sendiri (transient flora). Tetapi lebih penting adalah membasmi resident flora, yakni jasad renik yang merupakan penghuni alamiah di kulit dan terutama terdiri dari mikroba patogen, seperti *Staphylococcus epidermidis*, *Corynebacteri*, *Propionibacteri* dan kadang-kadang *Staphylococcus aureus* (Tjay & Raharja, 2007).

Antibakteri berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi:

1. Spektrum luas yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh bakteri gram negatif maupun gram positif (benzyl penisilin dan streptomisin).
2. Spektrum sempit yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri gram negatif atau gram positif saja (tetrasiklin dan kloramfenikol) (Ganiswara, 2007).

Mekanisme Kerja Antimikroba

Mekanisme penghambatan antibakteri dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu menghambat sintesis dinding sel mikrobia, merusak keutuhan dinding sel mikrobia, menghambat sintesis protein sel mikrobia, menghambat sintesis asam nukleat, dan merusak asam nukleat sel mikroba (Sulistyo, 1971).

Menurut Djide (2008) mekanisme kerja dari suatu antiseptika dan desinfektansia sangat beragam yang dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu :

a. Penginaktifan enzim tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia seperti turunan aldehid, amida, karbanilida, etilen-oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa amonium quaertener. Aldehid dan etilen oksida bekerja dengan mengalkilasi secara langsung gugus nukleofil seperti gugus amino, karboksil, fenol, dan thyol dari protein sel bakteri. Reaksi alkilasi tersebut menyebabkan pemblokkan sisi aktif dan perubahan komformasi enzim sehingga terjadi hambatan pertumbuhan sel bakteri.

b. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, merkuri, peroksida, turunan fenol, dan senyawa ammonium quartener bekerja sebagai antiseptika dan desinfektan dengan cara denaturasi dan konjugasi kodein sel bakteri itu turunan fenol, senyawa ini berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses absorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein fenol dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami penguraian, diikuti penetrasi fenol kedalam sel dan

menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein sel dan membran sitoplasma mengalami lisis.

c. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa amonium kuartener. Dengan mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri, senyawa-senyawa tersebut dapat mengakibatkan bocornya konstituen sel yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian. Contohnya klorheksidin.

d. Interkalasi DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesis DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

Tabel. Sifat ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang dapat menghambat bakteri.

Bakteri gram negatif	Bakteri gram positif	Pelarut ekstrak daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	Kepustakaan
<i>Erwinia carotovora</i> , <i>Pseudomonas marginalis</i>		Etanol	Utama, S, 2001

	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Metanol	Lovet T. Kigigha Et Al. 2013
	<i>Bacillus cereus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>	Etanol	Okigbo dan Ajalie, 2005
<i>Escherechia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Salmonella thypi</i> , <i>Vibrio sp</i> , <i>Shigella dysenteriae</i>	<i>Basillus subtilis</i> , <i>Stapphylococcus aureus</i> , <i>Stapphylococcus epidermidis</i> , <i>Streptococcus mutans</i>	Etanol dan n-heksan	Sriyanti Sadsyam et al, 2015
	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Stapphylococcus epidermidis</i>	Etanol	Nurul et al, 2006
<i>Escherechia coli</i> , <i>Salmonella thypi</i>		Etanol dan Aquadest	Douye V. Zige et al, 2013
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Etanol	Siti Rofida, 2015
<i>Aeromonas hydrophilla</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Candida albicans</i>		Aquadest	Y. Hadiroseyani et al, 2005
<i>Salmonella thypi</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	Etanol	Mbajiuka et al, 2014

C. Sediaan Formulasi

Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, biasanya dilarutkan didalam air, yang karena bahannya, cara peraciknya atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam produk lain (Ansel, 2008).

Komposisi sediaan Larutan Pekat

1. Zat aktif


Ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Zat aktif ini adalah bahan alami yang banyak ditemukan disekitar lingkungan kita yaitu berupa tanaman daun botto'-botto' atau gulma siam (*Chromolaena odorata* L.). Tanaman ini dapat digolongkan sebagai antimikroba berspektrum luas karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan gram positif (Sriyanti Syam, 2015).

2. Solvent

Uraian bahan H₂O (aquadest)

Aquadest	:	(Dirjen POM; 1995)
Nama resmi	:	AQUA DESTILATA
Nama lain	:	Aquadest, aqua destilata, air murni, air suling
Rumus molekul	:	H ₂ O
Berat molekul	:	18.02
Rumus struktur	:	



Pemeriaan	: Cairan jernih, tidak berwarna; tidak berbau
Kelarutan	: Terlarut campur dengan sebagian besar pelarut polar
Ph	: 5,0 sampai 7,0
Stabilitas	: Air stabil secara kimiawi di semua sifat fisik (es, cair, dan uap)
Incompatibilities	: Air dapat bereaksi cepat dengan logam alkali dan oksida, seperti kalsium oksida dan magnesium oksida. Air juga bereaksi dengan garam anhidrat untuk membentuk hidrat dari berbagai komposisi, dan dengan beberapa organik bahan dan kalsium karbida
Penyimpanan	: Dalam wadah tertutup rapat.
Kegunaan	: Sebagai pelarut

Bahan pembawa untuk sediaan larutan dapat dibedakan atas pembawa air (air, aqua rosae, giserin, propilen glikol, sorbitol), pembawa non air (alkohol, minyak) dan pembawa yang manis dan kental (sirup, larutan makromolekular). Pembawa dalam sediaan larutan terdiri dari Pembawa air (Aqueous solutions) dan Pembawa non - air (Non-aqueous solutions). Pembawa air (Aqueous solutions) adalah campuran

homogen yang disiapkan dengan melarutkan bahan padat, cair atau gas dalam medium (pembawa) berair. Bahan pembawa jenis ini dapat berupa air, air aromatik atau ekstrak. Air digunakan sebagai pembawa dan pelarut untuk bahan pemberi rasa (flavoring agent) atau bahan aktif obat. Air memberi keuntungan sebagai pelarut karena tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak memiliki efek farmakologi, netral dan sangat murah (Isriany Ismail, 2011).

Aquades digunakan sebagai pelarut pembawa pada pembuatan obat dan sediaan farmasi (Rowe, 2009). Aquades merupakan pelarut yang umum digunakan dalam sediaan oral karena tidak toksik, mudah didapat, dan murah. Aquades untuk pengolahan sediaan farmasi harus digunakan air yang sempurna (Voigt, 1984). Terdapatnya air menimbulkan efek melarutkan pada sebagian besar zat-zat yang berhubungan dengannya (Ansel, 1989).

3. Co-Solvent

Uraian bahan Tween

Tween	: (Excipient; 2009)
Nama resmi	: POLYSORBATUM
Nama lain	: Polisorbat, tween
Pemerian	: Cairan kental, transparan, tidak berwarna hampir tidak mempunyai rasa.
Kelarutan	: Mudah larut dalam air, dalam etanol (95%) P

dalam etil asetat P dan dalam methanol P,
sukar larut dalam parafin cair P.

- Konsentrasi : 3%
- Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat.
- Kegunaan : Sebagai Co-solvent

Polisorbat telah ditemukan untuk menjadi berguna dalam meningkatkan bioavailabilitas oral molekul obat yang substrat untuk p-glikoprotein. Polisorbat juga banyak digunakan dalam kosmetik dan makanan produk. Penggunaan polisorbat dengan konsentrasi (%) agen pengemulsi minyak dalam air digunakan 1-15, dalam kombinasi dengan hidrofilik pengemulsi air dalam minyak digunakan 1-10, untuk meningkatkan sifat air-holding dari salep digunakan 1-10, agen pelarut untuk konstituen aktif yang sukar larut dalam basis lipofilik 1-10, agen pembasahan untuk konstituen aktif tidak larut dalam lipofilik basa 0,1-3 (Excipient, 2009).

Alat yang digunakan pada sediaan ini adalah handsprayer (alat semproy). Fungsi sprayer menurut Bronson dan Anderson (1990), yaitu memecah cairan menjadi tetes-tetes dengan dengan ukuran yang efektif untuk didistribusikan secara merata diatas permukaan atau ruang yang harus dilindungi. Handsrayer, yaitu sprayer yang berukuran kecil dan khusus untuk keperluan dilapangan rumah, taman, dan penyemprotan ringan lainnya.

D. Herba Botto'-Botto' (Chromolaena odorata L.)

Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata L.*) adalah tanaman semak, dan merupakan gulma perkebunan tanaman dan padang rumput di Asia Selatan dan Afrika Barat. Tanaman ini adalah gulma dari 13 tanaman di 23 negara (Phan, 2004). Gulma ini tiba-tiba mendapat perhatian lagi setelah peneliti padang rumput Australia mencemaskan gulma ini akan masuk ke Australia dari padang rumput di NTT (Departemen of Natural Resources, Miner and Water, 2006). Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh tanaman ini terhadap subsektor peternakan ternyata sangat tinggi. Australia yang merupakan negara peternakan telah mengeluarkan banyak dana selama tujuh tahun untuk mencegah dan mengendalikan gulma ini. Tanaman ini menjadi racun bagi ternak karena daun dan tunas mudanya memiliki kadar nitrat yang sangat tinggi (5 sampai 6 kali di atas kadar toksik), sehingga dapat mematikan ternak yang makan tanaman ini (Akinmoladun, 2007).

1. Klasifikasi *Chromolaena odorata L.* (Anonim, 2013)

Klasifikasi tumbuhan Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata L.*):

Kingdom : Plantae
Super Divisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub Kelas : Asteridae
Ordo : Asterales

Family : Asteraceae
Genus : Chromolaena
Spesies : *Chromolaena odorata* (L.)

2. Nama daerah

Chromolaena odorata (L.) dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Di Makassar khususnya, spesies ini dikenal dengan beberapa nama, seperti Botto'-Botto', Laruna, dan Gondrong-Gondrong. Beberapa daerah lain misalnya, memiliki nama tersendiri, Kopasanda di Maros, Ki Rinyuh di Sunda, Tekelan di Jawa, *Siam Weed* atau *Jack in the Bush* di Inggris (Prawiradiputra, 2006).

3. Morfologi

Tumbuhan botto'-botto' termasuk keluarga *Asteraceae* atau *Compositae*. Daunnya oval, bagian bawah lebar, makin ke ujung makin runcing. Panjang daun 6–10 cm dan lebar 3–6 cm. Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun berhadap-hadapan. Karang bunga terletak di ujung cabang. Setiap karangan terdiri atas 20 – 35 bunga. Warna bunga putih (Prawiradiputra, 2006).

Tumbuhan botto'-botto' berbunga pada musim kemarau, perbungaannya serentak selama 3–4 minggu. Pada saat biji masak, tumbuhan mengering. Pada saat itu biji pecah dan terbang terbawa angin. Kira-kira satu bulan setelah awal penghujan, potongan batang, cabang dan pangkal batang bertunas kembali. Biji-biji yang jatuh ke tanah mulai berkecambah sehingga dalam waktu dua bulan kecambah dan tunas-tunas telah mendominasi area (Prawiradiputra, 2006).

Tanaman ini membentuk semak, tinggi tumbuhan dewasa, berkisar 3-7 meter tingginya ketika tumbuh di tempat terbuka. Batang muda berwarna hijau dan agak lunak yang kelak akan berubah menjadi coklat dan keras (berkayu) apabila sudah tua. Letak cabang biasanya berhadap-hadapan (oposit) dan jumlahnya sangat banyak. Percabangannya yang rapat menyebabkan berkurangnya cahaya matahari ke bagian bawah, sehingga menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang tumbuh di bawahnya. Dengan demikian gulma ini dapat tumbuh sangat cepat dan mampu mendominasi area dengan cepat pula. Kemampuannya mendominasi area dengan cepat ini juga disebabkan oleh produksi bijinya yang sangat banyak (Phan, 2004).

Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepat perkembangbiakan dan pertumbuhannya, gulma ini cepat membentuk komunitas sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 1000–2800 m dpl, tetapi di Indonesia banyak ditemukan di dataran rendah (0–500 m dpl) seperti di kebun karet dan kelapa serta di padang penggembalaan (Prawidiputra, 2006).

4. Kandungan Kimia

Skrining fitokimia pada sampel daun botto'-botto' dilakukan oleh Harbone (1973) dan Sofowora (1980). Mereka menyaring beberapa senyawa kimia kelompok pada sampel, berupa alkaloid, glikosida sianogen, flavonoid (auron, kalcon, flavon, and flavonol), fitat, saponin, dan tanin. Determinasi kuantitatif pada senyawa fitat,

saponin, dan tanin dipublikasi dengan metode relevan oleh Asosiasi Kimia Analisis Resmi tahun 2006.

Spackman (1985) menemukan asam amino dari botto'-botto', dengan melakukan serangkaian metode yaitu dengan mengeringkan daun botto'-botto' hingga bobotnya konstan, dibebas-lemakkan, dihidrolisis, lalu dievaporasi hingga diproses lebih lanjut dalam Aplikator Teknisi Multi-sampel dari Analitik Asam Amino (Ngozi, 2009).

Kandungan nitratnya yang tinggi (lima hingga enam kali di atas kadar toksik) dapat menyebabkan aborsi bahkan kematian ternak serta dapat meracuni daun dan tunas muda tanaman kebun (Akinmoladun, 2007).

5. Kegunaan

Dilaporkan oleh Ngozi (2009) bahwa dalam pengobatan tradisional, botto'-botto' digunakan sebagai bahan alam yang berkhasiat sebagai antispasmodik, antiprotozoa, antibakteria, antifungi, antihipertensi, antiinflamasi, astringen, antitriptosoma, diuretik dan bahan hepatotropik.

Senada dengan laporan Ngozi, Vital (2009) juga turut menyebutkan khasiat terapeutik dari tanaman botto'-botto' seperti antidiare, antispasmodik, astringen, antihipertensi, antiinflamasi, antimikroba, dan diuretik. Penggunaan daunnya yang dibuat dalam dekokta dimanfaatkan sebagai obat batuk atau bila dicampurkan rumput lemon dan daun jambu biji berkhasiat mengobati penyakit malaria.

Tanaman Botto'-botto' memberikan keuntungan bagi pertanian, khususnya tanaman pangan. Di India, gulma ini dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil

berbagai jenis tanaman pangan, seperti kedelai, *cluster bean*, *radish*, palak dan ragi yang tumbuh di sana (Prawiradiputra, 2007).

E. Penyarian

Penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari, sehingga terjadi larutan zat aktif dalam cairan penyari tersebut. Umumnya penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia makin luas. Karenanya makin halus serbuk simplisia seharusnya makin baik penyariannya.

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau aktif, sehingga senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar dari senyawa kandungan yang diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Septiningsih, 2008).

Ekstrak etanol daun *Chromoleana odorata* merupakan antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan *B. subtilis*, *S. aureus*, dan *S. typhimurium*. Ekstrak *C.odorata* mengandung flavonoid, saponin, tanin dan steroid (Vital, 2009). Sebagai Antimikroba, Menurut Robinson (1995) Flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan jalan merusak permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil dari interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri juga mampu melepaskan energi tranduksi terhadap membran sitoplasma bakteri serta menghambat motilitas bakteri. Sedangkan tanin bertindak seperti asam ringan

berdasarkan banyak gugus-OH fenolik. Tanin dapat berfungsi sebagai agen antimikroba alami (Salunkhe *et al.* 1989; Sanderson *et al.* 2001). Senyawa tanin adalah senyawa yang bersifat polar karena adanya gugus OH, ketika ditambahkan FeCl₃ 10% akan terjadi perubahan warna seperti biru tua atau hijau kehitaman yang menandakan adanya senyawa tanin (Jones dan Kinghorn, 2006; Robinson, 1991)

1. Ekstraksi

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Metode penarikan zat aktif ini berupa pemisahan senyawa di mana komponen-komponen terlarut dari suatu campuran dipisah dari komponen yang tidak larut dengan pelarut sesuai, sedangkan proses perpindahan massa zat aktif yang semula berada dalam sel yang ditarik oleh cairan penyari sehingga didapatkan zat aktif larut dalam penyari disebut dengan penyarian. Pembuatan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang terdapat di dalam simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan zat berkhasiat tersebut dapat diatur dosisnya (Wientarsih & Prasetyo, 2006).

Pada dasarnya metode ekstraksi ada beberapa macam di antaranya yaitu maserasi (perendaman), perkolasi, digesti, infusi, dan dekoksifikasi. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut organik dengan kepolaran yang semakin meningkat secara berurutan. Pelarut yang digunakan harus memenuhi syarat tertentu yaitu tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harga murah, tidak korosif, aman, dan tidak mudah meledak (Wientarsih & Prasetyo, 2006).

Etanol adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78°C), mudah terbakar, serta larut air, dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari 0,7964 (Voight, 1995).

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dari pada air. Sukar ditumbuhi mikroba dalam etanol 20% ke atas. Memiliki beberapa kelebihan lain yaitu tak beracun, netral, absorpsi baik, bercampur dengan air pada segala perbandingan, memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas tinggi untuk pemekatan. Penggunaan etanol sebagai cairan penyari biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran dengan air (Voight, 1995).

2. Maserasi

Metode maserasi merupakan penyarian sederhana yang dilakukan dengan merendam simplisia dalam penyari yang sesuai selama beberapa hari dalam temperatur kamar dan terlindung cahaya. Maserasi digunakan untuk menyari komponen kimia simplisia yang mudah larut dalam penyari (Fachruddin, 2001).

Maserasi umumnya dilakukan dengan cara memasukkan simplisia yang sudah diserbukkan dengan derajat halus tertentu sebanyak 10 bagian ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan 75 bagian cairan penyari, ditutup, kemudian ditutup dan dibiarkan selama lima hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, disaring ke dalam wadah penampung

kemudian ampasnya diperas dan ditambah cairan penyari lagi secukupnya dan diaduk kemudian disaring lagi hingga diperoleh sari sebanyak 100 bagian. Sari yang diperoleh ditutup dan disimpan pada tempat yang terlindung dari cahaya selama 2 hari, endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan (Fachruddin, 2001).

Ekstrak dapat berupa sediaan kental, sediaan kering atau cair yang dibuat dengan mengambil simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung. Sebagai cairan penyari digunakan air, eter, campuran etanol dan air. Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat dalam simplisia terdapat dapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan mengatur dosisnya. Dalam sediaan ekstrak distandarisasikan kadar zat berkhasiat sedangkan kadar zat berkhasiat dalam simplisia sukar didapat yang sama (Moh Arief, 2003).

F. Pembusukan Sayuran

Bahan pangan seperti sayuran dan buah jika dibiarkan di udara terbuka pada suhu kamar akan mengalami kerusakan atau bahkan kebusukan. Kerusakan atau kebusukan dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung dari jenis bahan pangan atau makanan yang bersangkutan dan kondisi lingkungan dimana bahan pangan atau makanan diletakkan (Utama, S. 2007).

Kehilangan mutu dan kerusakan pangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Syamsir, 2008) :

1. Pertumbuhan mikroba yang menggunakan pangan sebagai substrat untuk memproduksi toksin di dalam pangan
2. Katabolisme dan pelayuan (*senescence*) yaitu proses pemecahan dan pematangan yang dikatalisis enzim indigenus;
3. Reaksi kimia antar komponen pangan dan/atau bahan-bahan lainnya dalam lingkungan penyimpanan;
4. Kerusakan fisik oleh faktor lingkungan (kondisi proses maupun penyimpanan).
5. Kontaminasi serangga, parasit dan tikus.

Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalis biologis yang dapat mengendalikan berbagai reaksi biokimia yang terdapat di dalam jaringan hidup. Enzim dapat berasal secara alami di dalam bahan pangan, atau dapat pula berasal dari mikroba yang mencemari bahan pangan yang bersangkutan. Enzim yang dikeluarkan oleh mikroba dapat menimbulkan perubahan bau, warna dan tekstur pada bahan pangan, enzim yang terdapat secara alami di dalam bahan pangan misalnya enzim polifenol oksidase pada buah salak, apel atau ubi kayu. Enzim dapat menimbulkan warna coklat jika buah atau ubi dipotong. Enzim polifenol oksidase merupakan salah satu jenis enzim yang merusak bahan pangan karena warna coklat yang ditimbulkannya. Enzim dapat pula menyebabkan penyimpangan citarasa makanan seperti enzim lipoksidase yang menimbulkan bau langu pada kedelai. Enzim juga dapat menyebabkan pelunakan pada buah, misalnya enzim pektinase yang umum terdapat pada buah-buahan, merupakan salah satu faktor yang dapat

menimbulkan kerusakan pada bahan pangan, maka enzim perlu dinaktifkan jika bahan pangan yang bersangkutan akan diawetkan (Sucipto, 2008).

G. Tinjauan Islam

Islam senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan. Hal inilah yang mendorong umat muslim untuk mengenal banyak ilmu salah satunya adalah ilmu membuat bahan makanan alami yang menggunakan bahan alam khususnya tumbuhan.

Di dalam firman Allah swt. dalam surah (QS.asy-Syu'araa/26:6-9)

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٦ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٩

Terjemahnya :

“Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang” (Kementerian Agama, 2006).

Umat manusia sebagai khalifah diperintahkan oleh Allah swt. untuk memperhatikan bumi dan seisinya serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, tidak terkecuali tumbuhan. Hal tersebut merupakan salah satu bukti kebesaran Allah swt. yang ditunjukkan kepada manusia selain itu, yang terdapat dalam kata زَوْج dan أَنْبَتْنَا yang berarti ‘pasangan’ dan ‘berbagai macam tumbuhan’. Maksud dari kata tersebut yakni, setiap tumbuh-tumbuhan memiliki pasangan guna pertumbuhan dan

perkembangannya (benang sari dan putik) serta penyakit dan obatnya. Ayat ini diturunkan oleh Allah swt. kepada orang-orang yang telah mendustakan kebenaran dan bersifat sombong atas keagungan Allah swt. Kemudian melalui ayat ini Allah swt. mengingatkan kebesaran dan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah swt. Maha Agung dan Maha Kuasa yang menciptakan bumi dan langit. Oleh karena itu kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran bahwa Allah swt. memberikan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya dalam mengkaji hasil ciptaan Allah swt. salah satunya adalah dengan melakukan penelitian ini, dimana tujuannya untuk membuktikan kebenaran dari tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan secara tradisional yang harus di buktikan secara ilmiah melalui penelitian.

Di dalam firman Allah swt. dalam surat (QS.Al-Baqarah/2:172-173)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ ۱۷۲ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۱۷۳

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Kementerian Agama, 2006).

Melalui firman-Nya pada kata **كُلُوا** yang berarti ‘makanlah’ Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik

dari rezki yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. kepadanya supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rezeki tersebut, karena memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa dan diterimahnya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya doa dan ibadah. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya :

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman “Hai para rasul makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mu’minun:51) Dia juga berfirman “Hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu” (QS. Al-Baqarah: 172)”

Makna ayat diatas menyebutkan bahwa semua yang tidak diharamkan oleh agama adalah bersifat halal, tak terkecuali dengan pengawet yang digunakan sebagai bahan tambahan makan. Pengawet makanan yang bersumber dari barang yang haram akan bersifat haram, bahan pengawet makanan apabila berupa hewan yang halal jika disembelih dengan tidak menyebut nama Allah pun bersifat haram (Zaidul Akbar, 2011).

Dengan demikian, pangan yang baik ialah yang dibolehkan syariat, dan yang buruk ialah yang diharamkannya.

Negara-negara Islam, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, ternyata menghadapi masalah di mana sebagian produk pangan tidak

memenuhi standar ajaran Islam. Godaan persaingan pasar lokal dan global memiliki andil terjadinya campur aduk produk halal dengan yang haram, yang baik dan buruk, sehingga syubhat dapat dikatakan menjadi kualifikasi umum produk makanan dan minuman karena banyaknya produk yang menggunakan zat-zat tambahan yang haram atau mengandung syubhat. Dampak negatif revolusi industri di segmen pangan telah mengantarkan teknologi pengolahan pangan sampai kepada tingkat sulit untuk mencurigai kandungan dan sumber produk yang dihasilkan, sehingga konsumen yang terpelajar pun terpana dibuatnya apalagi konsumen awam dari kalangan umat Islam. Oleh karena itu pabrikasi makanan dan minuman tergolong masalah yang patut dikhawatirkan pada era modern ini. Makanan yang bersifat aman artinya tidak menyebabkan penyakit, alami dengan kata lain aman secara duniawi dan ukhrawi. Keamanan pangan (food safety) ini secara implisit dinyatakan dalam al-Qur'an.

Allah swt. memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (Halalan Thoyyiban) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain.

Di dalam firman Allah swt. dalam surat (OS.Al-Baqarah/2:168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

*karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”
(Kementerian Agama, 2010).*

Dari semua ayat di atas dapat dipahami bahwa seruan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halalan toyyiban. Dari kata **حَلَالٌ** yang berarti 'Halal' dalam pandangan agama sebagaimana yang telah dituliskan dalam Al Qur'an, sedangkan makanan yang toyyiban atau yang baik adalah makanan yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Eksperimen Laboratorium. Dengan artian Penelitian Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap objek penelitian. Penelitian Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui Formulasi dan Uji Efektivitas Larutan ekstrak Daun botto'-botto' (*Chromoleana odorata* L.) sebagai pengawet pada buah anggur, buah tomat, dan cabai.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia, Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Eksperimen.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi : Tanaman Botto-Botto (*Chromoleana odorata* L.) dari Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Sampel : Daun botto-botto (*Chromolaenaodorata* L.) yang diambil di Kelurahan Romang Polong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sampel diambil pada pagi hari sekitar pukul 09:00 WITA.

D. Instrument Penelitian / Pengumpulan Data

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah toples, labu erlenmeyer, gelas kimia, neraca analitik, batang pengaduk, handscoon, handspayer, mangkok, penangas, *rotary evaporator*, sendok besi, corong, dan rak

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air suling, tween 80, sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*), buah anggur, buah tomat, cabai, dan kain saring.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

a) Pengambilan sampel

Sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) diperoleh dari Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, daun yang dipetik adalah daun sehat, daun yang tidak busuk dan tidak berjamur.

b) Pengolahan sampel

Sebelum dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu daun botto'-botto' yang telah dipetik disortasi basah. Setelah proses sortasi basah, kemudian daun dicuci dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir, setelah proses pencucian, kemudian daun dikeringkan dengan cara mengangin-anginkan didalam ruangan yang

terlindung oleh cahaya matahari langsung. Simplisia yang telah kering selanjutnya diserbukkan.

c) Ekstraksi Sampel

Sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) yang telah diserbukkan selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi. Sampel daun botto'-botto' sebanyak 300 gram dimasukkan kedalam wadah maserasi, sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) dibebas lemakkan dengan penyari n-heksan. Wadah maserasi ditutup, disimpan ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung kemudian disaring. Serbuk yang telah direndam dengan n-heksan dikeringkan (diangin-anginkan) kembali dan dilakukan maserasi perendaman menggunakan pelarut baru yaitu etanol 70%. Sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) dimasukkan kedalam wadah maserasi, dibasahi dengan penyari etanol 70% hingga semua simplisia terbasahi, diaduk kemudian ditambahkan kembali penyari etanol 70%. Wadah maserasi ditutup dan disimpan ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung dan simpan selama 24 jam kemudian disaring. Dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Maserasi dengan penyari etanol 70% dilakukan sebanyak 3x24 jam. Penyarian yang dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada yang dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama. (Depkes RI. 1986) Ekstrak etanol 70% yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya sehingga diperoleh larutan pekat dengan alat *rotary evaporator* pada suhu 40°C. Kemudian ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) yang telah diperoleh akan dibebasetanolkan.

2. Rancangan Formulasi

a) Formulasi sediaan larutan ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) sebagai pengawet buah.

Tabel 1. Rancangan Formulasi

Bahan	Kegunaan	Konsentrasi
Ekstrak daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata L.</i>)	Zat aktif	1%, 2%, 3%, tween 80 dan 0%
Tween 80	Co-solvent	3%
Air suling	Pelarut	add 100 ml

Pembuatan sediaan :

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan kemudian ambil bahan-bahan dan ditimbang ekstrak sebanyak 1 gram, 2 gram, dan 3 gram dengan menggunakan timbangan neraca analitik setelah itu diambil ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) dengan konsentrasi yang efektif menghambat pembusukan, dimasukkan dalam labu erlenmayer. Ditambahkan dengan pelarut air suling sedikit demi sedikit dan ditambahkan tween 80 dengan konsentrasi 3% (3ml) kemudian dihomogenkan setelah itu dicukupkan hingga 100 ml dengan pelarut air suling dan dimasukkan kedalam baskom yang telah disiapkan.

b) Uji Penghambatan pembusukan buah

Terhadap ekstrak daun botto'-botto' dilakukanlah uji penghambatan pembusukan buah anggur, buah tomat, dan cabai dengan konsentrasi yang dibutuhkan pada perlakuan ini adalah konsentrasi 3%, 2%, 1%, dan control (0%) untuk masing-masing sampel (buah anggur, buah tomat, dan cabai).

Tabel 2. Uji Penghambatan pembusukan buah

Bahan	Formulasi					Kegunaan
	Formula 1	Formula 2	Formula 3	Formula 4	Formula 5	
Ekstrak daun botto'-botto' (%)	1%	2%	3%	0%	0%	Zat aktif
Tween 80 (%)	3%	3%	3%	3%	0%	Co-solvent
Air suling (%)	100 ml	Pelarut				

Pembuatan Uji Penghambatan pembusukan buah :

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan setelah itu semua bahan ditimbang dengan menggunakan timbangan neraca analitik. Setelah penimbangan diambil ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) dan dimasukkan kedalam labu erlenmayer kemudian dibuat larutan Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 4, Formula 5. Masing-masing ditambahkan tween dengan konsentrasi 3% kecuali Formula 5 yang diberikan kontrol 0% setelah itu ditambahkan dengan pelarut air suling sedikit demi sedikit. Dihomogenkan dan dicukupkan hingga 100 ml.

c) Pengamatan pembusukan buah

Masing-masing formula diuji efektivitas dengan penghambatan pembusukan buah dengan pengamatan sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu kita menggunakan sarung tangan (handscoon). Buah dimasukkan dalam larutan Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 4, Formula 5 selama 5 menit kemudian diangkat dan diangin-anignkan.
2. Buah disimpan dalam rak pada suhu kamar selama proses pengamatan.
3. Dilakukan pengamatan organoleptik terhadap parameter :
 - a. Perubahan warna terhadap buah
 - b. Perubahan tekstur buah

Tabel 3. Pengamatan pembusukan buah

Pengamatan Hari ke-	Perlakuan Penelitian														
	Buah Anggur					Buah tomat					Cabai				
	F1	F2	F3	F4	F5	F1	F2	F3	F4	F5	F1	F2	F3	F4	F5
H1															
H2															
H3															
H4															
H5															
H6															
H7															

H8															
H ^{xx}															

Keterangan :

F1 = Formulasi 1

F2 = Formulasi 2

F3 = Formulasi 3

F4 = Formulasi 4

F 5 = Formulasi 5

H1-H^{xx} = Perlakuan hari pertama sampai hari pembusukan

F. Analisis data

Data hasil pengamatan dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data Rancangan Acak Kelompok (RAK) dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol positif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Formulasi dan Uji Efektivitas Larutan Ekstrak Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata L.*) sebagai pengawet buah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil Formulasi sediaan larutan ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) sebagai pengawet buah.

Tabel 1. Rancangan Formulasi

Bahan	Kegunaan	Konsentrasi
Ekstrak daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata L.</i>)	Zat aktif	1%, 2%, 3%, tween 80, dan 0%
Tween 80	Co-solvent	3%
Air suling	Pelarut	add 100 ml

Tabel 2. Hasil formulasi yang mampu menghambat pembusukan buah

Bahan	Kegunaan	Konsentrasi
Ekstrak daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata L.</i>)	Zat aktif	1%

Tween 80	Co-solvent	3%
Air suling	Pelarut	add 100 ml

Pembuatan sediaan :

Disiapkan alat dan bahan, kemudian ditimbang ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) sebanyak 1 gram (1%) setelah itu di masukkan kedalam labu erlenmeyer. Ditambahkan dengan pelarut air suling sedikit demi sedikit. Ditambahkan tween 80 sebanyak 3 ml (3%) setelah itu add kan hingga 100 ml kemudian dihomogenkan dan di simpan dalam wadah.

2. Hasil Uji Penghambatan pembusukan buah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada uji penghambatan pembusukan buah anggur, buah tomat, dan cabai telah dihasilkan bahwa pada konsentrasi 1%, 2%, 3%, tween 80 dan kontrol negatif (0%) yang didapatkan adalah hasil dengan konsentrasi 1%. Dengan konsentrasi ekstrak 1% dapat digunakan sebagai pengawet buah karena dapat menghambat bakteri pembusuk yang terdapat pada buah anggur, buah tomat, dan cabai selama 30 hari. Dilihat dari Tabel pengamatan pembusukan buah.

3. Hasil Pengamatan pembusukan buah.

Hasil pengamatan pembusukan buah terhadap daya tahan kesegaran buah anggur, buah tomat, dan cabai yang dicelupkan ke dalam ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) dengan konsentrasi ekstrak daun botto'-botto' 1%, 2%, 3% dan kontrol negatif. Maka kondisi buah pada tiap harinya dilihat dari Tabel.

Tabel 1. Hasil Pengamatan Pembusukan Buah Replika I.

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Buah Anggur				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Buah anggur masih segar dan berwarna hijau	Buah masih segar dan berwarna hijau	Buah masih segar dan berwarna hijau	Buah masih segar dan berwarna hijau	Buah masih segar dan berwarna hijau
Hari ke 4	Buah anggur masih segar dan masih berwarna hijau	Buah masih segar, keras, dan hijau	Buah masih berwarna hijau dan sedikit mengkerut	Buah masih hijau dan segar	Buah masih berwarna hijau dan sedikit mengkerut
Hari ke 8	Buah anggur masih segar dan masih berwarna hijau	Buah masih hijau dan kulit sudah mengkerut	Ujung buah sudah mengkerut dan lunak	Buah masih berwarna hijau dan belum mengkerut	Buah sudah mengkerut dan warnanya kecoklatan
Hari ke 12	Buah anggur masih berwarna hijau kulitnya sedikit mengkerut	Buah masih hijau dan seluruh kulit sudah mengkerut	Warna buah sudah berwarna coklat dan lunak berkerut	Ujung buah sudah sedikit mengkerut masih berwarna hijau	Buah sudah lunak dan mengkerut, warnanya kecoklatan
Hari ke 16	Buah anggur masih hijau tetapi ujung kulitnya sudah mengkerut	Buah masih hijau dan kulit buah sudah mengkerut	Kebanyakan buah sudah lunak dan berwarna coklat	Buah sudah mengkerut dan berwarna hijau	Buah sudah lunak dan sedikit berair, kulitnya mengkerut dan

					berwarna coklat
Hari ke 20	Buah anggur masih hijau dan sebagian buah sudah mengerut seluruh kulit	Ujing buah berwarna coklat dan sedikit lunak	Buah sudah busuk dan berair, warnanya sudah coklat gelap	Buah sudah mengkerut dan sedikit lunak dan masih berwarna hijau	Buah sudah busuk dan mengkerut warnanya coklat
Hari ke 24	Buah anggur sudah sedikit lunak dan mengkerut warnanya masih hijau	Sebagian buah sudah lunak dan berwarna kecoklatan	Seluruh buah sudah busuk dan mengkerut, warnanya hitam dan berbau	Buah sudah lunak dan mengkerut, kulitnya masih berwarna hijau	Buah sudah busuk, berair, dan warnanya coklat
Hari ke 28	Buah anggur masih berwarna hijau dan sebagian buah anggur sudah lunak dan mengkerut	Buah anggur sudah berwarna coklat dan lunak	Seluruh buah busuk dan berwarna hitam mengkerut dan berair	Buah sudah mengkerut dan lunak, warnanya kecoklatan	Buah sudah busuk dan mengkerut, berair, warnanya coklat
Hari ke 30	Buah anggur sudah lunak dan mengkerut sebagian buah sudah busuk	Seluruh bagian buah sudah busuk dan berwarna hitam	Seluruh buah busuk, berwarna hitam, berair, berbau, dan mengkerut	Seluruh kulit buah mengkerut dan berwarna coklat	Buah sudah busuk dan warnanya coklat, dan berair

Pengamatan	Perlakuan Penelitian
-------------------	-----------------------------

pada hari ke-	Buah Tomat				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Buah tomat masih segar	Buah tomat masih segar	Buah tomat masih segar	Buah tomat masih segar	Buah tomat masih segar
Hari ke 4	Buah tomat masih keras, segar, dan berwarna merah	Buah masih segar, berwarna merah dan belum lunak	Kulit buah sudah mengkerut pada ujung buah dan berwarna merah	Buah masih berwarna merah dan masih segar belum lunak	Buah sudah mengkerut pada bagian ujung buah, masih keras dan berwarna merah
Hari ke 8	Buah tomat masih segar, keras, dan berwarna merah	Buah masih berwarna merah dan belum lunak	Seluruh kulit buah sudah mengkerut dan berwarna orange	Buah sudah sedikit keriput, berwarna merah orange	Buah sudah mengkerut pada seluruh kulit, berwarna merah
Hari ke 12	Buah tomat masih keras, segar, dan berwarna merah	Pada ujung buah sudah mengkerut dan masih berwarna merah	Buah tomat sudah berair pada bagian tengah dan mengkerut, warnanya orange	Buah sudah mengkerut pada seluruh bagian kulit dan berwarna orange	Buah sudah sedikit lunak, mengkerut, berwarna orange
Hari ke 16	Buah tomat masih keras belum lunak, berwarna merah dan segar	Seluruh bagian kulit buah sudah mengkerut dan sedikit lunak berwarna	Buah romat sudah lunak, berair, mengkerut bagian tengah buah dan warna orange	Buah sudah sedikit lunak dan mengkerut pada bagian kulit, berwarna	Buah sudah lunak, seluruh kulit buah mengkerut, dibagian tengah buah

		merah		orange	berair
Hari ke 20	Pada ujung buah sudah sedikit mengkerut, dan masih berwarna merah	Buah sudah lunak dan mengkerut berwarna merah tua	Buah sudah busuk, berair, mengkerut dan, warnanya orange kecoklatan	Buah sudah lunak, sedikit berair, dan seluruh kulit mengkerut	Buah sudah busuk, dibagian tengah buah berair, mengkerut, dan berwarna orange
Hari ke 24	Buah tomar sedikit mengkerut dan masih berwarna merah belum lunak	Buah sudah busuk dan keriput pada kulitnya dan sedikit berair, berwarna merah gelap	Buah sudah busuk, berulat, berair, mengkerut, dan berwarna orange kecoklatan	Buah sudah lunak, berair, dan mengkerut, berwarna orange	Buah sudah busuk, berair, mengkerut dibagian tngah, dan berwarna orange
Hari ke 28	Buah tomat masih berwarna merah, mengkerut dan belum lunak	Buah sudah busuk dan berair, kulitnya keriput dan berwarna merah kecoklatan	Buah sudah busuk, berulat, bau, mengkerut, dan berwarna orange kecoklatan	Buah sudah busuk, berair, dan mengkerut diseluruh bagian kulit, berwarna orange	Buah sudah busuk, berair, berulat, mengkerut, dan berwarna kecoklatan
Hari ke 30	Buah tomat sudah mengkerut dan sedikit lunak pada ujung buah	Buah sudah busuk, berair, kulitnya keriput, bau dan berwarna merah	Buah sudah busuk, berulat, bau, mengkerut, dan berwarna kecoklatan	Buah sudah busuk, dan mengkerut diseluruh bagian kulit buah, berair,	Buah sudah busuk, berair, berulat, mengkerut, dan

	dan masih berwarna merah	kecoklatan		dan berwarna orange kecoklatan	berwarna kecoklatan.
--	--------------------------	------------	--	--------------------------------	----------------------

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Cabai				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Cabai masih segar	Cabai masih segar	Cabai masih segar	Cabai masih segar	Cabai masih segar
Hari ke 4	Cabai masih segar dan berwarna merah	Cabai masih segar dan belum lunak, berwarna merah	Pada ujung cabai sudah keriput dan berwarna merah	Cabai masih merah dan masih keras	Cabai sudah keriput pada ujungnya dan berwarna merah
Hari ke 8	Cabai masih keras, belum lunak dan berwarna merah	Mengkerut pada ujung cabai dan masih keras, berwarna merah	Seluruh kulit cabai sudah mengkerut dan berwarna merah	Cabai masih berwarna merah, keras dan sedikit keriput pada ujung cabai	Seluruh bagian kulit cabai sudah mengkerut, dan masih berwarna merah
Hari ke 12	Pada bagian ujung cabai sudah sedikit mengkerut dan berwarna merah	Cabai sudah mengkerut dan berwarna merah	Cabai sudah sedikit lunak dan keriput, berwarna merah gelap	Cabai sudah keriput dan berwarna merah	Cabai sudah sedikit lunak dan mengkerut pada seluruh bagian kulit
Hari ke 16	Ujung cabai mengkerut, masih keras dan berwarna merah	Cabai sedikit lunak, dan mengkerut pada seluruh bagian kulit,	Cabai sudah lunak dan keriput, sedikit berair dan berwarna	Cabai sudah keriput pada bagian kulit dan berwarna merah	Cabai sudah lunak, berair, dan mengkerut, berwarna

		berwarna merah	merah gelap		merah gelap
Hari ke 20	Cabai sudah mengkerut pada seluruh kulit, dan masih keras, berwarna merah	Cabai sudah mengkerut dan berwarna hitam pada bagian ujungnya, dan sedikit lunak	Cabai sudah busuk, berair, keriput dan berwarna merah kehitaman	Cabai sudah lunak, keriput, dan berwarna merah gelap pada ujung cabai	Cabai sudah busuk, berair, dan mengkerut seluruh bagian kulit, berwarna merah gelap
Hari ke 24	Cabai sudah keriput pada seluruh bagian kulit dan berwarna hitam pada ujung cabai	Cabai sudah lunak dan mengkerut, berwarna hitam pada ujung cabai	Cabai sudah busuk, berair, bau, keriput, berwarna merah kehitaman	Cabai sudah busuk dan sedikit berair, berwarna kecoklatan	Cabai sudah busuk dan berair, kulitnya berwarna hitam pada bagian ujung cabai dan merah orange pada bagian tengah
Hari ke 28	Cabai sedikit lunak mengkerut dan berwarna hitam pada ujung cabai	Cabai sudah busuk dan mengkerut, berwarna hitam pada ujung cabai	Cabai sudah busuk, berbau, keriput, berair, dan berwarna kehitaman	Cabai sudah busuk, sedikit berair, dan berwarna merah gelap	Cabai sudah busuk dan berair, lunak dan berwarna orange kehitaman
Hari ke 30	Cabai sudah lunak dan mengkerut pada seluruh	Cabai sudah busuk dan mengkerut, berwarna	Cabai sudah busuk, berbau, keriput,	Cabai sudah busuk, berwarna hitam dan	Cabai sudah kering, keriput, dan berwarna

	bagian kulit dan berwarna hitam pada ujung cabai	hitam pada ujung cabai	berair, dan berwarna kehitaman	sedikit berair	orange kehitaman
--	--	------------------------	--------------------------------	----------------	------------------

Tabel 2. Hasil Pengamatan Pemasakan Buah Replika II.

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Buah Anggur				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Buah anggur masih segar dan padat	Buah anggur masih padat dan segar	Buah masih padat dan masih segar	Buah anggur masih segar, padat dan berwarna hijau	Buah anggur masih segar, padat dan berwarna hijau
Hari ke 4	Buah masih segar dan belum lunak	Buah masih padat dan segar	Buah sudah mengkerut pada ujung kulit buah	Buah masih segar dan padat	Buah sudah mengkerut pada ujung kulit buah
Hari ke 8	Buah anggur sudah mulai mengkerut	Buah sedikit mengkerut pada kulit ujung buah	Buah sudah mengkerut dan lunak pada ujung buah	Buah segar, padat dan sedikit berubah warna	Buah sudah mengalami perubahan warna dan mengkerut
Hari ke 12	Buah masih mengkerut pada kulit ujung buah	Buah sudah mengkerut	Kulit buah sudah lunak dan berwarna kecoklatan	Buah sudah sedikit mengkerut pada ujung kulit buah	Buah sudah sedikit lunak dan berwarna hijau kecoklatan
Hari ke 16	Buah anggur mengkerut	Buah masih mengkerut dan	Buah sudah lunak dan	Buah sudah mengkerut	Buah sudah lunak pada

	pada seluruh kuliah buah	berwarna hijau kecoklatan	berwarna coklat	dan berubah warna kecoklatan	seluruh bagian kulit buah
Hari ke 20	Buah sudah berwarna hijau kecoklatan dan mengkerut	Buah sudah mengkerut pada seluruh badan kulit	Buah sudah lunak pada bagian seluruh kulit	Buah sudah sedikit lunak dan berwarna hijau kecoklatan	Buah sudah lunak dan berwarna kecoklatan
Hari ke 24	Buah anggur sudah lunak dan mengkerut	Buah sedikit lunak dan mengkerut berwarna kecoklatan	Buah sudah lunak, kecoklatan dan berair	Buah sudah lunak dan mengkerut pada seluruh kulit buah	Buah sudah rusak, dan berair
Hari ke 28	Buah masih mengkerut, lunak dan, berwarna coklat muda	Buah sudah lunak, berwarna kecoklatan, dan berair	Buah sudah busuk dan berair	Buah sudah lunak, berair dan kecoklatan	Buah sudah mengalami busuk, berulat dan berwarna hitam
Hari ke 30	Buah masih mengkerut dan lunak berwarna kecoklatan	Buah sudah berair, kecoklatan dan lunak	Buah sudah berair, busuk, dan berulat	Buah sudah busuk, rusak dan berwarna coklat	Buah sudah rusak, berair, berwarna hitam dan berulat

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Buah Tomat				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Buah tomat masih segar dan masih	Buah tomat masih segar dan padat			

	padat				
Hari ke 4	Buah masih segar dan berisi padat	Buah tomat masih segar dan padat	Buah sudah mengkerut pada ujung kulit buah	Buah masih padat dan segar pada seluruh bagian buah	Buah sudah mengkerut pada bagian ujung buah
Hari ke 8	Buah masih segar berwarna orange dan padat	Buah sudah sedikit mengkerut dan masih padat	Buah sudah sedikit lunak, mengkerut, dan berwarna orange	Buah masih segar dan padat, berwarna orange	Buah sudah mengkerut pada seluruh bagian buah
Hari ke 12	Buah masih padat, segar dan berwarna orange	Buah masih mengkerut pada bagian ujung kulit	Buah sudah lunak dan mengkerut pada kulit buah	Buah sudah mengkerut pada ujung kulit buah	Buah sudah lunak dan mengkerut, berwarna orange
Hari ke 16	Buah sudah sedikit mengkerut dan berwarna orange	Buah masih berwarna orange dan mengkerut	Buah sudah lunak dan berubah warna kecoklatan	Buah sudah mengkerut pada seluruh kulit buah	Buah sudah lunak dan mengkerut pada seluruh bagian buah
Hari ke 20	Buah sudah mengkerut dan masih padat	Buah sudah mengkerut pada seluruh bagian kulit	Buah sudah lunak dan berair pada bagian ujung buah	Buah sudah lunak dan mengkerut pada ujung kulit buah	Buah sudah berair, lunak dan berwarna kecoklatan
Hari ke 24	Buah masih padat tapi sudah sedikit mengkerut pada ujung kulit	Buah masih berwarna orange dan mengkerut pada kulit buah	Buah sudah lunak, berair, dan berwarna kecoklatan	Buah sudah lunak pada seluruh bagian buah	Buah sudah berair, mengkerut, lunak dan berwarna kecoklatan

Hari ke 28	Buah sudah sedikit lunak dan mengkerut	Buah sudah lunak dan mengkerut, berwarna kecoklatan	Buah sudah berulat, busuk, dan berwarna coklat	Buah sudah lunak dan berair pada ujung buah	Buah sudah busuk, berair, berulat
Hari ke 30	Buah sudah berubah warna, mengkerut dan lunak berair	Buah sudah lunak dan berwarna kecoklatan	Buah sudah busuk, berair, berulat, dan berwarna coklat	Buah sudah busuk, berair, berulat, dan kecoklatan	Buah sudah busuk, berulat, berair, dan berwarna coklat

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Cabai				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Cabai masih segar dan padat	Cabai masih segar dan padat	Cabai masih segar dan padat	Cabai masih segar dan padat	Cabai masih segar dan padat
Hari ke 4	Cabai masih segar, padat dan berwarna merah	Cabai masih segar, padat dan berwarna merah	Cabai sudah mengkerut dan berwarna merah	Cabai masih segar, padat dan berwarna merah	Cabai sudah sedikit mengkerut
Hari ke 8	Cabai sedikit mengkerut pada ujung kulit buah	Cabai masih padat dan segar	Cabai sudah mengkerut pada bagian seluruh kulit	Cabai sudah mengkerut sedikit bagian ujung kulit	Cabai sudah mengkerut dan buah warna
Hari ke 12	Cabai masih mengkerut dan berwarna merah	Cabai sedikit mengkerut	Cabai sedikit lunak dan mengkerut	Cabai sudah mengkerut dan berwarna merah	Cabai sudah mengkerut pada seluruh bagian kulit
Hari ke 16	Cabai	Cabai masih	Cabai sudah	Cabai sudah	Cabai sudah

	mengkerut pada seluruh bagian kulit	mengkerut pada bagian ujung kulit	lunak dan berwarna kecoklatan	sedikit lunak pada ujung cabai	lunak dan berair pada ujung kulit
Hari ke 20	Cabai mengkerut dan berwarna merah	Cabai sudah sedikit lunak dan mengkerut	Cabai sudah berair, lunak, dan berwarna coklat	Cabai sudah lunak dan berair	Cabai sudah berair, berwarna kecoklatan
Hari ke 24	Cabai sudah lunak dan berwarna merah kecoklatan	Cabai sudah lunak, mengkerut dan berwarna merah kecoklatan	Cabai sudah berair, busuk, lunak dan berulat	Cabai sudah lunak, mengkerut seluruh bagian dan berair	Cabai sudah berair, lunak, dan berwarna kecoklatan
Hari ke 28	Cabai sudah lunak dan berwarna coklat	Cabai sudah lunak, berair, mengkerut seluruh bagian kulit cabai	Cabai sudah rusak, berwarna coklat kehitaman dan berulat	Cabai sudah berair, busuk dan berwarna kecoklatan	Cabai sudah busuk, lunak, berair, berulat, dan berwarna coklat
Hari ke 30	Cabai sudah lunak dan berair	Cabai sudah busuk, berair dan lunak	Cabai sudah busuk	Cabai sudah busuk, berair, dan berulat	Cabai sudah busuk dan rusak

Tabel 3. Hasil Pengamatan Pembusukan Buah Replika III.

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Buah Anggur				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Buah anggur masih segar	Buah masih segar dan	Buah masih segar dan	Buah masih segar dan	Buah anggur masih segar

	dan padat	padat	berisi padat	padat	dan padat
Hari ke 4	Buah masih padat dan masih berwarna hijau	Buah masih segar dan padat, berwarna hijau kecoklatan	Buah sedikit mengkerut dan berubah warna hijau kecoklatan	Buah masih segar dan padat pada kulit buah	Buah anggur sudah sedikit mengkerut pada ujung kulit buah
Hari ke 8	Buah anggur masih segar, berwarna hijau dan padat	Buah sudah sedikit mengkerut pada ujung buah	Buah sudah mengkerut pada ujung kulit buah	Buah sudah sedikit mengkerut pada ujung kulit buah	Buah sudah mengkerut dan berubah warna
Hari ke 12	Kulit buah sedikit mengkerut pada ujung buah dan masih pasih padat	Buah masih mengkerut dan berwarna hijau kecoklatan	Buah sudah berwarna kecoklatan dan lunak pada ujung buah	Buah sudah mengkerut dan berwarna hijau kecoklatan	Buah sudah sedikit lunak, kecoklatan, dan mengkerut
Hari ke 16	Buah sedikit mengkerut pada ujung kulit buah	Buah sudah mengkerut pada seluruh bagian kulit	Buah sudah lunak pada seluruh bagian buah	Buah sudah sedikit lunak dan hijau kecoklatan	Buah sudah lunak, dan mengkerut
Hari ke 20	Buah berwarna coklat muda dan sedikit mengkerut	Buah sudah sedikit lunak dan mengkerut berwarna coklat	Buah sudah berair, lunak dan berwarna kecoklatan	Buah sudah mengkerut, lunak, dan kecoklatan	Buah lunak, mengkerut, dan berair, berwarna kecoklatan
Hari ke 24	Buah masih padat, mengkerut, dan kecoklatan	Buah lunak dan berwarna coklat	Kulit buah berwarna coklat dan lunak berair	Buah sudah lunak pada seluruh bagian kulit buah	Buah sudah lunak, mengkerut, berair, berwarna

					hitam
Hari ke 28	Buah berwarna kecoklatan dan seluruh badan buah mengkerut	Buah sudah lunak, berair dan berwarna coklat	Buah sudah busuk dan berulat pada bagian isi dalam buah	Buah sudah lunak dan berair, berwarna kecoklatan	Buah sudah busuk, lunak dan berwarna hitam
Hari ke 30	Buah sedikit lunak dan mengkerut	Buah sudah busuk dan berair	Buah sudah busuk, rusak, dan berulat	Buah sudah lunak busuk dan berair	Buah sudah berair, berulat, busuk

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Buah Tomat				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Buah tomat masih segar dan berisi padat	Buah tomat masih segar dan berisi padat	Buah tomat masih segar dan berisi padat	Buah tomat masih segar dan berisi padat	Buah tomat masih segar dan berisi padat
Hari ke 4	Buah masih padat dan segar	Buah masih padat dan segar	Buah sudah sedikit mengkerut	Buah masih segar dan padat	Buah sudah sedikit mengkerut
Hari ke 8	Buah masih padat dan segar	Buah masih padat dan segar	Buah sudah mengkerut pada ujung buah	Buah sedikit mengkerut	Buah sudah mengkerut pada bagian ujung buah
Hari ke 12	Buah masih padat dan segar	Buah sudah sedikit mengkerut dibagian ujung buah	Buah sudah sedikit lunak dan mengkerut pada seluruh bagian kulit	Buah masih mengkerut pada bagian ujung kulit buah	Buah sudah mengkerut pada seluruh bagian buah dan berwarna

			buah		orange kecoklatan
Hari ke 16	Buah masih padat dan sedikit mengkerut pada bagian ujung kulit buah	Buah sudah mengkerut pada ujung buah dan berwarna orange	Buah sudah sedikit berair dan berwarna orange kecoklatan	Buah masih mengkerut dan berwarna orange	Buah sudah lunak pada ujung buah dan berwarna kecoklatan
Hari ke 20	Buah masih mengkerut dan berwarna orange	Buah sudah mengkerut pada seluruh bagian buah	Buah sudah lunak pada seluruh bagian buah dan berair	Buah sudah mengkerut pada seluruh bagian buah	Buah sudah lunak dan mengkerut pada seluruh bagian buah
Hari ke 24	Buah mengkerut pada seluruh bagian buah dan berwarna orange	Buah sudah sedikit lunak pada ujung buah	Buah sudah berair dan lunak pada ujung buah berwarna kecoklatan	Buah sudah mengkerut dan sedikit lunak pada ujung buah	Buah sudah berair, lunak, dan mengkerut pada seluruh bagian kulit
Hari ke 28	Buah sedikit lunak dan mengkerut	Buah sudah lunak dan mengkerut berwarna orange kecoklatan	Buah sudah busuk, berair, berulat dan kecoklatan	Buah sudah lunak dan mengkerut	Buah sudah berair, busuk, berulat dan berwarna kecoklatan
Hari ke 30	Buah sudah lunak pada ujung kulit buah dan berwarna orange	Buah sudah lunak dan sedikit berair pada ujung kulit buah berwarna	Buah sudah rusak, busuk, berair, berulat, berwarna kecoklatan, dan berbau	Buah sudah mengkerut dan lunak pada seluruh bagian buah berwarna	Buah sudah berair, bau, busuk, berwarna coklat, dan berulat

	kecoklatan	orange kecoklatan		kecoklatan	
--	------------	----------------------	--	------------	--

Pengamatan pada hari ke-	Perlakuan Penelitian				
	Cabai				
	F1(10%)	F2(20%)	F3(30%)	F4	F5
Hari ke 1	Cabai masih segar, padat, dan berwarna merah	Cabai masih segar, padat, dan berwarna merah	Cabai masih segar, padat, dan berwarna merah	Cabai masih segar, padat, dan berwarna merah	Cabai masih segar, padat, dan berwarna merah
Hari ke 4	Cabai masih segar dan padat	Cabai sedikit mengkerut dan masih berwarna merah	Cabai sedikit mengkerut dan masih berwarna merah	Cabai masih segar, padat dan berwarna merah	Cabai sudah sedikit mengkerut dan berwarna merah
Hari ke 8	Cabai sedikit mengkerut pada bagian ujung kulit	Cabai sudah mengkerut pada seluruh bagian dan berwarna merah	Cabai masih mengkerut dan berwarna merah	Cabai sedikit mengkerut dan masih berwarna merah	Cabai sudah mengkerut pada bagian ujung kulit
Hari ke 12	Cabai masih mengkerut dan berwarna merah	Cabai sudah mengkerut dan berwarna merah kecoklatan	Cabai sudah lunak dan berwarna merah kecoklatan	Cabai sudah sedikit lunak dan berwarna merah kecoklatan	Cabai sudah lunak pada ujung bagian kulit
Hari ke 16	Cabai sudah mengkerut	Cabai sedikit lunak pada	Cabai sudah berair dan	Cabai sudah lunak pada	Cabai sudah lunak dan

	pada seluruh bagian kulit	bagian ujung	lunak	seluruh bagian	berwarna coklat
Hari ke 20	Cabai sudah lunak pada ujung kulit	Cabai sudah lunak dan berwarna merah kecoklatan	Cabai masih berair dan lunak	Cabai sedikit berair dan lunak	Cabai sudah lunak dan mengkerut pada seluruh bagian
Hari ke 24	Cabai sudah lunak dan berwarna merah	Cabai sudah lunak dan sedikit berair	Cabai sudah busuk, berair, dan berulat	Cabai sudah berair, lunak dan berwarna kecoklatan	Sudah berair pada bagian ujung cabai
Hari ke 28	Cabai masih lunak dan berubah warna	Cabai sudah berair dan berwarna kecoklatan	Cabai sudah busuk, berulat, dan berwarna coklat	Cabai sudah berair, lunak, dan berwarna coklat	Cabai sudah berulat, berair, dan berwarna coklat
Hari ke 30	Cabai sudah lunak pada seluruh bagian dan berwarna merah kecoklatan	Cabai sudah berair, lunak dan berwarna coklat	Cabai sudah busuk, berulat, kering dan berwarna coklat	Cabai sudah berair, busuk, dan berulat	Cabai sudah busuk, bau, berair, dan berulat

B. Pembahasan

Pada buah tomat dengan tingkat kematangannya >70% hanya mampu bertahan selama 10 hari penyimpanan (Melly et al, 2012), sedangkan buah anggur dan cabai rawit sebagai salah satu komoditi pokok juga memiliki kelemahan yaitu mudah rusak (Sri Wulandari et al, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah

tomat yang telah di berikan perlakuan dengan formula ekstrak daun botto'-botto' dengan konsentrasi 1% bertahan hingga hari ke-30.

Hasil dari formula I, formula II, formula III, formula IV, dan formula V dari hari pertama sampai dengan hari ke-30 buah anggur, buah tomat dan cabai mengalami perubahan. Setiap 4 harinya buah mengalami perubahan dari segar dan padat menjadi mengkerut pada kulit buah kemudian buah menjadi lunak berair dan buah menjadi busuk.

1. Hasil Uji Penghambatan pembusukan buah.

Pencegahan penghambatan pembusukan buah menggunakan ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) dilakukan dengan pembuatan formula I dengan konsentrasi 1%, formula II dengan konsentrasi 2%, formula III dengan konsentrasi 3%, formula IV dengan tambahan tween 80, dan formula V dengan kontrol negatif (0%) pada buah anggur, buah tomat, dan cabai. Perlakuan ini dilakukan selama 30 hari dengan cara setiap formula di masukkan kedalam baskom kemudian buah direndam selama 5 menit setelah itu diamati selama pembusukan yang terjadi pada buah setiap harinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sediaan formula III konsentrasi 3% dengan ekstrak sebanyak 3 gram buah anggur bisa bertahan selama 12 hari, sedangkan buah tomat dan cabai hanya bisa bertahan selama 8 hari. Pembusukan ini disebabkan karena pada ekstrak daun botto'-botto' memiliki kadar yang tinggi dan toksik jika digunakan terlalu banyak. Tumbuhan ini dapat menyebabkan abortus pada

ternak sehingga dapat juga dikatakan memiliki sifat terarogenik atau bersifat toksik terhadap sel janin (Pratiwi, 2015). Kemudian pembusukan ini juga disebabkan karena pada ekstrak terlalu kental, yang dapat meningkatkan kelembaban pada permukaan kulit buah. Peningkatan kelembaban yang tinggi tersebut akan memicu kerusakan jaringan yang berakibat pada terjadinya pembusukan. Tingkat konsentrasi ekstrak daun botto'-botto' yang semakin tinggi tidak selalu diikuti dengan kemampuan penghambat yang semakin besar (Panggabean, 2009). Sedangkan pada sediaan formula II dengan ekstrak daun botto'-botto' sebanyak 2 gram pada konsentrasi 2% buah anggur hanya bisa bertahan selama 20 hari, sedangkan buah tomat dan cabai hanya bisa bertahan selama 24 hari, kemudian pada formula I konsentrasi 1% dengan ekstrak sebanyak 1 gram buah anggur bertahan selama 28 hari, sedangkan buah tomat bisa bertahan selama 30 hari dan cabai bisa bertahan selama 26 hari, kemudian formula VI dengan konsentrasi 0% dan tambahan tween 80 buah anggur bisa bertahan selama 20 hari, sedangkan buah tomat dan cabai bisa bertahan selama 20 hari dan pada formula V kontrol negatif dengan ekstrak konsentrasi 0% dan tambahan air suling 100 ml, buah anggur, buah tomat dan cabai hanya bisa bertahan selama 12 hari.

Ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) mampu mempertahankan kesegaran buah anggur, buah tomat, dan cabai dengan konsentrasi 1% pada formula I selama 20 sampai 30 hari sedangkan kontrol negatif hanya mampu bertahan selama 12 hari. Hal ini dipengaruhi oleh adanya zat-zat anti bakteri yang

terdapat pada ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri penyebab pembusukan buah. Pertumbuhan bakteri yang terhambat atau kematian bakteri akibat suatu zat antibakteri dapat disebabkan oleh penghambatan terhadap sintesis dinding sel, penghambatan terhadap fungsi membran sel, penghambatan terhadap sintesis protein, atau penghambatan terhadap sintesis asam nukleat (Sudding, 2012).

Salah satu kandungan ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata L.*) adalah senyawa metabolit sekunder golongan steroid. Senyawa steroid ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada buah anggur, buah tomat, dan cabai. Menurut Nurhayati (2006) senyawa steroid memiliki gugus -OH yang dapat berikatan dengan protein integral membran sel. Hal ini menyebabkan terbendungnya transport aktif Na^+ , K^+ dan ATP, sehingga zat-zat yang dibutuhkan untuk proses sintesis protein tidak dapat masuk ke dalam sel, yang pada akhirnya mengganggu pembentukan dinding sel. Jika ada kerusakan pada dinding sel atau ada hambatan dalam pembentukannya dapat terjadi lisis pada sel bakteri sehingga bakteri segera kehilangan kemampuan membentuk koloni dan diikuti dengan kematian sel bakteri. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan dari reaksi penurunan dari terpena atau skualena. Mekanisme kerja antibakteri senyawa steroid yaitu dengan cara merusak membran sel bakteri (Morin dan Gorman, 1995).

Sedangkan senyawa flavonoid dan tanin dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, etilasetat atau pelarut polar lainnya. Flavonoid umumnya lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar dikarenakan memiliki ikatan dengan gugus gula. Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air dan senyawa aktifnya dapat diekstraksi dengan etanol 70% (Harbone, 1987).

Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antimikroba. Golongan fenolik ini diduga menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab menghambat pertumbuhan mikroba uji. Meskipun komponen senyawa fenol sendiri masih tergolong luas, sehingga belum dapat dipastikan senyawa spesifik apa yang memiliki aktivitas antimikroba. Cara kerja senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein sel, senyawa flavonoid diduga mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Pada tumbuhan, flavonoid sebagai antimikroba dapat membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan dinding sel. Selain itu flavonoid yang bersifat lipofilik dapat merusak membran mikroba. Terpena atau terpenoid memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Mekanismenya tidak sepenuhnya diketahui, akan tetapi diduga senyawa ini bekerja pada pengrusakan membran oleh senyawa lipofilik. Aktivitas antimikroba senyawa fenolik adalah dengan merusak lipid pada membran plasma mikroorganisme sehingga menyebabkan isi sel keluar (Pratiwi, 2008).

2. Hasil Pengamatan pembusukan buah.

Pada hasil pengamatan pembusukan buah dalam formula dengan konsentrasi ekstrak 1%, 2%, 3% maupun kontrol. Buah anggur, buah tomat dan cabai terlihat mengkerut dan mengalami pelayuan serta penurunan bobot setiap harinya. Pelayuan yang terjadi akan mengarah pada kematian jaringan (Utama, 2002). Dengan kehilangan pelayuan serta penurunan bobot setiap harinya menyebabkan penampakan buah menjadi kurang menarik, tekstur jelek dan mutu menurun.

Hasil pengujian pengamatan pembusukan buah yang diperoleh dengan menggunakan program pengolahan analisis data RAK (Rancangan Acak Kelompok) pada buah anggur yaitu hasil formula I dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 4,11111 replikasi 2 adalah 3,88889 replikasi 3 adalah 4,22223 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula I adalah 4,07407 sedangkan formula II dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 3,55556 replikasi 2 adalah 3,77778 replikasi 3 adalah 3 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula II adalah 3,44444 sedangkan formula III dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 2,88889 replikasi 2 adalah 2,55556 replikasi 3 adalah 2,66667 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula III adalah 2,7037 sedangkan formula IV dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 3,88889 replikasi 2 adalah 3,66667 replikasi 3 adalah 3,33333 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula IV adalah 3,62963 sedangkan formula V dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 3,11111 replikasi 2 adalah 3 replikasi 3 adalah 2,77778 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula V adalah 2,96296.

Hasil analisis data yang didapatkan pada buah tomat yaitu hasil formula I dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 4,44444 replikasi 2 adalah 4,33333 replikasi 3 adalah 4,11111 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula I adalah 4,2963 sedangkan formula II dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 4 replikasi 2 adalah 3,77778 replikasi 3 adalah 3,88889 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula II adalah 3,88889 sedangkan formula III dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 2,88889 replikasi 2 adalah 2,55556 replikasi 3 adalah 2,66667 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula III adalah 2,7037 sedangkan formula IV dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 3,33333 replikasi 2 adalah 3,55556 replikasi 3 adalah 3,66667 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula IV adalah 3,51852 sedangkan formula V dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 3,11111 replikasi 2 adalah 2,77779 replikasi 3 adalah 2,44444 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula V adalah 2,77778.

Hasil analisis data yang didapatkan pada cabai yaitu hasil formula I dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 4,11111 replikasi 2 adalah 3,77778 replikasi 3 adalah 3,66667 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula I adalah 3,85185 sedangkan formula II dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 3,88889 replikasi 2 adalah 3,66667 replikasi 3 adalah 3,11111 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula II adalah 3,55556 sedangkan formula III dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 2,66667 replikasi 2 adalah 2,66667 replikasi 3 adalah 2,55556 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula III adalah 2,62963 sedangkan formula IV dengan

replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 3,11111 replikasi 2 adalah 3,11111 replikasi 3 adalah 3 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula IV adalah 3,07407 sedangkan formula V dengan replikasi 1 nilai rata-ratanya adalah 2,66667 replikasi 2 adalah 3 replikasi 3 adalah 2,88889 dan nilai rata-rata keseluruhan pada formula V adalah 2,85185.

Dari hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa hasil setiap formula pada buah anggur, buah tomat dan cabai sangat berbeda-beda. Dilihat dari formula I semua sampel buah anggur, buah tomat dan cabai memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dari formula lainnya, sedangkan nilai rata-rata formula III dan formula V (kontrol negatif) nilai yang didapatkan sangat rendah, jadi kesimpulan dari hasil yang diperoleh adalah pada formula I dengan konsentrasi 1% ekstrak daun botto'-botto' memiliki efek yang baik dan berbeda nyata (signifikan) dibandingkan dengan formula lainnya untuk menghambat pembusukan buah selama 20 sampai 30 hari.

Berdasarkan hasil analisis data RAK (Rancangan Acak Kelompok) pada tabel analisis varians formula buah anggur diperoleh F hitung standar keseragaman kelompok adalah 5,06 sedangkan F hitung standar keseragaman perlakuan adalah -21,21. Sedangkan pada tabel analisis varians formula buah tomat diperoleh F hitung standar keseragaman kelompok adalah 4,76 sedangkan F hitung standar keseragaman perlakuan adalah -20,71. Dan pada tabel analisis varians formula buah tomat diperoleh F hitung standar keseragaman kelompok adalah 5,48 sedangkan F hitung standar keseragaman perlakuan adalah -25,07. Dengan hasil data diatas maka

disimpulkan bahwa, semua tabel varians pada buah anggur, buah tomat, dan cabai memiliki perbedaan nyata (signifikan) dari setiap kelompoknya sedangkan pada setiap perlakuannya tidak terdapat perbedaan nyata (non signifikan). Hal ini menandakan bahwa F hitung kelompok lebih besar dari F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap kelompok (signifikan). Sedangkan F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel artinya terdapat perbedaan tidak nyata dari setiap perlakuan (non signifikan).

Umat manusia sebagai khalifa diperintahkan oleh Allah swt. untuk memelihara bumi beserta isinya, serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin tidak terkecuali dengan tumbuhan. Tumbuhan mempunyai banyak manfaat karena dapat digunakan sebagai penunjang bagi kehidupan sehari-hari. Manusia diperintahkan untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari berbagai macam tumbuhan tersebut. Seperti halnya dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dapat dimanfaatkan sebagai pengawet pada buah. Pemanfaatan tumbuhan ini tidak lain sebagai bentuk kesyukuran terhadap ciptaan Allah swt. sehingga lebih didalami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada Ekstrak Daun Botto-Botto (*Chromolaena odorata* L.) sebagai pengawet buah dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L.) dapat digunakan sebagai pengawet buah karena hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ekstrak daun botto'-botto' pada konsentrasi yang rendah dapat menghambat bakteri pembusuk yang ada pada buah anggur, buah tomat, dan cabai.
2. Pembuatan formulasi sediaan pengawet dalam bentuk larutan dengan konsentrasi ekstrak 1% (1 gram) sebagai pengawet buah.
3. Dalam pandangan Islam bahwa semua yang diciptakan oleh Allah swt. tidak ada yang sia-sia, semuanya mempunyai manfaat jika manusia itu sendiri mau berfikir dan berusaha.

B. Saran

1. Disarankan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi senyawa antimikroba pada sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek antimikroba.
2. Sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah swt. kita dituntut untuk berusaha dan tidak putus asa dalam mempelajari segala yang diciptakan oleh Allah swt.

KEPUSTAKAAN

- Akinmoladun, Afolabi C., Ibukun, E.O., Dan-Ologe, I.A. *Phytochemical Constituents and Antioxidant Properties of Extracts from the Leaves Of Chromolaena odorata*, scientific Research and Essay Volume 2. 2007
- Ai, Muhmudattusa'adah. *Pengawet sintetis*. Jurnal Volume 1. 2006
- Anonim. *Nuclear Precise News Letter edisi 81*. Jakarta: PT Nucleus Precise: Jakarta. 2008
- Ansel, Howard,C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi Empat*. Jakarta: UI-Press. 2008
- Akbar, Zaidul. *Konsep Pengobatan Islam*. 2011
- Balia. *Kerusakan Bahan Pangan Oleh Mikroorganism*. Jurnal Chemica Volume 13. 2008
- Departemen of Natural Resources,Mines and Water. *Siam Weed Declared no.1 Natural Mines and Water*, pp1-4, Queensland ,Australia: Pesr Series. 2006
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia. Edisi IV*. Departemen Kesehatan R.I: Jakarta. 1995
- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. *Produk Hortikultura Jawa Timur*. Surabaya: 2001
- Douye V. Zige, et al. *Antibacterial Activity of Ethanol, Crude and Water Extract of Chromolaena Odorata Leaves on S Typhi and E Coli*. Volume 1. Niger Delta University. 2013
- Djide, M. N., Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Lembaga Penerbitan UNHAS (Lephas): Makassar. 2008

- Fachruddin, H. *Analisis Fitokimia Tumbuhan*. Fakultas Farmasi. Universitas Hasanuddin: Makassar. 2001
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung: Penerbit ITB. 1987
- Ismail, Isriany. *Desain Bentuk Sediaan Farmasi Larutan, Suspensi Dan Emulsi*. UIN Alauddin: Makassar. 2011
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* PT. Syaamil Cipta Media: Bandung. 2006
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* PT. Syaamil Cipta Media: Bandung. 2010
- Khomsan, Ali. *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2003
- Khomsan, Ali. *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*. Rajawali Sport: Jakarta. 2010
- Lachman, L, Lieberman, H, A, dkk. *Teori dan Praktek Farmasi Industri, Edisi III*. UI-Press: Jakarta. 1994
- Lovet T. Kigigha, Et, Al. *Activity Of Chromolaena Odorata On Enteric And Superficial Etiologic Bacterial Agents*. Volume 1. Department Of Biological Sciences Niger Delta University Wilberforce Island. 2013
- Melly Novita et al. *Pengaruh Pelapisan Kitosan Terhadap Sifat Fisika dan Kimia Tomat Segar (Lycopersicum pyriforme) Pada Berbagai Tingkatn Kematangan*. Univ Syiah Kuala: Banda Aceh. 2012
- Mbajiuka Chinedu Stanley, Et, Al. *Antimicrobial Effects Of Chromolaena Odorata On Some Human Pathogens*. Volume 3. Michael Okpara University Of Agriculture. 2014
- Morin, R.B dan Gorman, M. *Kimia dan Biologi Antibiotik Laktam (Chemistri and Biology of lactam antibiotics)*. Edisi 3 terjemahan oleh Mulyani S. Ikip Semarang press: Semarang. 1995


- Ngozi, Igboh M., Jude, Ikewuchi C. and Catherine, Ikewuchi C. *Chemical Profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) Leaves*. Pakistan Journal of Nutrition 8. 2009
- Nurul et al. Extract of the leaves of *Chromolaena odorata* on gram-positive bacteria Pp51 *journal of ethnopharmacology*.2006
- Nwinuka, N, dkk. *Nutritional and potential medical value of Chromolaena odorata leaves*. 2009
- Nurhayati, A.P.D. *Uji Toksisitas Ekstrak Eucheuma Alvarezii Terhadap Studi Pendahuluan Potensi Antikanker*. Aktakimindo. 2006
- Okigbo dan Ajalie. *Activity Of Chromolaena Odorata On Enteric And Superficial Etiologic Bacterial Agents*. Volume 1. Department Of Biological Sciences Niger Delta University Wilberforce Island. 2005
- Panggabean, I.R. *Pengaruh Tingkat Konsentrasi Ekstrak Gulma Siam (Chromolaena odorata L.) yang Diaplikasikan dengan Cara Semprot dan Oles dalam Menghambat Perkembangan Gejala Penyakit Busuk Buah Kakao di Lapang*. Jurnal Volume 13. 2009
- Pelczar, Michael J. and Chan. E.C.S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008
- Phan, Thang T., et al. *Extracts from Leaves of Chromolaena odorata (A. Potential Agent for wound Healing)*. Herbal Traditional Medicine, New York: Marcel Dekker. 2004
- Pina Barus. Universitas Sumatera Utara. *Pemanfaatan Bahan Pengawet dan Antioksidan Alami pada Industri Bahan Makanan*. Kampus USU; Medan. 2009
- Prawiradiputra, Bambang R. *Ki Rinyuh (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan*. Bogor: Balai Penelitian Ternak. 2006
- Pratiwi. *Skrining Uji Efek Antimitosis Ekstrak Daun Botto'-Botto' (Chromolaena odorata L.) Menggunakan Sel Telur Bulubabi (Tripneustus gratilla L.)*.

- Skripsi sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin: Makassar. 2015
- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008
- Rowe, R, C, Sheskey, P.J, dan Weller, P.J. *Handbook of Pharmaceutical Excipient*. Publisher-Science and Practice Royal Pharmaceutical Society of Great Britain: Edisi IV. London. 2003
- Radix Suharjo. *Eksplorasi Potensi Gulma Siam (Chromolaena Odorata L.) Sebagai Biofungisida Pengendali Phytophthora Palmivora Yang Diisolasi Dari Buah Kakao*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jurnal Volume 11. 2011
- Rini Kartika et al. *Bioaktivitas Ekstrak Agertahum conyzoidesz, Chromolaena odorata, Aeglemarmelos dan Glirisida sepium Terhadap Penyakit Busuk Buah Phytophthora palmivora) Pada Tanaman Kakao Di Kabupaten Bantaeng*. Makassar: Unhas. 2015.
- Sakaria, S.M. *Uji Bioaktifitas Ekstrak Daun Badota (Ageratum conzoydes) Dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus*. Skripsi. Jurusan Kimia FMIPA UNM: Makassar. 2005
- Sudding. *Studi Awal Penggunaan Ekstrak Air Daun Gulma Siam (Chromolaena odorata L.) King And Robinson dalam Mencegah Pembusukan Sayuran*. Jurusan Kimia FMIPA UNM: Makassar. 2012
- Siti Rofida, Nurwahdaniati. *Antibacterial Activity Of Chromolaena Odorata (L) King Leaves With Bioautography*. Volume 12 University of Muhammadiyah Malang: Malang. 2015
- Sri Wulandari et al. *Pengaruh Jenis Bahan Pengemas Dan Lama Penyimpanan Terhadap Kadar Vitamin C Dan Susut Berat Cabai Rawit (Capsicum Frutescens L.)*. Univ. Riau Pekanbaru: Jurnal Biogenesis, Vol. 8, Nomor 2, Februari 2012
- Setiadi. *Jenis dan Budidaya Cabai Rawit*. Cetakan 9. Penebar swadaya: Jakarta. 2001
- Septiningsih, Erna. *Efek Penyembuhan luka bakar ekstrak etanol 70% daun pepaya (Carica papaya) dalam sediaan gel pada kulit punggung kelinci*. Skripsi sarjana, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah: Surakarta. 2008


- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al – Misbah*. Volume 5. Lentera Hati: Jakarta. 2009
- Sulistyo. *Farmakologi dan Terapi*. EKG: Yogyakarta. 1971
- Sucipto. *Sterilisasi Pangan*. M-Brio Press: Bogor. 2008
- Sadsyam, Sriyanti. *Skrining Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Ekstrak Daun “Botto-Botto” (Chromolaena odorata L.)*. Skripsi sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin: Makassar. 2015
- Tranggono dan Sutardi. *Biokimia dan Teknologi Pasca Panen*. Pusat Antar Universitas Pangan Dan Gizi, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 1990
- Tjay, Tan Hoan, K. Rahardja. *Obat-Obat Penting*. Elex Media Komputindo: Jakarta. 2007.
- Utama, S, M. *Pengolahan Pasca panen Buah dan Sayuran Segar*. Makalah pada forum konsultasi Teknologi Dinas Pertanian Tanaman Pangan: Bali. 2001
- Utama, S, M. *Pengendalian Organisme Pengganggu Pascapanen Produk Hortikultura dalam Mendukung GAP*. Universitas Udayana: Bali. 2007
- Vital, P.G, dan Rivera, W.L. *Antimicrobial activity and cytotoxicity of Chromolaena odorata (L.) king and Robinson and Uncaria perrottetii Merr. extracts*, Journal of medical Plants Research, Volume 3. 2009
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 1995
- Wientarsih I, Prasetyo BF. *Diktat Farmasi dan Ilmu Resepsir*. Fakultas Kedokteran Hewan IPB: Bogor. 2006
- Yuyun Fitriana et al. *Uji Efikasi Ekstrak Gulma Siam Terhadap Mortalitas Hama Pencucuk Buah Kakao (Helopeltis Spp.) Di Laboratorium*. Fakultas Pertanian: Universitas Lampung. 2012

LAMPIRAN


Lampiran 1. Penyiapan Sampel




Lampiran 2. Ekstraksi Sampel



Lampiran 3. Formulasi



Lampiran 4. Uji penghambatan pembusukan buah dan pengamatan buah



Lampiran 5. Gambar Simplisia Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L)



Gambar 1. Daun botto'-botto' yang belum dikeringkan



Gambar 2. Daun botto'-botto' yang telah di keringkan

Lampiran 6. Proses Maserasi



Gambar 1. Penimbangan simplisia **Gambar 2.** Penambahan pelarut etanol 70%



Gambar 3. Proses perendaman simplisia

Lampiran 7. Proses Penguapan Sampel



Gambar 1. Penyaringan sampel



Gambar 2. Proses rotary evaporator



Gambar 3. Penguapan sampel di atas alat penangas

Lampiran 8. Ekstrak Dibebas Etanolkan



Gambar 1. Penyiapan alat



Gambar 2. Proses ekstrak dibebas etanolkan

Lampiran 9. Gambar bahan yang digunakan



Gambar 1. Ekstrak daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)



Gambar 2. Tween 80



Gambar 3. Aqua destilata

Lampiran 10. Gambar hasil sediaan formulasi



Gambar 1. Formula I



Gambar 2. Formula II



Gambar 3. Formula III



Gambar 4. Formula IV



Gambar 5. Formula V

Lampiran 11. Gambar Hasil Pengamatan Replika I pada hari ke-30



Lampiran 12. Gambar Hasil Pengamatan Replika II pada hari ke-30



Lampiran 13. Gambar Hasil Pengamatan Replika III pada hari ke-30



Lampiran 14. Analisis Data Rancangan Acak Kelompok (RAK) Buah Anggur

Formula	Buah Anggur	Pengamatan									Jumlah	Rata-rata
		H1	H4	H8	H12	H16	H20	H24	H28	H30		
F1	1	5	5	5	4	4	4	4	3	3	37	4.11111
	2	5	5	4	4	4	4	3	3	3	35	3.88889
	3	5	5	5	4	4	4	4	4	3	38	4.22222
Jumlah		15	15	14	12	12	12	11	10	9	110	
Rata-Rata		5	5	4.7	4	4	4	3.67	3.3	3	36.667	4.07407
F2	1	5	5	4	4	4	3	3	3	1	32	3.55556
	2	5	5	4	4	4	4	3	3	2	34	3.77778
	3	5	5	3	3	3	3	2	2	1	27	3
Jumlah		15	15	11	11	11	10	8	8	4	93	
Rata-Rata		5	5	3.7	3.7	3.7	3.3	2.67	2.7	1.3	31	3.44444
F3	1	5	4	4	3	3	2	2	2	1	26	2.88889
	2	5	4	3	3	2	2	2	1	1	23	2.55556
	3	5	4	3	3	3	2	2	1	1	24	2.66667
Jumlah		15	12	10	9	8	6	6	4	3	73	
Rata-Rata		5	4	3.3	3	2.7	2	2	1.3	1	24.333	2.7037
F4	1	5	5	5	4	4	3	3	3	3	35	3.88889
	2	5	5	5	4	4	3	3	2	2	33	3.66667
	3	5	5	4	4	3	3	3	2	1	30	3.33333
Jumlah		15	15	14	12	11	9	9	7	6	98	
Rata-Rata		5	5	4.7	4	3.7	3	3	2.3	2	32.667	3.62963
F5	1	5	4	4	4	3	3	2	2	1	28	3.11111
	2	5	4	4	3	3	3	2	2	1	27	3
	3	5	4	4	3	3	2	2	1	1	25	2.77778
Jumlah		15	12	12	10	9	8	6	5	3	80	
Rata-Rata		5	4	4	3.3	3	2.7	2	1.7	1	26.667	2.96296

Tabel. Rata-rata buah Anggur untuk Formula 1 - 5

Formula	Hari									Jumlah	Rata-Rata
	H1	H4	H8	H12	H16	H20	H24	H28	H30		
F1	5	5	4.7	4	4	4	3.7	3.3	3	36.67	4.074444
F2	5	5	3.7	3.7	3.7	3.3	2.7	2.7	1.3	31.07	3.452222
F3	5	4	3.3	3	2.7	2	2	1.3	1	24.3	2.7
F4	5	5	4.7	4	3.7	3	3	2.3	2	32.7	3.633333
F5	5	4	4	3.3	3	2.7	2	1.7	1	26.7	2.966667
Jumlah	25	23	20	18	17	15	13	11	8.3	151.44	
Rata-Rata	5	4.6	4.1	3.6	3.4	3	2.7	2.3	1.7	30.288	3.365333

Keterangan :

F1 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 1%)

F2 = Formula II (ekstrak daun botto'-botto' 2%)

F3 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 3%)

F4 = Formula IV (kontrol positif)

F5 = Formula V (kontrol negatif)

H1 = Pengamatan hari pertama

H4 = Pengamatan hari ke empat

H8 = Pengamatan hari ke delapan

H12 = Pengamatan hari ke dua belas

H16 = Pengamatan hari ke enam belas

H20 = Pengamatan hari ke dua puluh

H24 = Pengamatan hari ke dua puluh empat

H28 = Pengamatan hari ke dua puluh delapan

H30 = Pengamatan hari ke tiga puluh

Penilaian Hasil Pengamatan : 5 = Buah masih segar dan padat

4 = Buah sudah mengkerut dan berwarna kecoklatan

3 = Buah sudah lunak

2 = Buah sudah berair dan rusak

1 = Buah sudah mengalami busuk dan berulat

$$\begin{aligned} \text{A. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\ &= \frac{(151,44)^2}{45} \\ &= \frac{22934,07}{45} \\ &= 509,65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum(Y_{ij})^2 - \text{FK} \\ &= [(5)^2 + (5)^2 + \dots + (1)^2 - 509,65] \\ &= 571,53 - 509,65 \\ &= 61,88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{(\text{Tij})^2}{r} - \text{Faktor Koreksi} \\ &= \frac{[(36,67)^2 + (31,07)^2 + \dots + (26,7)^2]}{5} - \text{FK} \\ &= \frac{4682,70}{5} - 509,65 \\ &= 936,54 - 509,65 \\ &= 426,89 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{D. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)} &= \frac{(\sum T_{ij})^2}{\text{Jumlah replikasi}} - \text{Faktor Koreksi} \\
&= \frac{[(25)^2 + (25)^2 + \dots + (8,3)^2]}{9} - \text{FK} \\
&= \frac{2750,89}{9} - 509,65 \\
&= 305,65 - 509,65 \\
&= -204 \\
\text{E. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} - \text{JKK} \\
&= 61,88 - 426,89 - (-203,99) \\
&= -161,02 \\
\text{F. Derajat Bebas Total (DBT)} &= \sum n - 1 \\
&= (9 \times 5) - 1 \\
&= 44 \\
\text{G. Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} &= t - 1 \\
&= 5 - 1 \\
&= 4 \\
\text{H. Derajat Bebas Kelompok (DBK)} &= t - 1 \\
&= 9 - 1 \\
&= 8 \\
\text{I. Derajat Bebas Galat (DBG)} &= \text{DBT} - \text{DBP} - \text{DBK} \\
&= 44 - 4 - 8 \\
&= 32
\end{aligned}$$

J. Kuadrat Tengah Kelompok

$$= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Kelompok}}{\text{Derajat Bebas Kelompok}}$$

$$= \frac{-203,99}{8}$$

$$= -25,49$$

K. Kuadrat Tengah Perlakuan

$$= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{426,89}{4}$$

$$= 106,72$$

L. Kuadrat Tengah Galat

$$= \frac{\text{Jumlah kuadrat galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{-161,02}{32}$$

$$= -5,03$$

M.F Hitung perlakuan

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{106,72}{-5,03}$$

$$= -21,21$$

N. F Hitung kelompok

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Kelompok}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{-25,49}{-5,03}$$

$$= 5,06$$

Table 1. Analisis Varians Formula Buah Anggur

Standar Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F hitung	F tabel	
					5%	1%
Kelompok	8	-204	-25,49	5,06*	2,24	3,13
Perlakuan	4	426,89	106,72	-21,21Ns	2,67	3,97
Galat	32	-161,02	-5,03			
Total	44					

Keterangan :

FH Kelompok = 5,06

FH Perlakuan = -21,21

Untuk FH 5% = 5,06 > 2,24 → Berbeda nyata (s)

= -21,21 < 2,67 → Berbeda tidak nyata (ns)

Untuk FH 1% = 5,06 > 3,13 → Berbeda nyata (s)

= -21,21 < 3,97 → Berbeda tidak nyata (ns)

F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5 %. F hitung dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan dan jika F hitung < F tabel artinya sediaan tidak berbeda nyata (Ns) dengan formula sediaan lainnya.

Lampiran 15. Analisis Data Rancangan Acak Kelompok (RAK) Buah Tomat

Formula	Buah	Pengamatan	Jumlah	Rata-
---------	------	------------	--------	-------

	Tomat	H1	H4	H8	H12	H16	H20	H24	H28	H30		rata
F1	1	5	5	5	5	5	4	4	4	3	40	4.44444
	2	5	5	5	5	4	4	4	4	3	39	4.33333
	3	5	5	5	5	4	4	4	3	2	37	4.11111
Jumlah		15	15	15	15	13	12	12	11	8	116	
Rata-Rata		5	5	5	5	4.3	4	4	3.7	2.7	38.67	4.2963
F2	1	5	5	5	4	4	4	4	3	2	36	4
	2	5	5	4	4	4	4	4	2	2	34	3.77778
	3	5	5	5	4	4	4	3	3	2	35	3.88889
Jumlah		15	15	14	12	12	12	11	8	6	105	
Rata-Rata		5	5	4.7	4	4	4	3.7	2.7	2	35	3.88889
F3	1	5	4	4	3	3	3	2	1	1	26	2.88889
	2	5	4	3	3	3	2	1	1	1	23	2.55556
	3	5	4	4	3	2	2	2	1	1	24	2.66667
Jumlah		15	12	11	9	8	7	5	3	3	73	
Rata-Rata		5	4	3.7	3	2.7	2.3	1.7	1	1	24.33	2.7037
F4	1	5	5	4	4	4	3	2	2	1	30	3.33333
	2	5	5	5	4	4	3	3	2	1	32	3.55556
	3	5	5	4	4	4	4	4	3	2	2	33
Jumlah		15	15	13	12	12	10	8	6	4	95	
Rata-Rata		5	5	4.3	4	4	3.3	2.7	2	1.3	31.67	3.51852
F5	1	5	4	4	4	3	3	2	2	1	28	3.11111
	2	5	4	4	3	3	2	2	1	1	25	2.77778
	3	5	4	3	3	2	2	1	1	1	22	2.44444
Jumlah		15	12	11	10	8	7	5	4	3	75	
Rata-Rata		5	4	3.7	3.3	2.7	2.3	1.7	2	1	25	2.77778

Tabel. Rata-rata buah Tomat untuk Formula 1 - 5

Formula	Hari									Jumlah	Rata-Rata
	H1	H4	H8	H12	H16	H20	H24	H28	H30		
F1	5	5	5	5	4.3	4	4	3.7	2.7	38.7	4.3
F2	5	5	4.7	4	4	4	3.7	2.7	2	35.1	3.9
F3	5	4	3.7	3	2.7	2.3	1.7	1	1	24.4	2.711111
F4	5	5	4.3	4	4	3.3	2.7	2	1.3	31.6	3.511111
F5	5	4	3.7	3.3	2.7	2.3	1.7	2	1	25.7	2.855556
Jumlah	25	23	21	19	18	16	14	11	8	155.5	
Rata-Rata	5	4.6	4.3	3.9	3.5	3.2	2.8	2.3	1.6	31.1	3.455556

Keterangan :

F1 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 1%)

F2 = Formula II (ekstrak daun botto'-botto' 2%)

F3 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 3%)

F4 = Formula IV (kontrol positif)

F5 = Formula V (kontrol negatif)

H1 = Pengamatan hari pertama

H4 = Pengamatan hari ke empat

H8 = Pengamatan hari ke delapan

H12 = Pengamatan hari ke dua belas

H16 = Pengamatan hari ke enam belas

H20 = Pengamatan hari ke dua puluh

H24 = Pengamatan hari ke dua puluh empat

H28 = Pengamatan hari ke dua puluh delapan

H30 = Pengamatan hari ke tiga puluh

Penilaian Hasil Pengamatan : 5 = Buah masih segar dan padat

4 = Buah sudah mengkerut dan berwarna kecoklatan

3 = Buah sudah lunak

2 = Buah sudah berair dan rusak

1 = Buah sudah mengalami busuk dan berulat

$$\begin{aligned} \text{A. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\ &= \frac{(155,5)^2}{45} \\ &= \frac{24180,25}{45} \\ &= 537,33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum(Y_{ij})^2 - \text{FK} \\ &= [(5)^2 + (5)^2 + \dots + (1)^2 - 537,33] \\ &= 608,11 - 537,33 \\ &= 70,78 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{(\sum T_{ij})^2}{r} - \text{Faktor Koreksi} \\ &= \frac{[(38,7)^2 + (35,1)^2 + \dots + (25,1)^2]}{5} - \text{FK} \\ &= \frac{4984,11}{5} - 537,33 \\ &= 996,82 - 537,33 \\ &= 459,49 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{D. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)} &= \frac{(\sum T_{ij}^2)}{\text{Jumlah replikasi}} - \text{Faktor Koreksi} \\
&= \frac{[(25)^2 + (23)^2 + \dots + (8)^2]}{9} - \text{FK} \\
&= \frac{2934,95}{9} - 537,33 \\
&= 326,10 - 537,33 \\
&= -211,23 \\
\text{E. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} - \text{JKK} \\
&= 70,78 - 459,49 - (-211,23) \\
&= -177,47 \\
\text{F. Derajat Bebas Total (DBT)} &= \sum n - 1 \\
&= (9 \times 5) - 1 \\
&= 44 \\
\text{G. Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} &= t - 1 \\
&= 5 - 1 \\
&= 4 \\
\text{H. Derajat Bebas Kelompok (DBK)} &= t - 1 \\
&= 9 - 1 \\
&= 8 \\
\text{I. Derajat Bebas Galat (DBG)} &= \text{DBT} - \text{DBP} - \text{DBK} \\
&= 44 - 4 - 8 \\
&= 32
\end{aligned}$$

J. Kuadrat Tengah Kelompok

$$= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Kelompok}}{\text{Derajat Bebas Kelompok}}$$

$$= \frac{-211,23}{8}$$

$$= -26,40$$

K. Kuadrat Tengah Perlakuan

$$= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{459,49}{4}$$

$$= 114,87$$

L. Kuadrat Tengah Galat

$$= \frac{\text{Jumlah kuadrat galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{-177,47}{32}$$

$$= -5,54$$

M. F Hitung perlakuan

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{114,87}{-5,54}$$

$$= -20,71$$

N. F Hitung kelompok

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Kelompok}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{-26,40}{-5,54}$$

$$= 4,76$$

Table 2. Analisis Varians Formula Buah Tomat

Standar Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F hitung	F tabel	
					5%	1%
Kelompok	8	-211,23	-26,40	4,76*	2,24	3,13
Perlakuan	4	459,48	114,87	-20,71Ns	2,67	3,97
Galat	32	-177,47	-5,54			
Total	44	70,77				

Keterangan :

FH Kelompok = 4,76

FH Perlakuan = -20,71

Untuk FH 5% = $4,76 > 2,24$ → Berbeda nyata (s)

= $-20,71 < 2,67$ → Berbeda tidak nyata (ns)

Untuk FH 1% = $4,76 > 3,13$ → Berbeda nyata (s)

= $-20,71 < 3,97$ → Berbeda tidak nyata (ns)

F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5 %. F hitung dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan dan jika F hitung < F tabel artinya sediaan tidak berbeda nyata (Ns) dengan formula sediaan lainnya.

Lampiran 16. Analisis Data Rancangan Acak Kelompok (RAK) Cabai

Formula	Cabai	Pengamatan									Jumlah	Rata-rata
		H 1	H 4	H 8	H1 2	H1 6	H2 0	H2 4	H2 8	H3 0		
F1	1	5	5	5	4	4	4	4	3	3	37	4.11111
	2	5	5	4	4	4	4	3	3	2	34	3.77778
	3	5	5	4	4	4	3	3	3	2	33	3.66667
Jumlah		15	15	13	12	12	11	10	9	7	104	
Rata-Rata		5	5	4.3	4	4	3.7	3.3	3	2.3	34.6667	3.85185
F2	1	5	5	4	4	4	4	3	3	3	35	3.88889
	2	5	5	5	4	4	3	3	2	2	33	3.66667
	3	5	4	4	4	3	3	2	2	1	28	3.11111
Jumlah		15	14	13	12	11	10	8	7	6	96	
Rata-Rata		5	4.7	4.3	4	3.7	3.3	2.7	2.3	2	32	3.55556
F3	1	5	5	4	3	3	1	1	1	1	24	2.66667
	2	5	4	4	3	3	2	1	1	1	24	2.66667
	3	5	4	4	3	2	2	1	1	1	23	2.55556
Jumlah		15	13	12	9	8	5	3	3	3	71	
Rata-Rata		5	4.3	4	3	2.7	1.7	1	1	1	23.6667	2.62963
F4	1	5	5	5	4	3	3	1	1	1	28	3.11111
	2	5	5	4	4	3	3	2	1	1	28	3.11111
	3	5	5	4	3	3	2	2	2	1	27	3
Jumlah		15	15	13	11	9	8	5	4	3	83	
Rata-Rata		5	5	4.3	3.7	3	2.7	1.7	1.3	1	27.6667	3.07407
F5	1	5	4	4	4	3	1	1	1	1	24	2.66667
	2	5	4	4	4	4	2	2	1	1	27	3
	3	5	4	4	3	3	3	2	1	1	26	2.88889
Jumlah		15	12	12	11	10	6	5	3	3	77	
Rata-Rata		5	4	4	3.7	3.3	2	1.7	1	1	25.6667	2.85185

Tabel. Rata-rata buah Cabai untuk Formula 1 - 5

Formula	Hari									Jumlah	Rata-Rata
	H1	H4	H8	H12	H16	H20	H24	H28	H30		
F1	5	5	4.3	4	4	3.7	3.3	3	2.3	34.6	3.844444
F2	5	4.7	4.3	4	3.7	3.3	2.7	2.3	2	32	3.555556
F3	5	4.3	4	3	2.7	1.7	1	1	1	23.7	2.633333
F4	5	5	4.3	3.7	3	2.7	1.7	1.3	1	27.7	3.077778
F5	5	4	4	3.7	3.3	2	1.7	1	1	25.7	2.855556
Jumlah	25	23	21	18	17	13.4	10	8.6	7.3	143.7	
Rata-Rata	5	4.6	4.2	3.7	3.3	2.68	2.1	1.7	1.5	28.74	3.193333

Keterangan :

F1 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 1%)

F2 = Formula II (ekstrak daun botto'-botto' 2%)

F3 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 3%)

F4 = Formula IV (kontrol positif)

F5 = Formula V (kontrol negatif)

H1 = Pengamatan hari pertama

H4 = Pengamatan hari ke empat

H8 = Pengamatan hari ke delapan

H12 = Pengamatan hari ke dua belas

H16 = Pengamatan hari ke enam belas

H20 = Pengamatan hari ke dua puluh

H24 = Pengamatan hari ke dua puluh empat

H28 = Pengamatan hari ke dua puluh delapan

H30 = Pengamatan hari ke tiga puluh

Penilaian Hasil Pengamatan : 5 = Buah masih segar dan padat

4 = Buah sudah mengkerut dan berwarna kecoklatan

3 = Buah sudah lunak

2 = Buah sudah berair dan rusak

1 = Buah sudah mengalami busuk dan berulat

$$\begin{aligned} \text{A. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\ &= \frac{(143,7)^2}{45} \\ &= \frac{20649,69}{45} \\ &= 458,88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum(Y_{ij})^2 - \text{FK} \\ &= [(5)^2 + (5)^2 + \dots + (1)^2 - 458,88] \\ &= 552,45 - 458,88 \\ &= 93,57 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{(\sum T_{ij})^2}{r} - \text{Faktor Koreksi} \\ &= \frac{[(34,6)^2 + (32)^2 + \dots + (25,7)^2]}{5} - \text{FK} \\ &= \frac{4210,63}{5} - 458,88 \\ &= 842,12 - 458,88 \\ &= 383,24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{D. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)} &= \frac{(\sum T_{ij})^2}{\text{Jumlah replikasi}} - \text{Faktor Koreksi} \\
&= \frac{[(25)^2 + (23)^2 + \dots + (7,3)^2]}{9} - \text{FK} \\
&= \frac{2623,23}{9} - 458,88 \\
&= 291,47 - 458,88 \\
&= -167,41 \\
\text{E. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} - \text{JKK} \\
&= 93,57 - 383,24 - (-167,41) \\
&= -122,264 \\
\text{F. Derajat Bebas Total (DBT)} &= \sum n - 1 \\
&= (9 \times 5) - 1 \\
&= 44 \\
\text{G. Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} &= t - 1 \\
&= 5 - 1 \\
&= 4 \\
\text{H. Derajat Bebas Kelompok (DBK)} &= t - 1 \\
&= 9 - 1 \\
&= 8 \\
\text{I. Derajat Bebas Galat (DBG)} &= \text{DBT} - \text{DBP} - \text{DPK} \\
&= 44 - 4 - 8 \\
&= 32
\end{aligned}$$

J. Kuadrat Tengah Kelompok

$$= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Kelompok}}{\text{Derajat Bebas Kelompok}}$$

$$= \frac{-167,41}{8}$$

$$= -20,92$$

K. Kuadrat Tengah Perlakuan

$$= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{383,24}{4}$$

$$= 95,81$$

L. Kuadrat Tengah Galat

$$= \frac{\text{Jumlah kuadrat galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{-122,26}{32}$$

$$= -3,82$$

M.F Hitung perlakuan

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{95,81}{-3,82}$$

$$= -25,07$$

N. F Hitung kelompok

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Kelompok}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{-20,92}{-3,82}$$

$$= 5,47$$

Table 3. Analisis Varians Formula Cabai

Standar Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F hitung	F table	
					5%	1%
Kelompok	8	-167,41	-20,92	5,48*	2,24	3,13
Perlakuan	4	383,24	95,81	-25,07Ns	2,67	3,97
Galat	32	-122,26	-3,82			
Total	44	93,56				

Keterangan :

FH Kelompok = 4,90

FH Perlakuan = -22,47

Untuk FH 5% = 4,90 > 2,24 → Berbeda nyata (s)

= -22,47 < 2,67 → Berbeda tidak nyata (ns)


Untuk FH 1% = 4,90 > 3,13 → Berbeda nyata (s)

= -22,47 < 3,97 → Berbeda tidak nyata (ns)


F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5 %. F hitung dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan dan jika F hitung < F tabel artinya sediaan tidak berbeda nyata (Ns) dengan formula sediaan lainnya.

Lampiran 17. Grafik Hasil Pengamatan


A. Grafik hasil pengamatan Buah Anggur



B. Grafik hasil pengamatan Buah Tomat



C. Grafik hasil pengamatan Cabai



Keterangan :

F1 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 1%)

F2 = Formula II (ekstrak daun botto'-botto' 2%)

F3 = Formula 1 (ekstrak daun botto'-botto' 3%)

F4 = Formula IV (kontrol positif)

F5 = Formula V (kontrol negatif)

H1 = Pengamatan hari pertama

H4 = Pengamatan hari ke empat

H8 = Pengamatan hari ke delapan

H12 = Pengamatan hari ke dua belas

H16 = Pengamatan hari ke enam belas

H20 = Pengamatan hari ke dua puluh

H24 = Pengamatan hari ke dua puluh empat

H28 = Pengamatan hari ke dua puluh delapan

H30 = Pengamatan hari ke tiga puluh



BIOGRAFI PENULIS

Makassar, Sulawesi Selatan, 06 Oktober 1994. Anak dari Bapak DAHLAN & Ibu MILDAWATI, dan dia anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tuanya memberi nama DEWI RATIH DAHLAN dan akrab di panggil DEWI atau RATIH. Awal ia melalui pendidikan di TK Pertiwi lalu ia melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 1 Enrekang sampai naik kelas 6 di sekolah dasar tersebut. Lalu ia melanjutkan Pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di SMP Negara 2 Enrekang dan SMA Negeri 1 Enrekang. Setelah lulus pendidikan SMA. Dia selalu “Berdoa Dan Belajar Keras pasti bisa tercapai cita-cita yang diinginkan” itulah prinsipnya. “Membuat Orang Tuanya bangga terhadapnya”, itulah motivasi hidupnya. Maka ia memutuskan untuk mengikuti jalur UMM UIN Alauddin Makassar dengan memilih jurusan FARMASI. Mungkin inilah jalan dan takdirnya yang diberikan Allah SWT kepadanya. Dalam benaknya ia selalu bersyukur karena mungkin di UIN Alauddin Makassar lah kunci kesuksesannya nanti. AMIN..... ☺