

**ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI PENAKUMULASI
LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA ENDAPAN SEDIMEN
KANAL SEKITAR RUMAH SUSUN KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

MASTANG
NIM. 60300112111

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mastang
NIM : 60300112111
Tempat/Tgl. Lahir : Tanrung 3 Juli 1994
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains Dan Teknologi
Alamat : Jln. H. Muh. Yasin Limpo
Judul : Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,
Penyusun,



Mastang
NIM: 60300112111

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar", yang disusun oleh Mastang, NIM: 60300112111, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2016 M, bertepatan dengan 25 Safar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 November 2016 M.
25 Safar 1438 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kebesaran Sang Khalik yang telah menciptakan alam semesta dalam suatu keteraturan hingga dari lisan terpercik berjuta rasa syukur kehadiran Allah swt karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nyalah sehingga saya diberikan kekuatan, kesempatan dan kemudahan kepada hamba-Nya untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul **“Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman ini yang di utus ke permukaan bumi ini untuk menuntun manusia dari lembah kebiadaban menjadi kebaikan seperti sekarang ini yang menjadi suri tauladan/uswatun hasanah bagi kita semua.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Namun berkat kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Terutama saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Hemma dan ibunda Cannupe yang dengan tulus senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan cinta kasihnya yang begitu tulus, serta semangat yang tak pernah putus kepada penulis. Serta kepada kedua saudara perempuanku Satriani dan Arna yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, secara mendalam

saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Bapak Prof Dr. Arifuddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi dan ibu Baiq Farhatul Wahidah S.Si, M.Si selaku sekretaris jurusan Biologi.
4. Ibu Fatmawati Nur, S. Si., M. Si. selaku pembimbing I dan Ibu Ulfa Triyani A. Latif, S. Si., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan nasehat dan kesabarannya dalam membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Cut Muhiadin S. Si., M. Si. selaku penguji I, Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku penguji II dan Bapak Dr. Aan Farhani Lc. M.Ag selaku penguji III yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si, M.Si selaku Kepala Laboratorium Jurusan Biologi yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.
8. Bapak dan Ibu pegawai yang bersangkutan di Laboratorium Kimia dan Laboratorium Rumah Sakit Pendidikan UNHAS yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dan mendidik penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan 51 Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
10. Teman-teman seperjuangan penelitian, Ardi, Yuli, Suci, Riska, Rahmi, Andi Nurul Azizah dan Reski Nurul Hakiki telah banyak memberikan masukan dan semangat satu sama lain, serta setia menemani penulis dalam suka dan duka hingga tercapainya harapan bersama.
11. Teman-teman Kerja Praktek (KP) di Rumah Sakit Bhayangkara Bagian Forensik kota Makassar.
12. Teman-teman “**RANVIER**”, (Biologi Angkatan 2012) yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah selama kurang lebih 4 tahun bersama.
13. Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2013, 2014, dan 2015.
14. Serta Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya menyadari bahwa hanya kepada ALLAH SWT saya menyerahkan segalanya. Semoga kita semua mendapat curahan & Rihdo dari-Nya, Amiin.

Makassar,

Penulis

Mastang


Nim : 60300112111



DAFTAR ISI

JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii-vi
DAFTAR ISI	vii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1-5
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5-6
D. Kajian Pustaka	6-7
E. Tujuan Penelitian	7-8
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-45
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	9-11
B. Tinjauan Umum Logam Berat	11-13
C. Tinjauan Umum Logam Berat Timbal	13-14
D. Pencemaran Logam Berat Timbal	14-21
E. Tinjauan Umum Bakteri	21-27
F. Kemampuan Bakteri Mengakumulasi Logam Berat Timbal	27-29
G. Ciri-Ciri Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal	29-30
H. Identifikasi Molekuler Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal	30-38
I. Ayat yang Relevan	39-43
J. Kerangka Pikir	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45-55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Variabel Penelitian	46
E. Definisi Operasional Variabel	46-47
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Instrumen Penelitian	47-48

	H. Prosedur Kerja.....	48-55
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	56-80
	A. Hasil Penelitian	56-65
	B. Pembahasan	66-80
BAB V	PENUTUP	81-83
	A. Kesimpulan	81-82
	B. Saran	82-83
KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komposisi Primer Mix.....	52
Tabel 4.1	Pengamatan Makroskopik Koloni Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun	57-58
Tabel 4.2	Pengamatan Mikroskopik Sel Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun	58-59
Tabel 4.3	Jumlah Akumulasi Bakteri Terhadap Logam Timbal	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Penghambatan Produksi Hemoglobin Oleh Timbal	19
Gambar 2.2 Kurva Pertumbuhan Bakteri	26
Gambar 3.1 Peta Lokasi Titik Pengambilan Sampel	45
Gambar 4.1 Hasil Elektroforesis dari Produk Amplifikasi Gen 16 S-rRNA	60
Gambar 4.2 Urutan Basa Nukleotida Isolat A8 Hasil Sequencing	61
Gambar 4.3 Urutan Basa Nukleotida Isolat B3 Hasil Sequencing	61
Gambar 4.4 Urutan Basa Nukleotida Isolat C2 Hasil Sequencing	62
Gambar 4.5 Hasil Analisis BLAST Isolat A8	63
Gambar 4.6 Hasil Analisis BLAST Isolat B3	63
Gambar 4.7 Hasil Analisis BLAST Isolat C2	64
Gambar 4.8 Kurva Standar Akumulasi Bakteri Terhadap Logam Timbal	65
Gambar 4.9 Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	74
Gambar 4.10 Bakteri <i>Alcaligenes faecalis</i>	75
Gambar 4.11 Bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i>	78

ABSTRAK

Nama : Mastang
Nim : 60300112111
Judul Skripsi : “Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”

Bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) yaitu bakteri yang mampu mengurangi logam berat timbal (Pb) melalui proses absorpsi, produksi senyawa ekstraseluler atau sintesis enzimatis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik koloni bakteri yang dapat mengakumulasi logam timbal, spesies bakteri yang dapat mengakumulasi logam timbal dan jumlah logam berat timbal (Pb) yang terakumulasi oleh bakteri pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun kelurahan Mariso kota Makassar. Sampling dilakukan pada titik yang berbeda yaitu kanal rumah susun (lokasi A), kanal belakang rumah sakit Siloam (lokasi B) dan kanal yang berhubungan langsung dengan air laut (lokasi C). Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, identifikasi molekuler dengan primer 16S rRNA dan uji akumulasi bakteri terhadap logam timbal. Tahapan penelitian meliputi isolasi bakteri, identifikasi molekuler gen 16S rRNA dan uji akumulasi bakteri terhadap logam timbal (Pb) dengan konsentrasi 250 ppm. Hasil penelitian diperoleh 22 isolat, seleksi dilakukan dengan cara melihat pertumbuhan koloni yang paling baik pada media, yaitu isolat A8 (kanal rumah susun), B3 (kanal belakang rumah sakit Siloam) dan C2 (kanal yang berhubungan langsung dengan air laut). Hasil dari identifikasi molekuler menunjukkan bahwa isolat A8 adalah bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, isolat B3 adalah bakteri *Alcaligenes faecalis* dan isolat C2 adalah bakteri *Bacillus thuringiensis*. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dapat menurunkan 250 ppm menjadi 8.805 ppm, bakteri *Alcaligenes faecalis* dapat menurunkan 250 ppm menjadi 3.875 ppm dan bakteri *Bacillus thuringiensis* dapat menurunkan 250 ppm menjadi 0.39 ppm dalam waktu 2x24 jam.

Kata Kunci: *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringiensis*, Logam Timbal, Akumulasi.

ABSTRACT

Name : Mastang
SIN : 60300112111
Minithesis Title : **“Isolation and Identification of Bacteria Accumulating Heavy Metal Lead (Pb) on Canal Sediment Deposition Around Town Flats Makassar”**

Bacteria accumulating heavy metals lead (Pb) are bacteria that capable to reduce heavy metals lead (Pb) through the absorption process, the production of extracellular compound or enzymatic synthesis. This study was conducted to determine the characteristics of bacterial colonies that can accumulate the lead metal, the species of bacteria that can accumulate metal lead and the amount of heavy metal that accumulated by bacteria on canal sediments canal around the apartment village Mariso Makassar. Sampling was done at different point, namely the canal flats (location A), canal behind its hospital Siloam (location B) and canal in direct contact with sea water (location C). The research method was used descriptive analysis, molecular identification by 16S rRNA primer and test the accumulation of bacteria to metallic lead. Stages of research include the isolation of bacteria, the molecular identification of the 16S rRNA gene and test of bacteria accumulation to metal lead (Pb) with a concentration of 250 ppm. The results were obtained 22 isolates, the selection was done by looking at the best growth of colony on the media. They are isolates A8 (canal flats), B3 (canal behind its hospital Siloam) and C2 (canal associated directly with sea water). The results of molecular identification showed that the bacterial isolates A8 is *Pseudomonas aeruginosa*, isolates B3 is *Alcaligenes faecalis* bacteria and isolates C2 is the bacterium *Bacillus thuringiensis*. *Pseudomonas aeruginosa* able to lowered to 250 ppm to 8.805 ppm, *Alcaligenes faecalis* bacteria able to degrade 250 ppm to 3.875 ppm and *Bacillus thuringiensis* bacteria able to degrade 250 ppm to 0.39 ppm in 2x24 hours.

Keywords: *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringiensis*, Metals Lead, Accumulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air), sehingga bersifat merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan. Kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak dan logam berbahaya sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Pencemaran dapat terjadi di udara, darat dan perairan (Aminah, 2009).

Pencemaran perairan adalah pencemaran yang sangat mengkhawatirkan dan merugikan, pencemaran ini sering kali terjadi pada tempat yang berkembang pesat. Pesatnya pembangunan di suatu wilayah dapat mempengaruhi keadaan dari wilayah itu sendiri. Perubahan yang dapat terjadi khususnya pada kondisi lingkungan baik yang di darat atau perairannya. Dampak terbesar dari pesatnya pembangunan adalah pencemaran yang sering kali merugikan lingkungan sekitar akibat dari industri, pembangunan perumahan atau gedung, asap yang menyebabkan polusi dan bahkan pestisida pertanian, sehingga menghasilkan berbagai macam limbah yang dapat mencemari lingkungan (Lewaru, 2012).

Pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh limbah ada bermacam - macam bentuk. Ada pencemaran berupa bau, warna, suara, bahkan pemutusan rantai dari

suatu tatanan lingkungan hidup atau penghancuran suatu jenis organisme yang pada tingkat akhirnya akan menghancurkan tatanan ekosistemnya. Pencemaran yang dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup, biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun (*toksisitas*) yang tinggi. Limbah yang sangat beracun pada umumnya merupakan limbah kimia, apakah itu berupa senyawa kimia atau hanya dalam bentuk unsur. Biasanya senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup dan manusia adalah senyawa kimia yang mempunyai bahan aktif dari logam berat. Daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologis atau metabolisme tubuh sehingga proses metabolisme terputus. Disamping itu bahan beracun dari senyawa kimia juga dapat terakumulasi atau menumpuk dalam tubuh, akibatnya timbul masalah kronis (Palar, 2008).

Undang-undang lingkungan hidup No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa suatu tatanan lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila kedalam tatanan lingkungan hidup itu masuk atau dimasukkan suatu benda lain yang kemudian memberikan pengaruh buruk terhadap bagian-bagian yang menyusun tatanan lingkungan hidup itu sendiri, sehingga tidak dapat lagi hidup sesuai aslinya. Pada tingkat lanjutnya bahkan dapat menghapuskan satu atau lebih dari mata rantai dalam tatanan tersebut. Sedangkan suatu pencemar atau polutan adalah setiap benda zat ataupun organisme hidup yang masuk kedalam suatu tatanan alami dan kemudian mendatangkan perubahan-perubahan yang bersifat negatif terhadap tatanan yang dimasukinya (Palar, 2008).

Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah. Limbah dalam konotasi sederhana dapat diartikan sebagai sampah. Limbah atau polutan, dapat digolongkan atas beberapa kelompok berdasarkan pada jenis, sifat dan sumbernya berdasarkan pada jenis, limbah digolongkan atas limbah padat dan limbah cair. Berdasarkan pada sifat yang dibawanya, limbah digolongkan atas limbah organik dan limbah anorganik. Sedangkan bila berdasarkan pada sumbernya, limbah dikelompokkan atas limbah rumah tangga atau limbah domestik dan limbah industri (Palar, 2008).

Allah berfirman dalam QS Al-Rum/30 : 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Kementrian Agama RI, 2010).

Dosa dan pelanggaran (*fasad*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan laut, mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Hakikat ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lebih-lebih dewasa ini. Allah swt menciptakan semua makhluk, saling kait berkaitan. Dalam keterkaitan itu, lahir keserasian dan keseimbangan dari

yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah yang Maha Besar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka kerusakan terjadi, dan ini kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu (Shihab, 2002).

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia di kawasan Indonesia Timur sehingga kota ini sudah menjadi kota metropolitan. Berkembang pesatnya kota Makassar diiringi pula dengan berbagai pembangunan seperti pembangunan perhotelan dan pariwisata, kegiatan perindustrian, pembangunan rumah sakit dan pemukiman penduduk, sehingga menghasilkan limbah dari pembangunan itu sendiri dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Kehadiran limbah tersebut dapat bersifat toksik bagi makhluk hidup melalui rantai makanan.

Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran pembangunan adalah kelurahan Mariso Kecamatan Mariso kota Makassar. Daerah ini meskipun pembangunannya begitu pesat namun warga masih kekurangan perhatian dan pengetahuan terhadap kesehatan lingkungan. Sehingga pada daerah ini masyarakat membuang sampahnya sembarangan di perairan seperti pada kanal, sungai, dan nantinya akan menuju ke laut tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini terjadi secara sistematis maka dampak yang akan diakibatkan oleh perbuatan tersebut ke depannya adalah timbulnya berbagai macam penyakit akibat pencemaran lingkungan itu sendiri. Melihat kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal*

(Pb) pada Endapan Sedimen di Perairan Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar” harapan kedepannya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan bakteri sebagai agen bioakumulator.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu :

1. Bagaimana karakteristik secara makroskopik dan mikroskopik dari koloni bakteri yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun?
2. Bakteri apa saja yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun?
3. Bagaimana kemampuan bakteri mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Pengambilan sampel dilakukan di daerah sekitar rumah susun kota Makassar pada tiga titik yang berbeda yaitu di daerah kanal rumah susun, kanal belakang rumah sakit Siloam dan kanal yang berhubungan langsung dengan air laut.

2. Sampel diisolasi, Jumlah bakteri dihitung dengan menggunakan penghitung koloni (*Colony Counter*) dengan metode *Standar Plate Count* (SPC), dan diamati karakteristiknya yang meliputi bentuk koloni, permukaan koloni, tepi koloni dan warna koloni. Kemudian diidentifikasi secara mikroskopik dengan pewarnaan gram dan pewarnaan endospora. Selanjutnya dilakukan identifikasi molekular di Laboratorium Biologi Molekular dan Seluler Rumah Sakit Pendidikan UNHAS.
3. Bakteri diuji kemampuannya dalam mengakumulasikan logam timbal dan dianalisis di Laboratorium Riset UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan metode SSA (*Spektrophotometer Serapan Atom*).

D. Kajian Pustaka

Menurut Prasetya dkk (2012) yang telah melakukan penelitian tentang adaptasi genera *Bacillus* pada media yang mengandung logam timbal yang bertujuan membandingkan daya adaptasi genera *Bacillus* terhadap cekaman logam timbal pada konsentrasi 10-25 ppm selama waktu pertumbuhan 24 jam. Media yang digunakan adalah media cair *Nutrient Broth* yang mengandung $PbCl_2$ dengan konsentrasi 10-25 ppm. Pola pertumbuhan diukur dengan Spektrofotometer pada λ 600 nm. Hasil pola pertumbuhan genera *Bacillus* hampir seragam pada konsentrasi perlakuan $PbCl_2$, yaitu awal 0 – 2 jam merupakan fase adaptasi, jam ke 2 – ke 12 adalah fase eksponensial, jam ke 12 – 20 adalah fase stasioner dan setelah jam ke 20 menunjukkan fase kematian. Semua generasi *Bacillus* menunjukkan daya adaptasi yang baik pada konsentrasi 15 ppm $PbCl_2$ kecuali *Bacillus* DA 11 dapat beradaptasi pada konsentrasi

20 ppm bahkan *Bacillus* S1 pada 25 ppm. Resistensi *Bacillus* terhadap logam timbal berhubungan dengan gen di dalam plasmid, transport aktif yang melibatkan ATP atau melalui fase peningkatan pada permukaan dinding sel yang mengandung eksopolisakarida.

Hasil penelitian ini juga telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2005), identifikasi bakteri pengikat timbal (Pb) pada sedimen di perairan sungai Siak, yang bertujuan untuk mendapatkan isolat-isolat bakteri yang mampu mengikat logam berat khususnya timbal (Pb) untuk mengurangi pencemaran timbal dari limbah industri secara biologis dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran mikroorganisme (bakteri) sebagai pengikat (biosorbent) logam berat khususnya timbal untuk mengurangi pencemaran di suatu perairan sungai. Jumlah total bakteri pengikat timbal (Pb) pada sedimen di perairan sungai Siak Pekanbaru berkisar antara $3,0 \times 10^7$ sampai $1,5 \times 10^8$ sel/ml. isolasi bakteri pengikat Timbal (Pb) pada sedimen di perairan sungai Siak Pekanbaru yang ditemukan 6 jenis yaitu *Micrococcus*, *Corynebacterium*, *Phenylobacterium*, *Enhydrobacter*, *Morrococcus*, *Flavobacterium*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui karakteristik secara makroskopik dan mikroskopik bakteri yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun.

2. Untuk mengetahui jenis bakteri yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun.
3. Untuk mengetahui kemampuan bakteri mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Mendapatkan isolat bakteri yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan pencemaran logam berat timbal (Pb) pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun.
3. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Mariso merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kota Makassar, secara geografis kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82 km², dengan tingkat kepadatan sebesar 30.009 jiwa/km². Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsektor perikanan laut. Kecamatan mampu menghasilkan 1.227 ton hasil laut atau 3.767.509 rupiah. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Padatnya Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi menimbulkan masalah tersendiri bagi pembangunan di perkotaan. Dampak langsung yang dihadapi oleh pemerintah kota adalah semakin sempitnya lahan yang tersedia bagi penduduk, akibatnya persaingan untuk mendapatkan tempat tinggal menjadi problem tersendiri (BPS, 2013).

Pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas prasarana lingkungan permukiman seperti pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan sosialisasi akan pentingnya kebersihan dan sanitasi lingkungan, program kali bersih serta program stimulan yang salah satu kegiatannya

adalah pengadaan peralatan kebersihan yang didistribusikan melalui kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Makassar (Alamsyah, 2013).

Pembangunan Rusunawa adalah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyediaan tempat tinggal. Pembangunan rumah susun di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Mariso dimulai pada tahun 2005, Konsep pembangunan ke arah vertikal seperti rumah susun, flat, dan kondominium akan dapat melipat gandakan daya dukung lahan yang ada di wilayah kota. Dengan demikian pembangunan rumah susun merupakan kebijakan pemerintah yang tepat dan baik untuk mengatasi permasalahan di atas. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa rumah susun dapat terjangkau oleh masyarakat tingkat ekonomi menengah kebawah. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya aspek kenyamanan dan keamanan bagi penghuni rumah susun adalah tersedianya fasilitas prasarana air bersih, air limbah, dan pengelolaan sampah yang memadai. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya dan kini kondisi fisik rumah susun dan prasarana lingkungannya sering terabaikan oleh penghuninya sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem prasarana air bersih, air limbah, dan pengelolaan sampah (Alamsyah, 2013).

Pembangunan rusunawa diharapkan mampu mengembangkan atau meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi Rusunawa mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian secara fisik maupun non fisik. Tujuan dibangunnya rumah susun itu sendiri untuk mengurangi kekumuhan, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa rumah susun terlihat semakin

kumuh, hal ini bisa saja disebabkan oleh prasarana yang kurang memadai, perilaku penghuni itu sendiri, ataupun manajemen yang kurang bagus dalam mengelola Rusunawa. Limbah domestik dari penghuni rusunawa itu sendiri di buang langsung ke kanal selanjutnya akan masuk ke badan perairan laut, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran logam berat yang berdampak pada biota perairan yang bersifat toksik bagi kelangsungan makhluk hidup (Alamsyah, 2013).

B. Tinjauan Umum Logam Berat

Logam berat merupakan senyawa toksik bila berada di atas tubuh manusia di atas ambang konsentrasi tertentu (Wardhana, 2004). Istilah logam biasanya diberikan kepada semua unsur kimia dengan ketentuan atau kaidah-kaidah tertentu. Unsur ini dalam kondisi suhu kamar, tidak selalu berbentuk padat melainkan ada yang berbentuk cair. Menurut (Palar, 2008) melihat kepada bentuk dan kemampuan atau daya yang ada pada setiap logam, maka dapatlah diketahui bahwa setiap logam haruslah:

- a. Memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik (konduktor).
- b. Memiliki kemampuan sebagai penghantar panas yang baik .
- c. Memiliki kerapatan yang tinggi.
- d. Dapat membentuk alloy dengan logam lainnya.
- e. Untuk logam yang padat, dapat ditempa dan dibentuk.

Disamping itu, setiap unsur logam baik yang padat maupun yang berbentuk cair, akan memberikan ion positif (+) apabila senyawanya dilarutkan dalam air. Sedangkan oksida dari senyawa tersebut akan membentuk hidroksida bila bertemu dengan air. Hampir 75% dari unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik unsur merupakan unsur logam. Unsur logam tersebut ditemukan hampir pada setiap golongan kecuali pada golongan VII-A dan golongan VIII-A dari tabel periodik unsur (Palar, 2008).

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria yang sama dengan logam lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan masuk ke dalam tubuh organisme hidup. Sebagai contoh bila unsur logam besi (Fe) masuk ke dalam tubuh, meski dalam jumlah agak berlebihan, biasanya tidaklah menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap tubuh. Karena unsur besi (Fe) dibutuhkan dalam darah untuk mengikat oksigen. Sedangkan unsur logam berat baik itu logam berat beracun yang dipentingkan seperti Tembaga (Cu), bila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan pengaruh pengaruh buruk terhadap fungsi fisiologis tubuh. Jika yang masuk ke dalam tubuh organisme hidup adalah unsur logam berat beracun seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), cadmium (Cd) dalam jumlah yang banyak dan terakumulasi dalam tubuh maka dapat dipastikan bahwa organisme tersebut akan langsung keracunan (Palar, 2008).

Logam berat biasanya ditemukan sangat sedikit sekali dalam air secara alamiah, yaitu kurang dari 1 μg . Bila terjadi erosi alamiah konsentrasi logam tersebut dapat meningkat. Terjadinya toksisitas logam dapat melalui beberapa jalan, yaitu

inhalasi (melalui pernapasan), termakan (melalui saluran pencernaan), dan penetrasi melalui kulit (Darmono, 2001). Salah satu jenis logam yang berbahaya terhadap makhluk hidup yaitu logam timbal. Logam timbal dapat bersifat toksik terhadap makhluk hidup apabila melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan yaitu 0.03 mg/L. Keracunan timbal disebut juga plumbism.

C. Tinjauan Umum Logam Berat Timbal

Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah hitam, dalam bahasa ilmiahnya dinamakan *Plumbum*, dan logam ini disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk kedalam kelompok logam-logam golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atau berat atom (BA) 207,2. Penyebaran logam timbal di bumi sangat sedikit. Jumlah timbal yang terdapat diseluruh lapisan bumi hanyalah 0,0002% dari jumlah seluruh kerak bumi. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kandungan logam berat lainnya yang ada di bumi (Palar, 2008).

Menurut (Palar, 2008) pada logam timbal atau Pb mempunyai sifat-sifat yang khusus seperti berikut :

- a. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.
- b. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga logam timbal sering digunakan bahan sebagai *coating*.
- c. Mempunyai titik lebur rendah, hanya 327,5 derajat celcius.

- d. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, kecuali emas dan merkuri.
- e. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik.

Timbal dan persenyawaannya banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam industri baterai, timbal digunakan sebagai *grid* yang merupakan alloy (suatu persenyawaan) dengan logam bismuth (Pb-Bi). Timbal oksida (PbO_4) dan logam timbal dalam industri baterai digunakan sebagai bahan yang aktif dalam pengaliran arus elektron. Kemampuan timbal dalam membentuk alloy dengan banyak logam lain telah dimanfaatkan untuk meningkatkan sifat metalurgi dari logam ini dalam penerapan yang sangat luas (Palar, 2008). Logam berat timbal dalam jumlah yang melebihi ambang batas dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan baik lingkungan darat, perairan maupun udara.

D. Pencemaran Logam Berat Timbal

Pencemaran logam berat timbal terhadap alam lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia. Pencemaran logam berat dapat terjadi melalui limbah industri maupun limbah domestik pada daerah lingkungan yang bermacam-macam dan terbagi menjadi tiga golongan yaitu udara, tanah dan perairan. Pencemaran udara oleh logam berat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat logam itu sendiri, sedangkan pencemaran tanah dan perairan erat hubungannya dengan penggunaan logam itu sendiri. Pencemaran udara biasanya terjadi pada proses-proses industri yang menggunakan suhu tinggi,

sedangkan logam seperti timbal (Pb) merupakan logam yang relatif mudah menguap. Pencemaran daratan dan air biasanya terjadi karena pembuangan limbah dari industri penggunaan logam yang bersangkutan secara tidak terkontrol atau penggunaan bahan yang mengandung logam itu sendiri seperti pestisida dan insektisida sehingga mengakibatkan keracunan pada makhluk hidup. Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam timbal dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut ke dalam tubuh. Proses masuknya timbal ke dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur seperti melalui makanan dan minuman, udara dan perembesan atau penetrasi pada selaput atau lapisan kulit. Pencemaran logam berat timbal kebanyakan ditemukan dalam perairan hal ini dikarenakan timbal dan persenyawaannya dapat berada di dalam badan perairan secara alamiah dan sebagai dampak dari aktivitas manusia (Palar, 2008).

1. Timbal (Pb) dalam Perairan

Secara alamiah, timbal dapat masuk kedalam badan perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Disamping itu, proses korosifikasi dari batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber timbal yang akan masuk ke dalam badan perairan (Palar, 2008).

Timbal yang masuk kedalam badan perairan sebagai dampak dari aktivitas kehidupan manusia ada bermacam bentuk, diantaranya air buangan (limbah) dari industri yang berkaitan dengan Pb, air buangan dari pertambangan bijih timah hitam dan buangan sisa industri baterai. Buangan buangan tersebut akan jatuh pada jalur-

jalur perairan seperti anak-anak sungai untuk kemudian akan dibawa terus menuju lautan. Umumnya jalur buangan dari bahan sisa perindustrian yang menggunakan timbal akan merusak tata lingkungan perairan yang dimasukinya (menjadikan sungai dan alurnya tercemar) (Palar, 2008).

Senyawa timbal yang ada dalam badan perairan dapat ditemukan dalam bentuk ion-ion divalen (Pb^{2+}) atau ion-ion tetravalen (Pb^{4+}) Pb divalent digolongkan kedalam kelompok ion logam kelas antara, sedangkan ion Pb tetravalent digolongkan pada kelompok ion logam kelas B. pengelompokan ion logam ini dibuat oleh Ricardson. Ion Pb tetravalent mempunyai daya racun yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan ion Pb divalent (Palar, 2008).

Badan perairan yang telah kemasukan senyawa atau ion-ion Pb, sehingga jumlah Pb yang ada dalam badan perairan melebihi konsentrasi yang semestinya, dapat mengakibatkan kematian bagi biota perairan tersebut. Konsentrasi Pb yang mencapai 188 mg/l, dapat membunuh ikan. Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa, biota-biota perairan seperti *Crustacea*. Akan mengalami kematian setelah 245 jam, bila pada badan perairan dimana biota itu berada terlarut Pb pada konsentrasi 2,75 – 49 mg/l. sedangkan biota perairan lainnya, yang dikelompokkan dalam golongan *Insecta* akan mengalami kematian dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu antara 168 ampai dengan 336 jam bila pada badan perairan tempat hidupnya terlarut 3,5 sampai dengan 64 mg/l Pb. Dalam air minum juga dapat ditemukan senyawa Pb bila air tersebut disimpan atau dialirkan melalui pipa yang merupakan alloy dari logam Pb (Palar, 2008).

Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan batas kandungan logam untuk timbal (Pb) dan cadmium (Cd) tidak boleh melebihi 0,03 mg/L dan 0,01 mg/L pada suatu perairan (Arif, 2012).

Apabila logam berat timbal melebihi ambang batas yang telah ditentukan maka dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan perairan yang berdampak pada biota perairan dan makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi biota perairan yang tercemar logam timbal tersebut dan mengakibatkan toksisitas pada makhluk hidup.


2. Mekanisme Toksisitas timbal (Pb)

Menurut (Darmono, 2001) timbal merupakan logam toksik yang bersifat kumulatif sehingga mekanisme toksisitasnya dibedakan menurut beberapa organ yang dipengaruhinya yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem hemopoetik, timbal menghambat sistem pembentukan hemoglobin sehingga menyebabkan anemia.
- b. Sistem saraf pusat dan tepi, dapat menyebabkan gangguan ensefalopati dan gejala gangguan saraf perifer.
- c. Sistem ginjal, dapat menyebabkan aminoasiduria, fosfaturia, glukosuria, nefropati, fibrosis, dan atrofi glomerular.
- d. Sistem gastrointestinal, menyebabkan kolik dan konstipasi.
- e. Sistem kardiovaskuler, menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler pembuluh darah.

- f. Sistem reproduksi, dapat menyebabkan kematian janin waktu melahirkan pada wanita serta hipospermi dan teratospermi pada pria.
- g. Sistem endokrin, mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal.

Timbal dalam tubuh terutama terikat pada gugus-SH pada molekul protein dan hal ini menyebabkan hambatan pada aktifitas kerja sistem enzim. Timbal mengganggu sistem sintesis Hb dengan jalan menghambat konversi delta aminolevulinik asid (delta-ALA menjadi porfobilinogen dan juga menghambat incorporasi dari Fe ke dalam protoporfirin IX untuk membentuk Hb, dengan jalan menghambat enzim delta-aminolevulinik asid-dehidratase (delta ALAD) dan ferokelatase. Hal ini mengakibatkan meningkatnya ekskresi koproporfirin dalam urin dan delta-ALA serta menghambat sintesis Hb (Darmono, 2001).



Gambar 2.1. Proses penghambatan produksi hemoglobin oleh Timba(Pb).

Untuk kompensasi dari penurunan Hb karena hambatan oleh Pb, sumsum tulang meningkatkan produksi sel darah merah. Sel darah merah yang masih muda (*retikulosit*) dan sel stiel kemudian terbebaskan. Sel stiel basofil ditemukan sebagai bagian dari gangguan metabolik dari pembentukan Hb yang merupakan tanda-tanda keracunan timbal. Sel darah merah gagal untuk menjadi dewasa dan sel tersebut menyisakan organel yang biasanya menghilang pada proses kedewasaan sel, sedangkan poliribosoma irregular pada agregat RNA membentuk sel stiel. Akumulasi dari delta ALA dan protoporfirin dapat menyebabkan pengaruh toksik terhadap jaringan. Akumulasi delta ALA dalam hipotalamus dan protoporfirin dalam saraf dorsal dapat menyebabkan ensefalopati karena toksisitas timbal. Terjadinya neuropati pada saraf tepi karena toksisitas timbal disebabkan oleh demylenisasi dan degenerasi saraf tersebut (Darmono, 2001).

Timbal bersirkulasi dalam darah setelah diabsorpsi dari usus, terutama hubungannya dengan sel darah merah (*eritrosit*). Pertama didistribusikan dalam jaringan lunak seperti tubulus ginjal dan sel hati, tetapi berinkorporasi dalam tulang, rambut dan gigi untuk dideposit, dimana 90% deposit terjadi dalam tulang dan hanya sebagian kecil tersimpan dalam otak. Dalam tulang, timbal ditemukan dalam bentuk Pb-fosfat. Secara teori selama timbal masih terikat dalam tulang tidak akan menyebabkan gejala sakit pada penderita. Tetapi yang berbahaya adalah toksisitas timbal yang diakibatkan oleh gangguan absorpsi kalsium, dimana terjadi desorpsi kalsium dari tulang menyebabkan terjadinya penarikan deposit timbal dari tulang tersebut (Darmono, 2001).

Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya toksisitas daya racun yang disebabkan oleh logam berat timbal (Pb) yang bersifat toksik terhadap lingkungan dan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) maka dapat dilakukan proses bioremediasi dengan memanfaatkan mikroorganisme (bakteri, jamur, kapang, alga dan protozoa) sebagai agen bioremediasi pada lingkungan yang tercemar. Salah satu sel mikroba yang digunakan untuk pengolahan limbah adalah bakteri (Utami, 2008). Mikroorganisme beradaptasi dengan lingkungannya dengan berbagai mekanisme seperti adsorpsi, penyerapan (*uptake*), metilasi, oksidasi, dan reduksi sehingga menjadi resisten terhadap logam (Maula, 2010).

E. Tinjauan Umum Bakteri

Bakteri merupakan mikroba uniseluler. Pada umumnya bakteri tidak mempunyai klorofil. Ada beberapa yang fotosintetik dan reproduksi seksualnya secara pembelahan. Bakteri disebut juga sebagai *Ubiquitous*, artinya ada di mana mana. Jumlah bakteri tergantung keadaan sekitar. Misalnya jumlah bakteri di dalam tanah tergantung jenis dan tingkat kesuburan tanah (Hidayat dkk, 2006).

1. Karakteristik Bakteri

Bakteri umumnya berukuran kecil dengan karakteristik dimensi sekitar 1 μm . bentuknya dapat bulat atau *cocci*, batang atau *bacilli*. Sel dapat berbentuk tunggal ataupun rantai. Beberapa kelompok memiliki flagel dan dapat bergerak aktif. Bakteri memiliki berat jenis 1,05 – 1,1 g cm^{-3} dan berat sekitar 10-12 g sebagai partikel kering. Ukuran aktual tergantung dari laju pertumbuhan, media tumbuh dan

sebagainya. Ada tiga bentuk dasar bakteri, yaitu bentuk bulat atau *Coccus*, bentuk batang atau *Silindris*, bentuk lengkung atau *Vibrio* (Hidayat dkk, 2006).

Bentuk bulat pada jenis bakteri ini sebenarnya tidak ada bakteri yang betul-betul bulat, tetapi *spheroid*. Bentuk bulat atau *Coccus* dapat dibedakan yaitu, *Micrococcus* yaitu bulat satu, *Diplococcus* bulat bergandengan dua, *Streptococcus* bulat bergandengan seperti rantai sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis, *Tetracoccus* bulat terdiri dari empat sel yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar sebagai hasil pembelahan sel ke dua arah, *Sarcina* bulat terdiri dari delapan sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ke tiga arah, *Staphilococcus* bulat tersusun sebagai kelompok buah anggur sebagai hasil pembelahan sel ke segala arah (Hidayat dkk, 2006).

Bentuk batang, pada jenis bakteri berbentuk batang dapat dibedakan ke dalam bentuk batang panjang dan batang pendek dengan ujung datar atau lengkung. Bentuk batang dapat dibedakan lagi atas bentuk batang yang mempunyai garis tengah sama dan tidak sama di seluruh bagian panjangnya. Bakteri bentuk batang dapat terdiri atas sel tunggal bergandengan dua-dua (*Diplocillus*) dan sebagai rantai (*Streptobacillus*) (Hidayat dkk, 2006).

Bentuk lengkung pada jenis bakteri berbentuk lengkung pada pokoknya dapat dibagi menjadi bentuk koma (*Vibrio*), jika lengkungnya kurang dari setengah lingkaran. Jika spiralnya halus dan lentur disebut *Spirochaeta* jika spiralnya tebal dan kaku disebut *Spirillum* (Hidayat dkk, 2006).

Banyak spesies bakteri yang mempunyai alat gerak yang disebut dengan flagel. Hampir semua bakteri yang berbentuk lengkung dan sebagian yang berbentuk batang ditemukan adanya flagel. Sedangkan bakteri kokus jarang sekali memiliki flagel. Ukuran flagel bakteri sangat kecil, tebalnya 0,02 – 0,1 mikro, dan panjangnya melebihi panjang sel bakteri. Berdasarkan tempat dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi lima golongan, yaitu: *Atrik* merupakan kelompok bakteri yang tidak mempunyai flagel, *Monotrik* merupakan kelompok bakteri yang mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya, *Lofotrik* merupakan kelompok bakteri yang mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya, *Amfitrik* merupakan kelompok bakteri yang mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya dan *Peritrik* merupakan kelompok bakteri yang mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya (Prasetyawati, 2009).

Bentuk bakteri dipengaruhi oleh umur dan syarat pertumbuhan tertentu. Pada bakteri dikenal bentuk yang disebut involusi. Bentuk ini disebabkan karena faktor faktor keadaan sekitar yang tidak menguntungkan. Sebagai bentuk involusi dikenal pula *Pleomorf* yaitu bentuk yang bermacam-macam dan teratur yang terdapat pada suatu bakteri meskipun di tumbuhkan pada syarat-syarat pertumbuhan yang sesuai (Hidayat dkk, 2006).

2. Morfologi Bakteri

Secara harfiah morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk (*morphos*). Morfologi dalam cabang ilmu biologi ilmu tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan dan mencakup bagian-bagiannya. Populasi bakteri tumbuh

dengan cepat ketika mereka disertakan dengan gizi dan kondisi lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Melalui pertumbuhan ini, berbagai jenis bakteri kadang-kadang menghasilkan koloni yang khas dalam penampilan. Beberapa koloni mungkin akan berwarna, ada yang berbentuk lingkaran, sementara yang lain tidak teratur. Karakteristik koloni (bentuk ukuran warna dan lain-lain) yang diistilahkan sebagai “morfologi koloni”. Morfologi koloni merupakan salah satu cara untuk dapat mengidentifikasi bakteri. Morfologi koloni dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu bentuk (*shape*), tepi atau pinggir (*edge*), ketinggian (*elevation*), ukuran (*size*), permukaan (*surface*), kekentalan atau kepadatan (*consistency*), bau (*odor*), transparansi (*opacity*) dan pigmentasi (*chromogenesis*) (Nadyah, 2011).

3. Habitat Bakteri

Bakteri tersebar luas di alam, di dalam tanah, di atmosfer, di dalam endapan endapan lumpur, di dalam lumpur laut, dalam air, pada sumber air panas, di daerah antartika, dalam tubuh manusia, hewan, dan tanaman (Hidayat dkk, 2006).

4. Struktur Bakteri

Menurut (Nadyah, 2011). Bakteri memiliki 2 pembagian struktur yaitu:

- a. Struktur dasar (dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri). Meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom dan DNA.
- b. Struktur tambahan (dimiliki oleh jenis bakteri tertentu) meliputi kapsul, flagellum, pilus dan fimbria, klorosom, vakuola gas dan endospora.

5. Sifat Bakteri

Pada bakteri ada yang bersifat hidup bebas, hidup sebagai saproba, hidup sebagai parasit dan ada pula yang hidup sebagai patogen (Aminah, 2009).

6. Pengaruh Lingkungan Terhadap Bakteri

Menurut (Nadyah, 2011) kondisi lingkungan yang mendukung dapat memacu pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan reproduksi bakteri adalah suhu, kelembaban dan cahaya.


- a. Suhu, berdasarkan kisaran suhu aktivitasnya bakteri dibagi menjadi 3 golongan:
 1. Bakteri Psikrofil, merupakan bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0°C – 30°C , dengan suhu optimum 15°C .
 2. Bakteri Mesofil, merupakan bakteri yang dapat hidup di daerah suhu antara 15°C – 55°C dengan suhu optimum 25°C – 40°C .
 3. Bakteri Termofil, merupakan bakteri yang dapat hidup di daerah suhu tinggi antara 40°C – 75°C dengan suhu optimum 50 – 65°C . Namun pada tahun 1967 ditemukan bakteri yang hidup dalam sumber air panas bersuhu 93°C sampai 500°C .
- b. Kelembaban, pada umumnya bakteri memerlukan kelembaban yang cukup tinggi, kira-kira 85%. Pengurangan kadar air dari protoplasma menyebabkan kegiatan metabolisme terhenti. Misalnya pada proses pembekuan dan pengeringan.
- c. Cahaya, sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Umumnya cahaya merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Sinar ultraviolet

dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian. Pengaruh cahaya terhadap bakteri dapat digunakan sebagai dasar sterilisasi atau pengawetan bahan makanan.

7. Fase Pertumbuhan Pada Bakteri

Menurut (Nadyah, 2011) pada pertumbuhan bakteri terdiri atas beberapa fase yaitu :

- Fase lag (lambat), merupakan fase dimana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertmbah sedikit demi sedikit.
- Fase logaritmik (eksponensial), merupakan fase dimana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat. Jika ingin mengadakan piaraan yang cepat tumbuh, maka bakteri pada fase ini baik sekali untuk dijadikan inokulum.
- Fase stasioner, merupakan fase dimana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian.
- Fase autolisis (kematian), adalah fase dimana jumlah bakteri yang mati semakin



Gambar 2.2 kurva pertumbuhan bakteri (www. Google. <http://gambar.kurva.pertumbuhan.bakteri>, 11 Januari 2017).

8. Reproduksi Bakteri

Reproduksi bakteri merupakan perkembangbiakan pada bakteri. Bakteri melakukan pembiakan dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Pembiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, sedangkan pembiakan secara seksual dilakukan dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Namun proses pembiakan secara seksual berbeda eukariota lainnya. Sebab, dalam proses pembiakan tersebut tidak ada penyatuan inti sel sebagaimana biasanya pada eukarion, yang terjadi hanya pertukaran materi genetika (rekombinasi genetik) (Nadyah, 2011).

9. Metabolisme Bakteri

Bakteri memiliki energi dan material mentah membutuhkannya untuk proses metabolisme dan reproduksi melalui media reaksi kimia. Alam menyediakan sejumlah besar reaksi tersebut, dan zat-zat bakteri telah menggunakannya. Konsekuensinya, bakteri terlibat dalam proses biogeokimia dalam air dan tanah. Partisipasi bakteri sangat esensial, dalam banyak siklus elemen penting di alam, termasuk elemen nitrogen, karbon dan sulfur. Zat-zat ini mengakibatkan formasi dari banyak deposit mineral termasuk besi dan mangan. Pada skala yang lebih kecil,

beberapa deposit terbentuk melalui aksi bakteri pada sistem air alam dan pipa. Metabolisme bakteri berhubungan dengan proses-proses biokimia melalui modifikasi zat-zat dalam sel-sel bakteri. Hal tersebut merupakan suatu cara untuk memperoleh energi dan material sel dari substansi nutrien.

F. Kemampuan Bakteri Mengakumulasi Logam Berat Timbal

Mikroorganisme sangat berperang dalam proses degradasi bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke air lingkungan, baik sungai, danau maupun laut. Jika bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak berarti mikroorganisme akan ikut berkembang biak. Pada perkembangbiakan mikroorganisme ini tidak menutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut berkembang pula (Aminah, 2009).

Bioremediasi didefinisikan sebagai penggunaan organisme hidup, terutama mikroorganisme, untuk mendegradasi pencemaran lingkungan yang merugikan ke tingkat atau bentuk yang lebih aman proses bioremediasi ini dapat dilakukan dengan cara bioaugmentasi yaitu penambahan atau introduksi satu jenis atau lebih mikroorganisme baik yang alami maupun yang sudah mengalami perbaikan sifat, dan biostimulasi yaitu suatu proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme atau menstimulasi kondisi lingkungan sedemikian rupa (misalnya pemberian aerasi) agar mikroorganisme tumbuh dan beraktivitas dengan baik. Dalam proses degradasinya, mikroba menggunakan

senyawa kimia tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi (Aminah, 2009).

Pengikatan logam berat oleh bakteri dapat dipisahkan menjadi fase pengikatan dan transpor aktif. Fase pengikatan tergantung pada metabolisme sel yaitu absorpsi melalui dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transpor aktif yang tergantung pada metabolisme sel. Pada proses metabolisme, logam berat dapat terakumulasi pada membran sel (*ekstraseluler*) dan pada sitoplasma (*intrasel*) (Aminah, 2009).

Akumulasi ekstraseluler dapat terjadi karena pengikatan ion-ion logam oleh polimer ekstraseluler atau polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan sel sel mikroba dan komplikasi antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan sisi reaktif pada permukaan sel yang bermuatan negatif. Sedangkan akumulasi intraseluler dapat terjadi karena proses difusi yang tidak membutuhkan aktifitas mikroba secara langsung dimana gen-gen yang mengendalikan plasmid dalam proses metabolisme tersebut. Cara lain adalah reverse osmosis, elektrodialisis, ultrafiltrasi dan resin penukar ion. Reverse osmosis merupakan proses pemisahan logam berat oleh membran semipermeabel dengan menggunakan perbedaan tekanan luar dengan tekanan osmotik dari limbah, kerugian sistem ini adalah biaya yang mahal sehingga sulit terjangkau oleh industri di Indonesia. Teknik elektrodialisis menggunakan membran ion selektif permeabel berdasarkan perbedaan potensial antara 2 elektroda yang menyebabkan perpindahan kation dan anion, juga menimbulkan kerugian yakni terbentuknya senyawa logam-hidroksi yang menutupi membran, sedangkan melalui

ultrafiltrasi yaitu penyaringan dengan tekanan tinggi melalui membran berpori, juga merugikan karena menimbulkan banyak lumpur (*Sludge*). Resin penukaran ion berprinsip pada gaya elektrostatis di mana ion yang terdapat (Aminah, 2009).

G. Ciri-Ciri Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal

Salah satu ciri khas bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) yaitu dari genera *Bacillus*, merupakan bakteri berbentuk batang, gram positif dan dapat membentuk endospora. Anggota spesies dari genera *Bacillus* menunjukkan kemampuan fisiologis yang luas sehingga dapat hidup di berbagai lingkungan termasuk lingkungan yang ekstrim seperti habitat yang tercemar logam berat timbal (Pb). Kemampuan fisiologis bakteri mengatasi tekanan lingkungan yang tercemar logam Pb tergantung pada metabolisme selnya, dapat melalui adsorpsi pada dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transport aktif yang tergantung pada metabolisme sel. Resistensi dan adaptasi bakteri terhadap logam berat tergantung spesies dan konsentrasi logam berat yang terpapar di sekitar bakteri tersebut (Prasetya dkk, 2012).

Bakteri dapat tumbuh pada lingkungan yang tercemar logam berat dan seringkali resisten terhadap ion Pb. Bakteri yang tumbuh dapat diisolasi, diidentifikasi dan dimanfaatkan dalam proses bioserben atau pengikatan logam berat dari berbagai limbah industri agar tidak membahayakan. Logam berat dapat terakumulasi di dalam beberapa jenis bakteri antara lain adalah *Thiobacillus thermophilica*, *Thermothrix thioparus*, *Sulfolobus acidocaldorus*, *Pseudomonas*

fluorescens, *Pseudomonas putidada*, *Bacillus subtilis*. Pemanfaatan bakteri untuk bioremoval logam berat, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh ZEROUAL, *et al.*, dalam (Widiyanti, 2011). Ialah bakteri dari genus *Pseudomonas*, *Leptotrix*, *Klebsiella*, *Citrobacter* dan *Bacillus* (Badjoeri, 2008).

H. Identifikasi Molekuler Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal

DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) merupakan sejenis asam amino nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik, yaitu DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme. DNA merupakan polimer yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu gugus fosfat, gula deoxyribosa dan basa nitrogen. Sebuah unit monomer DNA yang terdiri dari ketiga komponen tersebut dinamakan nukleotida, sehingga DNA tergolong sebagai polinukleotida. Rantai DNA memiliki lebar 22-24 Å, sementara panjang satu unit nukleotida 33 Å. Walaupun unit monomer ini sangatlah kecil, DNA dapat memiliki jutaan nukleotida yang terangkai seperti rantai. Struktur untai komplementer DNA menunjukkan pasangan basa (adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin) yang membentuk DNA beruntai ganda. Rangka utama untai DNA terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang seling. Gula pada DNA adalah gula pentose (berkarbon lima) yaitu 2-deoksiribosa. Dua gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester

antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya (Mustami, 2013).

Identifikasi mikroorganisme melalui metode molekuler teknik PCR (*Polymerase Chain Reaction*) karena prosesnya lebih cepat, efisien dan hasilnya lebih akurat untuk menentukan spesies suatu mikroorganisme. Dalam proses identifikasi molekuler mikroorganisme, ada 3 proses utama yang paling dasar yaitu ekstraksi DNA, amplifikasi, elektroforesis serta tahap yang paling penting yaitu sekuensing.

a. Ekstraksi

Pada tahap ekstraksi terjadi pemisahan benang-benang DNA dengan komponen sel yang lain. Isolasi atau ekstraksi DNA diperoleh dengan cara merusak atau memecahkan dinding sel sehingga DNA akan keluar dari sel. Pada metode boiling, pemanasan tinggi selama beberapa menit akan menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding sel yang berakibat pada masuknya cairan dan materi lain di sekitar sel dan keluarnya materi-materi dari dalam sel. Suhu tinggi juga bermanfaat untuk inaktivasi enzim, terutama DN-ase yang dapat merusak DNA. Suhu yang digunakan dan lamanya pemanasan tergantung pada sampel yang digunakan.

Proses ekstraksi DNA yang dilakukan mengacu pada pedoman intruksi manual oleh geneaid menggunakan presto TM mini gDNA Bacteria Kit. Dalam proses ini ada beberapa proses penting dalam ekstraksi yaitu preparasi sampel (*sample preparation*), lisis sel (*cell lysis*), pengikatan DNA (*DNA binding*), pencucian (*wash*) dan elusi (*elution*).

Kit Komersial Presto™ Mini gDNA Bacteria Kit menggunakan prinsip mini column atau filtrasi DNA. Pertama dinding sel dihancurkan, untuk bakteri gram positif menggunakan gram (+) buffer yang telah ditambahkan lysozyme sedangkan untuk bakteri gram negatif menggunakan gram (-) buffer dan proteinase K. sel dilisis menggunakan lysis buffer. DNA diendapkan dengan ethanol absolute, difilter, dan dicuci dengan washing buffer (buffer W1 dan buffer wash). Terakhir DNA dilarutkan dalam elution buffer. Ekstraksi DNA dengan mini column merupakan metode ekstraksi yang paling umum dilakukan karena hasil yang didapatkan sangat baik dalam waktu yang tidak lama dan biaya yang lebih murah.

Bahan yang digunakan dalam ekstraksi DNA bakteri memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gram (+) buffer (*Geneid*) yang telah ditambahkan lysozyme berfungsi khusus untuk menghancurkan dinding sel bakteri gram positif, penambahan buffer bertujuan untuk menjaga keadaan pH tetap stabil sehingga DNA tidak rusak selama pengerjaan. Proteinase K yang berfungsi menghancurkan komponen sel (terutama protein) dan gram (-) buffer (*Geneid*) fungsinya khusus untuk menghancurkan dinding sel bakteri gram negatif. *GB Buffer* (*Geneid*) berfungsi untuk melisis sel bakteri. Etanol absolute digunakan untuk mengendapkan atau pemekatan DNA. *Wash Buffer* digunakan untuk membersihkan DNA dari pengotor lain. Marker DNA yang terdapat pada *Gel Elektrophoresis* berfungsi untuk mengetahui ukuran DNA hasil amplifikasi dan sebagai penanda posisi molekul DNA yang bermigrasi untuk menentukan perkiraan ukuran basanya. Loading dye berfungsi sebagai pemberat agar tidak

keluar dari sumuran (*well*). Etidium Bromida (EtBr) sebagai pewarna DNA. 2x *KAPA2G Fast Ready Mix PCR Kit* merupakan master mix PCR komersial yang didalamnya terkandung *Taq* DNA Polymerase, PCR buffer, $MgCl_2$, dNTP, dan ddH_2O . master mix PCR komersial ini berfungsi sebagai komponen atau campuran DNA template yang akan diamplifikasi menggunakan mesin PCR. Primer Forward berfungsi untuk menginisiasi sintesis untai DNA dari ujung 5'-----3' sedangkan Primer Reverse berfungsi untuk menginisiasi sintesis untai DNA dari ujung 3'-----5'.

b. Polimerase Chain Reaction (PCR)

Polimerase Chain Reaction (PCR) merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi fragmen DNA secara *in vitro* teknik PCR dapat meningkatkan jumlah fragmen DNA hingga mencapai 10^6 - 10^7 kali dalam waktu singkat. Pada setiap n siklus PCR, akan diperoleh sebanyak 2^n kali DNA target. Keberhasilan PCR sangat tergantung pada kemampuannya untuk hanya mengamplifikasi DNA target dan tidak mengamplifikasi DNA non target. Proses PCR untuk memperbanyak DNA terdiri dari serangkaian siklus suhu yang berulang, dimana masing-masing siklus terdiri dari tiga tahap (i) tahap denaturasi DNA cetakan pada suhu 94 - 96 °C, dimana pada tahap ini terjadi pemisahan DNA heliks ganda menjadi 2 untai tunggal DNA. (ii) tahap penempelan (*annealing*) oligonukleotida primer pada suhu 45 - 60 °C, dengan untai tunggal DNA cetakan pada ujung 3'. Primer adalah oligonukleotida untai tunggal yang urutan nukleotidanya dirancang komplementer dengan urutan DNA cetakan pada daerah

ujung 3'. Primer menentukan bagian fragmen DNA yang akan diamplifikasi. (iii) tahap elongasi, yaitu pemanjangan primer menjadi suatu untai DNA baru, yang komplementer terhadap masing-masing DNA cetakan untai tunggal oleh enzim DNA polymerase pada suhu 72 °C. ketiga tahap siklus tersebut diulang sesuai dengan jumlah siklus amplifikasi. Pada siklus pertama dua untai tunggal DNA cetakan akan disalin menjadi 2 DNA untai ganda. Pada siklus kedua, 2 DNA cetakan untai ganda masing masing akan bertindak sebagai cetakan sehingga pada siklus kedua akan dihasilkan 4 DNA untai ganda. Pada siklus berikutnya akan dihasilkan jumlah DNA secara eksponensial, dimana pada siklus ketiga DNA akan disalin menjadi 8 kali, siklus ke 10 menjadi 1.024 kali, siklus 30 menjadi 1.073.741.824 dan seterusnya. Pada akhir siklus, DNA cetakan akan digunakan secara eksponensial sehingga dihasilkan DNA dalam jumlah yang berlipat ganda hanya dalam waktu yang relatif singkat sekitar 3-4 jam (Radji, 2011).

c. Elektroforesis

Elektroforesis merupakan suatu teknik pemisahan molekul seluler berdasarkan atas ukurannya, dengan menggunakan medan listrik yang dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan negatif. Jika molekul bermuatan negatif dilewatkan melalui suatu medium, misalnya gel agarosa, kemudian dialiri arus listrik yang dialirkan pada satu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya,

maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Kecepatan gerak molekul tersebut tergantung pada rasio muatan terhadap massanya, serta tergantung pula pada bentuk molekulnya (Yuwono, 2005)

Teknik elektroforesis dapat untuk analisis DNA, RNA maupun protein. Elektroforesis DNA dilakukan misalnya untuk menganalisis fragmen-fragmen DNA hasil pemotongan dengan enzim restriksi. Fragmen molekul DNA yang telah dipotong-potong dapat ditentukan ukurannya dengan cara membuat gel agarosa, yaitu suatu bahan semi padat berupa polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut. Gel agarosa dibuat dengan melarutkannya dalam suatu buffer. Agar dapat larut dengan baik, pelarutnya dibantu dengan pemanasan, misalnya menggunakan microwave oven. Dalam keadaan panas, gel akan berupa cairan sehingga mudah dituang ke atas suatu lempeng. Sebelum mendingin dan memadat, pada ujung gel tersebut dibuat lubang-lubang dengan menggunakan lembaran tipis yang menyerupai sisir yang ditancapkan pada salah satu ujung gel yang masih cair. Dengan demikian pada waktu gel memadat sisirnya diambil terbentuklah lubang-lubang kecil untuk memasukkan sampel molekul DNA. Gel agarosa yang sudah terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam suatu tangki yang berisi buffer yang sama dengan yang digunakan untuk membuat gel. Buffer dapat dibuat misalnya dengan tris-asetat-EDTA (TAE) atau tris-borat-EDTA (TBE) (Yuwono, 2005).

Setelah DNA dimasukkan ke dalam lubang sampel, arus listrik dialirkan. Kutub yang sejajar dengan lubang sampel DNA berupa kutub negatif, sedangkan kutub yang lainnya positif, oleh karena DNA bermuatan negatif maka molekul

molekul DNA akan bergerak ke arah positif. Setelah beberapa waktu gel kemudian direndam dalam larutan yang mengandung etidium bromida. Etidium bromida akan menyisip ke dalam DNA. Penggunaan etidium bromida dimaksudkan untuk membantu visualisasi karena etidium bromida akan memancarkan sinar ultraviolet. Jika gel disinari dengan ultraviolet dari bawah, maka akan tampak citra berupa pita-pita pada gel. Pita-pita tersebut merupakan molekul-molekul DNA yang bergerak sepanjang gel setelah dielektroforesis. Molekul RNA dapat dianalisis dengan prinsip yang sama, yaitu menggunakan gel agarosa, namun dengan menggunakan buffer yang berbeda yaitu yang mengandung formaldehid (Yuwono, 2005).

d. Sekuensing DNA

Teknik sekuensing DNA (*DNA Sequencing*) adalah cara untuk menentukan urutan basa-basa nukleotida suatu fragmen DNA. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang sangat penting dalam bidang biologi molekular, yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan urutan basa nukleotida suatu gen ataupun sekuen genom total suatu sel atau organisme. Teknik pengurutan basa DNA terdiri dari dua macam cara yang dikembangkan hampir secara bersamaan yaitu cara degradasi kimiawi oleh A. Maxam dan W. Gilbert di Amerika dan cara terminasi rantai oleh F. Sanger dan A.R. Coulson di Inggris (Radji, 2011).

1. Cara degradasi kimiawi

Molekul DNA dipotong terlebih dahulu secara parsial dengan piperidin. Pengaturan lama inkubasi atau konsentrasi piperidin yang digunakan dapat menghasilkan potongan fragmen DNA dalam berbagai ukuran. Selanjutnya basa

DNA dimodifikasi sedemikian rupa, dengan menggunakan senyawa kimia tertentu. Dimetilsulfat digunakan untuk metilasi basa G, asam format untuk menghidrolisis basa A dan G sedangkan hidrazin digunakan untuk menghidrolisis basa C dan T. akan tetapi dengan penambahan larutan 1,5 M NaCl, hidrazin hanya dapat bereaksi dengan baik untuk memecah sitosin (C). dengan demikian akan dihasilkan empat jenis fragmen DNA yang memiliki ukuran berbeda dengan masing-masing memiliki ujung G, ujung C, ujung A dan ujung T. Fragmen-fragmen DNA yang dihasilkan dielektroforesis dengan gel poliakrilamida. Berdasarkan pola migrasi pada gel elektroforesis dapat ditentukan urutan basa DNA dari molekul DNA yang akan ditentukan urutan basa-basanya (Radji, 2011).

2. Cara terminasi rantai

Teknik Sangar-Coulson pada dasarnya memanfaatkan sifat enzim DNA polymerase yaitu fragmen klenow, yang memiliki kemampuan mensintesis DNA dengan adanya dNTP, dan ketidakmampuannya untuk membedakan deoksinukleotida trifosfat (dNTP), dengan dideoksinukleotida trifosfat (ddNTP). Molekul dNTP, tidak memiliki gugus hidroksil (OH), pada atom C nomor 2 pada cincin gula pentosa, sedangkan molekul ddNTP, tidak memiliki 2 gugus OH pada posisi atom C nomor 2 dan nomor 3 pada cincin gula pentosa (Radji, 2011).

Teknik sekuensing DNA menggunakan teknik dideoksinukleotida dilakukan pada 4 tabung reaksi yang berbeda, dimana pada setiap tabung reaksi

berisi campuran reagen yang terdiri dari cetakan DNA untai tunggal yang akan disekuens, primer oligonukleutida, DNA polymerase, campuran dNTP dan larutan buffer. DNA cetakan yang akan disekuens adalah DNA untai tunggal sehingga biasanya diklon terlebih dahulu dalam vector M13. Sedangkan molekul ddNTP yang dilabel dengan senyawa radioaktif atau non radioaktif, hanya ditambahkan pada campuran reaksi yang sesuai yaitu, untuk tabung A hanya ditambahkan ddATP, untuk tabung C hanya ditambahkan ddCTP, untuk tabung G hanya ditambahkan ddGTP sedangkan untuk tabung T hanya ditambahkan ddTTP. Pada proses pemanjangan untai DNA, selain menggunakan dNTP, secara acak juga menggunakan ddNTP, maka jika ddNTP terikat, polimerisasi lebih lanjut basa-basa DNA tidak terjadi atau terhenti, pada ujung molekul DNA yang memiliki ujung ddNTP. Mesin DNA sekuensing otomatis yang dilengkapi dengan perangkat lunak pengolah data menampilkan warna spesifik dari masing-masing keempat basa DNA, yang sekaligus merupakan urutan sekuens DNA (Radji, 2011).

I. *Ayat yang Relevan*

Allah Berfirman dalam QS Al-Nur/24: 45.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥

Terjemahnya:

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah mahakuasa atas segala sesuatu (Kementrian Agama RI, 2010).

Ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya. *Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air* yang memancar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air yang tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka jenis, potensi dan fungsi, *maka sebagian dari mereka* yakni hewan itu *ada yang berjalan di atas perutnya* seperti buaya, ular dan hewan melata lainnya dan sebagian *berjalan dengan dua kaki* seperti manusia, burung, dan sebagian yang lain *berjalan dengan empat kaki* seperti sapi, kambing dan lain-lain, dan ada juga yang berjalan dengan menggunakan lebih dari empat kaki, seperti kalajengking, laba laba dan lain-lain. Memang Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana karena itu *Allah* secara terus menerus *menciptakan apa* dan dengan cara serta bahan *yang dikehendaki Nya*, salah satunya bakteri. Sebagai bukti kekuasaan-Nya *sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*. Betapa penciptaan binatang tidak menunjukkan kekuasaan Allah, sekaligus kehendak-Nya yang mutlak. Dari satu sisi bahan penciptaan-Nya sama yaitu air, tetapi air dijadikan berbeda-beda, lalu dengan perbedaan itu Dia menciptakan makhluk yang memiliki potensi dan fungsi berbeda-beda pula yang sungguh berbeda dengan substansi serta kadar air yang merupakan bahan kejadiannya (Shihab, 2002).

Allah Berfirman dalam QS Al-Ra'd/13: 17.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ١٧

Terjemahnya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (Kementrian Agama RI, 2010).

Yang dimaksud dengan firman-Nya *amma ma yanfa'u an-nasa* atau *adapun yang bermanfaat bagi manusia* adalah *air* bukan buihnya dan logam setelah dibakar dan hilang kotorannya. Ayat ini tidak menyebut air dan logam itu secara langsung tetapi menegaskan manfaatnya. Hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa yang penting bukan air atau logamnya, tetapi manfaat yang harus dihasilkan oleh air dan logam itu. Demikian juga yang *haq*, yang penting bukanlah ide-ide yang benar, yang mengawang awang di angkasa, tetapi yang lebih penting adalah manfaat dan penerapan ide-ide yang benar itu dalam kehidupan duniawi sehingga dapat memberi manfaat. Selanjutnya yang dimaksud *bermanfaat* di sini mencakup aneka manfaat, baik jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kolektif, baik dunia maupun akhirat.

Banyak ulama memahami bahwa ayat di atas menampilkan dua macam perumpamaan, masing-masing untuk kebenaran dan untuk kebatilan. Contoh pertama

bagi kebenaran adalah air yang mengalir dengan sangat deras dan contoh kedua adalah logam dengan kualitasnya yang jernih. Sedang contoh pertama dari kebatilan adalah buih yang dihasilkan oleh derasnya arus air dan contoh kedua adalah logam berat timbal yang keluar akibat pembakaran logam.

Dari berbagai barang tambang yang dihasilkan manusia melalui proses pembakaran seperti emas, perak, tembaga dan timah ada yang dapat dijadikan perhiasan atau peralatan seperti bejana, ada juga yang berupa sampah seperti sampah air yang mengapung di atas permukaan air. Bagian barang tambang yang mengalir itu disebut *khabits* (limbah). Dengan perumpamaan air dan limbahnya serta tambang dan limbahnya itu, Allah menerangkan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran diibaratkan sebagai air dan tambang yang jernih, sedangkan kebatilan diibaratkan sebagai limbah air dan limbah tambang yang tidak mungkin dapat dimanfaatkan dan akan lenyap dan terbuang. Sedangkan air jernih dan tambang jernih yang dapat berguna unuk kepentingan manusia akan bertahan di dalam tanah agar dapat dimanfaatkan. Dengan tamsil yang sangat jelas seperti itulah Allah swt. memperlihatkan kebaikan dan kejahatan kepada manusia (Shihab, 2002).

Allah Berfirman dalam QS Al-Anbiya'/21: 30.

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ ۳۰

Terjemahnya:

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya; dan kami

jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman? (Kementrian Agama RI, 2010).

Firman-Nya: *wa ja'alna min al-ma'i kulla syai'in hayyin* atau *kami jadikan dari air segala sesuatu hidup*, diperselisihkan juga maknanya. Ada yang memahaminya dalam arti segala yang hidup membutuhkan air atau pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air, atau kami jadikan dari air yang terpancar dari *shulbi* (sperma) segala yang hidup yakni dari jenis binatang.


Para pengarang Tafsir al-Muntakhab berkomentar bahwa ayat ini telah dibuktikan kebenarannya melalui penemuan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan. Sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel) misalnya, menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedangkan Biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap intraksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu sendiri. Sedangkan Fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu berarti kematian (Shihab, 2002).



J. Kerangka Pikir

Input

1. Terjadinya pencemaran logam berat timbal (Pb) pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun kota Makassar disebabkan karena buangan limbah domestik dan limbah rumah sakit yang berasal dari daerah sekitar rumah susun.
2. Bakteri dapat mengakumulasi logam timbal melalui fase pengikatan dengan absorpsi melalui dinding sel dan diikuti dengan transport aktif melalui membran sel (ekstraseluler) dan sitoplasma (intraseluler).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan tentang bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun kota Makassar.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2016 selama 2 bulan, pada tempat lokasi penelitian yaitu daerah kanal sekitar rumah susun kelurahan Mariso kota Makassar dan pengujian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Molekuler dan Seluler Rumah Sakit Pendidikan UNHAS.



Gambar 2.4. Lokasi titik pengambilan sampel: (a) kanal rumah susun (b) kanal belakang RS. Siloam (c) kanal yang berhubungan langsung dengan air laut (www. Google Earth, <http://peta.rumahsusun.com>, 5 November 2015).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi pada penelitian ini yaitu semua endapan sedimen kanal sekitar rumah susun kelurahan Mariso Kota Makassar.

2. Sampel penelitian ini yaitu endapan sedimen pada titik yang berbeda yaitu kanal rumah susun, kanal belakang rumah sakit Siloam dan kanal yang berhubungan langsung dengan air laut dengan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*.

D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb).

E. Definisi Operasional Variabel

Agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda terhadap variabel dalam penelitian ini maka dirumuskan defenisi operasional yaitu :

1. Bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) yaitu bakteri yang mampu mengurangi logam berat timbal (Pb) melalui proses absorpsi, produksi senyawa ekstraseluler atau sintesis enzimatis dari endapan sedimen yang diambil dari tiga titik yaitu kanal rumah susun, kanal belakang rumah sakit Siloam dan kanal yang berhubungan langsung dengan air laut yang berada di kawasan rumah susun kota Makassar. Bakteri tersebut diamati karakteristiknya. Identifikasi bakteri dilakukan berdasarkan uji mikroskopis dengan pewarnaan gram, pewarnaan endospora. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi molekular yang dilakukan di rumah sakit pendidikan Universitas Hasanuddin.

2. Logam berat merupakan unsur atau senyawa dengan berat molekul tinggi yang bersifat toksik pada tumbuhan, hewan dan manusia dalam konsentrasi tertentu.
3. Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah hitam, dalam bahasa ilmiahnya dinamakan *Plumbum*, dan logam ini disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk kedalam kelompok logam golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atau berat atom (BA) 207,2 yang bersifat komulatif, jika terakumulasi dalam tubuh maka dapat bersifat toksik pada makhluk hidup.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode secara sengaja. Metode ini merupakan upaya pengumpulan sampel pada endapan sedimen kanal dari kawasan rumah susun kota Makassar yang mengandung logam berat timbal (Pb).

G. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ekman grab, botol sampel, tabung PCR, UV- Transulaminator, komputer, alat elektroforesis, *Shaker Incubator*, *Autoclaf*, oven, *Vortex*, inkubator, cawan petri, jarum ose, pipet tetes, pipet ukur, corong, kaca preparat, erlenmeyer, *Hot Plate* dan *stirrer*, lampu bunsen, rak tabung, gelas ukur, tabung reaksi, microtube, mikropipet, mikroskop

binokuler, penghitung koloni (*Colony Counter*), *Spektrofotometer Serapan Atom* (SSA), neraca analitik dan botol semprot.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
PbNO₃ steril 250 ppm, asam nitrat (HNO₃), asam peklorat (HClO₄), Glukosa (0,5%) 270 ml, NA (*Nutrient Agar*) 10 g, NB (*Nutrient Broth*) 4 gram, Pewarnaan Gram (*Crystal violet, Lugol, Etil Alkohol Safranin*, dan Aquadest), Alkohol 95%, Minyak imersi (*Imersion Oil*), Malacyte Green, kit, primer forward, primer reverse, agarosa, marker 100 bp dan Aluminium foil.

H. Prosedur Kerja

Pelaksanaan penelitian terdiri dari lima tahap yaitu :

1. Daerah pengambilan sampel terletak di tiga titik yaitu kanal rumah susun, kanal belakang rumah sakit Siloam dan kanal yang berhubungan langsung dengan air laut, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yang diperkirakan mengandung logam berat timbal (Pb). Sedimen diambil dengan *Ekman Bottom Grab* yang dimasukkan ke dalam kolom air hingga mencapai dasar kanal. Selanjutnya *Ekman Bottom Grab* ditarik. Botol steril dimasukkan ke dalam tumpukan sedimen, botol steril dibuka di dalam tumpukan sedimen dan sedimen dimasukkan ke dalam botol steril hingga penuh. Kemudian botol steril ditutup pada posisi masih di dalam sedimen.

2. Menurut (Yuniarti dkk, 2002) isolasi mikroba pengakumulasi logam berat dilakukan dengan cara endapan sedimen yang diambil dari lokasi yang terdiri dari tiga titik masing-masing 10 g disuspensikan dalam larutan glukosa 0,5% 90 ml. Suspensi endapan sedimen diinkunasi di *shaker incubator* selama 2 jam dengan kecepatan 1500 rpm, kemudian diencerkan hingga 10^6 kali. Hasil pengenceran dikocok dengan vortex dan 100 μ l suspensi diinokulasikan pada cawan petri berisi medium NA (*Nutrient Agar*), kemudian diinkubasi kedalam Inkubator dengan suhu 37°C , selama 2 hari. Koloni yang tumbuh diremajakan pada medium agar NA sebanyak dua ulangan, dan diinkubasi kembali seperti kondisi semula. Setelah koloni tumbuh dan berdiameter 2-4 mm bakteri diinokulasikan pada medium NA (*Nutrient Agar*) yang ditambahkan logam berat timbal dengan konsentrasi 250 ppm di permukaan, kemudian biakan diinkubasi kembali pada kondisi yang sama, di ruang gelap selama 2 hari. Sebagai kontrol digunakan media yang tidak mengandung logam berat untuk mengoreksi tidak tampaknya koloni disebabkan oleh tidak tahannya mikroba terhadap logam berat atau koloni tidak terambil.

Pewarnaan gram dilakukan dengan preparat ulas ditetesi larutan Kristal violet sebanyak 2-3 tetes dan didiamkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir. *Gram's Iodine Mordant (Emerck)* ditetaskan sebanyak 2-3 tetes di atas permukaan preparat lalu didiamkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya preparat ditetesi etil alkohol 95% setetes demi setetes sampai kristal violet tercuci. Kemudian dicuci dengan air mengalir kembali. Berikutnya preparat ditetesi safranin selama 45 detik dan dicuci dengan air

mengalir, kemudian dikeringkan dan diamati dengan mikroskop. Pewarnaan endospora dilakukan dengan cara preparat ulas ditempatkan pada rak pewarna. Preparat ulas ditutup penuh dengan kertas saring. Kemudian zat warna hijau malakit diteteskan dengan pipet Pasteur ke permukaan kertas saring secara merata dan selanjutnya dipanaskan selama 5 menit dan didinginkan. Setelah preparat dingin, kertas saring dibuang dan preparat dibilas dengan air yang mengalir dan dikeringanginkan. Kemudian preparat diwarnai dengan safranin selama 1 menit dan dibilas dengan air yang mengalir dan dikeringanginkan. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000x dengan minyak imersi yang diteteskan di luar atas kaca penutup. Selanjutnya Identifikasi molekuler dengan menyiapkan stok bakteri dari seri pengenceran 10^{-1} sampai 10^{-6} dan memilih bakteri yang berbeda dari segi morfologi untuk dilakukan identifikasi molekuler yang diawali dengan ekstraksi DNA pada bakteri.

3. Identifikasi molekuler dilakukan dengan cara :

a. Estraksi DNA

Estraksi DNA bakteri dengan metode Geneid bertujuan untuk memisahkan DNA dari komponen-komponen sel lainnya. Estraksi DNA pada organisme prokariotik dilakukan melalui Sampel Preparasi, Melisiskan sel, *DNA Binding, Wash, Elution*. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Preparation sample (Sampel Preparasi)

Masing – masing sebanyak satu ose sampel bakteri yaitu pada kode isolat A8, B3, B4 dan C2 yang telah dipilih berdasarkan tingkat pertumbuhannya yang paling baik pada media NA (*Nutrient Agar*) yang telah diperkaya $PbNO_3$ sebanyak 0.3996 gr/L dengan konsentrasi sebanyak 250 ppm, dimasukkan ke dalam tabung *microcentrifuge* 1,5 mL steril yang telah berisi 200 μ l PBS (*Phosphate Buffer saline*) yang telah ditambahkan 20 μ l Proteinase K. Menghomogenkan dengan cara pipetting. Kemudian diinkubasi pada suhu 95°C selama 30 menit pada waterbath .

2. Cell lysis (Melisiskan sel)

Menambahkan 200 μ l *gram GSB buffer* lalu divortex dan diinkubasi kembali pada suhu 60°C selama 2 menit.

3. DNA Binding

Menambahkan 200 μ l etanol absolute 96% dan di vortex selama 10 detik. Memindahkan semua campuran tersebut ke dalam GD column (spin column) pada 2 ml *collection tube*, sentrifugasi pada kecepatan 14.000 xg selama 1 menit. Membuang *collection tube* yang berada di bawah *spin column* dan mengganti dengan *collection tube* yang baru.

4. Wash (Pencucian)

Menambahkan 400 μ l *WI buffer* lalu disentrifugasi pada kecepatan 14.000 rpm selama 30 detik, kemudian membuang cairan yang ada *collection tube*. Menambahkan 600 μ l *wash buffer* (Geneid) dan disentrifugasi kembali selama 30 detik, kemudian membuang cairan yang ada *collection tube* dan sentrifugasi

kembali selama 3 menit, dan meletakkan tabung *mikrocentrifuge* steril pada bagian bawah *spin column*.

5. Elution

Menambahkan 100 μl *Elution buffer*, diamkan selama 3 menit kemudian disentrifugasi dengan kecepatan yang sama selama 30 menit. Cairan yang mengandung DNA yang tertampung pada tabung *mikrocentrifuge* disimpan pada suhu -4°C untuk digunakan sebagai template PCR.

b. Ampifikasi PCR (*Polymerase Chain Reaction*)

Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan metode Geneid merupakan suatu proses sintesis enzimatis untuk melipat gandakan sekuens nukleotida tertentu secara *in vitro*. Prosesnya meliputi 3 tahap yaitu *denaturasi*, *annealing*, dan *extension*. Prosedur ini dikerjakan pada sampel DNA yang telah diisolasi, ekstrak DNA dari sample dan aquadest sebagai kontrol negatif “PCR mix” dimasukkan dalam tabung PCR:

Tabel 3.1 Komposisi Primer Mix

Reaksi	μl
Enzim Gotxaq Green Mix	25
Primer Forward 10 μM	1
Primer Reverse 10 μM	1
H ₂ O	18
DNA	5
Total Premix	50

Amplifikasi dilakukan dengan mesin PCR (*DNA Thermal Chycler*) untuk amplifikasi PCR, tahap awal denaturasi pada suhu 95°C selama 15 menit,

selanjutnya 94°C selama 1 menit, annealing pada suhu 55°C selama 30 detik, ekstensi 72°C selama 1 menit sebanyak 35 siklus dilanjutkan dengan ekstensi akhir suhu 72°C selama 5 menit dan 12°C ± 30 menit untuk penyimpanan jenis primer yang digunakan adalah primer universal dengan urutan sequens UI 5' CCAGCAGCCGCGGTAATACG-3' dan U2 5'ATCGG(C/T)TACC TTGTTACGACTTC-3' (Jang-Jih Lu, 2003 *dalam* Asrianti, 2015).

c. Elektroforesis gel agarose

Agarose dibuat dengan melarutkan 1 g agarose (*Bio Rad*) dalam 50 ml 0,5 Tris borate EDTA (100 g Tris base, 27,5 g asam borat, 20 ml 0,5 M EDTA pH 8 dalam 50 ml air). Kemudian memanaskan sampai mendidih dan larut selanjutnya menambahkan 2 µl gel red nucleic acid stain dan dituangkan dalam pencetak gel yang telah dipasang sisir. Setelah agarose memadat (sekitar 30 menit) selanjutnya dimasukkan ke dalam tank elektroforesis yang berisi larutan TBE 0,5%. Memasukkan DNA sampel yang telah dicampur dengan cairan "*loading dye*" ke dalam sumur dengan perbandingan 2:1 dengan cara pippeting, kemudian memasukkan Marker 100bp setelah keseluruhan sampel dimasukkan. Elektroda dihubungkan dengan *Power supply* dengan volt 100 selama 40 menit. Setelah itu *Power supply* dimatikan kemudian mengangkat gel dari dalam alat tersebut. Gel dipindahkan ke dalam UV transiluminator kemudian diamati hasilnya pada komputer.

d. Sekuensing DNA

Pengurutan atau sekuensing DNA hasil PCR dikirim ke 1st BASE sequensing INT di Malaysia untuk pemetaan pasang basa yang berhasil diampifikasi. Data sekuens selanjutnya diedit dengan menggunakan Clustal W dalam program MEGA 5 (Tamura et al., 2011) dan dilakukan perbandingan sekuens yang diperoleh (*Query*) dengan yang telah ada pada GeneBank dengan menggunakan fasilitas BLAST (*Basic Local Aligment Search Tool*) pada database Searches NCBI internet site (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>). Ukuran fragmen hasil ampifikasi PCR ditentukan dengan cara membandingkan antara posisi ukuran penanda DNA (Marker) dengan ukuran fragamen sampel. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya band pada ukuran 996 bp.

4. Uji kemampuan akumulasi logam timbal (Pb)

Setelah didapatkan spesies bakteri dari identifikasi molekuler, bakteri tersebut diuji kemampuan akumulasinya dalam menurunkan jumlah konsentrasi logam timbal dengan cara 1 ose isolat bakteri masing-masing diinokulasikan kedalam medium cair NB (*Nutrient Broth*) yang diperkaya dengan PbNO_3 0.3996 gr/L dengan konsentrasi 250 ppm kedalam erlenmeyer, kemudian dihomogenkan dengan menggunakan vortex mixer selama 5 menit dan diinkubasi kedalam inkubator selama 2 x 24 jam pada suhu 37°C. isolat yang tumbuh pada media tersebut kemudian disentrifugasi kembali dengan menggunakan centrifuge dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit untuk mendapatkan supernatan cairan,

selanjutnya supernatan yang dihasilkan diukur absorbansinya menggunakan SSA

(*Spektrophotometer Serapan Atom*).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Isolasi bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun.

Isolasi bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang terdapat di endapan sedimen perairan kanal sekitar rumah susun, dijadikan sampel untuk mengakumulasi logam berat timbal (Pb) yang ditumbuhkan pada media NA (*Nutrien Agar*). Didapatkan 28 isolat yang tumbuh pada media tersebut pada awal penyebarannya dan dilakukan pemurniaan. Setelah bakteri murni dilanjutkan dengan uji resistensinya yang masih dalam medium padat NA (*Nutrien Agar*) yang diperkaya PbNO_3 sebesar 0.3996 gr/L pada tahapan ini didapatkan 22 isolat bakteri murni yang dapat bertahan pada medium, 6 diantara isolat tersebut tidak dapat bertahan pada media, hal tersebut dikarenakan tidak tahannya bakteri terhadap logam berat timbal. Bakteri yang telah dimurnikan diamati karakteristiknya secara makroskopik meliputi pengamatan morfologi koloni bakteri dengan mengamati bentuk, ukuran, warna, permukaan, tepi dan elevasi pada koloni bakteri. Hasil pengamatan makroskopik koloni bakteri yang berhasil diisolasi dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pengamatan Makroskopik Koloni Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun

No	Kode Isolat	Bentuk Makroskopik Koloni					
		Ukuran	Bentuk	Warna	Permukaan	Margin	Elevasi
1	A2	Moderate (sedang)	Circular	Putih	Halus mengkilap	Entire	Convex
2	A3	Large (besar)	Circular	Putih susu	Kasar	Entire	Convex
3	A4	Moderate (sedang)	Irregular	Putih	Kasar	Undulate	Umbonate
4	A5	Moderate (sedang)	Circular	Putih	Halus mengkilap	Entire	Convex
5	A6	Small (kecil)	Circular	Putih susu	Halus mengkilap	Entire	Convex
6	A7	Large (besar)	Irregular	Putih susu	Halus mengkilap	Undulate	Umbonate
7	A8	Moderate (sedang)	Circular	Putih susu	Kasar	Entire	Convex
8	B1	Moderate (sedang)	Circular	Orange	Halus mengkilap	Entire	Convex
9	B2	Large (besar)	Circular	Orange	Halus mengkilap	Undulate	Umbonate
10	B3	Small (kecil)	Circular	Putih	Halus mengkilap	Entire	Convex
11	B4	Moderate (sedang)	Circular	Orange	Halus mengkilap	Entire	Convex
12	B5	Large (besar)	Rhizoid	Orange	Halus mengkilap	Rhizoid	Convex
13	B6	Large (besar)	Filament	Putih	Halus mengkilap	Filamentous	Convex
14	B7	Large (besar)	Irregular	Putih	Halus mengkilap	Undulate	Umbonate
15	B8	Large (besar)	Irregular	Putih	Kering seperti bubuk	Curled	Umbonate
16	B9	Small (kecil)	Circular	Putih	Halus mengkilap	Entire	Convex

No	Kode Isolat	Bentuk Makroskopik Koloni					
		Ukuran	Bentuk	Warna	Permukaan	Margin	Elevasi
17	B10	Moderate (sedang)	Circular	Putih	Halus mengkilap	Entire	Convex
18	B11	Small (kecil)	Circular	Putih	Halus mengkilap	Entire	Convex
19	C1	Large (besar)	Irregular	Putih	Halus mengkilap	Undulate	Umbonate
20	C2	Small (kecil)	Circular	Putih	Halus mengkilap	Entire	Convex
21	C4	Large (besar)	Irregular	Putih	Halus mengkilap	Undulate	Umbonate
22	C7	Large (besar)	Circular	Putih susu	Halus mengkilap	Entire	Convex

Dari ke 22 isolat tersebut yang didapatkan, dilakukan pengamatan mikroskopis dengan melihat bentuk sel dan pewarnaan untuk uji gram pada bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan uji pewarnaan endospora untuk mengetahui ada tidaknya endospora yang dimiliki pada isolat bakteri tersebut yang berfungsi sebagai pertahanan sel bakteri terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Hasil dari pengamatan mikroskopis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2. Pengamatan mikroskopik sel bakteri pengakumulasi logam berat timbal pada endapan sedimen kanal Sekitar rumah susun

No	Bentuk Mikroskopik Bakteri			
	Kode Bakteri	Bentuk Sel	Sifat Gram	Endospora
1	A2	Monobacil	Positif	Positif
2	A3	Monobacil	Positif	Negatif
3	A4	Monobacil	Positif	Positif
4	A5	Monobacil	Positif	Negatif
5	A6	Streptobacil	Positif	Positif
6	A7	Monobacil	Positif	Negatif

No	Bentuk Mikroskopik Bakteri			
	Kode Bakteri	Bentuk Sel	Sifat Gram	Endospora
7	A8	Monobacil	Negatif	Negatif
8	B1	Monococcus	Negatif	Negatif
9	B2	Monobacil	Negatif	Negatif
10	B3	Monobacil	Negatif	Negatif
11	B4	Diplococcus	Negatif	Negatif
12	B5	Diplobacil	Positif	Negatif
13	B6	Streptobacil	Positif	Negatif
14	B7	Streptobacil	Positif	Positif
15	B8	Diplobacil	Positif	Positif
16	B9	Monobacil	Negatif	Negatif
17	B10	Streptobacil	Positif	Positif
18	B11	Streptobacil	Positif	Positif
19	C1	Monobacil	Positif	Positif
20	C2	Streptobacil	Positif	Positif
21	C4	Streptobacil	Positif	Positif
22	C7	Streptobacil	Positif	Negatif

Dari 22 isolat bakteri tersebut yang telah diuji, dipilih 4 isolat bakteri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling baik pada media NA (*Nutrient Agar*) yang telah diperkaya $PbNO_3$ sebanyak 0.3996 gr/L dengan konsentrasi 250 ppm, yaitu isolat A8, B3, B4 dan C2.

Keempat isolat bakteri tersebut yang diketahui mampu menurunkan kadar timbal selanjutnya diidentifikasi dengan metode molekular menggunakan gen 16S rRNA.

2. Identifikasi molekular bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) pada endapan sedimen kanal rumah susun.

Adapun hasil elektroforesis dari hasil amplifikasi gen 16S-rRNA yang dilakukan dengan menggunakan mesin PCR (*DNA Thermal Cycler*) pada keempat sampel bakteri dari endapan sedimen kanal perairan sekitar rumah susun kota Makassar dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Hasil elektroforesis dari produk amplifikasi gen 16S-rRNA

Selanjutnya hasil dikirim ke PT. Genetika Science Indonesia yang kemudian akan dikirim ke 1st BASE Sequencing INT Malaysia untuk pemetaan pasang basa yang berhasil diamplifikasi. Dari hasil sequencing yang di dapatkan dari Malaysia terdapat isolat bakteri yang memiliki kesamaan yaitu isolat B3 dan B4 yang berasal

dari kanal belakang rumah sakit Siloam, sehingga hanya diambil satu sampel saja yang mewakili titik lokasi penelitian tersebut yaitu sampel isolat B3.

Adapun hasil sequencing dari ketiga isolat sampel tersebut yang diperoleh dari 1st BASE Sequencing INT Malaysia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Isolat A8

```

TTAATGTTCCGATACTGGGCGTAAGCGCGCTAGGTGGTTCAGCAAGTTGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAA
CCTGGGAACGCATCCAAAACACTGAGCTAGAGTACGGTAGAGGGTGGTGAATTTCTGTGTAGCGGTGA
AATGCGTAGATATAGGAAGGAACACCAGAGGCGAAGGCGACCACCTGGACTGATACTGACACTGAGGTGCG
AAAGCGTGGGGAGCAAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAACGATGTGCTAGCCGTTGGG
ATCCTTGAGATCTTAGTGGCGCAGCTAACGCGATAAGTGCACCGCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTAAAA
CTCAAATGAATTGACGGGGGCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCT
TACCTGGCCTTGACATGCTGAGAACTTCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACCTCAGACACAGGTGCTG
CATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGTAACGAGCGCAACCCTTGTCTTAGTT
ACCAGCACCTCGGGTGGGCACTTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAA
GTCATCATGGCCCTTACGGCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGGTACAAAGGGTTGCCAAGCCGCGA
GGTGGAGCTAATCCATAAAAACCGATCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGTCGGAAT
CGTAGTAATCGTGAATCAGAATGTCACGGTGAATACGTTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGGTCACACC
ATGGGGAGTGGGGTTGCTTCCAGAAGTAAGCTAGGTCTAAACCGCCAAGGGGGGACGGTTTACCACCGCAGT
GAATTCATGAACTGGGGGTGGAAGTCCTTATCAAGGTTAACCCCAAA

```

Gambar 4.2. Urutan basa nukleutida isolat A8 hasil sekuensing

Isolat B3

```

GGAATACGGATACTGGGCGTAAGCGTGTGTAGGCGGTTCGGAAGAAAGATGTGAAATCCCAGGGCTCAACC
TTGGAACGCATTTTAACTGCCGAGCTAGAGTATGTCAGAGGGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCAGTGAAA
TGCGTAGATATGTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGATAACTGACGCTCAGACACGAA
AGCGTGGGGAGCAAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTAGCTGTTGGGG
CCGTTAGCCCTTAGTAGCGCAGCTAACGCGTGAAGTTGACCGCTGGGGAGTACGGTGC AAGATTAAAACT
CAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTT
ACCTACCCTTGACATGTCTGAAAAGCCGAAGAGATTTGGCCGTGCTCGCAAGAGAACCAGGAAACACAGGTGC
TGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCTTA
GTTGCTACGCAAGAGCACTTAATGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTC
CTCATGGCCCTTATGGGTAGGGCTTCACAGTACATAAATGGTCCGGACAGAGGGTGC AACC CGCAGG
GGGAGCCAATCTCAGAAAACCGATCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGTCGGAATC
GCTAGTAATCGCGGATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCAT
GGGAGTGGGTTTACCAGAAGTAGGTAGCCTAACCGTAAGGAAGGGCGCTTACCACGGTGGGGATTATGTA
CTGGGGGTGAAGTCGTACAGGGTAGACCCCAAAAAA

```

Gambar 4.3. Urutan basa nukleutida isolat B3 hasil sekuensing

Isolat C2

```

AGGATTACGGATATTGGGCGTAAGCGCGCGCAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAAC
CGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAAATCCATGTGTAGCGGTGA
AATGCGTAGAGATATGGAGGAACACCAAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAAGTACACTGAGGCGCG
AAAGCGTGGGGAGCAAAACAGGATTAGATAACCTGGTAGTCCACGCCGTAACGATGAGTGTAAAGTGTTAG
AGGGTTTCCGCCCTTTAGTGCTGAAGTTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGA
AACTCAAAGGAATTGACGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTAATTCAAGCAACGCGAAGAA
CCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACAACCCTAGAGATAGGGCTTCTCCTTCGGGAGCAGAGTGACAGGTG
GTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTA
GTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTTAAGGTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCA
AATCATCATGCCCTTATGACCTGGGTACACACGTGTACAATGGACGGTACAAAGAGCTGCAAGACCGCG
AGGTGGAGCTAATCTCATAAAACCGTTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCTGGGA
ATCTTAGTAATCGCGGGATCAACATGCCTGCGGTTCAATACGTTTCCCGGGGCCTTGTAACAACCGGCCGG
TCCCACCACGGAGAGTTTGGTAACACCCTAAAATCCGGTGGGGGTAAACCTTTTTGGGAGCCCGCCCGC
CTAAGGGTGGGGAACGAAGGTGATTAGGGGGGAAATCTAAACAAGGGGAAGCCTCAATAAA

```

Gambar 4.4. Urutan basa nukleotida isolat C2 hasil sekuensing

Hasil sekuensing yang diperoleh dari Malaysia selanjutnya dianalisis pada Gen Bank menggunakan analisis BLAST. Analisis BLAST dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil sekuen DNA dari seluruh dunia yang didepositkan pada database Gen Bank. Analisis BLAST dilakukan secara online pada website NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>). Hasil analisis BLAST dari ketiga isolat bakteri tersebut yang terdapat pada endapan sedimen kanal sekitar rumah susun kota Makassar dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

M A K A S S A R

1. Sampel A8

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments Download GenBank Graphics Distance tree of results

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
Pseudomonas aeruginosa PAO1 chromosome, complete genome	1639	6545	98%	0.0	98%	NC_002516.2
Pseudomonas sp. FeS53a scaffold16.1, whole genome shotgun sequence	1611	1611	98%	0.0	97%	NZ_JYFT01000011.1
Pseudomonas resinovorans NBRC 106553 DNA, complete genome	1594	7973	98%	0.0	97%	NC_021499.1
Pseudomonas alcaligenes strain NER 585, complete genome	1578	4734	98%	0.0	96%	NZ_CP014784.1
Pseudomonas mendocina vmp, complete genome	1555	6223	98%	0.0	96%	NC_009439.1
Pseudomonas fulva 12-X, complete genome	1522	6091	98%	0.0	95%	NC_015558.1
Pseudomonas stutzeri strain CGMCC 1.1803, complete genome	1511	6030	98%	0.0	95%	NC_015740.1
Pseudomonas balearica DSM 6083, complete genome	1500	5998	98%	0.0	95%	NC_CP007511.1
Pseudomonas stutzeri DNA contig_00901, whole genome shotgun sequence	1495	1495	98%	0.0	95%	NZ_BBQQ01000010.1
Pseudomonas oryzaehabitans strain USDA-ARS-USMARC-56511, complete genome	1489	7447	98%	0.0	95%	NZ_CP013987.1
Pseudomonas stutzeri strain 28a24, complete genome	1489	5956	98%	0.0	95%	NZ_CP007444.1
Pseudomonas flexibilis strain JCM 14085 PT85_12, whole genome shotgun sequence	1483	1483	98%	0.0	95%	NZ_JTAK01000012.1
Pseudomonas knackmussii B13, complete genome	1483	5935	98%	0.0	95%	NZ_HG322950.1
Pseudomonas denitrificans ATCC 13867, complete genome	1483	7419	98%	0.0	95%	NC_020829.1
Pseudomonas sp. TTU2014-080ASC scaffold_1, whole genome shotgun sequence	1483	1483	97%	0.0	95%	NZ_LKKG01000002.1
Pseudomonas luteola XLDN4-9 contig000229, whole genome shotgun sequence	1472	1472	97%	0.0	95%	NZ_ALAT010000228.1
Azotobacter vinelandii DJ, complete genome	1472	8837	98%	0.0	94%	NC_012560.1

Gambar 4.5. Hasil analisis BLAST isolat A8

2. Sampel B3

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments Download GenBank Graphics Distance tree of results

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
Alcaligenes faecalis strain ZD02, complete genome	1701	5105	97%	0.0	99%	NZ_CP013119.1
Pusillimonas noertemannii BS8 Contig_48, whole genome shotgun sequence	1552	1552	97%	0.0	96%	NZ_AMZF01000048.1
Bordetella sp. N genome	1541	4623	97%	0.0	96%	NZ_CP013111.1
Achromobacter sp. DMS1 scaffold19, whole genome shotgun sequence	1519	3038	97%	0.0	96%	NZ_LHSJ01000019.1
Achromobacter xylosoxidans genome assembly NCTC10807, chromosome_1	1519	4557	97%	0.0	96%	NZ_LN831029.1
Bordetella bronchiseptica 253, complete genome	1519	4557	97%	0.0	96%	NC_019382.1
Bordetella sp. FB-8 genomic scaffold H143DRAFT_scaffold00001.1, whole genome shotgun sequence	1513	4540	97%	0.0	96%	NZ_KB907784.1
Bordetella tremulum strain HQ44680328 genome assembly, chromosome_1	1513	7567	97%	0.0	96%	NZ_LTS46645.1
Bordetella parapertussis Bpp5, complete genome	1509	4529	97%	0.0	96%	NC_018828.1
Bordetella holmesii ATCC 51541, complete genome	1507	4518	97%	0.0	96%	NZ_CP007494.1
Bordetella hinzii strain F582, complete genome	1507	4523	97%	0.0	96%	NZ_CP012078.1
Bordetella petrii strain DSM 12804, complete genome	1502	4507	97%	0.0	95%	NC_010170.1
Bordetella pertussis Tohama I chromosome, complete genome	1502	4507	97%	0.0	95%	NC_002929.2
Pusillimonas sp. TT-7, complete genome	1496	2993	97%	0.0	95%	NC_015458.1
Castellanella defragrans 65Phen, complete genome	1489	2979	97%	0.0	95%	NZ_HG816765.1
Advenella miminardfordensis DPN7, complete genome	1461	2923	97%	0.0	95%	NZ_CP003915.1
Candidatus Kinetoplastibacterium desouzaii TCC079E, complete genome	1435	4307	97%	0.0	94%	NC_020284.1
Candidatus Kinetoplastibacterium oncopeltii TCC290E, complete genome	1424	4274	97%	0.0	94%	NC_020299.1

Gambar 4.6. Hasil analisis BLAST isolat B3

3. Sampel C2

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected: 0

Alignments Download GenBank Graphics Distance tree of results


Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
[Bacillus thuringiensis] serovar konkukian str. 97-27 chromosome, complete genome	1548	21608	97%	0.0	96%	NC_005957.1
Bacillus anthracis str. Sterne chromosome, complete genome	1548	16960	97%	0.0	96%	NC_005945.1
Bacillus anthracis str. Ames chromosome, complete genome	1548	16960	97%	0.0	96%	NC_003997.3
Bacillus thuringiensis YBT-1518, complete genome	1537	23311	97%	0.0	96%	NC_022873.1
Bacillus cereus ATCC 14579 chromosome, complete genome	1537	19987	97%	0.0	96%	NC_004722.1
Bacillus mvcolides strain 11kri323 LG56_064, whole genome shotgun sequence	1520	1520	97%	0.0	95%	NZ_JYCJ01000064.1
Bacillus mvcolides strain ATCC 6462, complete genome	1520	18228	97%	0.0	95%	NZ_CP009692.1
Bacillus manilponensis strain JCM 15802 contig63, whole genome shotgun sequence	1491	1491	97%	0.0	95%	NZ_JOTN01000063.1
Bacillus cytotoxicus NVH 391-98, complete genome	1491	19321	97%	0.0	95%	NC_009674.1
Bacillus marisflavi strain JCM 11544 Contig2, whole genome shotgun sequence	1421	1421	97%	0.0	94%	NZ_LGUE01000011.1
Bacillus sp. FJAT-25509 Contig17, whole genome shotgun sequence	1410	1410	97%	0.0	93%	NZ_LJZ01000029.1
Bacillus coahuilensis m4-4 1855101000135, whole genome shotgun sequence	1410	1410	97%	0.0	93%	NZ_ABFU01000135.1
Bacillus simplex strain SH-B26, complete genome	1400	18211	97%	0.0	93%	NZ_CP011008.1
Bacillus simplex strain SH-B26 plasmid pSHB26, complete sequence	1400	1400	97%	0.0	93%	NZ_CP011009.1
Bacillus vietnamensis WGS project CCDN000000000 data, strain HD-02, contig.00012, whole genome shotgun sequence	1393	1393	97%	0.0	93%	NZ_CCDN010000012.1
Bacillus vietnamensis WGS project CCDN000000000 data, strain HD-02, contig.00011, whole genome shotgun sequence	1393	1393	97%	0.0	93%	NZ_CCDN010000011.1
Bacillus vietnamensis WGS project CCDN000000000 data, strain HD-02, contig.00010, whole genome shotgun sequence	1393	1393	97%	0.0	93%	NZ_CCDN010000010.1
Bacillus vietnamensis WGS project CCDN000000000 data, strain HD-02, contig.00007, whole genome shotgun sequence	1393	1393	97%	0.0	93%	NZ_CCDN010000007.1

Gambar 4.7. Hasil analisis BLAST isolat C2

3. Uji kemampuan akumulasi bakteri terhadap logam timbal (Pb)

Pada tahap ini masing-masing isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis* dan *Bacillus thuringiensis* diuji kemampuannya dalam mengakumulasi logam timbal yang ditumbuhkan pada media NB (*Nutrient Broth*) yang diperkaya $PbNO_3$ 0.3996 gr/L dengan konsentrasi 250 ppm dengan masa inkubasi 2x24 jam. Selanjutnya dicentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit untuk mendapatkan supernatan. Supernatan yang dihasilkan kemudian diukur dengan menggunakan Spektrophotometer Serapan Atom, untuk mengetahui jumlah

akumulasi dari masing-masing bakteri tersebut sehingga diperoleh kurva standar dibawah ini:



Gambar 4.8 Kurva standar akumulasi bakteri terhadap logam timbal

Kurva standar $y = 0.007x + 0.0005$ digunakan untuk mengetahui jumlah akumulasi bakteri terhadap logam timbal. Perhitungan jumlah akumulasi dari ketiga bakteri tersebut terhadap logam timbal dihitung melalui kurva standar, diketahui bahwa ketiga bakteri tersebut mampu menurunkan konsentrasi timbal. Hasil dari penurunannya berdasarkan kurva standar dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jumlah akumulasi bakteri terhadap logam timbal

No	Isolat Bakteri	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan (%)
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	250	8.805	241	96
2	<i>Alcaligenes faecalis</i>	250	3.875	246	98.4
3	<i>Bacillus thuringiensis</i>	250	0.39	249	99.6

B. Pembahasan

1. Isolasi bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) dari endapan

sedimen kanal sekitar rumah susun

Penelitian ini menggunakan endapan sedimen yang terdapat pada tiga titik sampel yang berbeda pada kanal sekitar rumah susun kelurahan Mariso kota Makassar yaitu kanal rumah susun, kanal belakang rumah sakit Siloam dan kanal yang berhubungan langsung dengan air laut, dimana pada masing-masing titik pengambilan endapan sedimen tersebut mengandung logam berat timbal (Pb) berdasarkan uji pendahuluan yang telah dilakukan, dengan jumlah konsentrasi masing-masing logam timbal yaitu 4.460 mg/L, 3.171 mg/L dan 0.388 mg/L, yang telah melewati nilai ambang batas yang ditentukan yaitu 0.03 mg/L. Masing-masing sampel endapan sedimen ini diambil dan diisolasi untuk mengetahui bakteri yang terdapat didalamnya yang mampu mengakumulasi logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi 250 ppm.

Hasil isolasi menunjukkan bahwa terdapat koloni bakteri yang tumbuh pada media agar yang telah diperkaya PbNO_3 0.3996 gr/L dengan konsentrasi 250 ppm pada cawan petri tersebut. Pada titik A yaitu kanal sekitar rumah susun terdapat terdapat 7 koloni yaitu (A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8), pada titik B yaitu kanal belakang rumah sakit Siloam terdapat 11 koloni yaitu (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 dan B11) dan pada titik C yaitu kanal yang berhubungan

langsung dengan air laut terdapat 4 koloni yaitu (C1, C2, C4 dan C7). Pada tahap pengujian ini terdapat 6 cawan petri yang tidak ditumbuhi oleh koloni bakteri yang berasal dari kanal sekitar rumah susun dan kanal yang berhubungan langsung dengan air laut yaitu (A1, C3, C5, C6, C8 dan C9). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak tahannya koloni bakteri terhadap logam berat timbal.

Kemampuan fisiologis bakteri mengatasi tekanan lingkungan yang tercemar logam timbal tergantung pada metabolisme selnya, dapat melalui adsorpsi pada dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transport aktif yang tergantung pada metabolisme sel. Resistensi dan adaptasi bakteri terhadap logam berat tergantung spesies dan konsentrasi logam berat yang terpapar di sekitar bakteri tersebut (Prasetya dkk, 2012).

Kemampuan mikroorganisme untuk mengatasi toksisitas logam berat karena memiliki mekanisme pertahanan yaitu dapat melalui:

1. Presipitasi atau pembentukan kompleks ekstraseluler.
2. Menurunkan permeabilitas logam atau transport logam melewati membran sel.
3. Kompartementalisasi intraseluler antara lain melalui penumpukan dalam vakuola.
4. Detoksifikasi melalui sejumlah reaksi kimia dalam sel.

2. Pengamatan makroskopik koloni dan mikroskopik sel bakteri pengakumulasi logam timbal (Pb)

Penampakan koloni bakteri yang tumbuh dalam media lempeng agar menunjukkan bentuk dan ukuran koloni yang khas, perbedaan koloni yang tumbuh pada media agar dapat dilihat dari bentuk (*shape*), tepi atau pinggir (*edge*), ketinggian (*elevation*), ukuran (*size*), permukaan (*surface*), kekentalan atau kepadatan (*consistency*), bau (*odor*), transparansi (*opacity*) dan pigmentasi (*chromogenesis*) untuk memperoleh karakteristik makroskopik dari koloni bakteri. Tahap penting yang juga harus dilakukan dalam pencirian dan pengidentifikasian bakteri adalah pewarnaan Gram yang merupakan proses pewarnaan diferensial dan pewarnaan endospora.

Hasil yang didapatkan dari 22 isolat koloni bakteri untuk pengamatan makroskopik dapat dilihat pada tabel 4.1 sedangkan hasil yang didapatkan dari pengamatan mikroskopik koloni bakteri dapat dilihat pada tabel 4.2. Dari 22 isolat koloni bakteri yang didapatkan dipilih 4 isolat koloni bakteri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling baik yang mewakili masing-masing titik lokasi penelitian, pada kanal rumah susun dipilih isolat A8 dengan karakteristik yang dimiliki yaitu ukuran koloni sedang, bentuk koloni circular, warna koloni putih susu, permukaan koloni kasar, tepian koloni entire, memiliki elevasi convex. Pada kanal belakang rumah sakit Siloam dipilih isolat B3 dengan karakteristik yang dimiliki yaitu ukuran kecil, bentuk koloni circular, warna koloni putih, permukaan koloni halus mengkilap, tepian koloni entire, memiliki elevasi convex dan isolat B4 dengan karakteristik yang dimiliki yaitu ukuran sedang, bentuk koloni circular, warna koloni orange, permukaan koloni halus mengkilap, tepian koloni entire,

memiliki elevasi convex. Pada kanal yang berhubungan langsung dengan air laut dipilih isolat C2 dengan karakteristik yang dimiliki yaitu ukuran kecil, bentuk koloni circular, permukaan koloni halus mengkilap, tepian koloni entire dan memiliki elevasi yang convex. Pengamatan mikroskopik sel bakteri untuk isolat A8 memiliki bentuk sel basil (batang), bersifat gram negatif (-) dan tidak memiliki endospora. Untuk isolat B3 memiliki bentuk sel basil (batang), bersifat gram negatif (-) dan tidak memiliki endospora. Untuk isolat B4 memiliki bentuk sel diplobacil (berantai dua), bersifat gram negatif (-) dan tidak memiliki endospora. Untuk isolat C2 memiliki bentuk sel streptobacil (batang berantai), bersifat gram positif (+) dan memiliki endospora.

Pewarnaan Gram isolat bakteri pengakumulasi logam timbal (Pb) dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang didapatkan agar dapat di klasifikasikan antara bakteri Gram positif dan Gram negatif (Waluyo, 2008).

Pengecatan gram memisahkan antara bakteri Gram positif dan Gram negatif. Bakteri Gram positif pada pewarnaan Gram berwarna biru keunguan hal ini disebabkan kompleks *crystal violet* yang masuk ke dalam sel bakteri Gram positif tidak dapat tercuci oleh alkohol karena adanya lapisan peptidoglikan yang kokoh pada dinding sel, sedangkan pada bakteri Gram negatif berwarna merah, hal tersebut disebabkan kompleks *crystal violet* pada bakteri Gram negatif dapat tercuci oleh alkohol dan akan merusak lapisan lipopolisakarida sehingga menyebabkan sel bakteri tampak transparan, yang akan berwarna merah setelah diberikan safranin.

Berdasarkan hasil pengecatan Gram yang dilakukan dari 22 isolat bakteri berbeda yang didapatkan terdapat 16 isolat bakteri bersifat Gram positif yaitu isolat (A2, A3, A4, A5, A6, A7, B5, B6, B7, B8, B10, B11, C1, C2, C4 dan C7) dan 6 isolat bakteri bersifat Gram negatif yaitu isolat (A8, B1, B2, B3, B4 dan B9).

Perbedaan warna antara bakteri Gram positif dan bakteri gram negatif disebabkan oleh adanya perbedaan struktur pada dinding selnya. Dinding sel pada bakteri Gram positif banyak mengandung peptidoglukan sedangkan dinding sel pada bakteri Gram positif banyak mengandung lipopolisakarida (Pratiwi, 2008).

Pewarnaan endospora pada isolat bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya endospora yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Pewarnaan endospora merupakan salah satu proses dalam mengidentifikasi jenis mikroba tertentu seperti anggota genus dari *Clostridium*, *Desulfomaculatum* dan *Bacillus*, pada pewarnaan endospora ini digunakan *malachite green* dimana bahan ini berfungsi untuk mewarnai endospora dari bakteri. Endospora adalah bentuk istirahat (laten) dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri (Nadyah, 2011).

Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein dan menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan endospora akan tumbuh mejadi sel bakteri baru.

Berdasarkan hasil pengamatan pewarnaan endospora, dari 22 isolat bakteri yang berbeda didapatkan 10 isolat bakteri yang memiliki endospora yaitu (A2, A4, A6, B7, B8, B10, B11, C1, C2 dan C4), dan 12 isolat bakteri yang tidak memiliki endospora yaitu (A3, A5, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, dan C7).

3. Identifikasi Molekuler Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dari Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun

Dari hasil elektroferesis keempat sampel diketahui terdapat pita yang terseparasi dan sejajar dengan marker 996 bp. Hal ini mengindikasikan bahwa fragmen gen yang teramplifikasi dengan ukuran 996 bp, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses amplifikasi keempat isolat bakteri pengakumulasi logam timbal berhasil dilakukan. Selanjutnya hasil dikirim ke PT. Genetika Science Indonesia yang kemudian akan dikirim ke 1st BASE Sequencing INT Malaysia untuk pemetaan pasang basa yang berhasil diamplifikasi. Dari hasil sequencing yang didapatkan dari Malaysia terdapat isolat bakteri yang memiliki kesamaan yaitu isolat B3 dan B4, yang berasal dari kanal belakang rumah sakit Siloam, sehingga hanya diambil satu sampel saja yang mewakili titik lokasi penelitian tersebut yaitu sampel isolat B3.

Hasil yang diperoleh dari Malaysia selanjutnya dianalisis pada Gen Bank menggunakan analisis BLAST. Analisis BLAST dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil sekuen DNA dari seluruh dunia yang didepositkan pada data base Gen Bank. Analisis hasil BLAST tersebut

memberikan informasi mengenai bakteri apa yang mempunyai kesamaan dengan urutan DNA sampel sehingga dapat digunakan untuk identifikasi bakteri. Analisis BLAST dilakukan secara online pada website National Center For Biotechnology Information (NCBI, 2016): (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>). ciri-ciri sekuens dari Gen Bank yang paling mirip dengan sekuens DNA yang diperoleh yaitu nilai *Max Score* dan *Total Score* sama, *Query Coverage* mendekati 100%, *E-Value* mendekati 0 dan *Identities* mendekati 100%. Dari kelima parameter tersebut, nilai *Query Coverage* yang paling penting karena menunjukkan persentase database yang tertutupi oleh *Query*. Apabila nilai *E-Value* semakin mendekati nol, hasilnya akan lebih terpercaya dan bila nilainya 1 maka tidak boleh digunakan (Narita, 2012).

Informasi dari hasil BLAST tersebut berupa *Max Score* dan *Total Score*, *Query Coverage*, *E-Value* dan *Identities*. *Max Score* dan *Total Score* adalah jumlah keselarasan semua segmen dari urutan database yang cocok dengan urutan nukleotida. Nilai skor menunjukkan keakuratan nilai penjajaran sekuens berupa nukleotida yang tidak diketahui dengan sekuens nukleotida yang terdapat di dalam Gen Bank. Semakin tinggi nilai skor yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat homologi kedua sekuens. *Query coverage* adalah presentasi dari panjang nukleotida yang selaras dengan database yang terdapat pada BLAST. Nilai *E-Value* merupakan nilai dugaan yang memberikan ukuran statistik yang signifikan terhadap kedua sekuens. Nilai *E-Value* yang semakin tinggi menunjukkan tingkat homologi antar sekuens semakin rendah, sedangkan nilai *E-Value* yang semakin


rendah menunjukkan tingkat homologi antar sekuens semakin tinggi. Nilai *E-Value* bernilai 0 (nol) menunjukkan bahwa kedua sekuens tersebut identik. *Identities* adalah nilai tertinggi dari persentasi identitas atau kecocokan antara sekuens *query* dengan sekuens database yang tersejajarkan (Narita, 2012).

Hasil analisis BLAST dari ketiga isolat bakteri pengakumulasi logam timbal menunjukkan bahwa spesies isolat A8 adalah bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dengan nilai maximum score 1639, total score 6545, query coverage 98% dan identitas 98%. Spesies isolat B3 adalah bakteri *Alcaligenes faecalis* dengan nilai maximum score 1701, total score 5105, query coverage 97% dan identitas 99%. Spesies isolat C2 adalah bakteri *Bacillus thuringiensis* dengan nilai maximum score 1548, total score 21608, query coverage 97% dan identitas 96%.

1. *Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas aeruginosa berbentuk batang dengan ukuran sekitar 0,5 sampai 1,0 μm . bakteri ini terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan dan terkadang membentuk rantai yang pendek. *Pseudomonas aeruginosa* adalah bakteri gram negatif aerob obligat, berkapsul, mempunyai flagella monotrik (flagel tunggal pada salah satu kutub) polar sehingga bakteri ini bersifat motil, dan memiliki suhu pertumbuhan 42°C . *Pseudomonas aeruginosa* tidak menghasilkan spora dan tidak dapat memfermentasikan karbohidrat pada uji biokimia. Bakteri ini menghasilkan hasil negatif pada uji methyl red dan Voges proskauer. Bakteri ini secara luas dapat ditemukan di alam contohnya tanah, air, tanaman dan hewan. *Pseudomonas aeruginosa* mampu tumbuh di lingkungan

yang mengandung oli dan bahan bakar minyak lainnya. Beberapa spesies memiliki sifat patogenik bagi manusia dan binatang. *Pseudomonas aeruginosa* adalah patogen oportunistik. Ketika bakteri ini ditumbuhkan pada media yang sesuai, bakteri ini akan menghasilkan pigmen nonfluoresens berwarna kebiruan (pyocyanin). Beberapa strain *Pseudomonas* juga mampu menghasilkan pigmen fluoresen berwarna hijau yaitu pyoverdinin dan pigmen berwarna merah coklat yaitu pyorubin. *Pseudomonas aeruginosa* memproduksi katalase, oksidase dan ammonia dari arginin. Bakteri ini dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. *Pseudomonas aeruginosa* mampu mendegradasi polimer sintetik seperti polistirene, polietilena, polipropilena, dan polimer lainnya. Bakteri ini dapat mendegradasi polimer sintetik di perairan maupun di tanah, dapat mendegradasi metilbenzena, toluena, dan metilmetilbenzena yang merupakan polutan organik. Bakteri ini biasanya digunakan sebagai pelarut untuk enamel dan cat serta dalam produksi obat dan bahan kimia serta dapat memecah toluena bentuk paling sederhana metilbenzena (pengendalian pencemaran).



Gambar 4.9 bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (www. Google. [http:// gambar bakteri *Pseudomonas aeruginosa*](http://gambarbakteri.com/gambar-bakteri-Pseudomonas-aeruginosa), 11 Januari 2017).

Klasifikasi dari bakteri *Pseudomonas aeruginosa* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria
Phylum : Proteobacteria
Class : Gamma proteobacteria
Order : Pseudomondales
Family : Pseudomonadaceae
Genus : Pseudomonas
Spesies : *Pseudomonas aeruginosa* (Schroter, 1872).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiroh (2014) tentang bioremediasi logam berat timbal (Pb) dalam lumpur lapindo menggunakan campuran bakteri *Pseudomonas pseudomallei* dan *Pseudomonas aeruginosa* menunjukkan bahwa bakteri *Pseudomonas pseudomallei* dan *Pseudomonas aeruginosa* mampu menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dari konsentrasi awal sebesar 3.5 ppm menjadi 1.21 ppm dengan persen penurunan sebesar 65%.

2. *Alcaligenes faecalis*

Alcaligenes faecalis merupakan bakteri Gram negatif, bersifat aerobik, dan motil. Jenis bakteri ini dapat ditemukan pada air, tanah dan asosiasi lingkungan dengan manusia serta dapat tumbuh pada suhu 37° C. *Alcaligenes faecalis* termasuk ke dalam Protobacteria, pertama kali ditemukan pada feses namun pada saat ini dapat ditemukan di lingkungan.



Gambar 4.10 bakteri *Alcaligenes faecalis* (www. Google. [http:// gambar bakteri *Alcaligenes faecalis*](http://gambar_bakteri_Alcaligenes_faecalis), 11 Januari 2017).

Klasifikasi dari bakteri *Alcaligenes faecalis* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria
Phylum : Proteobacteria
Class : Beta proteobacteria
Order : Burkholderiales
Family : Alcaligenaceae
Genus : Alcaligenes
Spesies : *Alcaligenes faecalis* (Castellani & Chalmes, 1919).

Penelitian tentang bakteri *Alcaligenes faecalis* dilaporkan diketahui dapat mereduksi logam berat diantaranya logam kromium, timbal dan jenis logam lainnya yang berbahaya terhadap lingkungan dan bersifat toksik bagi makhluk hidup. Sehingga bakteri *Alcaligenes faecalis* dapat digunakan sebagai agen bioremediasi untuk mengurangi jumlah pencemaran logam berat terhadap lingkungan.

Penelitian ini juga didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Shakoori (2010) yang menunjukkan kemampuan bakteri *Alcaligenes faecalis* dalam mereduksi logam tetapi bukan logam timbal melainkan logam kromium (VI) sebesar 97% dari konsentrasi awal 100 µg/ml selama 24 jam pada media lurea bertani.

3. *Bacillus thuringiensis*

Bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) memiliki ukuran lebar 1,0 - 1,2 µm dan panjang 3 - 5 µm dan diameter 5-10 mm. Termasuk bakteri Gram positif, Sel menghasilkan endospora berbentuk oval dengan letak subterminal. Endospora merupakan bentuk dorman bakteri-bakteri tertentu dan bersifat tahan terhadap suhu tinggi, sinar ultraviolet, sinar-X, bahan kimia, dan pengeringan. Selain adanya endospora, *Bacillus thuringiensis* (Bt) memiliki struktur yang disebut Kristal protein protoksin intraseluler. Kristal protein ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt). Kemampuannya membentuk kristal (tubuh paraspora) bersamaan dengan pembentukan spora, yaitu pada waktu sel mengalami sporulasi. Kristal tersebut merupakan kompleks protein yang mengandung toksin (δ -endotoksin) yang terbentuk di dalam sel 2-3 jam setelah akhir fase eksponensial dan baru keluar dari sel pada waktu sel mengalami autolisis setelah sporulasi sempurna. *Bacillus thuringiensis* (Bt) dapat tumbuh pada interval suhu 0 - 50⁰C dan memiliki pertumbuhan optimum pada suhu 40⁰C Selain itu, *Bacillus thuringiensis* (Bt) dapat tumbuh pada kisaran pH 6.4 sampai 7.5 dan mampu tumbuh optimum pada pH 7.0. *Bacillus*

thuringiensis (Bt) dapat tumbuh optimum pada kisaran salinitas 20 - 50 ppt karena bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) merupakan bakteri halotoleran yang dapat mentolerir berbagai tingkat salinitas.

Bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) memiliki ciri koloni bakteri seperti bewarna putih berbentuk bulat, tepian berkerut atau bergelombang, elevasi timbul, dan permukaannya kasar. Bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat diisolasi langsung dari tanah, kotoran, dan bagian tumbuhan.



Gambar 4.11 bakteri *Bacillus thuringiensis* (www. Google. [http:// gambar bakteri Bacillus thuringiensis](http://gambarbakteri.com), 11 Januari 2017).

Klasifikasi dari bakteri *Bacillus thuringiensis* sebagai berikut:

Kingdom : Eubacteria
 Phylum : Firmicutes
 Class : Bacilli
 Order : Bacillales
 Family : Bacillaceae

Genus : *Bacillus*

Spesies : *Bacillus thuringiensis* (Berliner, 1915).

Penelitian ini juga didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Sahin (2005) yang telah mengisolasi bakteri *Bacillus thuringiensis* yang dapat mereduksi ion logam tetapi bukan logam timbal melainkan logam kromium (VI) dengan menggunakan spora Kristal bakteri *Bacillus thuringiensis* pada 250 mg/l dengan jumlah penyerapan 24.1% dan dengan menggunakan sel vegetatif *Bacillus thuringiensis* dengan jumlah penyerapan 18.00%.

4. Uji akumulasi bakteri terhadap logam timbal (Pb)

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa isolat bakteri yang didapatkan dari endapan sedimen perairan kanal sekitar rumah susun menunjukkan dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb). Isolat bakteri A8 yang didapatkan dari kanal rumah susun merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* sangat efektif dalam menurunkan kadar logam berat timbal dengan konsentrasi 250 ppm menjadi 9.128 ppm dengan total reduksi menjadi 240.9 ppm dengan jumlah persentase reduksi yaitu 96%. Isolat bakteri B3 yang didapatkan dari kanal belakang rumah sakit Siloam merupakan bakteri *Alcaligenes faecalis* juga sangat efektif dalam menurunkan kadar timbal dari konsentrasi 250 ppm menjadi 4.057 ppm dengan total reduksi yaitu 246 ppm dengan jumlah persentase reduksi yaitu 98.4% dan isolat bakteri C2 yang didapatkan dari kanal yang berhubungan langsung dengan air laut merupakan bakteri *Bacillus thuringiensis* juga menunjukkan kemampuannya dalam mereduksi logam timbal dari konsentrasi 250 ppm menjadi

0.471 ppm dengan jumlah total reduksi yaitu 249.5 ppm dengan persentase reduksi yaitu 99.8%.

Ketiga isolat bakteri yang didapatkan, isolat bakteri C2 yaitu bakteri *Bacillus thuringiensis* memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mereduksi logam berat timbal dibandingkan kedua isolat bakteri yang lainnya yaitu isolat A8 yang merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan B3 yaitu bakteri *Alcaligenes faecalis*. Total persentase reduksi bakteri *Bacillus thuringiensis* pada konsentrasi 250 ppm yaitu mencapai 99.8%. proses bakteri dalam mereduksi logam timbal dapat melalui kondisi aerobik dan anaerobik. Dalam kondisi aerobik logam direduksi dengan bantuan NADH sebagai donor elektron (Kuadjo dan Zeze *et al.*, 2010 dalam Lewaru 2012), dan pada kondisi anaerobik logam direduksi menggunakan *Cytoplasmicmembrane proteins* yang dimiliki oleh bakteri (Kuadjo dan Zeze *et al.*, dalam Lewaru 2012). Jumlah reduksi yang dihasilkan oleh ketiga isolat bakteri tersebut menunjukkan kemampuan bakteri dalam menurunkan konsentrasi logam timbal.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ciri makroskopik koloni bakteri yang dimiliki dari ke 22 sampel isolat bakteri yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) sangat beranekaragam ada yang memiliki ukuran koloni yang besar, sedang dan kecil. Bentuk koloni yang irregular, circular, rhizoid dan filamentaus. Permukaan koloni yang kasar, halus mengkilap, kering seperti bubuk dan berkerut. Tepi koloni yang undulate, entire, rhizoid, filamentaus dan curled. Elevasi koloni yang umbonate dan convex. Ciri mikroskopik sel bakteri yang dimiliki juga beraneka ragam ada 10 jenis sel bakteri memiliki bentuk Monobacil, 8 jenis sel bakteri memiliki bentuk Streptobacil, 1 jenis sel bakteri memiliki bentuk Monococcus, 1 jenis sel bakteri memiliki bentuk

Diplococcus dan 2 jenis sel bakteri memiliki bentuk Diplobacil. Ada 16 isolat bakteri yang bersifat gram positif dan 6 isolat bakteri yang bersifat gram negatif. Ada 10 isolat bakteri yang memiliki endospora dan 12 isolat bakteri lainnya tidak memiliki endospora.

2. Tiga isolat bakteri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling baik di media logam timbal (Pb) yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam berat timbal yaitu isolat A8, B3 dan C2. Setelah diidentifikasi secara molekular menunjukkan bahwa isolat A8 merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, B3 merupakan bakteri *Alcaligenes faecalis* dan isolat C2 merupakan bakteri *Bacillus thuringiensis*.
3. Dari ketiga isolat bakteri yaitu *Pseudomonas aeruginosa* memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam timbal 96% dengan total akumulasi 241 ppm, *Alcaligenes faecalis* memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam timbal 98.4% dengan total akumulasi 246 ppm dan *Bacillus thuringiensis* memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam timbal 99.6 % dengan total akumulasi 249 ppm.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya isolat bakteri yang telah berhasil diidentifikasi sebagai bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) untuk dikoleksi agar dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang relevan, dan dapat diaplikasikan langsung ke

lingkungan yang tercemar logam berat timbal (Pb) dengan mengeksplorasi kemampuan isolat bakteri tersebut.

2. Dari beberapa isolat bakteri yang telah didapat, selain dari ketiga isolat bakteri tersebut yang sudah diidentifikasi secara molekular yaitu bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis* dan *Bacillus thuringiensis* yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) agar bisa juga diidentifikasi secara molekular isolat bakteri yang lainnya untuk mengetahui beberapa bakteri bakteri yang dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) dari isolat yang didapatkan.
3. Selain dari logam berat timbal (Pb), sebaiknya bakteri yang berhasil didapatkan agar bisa diaplikasikan untuk logam berat lainnya.
4. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan incubator shaker untuk menginkubasi bakteri pada media yang diperkaya logam timbal dan spectrophotometer UVVS untuk mengetahui jumlah kepadatan pertumbuhan sel bakteri.



KEPUSTAKAAN

- Alamsyah, *Hadir. Kinerja Prasarana Dasar Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Mariso Kota Makassar*. 2013.
- Aminah Ummi. “*Isolasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) di Perairan Pelabuhan Paotere Makassar*”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2011.
- Arief Happy. “*Distribusi Kandungan Logam Berat Pb dan Cd Pada Kolom Air dan Sedimen Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu*”. *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 3 no. 3 (September 2012): 176.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2013. *Makassar Dalam Angka 2013*. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Badjoeri Muhammad, Larasati Sekar, Awalina, Syawal M.S, Sugiarti, Zarkasyi Hafidh. “*Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Untuk Agen Bioremoval Logam Berat Merkuri*”. *Prosiding Seminar Nasional Limnologi IV 2008*.
- Darmono. *Lingkungan Hidup dan Pencemar Hubungan dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

- Hidayat Nur, Padaga Masdiana C, Suhartini Sri. *Mikrobiologi Industri*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Wali, 2010.
- Khoiroh, Zaimatul. *Bioremediasi Logam Berat Timbal (Pb) dalam Lumpur Lapindo Menggunakan Campuran Bakteri (Pseudomonas pseudomallei dan Pseudomonas aeruginosa)*. Malang, 2014.
- Kouadjo et al. 2010. "Chromium Tolerance and Reduction Potential Of Staphylococci Species Isolated From a Fly Ash Dumping Site In South Africa. *Journal of Biotechnology* Vol. 10 (19) pp. 15587 – 15594.
- Lewaru, Syafruddin. Riyantini, Indah. Mulyani, Yuniar. *Identifikasi Bakteri Indigenus Logam Berat Cr (VI) dengan Metode Molekuler di Sungai Cikijing Rancaekek Jawa Barat*". *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 3 no.4 (Desember 2012): 82.
- Maula, Alfiatul. *Bioremediasi Logam Kromium pada Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit Menggunakan Isolat Bakteri Indigenus*. Malang: 2005.
- Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 51/MENKLH/2004 *Tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan*. Jakarta
- Mustami, Muh. Khalifah. *Genetika*. Makassar: Alauddin University Press Makassar, 2013.
- Nadyah. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Palar Heryando. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prasetyawati E. Triwahyu. *Bakteri Rhizozfer Sebagai Pereduksi Merkuri dan Agensia Hayati*. : UPN Press, 2009.
- Pratiwi, Tanjung, Sylvia. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Prasetya Yulianto Ade, Kuswytasari Nengah Dwianita, Zulaika Enny. "Adaptasi Genera *Bacillus* pada Media yang Mengandung Logam Timbal". *Scientific Conference Of Enviromental Technology IX-2012* (2012): 2.
- Putra, J.A. *Bioremoval Metode Alternatif Untuk Menanggulangi Pencemaran Logam Berat*, 2005.
- Radji, Maskum. *Rekayasa Genetika*. Jakarta: Sagung Seto, 2011.
- Sahin, Yasemin. 2005 "Biosorption Of Chromium (VI) Ions From Aqueus Solution By The Bacterium *Bacillus thuringiensis*". *Process Biochemistry*. 40: 1895 – 1901.
- Shakoori et al. 2010. "Isolation and characterization of Cr6+ reducing bacteria and their potential use in bioremediation of chromium containing wastewater". *Pakistan J. Zool.* 42 (6): 651-658.
- SNI 06-6989. 8-2004. Air dan Air Limbah-Bagian 8 : Cara Uji Timbal (Pb) dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Nyala. Banteng: BSN, 2004.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tamura, et al. 2011. MEGA 5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance and Maximum Parsimony Methods. *Journal Mol. Biol.* vol.10.1093
- Utami, Ulfa. *Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Wardhana W, Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Widiyanti Atik, Shovitri Maya, Kuswytasari Nengah Dwianita. "Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Resisten Merkuri di Hilir Kali Mas Surabaya". *Scientific Conference Of Enviromental Technology IX-2012* (Mei 2011) 2-6.

Wulandari Sri, Dewi Nila Fitri, Suwando. “*Identifikasi Bakteri Pengikat Timbal (Pb) pada Sedimen di Perairan Sungai Siak*”. *Jurnal Biogenesis*. 1 no 2 (2005):62.

www. Google Earth. <http://peta.rumah.susun> (5 November 2015).

www. Google. <http://Gambar.Bakteri.Alcaligenes.faecalis> (11 Januari 2017).

www. Google. <http://Gambar.Bakteri.Bacillus.thuringiensis> (11 Januari 2017).


www. Google. <http://Gambar.Bakteri.Pseudomonas.aeruginosa> (11 Januari 2017).

Yuniarti, Erny. Susilowati Dwi N. Saraswati Rasti. “*Koleksi, Karakterisasi, dan Preservasi Mikroba Remediasi*”. *Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian* (2002): 99.

Yuwono, Triwibowo. *Biologi Molekular*. Jakarta: Erlangga, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1. Skema Penelitian



IDENTIFIKASI SECARA MOLEKULAR

SPEKIES BAKTERI PENGAKUMULASI
LOGAM BERAT TIMBAL (Pb)

Lampiran 2. Alur Kerja Penelitian



Diinkubasi dengan incubator selama 2 x 24 jam.



**Pembuatan
Media Stok**


Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang paling baik pada media NA + logam timbal (Pb)

**Uji Kemampuan Isolat
Bakteri Terhadap Logam
Timbal**



Uji kemampuan bakteri mengakumulasi logam berat timbal (Pb) pada media NB (*Nutrient Broth*) menggunakan SSA.

**Identifikasi
Molekular**



Lampiran 3. Pewarnaan Gram B



- Memfiksasi isolat
- Menambahkan Gram A (Kristal Violet) 2-3 tetes
- Diamkan selama 1 menit
- Mencuci dengan aquades mengalir lalu keringkan

- Teteskan isolat dengan Gram B (Iodium)
- Diamkan selama 1 menit
- Mencuci dengan aquades mengalir lalu keringkan





Lampiran 4. Pewarnaan Endospora




1. membuat preparat ulas dari isolat bakteri.
2. Memfiksasi isolat.
3. Menetesi Malacyte Green.
4. Meletakkan diatas air mendidih. Membiarkan selama 5 menit.
5. Mengangin-anginkan selama 15 menit, menjaga jangan sampai kering, jika bagian pinggir mulai mengering, menambahkan lagi Malacyte Green.
6. Setelah dingin, membilas objek gelas dengan aquadest mengalir.



1. Menetesi dengan safranin sebagai counter strain.
2. Mendinginkan selama 45 detik.

3. Mencuci dengan aquadest mengalir, kemudian dikeringkan.




Hasil pengecatan endospora dilihat dengan menggunakan mikroskop.

Lampiran 5. Alur kerja identifikasi molekular bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb).


Isolat Bakteri Terpilih


Ekstraksi DNA




Amplifikasi PCR
(*Polymerase Chain Reaction*)




Lampiran 6. Gambar koloni isolat bakteri yang tumbuh pada media NA (*Nutrient Agar*) yang ditambahkan logam timbal (Pb) dengan konsentrasi 250 ppm.







B9	B10	B11
		
C1	C2	C4
		
C7	Kontrol	


Lampiran 7. Gambar pewarnaan Gram Ke 22 isolat bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) dari endapan sedimen perairan kanal








Lampiran 8. Gambar koloni isolat bakteri yang tidak tumbuh pada media NA (*Nutrient Agar*) yang ditambahkan logam timbal (Pb) dengan konsentrasi 250 ppm.



Lampiran 9. Diagram perbandingan jumlah konsentrasi logam berat timbal pada masing masing titik lokasi penelitian.



Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 11. Alat dan Bahan


1. Alat Penelitian





UNIVERSITAS ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Bahan Penelitian



Lampiran 12. Perbandingan urutan nukleotida

1. Sampel A8

Pseudomonas aeruginosa PAO1 chromosome, complete genome

Sequence ID: [NC_002516.2](#) Length: 6264404 Number of Matches: 4

Range 1: 722644 to 723595 [GenBank](#) [Graphics](#) [▼ Next Match](#) [▲ Previous Match](#)

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
1639 bits(887)	0.0	945/969(98%)	20/969(2%)	Plus/Plus

Features: [rRNA-16S ribosomal RNA](#)

Query	8	TCGG-A-TACTGGGCGT-AAGCGCGCTAGGTGGTTTCAGCAAGTTGGATGTGAAATCCCC	64
Sbjct	722644	TCGGAAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCTAGGTGGTTTCAGCAAGTTGGATGTGAAATCCCC	722703
Query	65	GGGCTCAACCTGGGAACATGCATCCAAAACACTGAGCTAGAGTACGGTAGAGGGTGGTGG	124
Sbjct	722704	GGGCTCAACCTGGGAACATGCATCCAAAACACTGAGCTAGAGTACGGTAGAGGGTGGTGG	722763
Query	125	AATTTCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAGGAAGGAACACCAGAGGCGAAGGCCGA	184
Sbjct	722764	AATTTCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAGGAAGGAACACCAGAGGCGAAGGCCGA	722823
Query	185	CCACCTGGACTGATACTGACACTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAACAGGATTAGATA	244
Sbjct	722824	CCACCTGGACTGATACTGACACTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAACAGGATTAGATA	722883
Query	245	CCCTGGTAGTCCACGCCGTAACCGATGTCGACTAGCCGTTGGGATCCTTGAGATCTTAGT	304
Sbjct	722884	CCCTGGTAGTCCACGCCGTAACCGATGTCGACTAGCCGTTGGGATCCTTGAGATCTTAGT	722943
Query	305	GGCGCAGCTAACCGGATAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACCTCAA	364
Sbjct	722944	GGCGCAGCTAACCGGATAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACCTCAA	723003
Query	365	ATGAATTGACGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAAATTCGAAGCAACGCCGA	424
Sbjct	723004	ATGAATTGACGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAAATTCGAAGCAACGCCGA	723063
Query	425	AGAACCTTACCTGGCCTTGACATGCTGAGAACTTCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGG	484
Sbjct	723064	AGAACCTTACCTGGCCTTGACATGCTGAGAACTTCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGG	723123
Query	485	AACTCAGACACAGGTGCTGCAATGGCTGCTCAGCTCGTGTGAGATGTTGGGTTAAG	544
Sbjct	723124	AACTCAGACACAGGTGCTGCAATGGCTGCTCAGCTCGTGTGAGATGTTGGGTTAAG	723183
Query	545	TCCCGTAACGAGCGCAACCCCTTGTCCCTTAGTTACCAGCACCTCGGGTGGGCACTCTAAGG	604
Sbjct	723184	TCCCGTAACGAGCGCAACCCCTTGTCCCTTAGTTACCAGCACCTCGGGTGGGCACTCTAAGG	723243
Query	605	AGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAGTCAATCATATGGCCCTTAC	664
Sbjct	723244	AGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAGTCAATCATATGGCCCTTAC	723303
Query	665	GGCCAGGGCTACACACGIGCTACAATGGTCGGTACAAGGGTTGCCAAGCCGCGAGGTGG	724
Sbjct	723304	GGCCAGGGCTACACACGIGCTACAATGGTCGGTACAAGGGTTGCCAAGCCGCGAGGTGG	723363
Query	725	AGCTAATCCATAAAAACCGATCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAG	784
Sbjct	723364	AGCTAATCCATAAAAACCGATCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAG	723423
Query	785	TCGGAATCGCTAGTAATCGTGAATCAGAATGTCACGGTGAATACGTTTCCCGGGCCTTGT	844
Sbjct	723424	TCGGAATCGCTAGTAATCGTGAATCAGAATGTCACGGTGAATACG-ITCCCGGGCCTTGT	723482
Query	845	ACACACCGCCCGGTACACACCATGGGGAGTGGGGTTGCTTCCAGAAGTAAGCTAGGICTAA	904
Sbjct	723483	ACACACCGCCC-GTCACACCATGGG-AGTGGG-TTGCT-CCAGAAGTA-GCTAG-ICTAA	723536
Query	905	ACCGCCAAGGGGGGACGGTTTACCACCGCAGTGAATTCATGAACTGGGGTGGGAAGTCCT	964
Sbjct	723537	-CCGC-AAGGGGG-ACGGTT-ACCACGG-AGTGA-TTCATGA-CTGGGG-TG-AAGTCGT	723587
Query	965	TATCAAGGT 973	
Sbjct	723588	AA-CAAGGT 723595	

2. Sampel B3

Alcaligenes faecalis strain ZD02, complete genome

Sequence ID: [NZ_CP013119.1](#) Length: 4233756 Number of Matches: 3Range 1: 1062324 to 1063265 [GenBank](#) [Graphics](#) ▼ Next Match ▲ Previous Match

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
1701 bits(921)	0.0	938/945(99%)	6/945(0%)	Plus/Minus
Query 11	TACTGGGCGT-AAGCGTGTGTAGGCGGTTTCGGAA-GAAAGATGTGAAATCCCAGGGCTCA	68		
Sbjct 1063265	TACTGGGCGTAAAGCGTGTGTAGGCGGTTTCGGAAAGAAAGATGTGAAATCCCAGGGCTCA	1063206		
Query 69	ACCTTGGAACTGCATTTTAACTGCCGAGCTAGAGTATGTCAGAGGGGGGTAGAATTCCA	128		
Sbjct 1063205	ACCTTGGAACTGCATTTTAACTGCCGAGCTAGAGTATGTCAGAGGGGGGTAGAATTCCA	1063146		
Query 129	CGTGTAGCAGTGAATGCGTAGATATGTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTG	188		
Sbjct 1063145	CGTGTAGCAGTGAATGCGTAGATATGTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTG	1063086		
Query 189	GGATAAATACTGACGCTCAGACACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCCTGGT	248		
Sbjct 1063085	GGATAAATACTGACGCTCAGACACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCCTGGT	1063026		
Query 249	AGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTAGCTGTTGGGGCCGTTAGGCCTTAGTAGCGCAGC	308		
Sbjct 1063025	AGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTAGCTGTTGGGGCCGTTAGGCCTTAGTAGCGCAGC	1062966		
Query 309	TAACGCGTGAAGTTGACCGCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAACAACTCAAAGGAATTG	368		
Sbjct 1062965	TAACGCGTGAAGTTGACCGCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAACAACTCAAAGGAATTG	1062906		
Query 369	ACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTT	428		
Sbjct 1062905	ACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTT	1062846		
Query 429	ACCTACCCCTTGACATGCTCGAAAGCCGAAGAGATTTGGCCGTGCTCGCAAGAGAACCCGG	488		
Sbjct 1062845	ACCTACCCCTTGACATGCTCGAAAGCCGAAGAGATTTGGCCGTGCTCGCAAGAGAACCCGG	1062786		
Query 489	AACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGC	548		
Sbjct 1062785	AACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGC	1062726		
Query 549	AACGAGCGCAACCCTTGTCAATTAGTTGCTACGCAAGAGCACTCTAATGAGACTGCCGGTG	608		
Sbjct 1062725	AACGAGCGCAACCCTTGTCAATTAGTTGCTACGCAAGAGCACTCTAATGAGACTGCCGGTG	1062666		
Query 609	ACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAGTCAAGTCTCATGGCCCTTATGGGTAGGGCTTC	668		
Sbjct 1062665	ACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAGTCAAGTCTCATGGCCCTTATGGGTAGGGCTTC	1062606		
Query 669	ACACGTCATACAATGGTCGGGACAGAGGGTCGCCAACCCGCGAGGGGGAGCCAAICTCAG	728		
Sbjct 1062605	ACACGTCATACAATGGTCGGGACAGAGGGTCGCCAACCCGCGAGGGGGAGCCAAICTCAG	1062546		
Query 729	AAACCCGATCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGTCGGAATCGCTA	788		
Sbjct 1062545	AAACCCGATCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGTCGGAATCGCTA	1062486		
Query 789	GTAATCGCGGATCAGAAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCCCGCT	848		
Sbjct 1062485	GTAATCGCGGATCAGAAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCCCGCT	1062426		
Query 849	CACACCATGGGAGTGGGTTTACCAGAAGTAGGTAGCCTAACCGTAAGGAAGGGCGCTTA	908		
Sbjct 1062425	CACACCATGGGAGTGGGTTTACCAGAAGTAGGTAGCCTAACCGTAAGGAAGGGCGCTTA	1062367		
Query 909	CCACGGTGGGGATTCACTGACTGGGGTGAAGTCGTA-CAGGGTAG 952			
Sbjct 1062366	CCACGGTGGG-AITCATGACTGGGG-TGAAGTCGTAACAGGTAG 1062324			

3. Sampel C2

[Bacillus thuringiensis] serovar konkukian str. 97-27 chromosome, complete genome

Sequence ID: [NC_005957.1](#) Length: 5237682 Number of Matches: 14Range 1: 88722 to 89666 [GenBank](#) [Graphics](#) ▼ Next Match ▲ Previous Match

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
1548 bits(838)	0.0	932/972(96%)	28/972(2%)	Plus/Plus

Features: [rRNA-16S ribosomal RNA](#)

Query	12	TATTGGCGT-AAGCGCGCGCAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCACGGCTCA	70
Sbjct	88722	TATTGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCACGGCTCA	88781
Query	71	ACCGTGGAGGGTCATTGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAAITCCA	130
Sbjct	88782	ACCGTGGAGGGTCATTGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAAITCCA	88841
Query	131	TGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGCGACTTTCTG	190
Sbjct	88842	TGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGCGACTTTCTG	88901
Query	191	GTCTGTAAC TGACACTGAGCGCGAAAGCGTGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT	250
Sbjct	88902	GTCTGTAAC TGACACTGAGCGCGAAAGCGTGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT	88961
Query	251	AGTCCACGCCGTAACGATGAGTGTAAAGTGTAGAGGGTTCCGCCCTTAGTGCTGAA	310
Sbjct	88962	AGTCCACGCCGTAACGATGAGTGTAAAGTGTAGAGGGTTCCGCCCTTAGTGCTGAA	89021
Query	311	GTTAACGCATTAAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAAT	370
Sbjct	89022	GTTAACGCATTAAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAAT	89081
Query	371	TGACGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAAATCGAAGCAACCGGAAGAACC	430
Sbjct	89082	TGACGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAAATCGAAGCAACCGGAAGAACC	89141
Query	431	TTACCAGGTCTTGACATCCCTCTGACAACCCTAGAGTAGGGCTTCTCCTTCGGGAGCAGA	490
Sbjct	89142	TTACCAGGTCTTGACATCCCTCTGACAACCCTAGAGTAGGGCTTCTCCTTCGGGAGCAGA	89201
Query	491	GTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTGAGTGTGGGTTAAGTCCCGC	550
Sbjct	89202	GTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTGAGTGTGGGTTAAGTCCCGC	89261
Query	551	AACGAGCGCAACCCCTTGATCTTAGTTGCCATCAITTAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGC	610
Sbjct	89262	AACGAGCGCAACCCCTTGATCTTAGTTGCCATCAITTAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGC	89321
Query	611	CGGTGACAAACCGGAGGAGGTGGGGATGACGTCAAATCAICATGCCCTTATGACCTGG	670
Sbjct	89322	CGGTGACAAACCGGAGGAGGTGGGGATGACGTCAAATCAICATGCCCTTATGACCTGG	89381
Query	671	GCTACACACGTGCTACAATGGACGGTACAAAGAGCTGCAAGACCGGAGGTGGAGCTAAT	730
Sbjct	89382	GCTACACACGTGCTACAATGGACGGTACAAAGAGCTGCAAGACCGGAGGTGGAGCTAAT	89441
Query	731	CTCATAAAACCGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCTGGGAA	790
Sbjct	89442	CTCATAAAACCGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCT-GGAA	89500
Query	791	TCCTAGTAATCGCGGATCAACATGCCGCTTCAATACGTTTCCCGGGCCCTTGATC	850
Sbjct	89501	TCCTAGTAATCGCGG-ATCAGCATGCC-GCGGTG-AATACGTT-CCCGGG-CCTTGATC	89555
Query	851	AACACCGCCCGTCCCACCAGGAGTTTGGTAACACCCCTAAAAATCCGGTGGGGGTAA	910
Sbjct	89556	A-CACCGCCCG-TCACACCAG-AGAGTTTG-TAACACCG-AAG-TC-GGTGGGG-TAA	89607
Query	911	ACCTTTTTTGGGAGCCCGCCCGCTAAGGGTGGGGAACGAAGGTGATTAGGGGGGAAAT	970
Sbjct	89608	-CCTTTTT-GG-AGCCAGCC--GCCTAAGG-TGGG-A-C-A-GATGATT-GGGGTGAAGT	89656
Query	971	TCCTAAACAAGG 982	
Sbjct	89657	-CGTAA-CAAGG 89666	

Lampiran 13. Lokasi titik pengambilan sampel



Lokasi titik pengambilan sampel pertama



Lokasi titik pengambilan sampel kedua



Lokasi Titik Pengambilan Sampel Ketiga



RIWAYAT HIDUP



Mastang lahir di Tanrung 3 Juli 1994 dari pasangan suami istri Hemma dan Cannupe. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN 113 Lebbae pada tahun 2000, kemudian SMPN 1 Ajangale pada tahun 2006 dan SMAN 1 Ajangale pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Negeri di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di berbagai bidang organisasi intra dan ekstra kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HMJ) sebagai pengurus di bidang Ilmu dan Penalaran pada periode 2014-2015. Penulis juga aktif sebagai asisten praktikum di Laboratorium Biologi.

Terakhir penulis membuat skripsi dengan judul “*Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Endapan Sedimen di Perairan Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar*”

Semoga ilmu yang didapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi semua umat, berguna bagi nusa bangsa, dan Agama. Amin...



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R