

**PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM PUTIH (*Pleurotus ostreatus*)
PADA VARIASI MEDIA TANAM SERBUK GERGAJI KAYU
DAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HERLINA
NIM. 60300112066

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina
NIM : 60300112066
Tempat/Tgl. Lahir : Tapango/11 Agustus 1994
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Samata
Judul : “Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Variasi Media Tanam Serbuk Gergaji Kayu dan Tandan Kosong Kelapa Sawit”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 November, 2016
Penyusun

HERLINA
NIM: 60300112066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Variasi Media Tanam Serbuk Gergaji Kayu dan Tandan Kosong Kelapa Sawit”, yang disusun oleh herlina, NIM: 60300112066, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016. Bertepatan dengan 28 Safar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 29 November 2016 M
28 Safar 1438

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Ir. A.Suarda, M. Si.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Cut Muthiadin, S. Si., M. Si.	(.....)
Munaqasyah I	: Hafsan S. Si., M. Pd.	(.....)
Munaqasyah II	: Isna Rasdiana Aziz, S. Si., M. Sc.	(.....)
Munaqasyah III	: Muh. Rusydi Rasyid, S. Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Baiq Farhatul Wahidah, S. Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlailah Mappanganro, S. P., M. P	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof.Dr.H.Arifuddin Ahmad M. Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Herlina**, NIM: 60300112066, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul "Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Variasi Media Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu dan Tandan Kosong Kelapa Sawit", memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 29 November, 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Baiq Farhatul Wahidah, S. Si., M. Si.
NIP.19750222 20912 2 002

Nurlailah Mappanganro, S. P., M. P.
NIP.

KATA PENGANTAR



Tiada kalimat yang pantas terucap, selain kalimat *Alhamdulillah Rabbil alamin*, yang mana atas berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga skripsi yang berjudul “Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Variasi Media Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu dan Tandan Kosong Kelapa Sawit” ini dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.). Shalawat dan salam semoga tetap tecurah kepada Baginda Rasulullah saw yang telah mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan yang dijadikan lampu penerang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Anding dan Ibunda Napisa tersayang yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan keikhlasan, yang tak henti-hentinya melantukan doa terbaik di setiap akhir sujud beliau bagi penulis serta rela mengorbankan segalanya demi tercapainya harapan dari sang anak tercinta yang tidak akan pernah mampu untuk dibalas. Semoga berkah dan rahmat Allah swt selalu menaungi mereka. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M,Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof.Dr.H. Arifuddin,M,Ag. Selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes. Selaku ketua jurusan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Baiq Farhatul Wahidah S.Si., M.Si. dan Ibu Nurlailah Mappanganro S.P. M.P. selaku pembimbing I dan II dalam proses penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan sekaligus sebagai penasehat akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama aktif menjalani proses perkuliahan.
5. Ibu Hafsan S.Si., M.Si. Ibu Isna Rasdiana Aziz S.Si., M.Sc. Bapak Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed. selaku penguji/pembahas I II dan III.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, guna perbaikan ke depannya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, Amin.

Makassar, 29 November, 2016

PERSEMBAHAN

*Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kehadirat Illahi Rabbi
Yang Maha Penolong Lagi Maha Mengabulkan Do'a
Semoga ridha-Nya Selalu Menyertai Setiap Jengkal Langkahku
Sehingga Kesuksesan Dan kebahagiaan
Menjadi Akhir Dari Semua Perjuangan Yang Mesti Kutempuh
Atas Nama Cinta
Kupersembahkan Karya ini untuk.....*

1. **Ayahanda Anding** dan **Ibunda Napisa** tercinta yang telah memberi kasih sayang dan dorongan baik secara material maupun spiritual.
2. Kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dalam perjuangan menempuh studi ini.
3. Kakaku Mashuri AR, yang setia mendampingi dan banyak membantuku baik berupa materi maupun dukungan agar tetap semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Saudara seperjuanganku, Fatmawati dan Nurul Iqraini yang telah banyak memberikan masukan dan semangat satu sama lain, serta setia menemani penulis dalam suka dan duka hingga tercapainya harapan bersama.
5. Teman-teman mahasiswa Jurusan Biologi terkhusus kepada keluarga besar **RANFIER (012)** yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah selama kurang lebih 4 tahun bersama.
6. Senior-seniorku yang telah mengajarkanku arti persaudaraan dan solidaritas dalam perjuangan selama 3 tahun lebih bersama teman-temanku hingga sampai sekarang. Beserta adik-adik junior angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang selalu menyemangati dalam setiap aktivitas akademis dan non akademis yang telah membagi canda tawa pelibur lara bersama.
7. Teman-teman KKN di Sidrap, Kabupaten Sidrap, terkhusus kepada POSKO DUA (takim, lulu dan fany) kalian telah memberikan cerita indah, rasa persaudaraan dan pengalaman berharga selama kurang lebih 2 bulan.
8. Adik-adik kosku di perumahan garaganti blok F No 19.(riskha, sukma, fitri, reskia dan lia) yang selalu menyemangatiku dan canda tawanya yang tiada henti-hentinya.

*Almamaterku Tercinta "Kampus Hijau" UIN Alauddin Makassar"
Segenap Civitas Akademika Fakultas SainsTek
Tiada Kata Yang Bisa Terucap Selain Do'a
Semoga Segala Amal Kalian Semua Dibalas Oleh Allah SWT
Amin....*

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v-vi
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-28
A. Ayat yang Relevan	9
B. Tinjauan Jamur Tiram Putih.....	11
C. Media Tanam Dasar Jamur Tiram.....	22
D. Media Tambahan Jamur Tiram	24
E. Tandan Kosong Kelapa Sawit.....	25
F. Kerangka Pikir	27
G. Hipotesis	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29-34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Variabel Penelitian	29
D. Definisi Operasional Variabel.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	30

F. Alat dan Bahan	31
G. Prosedur Kerja.....	32
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35-49
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	40
BAB V PENUTUP	50-51
A. Kesimpulan	50
B. Saran (Implikasi Penelitian).....	51
KEPUSTAKAAN	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55-66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Uji BNT Waktu pemeneuhan miselium (<i>full colony</i>) (HSI)	36
Tabel 4.2 Hasil Uji BNT Lebar tudung (cm) jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)....	38
Tabel 4.3 Hasil Uji BNT Panjang tangkai (cm) jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Waktu awal tumbuh miselium dan waktu pemenuhan miselium (HSI) jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	35
Gambar 4.2. Berat basah (gr) jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	37
Gambar 4.3. Lebar tudung(cm) jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	38
Gambar 4.4. Panjang tangkai (cm) jamur tiram putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	39

ABSTRAK

Nama Penyusun : Herlina
NIM : 60300112066
**Judul Skripsi : Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)
pada Variasi Media Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu dan
Tandan Kosong Kelapa Sawit.**

Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur kayu yang dapat dikonsumsi dan kandungan cukup tinggi karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, Ca, Fe, thiamin, riboflavin. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pertumbuhan dan produktivitas Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) dengan komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit pada media tanam jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu penambahan tandan kosong kelapa sawit yang terdiri dari lima perlakuan yakni tanpa tandan kosong kelapa sawit, 20 gr /*baglog*, 30 gr /*baglog*, 40 gr /*baglog* dan 50 gr /*baglog*. Parameter yang diukur adalah kecepatan tumbuh miselium, kecepatan *full colony*, berat basah, lebar tudung dan panjang tangkai jamur tiram putih.

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik inferensial uji oneway Anova pada taraf kepercayaan α 0.05. selanjutnya dengan menggunakan uji BNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tandan kosong kelapa sawit 50 gr dan serbuk gergaji kayu 750 gr memberikan hasil terbaik terhadap kecepatan tumbuh miselium dan kecepatan *full colony*, dan penambahan tandan kosong kelapa sawit 40 gr dan serbuk gergaji kayu 760 gr memberikan hasil terbaik pada berat basah serta

pemberian tandan kosong kelapa sawit 20 gr dan serbuk gergaji kayu 780 gr memberikan hasil terbaik pada lebar tudung dan panjang tangkai.

Kata kunci: *Pleurotus ostreatus*, Tandan kosong kelapa sawit dan Serbuk gergaji kayu.

ABSTRACT

Compiler Name : Herlina
NIM : 60300112066
Title of Minithesis : The Growth White Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*) on Growing Media Variation Sawdust Wood and Oil Palm Empty Fruit Bunch

Oyster mushroom is one type of fungus that can be consumed and relatively high content of carbohydrates, protein, fat, crude fiber, Ca, Fe, thiamin, riboflavin. The purpose of this study to determine the growth and productivity of White Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*) with the composition of growth media sawdust and oil palm empty.

This study was conducted to determine the effect of sawdust and oil palm empty fruit bunches to the growing media white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*). This research was conducted at the Laboratory of Botany Jurusan Biology, Faculty of Science and Technology UIN Alauddin Makassar.

This type of research is quantitative research. By using a completely randomized design (CRD) of the factors is the addition of oil palm empty fruit bunches consisting of five treatments ie without oil palm empty fruit bunches, 20 gr / baglog, 30 g / baglog, 40 gr / baglog and 50 g / baglog. Parameters measured were the speed of growth of mycelium, colony full speed, wet weight, width and length hood white oyster mushroom stalks.

Data were analyzed by Anova oneway inferential statistical test at level α 0:05. further by using LSD. The results showed that administration of empty fruit bunches of oil palm 50 grams and sawdust 750 grams gives the best results to the speed of growth of mycelium and speed full colony, and the addition of empty fruit bunches of oil palm 40 grams and sawdust 760 gr give hasi best on wet weight as well Award empty oil palm bunches 20 g and 780 g sawdust gives the best results on a wide hood and a long stalk.

Keywords: *Pleurotus ostreatus*, oil palm empty bunches Sawdust and wood.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menciptakan tanaman di bumi ini, sebagian tanaman bisa dijadikan obat dan sebagai tanaman hias, salah satunya adalah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yang merupakan ciptaan Allah yang dapat dimanfaatkan. Begitu pun dengan limbah tandan kosong kelapa sawit yang dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna, yaitu sebagai media jamur tiram yang bermanfaat bagi tanaman. Salah satu surah yang mengajak untuk memanfaatkan tanaman yaitu surah Shad/38: 27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. (Kementerian Agama RI, 2012).

Ayat di atas menyatakan: Dan Kami tidak menciptakan tidak langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya seperti udara, dan tentu tidak juga Kami ciptakan kamu semua dengan batil yakni sia-sia tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, dan karenanya mereka berkata bahwa hidup berakhir di dunia ini; tidak akan ada perhitungan, juga tidak ada

surga dan neraka, maka kecelakaan yang amat besar menimpa orang-orang kafir akibat dugaannya itu karena mereka akan masuk neraka (Sihab, 2002).

Kata *wauw* pada awal ayat di atas dapat anda pahami dalam arti dan, dengan jalan memunculkan dalam benak satu kalimat sebelumnya misalnya: tidak ada yang sia-sia dalam segala ketetapan kami, dan kami tidak menciptakan dan seterusnya (Sihab, 2002).

Kata *bathilan* dapat berarti sia-sia tanpa tujuan, atau dengan permainan. Allah swt. menciptakan langit dan bumi juga segala yang ada di antara keduanya dengan tata aturan yang demikian rapi, indah serta harmonis. Ini menunjukkan Dia tidak bermain-main yakni tidak menciptakannya secara sia-sia tanpa arah dan tujuan yang benar. Kata sia-sia disini berarti segala sesuatu penciptaan langit dan bumi tidak ada sia-sia seperti tandan kosong kelapa sawit yang selama ini para petani menganggap bahwa tandan kosong kelapa sawit adalah limbah, ternyata ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena dapat dijadikan sebagai media jamur tiram (Sihab, 2002).

Seandainya penciptaan alam tanpa tujuan yang *haq*, maka itu berarti apa yang dilakukan oleh Allah swt. menyangkut kehidupan dan kematian mahluk serta penciptaan-Nya, semua dilakukannya tanpa tujuan, tetapi karena itu bukan permainan, bukan juga tanpa tujuan maka pasti yang kuasa itu membedakan antara yang berbuat baik dan buruk lalu memberi ganjaran balasan sesuai amal perbuatan masing-masing (Sihab, 2002).

Di Indonesia, jamur mulai dikenal dan dibudidayakan pada tahun 1950-an. Jamur mulai berkembang pesat sejak di era krisis ekonomi pada tahun 1998. Jamur merupakan salah satu produk holtikultura yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat, salah satunya adalah jamur tiram. Jamur tiram memiliki khasiat kesehatan dan nilai gizi. Protein nabati yang terdapat dalam jamur tiram hampir sebanding dengan protein sayuran, dan memiliki kandungan lemak yang rendah dibandingkan daging sapi. Secara ekonomis, jamur tiram dapat dimanfaatkan menjadi makanan olahan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat (Wignyanto, 2012).

Jamur tiram putih mempunyai khasiat untuk kesehatan adalah menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka pada permukaan tubuh, mencegah penyakit diabetes melitus, penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolestrol darah, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, dan mencegah penyakit tumor atau kanker, kelenjar gondok, influenza, serta memperlancar buang air besar (Kalsum, 2011).

Afina, dkk., (2012) menyatakan jamur tiram mengandung 5,49 % protein, 59 % karbohidrat, 1,56 % serat, 0,17 % lemak. Selain itu, setiap 100 g jamur tiram segar mengandung 8,9 mg kalsium, 1,9 mg besi, 17 mg fosfor, 0,15 mg vitamin B, 0,75 mg vitamin B2, 12,4 mg vitamin C, dan 45,65 kalori mineral.

Jamur dari tahun ke tahun terus menjadi primadona bagi para pecinta sayuran dan vegetarian. Permintaan jamur terus mengalami peningkatan dan pelaku usaha meresponnya dengan secara serius membuka sentra-sentra

pertumbuhan baru khususnya di daerah-daerah pinggiran kota sebagai pusat tujuan akhir pemasaran jamur. Berdasarkan hasil penghitungan capaian produksi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 61,75 % jika dibandingkan tahun 2011 dari 45.854 ton menurun menjadi 17.541 pada tahun 2012. Bila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi tahun 2012 tidak terealisasi, baru tercapai sebesar 26,14 % (Hasimuddin, 2012).

Masalah tentang produktivitas jamur tiram, kita dapat mengambil solusi dengan cara meningkatkan media tanam yang digunakan. Limbah ini bisa berupa limbah industri. Beberapa jenis jamur dapat dibudidayakan dalam berbagai media limbah pertanian, industri dan rumah tangga antara lain *P. ostreatus*, *Volvariella volvaceae*, *Auricularia* sp dan lain-lain. Jenis jamur tiram (*P. osteratus*) mempunyai ketahanan tumbuh yang baik terhadap pengaruh persaingan dengan jamur jenis lain, iklim maupun kemampuan hidup dalam berbagai substrat selulosa sebagai media tumbuh. Jamur kayu merupakan jenis jamur yang dapat ditumbuhkan dalam berbagai media tanam yang tersusun atas lignin dan selulosa seperti jerami, ampas tebu, batang jagung dan daun pisang (Djarajah, 2001).

Budidaya jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), pada awalnya dilakukan dengan menggunakan media yang sederhana. Bahan baku media tanam yang sering digunakan adalah serbuk gergaji, bekatul, tepung jagung dan kapur. Serbuk gergaji kayu memiliki kelebihan antara lain mudah diperoleh dalam bentuk limbah sehingga harganya relatif murah, mudah dicampur dengan bahan-bahan

lain pelengkap nutrisi, serta mudah dibentuk dan dikondisikan. Kemudian karena media tanam serbuk gergaji sering kali dipakai oleh petani jamur dan hasil yang diperoleh tidak terlalu maksimal seperti jumlah tubuh buah yang sedikit maupun pada berat basah tubuh buah yang rendah maka dalam penelitian ini juga mencoba menggunakan tandan kosong kelapa sawit pada media tanam yang dimana tandan kosong kelapa sawit ini diketahui dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan miselium, banyak tubuh buah dan berpengaruh terhadap berat basah tubuh buah (Narmawanti, 2013).

Tandan kosong kelapa sawit merupakan hasil limbah pengolahan buah kelapa sawit yang belum dimanfaatkan dan kebanyakan dibuang. Tandan kosong kelapa sawit mengandung zat yang sama dengan serbuk kayu yaitu selulosa yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih sebagai media tumbuhnya (Sa'id, 1994).

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) adalah salah satu produk sampingan (*by-product*) berupa padatan dari industri pengolahan kelapa sawit. TKKS kaya akan kandungan materi organik dan nutrisi yang baik bagi tanaman. Dari 1 ton TBS (Tandan Buah Segar) akan dihasilkan 20-23 % atau sekitar 200-230 kg TKKS. Pabrik yang telah berkembang dengan baik mampu mengolah TBS sebanyak 600 ton/hari, sehingga akan dihasilkan tankos sebanyak 130 ton. Pemanfaatan tankos saat ini masih belum maksimal karena hanya digunakan sebagai pupuk untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri (Fauzi, 2002).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada komposisi media tumbuh serbuk gergaji dan tandan kosong kelapa sawit yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variasi media tanam serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)?
2. Pada variasi berapa dari media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Bibit jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) diperoleh dari usaha pembibitan jamur tiram di Maros kemudian dibudidayakan pada *baglog* di dalam kumbung. Pada penelitian ini hal yang diteliti yaitu kecepatan awal tumbuh miselium, kecepatan *full colony*, berat basah, lebar tudung dan panjang tangkai.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Suryaningrum (2012) tentang Pertumbuhan dan Produktivitas Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) dengan Komposisi Media Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu Sengon, Tandan Tosong Kelapa Sawit, dan Ampas Tahu Yang Berbeda menunjukkan bahwa pada tandan kosong kelapa sawit (TKKS) 100 % pertumbuhan optimal miselium jamur tiram putih yaitu sebesar 0.58 cm per hari. Pada TKKS 80 % variasi komposisi media yang optimal berat basah *Pleurotus ostreatus* sebesar 125.88 gr dan berat kering badan buah sebesar 17.99 gr. Jumlah tubuh buah *Pleurotus ostreatus* panen tertinggi diperoleh pada TKKS 20 % yaitu 18,8 tubuh buah. *Biological Efficiency Ratio* (BER) tertinggi pada TKKS 80 % yaitu sebesar 78.68 %.

Dalam penelitian Setiagama (2014) tentang Pertumbuhan dan Produktivitas Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) dengan Komposisi Media Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu Sengon, Tandan Tosong Kelapa Sawit, dan Ampas Tahu Yang Berbeda menunjukkan hasil terbaik dengan kecepatan pertumbuhan miselium paling cepat selama 28,33 hari pada perlakuan R0 (TKKS + ampas tahu + serbuk gergaji sengon 1000 gr), sedangkan paling lama selama 31,33 hari pada perlakuan R4 (TKKS 40 gr + ampas tahu 25 gr + serbuk gergaji sengon 935 gr). Sedangkan jumlah tubuh buah dan berat segar tubuh buah jamur tiram putih saat panen yang paling tinggi pada perlakuan R2 (TKKS 20 gr + ampas tahu 25 gr + serbuk gergaji sengon 955 gr) sebesar 21,33 helai dan 140 gr. Sedangkan paling lama pada perlakuan R4 sebesar 12 helai dan 90 gr.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena, penelitian ini menggunakan media berupa media serbuk gergaji kayu durian dan tandan kosong kelapa sawit untuk pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
2. Untuk mengetahui variasi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan para petani untuk mengembangkan manfaat dan kegunaan tandan kosong kelapa sawit dalam mengembangkan budidaya jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Ayat Al-Qur'an yang Relevan

AL-Qur'an surah Luqman/31 : 10.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ (١٠)

Terjemahnya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama RI 2012).

Dari ayat di atas menyifati Allah dengan dua dari asma'-Nya, yaitu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dalam rangka membuktikan kebenaran janji-Nya. Kini dilanjutkan dengan memaparkan kekuasaan dan kehebatan ciptaan-Nya sekaligus sebagai bukti keperkasaannya. Ayat di atas menyatakan: Dia menciptakan langit yang demikian tinggi dan besar tanpa tiang yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan dia meletakkan di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang sangat kukuh sehingga tertancap kuat supaya ia yakni bumi ini tidak goncang bersama kamu, kendati ia lonjong dan terus berputar; dan dia mengembangbiakan di sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melalat dan lain-lain, dan kami turunkan air hujan dari langit, baik yang cair maupun yang membeku, lalu kami

tumbuhkan padanya setelah percampuran tanah dengan air yang turun itu segala macam pasang tumbuh-tumbuhan yang baik (Sihab, 2002).

AyatNya; (*bi ghayri 'amadin taraunaha*) tanpa tiang yang kamu melihatnya dalam arti sebenarnya tiangnya ada tetapi kamu tidak melihatnya dengan mata kepala. Tiang tersebut adalah daya-daya yang diciptakan Allah, sehingga ini dapat meninggi dan tidak jatuh ke bumi. Tidak juga planet-planet yang ada di alam raya ini saling bertabrakan. Kata (*rawasiya*) terambil dari kata *ar-raws* atau *ar-rusuwwu* yakni kemantapan pada satu tempat. Dari sini, gunung-gunung, karena ia kekar tidak bergerak dari tempatnya, ditunjuk dengan kata *rawasi* yang merupakan bentuk jamak dari kata *rasin*. Kemudian kata (وَأَنْزَلْنَا) *wa anzalna/* Kami turunkan air dari langit menggunakan bentuk personal pertama (Kami), sedang redaksi sebelumnya yang berbunyi; (وَبَثَّ فِيهَا) *wa batstsa fiha* dan dia mengembangbiakan di sana segala jenis binatang menggunakan personal ketiga (Dia). Pengalihan bentuk ini, agaknya untuk menggaris bawahi pentingnya air sebagai sumber hidup manusia. Bukan saja manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya, seperti pada penelitian ini yaitu jamur tiram putih juga memerlukan air sebagai sumber kehidupannya (Sihab, 2002).

Kata (كَرِيمٍ) *Karim* digunakan untuk menyifati segala sesuatu yang baik sebagai objeknya. *Rizq* yang *Karim* adalah yang banyak, halal dan bermanfaat. Pasangan tumbuhan yang *Karim* adalah yang tumbuh subur dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya (Shihab, 2002).

B. Tinjauan Umum Tentang Jamur Tiram

Jamur dalam bahasa Indonesia disebut “cendawan” dan dalam istilah botani disebut “fungi” termasuk kedalam golongan tumbuhan sederhana karena tidak berklorofil. Tubuh jamur terdiri atas satu atau beberapa sel yang berbentuk tabung bersekat-sekat atau tidak bersekat, hidup pada bahan atau media tumbuh yang telah mengandung nutrisi yang dibutuhkannya (autotropik). Secara sederhana pengertian jamur adalah tumbuhan sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau sejumlah sel dalam bentuk benang-benang (miselia) yang bercabang-cabang. Bakal tubuh buah atau primordia dari basidiomiset adalah gumpalan kecil yang terdiri dari kumpulan miselia yang berkembang menjadi tubuh buah. Diameter tubuh buah sekitar 1 mm primordia berkembang dan pada tubuh buah muda terlihat bagian-bagian tubuh buah seperti tudung dan tangkai yang terletak tidak di tengah tudung (Maulana, 2012).

Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah jamur memiliki tudung (*pileus*) dan tangkai (*stipe*). *Pileus* berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 5–15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Sedangkan tangkai berukuran 2–6 cm yang mana menyangga tudung agak lateral (dibagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah) (Yanuati, 2007).

Jamur tiram dalam bahasa latin disebut *Pleurotus ostreatus* merupakan jenis jamur masuk pada kelas *Basidiomycetes*. Spesies jamur tiram, *Pleurotus ostreatus* dikenal oleh para petani jamur dengan sebutan jamur tiram putih karena bentuk tudungnya yang menyerupai cangkang tiram (cangkang kerang) dan jamur ini berwarna putih. Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur kayu. Jamur tiram biasa disebut dengan jamur kayu karena banyak tumbuh pada media kayu yang sudah lapuk. Jamur ini disebut dengan jamur tiram karena memiliki bentuk tudung yang agak membulat, lonjong, dan melengkung hampir seperti cangkang tiram. Batang atau tangkai jamur ini tidak tepat berada pada tengah tudung, tetapi agak ke tepi (Steviani, 2011).

Tjitrosoepomo (2001), menyatakan bahwa jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) memiliki tudung berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung dan berwarna putih hingga krem, memiliki tangkai yang tumbuh menyamping, bentuknya seperti tiram (*ostreatus*), permukaannya hampir licin, diameter 5-20 cm. Tepi tudung mulus sedikit berlekuk. Pada waktu muda, tubuh buah diselubungi oleh *velum* universal. Jika tubuh membesar, tinggallah selaput pada pangkal tangkai tubuh buah sebagai bursa. Dari tepi tubuh buah ke tangkai terdapat pula selaput yang menutupi sisi bawah tubuh buah dinamakan *velum partiale*. Jika tubuh buah membesar, maka selaput ini akan robek dan merupakan suatu cincin (*annulus*) pada bagian atas tubuh buah. *himenofora* pada sisi bawah tubuh buah, membentuk papan-papan atau *lamella* yang tersusun radial, dapat juga *himenofora* membuat tonjolan berupa buluh-

buluh. *Himenium* meliputi sisi bawah tubuh buah tadi dan mula-mula terletak dibawah *velum partiale*. Letak *himenium* yang demikian itu disebut *angiokarp*.

Oktavita (2009), menyatakan bahwa faktor penting yang harus diperhatikan dalam budidaya jamur tiram ini adalah masalah higienis, aplikasi bibit unggul, teknologi produksi bibit (kultur murni, bibit induk, bibit sebar), teknologi produksi media tumbuh/substrat dan pemeliharaan serta cara panen jamur tiram. Pada budidaya jamur tiram suhu udara memegang peranan yang penting untuk mendapatkan pertumbuhan badan buah yang optimal. Pada umumnya suhu yang optimal untuk pertumbuhan jamur tiram, dibedakan dalam dua fase yaitu fase inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar antara 22-28°C dengan kelembaban 60-70 % dan fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara antara 16-22°C.

Hasil penelitian dari riset Badan Kesehatan Dunia (WHO), jamur tiram memiliki standar gizi sebagai makanan yang layak untuk dikonsumsi, enak dimakan, tidak beracun dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Jamur tiram sebagaimana jamur *edible* lainnya memiliki berbagai manfaat diantaranya sebagai bahan sayuran (Soenanto, 2000).

Jamur tiram putih mempunyai aroma yang khas karena mengandung *muskorin*, dan penting bagi kesehatan. Jamur tiram mempunyai kandungan protein sebanyak 5,4 %, karbohidrat 59%, serat 1,56 %, lemak 0,17 %, selain itu setiap 100 gr jamur tiram mengandung kalsium 8,9 mg, besi 1,9 mg, fosfor 17,0

mg, vitamin B 0,15 mg, vitamin B2 0,75 mg, vitamin C 12,40 mg dan menghasilkan 45,65 kalori (Afina, 2012).

Pertumbuhan jamur apabila spora yang sudah masak jatuh di tempat yang cocok, kemudian spora tersebut akan tumbuh menjadi miselium. Apabila lingkungan tempat miselium baik, dalam arti temperatur kelembaban, dan substrat tempat tumbuh memungkinkan maka kumpulan miselium akan tumbuh menjadi bakal buah jamur. Bakal buah jamur kemudian membesar dan pada akhirnya membentuk tubuh buah jamur. Tubuh buah jamur inilah yang akan dipanen untuk dikonsumsi. Berat basah dari tubuh buah jamur inilah yang menentukan tinggi atau rendahnya produktivitas jamur tiram (Pradita, 2012).

Kasifikasi jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), menurut (Parjimo, 2007) adalah sebagai berikut:

Regnum	: Fungi
Divisio	: Amastigomycota
Sub divisio	: Basidiomicota
Classis	: Basidiomycetes
Ordo	: Agaricales
Familia	: Agaricaeae
Genus	: <i>Pleurotus</i>
Species	: <i>Pleurotus ostreatus</i>

1. Siklus Hidup Jamur

Jamur bereproduksi dengan cara melepaskan spora yang dihasilkan secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual hanya dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan yang kurang sesuai dengan jamur. Reproduksi seksual ini menghasilkan keturunan dengan keanekaragaman genetik yang lebih besar. Variasi individu pada keturunan ini dapat membantu mereka beradaptasi ketika terjadi perubahan lingkungan. Sedangkan reproduksi aseksual pada jamur menggunakan spora yang dihasilkan oleh hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan jamur memungkinkan, pertumbuhannya akan cepat, jamur mengklon diri mereka sendiri dengan cara menghasilkan banyak spora secara aseksual. Spora ini akan terbawa oleh angin dan berkecambah jika mendarat di tempat yang lembab dan permukaan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Spora akan berkecambah membentuk benang-benang halus yang merupakan bagian dari dinding tubuler yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma yang disebut dengan hifa. Hifa membentuk suatu hamparan anyaman yang disebut miselium. Miselium merupakan jaringan “makan” dari jamur (Narwanti, 2013).

Kehidupan jamur berawal dari spora (*basidiospora*) yang kemudian akan berkecambah membentuk hifa yang berupa benang-benang halus. Hifa ini akan tumbuh ke seluruh bagian media tumbuh. Kemudian dari kumpulan hifa atau miselium akan terbentuk gumpalan kecil seperti simpul benang yang menandakan bahwa tubuh buah mulai terbentuk. Simpul tersebut berbentuk bundar atau lonjong dan dikenal dengan radia kepala jamur (*pin head*) atau primordial. Simpul

ini akan membesar dan disebut stadia kancing kecil (*small button*). Selanjutnya stadia kancing kecil akan terus membesar mencapai stadia kancing (*button*) dan stadia telur atau (*egg*). Pada stadia ini tangkai dan tudung yang tadinya tertutup selubung universal mulai membesar. Selubung tercabik, kemudian diikuti stadia perpanjangan (*elongation*). Cawan (*volva*) pada stadia ini berpisah dengan tudung (*pileus*) karena perpanjangan tangkai (*stalk*). Stadia terakhir adalah stadia dewasa (tubuh buah) (Steviani, 2011).

Menurut Meinanda (2013), siklus hidup jamur tiram adalah sebagai berikut:

a. Spora

Awal mula jamur berasal dari spora. Spora berukuran kecil dan berbobot ringan sehingga mudah berterbangan menyebar ke berbagai tempat dengan bantuan angin. Spora yang telah matang akan terlepas dari tubuh jamur dan jatuh atau menempel di berbagai tempat. Spora akan tumbuh jika kondisi lingkungan tempat ia menempel mendukung proses pertumbuhannya. Suhu, kelembaban, dan sumber makanan merupakan kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan spora untuk menjadi jamur. Jika spora jatuh pada tempat yang kurang mendukung pertumbuhannya, spora dapat bertahan cukup lama hingga kondisi tempat ia menempel dapat mendukung syarat pertumbuhannya.

b. Hifa

Ketika kondisi lingkungan sudah memadai untuk pertumbuhan, spora akan mulai berkecambah. Kecambah yang berbentuk spora berupa benang-

benang tipis berwarna putih dan disebut dengan hifa. Fungsi hifa hampir sama dengan fungsi akar pada tumbuhan, yaitu untuk menyerap sumber makanan.

c. Miselium

Hifa akan terus tumbuh dan menyebar ke seluruh media tumbuh. Pertumbuhan hifa memanjang, bercabang, dan saling tumpang tindih disebut dengan miselium. Miselium berwarna putih seperti kapas dan akan menutupi seluruh permukaan media tumbuh.

d. *Pin Head*

Pin head akan tumbuh dari miselium yang paling numpuk dan membentuk benjolan atau gumpalan kecil seperti kancing. *Pin head* ini nantinya akan berkembang menjadi jamur dewasa, dari tudung yang menguncup kemudian menjadi mekar membentuk setengah lingkaran seperti cangkang tiram.

e. Jamur dewasa


Dua sampai empat hari setelah kemunculan *pin head*, jamur memulai memasuki fase dewasanya. Jamur dewasa akan kembali menghasilkan spora. Spora dihasilkan oleh serat-serat halus dibawah tudung jamur yang disebut *lamela*. Di dalam *lamela* ini terdapat *basidium*, yaitu sel-sel penghasil spora.

Berdasarkan fase perkembangannya, dikenal tiga macam miselia, yaitu fase miselium primer, sekunder dan tersier. Miselium primer terbentuk dari basidiospora yang jatuh pada media yang menguntungkan, miselium ini berinti satu haploid. Fase ini merupakan pertunasan dan fragmentasi hifa yang disebut

pembiakan vegetatif. Fase vegetatif berakhir saat miselium primer mengadakan plasmogami antara dua hifa yang kompatibel dan membentuk miselium.

Sekunder berinti dua. Fase selanjutnya, miselium sekunder akan berhimpun menjadi jaringan tertur dan membentuk tubuh buah (*basidiocarp*) yang menghasilkan basidiospora. Fase ini disebut fase generatif atau fase reproduktif (Steviani, 2011).

Adapun siklus hidup jamur tiram pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Siklus hidup jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) (www. Google com, 2016).

Adapun karakteristik pertumbuhan jamur tiram pada *baglog* yaitu dalam jangka waktu antara 40-60 hari seluruh permukaan *baglog* sudah rata ditumbuhi oleh miselium berwarna putih. Satu sampai dua minggu setelah *baglog* dibuka biasanya akan tumbuh tunas dalam 2-3 hari akan menjadi badan buah yang sempurna untuk dipanen. Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah menunjukkan lebar tudung antara 5-10 cm. Produksi jamur dilakukan dengan memanen badan buah sebanyak 4-5 panen dengan rerata 100

gr jamur setiap panen. Jarak selang waktu antara masing-masing panen adalah 1-2 minggu (Steviani, 2011).

2. Syarat Tumbuh Jamur Tiram

a. Temperatur

Jamur dapat tumbuh pada kisaran temperatur yang lebih luas. Kebanyakan jamur tumbuh antara temperatur 0-35 °C dengan suhu optimum untuk spesies saprofit 22-30 °C. Diupayakan temperatur lingkungan sekitar tumbuh jamur selalu dalam keadaan stabil, supaya pertumbuhan dan perkembangan tidak terganggu. Untuk menjaga suhu agar tetap stabil jika suhu kumbung mulai panas, maka dapat dilakukan penyemprotan menggunakan air bersih hingga suhu kumbung menjadi sejuk kembali (Narwanti, 2013).

Syarat pertumbuhan, secara alami jamur tiram ditemukan di hutan di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak, di tempat terlindung miselium jamur akan tumbuh lebih cepat dari pada di tempat yang terang dengan cahaya matahari yang berlimpah, kelembaban ruangan optimal 80–90 %, yang harus dipertahankan dengan menyemprot air secara teratur, suhu udara untuk pertumbuhan miselium adalah 25 - 30 °C dan untuk pertumbuhan tubuh buah adalah 18 – 20 °C. Miselium jamur tumbuh optimal dalam keadaan gelap dan kondisi asam (pH 5,5 – 6,5). Tetapi kondisi lingkungan atau substrat tempat tumbuh yang terlalu asam (pH rendah) atau pH terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan miselium. Sebaliknya, tubuh buah jamur tidak tumbuh optimal

pada lingkungan yang agak terang dan kondisi keasaman agak netral (pH 6,8 – 7,0) (Steviani, 2011).

b. Kelembaban

Kelembapan udara berpengaruh pada pertumbuhan jamur tiram cepat atau lambat, sehat atau tidak sehatnya pertumbuhannya. Kelembapan ruangan yang optimal 80–90 %, yang harus dipertahankan dengan menyemprot air secara teratur. Kelembapan memegang peranan penting sehingga perlu diperhatikan kelembapan yang kurang memenuhi syarat dapat diperbaiki dengan menggunakan cara lain seperti untuk daerah panas ditempatkan pada lingkungan pepohonan besar, *log*, atau polibag selalu disiram (Narwanti, 2013).

c. Keasaman (pH)

Media yang terlalu asam atau basa dapat menyebabkan pertumbuhan miselium dan tubuh buah terhambat. Pertumbuhan miselium dan tumbuh buah jamur yang ideal pada pH maksimum 4 sampai 6. Bila pH di atas 6,0 pertumbuhannya kurang baik (Narwanti, 2013).

d. Cahaya

Jamur tidak membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya, namun demikian cahaya penting untuk merangsang sporulasi dan juga berguna dalam pemencaran spora karena organ-organ yang menghasilkan spora bersifat fototrofik dan memencarkan sporanya ke arah cahaya (Narwanti, 2013).

e. Kadar air

Kandungan air dalam media pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium maupun perkembangan tubuh buah. Jamur tiram memerlukan kandungan air tidak lebih dari 70 % (Narwanti, 2013).

f. Kebutuhan nutrisi jamur

Seperti halnya tumbuhan lain jamur tiram juga memerlukan nutrisi dalam bentuk unsur hara seperti karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Besi (Fe) dan Seng (Zn). Dalam media tanam, unsur tersebut harus dipersiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam budidaya jamur tersebut. Jamur tidak dapat menggunakan energi matahari seperti tanaman berklorofil untuk proses biologi tetapi menghasilkan sejumlah enzim ekstra yang dapat mendegradasi senyawa yang dapat larut dan kemudian diserap oleh jamur. Untuk nutrisi, unsur utama yang digunakan untuk budidaya adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin. Ukuran molekul nutrien bagi jamur harus cukup kecil sehingga mampu untuk melewati dinding sel dan membran. Oleh karena itu jamur harus terlebih dahulu merombak molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil untuk dapat diabsorpsi. Perombakan molekul ini dilakukan dengan mengeluarkan enzim ekstraseluler (Narwanti, 2013).

Pada umumnya jamur mensekresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan untuk mengurai substrat yang kompleks agar memperoleh nutrien-nutrien yang diperlukannya. Transportasi nutrien ke dalam sel jamur dapat berlangsung

melalui beberapa cara, antara lain melalui transportasi aktif. Adanya pertumbuhan oleh jamur pada suatu substrat dapat diketahui karena proses metabolisme jamur menyebabkan perubahan pada substrat antara lain timbulnya perubahan warna pada substrat (Narwanti, 2013).

C. *Media Tanam Dasar Jamur Tiram*

Suriawiria (2002) menyatakan bahwa jamur dapat tumbuh pada media limbah, karena jamur mampu mendegradasi limbah organik. Dengan kemampuannya tersebut jamur tiram putih dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai guna limbah. Jamur tiram putih termasuk dalam jamur yang tumbuh pada substrat organik yang telah mati dan akan merombak substrat menjadi zat yang mudah diserap. Biasanya substrat tersebut mengalami pengomposan terlebih dahulu.

Kayu merupakan media utama jamur untuk tumbuh di alam sehingga serbuk gergaji kayu sangat cocok untuk media budidaya jamur tiram (Sunarmi dan Saparinto, 2010).

Suriawiria (2002) menambahkan bahwa serbuk gergaji kayu merupakan tempat tumbuh jamur tiram yang tergolong sebagai jamur pengguna selulosa, hemiselulosa, dan lignin, yang dapat mengurai dan memanfaatkan komponen kayu sebagai sumber C (karbon). Media serbuk gergaji sebagai media tumbuh jamur tiram ditambahkan dedak agar dapat mempercepat pertumbuhan miselium jamur.

Oleh karena itu serbuk kayu yang digunakan untuk budidaya jamur sebaiknya berasal dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet alami, tidak busuk dan tidak ditumbuhi oleh jamur atau kapang lain. Serbuk kayu yang baik adalah serbuk yang berasal dari kayu keras dan tidak banyak mengandung minyak ataupun getah. Namun demikian serbuk kayu yang banyak mengandung minyak maupun getah dapat pula digunakan sebagai media dengan cara merendamnya lebih lama sebelum proses lebih lanjut (Maulana, 2011).

Kualitas media tanam merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi keberhasilan budidaya jamur. Media tanam jamur biasanya menggunakan serbuk gergaji sebagai substrat dari berbagai jenis kayu seperti kayu durian. Kandungan dari kayu durian ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, abu, zat ekstraktif. Sifat kayu ini keras dan tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap serangan hama memiliki pengembangan dan penyusutan yang kecil serta memiliki serat dan warna khas tersendiri (Sanjoyo, 2011).

Zat yang terkandung dalam kayu tersebut ada yang berguna dan membantu pertumbuhan jamur, tetapi adapula yang menghambat. Kandungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram adalah karbohidrat, lignin dan serat, sedangkan faktor penghambat adalah getah dan zat ekstraktif (zat pengawet alami yang terdapat pada kayu). Oleh karena itu, serbuk kayu yang digunakan untuk budidaya jamur sebaiknya berasal dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet alami (Chang, 1978).

D. *Media Tambahan Jamur Tiram*

1. Bekatul

Menurut Sutarja (2010), bekatul merupakan limbah penggilingan padi yang merupakan bagian luar atau kulit ari beras yang merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi. Walaupun bekatul merupakan limbah dari penggilingan padi, tetapi mempunyai kandungan gizi, vitamin dan protein yang cukup tinggi (Narwanti, 2013).

Bekatul atau dedak padi merupakan hasil sisa penggilingan padi. Digunakan sebagai bahan tambahan media tanam yang berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, karbon dan nitrogen. Bekatul juga kaya akan vitamin B kompleks, merupakan bagian yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur serta berfungsi juga sebagai pemicu pertumbuhan tubuh buah. Media yang dibuat dari campuran beberapa macam bahan tersebut perlu diatur pH-nya. Kadar air media diatur hingga 50-65 %. Air perlu ditambahkan agar miselia jamur dapat tumbuh dan menyerap makanan dari media dengan baik. Tingkat keasaman media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram. Apabila pH terlalu rendah atau tinggi, maka pertumbuhan jamur tiram akan terhambat. Bahkan akan kemungkinan akan tumbuh jamur lain yang akan mengganggu pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Selain itu juga digunakan bekatul yang merupakan bahan untuk pertumbuhan tubuh buah jamur, bekatul ini juga kaya vitamin, terutama vitamin B (Nurul, 2014).

2. Kapur

Pada budidaya jamur kapur juga diperlukan karena berfungsi sebagai pengatur pH (keasaman) media tanam dan sebagai sumber kalsium (Ca) yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Kapur yang digunakan sebagai campuran bahan media adalah kapur pertanian yaitu kalsium karbonat (CaCO_3) atau kapur bangunan (Warisno, 2010).

Untuk meningkatkan produksi jamur tiram, maka dalam campuran bahan media tumbuh selain serbuk gergaji sebagai bahan utama, perlu bahan tambahan berupa bekatul dan tepung jagung. Dalam hal ini harus dipilih bekatul dan tepung jagung yang mutunya baik, masih baru sebab jika sudah lama disimpan kemungkinan telah menggumpal atau telah mengalami fermentasi serta tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Kegunaan penambahan bekatul dan tepung jagung merupakan sumber karbohidrat, lemak dan protein. Disamping itu perlu ditambahkan bahan-bahan lain seperti kapur (kalsium karbonat) sebagai sumber mineral dan pengatur pH meter (Suprapti, 2010).

E. *Tandan Kosong Kelapa Sawit*

Dalam budi daya jamur tiram dengan media tandan kosong kelapa sawit perlu diadakan pemilihan, kesegaran jenis, waktu tebang, fase tumbuh, dan umur tanaman perlu mendapat perhatian. Dalam pengadaan pilih jenis tanaman kelapa sawit yang mempunyai tandan kosong. Tiap jenis dipisahkan, umur lebih dari 10

tahun, fase tebang saat menggugurkan daun (misal tandan kelapa sawit yang muda), dan pengambilan dilakukan pada musim kemarau atau musim gugur di daerah subtropika (Maulana, 2012).

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan salah satu jenis limbah padat yang dihasilkan dalam industri minyak sawit. Jumlah TKKS ini cukup besar karena hampir sama dengan jumlah produksi minyak sawit mentah. Limbah tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Komponen terbesar dari TKKS adalah selulosa (40-60 %), disamping komponen lain yang jumlahnya lebih kecil seperti hemiselulosa (20-30 %), dan lignin (15-30 %). Salah satu alternatif pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit adalah sebagai pupuk organik dengan melakukan pengomposan (Fauzi, dkk., 2002).

Tandan kosong sawit berfungsi ganda yaitu selain menambah hara ke dalam tanah, juga meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang sangat diperlukan bagi perbaikan sifat fisik tanah. Dengan meningkatnya bahan organik tanah maka struktur tanah semakin mantap dan kemampuan tanah menahan air bertambah baik, perbaikan sifat fisik tanah tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hara (Deptan, 2006).


Tandan kosong kelapa sawit mengandung serat yang tinggi. Kandungan utama TKKS adalah selulosa dan lignin. Selulosa dalam TKKS dapat mencapai 54- 60 %, sedangkan kandungan lignin mencapai 22-27 % (Hambali, 2007). Dua bagian tandan kosong kelapa sawit yang banyak mengandung selulosa adalah

bagian pangkal dan bagian ujung tandan kosong sawit yang agak runcing dan agak keras (Hasibuan, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PPKS, Pabrik Minyak Sawit menghasilkan limbah padat dan limbah cair memiliki potensi pemanfaatan sebagai pupuk organik bagi tanaman kelapa sawit. Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) merupakan bahan organik yang mengandung; 42,8 % C, 2,90 % K_2O , 0,80 % N, 0,22 % P_2O_5 , 0,30 % Mg dan unsur-unsur mikro antara lain 10 ppm B, 23 ppm Cu dan 51 ppm Zn. Dalam setiap 1 ton tandan kosong sawit mengandung unsur hara yang setara dengan 3 kg Urea, 0,6 kg RP, 12 kg MOP dan 2 kg kiserit (Humas, 2008)

F. Kerangka Pikir

Gambar dan alur skematis dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1. Kerangka pikir penelitian

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh variasi media tanam serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
2. Terdapat variasi media tanam serbuk gergaji dan tandan kosong kelapa sawit yang dapat memberi pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimental. Penelitian bersifat eksperimental yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu variabel atau lebih terhadap variabel lainnya.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah media serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit. Sedangkan variabel terikat adalah pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional penelitian antara lain :

1. Serbuk gergaji kayu merupakan limbah industri pengolahan kayu yang mengandung lignin, hemiselulosa dan selulosa sebagai tempat tumbuhnya jamur tiram.
2. Tandan kosong kelapa sawit merupakan hasil limbah pengolahan buah kelapa sawit yang jarang dimanfaatkan dan dibuang. Tandan kosong kelapa sawit mengandung zat yang sama dengan serbuk kayu yaitu, lignin, hemiselulosa dan selulosa yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih sebagai media tumbuhnya.
3. Pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) didefinisikan sebagai bertambahnya jumlah ukuran sel yang diukur dengan waktu penyebaran miselium hari setelah inokulasi (HSI), *full colony* (HSI), berat basah tubuh buah (gram), lebar tudung (cm) dan panjang tangkai (cm).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan hasil dengan bantuan alat elektronik.

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Waktu awal tumbuh miselium (HSI), dengan cara mengamati pertumbuhan miselium hari setelah inokulasi.

2. Waktu pemenuhan miselium (*full colony*) (HSI), dengan cara mencatat pada hari keberapa setelah inokulasi pertumbuhan miselium memenuhi media tanam untuk masing-masing *baglog*.
3. Berat basah tubuh buah (gr) yaitu dengan cara menimbang tubuh buah jamur yang sudah dipanen dengan menggunakan timbangan analitik.
4. Lebar tudung (cm) yaitu dengan cara mengukur lebar tudung di atas kertas millimeter.
5. Panjang tangkai (cm) dengan cara mengukur panjang tangkai di atas kertas millimeter.

F. *Alat dan Bahan.*

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan duduk berskala, ayakan, baskom, terpal, skop, autoklaf, *laminar air flow* (LAF), pinset, pipa paralon, rak pemeliharaan, *hand sprayer*, timbangan analitik, gunting, kompor, spatula dan alat tulis menulis.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit jamur tiram, serbuk gergaji kayu, bekatul, dedak jagung, kapur pertanian, tandan kosong kelapa sawit, air bersih, spiritus, karet gelang, kertas koran, karet gelang kantong plastik dan bahan bakar.

G. *Prosedur Kerja*

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan, sehingga terdapat 20 unit percobaan. Perlakuan yang diberikan sebagai berikut:

K0 = Serbuk gergaji kayu 800 gr.

K1 = TKKS 20 gr + serbuk gergaji kayu 780 gr

K2 = TKKS 30 gr + serbuk gergaji kayu 770 gr

K3 = TKKS 40 gr + serbuk gergaji kayu 760 gr

K4 = TKKS 50 gr + serbuk gergaji kayu 750 gr

1. Media Tanam

Semua bahan ditimbang sesuai dengan formulasi bahan dasar serbuk gergaji kayu 80 %, bekatul 15 %, dedak jagung 3 % dan kapur pertanian 2 % (Priyadi, 2013). Serbuk gergaji ditambahkan air dengan kelembaban kira-kira 50-65 %. Kemudian semua bahan dicampur dengan rata.

2. Pengomposan

Proses pengomposan dilakukan dengan menutup bahan yang telah dicampur dengan menggunakan terpal. Kemudian pengomposan dilakukan dalam waktu 1 minggu, dalam selang waktu 3 hari bahan yang ditutupi terpal diaduk sehingga merata agar bahan tersebut tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa.

3. Pengemasan Media

Bahan media yang sudah dikomposkan dimasukkan dalam plastik *baglog*. *Baglog* diikat menggunakan tali rafia.

4. Sterilisasi

Memasukan *baglog* ke dalam drum dan memanaskan media hingga suhunya mencapai 120 °C. Setelah disterilisasi media didinginkan selama 24 jam.

5. Inokulasi Bibit Jamur

Membersihkan tangan dengan sabun anti kuman dan disemprot dengan alkohol 70 % untuk meminimalisir kontaminasi. Mengangkat dan mengeluarkan spatula dari plastik yang sudah disterilisasi. Menyebarkan bibit jamur sebanyak 9 biji pada media kemudian menutup kembali media dan memasang pipa paralon pada bagian mulut media dan menutupnya dengan menggunakan koran.

6. Cara Inkubasi

Meletakkan media yang sudah diberi bibit pada rak penyimpanan kemudian diinkubasi selama kurang lebih 45 hari dengan suhu optimal 22 hingga 29 °C.

7. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar suhu dan kelembaban ruang penumbuhan tetap sesuai untuk perkembangan badan buah sehingga produksi jamur tinggi. Hal ini dilakukan dengan pengkabutan atau Penyemprotan air dengan *hand sprayer* pada ruang penumbuhan. Air yang disemprotkan diusahakan tidak mengenai bagian dalam *baglog* karena bisa menyebabkan kebusukan media. Pengkabutan dilakukan jika media tanam dirasakan terlalu kering.

8. Pemanenan

Tubuh buah jamur yang telah berkembang optimal (3 hari setelah *pin head* mulai tumbuh) dan memiliki tepi yang lebih tipis, kemudian dipanen. Pemanenan dilakukan dengan mencabut semua bagian dari jamur hingga pangkalnya. Pemanenan dilakukan pagi hari untuk menjaga kesegaran jamur.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis sidik ragam dan jika hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{\text{Hitung}} > F_{\text{Tabel } 5\%}$ tetapi lebih kecil daripada $F_{\text{Tabel } 1\%}$) atau berbeda sangat nyata ($F_{\text{Hitung}} > F_{\text{Tabel } 1\%}$), maka untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjutan dengan Uji Nyata Tarkecil (BNT), pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan *software* SPSS, 16.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Waktu awal tumbuh miselium dan waktu penenuhan miselium (*full colony*)

Waktu awal tumbuh miselium hari setelah inokulasi (HSI) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dan sidik ragamnya dapat dilihat pada tabel lampiran 1a dan 1b. Sidik ragam menunjukkan bahwa komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh tidak nyata terhadap waktu awal tumbuh miselium (HSI) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perbandingan waktu awal tumbuh miselium (HSI) dan waktu pemenuhan *full colony* (HSI) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Waktu awal tumbuh miselium dan waktu pemenuhan miselium Jamur Tiram Putih (*full colony*) (*Pleurotus ostreatus*).

Waktu pemenuhan miselium (*full colony*) (HSI) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dan sidik ragamnya dapat dilihat pada tabel lampiran 2a dan 2b. Sidik ragam menunjukkan bahwa komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh sangat nyata terhadap waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Hasil Uji BNT waktu pemenuhan miselium (*full colony*) dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Uji BNT waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata	NP BNT 0,01
	I	II	III	IV		
K0	40.5	44.5	41	40	41.5 ^c	3.055
KI	50	50	50	50	50 ^a	
K2	45	48	40	48	45.25 ^b	
K3	40	45	44	39	42 ^{bc}	
K4	40	40	40	39	39.75 ^c	

keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT $\alpha=0,05$ dan 0,01

Perbandingan waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). (HSI) dapat dilihat pada gambar 4.1

2. Lebar Tudung

Rata-rata lebar tudung (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dan sidik ragamnya dapat dilihat pada tabel lampiran 4a dan 4b. Sidik ragam menunjukkan bahwa komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap lebar tudung (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)


Hasil Uji BNT lebar tudung (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji BNT lebar tudung jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Perlakuan					Rata-rata	NP BNT 0,05
	I	II	III	IV		
K0	6.560	6.359	7.310	5.815	6.511 ^{ab}	2.179
KI	10.395	7.950	8.000	8.037	8.596 ^a	
K2	3.925	4.838	6.411	7.893	5.767 ^b	
K3	6.051	6.938	5.932	5.552	6.118 ^b	
K4	4.617	5.386	8.478	4.289	5.693 ^b	

keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji $BNT\alpha=0,05$ dan $0,01$

Perbandingan lebar tudung jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.3



Gambar 4.3. Lebar tudung jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

3. Panjang Tangkai

Panjang tangkai (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dan sidik ragamnya dapat dilihat pada tabel lampiran 5a dan 5b. Sidik ragam menunjukkan bahwa komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa

sawit berpengaruh nyata terhadap panjang tangkai jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).


Hasil uji BNT jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada panjang tangkai dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil uji BNT panjang tangkai jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata	NP BNT 0,05
	I	II	III	IV		
K0	6.137	5.656	5.000	3.979	5.193 ^b	2.179
KI	9.150	6.200	7.163	7.687	7.550 ^a	
K2	3.127	3.829	6.207	7.376	5.135 ^b	
K3	4.007	5.088	5.168	4.015	4.570 ^b	
K4	4.920	5.442	5.518	4.956	5.209 ^b	

keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT $\alpha=0,05$ dan 0,01

Perbandingan panjang tangkai (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.4.




Gambar 4.4. Panjang tangkai jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

4. Berat Basah Jamur Tiram Putih

Berat basah (gr) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dan sidik ragamnya dapat dilihat pada tabel lampiran 3a dan 3b. Sidik ragam menunjukkan bahwa komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh tidak nyata terhadap berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Perbandingan berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2. Berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

B. Pembahasan

Pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) menggunakan berbagai media yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Narwanti (2013) bahwa jamur tiram juga memerlukan nutrisi dalam bentuk unsur hara seperti karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), mangan (Mn) tembaga (Cu), besi (Fe), dan seng (Zn). Dalam media tanam, unsur tersebut

harus dipersiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam budidaya jamur tersebut. Jamur tidak dapat menggunakan energi matahari seperti tanaman berklorofil untuk proses biologi tetapi menghasilkan sejumlah enzim ekstra yang dapat mendegradasi senyawa yang dapat larut dan kemudian diserap oleh jamur. Untuk nutrisi, unsur utama yang digunakan untuk budidaya adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin.

1. Waktu awal tumbuh miselium dan waktu pemuhan miselium (*full colony*)

Waktu awal tumbuh diamati setelah munculnya miselium hari setelah inokulasi (HSI). Kecepatan awal tumbuh miselium ini merupakan salah satu indikator keberhasilan inokulasi. Bila *baglog* tidak ditumbuhi miselium maka pelaksanaan inokulasi benih jamur tersebut dinyatakan gagal.

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh tidak nyata terhadap kecepatan awal tumbuh miselium. Ipuk dan Saparinto, (2010). Lama penyebaran miselium dipengaruhi oleh suhu, kelembaban tempat inkubasi dan kualitas benih jamur yang digunakan. Guna menunjang pertumbuhan miselium pada jamur tiram, idealnya ruang inkubasi memiliki suhu berkisar 24 – 29⁰ C dan kelembaban 80 – 100 %. Selain itu tingkat kepadatan *baglog* juga mempengaruhi penyebaran miselium. Karena apabila miselium terlalu padat maka miselium akan sulit menyebar ke seluruh permukaan *baglog*. Oleh karena itu

pengisian *baglog* seharusnya tidak terlalu padat ataupun terlalu renggang akan tetapi yang sedang- sedang saja.

Berdasarkan kecepatan awal tumbuh miselium dapat dilihat bahwa K4 memiliki kecepatan tumbuh miselium tercepat dengan rata-rata 25,5 hari setelah inokulasi (HSI), dengan penambahan tandan kosong kelapa sawit 50 gr dan serbuk gergaji kayu 750 gr.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) untuk pertumbuhan miselium cukup terpenuhi pada media tanam dengan penambahan tandan kosong kelapa sawit 50 gr dan serbuk gergaji kayu 750 gr. Sedangkan pertumbuhan awal miselium paling lambat adalah perlakuan K1 (media tanam dengan penambahan tandan kosong kelapa sawit 20 gr dan serbuk gergaji kayu 780 gr). Perlakuan K1 membutuhkan waktu inkubasi yang paling lama yaitu 27.5 HSI. Sebagai mana dikemukakan oleh Rashad (2009) pertumbuhan miselium pada jamur dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi faktor fisik, kimia dan biologi. Faktor fisik terdiri dari suhu, pH, kelembaban, intensitas cahaya dan sirkulasi (aerasi) udara. Suhu dan kelembaban yang dibutuhkan selama proses pertumbuhan miselium yaitu antara 22° C-28° C dan 60-70 %. Intensitas cahaya yang dibutuhkan selama pertumbuhan miselium yaitu sebesar 10 %. Kisaran pH yang dibutuhkan selama pertumbuhan miselium jamur antara 4-7. pH (tingkat keasaman) akan mempengaruhi pertumbuhan secara langsung terhadap kemampuan permukaan sel jamur pada ketersediaan nutrisi. Sedangkan sirkulasi udara berkaitan dengan kadar CO₂ dan O₂ di lingkungan.

Pertumbuhan miselium memerlukan lingkungan yang mengandung CO₂ sebesar 15-20 %. Intensitas cahaya, pH dan sirkulasi udara akan mempengaruhi kebutuhan vitamin yang terdapat pada media, yang berfungsi sebagai koenzim atau konstituen yang mengkatalisis reaksi spesifik dan tidak digunakan sebagai sumber energi maupun materi struktural protoplasma. Intensitas cahaya, pH dan sirkulasi udara yang tinggi akan dapat merusak vitamin.

Rahayu dalam Susiana, (2010) benang-benang hifa (miselium) mengeluarkan enzim yang memecahkan bahan-bahan karbohidrat kedalam senyawa sederhana seperti selulosa yang dapat digunakan sebagai energi untuk dimetabolisasi yang mengakibatkan miselium dapat cepat tumbuh atau muncul pada baglog.

Tandan kosong kelapa sawit juga memiliki beberapa unsur diantaranya karbon 42,8 %, kalium 2,90%, nitrogen 0,80 % dan fosfor 0,30 %, sedangkan serbuk gergaji kayu memiliki unsur hara diantaranya, karbon 50 %, hidrogen 6 %, nitrogen 0,04 – 0,10 % dan 0,20 –0,50 % abu yang berfungsi untuk membangun miselium. Pemilihan media tambahan tandan kosong kelapa sawit pada komposisi yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih.

Kecepatan *full colony* (HSI). Lama *full colony* ini merupakan salah satu indikator keberhasilan tumbuh bakal buah. Bila *baglog* tidak dipenuhi miselium maka pelaksanaan inokulasi benih jamur pada baglog tersebut dinyatakan gagal.

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh sangat nyata terhadap kecepatan *full colony*.

Hasil uji BNT $\alpha(0.01)$ menunjukan bahwa pada kecepatan *full colony* yang tercepat adalah pada perlakuan K4 dan berbeda nyata terhadap perlakuan K1 dan K2 sedangkan perlakuan K0 dan K3 tidak berpengaruh nyata. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kecepatan *full colony* tercepat pada perlakuan K4 dengan rata-rata (39,75) dengan pemberian tandan kosong kelapa sawit 50 gr dan serbuk gergaji kayu 750 gr. Hal tersebut bahwa tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan selulosa dan lignin sebagai sumber karbohidrat. Sebagai mana pendapat Rahayu dalam Susiana (2010), bahwa komponen karbohidrat memberikan nutrisi pada cendawan. Benang-benang hifa (miselium) mengeluarkan enzim yang memecahkan bahan-bahan karbohidrat ke dalam senyawa sederhana yang dapat digunakan sebagai energi untuk dimetabolisasi. Tandan kosong memiliki kandungan unsur hara diantaranya karbon 42,8 %, kalium 2,90 %, nitrogen 0,80 % dan fosfor 0,30 %, yang berfungsi untuk membangun miselium untuk pertumbuhan jamur tiram. Steviani, (2011) lamanya penyebaran miselium hingga *full colony* dipengaruhi oleh suhu, kelembaban tempat inkubasi dan kualitas bibit jamur yang digunakan. Guna menunjang pertumbuhan miselium pada jamur tiram, idealnya ruang inkubasi memiliki suhu 24-29⁰ C dan kelembaban 90-100 %.

2. Lebar tudung

Lebar tudung diamati setelah melakukan penimbangan. Lebar tudung ini diamati di atas kertas millimeter dan mengukur berapa lebar cm dari keseluruhan jamur tiram putih.

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap lebar tudung jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Pada pengamatan lebar tudung jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yaitu dengan mengukur lebar tudung yang sudah ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik, pada pengamatan ini hasil yang didapatkan yaitu pada perlakuan menunjukkan nilai tertinggi pada perlakuan K1 dengan penambahan tandan kosong kelapa sawit 20 gr dan serbuk gergaji kayu 780 dengan rata-rata sebesar (8,596) cm

Hasil uji BNT $\alpha(0.05)$ menunjukan bahwa lebar tudung yang tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan K1 dan berbeda nyata dengan lebar tudung K2, K3 dan K4. Sedangkan terhadap perlakuan K0 menunjukkan perbedaan tidak nyata. Hasil tersebut bahwa lebar tudung dapat dilihat pada perlakuan K1 dengan penambahan media tandan kosong kelapa sawit 20 gr dan serbuk gergaji kayu 780 gr memberikan pengaruh optimal pada lebar tudung jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Dimana tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan lignin dan selulosa untuk pertumbuhan jamur tiram putih. Tandan kosong kelapa sawit juga memiliki unsur hara diantaranya karbon 42,8%, kalium 2,90%, nitrogen 0,80% dan fosfor 0,30 %, begitupun serbuk gergaji kayu yang juga memiliki unsur hara

seperti, karbon 50 %, hidrogen 6 %, nitrogen 0,04 – 0,10 % dan 0,20 – 0,50 % abu yang berfungsi untuk membangun miselium, sebagaimana telah diketahui bahwa semakin banyak unsur hara yang terdapat pada media tanam maka akan semakin bagus pula untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas jamur tiram dapat dilihat dari bentuk dan ukuran diameter pada tudung jamur tiram. Semakin besar ukuran diameter jamur tiram maka menghasilkan massa jamur yang besar pula. Savitri (2011) mengemukakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diameter pada tudung jamur adalah udara. Jamur yang kekurangan oksigen dapat menghambat sistem metabolisme pada jamur. Ukuran diameter tudung yang cukup oksigen menghasilkan ukuran diameter yang lebih besar.

3. Panjang tangkai

Panjang tangkai diamati setelah melakukan penimbangan. Panjang tangkai ini diamati di atas kertas millimeter dan mengukur berapa panjang tangkai cm dari keseluruhan jamur tiram putih.

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap panjang tangkai jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Ady setyo, (2013) mengemukakan bahwa pada komposisi media tanam 100% memiliki ukuran panjang tangkai yang besar yaitu 14 cm dan ukuran terkecil yaitu 0% yaitu 12, 13 cm. Kandungan selulosa yang ada pada tandan kosong kelapa sawit

merupakan substrat utama yang dibutuhkan sebagai sumber karbon untuk memperoleh energi pertumbuhan dalam pembentukan tubuh buah jamur. Pada pertumbuhan jamur juga terdapat dua komponen penting yang sangat berpengaruh, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Adanya pengaruh karbondioksida yang terlalu berlebihan ini pada pertumbuhan menyebabkan tangkai sangat menjadi panjang.

Pada pengamatan panjang tangkai jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yaitu dengan mengukur panjang tangkai yang sudah ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik, pada pengamatan ini hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai tertinggi dapat dilihat pada perlakuan K1 dengan penambahan tandan kosong kelapa sawit 20 gr dan serbuk gergaji kayu 780 dengan rata-rata sebesar 7,550 cm.

Hal tersebut diketahui bahwa tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan lignin dan selulosa untuk pertumbuhan jamur tiram putih. Tandan kosong kelapa sawit juga memiliki unsur hara diantaranya karbon 42,8%, kalium 2,90%, nitrogen 0,80% dan fosfor 0,30%, begitu pun serbuk gergaji kayu yang memiliki unsur hara seperti, karbon 50 %, hidrogen 6 %, nitrogen 0,04 – 0,10 % dan 0,20 – 0,50 % abu yang berfungsi untuk membangun miselium untuk pertumbuhan jamur tiram, sebagaimana telah diketahui bahwa semakin banyak unsur hara yang terdapat pada media tanam maka akan semakin bagus pula untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Hasil uji BNT $\alpha(0.05)$ menunjukkan bahwa panjang tangkai yang tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan K1 dan berbeda nyata dengan panjang tangkai K0, K2 dan K3 dan K4. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan. Ady setyo (2013), mengemukakan bahwa adanya pengaruh karbondioksida yang terlalu berlebihan sehingga pada pertumbuhan menyebabkan tangkai menjadi panjang. Hal ini dikarenakan karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai seperti pengaruh oleh suhu, kelembaban dan tidak terkenanya cahaya matahari.

4. berat basah

Menurut Djarijah, (2001). Selain tubuh buah jamur, berat basah tubuh buah jamur pun dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih. Berat tubuh jamur dapat dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu kumbung jamur. Jamur yang telah dipanen, dibersihkan dari sisa-sisa media tanam yang masih menempel pada ujung tangkai jamur kemudian ditimbang untuk mengetahui berat basah tubuh buah. Penimbangan dilakukan pada semua badan buah jamur per media tanam. Sesuai dengan pernyataan nurman dan kahar (1992), bahwa berat segar jamur ditentukan oleh kesuburan media dan adanya zat-zat yang lain seperti karbohidrat dan protein.

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit berpengaruh tidak nyata terhadap berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Berdasarkan gambar pada pengamatan berat basah tubuh buah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yaitu dengan mengukur berat basah tubuh buah jamur

yang sudah dipanen dengan menggunakan timbangan analitik, pada pengamatan ini hasil yang didapatkan menunjukkan nilai tertinggi pada perlakuan K3 dengan penambahan tandan kosong kelapa sawit 40 gr dan serbuk gergaji kayu 760 sebesar (151,709) gr. Hal tersebut bahwa pemberian tandan kosong kelapa sawit 20 gr dan serbuk gergaji kayu 780 gr memiliki kandungan hara optimal yang dibutuhkan untuk penambahan berat basah dibandingkan dengan perlakuan lain. Hal ini karena tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan selulosa yang merupakan tempat tumbuh jamur tiram. Tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan unsur hara diantaranya karbon 42,8 %, kalium 2,90 %, nitrogen 0,80 % dan fosfor 0,30 %, begitupun serbuk gergaji kayu yang memiliki kandungan unsur hara seperti begitu pun serbuk gergaji kayu yang memiliki unsur hara seperti, karbon 50 %, hidrogen 6 %, nitrogen 0,04 – 0,10 % dan 0,20 – 0,50 % abu yang berfungsi untuk membangun miselium untuk pertumbuhan jamur tiram, sebagaimana telah diketahui bahwa semakin banyak unsur hara yang terdapat pada media tanam maka akan semakin bagus pula untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Jamur tiram putih merupakan tumbuhan yang tidak mengandung klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu jamur memerlukan zat-zat makanan dari organisme lain khususnya dari tandan kosong kelapa sawit (Putranti, dkk., 2003).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Media tumbuh serbuk gergaji kayu dan tandan kosong kelapa sawit pada berbagai variasi memberikan pengaruh tidak nyata terhadap waktu awal tumbuh miselium (HSI) dan berat basah (gr) dan berpengaruh sangat nyata terhadap waktu penumbuhan miselium (*full colony*) (HSI) serta berpengaruh nyata terhadap lebar tudung (cm) dan panjang tangkai (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
2. Media tumbuh tandan kosong kelapa sawit 50 gr (K4) + serbuk gergaji kayu 750 gr memberikan pengaruh terbaik pada kecepatan tumbuh miselium (25.5) dan full colony, (39.75) sedangkan pada pemberian tandan kosong kelapa sawit 40 gr (K3) + serbuk gergaji kayu 760 gr memberikan pengaruh terbaik pada berat basah (151.709) serta pemberian tandan kosong kelapa sawit 20 gr (K1) + serbuk gergaji kayu 770 gr memberikan pengaruh terbaik pada lebar tudung (8.596) dan panjang tangkai (7.550) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

B. Implikasi Penelitian (Saran)

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Limbah tandan kosong kelapa sawit dan serbuk gergaji kayu dapat dimanfaatkan sebagai media alternatif jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang variasi pemberian tandan kosong kelapa sawit dan serbuk gergaji kayu dengan media lain untuk pertumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

KEPUSTAKAAN

- Baharuddin. *Pemanfaatan Serbuk Kayu Jati (Tectona grandis L) Yang Direndam Dalam Air Dingin Sebagai Media Tumbuh Jamur Tiram (Pleurotus comunicipae)*. Jurnal Perrenial: 2(1). 1-5 . 2005.
- Chang, S.T. and P.G. Miles. *Edible Mushroom and Their Cultivation*. CRC Press. Boca Raton Florida, 1987.
- Djarajah dan Djarajah AS. *Budi Daya Jamur Tiram*. Kanisius: Yogyakarta 2001.
- Erie, MSY. *Panen Jamur Tiap Musim*. Yogyakarta : Perpustakaan Nasional, 2012.
- Fauzi, M. *Pengaruh Tiga Media Tanam Serbuk Kayu dan Pemberian Pupuk Pada Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Fakultas Pertanian USU Medan 20155 : Medan, Vol. 1 no 2 (Maret 2013).
- Hasimuddin. *Direktoral jendral hortikultura*: Jakarta, 2012.
- <https://www.google.com/gambar/siklus-hidup-jamur-tiram-putih>. (Diakses, 2016).
- Indah, NTY. *Kajian Perbedaan Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus Florida)*. Universitas Brawijaya : Malang. 2007.
- Kalsum, UFW. *Efektivitas Pemberian Air Leri Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura: Madura, Vol 4 no 2 (September 2011).
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah-Nya. Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba'at Al mush-haf Asy Syarif Medinah Munawwarah P.O. Box 6262 Kerajaan Arab Saudi, 2012.
- Minanda I, *Panen Cepat Budidaya Jamur*. Bandung: padi 2013.
- Narwanti EE. *Perbedaan Pengaruh Media Sekam Padi dan Serbuk Gergaji Sengon Terhadap Berat Basah, Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih dan Efficiency Biology Rate*. IKIP PGRI Semarang: Semarang, 2013.

- Nurul I. *Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Pada Berbagai Komposisi Media Tanam*". Program Studi Agroteknologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai (Oktober, 2014).
- Oktavita. *Tempat Budidaya Jamur Tiram*.<http://oktavita.com/tempat-budidaya-jamur-tiram.htm>. diakses 07 Januari 2013. 2009.
- Parjimo. Agus, A. *Budidaya jamur kuping, tiram dan merang*. Jakarta : Agromedia Pustaka, 2007.
- Pradita K. "*Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Pemberian Pupuk Hayati Terhadap Pertumbuhan Dan Produktivitas Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus)*". Prodi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi : Universitas Erlangga (Maret, 2012).
- Priyadi, TU., *Bisnis Jamur Tiram*. Jakarta : Agromedia Pustaka, 2013.
- Royse DJ. *Cultivation of Oyster Mushrooms*. Plant Pathology. US: The Pennsylvania State University. 2003
- Rashad, M. M., H. M. Abdou, A. E. Mahmoud and M. U. Nooman. *Nutritional Analysis and Enzyme Activities of Pleurotus ostreatus Cultivated on Citrus limonium and Carica papaya Wastes*. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (4): 3352-3360. 2009.
- Shihab, MQ. "*Tafsir Al-Misbah*" Penerbit lentera hati: Jakarta (Oktober 2004).
- Suprapti. "*Pengaruh Sumber Bibit Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*". Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan : Bogor, (April, 2010).
- Sanjoyo. Dkk." *Pengaruh Penggunaan Sludge Sebagai Pengganti Dedak Pada Media Tanam Terhadap Produksi Jamur Kuping Hitam*". Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto: Purwokerto (April 2011).
- Shifriya, A. *Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) Pada Penambahan Dua Sumber Nutrisi*". Dosen Jurusan Agroekoteknologi FP UTM : Bangkalan, Maret 2012.
- Suryaningrum B. *Pertumbuhan Dan Produktivitas Jamur Tiram Putih (pleurotus Ostreatus) Pada Baglog Tandan Kosong Kelapa Sawit (Alaeis guineensis)*. Thesis. Duta Wacana Christian University, 2012.

- Steviani S. *Pengaruh Penambahan Molase dalam Berbagai Media Pada Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2011
- Syammahfuz, C & PS. *Usaha Jamur Tiram Skala Rumah Tangga*. Bogor: Penebar Swadaya, 2009.
- Sa'id. *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Industri Kelapa Sawit*. Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan, Bogor, 1994.
- Suriawiria, U. *Budi Daya Jamur Tiram*. Kanisius. Yogyakarta, 2002.
- Soenanto, H. *Jamur Tiram Budi Daya dan Peluang Usaha*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Sumarsih S. *Untung Besar Usaha Bibit Jamur Tiram*. Penebar Swadaya. Jakarta, 2010.
- Tjitrosoepomo, G. *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press. 2001.
- Warisno. *Menabur Jamur Tiram Menuai Rupiah*". PT Gramedia Pustaka Umum: Jakarta 2010.
- Wignyanto. *Analisis Kelayakan Teknis Dan Finansial Produksi Sosis Jamur Tiram Pada Skala Industri Kecil (Studi Kasus Di Budidaya Jamur Tiram 'Wahyu' Kota Mojokerto)*". Alumni Jurusan Teknologi Industri Pertanian F TP-Univ. Brawijaya: Universitas Brawijaya Malang (Maret, 2012).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel

Tabel lampiran 1a. Waktu awal tumbuh miselium jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Perlakuan	Ulangan				Total	Rata-Rata
	I	II	III	IV		
KO	26.5	26.5	27	26.5	106	26.5
KI	27	26	28.5	28.5	110	27.5
K2	25	27.5	25	28.5	106	26.5
K3	26	27.5	25.5	25.5	104.5	26.125
K4	26.5	25	25	25.5	102	25.5
Total	131	133	131	135	529	132

Tabel lampiran 1b. Sidik ragam waktu awal tumbuh miselium jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	4	8.800	2.200	1.692 ^{tn}	0.216
Ulangan	3	1.900	0.633		
Galat	12	15.600	1.300		
Total	19	26.300			

Keterangan: tn= tidak nyata

Tabel lampiran 2a. Waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Perlakuan	Ulangan				Total	Rata-Rata
	I	II	III	IV		
KO	40	44.5	41	40	166	41.5
KI	50	50	50	50	200	50
K2	45	48	40	48	181	45.25
K3	40	45	44	39	168	42
K4	40	40	40	39	159	39.75
Total	215,5	215	216	216	874	218

Tabel lampiran 2b. Sidik ragam waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	4	261.700	65.425	13.020**	0.00
Ulangan	3	21.700	7.233		
Galat	12	60.300	5.025		
Total	19	343.700			

Keterangan: **= sangat nyata

Tabel Lampiran 3a. Lebar tudung jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Perlakuan	Ulangan				Total	rata-rata
	I	II	III	IV		
KO	6.560	6.359	7.310	5.815	26.044	6.511
KI	10.395	7.950	8.000	8.037	34.382	8.596
K2	3.925	4.838	6.411	7.893	23.067	5.767
K3	6.051	6.938	5.932	5.552	24.473	6.118
K4	4.617	5.386	8.478	4.289	22.770	5.693
Total	31.548	31.471	36.131	31.586	130.736	32.684

Tabel Lampiran 3b. Sidik ragam lebar tudung (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	4	854.595	5.720	2.921*	0.05
Ulangan	3	3.170	412.088		
Galat	12	23.502	1.958		
Total	19	49.551			

Keterangan: *= nyata

Tabel Lampiran 4a. Panjang tangkai jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

perlakuan	Ulangan				Total	rata-rata
	I	II	III	IV		
KO	6.137	5.656	5.000	3.979	20.772	5.193
KI	9.150	6.200	7.163	7.687	30.200	7.550
K2	3.127	3.829	6.207	7.376	20.539	5.135
K3	4.007	5.088	5.168	4.015	18.278	4.570
K4	4.920	5.442	5.518	4.956	20.836	5.209
total	27.341	26.215	29.056	28.013	110.625	27.656

Tabel lampiran 4b. Sidik ragam panjang tangkai (cm) jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	4	21.503	5.376	3.263*	0.05
Ulangan	3	0.853	0.284		
Galat	12	19.772	1.648		
Total	19	42.128			

Keterangan: *= nyata


Tabel lampiran 5a. Berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)


Perlakuan	Ulangan				Total	rata-rata
	I	II	III	IV		
KO	65.288	68.475	96.065	100.304	330.132	82.533
KI	388.334	35.139	42.776	58.678	524.928	131.232
K2	75.650	81.168	88.720	64.271	309.808	77.452
K3	77.982	46.112	55.619	427.121	606.834	151.709
K4	61.914	54.910	81.664	314.285	512.772	128.193
Total	669.168	285.804	364.845	964.658	2.284.474	571.119

Tabel Lampiran 5b. Sidik ragam berat basah jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Sumber	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Keragaman (Sk)					
Perlakuan	4	2444.068	6112.267	0.440 ^{tn}	0.777
Ulangan	3	25721.256	8573.752		
Galat	12	166624.075	13885.340		
Total	19	216794.399			

Keterangan: tn= tidak nyata

Lampiran 2. Skema Penelitian

Lampiran 3. Lay Out

Lampiran 4. Alat dan Bahan

1. Alat



Terpap



Timbangan 3 kg



Baskom



Plastik 18X30



Gergaji besi



Kompor



Tabung Gas



Drum



Plastik 1 m



Autoklaf



Pinset



Lampu spiritus



Laminar Air Flow (LAF)



Neraca Analitik



Termometer Suhu



Hand sprayer



Gunting



Aluminium foil




Baki



Alat tulis



Kertas Pengukuran



2. Bahan



Serbuk Gergaji Kayu



TKKS



Bekatul/Dedak Padi



Dedak Jagung

(CaCO₃)

Bibit Jamur (F2)



Alkohol 96 %



Karet gelang



Tali rafia



label



pipa paralon

Lampiran 5. Prosedur Kerja

1) Menyaring dan Menimbang



Menyaring



Menimbang Serbuk Gergaji Kayu



Menimbang Dedak Padi



Menimbang TKKS



Menimbang Tepung Jagung



Menimbang Kalsium Karbonat (CaCO_3)

2) Pencampuran/pengadukan bahan



Pencampuran serbuk gergaji kayu, TKKS, bekatul/dedak padi, tepung jagung, dan CaCO_3



Pengomposan



Pembuatan *baglog*



3) Sterilisasi *baglog*



4) Penanaman bibit jamur F2 (Inokulasi)



5) Inkubasi (pemasukkan *baglog* ke dalam kumbung)



6) Penyiraman



7) Pemanenan



8) Penimbangan



9. Pengukuran

9) Hasil terbaik

- a. Waktu awal tumbuh miselium
- b. Waktu pemenuhan miselium (*full colony*)
- c. berat basah
- d. lebar tudung dan
- e. panjang tangkai



a



b



c



d



e

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Herlina, lahir di Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Agustus 1994. Penulis adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Anding dan Napisah.

Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut

1. Sekolah Dasar Inpres (SDI) Negeri Tapango pada tahun 2000-2006.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo pada tahun 2006-2009
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tapango pada tahun 2009-2012.
4. Pada tahun 2012, penulis diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur UMM pada Program Strata 1 (S1) jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Selama masa kuliah penulis aktif menjadi asisten praktikum pada berbagai mata kuliah seperti Biologi Dasar, Taksonomi Tumbuhan dan Mikologi. Kemudian penulis juga PKL di RSUD Polewali Mandar. Terakhir penulis membuat skripsi dengan judul “Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Variasi Media Tanam Serbuk Gergaji Kayu Dan tandan Kosong Kelapa”.