

UJI EFEKTIVITAS MINYAK ATSIRI KULIT BUAH JERUK MANIS (*Citrus sinensis*) SEBAGAI TABIR SURYA SECARA SPEKTROFOTOMETER UV-VIS



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**FATMA DEWI
70100107095**

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2011

Penulis,

Fatma Dewi
70100107095

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Efektifitas Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Manis (*Citrus sinensis*) Sebagai Tabir Surya Secara Spektrofotometer UV-Vis” yang disusun oleh Fatma Dewi, NIM: 70100107095, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011, bertepatan dengan 3 Ramadhan, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 3 Agustus 2011 M
3 Ramadhan 1432 H


DEWAN PENGUJI :

Ketua : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Penguji I : Gemy Nastity Handayany, S.Si, M.Si, Apt (.....)
Penguji II : Haeria, S.Si., M.Si (.....)
Penguji III : Dr. H. Lomba Sultan, M.A (.....)

Diketahui oleh:
Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A
Nip. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang pantas diucapkan oleh lisan seorang hamba kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan pertolongan-Nya skripsi dengan judul “Uji Efektifitas Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Manis (*Citrus sinensis*) Sebagai Tabir Surya Secara Spektrofotometer UV-Vis ” dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Dialah Dzat yang memberikan kita karunia, rahmat, banyak nikmat yang tak pernah pudar yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik sepanjang sejarah manusia, sang *khatamulanbiya'*, Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa berpegang teguh menapaki risalahnya yang paripurna hingga akhir zaman. *Ammaba'du*.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Achmad Alle, BA dan Ibunda Harjuna Waris, yang tak putus – putus atas segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

2. Drs. Abdul wahab Idris & keluarga serta Drs. Burhanuddin & keluarga atas segala doa restu, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
3. Rektor (Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT.,MS) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta para staf pada Fakultas Kesehatan.
5. Isriany Ismail S.Si, M.Si, Apt. Selaku Pembimbing pertama dan Nursalam Hamzah, S.Si, Apt selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Dr.H.Lomba Sultan, MA Selaku Penguji Agama dan Gemy Nastity Handayani,S.Si,M.Si.Apt serta Haeria,S.Si.,M.Si selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi apa - apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
7. Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi terkhusus Haeria S.Si, M.Si dan Surya Ningsi, S.Si, Apt atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.

8. Kakak-kakak jurusan farmasi angkatan 2005, terkhusus A. Armisman Edy Paturusi S.Farm, Muhammad Rusydi, S.Farm,Apt S, Ahmad Irsyad Aliah, S.Farm, dan Kisrin Mirwan S.Farm,Apt yang selalu memberikan bantuan baik secara materi maupun secara moril selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman – teman seperjuangan angkatan 2007 terutama sahabat-sahabatku Fauziah Rezky, Anastasia Nugraha Pratiwi, Nur Afni, Ismi Fadhilah serta teman seperjuanganku penelitian Ferawati, Isnaini Fitri Wahyuni, Astriani, Adriani Aras, Sulfiana, Andi Ahmad, Akzan, Ansir Mustawa atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini serta keluarga dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih.
10. Adik-adik jurusan farmasi angkatan 2008, 2009 & 2010, yang selalu memberikan bantuan baik secara materi maupun secara moril selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangatlah diperlukan, mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Amin, ya Robbal Alamin!

Makassar, Agustus 2011

Wassalam

Fatma dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Jeruk Manis.....	7
1. Klasifikasi.....	7
2. Morfologi.....	7
3. Nama Daerah.....	8
4. Kandungan Kimia.....	8
5. Kegunaan.....	9
B. Minyak Atsiri.....	9
C. Kulit.....	14
1. Lapisan Epidermis.....	15
2. Lapisan Dermis.....	17
D. Tabir Surya.....	17
1. Cara Perlindungan Kulit.....	18
2. Penentuan Kekuatan Tabir Surya.....	20
E. Sinar UV A & UV B.....	23
F. Spektrofotometer UV-Vis.....	24
G. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Alat dan Bahan.....	31
B. Prosedur Kerja.....	31
1. Pengambilan Sampel.....	31
2. Pengolahan Sampel.....	31

3.	Penentuan Efektifitas Sediaan.....	32
4.	Analisis Data.....	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
	<i>A. Hasil Penelitian</i>	34
	<i>B. Pembahasan</i>	34
BAB V	PENUTUP.....	39
	<i>A. Kesimpulan</i>	39
	<i>B. Saran</i>	39
	DAFTAR PUSTAKA.....	40
	LAMPIRAN.....	43
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai SPF Kulit Jeruk Manis.....	34
2. Data Hasil Replikasi Serapan Minyak Atsiri 20 bpj.....	44
3. Data Hasil Replikasi Serapan Minyak Atsiri 40 bpj	45
4. Data Hasil Replikasi Serapan Minyak Atsiri 60 bpj	46
5. Data Hasil Replikasi Serapan Minyak Atsiri 80 bpj	47
6. Data Hasil Replikasi Serapan Minyak Atsiri 100 bpj	48
7. Data Hasil Replikasi Serapan Minyak Atsiri 120 bpj	49
8. Nilai SPF Minyak Atsiri 20 bpj.....	50
9. Nilai SPF Minyak Atsiri 40 bpj	51
10. Nilai SPF Minyak Atsiri 60 bpj	52
11. Nilai SPF Minyak Atsiri 80 bpj	53
12. Nilai SPF Minyak Atsiri 100 bpj	54
13. Nilai SPF Minyak Atsiri 120 bpj.....	55
14. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 150 bpj.....	57
15. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 200 bpj.....	58
16. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 250 bpj.....	59
17. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 300 bpj.....	60
18. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 350 bpj.....	61

19. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 400 bpj.....	62
20. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 450 bpj.....	63
21. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 500 bpj.....	64
22. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 550 bpj.....	65
23. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 600 bpj.....	66
24. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 650 bpj.....	67
25. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 700 bpj.....	68
26. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 750 bpj.....	69
27. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 800 bpj.....	70
28. Nilai Prediksi SPF Minyak Atsiri 150-800 bpj.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Senyawa Antranilat.....	36
2. Hesperidin.....	37
3. Skema Kerja Pengujian Efektifitas Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Manis (<i>Citrus sinensis</i>) Sebagai Tabir Surya Secara Spektrofotometer.....	43
4. Spektrum Serapan Minyak Atsiri.....	56
5. Pohon Jeruk Manis.....	57
6. Buah Jeruk Manis.....	58
7. Kulit Buah Jeruk Manis.....	58
8. Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Manis.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Skema Kerja Pengujian Efektifitas Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Manis (<i>Citrus sinensis</i>) Sebagai Tabir Surya Secara Spektrofotometer.....	43
2. Hasil Pengukuran Serapan Minyak Atsiri Kulit 20 bpj.....	44
3. Hasil Pengukuran Serapan Minyak Atsiri Kulit 40 bpj.....	45
4. Hasil Pengukuran Serapan Minyak Atsiri Kulit 60 bpj.....	46
5. Hasil Pengukuran Serapan Minyak Atsiri Kulit 80 bpj.....	47
6. Hasil Pengukuran Serapan Minyak Atsiri Kulit 100 bpj.....	48
7. Hasil Pengukuran Serapan Minyak Atsiri Kulit 120 bpj.....	49
8. Nilai SPF minyak atsiri 20 bpj.....	50
9. Nilai SPF minyak atsiri 40 bpj.....	51
10. Nilai SPF minyak atsiri 60 bpj.....	52
11. Nilai SPF minyak atsiri 80 bpj.....	53
12. Nilai SPF minyak atsiri 100 bpj.....	54
13. Nilai SPF minyak atsiri 120 bpj.....	55
14. Spektrum Serapan Minyak Atsiri.....	56
15. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 150 bpj.....	57
16. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 200 bpj.....	58

17. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 250 bpj.....	59
18. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 300 bpj.....	60
19. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 350 bpj.....	61
20. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 400 bpj.....	62
21. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 450 bpj.....	63
22. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 500 bpj.....	64
23. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 600 bpj.....	65
24. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 650 bpj.....	66
25. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 700 bpj.....	67
26. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 750 bpj.....	68
27. Hasil Prediksi serapan Minyak Atsiri 800 bpj.....	69
28. Nilai Prediksi SPF Minyak Atsiri 150-800 bpj.....	71
29. Gambar Sampel Jeruk Manis (<i>Citrus sinensis</i>).....	72

ABSTRAK

Nama Penyusun : Fatma Dewi
NIM : 70100107095
Judul : “Uji Efektifitas Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Manis (*Citrus sinensis*) Sebagai Tabir Surya Secara Spektrofotometer UV-VIS”

Telah dilakukan penelitian tentang uji efektifitas minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*) sebagai tabir surya secara spektrofotometer UV-VIS. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai *sun protection factor* (SPF) dari minyak atsiri kulit jeruk manis. Minyak atsiri jeruk diperoleh dengan mengekstraksi kulit buah jeruk manis dengan metode pengepresan/pemerasan. Pengukuran nilai SPF dilakukan secara *in vitro* menggunakan metode spektrofotometri UV pada panjang gelombang 290 – 400 nm terhadap konsentrasi minyak atsiri 20 bpj, 40 bpj, 60 bpj, 80 bpj, 100 bpj, dan 120 bpj. Hasil analisis menunjukkan bahwa minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*) mengabsorpsi sinar UV B hingga UV A dengan nilai SPF 1,094 hingga 1,380. Minyak atsiri kulit buah jeruk manis belum efektif sebagai tabir surya pada konsentrasi yg digunakan.

Kata kunci: Minyak atsiri, kulit buah jeruk manis, tabir surya, SPF

ABSTRACT

Name : Fatma Dewi
NIM : 70100107095
Title : “Effectivity Test Of Essensial Oil Of Sweet Lemon Peel (*Citrus sinensis*) As Sun Screen By Spectrophotometric UV-Vis”

Research of effectivity test of essential oil of sweet lemon peel as sunscreen was conducted by UV-Vis spectrophotometric. This research aims to determine the value of the Sun Protection Factor (SPF) from essential oil of sweet lemon peel. Essential oil of the lemon obtained by macerating the peel of sweet lemon by pressing method. Measuring the value of SPF was done by in vitro using spectrophotometric UV at the of 290-400 nm wavelength to essential oil concentration of 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm dan 120 ppm. The result of analysis shows that essential oil of sweet lemon peel (*Citrus sinensis*) absorb UV B light to UV A light with the value of SPF 1,094 to 1,380. Essential oil of sweet lemon peel is not effective yet as sunscreen at that concentration assays.

Kata kunci: Essential oil, sweet lemon skin, sunscreen, SPF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anjuran agama untuk menggali ilmu pengetahuan telah mendorong muslim untuk mengenal banyak ilmu. Segala upaya mereka kerahkan untuk menekuni sebuah ilmu, bahkan beragam ilmu. Termasuk ilmu pengobatan yang menggunakan tumbuhan. Ketertarikan pada tumbuhan tak hanya melahirkan ahli pengobatan herbal. Namun, juga melahirkan perkembangan menakjubkan di bidang pertanian, termasuk teknik baru dalam mengembangkan tanaman. Dari berbagai penelitian yang dilakukan ilmuwan Muslim soal tanaman ini, kemudian lahir ilmu tentang pengobatan herbal. Dalam banyak literatur Islam di abad pertengahan, kehidupan tumbuh-tumbuhan erat kaitannya dengan ilmu kedokteran dan agronomi.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Syuara : 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah Allah Swt. Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan obat-obatan (Savitri, 2008).

Sinar matahari selain merupakan sumber energi bagi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi, juga pada paparan berlebih di kulit akan memberikan efek yang merugikan antara lain menyebabkan timbulnya eritema, pigmentasi dan penuaan dini. Sengatan matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan kelainan kulit dari dermatitis ringan sampai kanker kulit. Besarnya derajat kerusakan kulit tergantung pada frekuensi dan lamanya sinar matahari mengenai kulit, intensitas sinar matahari serta sensitifitas seseorang (Affandi, 2009).

Penyinaran matahari yang singkat pada kulit dapat menyebabkan kerusakan epidermis sementara, gejalanya biasanya disebut sengatan surya. Sinar matahari menyebabkan eritema ringan hingga luka bakar yang nyeri pada kasus yang lebih parah. Penyinaran yang lama akan menyebabkan perubahan degeneratif pada jaringan pengikat dalam korium. Keadaan tersebut menyebabkan kulit akan menebal, kehilangan kekenyalan sehingga kulit kelihatan keriput, ini disebabkan karena kulit kehilangan kapasitas ikat-air. Pada paparan sinar matahari yang berlebihan, sistem

perlindungan alamiah tubuh tidak mampu menahan radiasi tersebut, sehingga diperlukan perlindungan tambahan, diantaranya menggunakan sediaan tabir surya (Anonim, 1985).

Tabir surya merupakan senyawa kimia yang melindungi kulit dari sengatan matahari atau sinar ultraviolet dengan cara menghamburkan cahaya secara efektif atau dengan mengabsorpsi sinar matahari atau sinar ultraviolet (Michael, 1977). Berbagai cara dapat digunakan untuk melindungi manusia dari sinar ultraviolet seperti penggunaan pakaian dan topi pelindung. Namun perlindungan tersebut kadang-kadang tidak dapat mencukupi karena alat atau bahan pelindung masih dapat ditembus sinar tersebut. Selain itu, sinar ultraviolet dapat dipantulkan oleh berbagai benda di permukaan bumi. Sehingga kemungkinan besar pantulannya akan mencapai tubuh kita. Kosmetika yang dapat menyaring sinar matahari (sun screen) atau bahkan yang dapat menahan seluruh sinar matahari (sun block) untuk mengurangi efek buruk sinar matahari tersebut, kosmetika ini disebut kosmetika tabir surya. Ada 2 macam tabir surya : tabir surya kimia misalnya PABA, PABA ester, benzofenon, salisilat, dan antranilat yang dapat mengabsorpsi energi radiasi dan tabir surya fisik misalnya titanium dioksida, Mg silikat, seng oksida, red petrolatum, dan kaolin, yang dapat memantulkan sinar (Wasiatmadja, 1977).

Kemampuan menahan sinar ultraviolet dari tabir surya dinilai dalam factor proteksi sinar (*sun protection factor*/SPF). SPF (*sun protection factor*) didefinisikan sebagai perbandingan respon terhadap paparan sinar UV dari matahari ataupun buatan pada kulit yang terlindungi dengan kulit yang tak terlindungi (Nash, 2006).

Dengan metode spektrofotometri, nilai SPF dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan nilai $SPF = 10^A$ (Lowe, 2000). Dengan banyaknya kebutuhan terhadap sediaan tabir surya maka perlu dilakukan penelitian senyawa aktif tabir surya dari bahan alam yang banyak terdapat di Indonesia.

Tanaman jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. Cina dipercaya sebagai tempat pertama kali tumbuh. Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia secara alami atau dibudidayakan. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Itali (Prihatman,2000). Kulit buah jeruk biasanya hanya dibuang sebagai sampah, yang saat ini menjadi salah satu masalah di kota-kota besar. Untuk mengatasi masalah sampah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengolah atau mendaur ulang sampah menjadi produk atau bahan yang berguna, seperti sampah organik menjadi menjadi pupuk kompos serta sampah plastik menjadi peralatan rumah tangga. Selain diolah menjadi manisan, kulit buah jeruk manis segar bisa diperas untuk diambil minyak atsirinya. Atau bisa juga dikeringkan sebagai bahan obat atau pewangi, hasilnya disebut minyak jeruk manis atau kulit buah jeruk manis.

Minyak kulit jeruk manis adalah minyak atsiri yang diperoleh dari hasil pemerasan kulit buah terluar jeruk manis (*Citrus aurantium* subspes. *sinensis*) yang masak dan segar. Minyak ini berupa cairan yang berwarna kuning muda atau coklat kekuningan, baunya khas aromatis. Kandungan isinya adalah d-Limonen lebih dari 90%, terdapat pula 5% campuran sitral, sitronel dan metil ester dari asam antranilat.

Kegunaannya untuk bahan pewangi dan obat bronchitis menahun, kadar aldehida (jumlah dihitung sebagai dekanol) tidak kurang dari 1% dan tidak lebih dari 3%. Kandungan minyak atsirinya (tidak kurang dari 1% v/b) yang 90% terdiri dari limonen. Terdapat pula glikosida-glikosida, hesperidina, isohesperidina, dan aurantiamarina, serta damar (Sarwono, 1995).

Berdasarkan penelitian Diffey (2001) dan Green dkk (1999) menyatakan bahwa penggunaan tabir surya setiap hari ternyata dapat menurunkan resiko terjadinya kanker kulit. Tutik dwi (2002) menyatakan sintesis senyawa tabir surya 3,4-di-metoksi isoamii sinamat dapat dibuat dari bahan dasar minyak cengkeh dan minyak fusei dengan mampu memberikan perlindungan SPF *invitro* maksimum pada konsentrasi 10,25µg/ml (Sarwono : 1995, Dwi : 2002).

Perlu dilakukan pengkajian minyak atsiri kulit buah jeruk manis mengenai efesiensinya sebagai tabir surya. Sehingga untuk mengetahui efektivitas bahan tabir surya dilakukan pengujian daya absorpsi terhadap kadar dan panjang gelombang (Anonim , 1985).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai penentuan tingkat kemampuan tabir surya berdasarkan nilai SPF-nya yang diukur secara in-vitro menggunakan spektrofotometri UV dari minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*).

B. Rumusan masalah

1. Apakah minyak atsiri dari kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*) dapat mengabsorpsi sinar UV.
2. Berapa nilai dan tingkatan SPF (Sun protection factor) dari minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*).

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai dan tingkatan SPF dari minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*).

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif pemanfaatan dari limbah kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*), dan sebagai data ilmiah bagi peneliti lainnya dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jeruk manis (*Citrus sinensis*)

1. Klasifikasi (Steenis,2006)

Klasifikasi tanaman *Citrus sinensis* adalah sebagai berikut :

Regnum	:	Plantae
Divisio	:	Magnoliophyta
Subdivisio	:	Spermatophyta
Class	:	Dicotylodena
Ordo	:	Rutales
Familia	:	Rutacea
Genus	:	Citrus
Spesies	:	<i>Citrus sinensis</i> (L .) osbeck

2. Morfologi (Steenis,2006)

Pohon tinggi 3-10 m. Ranting berduri; duri pendek berbentuk paku. Tangkai daun panjang 0,5-3,5 cm. Helaian daun bulat telur, elliptis atau memanjang, dengan ujung tumpul atau meruncing tumpul, kerap kali melekuk kedalam lemah; tetapi beringgit melekuk ke dalam; panjang 2-15 cm. Mahkota bunga putih atau putih kekuningan. Buah bentuk bola, atau bentuk bola tertekan, diameter 4-7,5 cm, kuning kotor, oranye atau hijau dengan kuning; kulit 0,3-0,5 cm tebalnya; daging buah kuning muda, oranye kuning

atau kemerah-merahan, dengan gelembung yang bersatu satu dengan yang lain(Steenis,2006).

3. **Nama Daerah**

Citrus sinensis memiliki beberapa nama daerah yang berbeda-beda sebagai berikut : Lemo cina (Mandar), Lemo te'ne (Makassar), Lemo cina (Mamuju)

4. **Kandungan kimia**

Kandungan isinya adalah d-Limonen lebih dari 90%, terdapat pula 5% campuran sitral, sitronel dan metil ester dari asam antranilat, kadar aldehida (jumlah dihitung sebagai dekanol) tidak kurang dari 1% dan tidak lebih dari 3%. Kandungan minyak atsirinya (tidak kurang dari 1% v/b) yang 90% terdiri dari limonen. Terdapat pula glikosida-glikosida, hesperidina, isoheperidina, dan aurantiamarina, serta dammar (Sarwono, 1995).

5. **Kegunaan**

Manfaat tanaman jeruk sebagai makanan buah segar dan makanan olahan, dimana kandungan vitamin C yang tinggi. Sari buah jeruk berfungsi sebagai diuretik atau pelancar pembentukan air seni, tonikum bagi jantung. Mengatur pengeluaran empedu, memberi efek pendingin, dan mengurangi keasaman darah. Air jeruk juga memperlancar pengeluaran lendir dan melindungi paru-paru dari infeksi ulang. Kulit jeruk dapat menghilangkan dan menyembuhkan bintik hitam dan menghaluskan kulit(Rukmana : 2003).

B. Minyak atsiri

Minyak atsiri adalah substansi yang menyebabkan / menimbulkan bau dari macam-macam bagian tanaman. Dinamakan minyak atsiri oleh karena substansi ini kalau dibiarkan di udara akan atsiri pada temperatur biasa, maka ini dinamakan “ volatile oils ” atau “ aethereal oils ”. Istilah terakhir ini digunakan karena minyak atsiri merupakan “ essences ” atau isi aktif dari tanaman.

Secara umum uraian makroskopiknya kulit jeruk manis antara lain :

1. Kepingan berbentuk spiral dan ada pula yang berbentuk panjang
2. Permukaan luar berwarna coklat agak kekuning-kuningan sampai coklat jingga, tebal + 3mm, keras dan rapuh.
3. Permukaan dalam rata, berwarna coklat jingga.
4. Terdapat sedikit jaringan bunga karang, apabila kulit dipatahkan akan tampak dengan jelas rongga-rongga minyaknya yang bergaris tengah sekitar 1 mm (kartasapoetra, 2001).

Minyak atsiri, atau dikenal juga sebagai minyak eteris (aetheric oil), minyak sensial, minyak terbang, serta minyak aromatik, adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri mudah menguap karena titik uapnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponennya kuat mempengaruhi syaraf manusia (terutama dihidung) sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu.

Adapun sifat-sifat minyak atsiri :

1. Tersusun oleh bermacam-macam komponen kimia
2. Memiliki bau khas
3. Bersifat tidak bisa disabunkan dengan alkali dan tidak bisa berubah menjadi tengik (rancid) meninggalkan bekas noda pada benda yang ditempel.
4. Bersifat tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, baik pengaruh oksigen udara, sinar matahari, dan panas karena terdiri dari berbagai macam komponen penyusun.
5. Indeks bias umumnya tinggi
6. Pada umumnya tidak dapat bercampur dengan air, tetapi cukup dapat larut sehingga dapat memberikan baunya kepada air walaupun kelarutannya sangat kecil.
7. Sangat mudah larut dalam pelarut organik.

Lokasi minyak atsiri dalam tanaman tergantung pada suku tanaman tersebut, seperti di dalam rambut kelenjar (pada family *Labitae*), didalam sel-sel parenkim (misalnya family *Piperaceae*), didalam saluran minyak yang disebut Vittae (family *Umbebelliferae*), didalam rongga-rongga skizogen dan lizigen (pada family *Pinaceae* dan *Rutaceae*), terkandung dalam semua jaringan (pada family *Coniferae*), pada bunga mawar kandungan minyak atsiri terpusat pada mahkota bunga , pada kayu manis ditemui pada kulit batang (korteks), pada family *Umbellifera* terbanyak terdapat dalam perikarp buah, pada menthae sp. terdapat rambut kelenjar batang serta pada jeruk terdapat dalam kulit buah dan helai daun (Rahim dkk, 2007).

Minyak atsiri buah sitrus terdapat dalam kantung-kantung minyak berbentuk oval, balon, dalam kelenjar atau gelembung dengan ukuran diameter bervariasi dari 0,4-0,6 mm. Kantung minyak tersebut tidak memiliki saluran dan tidak berhubungan dengan sel sekitarnya atau dengan dinding luar sel, tidak memiliki dinding tetapi dibatasi oleh runtunan jaringan yang terdegrasi.

Kantung atau kelenjar minyak ini terdistribusi secara tidak teratur pada bagian luar kulit buah yang telah masak serta berwarna (flavedo), dan terutama terletak dibagian luar epikarp dan hipoderm, dan diatas mesokarp bagian dalam, yaitu dibagian kulit yang sedikit berwarna (albedo). Albedo ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, pentosan, gula, glikosida, zat yang mempunyai rasa pahit, dan mineral. Jeruk manis, lemon dan tangerin mengandung senyawa glikosida yang disebut hesperidin; sedangkan jenis glikosida dalam grapefruit disebut nariginin. Pada proses pematangan buah, sel-sel albedo tersebut berubah menjadi lebih panjang dan bercabang, serta membentuk jaringan sel yang rumit, ruang antar sel cukup besar, sehingga kulit buah yang matang memiliki tekstur seperti karet busa (spongi). Lapisan spongi ini memegang peranan penting dalam pengepresan minyak yang keluar dari kantung minyak, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dalam pengepresan.

Donovan telah membuat suatu deskripsi yang cukup baik mengenai hal yang terjadi jika kantung minyak tersebut hancur akibat tekanan dari luar. Menurut pendapat donovan, dinding sel minyak tidak mudah pecah. Sebagai contoh, jika kulit diberi tekanan rendah, atau direndam dalam air mendidih atau dalam larutan garam,

dan disuling dengan dengan penyulingan pada tekanan satu atmosfer atau kurang, maka hanya sebagian kecil minyak yang keluar dari kantung. Agar minyak dapat diekstraksi dengan cara penyulingan, maka tindakan awal yang harus dilakukan adalah merusak jaringan dengan cara mencacah atau merajang dengan cara hati-hati untuk mencegah kehilangan minyak akibat semburan. Tetapi apabila dinding kelenjar minyak itu disobek atau dilengkungkan, maka minyak yang terdapat terdorong keluar dengan tenaga tertentu dan mencapai jarak tertentu, seperti yang terlihat pada penyobekan kulit terhadap nyala lilin. Hal ini penting artinya di dalam berbagai proses ekstraksi. Tenaga pengepresan yang diberikan bervariasi dengan tingkat kematangan dan tingkat kesegaran kulit; kulit segar dan belum matang membutuhkan tekanan lebih besar (Guenther, 2007).

1. Ekstraksi Minyak Atsiri

Minyak atsiri umumnya diperoleh dengan cara :

a. Metode destilasi/penyulingan

Minyak atsiri yang resmi kebanyakan diperoleh dengan penyulingan. Dasar dari metode ini adalah memanfaatkan titik didih. Beberapa metode destilasi yang populer dilakukan diberbagai perusahaan industri penyulingan minyak atsiri antara lain :

1) Metode destilasi kering (langsung dari bahan tanpa menggunakan air).

Metode ini paling sesuai untuk bahan tanama yang kering dan untuk minyak-minyak yang tahan pemanasan (tidak mengalami perubahan bau dan warna saat dipanaskan) misalnya oleoresin dan *copaiba*.

2) Destilasi air, meliputi destilasi air dan uap air dan uap air langsung.

b. Metode penyarian

Metode penyarian digunakan untuk minyak-minyak atsiri yang tidak tahan pemanasan, seperti cendana. Kebanyakan dipilih metode ini karena kadar minyak atsiri dalam tanaman sangat rendah/kecil. Pengambilan minyak atsiri dengan cara ini diyakini sangat efektif karena sifat minyak atsiri yang larut sempurna didalam bahan pelarut organik non polar.

c. Metode pengepresan atau pemerasan

Metode pengepresan atau pemerasan dilakukan terutama untuk minyak atsiri yang tidak stabil dan tidak tahan pemanasan seperti minyak jeruk (citrus). Juga terhadap minyak atsiri dan bau dan warnanya berubah akibat pengaruh pelarut penyari. Metode ini juga hanya cocok untuk minyak atsiri yang rendamennya cukup besar.

d. Metode perlekatan bau

Metode *Enfleurage* metode penarikan bau minyak atsiri yang dilekatkan pada lilin. Metode ini digunakan karena diketahui ada beberapa jenis bunga yang setelah dipetik, enzimnya masih menunjukkan kegiatan dalam menghasilkan minyak atsiri sampai beberapa hari / minggu, misalnya bunga melati.

e. Metode hidrolisa enzimatik dari glikosida-glikosida

Metode hidrolisis enzimatik dari pada glikosida digunakan untuk minyak atsiri yang terdapat dalam bentuk glikosidanya(Rahim, 2007).

C. Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melamin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar (Tranggono, 2007).

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Kulit merupakan sawar fisiologik yang penting karena mampu menahan penembusan bahan gas, cair, maupun padat baik yang berasal dari lingkungan luar tubuh, maupun dari komponen organisme. Meskipun kulit relatif permeabel terhadap senyawa-senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa obat atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek terapeutik atau efek toksik, baik yang bersifat setempat maupun sistemik (Hermann, 1993).

Luas kulit pada manusia rata-rata ± 2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak. Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu : Epidermis (kulit ari), sebagai lapisan yang paling luar dan Dermis (korium, kutis, kulit jangat). Dibawah dermis terdapat subkutis atau jaringan lemak dibawah kulit.

Para ahli histology membagi epidermis dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yakni :

- a. Lapisan tanduk (*Stratum corneum*), sebagai lapisan yang paling atas.
- b. Lapisan jernih (*Stratum lucidum*), disebut juga “lapisan barrier”.
- c. Lapisan berbutir-butir (*Stratum granulosum*).
- d. Lapisan malphigi (*Stratum spinosum*) yang selnya seperti berduri.
- e. Lapisan basal (*Stratum germinativum*) yang hanya tersusun oleh satu lapis sel-sel basal.

1. Epidermis

Dari sudut kosmetik, epidermis merupakan bagian kulit yang menarik Karena kosmetik dipakai pada epidermis itu. Meskipun ada beberapa jenis kosmetik yang digunakan sampai ke dermis namun tetap penampilan epidermis yang menjadi tujuan utama. Dengan kemajuan teknologi, dermis menjadi tujuan dalam kosmetik medik.

Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter, misalnya pada telapak kaki dan telapak tangan, dan lapisan yang tipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi dan perut. Sel-sel epidermis ini disebut keratinosit.

- a. Lapisan tanduk (*Stratum corneum*) terdiri atas beberapa lapis sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin, jenis protein yang tidak larut dalam air, dan sangat resisten terhadap bahan-bahan

kimia. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit untuk memproteksi tubuh dari pengaruh luar. Secara alami, sel-sel yang sudah mati dipermukaan kulit akan melepaskan kulit untuk berdegradasi. Permukaan stratum corneum dilapisi oleh suatu lapisan pelindung lembab tipis yang bersifat asam, yang disebut mantel asam kulit.

- b. Lapisan Jernih (*Stratum lucidum*) terletak tepat dibawah *stratum corneum*, merupakan lapisan yang tipis, jernih, mengandung eleidin, sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Antara *stratum lucidum* dan *stratum granulosum* terdapat lapisan keratin tipis yang disebut *rein's barrier* (Szakall) yang tidak bias ditembus (impermeable).
- c. Lapisan Berbutir-butir (*stratum granulosum*) tersusun oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut. Stoughton menemukan bahwa di dalam butir keratohyalin itu terdapat bahan logam, khususnya tembaga yang menjadi katalisator proses pertandukan kulit.
- d. Lapisan Malphigi (*stratum spinosum* atau *malphigi layer*) memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri, intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Cairan limfe masih ditemukan mengitari sel-sel dalam lapisan malphigi ini.
- e. Lapisan Basal (*stratum germinativum* atau membrane basalis) adalah lapisan terbawah epidermis. Di dalam *stratum germinativum* juga terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinasi dan fungsinya hanya membentuk pigmen melamin dan memberikannya kepada sel-sel keratinosit

melalui dendrit-dendritnya. Satu sel melanosit melayani sekitar 36 sel keratinosit. Kesatuan ini diberi nama unit melanin epidermal(Tranggono, 2007).

2. Dermis

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan keadaan, dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin, yang berada dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolisakarida. Serabut kolagen dapat mencapai 72 persen dari keseluruhan berat kulit manusia bebas lemak.

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit(subkutis/hypodermis) (Tranggono, 2007).

D. Tabir surya

Secara alami, kulit sudah berusaha melindungi dirinya beserta organ-organ dibawahnya dari bahaya sinar UV matahari, antara lain dengan membentuk butir-butir pigmen kulit (melanin) yang sedikit banyak memantulkan kembali sinar matahari. Jika kulit terpapar sinar matahari, misalnya ketika seseorang berjemur, maka timbul 2 tipe reaksi melanin (Tranggono, 2007):

1. Penambahan melanin dengan cepat ke permukaan kulit.
2. Pembentukan tambahan melanin baru.

Jika pembentukan melanin berlebihan dan terus menerus, noda hitam pada kulit dapat terjadi.

1. Cara Perlindungan Kulit terbagi atas (Tranggono, 2007) :

a. Perlindungan secara fisik

Misalnya memakai payung, topi lebar, baju lengan panjang, celana panjang, serta pemakaian bahan-bahan kimia yang melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar yang mengenai kulit, misalnya titanium dioksida, zink oksida, kaolin, kalsium karbonat, magnesium karbonat, talcum, silisium dioksida, dan bahan-bahan lainnya.

b. Perlindungan secara kimiawi dengan memakai bahan kimia

- 1) Bahan yang menimbulkan dan mempercepat proses penggelapan kulit (tanning). Misalnya dioxy acetone dan 8-methoxy psoralen yang dikonsumsi 2 jam sebelum berjemur. Bahan ini mempercepat pembentukan pigmen melanin dipermukaan kulit. Bahan-bahan tersebut mengabsorpsi radiasi sinar UVB sekurang-kurangnya 85% pada panjang gelombang 290-320 nm tetapi meneruskan sinar UV A pada panjang gelombang lebih dari 320 nm dan menyebabkan sedikit warna coklat sementara pada kulit.
- 2) Bahan yang menyerap UV B tetapi meneruskan UV A ke dalam kulit. Misalnya para amino benzoic acid (PABA) dan derivatnya, derivat cinnamates, anthranilates, benzophenon, digalloyl trioliolate dan petrolatum, veteriner merah. Tapi perlu diingat dan sejumlah bahan tersebut bersifat

photosensitizer yaitu jika terkena terik matahari seperti halnya di negara tropis Indonesia dapat menimbulkan berbagai reaksi negatif pada kulit, seperti *photoallergy*, *photo toxic*, disamping pencoklatan kulit tannin yang tidak disukai oleh orang asia yang menyukai kulit putih.

3) Bahan pencegah efek terbakar sinar matahari (sunburn)

Didefinisikan sebagai sunscreen yang mengabsorpsi radiasi sinar UV B 95% atau lebih pada panjang gelombang 290-329 nm. Dalam beberapa hal tabir surya yang sama dapat bekerja pada proses *suntanning* dan mencegah efek sunburn sekaligus tetapi pada konsentrasi yang berbeda (konsentrasi pada produk suntan lebih rendah).

Penentuan aktivitas tabir surya dilakukan dengan cara menghitung nilai SPF dari sediaan. Pathak membagi tingkat kemampuan tabir surya sebagai berikut (Wasitaatmadja, 1997):

- a. Minimal, bila SPF antara 2-4, contoh salisilat, antranilat
- b. Sedang, bila SPF antara 4-6, contoh sinamat, bensofenon
- c. Ekstra, bila SPF antara 6-8, contoh derivat PABA
- d. Maksimal, bila SPF antara 8-15, contoh PABA
- e. Ultra, bila SPF lebih dari 15, contoh kombinasi PABA, non-PABA dan fisik.

Nilai SPF minimum pada suatu daerah ditentukan intensitas sinar UV pada daerah tersebut, sehingga nilai SPF optimum pada daerah tropis lebih tinggi dibandingkan pada daerah subtropis (Tranggono, 2007).

2. Penentuan kekuatan tabir surya

Penentuan kekuatan produk tabir surya dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran sederhana adsorbansi produk dalam larutan.

- a. Hukum Lambert-Beer. Turunan bentuk dari hukum Lambert-Beer yang digunakan adalah : (Lowe, 2000)

$$\frac{I}{I_s} = 10^{-E_{1cm}^{1\%}}$$

Keterangan :

I_s = intensitas sinar mula-mula

I = intensitas sinar yang melewati larutan dengan ketebalan t cm

c = konsentrasi bahan tabir surya dalam larutan (%)

$E^{1\%}$ = absorpsitivitas, adsorbansi dari larutan 1% pada ketebalan larutan 1 cm.

$$E_{1cm}^{1\%} = \frac{A}{C_s} \times 10^{-4}$$

Keterangan :

A = adsorbansi larutan 0,1 g/L dari sediaan tabir surya (dalam alcohol)

C_s = konsentrasi dari bahan tabir surya dalam sediaan tabir surya.

$$c = \frac{C_s}{500 \times t}$$

Sehingga, $\frac{I}{I_s} = 10^{-20 A}$

- b. Nilai SPF (Sun protecting Factor) dihitung dengan terlebih dahulu menghitung luas daerah dibawah kurva serapan (AUC) dari nilai serapan

pada panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 2 nm. Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut : (Cairns, 2004)

$$[AUC] = \frac{Aa + Ab}{2} \times (dP_{a-b})$$

Aa = Absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = Absorbansi pada panjang gelombang b nm

dP_{a-b} = Selisih panjang gelombang a dan b

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan semua nilai AUC pada tiap segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Chairns, 2004 ; Lowe,2000)

$$\text{Log SPF} = \frac{AUC}{\lambda_n - \lambda_1}$$

λ_n = panjang gelombang terbesar (dengan $A \geq 0,05$ untuk ekstrak ; dengan $A \geq 0,01$ untuk sediaan)

λ_1 = Panjang gelombang terkecil (290 nm)

- c. Perbandingan MED antara kulit yang terlindungi dengan yang tidak terlindungi sediaan tabir surya, maka nilai SPF pada suatu panjang gelombang dapat ditentukan dengan persamaan,

$$\text{SPF} = 10^{20A}$$

Untuk memperoleh nilai SPF pada rentang panjang gelombang UV A dan UV B, terlebih dahulu ditentukan rata-rata nilai A pada interval eritemogeniknya. Interval aktivitas eritemogenik adalah interval panjang gelombang yang dapat diserap oleh bahan tabir surya yang dapat menyebabkan eritema yang dapat ditunjukkan dengan absorbansi sebesar 0,05 pada sampel yang tanpa pengenceran. Menurut FDA (Food and Drug Administration), sediaan yang digunakan pada penentuan nilai SPF sebanyak 2 mg/cm^2 yang setara dengan 2 mg/ml (Lowe, 2000 ; Lestari, 2006).

SPF didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara pajanan UV yang dibutuhkan untuk menghasilkan eritema minimal (MED) pada kulit yang dilindungi dan pajanan yang dapat menghasilkan eritema yang sama pada kulit yang tidak dilindungi. Metode SPF merupakan metode resmi Amerika Serikat. FDA (Food Drug Administration) mensyaratkan produk tabir surya harus mencantumkan nilai SPF-nya, untuk memberikan arahan pada konsumen mengenai kekuatan relatif dari produk tersebut (Purwanti, 2004).

Daya tahan kulit terhadap sinar matahari dinyatakan MED (*minimum erythema dose*) yaitu keadaan kulit di bawah sinar matahari (tanpa tabir surya) sebelum mengalami tanda kemerahan (Purwanti, 2004).

MED berdasarkan warna kulit (Purwanti, 2004) :

1. Tipe 1 : Blondi, rambut pirang kemerahan, mata biru/hijau, bertahan 10-20 menit.

2. Tipe 2 : Kulit putih, rambut pirang kekuningan, mata biru/coklat, bertahan 15-30 menit.
3. Tipe 3 : Kulit kuning langsung, rambut coklat, mata coklat, dapat bertahan 20-40 menit.
4. Tipe 4 : Kulit coklat muda, rambut hitam, mata coklat tua, dapat bertahan 25-50 menit.
5. Tipe 5 : Kulit sawo matang, rambut hitam, mata coklat tua, dapat bertahan 30-60 menit.
6. Tipe 6 : Kulit hitam, rambut hitam, mata hitam, bertahan 40-75 menit.

Tabir surya dengan SPF menyatakan lamanya kulit seseorang berada di bawah sinar matahari tanpa mengalami luka bakar. Sedangkan angka SPF menyatakan berapa kali daya tahan alami kulit seseorang dilipatgandakan sehingga aman dibawah sinar matahari tanpa terkena luka bakar (Purwanti, 2004).

E. Sinar UV A & UV B

Berdasarkan klasifikasi, sinar radiasi UV digolongkan menjadi tiga bagian yaitu senyawa tabir surya tipe A (menyerap sinar UV pada panjang 315-400 nm), tipe B (menyerap sinar UV pada panjang 290-315 nm), tipe C (menyerap sinar UV pada panjang 200-290 nm) (Harry, 1952).

Ultraviolet A (UV A) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 400 – 315 nm dengan efektivitas tertinggi pada 340 nm, dapat menyebabkan warna coklat pada kulit

tanpa menimbulkan kemerahan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya oksidasi bentuk leuko dari melamin yang berada pada lapisan atas kulit.

Ultraviolet B (UV B) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 315 – 280 nm dengan efektivitas tertinggi pada 297,6 nm, merupakan daerah eritemogenik, dapat menimbulkan sengatan surya dan terjadi reaksi pembentukan melanin awal.

Ultraviolet C (UV C) yaitu sinar dengan panjang gelombang di bawah 280 nm, dapat merusak jaringan kulit, tetapi sebagian besar telah tersaring oleh lapisan ozon dalam atmosfer (Anonim , 1985).

F. Spektrofotometer UV-Vis

Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh atom atau molekul disebut spektrofotometer. Jenis spektrofotometer yang tersedia berbeda-beda, tergantung pada cahaya yang digunakan, apakah berkas cahaya tunggal atau berkas sampel dan pembanding secara terpisah, dan apakah pengukurannya dilakukan pada panjang gelombang tetap atau memindai spektrum pada berbagai panjang gelombang. Seperti pada sebagian besar alat analitik, akurasi, presisi, dan biayanya sangat bervariasi (Cairns, 2004).

Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorpsi radiasi elektromagnet. Cahaya terdiri dari radiasi terhadap mana mata manusia peka, gelombang dengan panjang berlainan akan menimbulkan cahaya yang berlainan sedangkan campuran cahaya dengan panjang-panjang ini akan menyusun cahaya putih. Cahaya putih meliputi seluruh spektrum nampak 400-760 mm. Keuntungan

utama pemilihan metode spektrofotometri bahwa metode ini memberikan metode sangat sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil (Anonim , 1979).

Spektrum UV-Vis merupakan hasil interaksi antara radiasi elektromagnetik (REM) dengan molekul. REM merupakan bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat gelombang dan partikel (foton). Karena sifat sebagai gelombang maka beberapa parameter perlu diketahui antara lain panjang gelombang, frekuensi (f), bilangan gelombang (n), dan serapan (A). Penggunaan spektrofotometer UV-Vis digunakan terutama untuk analisa kuantitatif tetapi dapat juga untuk analisa kualitatif. Secara garis besar daerah spektrum dibagi dalam daerah ultraviolet (190nm-380nm), daerah cahaya tampak (380nm-780nm), daerah inframerah dekat (780nm-3000nm) dan daerah inframerah (2,5nm-40nm). Spektrum cahaya ultraviolet dan cahaya tampak suatu zat pada umumnya tidak mempunyai derajat spesifikasi tinggi, walaupun demikian spektrum tersebut sesuai untuk pemeriksaan kuantitatif dan untuk berbagai zat spektrum tersebut bermanfaat sebagai tambahan untuk identifikasi (Anonim , 1979).

Penetapan kadar secara kuantitatif dilakukan dengan mengukur serapan larutan zat dalam suatu pelarut pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran serapan biasanya dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum. Oleh karena serapan dapat berbeda jika digunakan alat yang berbeda, maka sebaiknya pengukuran dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum yang diperoleh dengan alat yang digunakan. Syaratnya panjang gelombang yang diperoleh dengan alat tidak berbeda lebih dari $\pm 0,5$ nm pada daerah pengukuran 240-280 nm, tidak lebih dari ± 1

nm pada daerah pengukuran 280-320 nm serta tidak lebih dari ± 3 nm pada daerah pengukuran diatas 320 nm dari panjang gelombang yang ditentukan. Jika perbedaannya melebihi batas tersebut maka alat harus dikalibrasi. Pada pengukuran serapan suatu larutan hampir semua digunakan blanko untuk spektrofotometer agar panjang gelombang pengukuran mempunyai serapan nol. Blanko dapat berupa pelarut yang sama seperti yang digunakan untuk melarutkan zat atau blanko pereaksi menyiapkan larutan zat (Anonim , 1995).

Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi larutan dan berbanding terbalik dengan transmittansi. Hukum tersebut dituliskan dengan

$$A = abc = \log 1/T$$

Keterangan : A = absorbansi

a = koefisien ekstingsi

b = tebal sel (cm)

c = konsentrasi analit

Pada spektrofotometri sinar tampak, pengamatan mata terhadap warna timbul dari penyerapan selektif panjang gelombang tertentu dari sinar masuk oleh objek yang berwarna (Vogel, 1994).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis dengan spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak terutama untuk senyawa yang tidak berwarna yang akan dianalisis yaitu (Khopkar, 2002) :

1. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV-Vis

Cara yang digunakan adalah dengan merubahnya menjadi senyawa lain atau direaksikan dengan pereaksi tertentu sehingga dapat menyerap sinar UV-Vis.

2. Waktu kerja (operating time)

Tujuannya ialah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Waktu kerja ditentukan dengan mengukur hubungan antara waktu pengukuran dengan absorbansi larutan.

3. Pemilihan panjang gelombang

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal.

4. Pembuatan kurva baku

Dilakukan dengan membuat seri larutan baku dalam berbagai konsentrasi kemudian absorbansi tiap konsentrasi diukur lalu dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi.

5. Pembacaan absorbansi sampel

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 sampai 0,6.

H. Tinjauan Islam mengenai Tanaman obat

Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga, serta kekayaan yang paling mahal harganya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohani belaka

tanpa mengindahkan aspek jasmania. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan duniawi dan ukhrawi.

Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja. Dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobatlah dengannya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ

شِفَاءً (رواه البخارى)

Terjemahnya :

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda; Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari, VII, 12)

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir ra. bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ

بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Terjemahnya :

Dari Jabir dari Rasulullah Saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah 'Azza wajallah. (H.R. Muslim, IV, 1729)

Maksud hadits diatas, bahwasanya obat hanyalah usaha, yang sebenarnya penyebab kesembuhannya hanyalah Allah. Intinya manusia hanya berusaha atau berupaya .

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qaradhawi 2001).

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Luqman (31) ayat 10:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ
بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di Permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh – tumbuhan ada manfaatnya, tugas manusia mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. *Alat dan Bahan Penelitian*

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Blender (Miyako), Corong pisah , Gelas piala (Pyrex), Timbangan analitik (kern alj 220-4nm), Sentrifug (Kubota 2500), Spektrofotometer UV-Vis (Jenway 6505).

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari air suling, etanol absolut , kulit jeruk manis.

B. *Penyiapan Sampel Penelitian*

1. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian berupa buah jeruk manis yang diambil di Kecamatan Budong-budong Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pengolahan Sampel (Switaning, 2010)

Sampel penelitian yang telah diambil dibersihkan dengan air mengalir kemudian di kupas, kulit jeruk manis dirajang, setelah itu kulit jeruk tersebut dihaluskan hingga halus. Kulit jeruk yang telah halus dibungkus dengan kain blacu kemudian diperas. Pemerasan dilakukan dua kali. Hasil yang diperoleh

berupa emulsi minyak dalam air yang disebut emulsi minyak. Selanjutnya, tahap pemisahan minyak melalui beberapa proses diantaranya :

Proses dekantasi, emulsi minyak atsiri kulit jeruk dimasukkan ke dalam corong pisah (pemisah fraksi air dan minyak emulsi). Setelah itu dibiarkan dalam corong pisah selama 24 jam. Fraksi air yang berada paling bawah dibuang dengan membuka kran pengeluaran sampai semua fraksi air mengalir keluar.

Selanjutnya dilakukan proses sentrifugasi, Fraksi minyak yang tertinggal di corong pisah dipindahkan ke tabung sentrifus, kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 2000rpm selama 15 menit. Sisa fraksi air akan berada pada bagian bawah cairan dalam botol sentrifus dan fraksi minyak berada pada bagian atas. Fraksi minyak itu disebut minyak kulit jeruk. Setelah itu minyak kulit jeruk diberi Na_2SO_4 anhidrat kemudian diaduk-aduk. Setiap 1 liter minyak diberi dengan 1-3 g Na_2SO_4 anhidrat. Setelah itu, minyak disaring untuk memisahkan Na_2SO_4 (Switaning, 2010).

3. Penentuan efektifitas sediaan

Ditimbang dengan seksama 50 mg bahan uji kemudian dilarutkan dalam etanol absolut pada labu ukur hingga 100,0 ml, diperoleh suatu konsentrasi 500 bpj (larutan stok), kemudian larutan stok diencerkan hingga diperoleh 6 konsentrasi yaitu 20 bpj, 40 bpj, 60 bpj, 80 bpj, 100 bpj dan 120 bpj. Masing-masing konsentrasi diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 240-400 nm.

4. Analisis data

Nilai SPF (Sun protecting Factor) dihitung dengan terlebih dahulu menghitung luas daerah dibawah kurva serapan (AUC) dari nilai serapan pada panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 5 nm. Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut : (Cairns,2004)

$$[AUC] = \frac{Aa + Ab}{2} \times (dP_{a-b})$$

Aa = Absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = Absorbansi pada panjang gelombang b nm

dP_{a-b} = Selisih panjang gelombang a dan b

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan semua nilai AUC pada tiap segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Chairns, 2004 ; Lowe,2000)

$$\text{Log SPF} = \frac{AUC}{\lambda_n - \lambda_1}$$

λ_n = panjang gelombang terbesar (dengan $A \geq 0,05$ untuk ekstrak ; dengan $A \geq 0,01$ untuk sediaan)

λ_1 = Panjang gelombang terkecil (290 nm)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian tentang penentuan nilai SPF (*Sun Protection Factor*) minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil perhitungan nilai SPF

Konsentrasi	Nilai SPF (rata-rata)
20 bpj	1.094
40 bpj	1.150
60 bpj	1.134
80 bpj	1.299
100 bpj	1.321
120 bpj	1.380

B. Pembahasan


Penentuan efektivitas sediaan tabir surya dilakukan dengan menentukan nilai SPF secara *in vitro* dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Penentuan nilai SPF dilakukan dengan mengukur serapan pada panjang gelombang 290 - 400 nm. Panjang gelombang ini mewakili panjang gelombang sinar matahari baik UV A (320-400) maupun UV B (290 - 320) (Anonim , 1985).

Senyawa berpotensi tabir surya sebagian besar merupakan senyawa organik yang memiliki gugus-gugus kromofor yang mampu menyerap sinar UV. Kemampuan ini disebabkan terjadinya transisi elektronik dalam molekul tabir surya dimana energi transisi tersebut setara dengan energi sinar UV (Thahir, 2002). Pengukuran potensi suatu senyawa berefek tabir surya dianalisis dari kemampuannya mengabsorpsi sinar UV pada panjang gelombang daerah serapan sinar UV yang dikelompokkan ke dalam UV B (290 - 320 nm) hingga UV A (320 - 400 nm).

Minyak atsiri kulit buah jeruk manis diekstraksi dengan metode dingin yaitu dengan metode pemerasan, sehingga dilakukan terutama untuk minyak atsiri yang tidak stabil dan tidak tahan pemanasan seperti minyak jeruk (*Citrus*) untuk menjaga kandungan minyak atsiri selama proses ekstraksi (Rahim,2007). Minyak atsiri buah jeruk terdapat dalam kantung-kantung minyak yang terdistribusi secara tidak teratur pada bagian kulit buah yang telah masak, jika kulit diberi tekanan maka kantung minyak akan hancur dan minyak akan keluar dari kantung (Guenther,2007).


Bagian molekul organik yang bertanggung jawab terhadap penyerapan cahaya disebut kromofor dan terdiri atas ikatan rangkap dua atau rangkap tiga, terutama jika ikatan tersebut terkonjugasi (ikatan rangkap dan ikatan tunggal pada strukturnya berselang-seling). Semakin panjang ikatan rangkap dua atau rangkap tiga terkonjugasi didalam molekul, molekul tersebut akan semakin mudah menyerap cahaya. Senyawa-senyawa aromatik yang mengandung cincin benzen akan menyerap senyawa ultraviolet dengan panjang gelombang 254 nm (Chairins : 2008).

Minyak atsiri kulit jeruk manis mengandung senyawa antranilat, yang memiliki gugus-gugus kromofor yang mampu menyerap sinar UV yang kemudian dijadikan acuan aktivitas senyawa berpotensi tabir surya. Berdasarkan struktur kimianya, pada senyawa antranilat dimungkinkan berperan penting yaitu bagian rantai benzil. Adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada cincin benzen yang mengakibatkan efek perlindungan sinar UV karena kemampuannya mengabsorpsi sinar UV.



Gambar 1 : Senyawa antranilat (Sumber : www.termwiki.com)

Kemungkinan lain, diduga adanya efek perlindungan sinar UV dari kandungan minyak atsiri kulit buah jeruk manis adalah adanya kandungan hesperidin (Senyawa flavanoid). Dilihat dari hesperidin yang diketahui merupakan golongan senyawa flavanoid disini mengandung senyawa aromatik yang mengakibatkan efek perlindungan sinar UV.



Gambar 3 : Hesperidin (Sumber : www.chemicalbook.com)

Dari data absorbansi sinar UV, minyak atsiri kulit buah jeruk manis menunjukkan bahwa pada konsentrasi 20 bpj, 40 bpj, 60 bpj, 80 bpj, 100 bpj dan 120

bpj minyak atsiri ini dapat menyerap sinar UV pada daerah panjang gelombang UV B (290 – 320) hingga UV A (320 – 400). Absorbansi tertinggi pada panjang gelombang 290 – 360. Minyak atsiri ini mampu mengabsorpsi sinar UV A termasuk pada panjang gelombang 340 nm yang merupakan panjang gelombang efektifitas tertinggi dari UV A yang dapat menyebabkan pencoklatan kulit. Bahan ini dapat pula mengabsorpsi sinar UV B pada panjang gelombang 290 – 320 nm, termasuk pada panjang gelombang 297,5 nm yang merupakan daerah eritemogenik yang dapat menimbulkan sengatan surya, seperti yang telah dijelaskan oleh Anonim (1985) bahwa ultraviolet A (UV A) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 400 – 315 nm dengan efektivitas tertinggi pada 340 nm, dapat menyebabkan warna coklat pada kulit tanpa menimbulkan kemerahan sebelumnya. Ultraviolet B (UV B) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 315 – 280 nm dengan efektivitas tertinggi pada 297,6 nm, merupakan daerah eritemogenik, dapat menimbulkan sengatan surya dan terjadi reaksi pembentukan melanin awal (Anonim, 1985).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai SPF yang diperoleh untuk minyak atsiri 20 bpj adalah 1.094 , 40 bpj adalah 1.150, 60 bpj adalah 1.334, 80 bpj adalah 1.299, 100 bpj adalah 1.321, 120 bpj adalah 1.380. Dari perolehan nilai SPF, terjadi peningkatan nilai seiring peningkatan konsentrasi minyak atsiri. Pada prediksi dengan menggunakan kurva linear pada tiap panjang gelombang hingga konsentrasi 800 bpj diperoleh hasil, bahwa pada konsentrasi 800 bpj didapatkan nilai SPF 7,15. Nilai SPF ini merupakan tingkatan ekstra dari kemampuan tabir surya suatu senyawa. Berdasarkan pernyataan dari Wasiatmadjaya (1997) tingkat kemampuan tabir surya

minimal bila SPF antara 2-4, Sedang bila SPF antara 4-6, Ekstra bila SPF 6-8, maksimal, bila SPF antara 8-15, dan ultra bila SPF lebih dari 15 (Wasiatmadjaya,1997).

Berdasarkan prediksi ini dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri kulit buah jeruk manis kemungkinan berpotensi sebagai tabir surya jika konsentrasi ditingkatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian aktivitas tabir surya minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*), dapat disimpulkan bahwa :

1. Minyak atsiri kulit buah jeruk manis dapat mengabsorbsi sinar UV B hingga UV A dan berpotensi sebagai tabir surya.
2. minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*) pada konsentrasi hingga 120 bpj belum memenuhi syarat sebagai tabir surya dengan nilai SPF 1,380.

B. Saran

Perlu dilakukan peningkatan konsentrasi hasil untuk mendapatkan nilai SPF yang mampu bersifat sebagai tabir surya serta disarankan dapat diformulasi untuk dibuatkan sediaannya.


DAFTAR PUSTAKA

- Anonim , 1986. *Sediaan Galenik*, Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 1979. *Farmakope Indonesia Edisi III*, Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*, Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 1985, *Formularium Kosmetika Indonesia*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Affandi, andi. 2009. Penentuan nilai SPF (Sun Protection Factor) in vitro krim tabir surya ekstrak rumput laut *Eucheuma spinosum*. Skripsi, Makassar : Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid VII, Semarang : Maktabah Toha Putra.
- Ar-Rumaikhon, Sulaiman bin A, 2008. *Fiqih Pengobatan Islam: Kajian Komprehensif Seputar Berbagai Aspek Pengobatan Dalam Prespektif Islam*, Penerjemah, Tim Al-Qowam; Editor, Amir Ghozali, Lc & Effendy Abu Ahmad, solo : Al-Qowam.
- Chairns D, 2008. *Intisari kimia farmasi ed.2*. Terjemahan dari Essentials of pharmaceutical chemistry, second edition oleh simanjuntak J. Jakarta: EGC: Penerbit buku kedokteran.
- Departemen Agama RI. 1986/1987. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qura'n Departemen Agama RI
- Dwi, Tutik W. 2002. Sintesis senyawa tabir surya 3,4-dimetoksi isoamii sinamat dari bahan dasar minyak cengkeh dan minyak fusei. Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Madam.
- Guenther, ernest. 1997. *Minyak atsiri jilid III A*. Terjemahan dari The essentials oil oleh Ketaren S Jakarta : Universitas Indonesia (UI- press).

- Harry, R.G. 1962. *Modern Cosmeticology vol. 1*. New York : Chemical Publishing Co, inc.
- Kemal, tarwiyah. 2001. *Teknologi Tepat Guna Agroindustri Kecil Sumatera Barat*. Jakarta : Dewan ilmu pengetahuan, teknologi dan industry Sumatera Barat.
- Lestari R. 2006. *Penentuan nilai SPF in vitro Kristal yang diperoleh dari ekstrak rimpang kencur (Kaempferia galanga L) dengan spektrofotometer UV*. Skripsi, Jakarta : Fakultas MIPA universitas muhammadiyah Hamka.
- Lowe NJ, Shaath NA. 2000. *Sunscreens development, evaluation, end regulatory aspects*. Marcel Dekker. New York.
- Michael dan Irene ash. 1977. *A formulary of Cosmetic Preparation*, New York Chemical publishing Co.
- Nash JF. Tanner PR. 2006. Sunscreens. In: Draelos ZD, Thaman LA, (ed) New York : Cosmetics Formulation of skin care product. Taylor & Francis Group.
- Pracaya, IR. 1997. *Jeruk manis varietas, budi daya dan pascapanen* , Jakarta. Penebar swadaya.
- Prihatman, kemal. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Pembangunan di Pedesaan*. Jakarta. BAPPENAS.
- Purwanti, T., dan Soeratri, W. 2004. *Pengaruh Penambahan Asam Glikolat Terhadap Efektivitas Sediaan Tabir Surya Kombinasi Anti UV A dan AntiUV B dalam basis Gel Vol 4 No.3, t.t, Majalah Airlangga*.
- Rahim, Abdul dkk. 2007. *Buku dasar farmakognosi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Rukmana, rahmat. 2003. *Jeruk Manis*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Sarwono, B. 1995. *Jeruk dan kerabatnya cetakan 6*. Jakarta : PT. penebar swadaya.
- Savitri, Evika Sandi, 2008. *Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press.
- Steenis van Dr C.G.G.J. 2006. *Flora*. Diterjemahkan dari Flora oleh Ir. Moeso Surjowinoto dkk. Jakarta : PT. Pradya paramitha.

- Switaning, resti dkk. 2010. *Ekstraksi minyak atsiri dari limbah kulit jeruk manis di desa gadingkulon kecamatan dan kabupaten Malang sebagai campuran minyak goreng untuk penambah aroma terapi jeruk*. Skripsi, Malang : Universitas Negeri Malang.
- Thahir, iqmal dkk. *Analisis spectra transisi elektronik senyawa tabir surya Maa's-gly pada konfigurasi dimer dan konfigurasi slut etanol*. Yogyakarta : Austria Indonesian centre for computational chemistry, FMIPA, UGM, Sekip.
- Tranggono, R.I.S, F. Latifah dan J. Djajadistra, 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Trevor robinsos. 1995. *Kandungan organik tumbuhan tinggi. Eds 6*. Bandung : ITB.
- Tutik dwi wahyuningsih,dkk. 2002. *Sintesis senyawa tabir surya 3,4-dimetoksi Isoamil sinamat dari bahan dasar minyak cengkeh dan Minyak fusel*. Yogyakarta : FMIPA, Universitas Gadjah mada.
- Underwood A.L., R.A. Day, JR., 1999. *Analisis Kimia Kuantitatif edisi keenam*. Terjemahan dari Quantitative analysys sixth edition oleh Iis Sofyan, Jakarta : Erlangga.
- Wasiatmadjaya, S.M. 1977. *Penuntun ilmu kosmetik medic*. Jakarta : Universitas Indonesia press.
- Wijayakusuma, Hembing. 1994. *Tanaman Berkhasiat Obat Jilid 1*, Jakarta, Pustaka Kartini.

LAMPIRAN 1 : Pengujian efektifitas minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*) sebagai tabir surya secara spektrofotometer UV-Vis



Gambar 4 : Skema kerja pengujian efektifitas minyak atsiri kulit buah jeruk manis (*Citrus sinensis*) sebagai tabir surya secara spektrofotometer UV-Vis

LAMPIRAN II : Hasil pengukuran serapan minyak atsiri kulit buah jeruk 20 bpj
Tabel I . Data hasil replikasi serapan minyak atsiri 20 bpj

Panjang Gelombang	Pengulangan serapan			Rata-rata
	1	2	3	
290.0	0.064	0.053	0.054	0,057
295.0	0.047	0.028	0.039	0,038
300.0	0.055	0.050	0.058	0,054
305.0	0.036	0.027	0.023	0,028
310.0	0.057	0.042	0.032	0,043
315.0	0.035	0.047	0.050	0,04
320.0	0.053	0.052	0.062	0,055
325.0	0.047	0.041	0.041	0,043
330.0	0.056	0.073	0.047	0,058
335.0	0.060	0.071	0.042	0,057
340.0	0.049	0.025	0.019	0,031
345.0	0.050	0.035	0.044	0,041
350.0	0.042	0.026	0.046	0,038
355.0	0.052	0.022	0.035	0,036
360.0	0.038	0.031	0.021	0,03
365.0	0.039	0.038	0.038	0,038
370.0	0.035	0.032	0.037	0,034
375.0	0.035	0.036	0.038	0,036
380.0	0.034	0.031	0.037	0,034
385.0	0.033	0.035	0.034	0,034
390.0	0.033	0.032	0.034	0,031
395.0	0.029	0.032	0.031	0,03
400.0	0.033	0.034	0.035	0,034

LAMPIRAN III : Hasil pengukuran serapan minyak atsiri kulit buah jeruk 40 bpj
Tabel 2. Data hasil replikasi serapan minyak atsiri 40 bpj

Panjang Gelombang	Pengulangan serapan			Rata-rata
	1	2	3	
290.0	0.068	0.083	0.068	0,073
295.0	0.066	0.053	0.054	0,057
300.0	0.084	0.082	0.076	0,08
305.0	0.043	0.063	0.055	0,053
310.0	0.076	0.076	0.075	0,075
315.0	0.081	0.081	0.090	0,084
320.0	0.085	0.085	0.094	0,088
325.0	0.083	0.079	0.095	0,085
330.0	0.112	0.107	0.107	0,108
335.0	0.098	0.094	0.094	0,095
340.0	0.065	0.063	0.062	0,063
345.0	0.081	0.080	0.083	0,081
350.0	0.047	0.078	0.055	0,06
355.0	0.063	0.065	0.041	0,056
360.0	0.051	0.037	0.027	0,038
365.0	0.042	0.044	0.042	0,042
370.0	0.038	0.040	0.039	0,039
375.0	0.038	0.040	0.042	0,04
380.0	0.038	0.038	0.040	0,038
385.0	0.036	0.038	0.037	0,037
390.0	0.038	0.038	0.038	0,038
395.0	0.032	0.036	0.035	0,034
400.0	0.035	0.034	0.038	0,035

LAMPIRAN IV : Hasil pengukuran serapan minyak atsiri kulit buah jeruk 60 bpj
Tabel 3. Data hasil replikasi serapan minyak atsiri 60 bpj

Panjang Gelombang	Pengulangan serapan			Rata-rata
	1	2	3	
290.0	0.083	0.176	0.118	0,125
295.0	0.062	0.147	0.116	0,108
300.0	0.083	0.181	0.131	0,131
305.0	0.072	0.159	0.118	0,116
310.0	0.092	0.205	0.135	0,144
315.0	0.098	0.200	0.142	0,146
320.0	0.120	0.218	0.173	0,17
325.0	0.117	0.215	0.163	0,165
330.0	0.124	0.248	0.180	0,184
335.0	0.124	0.213	0.168	0,174
340.0	0.096	0.185	0.124	0,135
345.0	0.077	0.181	0.135	0,131
350.0	0.079	0.150	0.108	0,112
355.0	0.069	0.148	0.104	0,107
360.0	0.050	0.115	0.093	0,086
365.0	0.043	0.082	0.052	0,059
370.0	0.041	0.074	0.042	0,052
375.0	0.041	0.073	0.046	0,053
380.0	0.041	0.073	0.042	0,052
385.0	0.038	0.073	0.041	0,05
390.0	0.039	0.069	0.042	0,05
395.0	0.038	0.070	0.037	0,048
400.0	0.037	0.070	0.039	0,048

LAMPIRAN V : Hasil pengukuran serapan minyak atsiri kulit buah jeruk 80 bpj
Tabel 4. Data hasil replikasi serapan minyak atsiri 80 bpj

Panjang Gelombang	Pengulangan serapan			Rata-rata
	1	2	3	
290.0	0.142	0.139	0.131	0,137
295.0	0.143	0.137	0.110	0,13
300.0	0.149	0.160	0.148	0,152
305.0	0.136	0.127	0.112	0,125
310.0	0.177	0.158	0.149	0,161
315.0	0.178	0.178	0.153	0,169
320.0	0.210	0.194	0.176	0,193
325.0	0.195	0.184	0.161	0,18
330.0	0.192	0.204	0.185	0,193
335.0	0.196	0.191	0.173	0,186
340.0	0.157	0.162	0.148	0,155
345.0	0.167	0.152	0.148	0,155
350.0	0.141	0.130	0.100	0,123
355.0	0.105	0.107	0.088	0,093
360.0	0.091	0.092	0.043	0,075
365.0	0.053	0.053	0.053	0,053
370.0	0.046	0.047	0.046	0,046
375.0	0.046	0.050	0.047	0,047
380.0	0.044	0.045	0.042	0,043
385.0	0.045	0.044	0.042	0,043
390.0	0.040	0.042	0.041	0,041
395.0	0.039	0.037	0.038	0,038
400.0	0.041	0.042	0.039	0,04

LAMPIRAN VI : Hasil pengukuran serapan minyak atsiri kulit buah jeruk 100 bpj
Tabel 5. Data hasil replikasi serapan minyak atsiri 100 bpj

Panjang Gelombang	Pengulangan serapan			Rata-rata
	1	2	3	
290.0	0.150	0.140	0.165	0,151
295.0	0.137	0.128	0.158	0,141
300.0	0.158	0.154	0.170	0,16
305.0	0.134	0.145	0.142	0,14
310.0	0.166	0.162	0.167	0,165
315.0	0.192	0.182	0.194	0,189
320.0	0.197	0.196	0.202	0,198
325.0	0.200	0.186	0.204	0,196
330.0	0.216	0.210	0.233	0,219
335.0	0.210	0.193	0.209	0,204
340.0	0.168	0.177	0.172	0,17
345.0	0.155	0.152	0.168	0,158
350.0	0.119	0.129	0.144	0,13
355.0	0.070	0.117	0.107	0,098
360.0	0.077	0.073	0.106	0,085
365.0	0.054	0.055	0.057	0,055
370.0	0.048	0.047	0.052	0,049
375.0	0.046	0.045	0.052	0,047
380.0	0.044	0.044	0.048	0,045
385.0	0.044	0.043	0.048	0,045
390.0	0.042	0.041	0.048	0,043
395.0	0.041	0.039	0.045	0,041
400.0	0.040	0.039	0.044	0,041

LAMPIRAN VII : Hasil pengukuran serapan minyak atsiri kulit buah jeruk 120 bpj

Tabel 6. Data hasil replikasi serapan minyak atsiri 120 bpj

Panjang Gelombang	Pengulangan serapan			Rata-rata
	1	2	3	
290.0	0.187	0.196	0.147	0,176
295.0	0.179	0.182	0.114	0,167
300.0	0.204	0.211	0.135	0,183
305.0	0.189	0.194	0.113	0,165
310.0	0.220	0.226	0.142	0,196
315.0	0.243	0.236	0.143	0,207
320.0	0.278	0.272	0.163	0,237
325.0	0.265	0.261	0.152	0,226
330.0	0.286	0.290	0.167	0,247
335.0	0.256	0.269	0.165	0,23
340.0	0.198	0.222	0.138	0,186
345.0	0.182	0.204	0.128	0,171
350.0	0.170	0.182	0.100	0,15
355.0	0.133	0.137	0.089	0,119
360.0	0.099	0.103	0.061	0,087
365.0	0.062	0.062	0.052	0,058
370.0	0.055	0.051	0.046	0,05
375.0	0.051	0.052	0.047	0,05
380.0	0.050	0.050	0.045	0,048
385.0	0.049	0.049	0.043	0,047
390.0	0.049	0.048	0.041	0,046
395.0	0.043	0.044	0.040	0,042
400.0	0.047	0.045	0.040	0,044

LAMPIRAN VIII : Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 20 bpj

Tabel 7. Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 20 bpj

Wavelength(nm)	AUC			Rata-rata
	1	2	3	
290.0-295.0	0,277	0,202	0,232	0,237
295.0-300.0	0,255	0,195	0,242	0,230
300.0-305.0	0,227	0,192	0,202	0,207
305.0-310.0	0,232	0,172	0,137	0,180
310.0-315.0	0,23	0,222	0,205	0,219
315.0-320.0	0,22	0,247	0,28	0,249
320.0-325.0	0,25	0,232	0,257	0,161
325.0-330.0	0,257	0,285	0,22	0,254
330.0-335.0	0,29	0,36	0,222	0,291
335.0-340.0	0,272	0,24	0,152	0,221
340.0-345.0	0,247	0,15	0,157	0,185
345.0-350.0	0,23	0,152	0,125	0,169
350.0-355.0	0,235	0,12	0,202	0,186
355.0-360.0	0,255	0,132	0,14	0,176
360.0-365.0	0,192	0,172	0,14	0,168
365.0-370.0	0,185	0,175	0,187	0,182
370.0-375.0	0,175	0,17	0,188	0,178
375.0-380.0	0,172	0,167	0,188	0,176
380.0-385.0	0,167	0,165	0,177	0,169
385.0-390.0	0,165	0,167	0,17	0,167
390.0-395.0	0,155	0,16	0,162	0,159
395.0-400.0	0,155	0,165	0,165	0,162
Total AUC				4.299
Nilai SPF				1.094

LAMPIRAN IX : Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 40 bpj**Tabel 8. Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 40 bpj**

Wavelength(nm)	AUC			Rata-rata
	1	2	3	
290.0-295.0	0,335	0,34	0,305	0,327
295.0-300.0	0,375	0,337	0,325	0,346
300.0-305.0	0,317	0,362	0,327	0,335
305.0-310.0	0,297	0,347	0,325	0,323
310.0-315.0	0,392	0,392	0,412	0,399
315.0-320.0	0,415	0,145	0,46	0,34
320.0-325.0	0,42	0,41	0,472	0,434
325.0-330.0	0,487	0,465	0,505	0,486
330.0-335.0	0,525	0,502	0,502	0,509
335.0-340.0	0,408	0,392	0,39	0,397
340.0-345.0	0,365	0,357	0,362	0,361
345.0-350.0	0,32	0,395	0,345	0,353
350.0-355.0	0,275	0,357	0,24	0,291
355.0-360.0	0,285	0,255	0,17	0,237
360.0-365.0	0,232	0,202	0,172	0,202
365.0-370.0	0,2	0,21	0,202	0,204
370.0-375.0	0,19	0,2	0,202	0,198
375.0-380.0	0,19	0,195	0,205	0,197
380.0-385.0	0,185	0,19	0,193	0,189
385.0-390.0	0,185	0,19	0,188	0,188
390.0-395.0	0,175	0,185	0,183	0,181
395.0-400.0	0,165	0,175	0,183	0,174
Total AUC				6.691
Nilai SPF				1,150

LAMPIRAN X : Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 60 bpj

Tabel 9. Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 60 bpj

Wavelength(nm)	AUC			Rata-rata
	1	2	3	
290.0-295.0	0.362	0.807	0.585	0.584
295.0-300.0	0.362	0.82	0.617	0.599
300.0-305.0	0.387	0.85	0.622	0.619
305.0-310.0	0.41	0.91	0.632	0.650
310.0-315.0	0.475	1.012	0.692	0.726
315.0-320.0	0.545	1.045	0.787	0.792
320.0-325.0	0.547	1.082	0.84	0.823
325.0-330.0	0.602	1.157	0.857	0.872
330.0-335.0	0.62	1.152	0.87	0.880
335.0-340.0	0.55	0.995	0.73	0.758
340.0-345.0	0.432	0.915	0.647	0.664
345.0-350.0	0.39	0.827	0.608	0.608
350.0-355.0	0.37	0.745	0.53	0.548
355.0-360.0	0.297	0.657	0.492	0.482
360.0-365.0	0.232	0.492	0.362	0.362
365.0-370.0	0.21	0.39	0.235	0.278
370.0-375.0	0.205	0.367	0.22	0.264
375.0-380.0	0.205	0.365	0.22	0.263
380.0-385.0	0.197	0.365	0.207	0.256
385.0-390.0	0.192	0.355	0.207	0.251
390.0-395.0	0.192	0.347	0.198	0.245
395.0-400.0	0.187	0.35	0.19	0.242
Total AUC	7.968	16.085	11.485	13.799
Nilai SPF	1.181	1.39	1.271	1.334

LAMPIRAN XI : Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 80 bpj

Tabel 10. Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 80 bpj

Wavelength(nm)	AUC			Rata-rata
	1	2	3	
290.0-295.0	0.712	0.69	0.602	0.668
295.0-300.0	0.73	0.742	0.645	0.705
300.0-305.0	0.712	0.717	0.65	0.693
305.0-310.0	0.782	0.712	0.652	0.715
310.0-315.0	0.87	0.84	0.755	0.821
315.0-320.0	0.97	0.93	0.822	0.907
320.0-325.0	1.012	0.947	0.842	0.933
325.0-330.0	0.96	0.97	0.865	0.931
330.0-335.0	0.97	0.987	0.895	0.950
335.0-340.0	0.882	0.882	0.802	0.855
340.0-345.0	0.81	0.785	0.74	0.778
345.0-350.0	0.77	0.705	0.62	0.698
350.0-355.0	0.615	0.593	0.47	0.559
355.0-360.0	0.49	0.498	0.327	0.438
360.0-365.0	0.36	0.363	0.24	0.321
365.0-370.0	0.247	0.25	0.247	0.248
370.0-375.0	0.23	0.242	0.232	0.234
375.0-380.0	0.225	0.237	0.225	0.229
380.0-385.0	0.222	0.222	0.21	0.218
385.0-390.0	0.212	0.215	0.207	0.211
390.0-395.0	0.197	0.197	0.198	0.197
395.0-400.0	0.2	0.197	0.192	0.196
Total AUC	13.176	12.921	11.463	12.505
Nilai SPF	1.317	1.310	1.271	1.299

LAMPIRAN XII : Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 100 bpj

Tabel 11. Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 100 bpj


Wavelength(nm)	AUC			Rata-rata
	1	2	3	
290.0-295.0	0.717	0.67	0.807	0.731
295.0-300.0	0.737	0.705	0.82	0.754
300.0-305.0	0.73	0.747	0.78	0.752
305.0-310.0	0.75	0.767	0.772	0.763
310.0-315.0	0.895	0.86	0.902	0.885
315.0-320.0	0.972	0.945	0.99	0.969
320.0-325.0	0.992	0.955	1.015	0.987
325.0-330.0	1.04	0.99	1.092	1.010
330.0-335.0	1.065	1.007	1.105	1.059
335.0-340.0	0.945	0.925	0.952	0.940
340.0-345.0	0.807	0.822	0.85	0.826
345.0-350.0	0.685	0.702	0.78	0.722
350.0-355.0	0.472	0.615	0.627	0.571
355.0-360.0	0.368	0.475	0.532	0.458
360.0-365.0	0.327	0.32	0.407	0.351
365.0-370.0	0.255	0.255	0.273	0.261
370.0-375.0	0.235	0.23	0.125	0.196
375.0-380.0	0.225	0.222	0.25	0.232
380.0-385.0	0.22	0.217	0.24	0.225
385.0-390.0	0.215	0.21	0.24	0.221
390.0-395.0	0.207	0.2	0.232	0.213
395.0-400.0	0.202	0.195	0.222	0.206
Total AUC	13.061	13.032	14.013	13.321
Nilai SPF	1.314	1.313	1.340	1.321

LAMPIRAN XIII : Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 120 bpj

Tabel 12. Perhitungan nilai SPF minyak atsiri 120 bpj

Wavelength(nm)	AUC			Rata-rata
	1	2	3	
290.0-295.0	0.915	0.945	1.006	0.955
295.0-300.0	0.957	0.982	0.622	0.853
300.0-305.0	0.982	1.013	0.662	0.885
305.0-310.0	1.022	1.05	0.638	0.903
310.0-315.0	1.157	1.155	0.713	1.008
315.0-320.0	1.302	1.27	0.765	1.112
320.0-325.0	1.357	1.332	0.787	1.158
325.0-330.0	1.377	1.378	0.797	1.184
330.0-335.0	1.355	1.398	0.83	1.194
335.0-340.0	1.135	1.228	0.757	1.04
340.0-345.0	0.95	1.065	0.665	0.893
345.0-350.0	0.88	0.965	0.57	0.805
350.0-355.0	0.757	0.789	0.473	0.673
355.0-360.0	0.58	0.6	0.575	0.585
360.0-365.0	0.402	0.413	0.282	0.365
365.0-370.0	0.292	0.283	0.245	0.273
370.0-375.0	0.265	0.257	0.232	0.251
375.0-380.0	0.252	0.255	0.23	0.245
380.0-385.0	0.247	0.247	0.22	0.238
385.0-390.0	0.245	0.242	0.21	0.232
390.0-395.0	0.23	0.23	0.202	0.220
395.0-400.0	0.225	0.222	0.2	0.215
Total AUC	16.887	17.319	11.681	15.387
Nilai SPF	1.424	1.436	1.277	1.380

LAMPIRAN X IV : Spektrum serapan minyak atsiri



Gambar 5 : Spektrum serapan minyak atsiri

- Keterangan :
1. MA 20 bpj = Spektrum serapan minyak atsiri 20 bpj
 2. MA 40 bpj = Spektrum serapan minyak atsiri 40 bpj
 3. MA 60 bpj = Spektrum serapan minyak atsiri 60 bpj
 4. MA 80 bpj = Spektrum serapan minyak atsiri 80 bpj
 5. MA 100 bpj = Spektrum serapan minyak atsiri 100 bpj
 6. MA 120 bpj = Spektrum serapan minyak atsiri 120 bpj

LAMPIRAN XV : Hasil Prediksi Serapan Minyak Atsiri 150 bpj

Tabel 13 : Data Hasil Prediksi Serapan Minyak Atsiri 150 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,2157
295	0,1965
300	0,231
305	0,219
310	0,250
315	0,276
320	0,300
325	0,292
330	0,309
335	0,292
340	0,251
345	0,497
350	0,189
355	0,152
360	0,115
365	0,067
370	0,049
375	0,052
380	0,050
385	0,049
390	0,048
395	0,047
400	0,047

LAMPIRAN XVI : Prediksi Nilai SPF 200 bpj

Tabel 14 : Data Hasil Prediksi Serapan 200 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,275
295	0,261
300	0,296
305	0,289
310	0,325
315	0,361
320	0,390
325	0,382
330	0,399
335	0,377
340	0,331
345	0,652
350	0,244
355	0,192
360	0,145
365	0,077
370	0,054
375	0,057
380	0,055
385	0,054
390	0,053
395	0,052
400	0,052

LAMPIRAN XVI I: Prediksi Nilai SPF 250 bpj

Tabel 15 : Data Hasil Prediksi Serapan 250 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,335
295	0,326
300	0,361
305	0,359
310	0,400
315	0,446
320	0,480
325	0,472
330	0,489
335	0,462
340	0,411
345	0,807
350	0,299
355	0,232
360	0,175
365	0,087
370	0,059
375	0,062
380	0,060
385	0,059
390	0,058
395	0,057
400	0,056

LAMPIRAN XVIII : Prediksi Nilai SPF 300 bpj

Tabel 16 : Data Hasil Prediksi Serapan 300 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,395
295	0,391
300	0,426
305	0,429
310	0,475
315	0,531
320	0,570
325	0,562
330	0,579
335	0,543
340	0,491
345	0,962
350	0,354
355	0,272
360	0,205
365	0,097
370	0,064
375	0,067
380	0,065
385	0,064
390	0,063
395	0,062
400	0,061

LAMPIRAN XIX : Prediksi Nilai SPF 350 bpj

Tabel 17 : Data Hasil Prediksi Serapan 350 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,455
295	0,456
300	0,491
305	0,499
310	0,550
315	0,616
320	0,660
325	0,652
330	0,669
335	0,632
340	0,571
345	1,117
350	0,409
355	0,321
360	0,235
365	0,107
370	0,069
375	0,072
380	0,070
385	0,069
390	0,068
395	0,067
400	0,065

LAMPIRAN XX : Prediksi Nilai SPF 400 bpj

Tabel 18 : Data Hasil Prediksi Serapan 400 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,515
295	0,521
300	0,556
305	0,569
310	0,625
315	0,701
320	0,750
325	0,742
330	0,759
335	0,717
340	0,651
345	1,272
350	0,464
355	0,352
360	0,265
365	0,117
370	0,074
375	0,077
380	0,075
385	0,074
390	0,073
395	0,072
400	0,070

LAMPIRAN XXI : Prediksi Nilai SPF 450 bpj

Tabel 19 : Data Hasil Prediksi Serapan 450 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,575
295	0,586
300	0,621
305	0,639
310	0,700
315	0,786
320	0,840
325	0,832
330	0,849
335	0,802
340	0,731
345	1,427
350	0,519
355	0,392
360	0,295
365	0,127
370	0,079
375	0,082
380	0,080
385	0,079
390	0,078
395	0,077
400	0,074

LAMPIRAN XXII : Prediksi Nilai SPF 500 bpj

Tabel 20 : Data Hasil Prediksi Serapan 500 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,635
295	0,651
300	0,686
305	0,709
310	0,775
315	0,871
320	0,930
325	0,922
330	0,939
335	0,887
340	0,811
345	1,582
350	0,574
355	0,432
360	0,325
365	0,137
370	0,084
375	0,087
380	0,085
385	0,084
390	0,083
395	0,082
400	0,079

LAMPIRAN XXIII : Prediksi Nilai SPF 550 bpj

Tabel 21 : Data Hasil Prediksi Serapan 550 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,695
295	0,716
300	0,715
305	0,779
310	0,850
315	0,956
320	1,020
325	1,012
330	1,029
335	0,972
340	0,891
345	1,737
350	0,629
355	0,472
360	0,355
365	0,147
370	0,089
375	0,092
380	0,090
385	0,089
390	0,088
395	0,087
400	0,083

LAMPIRAN XXIV : Prediksi Nilai SPF 600 bpj

Tabel 22 : Data Hasil Prediksi Serapan 600 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,755
295	0,781
300	0,816
305	0,849
310	0,925
315	1,041
320	1,110
325	1,102
330	1,119
335	1,057
340	0,971
345	1,892
350	0,684
355	0,512
360	0,385
365	0,157
370	0,094
375	0,097
380	0,095
385	0,094
390	0,093
395	0,092
400	0,088

LAMPIRAN XXV : Prediksi Nilai SPF 650 bpj

Tabel 23 : Data Hasil Prediksi Serapan 650 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,815
295	0,846
300	0,881
305	0,919
310	1,000
315	1,126
320	1,200
325	1,192
330	1,209
335	1,142
340	1,051
345	2,047
350	0,739
355	0,552
360	0,415
365	0,167
370	0,099
375	0,102
380	0,100
385	0,099
390	0,098
395	0,097
400	0,092

LAMPIRAN XXVI : Prediksi Nilai SPF 700 bpj

Tabel 24 : Data Hasil Prediksi Serapan 700 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,875
295	0,911
300	0,946
305	0,989
310	1,075
315	1,211
320	1,290
325	1,282
330	1,299
335	1,227
340	1,131
345	2,203
350	0,794
355	0,592
360	0,445
365	0,177
370	0,104
375	0,107
380	0,105
385	0,104
390	0,103
395	0,102
400	0,097

LAMPIRAN XXVII : Prediksi Nilai SPF 750 bpj

Tabel 25 : Data Hasil Prediksi Serapan 750 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,935
295	0,976
300	1,011
305	1,059
310	1,150
315	1,296
320	1,380
325	1,372
330	1,389
335	1,312
340	1,211
345	2,357
350	0,849
355	0,632
360	0,475
365	0,187
370	0,109
375	0,112
380	0,110
385	0,109
390	0,108
395	0,107
400	0,101

LAMPIRAN XXVIII : Prediksi Nilai SPF 800 bpj

Tabel 26 : Data Hasil Prediksi Serapan 800 bpj

Panjang gelombang	Absorban
290	0,995
295	1,041
300	1,076
305	1,129
310	1,225
315	0,381
320	1,470
325	1,462
330	1,479
335	1,397
340	1,291
345	2,512
350	0,904
355	0,672
360	0,505
365	0,197
370	0,114
375	0,117
380	0,115
385	0,114
390	0,113
395	0,112
400	0,106

LAMPIRAN XVI : Gambar sampel Jeruk manis (*Citrus sinensis*)



Gambar 6 : Pohon jeruk manis asal kec. Topoyo kab. Mamuju Provinsi Sulawesi barat

Keterangan : 1 : Buah jeruk
2 : Daun



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



FATMA DEWI lahir di Gresik pada tanggal 7 Januari 1990 anak dari pasangan suami istri Achmad Alle.BA dan Harjuna Waris. yang merupakan anak yang ditunggu-tunggu karena merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Dia memulai sekolah di TK Pertiwi pada umur 5 tahun atau pada tahun 1994 kemudian melanjutkan bangku persekolannya di SDN Inpres rimuku, setelah sekolah 6 tahun dan tamat pada tahun 2000 lanjut ke jenjang sekolah selanjutnya di SMP Negeri 2 Mamuju. Di smp inilah selain ilmu duniawi, dia mendapatkan ilmu agama yang membawa hidupnya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan orang lain serta tak lupa pada Yang Maha Kuasa. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan sekolah sma unggulan di kab. Mamuju. Setelah lulus disana maka dirinya melanjutkan kuliah di salah satu P.T. negeri di Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar dia mengambil Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu – Ilmu Kesehatan.